







M





ANDꝛ CRATANDER LECTORI Sꝛ

EN TIBI CANDIDE LECTOR,

ARISTOTELIS ET

THEOPHRASTI HISTORIAS, QVIBVS CVNCTA FERÉ
 quæ Deus Opt. Max. hominī cōtemplanda & usurpanda exhibuit, adamussim
 complectuntur: creaturas inquam omnes, & sensu præditas, quæ animalia di-
 cuntur, & sensus expertes, quas appellant plantas. Vbi hercle ne ꝑꝑi quidem in
 speciem tam humile, tam abiectum, tamqꝛ pusillum, in quo summus ille creator
 non sit summè suspiciendus, & cuius non sit usus amplissimus. Qua profectò re
 uix aliud quicquam existit, quod gloriam & amorem Dei, omnium parentis, in
 cordibus hominum magis excitet & inflammet, Quod autē huiusmodi rerum
 cognitio, meditatioqꝛ, cum ad omne Philosophiæ genus, tum præcipuè ad Me-
 dicinam, tum ad uniuersam deniqꝛ mortalium uitam utilissima sit, ac maximè ne-
 cessaria, nullus est adeò naris obelæ, & à cōmuni sensu tam alienus, qui nō intel-
 ligat. Quum uerò ARISTOTELES & THEOPHRASTVS mihi in primis ad
 hoc faciū uidentur, per quos *domus iēny* uoluit eiusmodi mysteria benignissimè
 mortalibus effundere: ne tibi ea quocꝛ parte deessem, optime lector, placuit eorū
 quæ huc pertinent opera, sub incudē reuocata, multò quàm antehac diligentius
 emendatusqꝛ, publicis potius studijs, quàm rei priuatz consulens, excudere.

Proinde abs te uehementer contendo, ut meo in transcribē-

dis optimis authoribus studio, tuus etiā in

comparandis syncerus ani-

mus respondeat.

Vale, &

• Librorum catalogum uerſa pagina requirere.



BASILEAE

1534

HOC OPERE CONTINENTVR

ARISTOTELIS

De historia animalium, Lib. I X.
 De partibus animalium, & earum causis, Lib. I I I I:
 De generatione animalium, Lib. V.

Theodoro Gaza interprete.

De communi animalium gressu, Lib. unus.
 De communi animalium motu, Lib. unus.

Petro Alcyonio interprete.

THEOPHRASTI

De historia plantarum, Lib. I X.
 Et Decimi principium duntaxat.
 De causis plantarum, Lib. VI.

Theodoro Gaza interprete.

A D H A E C;

Vocabula latina & græca, ex Aristotelis libris de animalibus, & Theophrasti de plantis.

Indices in præfatos libros, summo labore & diligentia digessi.

A D L E C T O R E M.

Admonendum te duximus optime lector, priusquam indices nostros adgrediaris, priorem numerum paginam, alterum uero uersum eiusdem pagina designare, non semper illum quem indicat, sed ab eo ipso ad subsequenter denarium numerum progrediendum esse: ita ut quicquid querere statueris, decem illis uersibus comprehensum, statim se obtineas.

I N D E X.

IN ARISTOTE
lis de Historia animalium
libros Index.



Bdomen. 14.4
Aborriões quæ uo
centur. 108.10
Aborum facit &
equa & mulier,
odore extingit lucernæ. 139.30
Acari nomine animal. 81.20
Accipenferis branchiæ. 27.40
Accipenferis fel. 29.10
Accipiter auiū cor nō edit. 140.10
Accipitrū pulli suauis sunt. 88.40
Accipitris tempus excubadi. 88.10
Accipiter ubi sel habeat. 29.20
Accipitrū pulli suauis sunt. 88.40
Accipitres ubi nidificent. 88.40
Accipitrum genera. 146.30
Accipitres uenando inter se dissi
runt. 146.30
Accipitres carnuiori sunt. 117.20
Acetabulum. 14.40
Acetabula uulū quæ habet. 14.10
Acetabulum quo loco sit. 39.10
Acheolus amnis gignit piscem a
prum. 59.30
Achetæ cicadæ unde dicunt. 56.30
Acia unde generentur. 76.30
Aculeus insectorum. 66.10
Aculeo quæ armentur. 11.1
Acus piscis quando pariat. 68.10
Acus ferō sanctificat. 91.30
Ac^o piscis quomodo oua ædat. 92.30
Adeps cōmunis animalib^{us}. 14.20
Adeps à sebo quid differat. 41.30
Adeps ex sanguine fit. 44.40
Adipe quæ pinguescant. 41.30
Adipe pinguefcenna minus sicc
cunda sunt. 44.1
Adipis in animali locus. 41.30
Aegnhi & flori sanguis mūcieri
nequit. 135.1
Ægyptus gignit equum fluuia
tlem. 24.20
Ægypti mulieres fecundæ. 109.1
Ægypti canes. 131.1
Ætica quo malo uexetur. 117.40
Æsculo uulpi est inimicus. 234.40
Ætas quadrupedum qua ranone
noscatur. 101.30
Æfrica multiformes sunt animan
tes. 131.20
Ala. 21.10
Alauda later. 121.10
Alaudæ nidus. 84.1. & 139.30
Alaudarum genera. 141.30

Albardeola quarit fluuios. 118.10
Albicula cibis. 118.10
Albingo oculi in omnibus ferē si
milis. 13.10
Albumen oul. 81.10
Albumen complectitur originē
pulli. 85.40
Alcedo amar aquas. 118.20
Alcedonum species, & nidus, &
partus. 141.30
Alcmaon putauit capras per au
res spirare. 13.30
Alcmanes poëta quo morbo pe
nerit. 81.40
Alcyon quot oua pariat. 67.10
Alcyonis tempus coitus. 67.1
Alcyonem uidisse rarū est. 67.10
Alcyoni dies quare uocet. 67.10
Alec grauis utero melior. 131.10
Alec mutatur. 131.20
Alecæ quando pariant. 95.30
Alecis fecunditas. 95.30
Alecis gregales sunt. 131.20
Alecum fortura est apud genus.
94.20
Algulæ unde nascantur. 76.40
Alimentum animalium. 114.20
Allopecones pisces. 121.1
Aluco aus. 117.30
Aluus. 94.40
Aluus hominis. 17.30
Alui proliuio mederi cogit. 46.20
Amia piscis. 57.30
Amia piscis gaudet fluuijs. 116.30
Amiæ quid comedant. 116.30
Amiæ incrementum. 91.40
Amiæ synodo se defendit. 147.30
Amiæ ubi reperiantur. 121.1
Anas à gauia diffidet. 134.10
Anas aquas amat. 118.20
Anatomen primus tradidit Ari
stoteles. 1.40
Angina canes interimit. 128.40
Anguillæ fel. 29.10
Anguilla quæ pinnas habeat. 17.10
Anguillæ quot pinnae. 10.40
Anguillæ quomodo capiant. 18.
20. & 117.1
Anguillæ laues sunt. 17.40
Anguillæ gula est. 29.40
Anguilla non habet ouum neque
semen. 40.20. & 91.30
Anguillæ de lacu in mare ueni
unt. 91.30
Anguilla neq^{ue} mas, neq^{ue} femina
est. 62.1
Anguilla non potest prolem ex se
procreare. 62.3

Anguillæ quæ optimæ. 131.10
Anguillis quā longā uita. 117.10
Anguillæ quomodo pinguescant
43.40
Anguillarum procreatio. 94.30
Anguillæ imbre & uiuūt & alun
tur. 94.30
Anguillis quibusdam lumbicini
sunt. 94.30
Anguillæ prodeunt ex terra inte
stinis. 94.40
Anguillæ quid comedant. 117.1
Anguillæ non superfluitant mor
tue. 117.1
Anguillæ quando transferendæ
sint. 117.10
Anguillarū uita extra aquā. 117.10
Anguim iclus differunt. 131.40
Angues membrana uernationis
exuuntur. 74.30
Angues circa Aethiopiam uolan
tes. 11.1
Anguim magnitudo in Africa.
131.10
Anguli oculorum. 13.1
Anguli oculorū longiores quid si
gnificent. 13.1
Anima quid sit. 4.40
Animal quibus rebus creati pos
sit. 82.30
Animalium partes. 7.1. & 13.10
Animalia quare degant locis dif
finita. 114.30
Animaliū differentia. 7.20. & 12.10
Animalium minimum. 82.20
Animalium coitus uarij. 64.1
Animalibus quibusdam nullum
munus pter generationē. 114.10
Animalia quæ quinq^{ue} sensus lia
beant. 57.10
Animaliū actiōes & mōres. 111.30
Animalia mira in mari. 56.40
Animalium differentia quæ ex lo
cis est. 110.20
Animalia quæ cauta sint. 9.20
Animaliū somn^{us} & ingria. 60.40
Animalium incessus. 10.30
Animalium actio. 121.30
Animalia mutant cælum. 121.30
Animalium genera summa. 18.30
Animaliū dissidia ob cibū. 13.40
Animal pfectū quæ generet. 10.10
Animalia uarij libunt. 119.40
Animalibus sunt partes quedam
dare uelut arma. 61.30
Animalia alia ex semine, alia sine
semine nascuntur. 69.20
Animaliū motus quomodo agi
tur. 10.30



Animalium studii in quibus uer- setur.	114.30	Apum fur.	78.10	potest.	42.10
Animalium generatio uaria.	69.10	Apum duces non rarij in ex- amine.	78.30	Apum ablato aculeo breui mori- annus necesse est.	42.10
Animalium partes diuerse.	19.30	Apes quando melius proueniunt.	78.30	Apum uermes.	76.10. & 79.10
Animalium consideratio quanta sit.	4.30	Apes tempestate praesagunt.	154.1	Apes noctu quiescunt.	61.30
Animalium & inanimatarum medium non uidetur.	114.1	Apes quidodo melifliscunt.	78.40	Aphaca opimat pecus.	121.10
Anser gregalis est.	122.30	Apum morbus.	130.30	Aphare ^o pinnula Thunnus.	67.30
Anseres amant aquas.	118.30	Apis sibi domum facit.	9.1	Apur generatio.	94.1
Anseres quales sint.	9.30	Apes unde accipiant operis sui materiam.	153.20	Apur genus encraulos parit.	94.10
Anseris uerecundia.	1.10	Apes sonitu gaudent.	153.30	Aquam quo pacto accipiant cru- sta insecta.	51.30
Anseres se à coitu lauant.	85.30	Apes ualere quomodo noscitur.	153.40	Aquarum mutatio creat pedicu- los.	81.10
Anseris tempus incubandi.	88.10	Apum pennae.	56.10	Aqua quare dicat diuina.	145.40
Anseris appendices.	11.40	Apes ut aues incubant.	79.10	Aqua dulcis qua ratione ex mari colligenda.	115.30
Anseris gula.	31.30	Apum fortis candidus est.	79.10	Aque usus quibusdam ad refrige- rationem, ut nobis aëris.	115.10
Anseres sterilia oua sepe edunt.	84.40	Apud reges fuluo colore sunt.	79.10	Aque in generando uis.	98.20
Anserum foeminae tantum incubant.	88.40	Apes ubi mel faciant sine sauis.	79.30	Aquilonis statu mares concipiunt.	98.10
Antandriae suuij duo multicolores pecoris.	42.10	Apum mos in floribus petendis.	150.40	Aque quaedam mutant animalium colores.	42.10
Antherina iuxta terram parit.	91.10	Apum genus optimum quod sit.	151.10	Aquaricus.	14.40
Aorta arctior uena maiore est.	36.10	Apes cadauera foras educunt.	151.40	Aquante quare dicatur animal.	115.30
Aortae uenae pulmo annectitur.	17.10	Apes singulis muneribus se distri- buunt.	152.10	Aquantia aëre uiuentia.	8.0
Aorta multas mittit uenas ad uul- uum.	37.10	Apum puritas in gustu.	152.40	Aquantia dormiunt.	61.10
Aorta uena spiritui annectitur.	37.20	Apibus quae noceant.	152.20	Aquantium ordo duplex.	8.1
Aorta mittit ramos ad laeues.	37.20	Apes quod odio prosequantur.	152.40	Aquilae ungues.	40.10
Aorta uena.	38.40	Apes quando potissimum argo- tent.	150.10	Aquila bellum gerit cum thracone.	134.1
Aorta quo pacto sit ossibus appli- cata.	38.1	Apes uolant sicca membrana.	11.1	Aquila anguibus uescit.	134.1
Aortae duo sunt meatus ad testes.	38.1	Apum reges.	1.10	Aquiloniarum pres purpurae nigrae, austriacae rubrae ferunt.	70.40
Aortae origo.	38.10	Apes latent.	114.1	Aquila cum ardeola pugnat.	134.10
Appellicon Teius quod deprauauit.	3.10	Apis animal ciuile.	8.40	Aquilae carniores sunt oēs.	117.20
Aper exortos dentes habet.	23.10	Apum labores.	3.10	Aquila pygargus.	88.10
Aper piscis in amne Acheolo uo- catus existimatus est.	19.10	Apud cibum.	9.1. & 12.30. & 132.20	Aquila marina humore gaudet.	118.30
Aper quomodo bene, quandoque male inest.	70.40	Apum generatio.	78.1	Aquila quae animalia uenerat.	145.40
Aper quot branchias habet.	27.10	Apud proles quando optima.	79.1	Aquila diu uiuit.	145.40
Aper qua uia castritur.	159.30	Apum duces duplices.	78.10	Aquilae quot oua pariant.	88.1
Apria suis uirus est.	96.40	Apud duces matres uocantur.	78.10	Aquila quot diebus excubet.	88.10
Aprio coquant hordeum apponi debet.	98.1	Apum sedulitas.	149.10	Aquitarum sex genera.	144.40
Apri quando inire incipit.	70.10	Apum uita sex annorum est.	79.20	Aquila ex carulagineis.	69.10
Apri quando coitu ualeat.	70.10	Apum genus in Ponto caedidum.	79.20	Arabiae cameli.	21.10
Apes.	8.10. & 47.30	Apes in terra etiam suos faciunt.	79.10	Araneorum cibum.	9.1
Apes mel sentiunt.	18.30	Apum duces non utuntur aculeo.	78.10	Araneorum genera.	149.10
Apes habent aculeum.	16.10	Apud duces quo pacto nascantur.	78.10	Araneus absorbet humorem.	81.20
Apes murmur edunt.	19.20	Apum genera.	78.10. & 150.1	Araneorum alimentum.	118.40
Apes colligunt sine florum detri- mento.	79.1	Apis quidodo sterces emittit, quan- do non.	79.10	Aranei unde procreantur.	71.40
Apes optime quae sint.	78.10	Apibus pro pabulo sunt uermes eorum.	79.10	Aranei quot diebus consumman- tur ad iustum incrementum.	80.30
		Apum penna euulsa renasci non potest.		Aranei uermiculos parit.	80.20
				Aranei triduum incubant.	80.20
				Aranei	

Aranei ubi pariant. 80.10
 Araneus statim ex uermiculo for-
 manis salt. 80.10
 Aranei pratenfes quo pacto pari-
 ant. 80.10
 Araneus quibus temporibus ue-
 nientur. 149.10
 Araneus etiam maiora animalia
 uincit. 149.40
 Archanas estate extenuat. 136.40
 Arcti quo tempore sint laudatiffi-
 mi cibi. 74.10
 Ardeola auis peti aquas. 118.10
 Ardeolę inimica pipo eft. 114.10
 Ardeolaram uita. 141.10
 Ardeolę genera. 114.10. et 141.10
 Argathylis ingeniofa auis eft in
 faciendis nido. 141.10
 Arietes tempore coitus ferocifit. 96.10
 Arietes cornigeri generantur in
 Africa. 121.1
 Arietes nouellas formellas minus
 perfequuntur in coitu. 70.10
 Aris lingua ad colorem fortis
 facit. 98.10
 Arista pifcis iuxta terrę generat. 91.10
 Aristoteles preconium. 4.10
 Aristule pifces gregatim habent. 121.10
 Aro herba fibi mideri uifum. 115.10
 Arteria conftat cartilagine. 17.1
 Arteriam habent quibus pulmo
 eft. 17.1
 Arteria ouiparis oibus eft. 18.10
 Arterię officium. 17.10
 Arteria quo pacto tendat ad pul-
 monem. 17.10. & 19.1
 Arteria non oibus fimilis. 18.10
 Arteria quę pars nominet. 14.10
 Arterię origo iuxta os ferpentis
 pofita eft. 10.40
 Articulū digitorum. 15.10
 Arundinis flore apert nafci. 78.1
 Afcaphę appendices habet. 11.40
 Afcandes unde nafcuntur. 76.1
 Afellus pifcis later. 114.40
 Afie beftię efferaiores. 11.10
 Afili os. 11.40
 Afilus thugnorum. 81.10
 Afili aculeus. 11.10
 Afili qualis fit lingua. 16.10
 Afili fanguiuori funt. 121.10
 Afili unde proueniunt. 8.10.
 & 76.10
 Afine purgatio ad partu. 91.10
 Afinus frigoris impacit eft. 110.1

Afini fanguis. 44.10
 Afinus Indicus. 11.40
 Afinus non habet fel. 19.1
 Afine urina. 97.10
 Afina ad coitu interpellanda, alias
 fermen reſcit. 101.40
 Afini coitus. 101.10
 Afini dentes. 101.10
 Afinus non habet pediculi. 81.1
 Afinus qui intercipit mire. 70.10
 Afina quando gerat uterū. 70.10
 Afina cōtinue parere poteft. 101.10
 Afinorum morbus. 110.1
 Afinorum alimentum. 110.10
 Afine lac. 41.40
 Afine uerecundia. 101.40
 Afinorum uita ſpaciū. 101.1
 Afina equi in coitu recipit. 101.10
 Afinos, quos hippothetas uocāt,
 admittunt eque. 101.10
 Afinum qui fluxit equant, admit-
 tunt eque. 101.10
 Afinum lac mifcent ad caſum
 conſciendum. 46.10
 Afio auis. 117.10
 Afionum genera. 144.1
 Afipidis ichus nullum eſt remediū.
 111.40
 Athimontis fues. 11.40
 Arramentū in mollibus eſt. 48.10
 Arricapulla. 117.40
 Arricapillę parus & nidus. 141.1
 Attelabum genus locuſte quod
 Grece uocent. 1.40
 Attendō pars quę ad uires corpo-
 ris uiuat. 18.10
 Aucupandi ratio. 194.1
 Audius in animalib; fedes. 17.10
 Audius pifciū argumēta. 17.40
 Audiendi mearus. 11.40
 Audiendi mearus pifcium. 18.1
 Aues quę amice. 115.1
 Auium ouī purgatine duro con-
 ſtat. 84.10
 Aues quę apud aquas degant. 84.10
 140.10
 Auium coitus. 64.10
 Auiū partus precipue uere. 81.40
 Aues quibus ungues adunci, par-
 cius generant. 81.40
 Aues quo loco fel habeant. 19.10
 Auium ſitus in uero. 111.10
 Aues plurię habent tenet inre-
 rinum. 11.40
 Auium odorandi foramina. 17.10
 Aues urbanę quōtes pariant. 69.10
 Auium uulue ceruix. 11.10
 Aues qualem habeant in uulua

membrantam. 11.10
 Aues pediculis infeſtantur. 81.1
 Aues quę breuem, quę longam
 habeant caudam. 16.40
 Auium lingua. 16.40
 Aues palmpedes in aqua magna
 ex parte uſantur. 118.10
 Aues hyeme petunt ſtipos. 121.1
 Aues estate perunt mones. 121.1
 Aues quomodo ſuos inſexu ſa-
 gant. 101.10
 Aues maximis carent. 41.10
 Auium oua. 10.10
 Auium os pecuniare. 16.10
 Aues partum diſerte poſſunt.
 81.10
 Auium appendices. 11.10
 Aues aquatice ubi hidifcent. 80.40
 Auium mares multi oua frangit.
 87.1
 Aues quę puluere ſe uolunt, &
 quę aqua lauantur. 119.10
 Auium uenit. 86.10
 Aures homini ſoli immobiles.
 11.10
 Auium formix quando cantat.
 60.10
 Aues omnes fel habent. 19.10
 Aues habent teſtes. 11.10
 Aues pleręq; pullos maturos ex-
 pellunt. 11.10
 Aues apedes. 11.10
 Aues pennis plurimum ualent.
 8.10
 Aues estate incubantes celerius
 excludunt. 84.40
 Aues quibus temporibus melius
 ualeant. 116.10
 Auium odorandi mearus in ro-
 ſtro connentur. 16.10
 Auium oculi. 16.10
 Aues in hidis pariant. 81.40
 Aues ſylueſtres quōtes pariant.
 69.1
 Aues quōtōs ſe moueant. 11.10
 Auib; quę ungues habent adun-
 cos, femora ſunt maxima. 16.10
 Aues omnes oua pariant. 81.10
 Auium ſemen genitale. 84.10
 Auis ſerina ubi coticipat. 84.10
 Auium auium mearus. 16.10
 Auium morborum ſigna. 116.10
 Aues hiſi pariant moriunt. 81.10
 Aues ad coitu inhorreſcunt. 81.10
 Aues pleręq; lienem exiguum ha-
 bent. 116.10
 Auium oua uento concepta inſer-
 cunda ſunt. 61.10

Auium incubitus. 88.40
 Auium parres. 16.10
 Auium crura. 26.10
 Auius quid peculiare inter caetera animalia. 26.10
 Auium femur. 16.10
 Auium cibus. 117.10
 Aues quibus sunt adunci ungues carniuorū omnes sunt. 117.10
 Auium mares canunt quidam, ut formice suæ. 60.10
 Aues quo pacto efficiant ne quid in pulmonem delabatur. 27.1
 Auius quibusdam natura calcar dedit. 27.1
 Aues quæ uolaces sint. 27.1
 Aues quæ calcarigeræ, ad uolandum ineptiores sunt. 27.1
 Auium crista. 27.1
 Auium generatio in ouo quid cū piscibus cōmune habeat. 89.10
 Auium testes. 12.40. & 65.10
 Auius quibus locutionis præcipua facultas sit. 60.10
 Aues minores linguaciores sunt. 60.10
 Aues tempore coitus loquaciores. 60.10
 Aues nouellæ oua sēdunt pauciora. 69.10
 Aues quomodo bibant. 119.40
 Auium rostrum augeri in senectute. 42.1
 Aues quibus paribus & à seipfis & ab alijs animalibus differant. 31.10
 Auium duces. 121.10
 Auium pennæ p̄ ætatem nō nullæ mutantur. 42.10
 Auium ossa parum inter se differunt. 19.10
 Aues multæ conduntur. 125.1
 Aues quas uocemus. 11.1
 Aues exiguo, aut etiam quædam nullo potu contenti sunt. 113.10
 Aues tenes non habent. 29.10
 Auius quibusdam maribus data sunt calcaria, formis nō itē. 61.40
 Aues quedam uento cōcipiunt. 61.10
 Aues omnes copiam unguis habent. 26.10
 Aues multifidæ sunt. 26.10
 Aues planipedes. 26.10
 Auium digni. 26.10
 Auium pulmo. 29.40
 Auium quædā genera literas p̄ferre possunt. 27.1

Auis cuiusdam scythicæ mores. 145.40
 Auiula quo pacto mutet uocē. 60.10
 Auiularum uentriculus. 31.10
 Auratæ dormientes capiuntur. 61.10
 Aurata litoralis piscis. 112.40
 Aurata piscis frigore laborat. 126.40
 Auratæ partus. 95.10
 Aurata q̄t pinnas habeat. 10.40
 Auratæ ubi pariant. 68.1
 Auratæ pauca appendices. 31.10
 Aurebræ. 76.10
 Aures simia hominis more habet. 24.10
 Auris pars capitis. 11.10
 Auris pars interior. 11.10
 Auris meatum nullum habet ad cerebrum. 11.10
 Auris ex qua materia constituta sit. 11.10
 Aurium meatus auium. 16.10
 Aurem solus homo non mouet. 11.40
 Aurium differentiæ multæ. 11.40
 Aures ad audiendum apertissimæ. 11.40
 Aures non sunt indices morum. 11.40
 Aurium magnitudo. 11.40
 Auricula auris pars exterior. 11.10
 Auriculæ quorundam cartilagine constant. 19.40
 Auriculis quæ careant. 25.10
 Auriuitis quid edat. 117.40
 Auster impedit uolarē auiū. 112.10
 Austri statu formicæ cōcipiuntur. 98.10
 Auxumæ uocatur catuli thunnī. 95.40

B

Balena habet mīsmas. 45.10
 Balenæ generant animalia. 91.10
 Balenæ natura. 114.40
 Balenis desunt branchiæ. 10.10
 Balenæ ubi habeant fistulā. 10.10
 Balenæ quot ædant. 91.10
 Balenæ quo pacto dormiūt. 61.10
 Balerus piscis. 1.40
 Balerus quo loco pariat. 91.10
 Baleri morbus. 127.10
 Barbæ diuersitatis. 41.40
 Bellum quando fit suscipiendū. 1.10
 Bestiolarū pennarū in igne nascuntur. 11.1

rur in Cypro. 77.10
 Bilis communis est animalibus. 14.10
 Bipedium situs in utero. 111.10
 Bisulca animalia. 31.10
 Bisulca sunt quæ cornua habent. 11.40
 Bivaluia quo loco habeant papauer. 31.10
 Bivalue quod genus appellerent. 32.10
 Blattæ ubi gignantur. 76.10
 Bolignæ species polypti. 49.10
 Bombyx unde fiat. 76.10
 Bōbycia texisse quandā in Coo insula. 76.10
 Bombycum industria in facienda nidis. 80.1
 Bombycum uermes. 8.1
 Bombycum cera. 8.1
 Bombycum genus. 155.40
 Bonafus. 20.40
 Bonafus in Pæonia. 22.1
 Bonafus ubi gignatur. 156.40
 Bonafi uox. 116.40
 Bonafi caro. 157.6
 Bonafi excrementum. 157.10
 Bonafus omnia interiora ut boues habet. 139.10
 Bos gaudet aquis. 118.10
 Bos torbendo bibit. 119.40
 Bos ex carnagine. 65.10
 Bos piscis oua non habet. 91.10
 Boues quidam in corde suo osculum continent. 15.40
 Boum uox. 61.10. & 70.1
 Boues claram aquam desiderant. 120.10
 Boues quibus rebus uescantur, et pinguescant. 120.10
 Boum morbi. 129.1
 Boum pedum cura. 120.10
 Boues quando dentes mutantur. 100.1
 Bos quinquennis in uigore est. 100.1
 Boues laborat pedibus. 100.1
 Boum societas in pascendo. 116.1
 Boues magni in Epiro. 46.10
 Boues pediculos habent. 82.1
 Boum coitus. 99.10
 Boues quando uiuant. 99.40
 Boues mines sunt. 9.10
 Boum potus. 119.40
 Bouis dentes. 21.10
 Boues seniores quomodo possint pingues reddi. 120.10
 Boum cornua. 12.1
 Boues syluestres ubi sint. 21.1
 Boues

Boves sylvestres quales sint. 11.10
 Boves sylvestres quid differat ab
 urbanis. 21.1
 Boves in Phrygia sunt qui cor-
 nua, ut aures, mouent. 40.10
 Boves etiam forniare. 60.40
 Boum ungulae pice illitae valent
 melius. 12.10
 Bovis morbus struma qualis sit.
 129.1
 Bovis languentis signa. 129.2
 Bubus copiam lactis augere fabry
 46.40
 Bubulum lac. 46.40
 Bubulum lac aptum ad caseum.
 46.10
 Bubulo ex tergo sit glutinum.
 40.40
 Brachium. 15.30
 Brachium inflexum in interiora
 agitur. 15.30
 Brachia finia. 24.40
 Brachium quomodo insectatur.
 15.30
 Brachia finia ad modum homi-
 nis sunt, sed lurnuscula. 24.40
 Brachiale quid uocetur. 15.30
 Brachia finia ut homo insectat.
 24.40
 Brachii partes. 15.30
 Brachium enim unam appella-
 mus. 15.30
 Branchias quae animalia detestas
 habeant. 10.30 & 27.30
 Branchiae delphinis desunt. 10.30
 Branchiarum usus in locustis. 50.30
 Branchiae quot sint gladio pisci.
 27.40
 Branchiae piscium partim testae,
 partim detestae sunt. 27.30
 Branchiarum in piscibus usus. 27.30
 Branchias integras quae non ha-
 beant. 27.30
 Branchiatorum discrimina. 27.30
 Branchias baleni non habet. 10.30
 Brastica generat erucas. 76.1
 Brenthus autem montes, & sylvas
 colit. 140.30
 Brenthi uox & uictus. 140.20
 Brissi echini. 54.30
 Brucus genus locustae. 3.40
 Bruci unde procreantur. 75.40
 Bruci quando pariant. 81.1
 Brucorum oia quasi interire. 81.1
 Bubali sanguis fibras non habet.
 38.30
 Bubo. 127.30
 Buccina quando generet. 68.40
 Buccina sabra. 32.30

Buccinis etiam est fau* quid. 71.30
 Buccinis longum est uiuendi tem-
 pus. 72.30
 Buccinis qui modus gignendi sit
 72.10
 Buccinis quae sit pascendi ratio.
 72.10
 Buccina quando lateat. 131.40
 Buteo avis similis miluo. 117.30
 Buteo hostis rari est. 114.10
 Buteo hostis rubetate est. 114.10

C

Caelus finia gerens caudam.
 24.30 & 35.10
 Calcar quibus aubus datū sit. 27.1
 Calculi quo pacto gignent. 43.10
 Calidris aquas pent. 118.10
 Calli qui uocentur. 52.10 & 55.1
 Calua os capitis. 38.40
 Caluae uertex quid uocem*. 12.30
 Caluae serrata pars. 38.40
 Calua mulieris unam habet futu-
 ram. 12.30
 Caluae uertex quibusdam gemin*
 12.30
 Calua quae sit in homine. 12.30
 Calua canis futuris caret. 38.40
 Caluae partes. 12.30
 Calua quale os. 12.30 & 38.40
 Caluae tres futuras habet. 12.30
 Caluae sunt min* quibus uarietates
 sunt. 43.1
 Calui parte priore fiunt, sed par-
 te posteriore nemo. 41.20
 Caluini quid uocemus. 41.20
 Calutium mulieres pueri & spa-
 diones non patiuntur. 41.20
 Calx. 15.40
 Camelus quo pacto urinam red-
 dat. 71.10
 Cameli tempus coeundi. 71.10
 Camelus singulos parit. 71.10
 Camelus quando ferat uterum.
 71.10 & 102.30
 Cameli cauda. 21.10
 Cameli aquam desiderat turbidam.
 110.30
 Cameli sitis patientes sunt. 120.30
 Cameli etiam laborat rabie. 128.40
 Cameli nomen usitatum utrique
 linguae. 3.40
 Camelus mas seuit tempore coi-
 tus. 96.30
 Camelus est cum equis odium na-
 turale. 96.30
 Cameli fornicat etiam castrantur
 160.1
 Camelos quot quidam in Asia

possideant. 160.1
 Cameli celeris cursus sunt. 160.1
 Cameli papillae. 21.10
 Cameli genitale. 21.10
 Cameli genua. 21.10
 Cameli clunes. 21.10
 Camelus animal bifidum. 21.10
 Cameli pes. 21.10
 Camelos calcant. 21.10
 Camelus diu uiuit. 102.30
 Camelorum gressus. 20.30
 Camelus quomodo mingat. 22.30
 Cameli ardor in coitu. 64.20
 Cameli lac. 46.40
 Cameli caro suauissima. 101.40
 Cameli genitale. 22.40 & 64.20
 Camelum matrem non superue-
 nire. 157.10
 Cameli dentes utriusque non habent.
 21.10
 Cameli Baetiani ab Arabibus disse-
 runt. 21.10
 Cameli coitus. 64.20
 Cancelli quomodo generet. 71.40
 Cancelli descriptio. 53.30
 Cancer. 49.10
 Cancrorum gen* crusta testis.
 11.30
 Cancrorum forceps dexter uali-
 dior. 51.20
 Cancri sunt ictus serpenti. 106.40
 Cancri quidam in nonnullis testa-
 operis nascuntur. 71.30
 Cancrorum intestinum. 50.40
 Cancrorum pedes. 49.30
 Cancri quo pacto ore mare ex-
 cipiant. 50.30
 Cancrorum gen* multiplex est. 49.20
 Cancri exuuntur senectute. 126.1
 Cancri ambulare possunt. 8.20
 Cancrorum genus. 47.30
 Cancer mas quid differat a mare.
 66.20
 Cancri quo pacto coeant. 66.10
 Cancrorum oculi. 50.1
 Cancrorum gen* mirae uelocitatis.
 49.30
 Cancri puer crusta exuunt. 74.30
 Cancri fluuiales. 49.30
 Cancri maris. 49.30
 Cancer quomodo incedat. 11.20
 Clididi ferunt unde generent. 98.30
 Clididi quidam unde generent. 91.30
 Canes ut coeant cum feris, quo pa-
 cto efficiendum. 131.30
 Canes herba quadam uomitum
 mouent. 137.10
 Canes quo pacto mingant. 99.10
 Canes quot pariant. 99.10
 Canis quandiu uiuat. 99.10

INDEX.

Canibus iuuenibus quales sint dentes.	39.40	Capito carne abstinet.	116.10	fium continetur.	118.10
Canes quales habeant dentes.	39.10	Capitonis partus.	95.10	Capitis pars posterior.	16.40
Canum mammarum.	32.30	Capitonum alimentum.	116.10	Capitis magnitudo uaria.	16.40
Cani angustus est uenter.	30.30	Capitones quando pariunt.	64.30	Capita minus laborant quorum pediculus in capillo est.	81.10
Canum amor.	5.30	Caper lac prębuit in Leno.	45.40	Capitis forditas unde ueniat.	81.40
Canis tempus ad uenirem.	67.1	Capras somnare.	60.40	Capitis pars quę sit in homine.	12.30
Canis calua sine futuris est.	38.40	Capra non spirant per aures.	13.30	Caput animalium.	16.10
Canes ad duodecimum annum coeunt.	71.10	Caprae quo pacto cubent.	136.1	Cardueli cibus.	117.40
Canum ingenium.	9.30	Caprae coitus.	70.1. & 98.10	Caro testis intestorum.	52.1
Canes laconici unde generentur.	131.30	Caprae Aethiopice lęgs sunt uita.	98.30	Caro communis quibus sit.	34.30
Canes quomodo incrementa capiant.	31.1	Caprae ius quamobrem concretat.	43.30	Caro squillarum.	51.10
Canibus ricinus peculiaris.	82.1	Caprae ueneris expertes qua ratio nelac prębeant.	45.40	Caro diuisibilis undique est.	42.10
Canum rabies.	128.40	Capris duces non sunt.	98.30	Caro aboletur quando animal gracilescit.	42.30
Canes propter catellos seruiunt.	96.30	Caprarum folertia.	137.10	Caro uertitur in pingue.	42.30
Canes quando canire dicantur.	97.10	Capris lactis copiam augēt fabae.	46.40	Cartilaginea dormientia capiuntur.	61.30
Canis pes.	31.30	Caprarum cibus.	121.1	Cartilagineorum fecunditas.	90.10
Cani os est rescissum.	24.30	Caprae quot menses ferant uterū.	98.10	Cartilaginea particulatim foras arduunt.	90.30
Canes an mutant dentes.	31.30	Caprae quā longa uita.	98.10	Cartilago quid differat ab offe.	39.40
& 99.30		Caprae ubi sint longis auribus.	130.40	Cartilagineorum ouis.	10.30
Cani corpus est hirtum.	30.40	Caprae pinguescunt gerentes uterum.	97.40	Cartilago rupea non reparatur.	39.40
Canum genera plura.	98.30	Capris uox propria ad coitum.	60.10	Cartilago in quibus medullae continentur in quibus non.	39.40
Canes laconici quando coeant.	98.30	Caprae pes.	31.30	Cartilaginei generis mares quidam a foeminis differunt.	65.10
Canum coitus.	98.40	Caprae menstruorum signum ostendunt.	97.20	Cartilagineorum quędam aspera.	27.40
Canum menstrua.	98.40	Caprae qua occasione obstupescant.	135.40	Cartilagineorum coitus.	65.1
Canum pruritus.	99.1	Caprae sunt impatientes frigoris.	136.1	Cartilaginei generis foemina maiore maior.	65.10
Canum lac.	99.1	Caprae urina.	97.30	Cartilaginea quę sint.	65.10
Canes quibus morbis laborent.	118.40	Caprae rediuos habent.	82.1	Cartilago quibus sit communis.	14.30
Canum ætas ex dentibus iudicatur.	33.30. & 99.30	Caprae ualitudinarie sunt.	131.20	Cartilagine extrema nonnullorum offium constant.	39.40
Canes angina morbo moriuntur.	128.40	Capriceps aus non habet lienem.	28.40	Cartilaginea quę parit.	67.40
Canes magni in Epiro.	46.30	Capriceps locus felis.	29.10	Cartilaginea oua gignunt.	10.30
Canum uox.	69.40	Capriceps generat culices.	82.10	Cartilagineum genus omne hyeme conditur.	124.30
Canum purgatio.	99.1. & 119.10	Capriceps quare agricolę iuxta ficus serant.	82.40	Cartilagineorum iecur.	42.30
Canes etiam somniant.	60.40	Caprimulgi forma.	144.30	Cartilaginei carniuori sunt tantum.	116.20
Canes anniculi coeunt.	70.10	Caprinum oculorum bonorum morum indicium est.	13.10	Cartilaginea quomodo sonent.	59.40
Canis quando uerum gerat.	70.10. & 98.40	Caprinum lac ad caleum aptum.	46.10	Carulus apud mare uersat.	118.30
Canes herbam tritici comedunt contra lumbricos.	117.30	Caprire.	105.40	Cæsus.	46.30
Canis Vlyffis.	99.10	Caput uiri sine sutura.	12.30. & 39.1	Cæsus ex quo lacte fiat.	46.30
Caniceps quale sit animal.	14.30	Caput omnibus animalibus superius in matre est.	81.30	Castriandi duæ rationes.	31.1
Canicula piscis semel anno parit.	90.40	Capitis ossa sex.	39.1	Castratione mutantur animalia.	159.2
Canicæ celerius sentiunt temporis homines.	41.10	Caput testis testorum.	52.40	Castroorum uox.	70.1
Canicæ unde sit.	41.10	Caput non neruis sed suturis offium continetur.	118.10	Gatactæ gula.	31.30
Cantharide unde nascantur.	77.10				
Caneus animalium tempus.	9.10				
Capella aus petit aqua.	118.30				

Camraſta auis in mari uictitas. 140.30
 Catelli cœci gignuntur. 98.40
 Cauda quibus ſit pro parte inferiori. 32.40
 Caudarum pilî. 21.10
 Cauda cameli. 21.10
 Caudis naranda. 10.40
 Cauda uolucrum. 26.40
 Caudam quæ habeant. 20.30
 Cauda ſimiarum. 25.10
 Caudæ ſerpentibus renaſcuntur. 31.10
 Cauernas q̃ animalia ſubeant. 9.1
 Cauſe quæ primæ, quæq̃ ſecundæ. 3.10
 Cernipeda quomodo euomet huium. 147.20
 Cernipedæ. 47.30
 Cernipedes maris incolæ. 23.10
 Cernipedes quomodo moueant. 36.1
 Cera bombycum. 80.1
 Ceri ex q̃ materia ſingant. 78.40
 Cerantheros. 79.1
 Cerebrum quibus animalibus ſit. 16.30
 Cerebrum hominis. 16.30
 Cerebrũ in chamæleone ubi poſitum ſit. 26.1
 Cerebrum ſenſu caret. 44.10
 Cerebrum adipe pingueſcenti pingue eſt. 42.40
 Cerebrum ſanguine caret. 16.40 & 36.40
 Cerebrum frigidũ. 16.40
 Cerebrũ quibus membranis muniat. 42.30
 Cerebrũ ouis ſqualidũ eſt. 43.40
 Cerebrum ubi ſinum ſit. 11.30. & 16.30
 Cerebri membranæ. 16.30
 Cerebrum bipartitum. 16.30
 Cerebellum. 16.30
 Cerinthi flore apes naſci. 78.1
 Cernua quibuldam temporibus latet. 124.20
 Cernua piſcis citò creſcit. 68.1
 Cernuæ quid comedant. 116.20
 Cernus mutat colorem. 192.20
 Cernithia aicula qualis. 142.20
 Cerui pes. 21.30
 Ceruix colli pars. 14.30
 Ceruix nulli eſt piſcium. 27.20
 Ceruices plurimis neruis cõtenentur. 38.20
 Ceruus ruminat. 160.10
 Ceruorũ ſanguini deſunt fibres. 38.30

Ceruo mari uox grauior. 69.40
 Cerui genitale neruoſum. 32.40
 Ceruorum natura. 9.20
 Ceruis in capite gignuntur uermes. 29.1
 Ceruorum prudentia. 136.10
 Ceruus ſel non habet. 28.40
 Ceruæ ſtatim à partu edunt in uolucrum. 116.40
 Ceruarum inuolucrum creduntur habere uim medicam. 136.40
 Cerui quo pacto capiantur. 137.11
 Ceruus creſtus auribus acerrime ſentit. 137.1
 Cerui æſtate pingueſcunt. 103.30
 Cerui qua cauſa in aqua fugiant. 103.30
 Ceruorum caro ut hircorum olet tempore coitus. 102.30
 Cerui habent inteſtinũ imbecille. 103.30
 Ceruæ ubi pariant. 136.10
 Cerui mortũ à ſerpente cancroſo edunt. 136.40
 Cerui cornua decidua. 22.10
 Ceruus ſolus omnibus annis cornua amittit. 40.10
 Ceruus Achaiinos ſel in cauda habere. 29.11
 Ceruus ſenes quo pacto cognoscantur. 136.30
 Ceruorum adminicula. 136.30
 Cerui donec recipiãt cornua non ſu paſcuntur. 136.30
 Cerui qua ratione præparent cornua. 136.40
 Ceruorũ inteſtinum amarũ. 29.1
 Ceruus caprus eſt hederam ſuis in cornibus habes uiridẽ. 136.40
 Cerui cornua. 22.1
 Ceruorũ cornua tota ſolida. 40.10
 Ceruorũ ſanguis quo pacto ſpiſſetur. 38.30
 Ceruarum ubera. 103.20
 Cerui quomodo oleant, quidq̃ faciant poſt coitum. 103.30
 Cerua docet hinnulũ ſuũ. 136.20
 Cerua pugnat pro hinnulis ſuis. 136.20
 Ceruus præpinguis cur ſecedat. 136.20
 Ceruũ ubi amittat cornua. 136.20
 Ceruorũ coitus. 103.10
 Ceruorum partus. 103.10
 Ceruus celeriter creſcit. 103.10
 Ceruæ à partu purgatio. 103.10
 Ceruæ qua rãde hinnulos ſuos defendant. 103.10
 Ceruorum uix ſpaciũ. 103.20

Ceruæ ubi ſint ſciſſa aure. 103.20
 Ceruus mas cornua habet, nõ foetmina. 62.40
 Ceruæ raro paſciuntur marẽ. 64.10
 Cere. 10.20
 Cere quibus branchiæ non ſunt, animal generant. 91.10
 Cere datæ mammae ſunt. 45.30
 Ceratũ odores piſces excitant. 38.10
 Ceratũ generis coitus. 65.10
 Chalcida. 129.30
 Chalcis piſcis quo malo infeſta. 127.40
 Chalcis qualis ſit auis. 140.40
 Chamæ ortus. 72.10
 Chamæleo quando mutet ſuum colorem. 26.1
 Chamæleo niger crocodilo non diſſimilis. 26.1
 Chamæleonis color mutatur toto corpore. 26.1
 Chamæleo pigre mouetur. 26.1
 Chamæleo qualis ſit mortuus. 26.1
 Chamæleonis gula. 26.1
 Chamæleo ubi habeat arteriam. 26.1
 Chamæleo ubi habeat ſanguinẽ. 26.1
 Chamæleonis pedes. 35.40
 Chamæleonis membranæ firmæ. 26.1
 Chamæleo diſſectus, ſpirare tamen diu poteſt. 26.1
 Chamæleonis internæ partes. 26.1
 Chamæleo corporis partes mouere ad arbitrium poteſt. 26.10
 Chamæleonis domicilia. 26.10
 Chamæleo lacertæ ſimilis. 35.30
 Chamæleonis deſcriptio. 25.30
 Chamæleonis cauda. 35.30
 Charadrium auem unde nominemus. 140.10
 Chenalopetes. 84.40
 Chromis offendiſtur algore. 126.40
 Chromes ſemel pariunt. 67.30
 Chromis piſcis liquide audit. 38.10
 Chromis piſcis uidetur uocalis. 59.30
 Chryſalides. 76.10
 Cibi quomodo differant. 114.20
 Cibi qui inſtant, obſunt nutrimentis. 119.20
 Cicada ſola ore caret. 56.30
 Cicadæ alimentum roſ eſt. 56.30

Cicada nō habet excrementum. 56.30
 Cicadarum multa genera. 56.30
 Cicadæ canunt. 59.10
 Cicadæ ubi non sunt arbores, nō
 proveniunt. 81.10
 Cicadæ oleis deflestantur. 81.10
 Cicadarum coitus. 81.10
 Cicadæ mares canūt, femine si-
 lent. 81.30
 Cicadæ quo pacto capiuntur. 81.30
 Cicadæ unde generentur. 75.40
 Cicadarū duo genera sunt. 81.10
 Cicadæ quæ canunt, quales sint. 81.10
 Cicadæ muræ. 81.10
 Cicadæstris quale corp^o fit. 56.40
 Cicere pinguefunt fues. 128.30
 Cicindele. 47.40
 Cicindele unde nascantur. 76.30
 Ciconiæ cibis. 118.10
 Ciconia fecerit. 125.10
 Ciconiæ vulnere quæ herbam ad-
 ponant. 157.30
 Ciconia moneta. 145.10
 Ciconiæ pietas. 7.10 & 145.10
 Ciconiæ appendices. 31.40
 Cicunia. 146.1
 Cicunia auis aduncis unguibus. 117.30
 Cicures animantes. 9.10
 Cilia quos pilos vocemus. 131.1
 Cilium simiarum. 24.40
 Ciliū in palpebris. 20.40
 Calicis capræ tendentur. 131.1
 Cimices unde uiuant. 81.40
 Cimices unde proveniant. 81.40
 Cinchilus auis unde petat cibum. 118.10
 Cinclus uitam apud mare tradit. 140.30
 Cinclus præcordia appellatur. 28.30
 Cinclū uocat septentrā suerum 18.10
 Cinnamonus ex qua materia fa-
 ciat nidum. 141.30
 Cinthamomum quo pacto legit. 141.30
 Circus accipiter uulpem inuadit. 174.20
 Cirri unde proveniant. 76.30
 Cirri loliginis. 48.30
 Cirriles animantes quæ sint. 8.40
 Clerus nocet fauīs. 110.20
 Coagulo lac cogitur. 46.10
 Coagulum quid sit. 46.30
 Coagulum quæ habeant. 46.30

Congulum præstantius quod fit. 46.20
 Coarmentari. 97.10
 Cocalia. 52.1
 Cochleæ. 52.1
 Cochleæ bestiolas quasdam in se
 continent. 54.10
 Cochleis quales dentes. 52.40
 Cochleæ quo pacto latet. 12.40
 Coeunt aucta quæ retro urinam
 mittunt. 64.1
 Coeunt diuini quæ animal gene-
 rant, quā quæ ouum. 65.10
 Coitus tempus plurimorū uer est 66.40
 Coitus tempora certa. 66.40
 Coitus insectorum. 86.30
 Coitus crusta insectorum. 66.10
 Coitus quadrupedum bua pa-
 rientium. 64.30
 Coitus tempus omne quibus op-
 portunum. 67.1
 Coitus tempore humor mittunt
 in genitalia. 65.40
 Coitu quæ animalia nascantur. 85.20
 Coitus ante partum facit ad facili-
 tatem pariendi. 109.1
 Coitus serpentū. 64.40
 Coitus homini omne tēpus op-
 portunum. 67.1
 Coitus uarij animantium. 64.1
 Coitus mollium. 66.1
 Coitus matura ætas q̄ fit. 69.20
 Coitus tempore elephantū solitu-
 dinem querunt. 64.20
 Coles. 15.10
 Collum quibus hirtum fit. 20.40
 Collum quod sit. 14.30
 Colli partes. 14.30
 Collurio auicula. 143.30
 Colosq̄ hostis afinus est. 114.30
 Colubris Thebanus cornu uesti-
 gium est. 22.1
 Columba quo loco fel habeat. 29.20
 Columbe etia hyeme pariūt si lo-
 cum apricum habeant. 69.10
 Columbarum pulli quando me-
 liōres sint. 69.20
 Columbus exiguis lien. 28.40
 Columbi cum hominibus degūt 9.10
 Columborum cibis. 118.1
 Columbe ante coitum mutū o-
 sculantur. 85.30
 Columbe quandiu uiuūt. 118.30
 Columbe primo mare, deinde
 feminam generant. 87.20

Columbe ambo incubat, mas &
 femella. 87.10
 Columbe Aegyptiæ. 87.30
 Colubæ semetipsas coeunt. 87.30
 Columbe parus. 81.40
 Columbarū species plures sunt. 69.10
 Colubæ coniugij seruant. 118.10
 Columbe castitas. 5.30
 Colubæ setant tota ætate. 69.10
 Columbe caudam post coitū dis-
 tendunt. 85.20
 Columbi gregales sunt. 8.40
 Columbarum genus parit bina
 oua. 87.10
 Columella quæ sit. 14.20
 Commosis quid dicatur. 150.30
 Concepus post menstruorū p-
 sium coniugij. 107.1
 Concepus signa. 107.40
 Conchæ. 52.1
 Conchæ uiuant immutabili sede 8.10
 Concharum genus. 47.30
 Conchæ ubi generentur. 72.10
 Conchæ galadæ. 52.10
 Conchæ testa conctæ. 11.20
 Concharū genus uarijs locis na-
 scitur. 72.30
 Conchæ quedam sedem mutant,
 quedam non. 71.40
 Concharum quedam pectus autem
 diuise sunt. 52.30
 Concha quæ pictorib^{us} in usu est,
 qualis sit, ubiq̄ reperit. 73.40
 Concharum holpes cancellus. 71.40
 Conger ubi habeat fel positum. 29.20
 Conger quibusdam temporibus
 latet. 114.30
 Congros uincunt locustæ. 116.1
 Congri polypos uincunt. 116.1
 Congri uiuūt abscessa cauda. 116
 Congri branchiæ. 27.40. (30)
 Congri caput habet serpentes in
 mari. 28.30
 Congro gula est. 29.40
 Congri fortura. 98.1
 Congri in alto sunt. 112.40
 Congri lūes sunt. 27.40
 Congri tantum sunt carni uoci. 116.20
 Congri q̄t pinnas habeat. 10.40
 Coniugij uis. 110.20
 Coniugantes quo pacto profe-
 rantur. 59.20
 Conuulsione plenitudo infusa-
 tur pueri. 113.20

I N D E X.

- Cōuulsiōe excipiunt pueri. 113. 20
 Conuulsiō a scapulis orta pericu-
 losa est. 113. 20
 Cor quomodo inter duas uenas
 sit. 115. 40
 Cordis fin* in qbus pexigui. 16. 1
 Cor suo mucrone in quam par-
 tem spectet. 17. 40. & 16. 1
 Cordis sinus dexter maximus est
 finis minimus. 16. 1
 Cordis sinus omnes ad pulmonē
 habent foramen. 16. 1
 Cor tres habet fin*. 17. 40. & 16. 1
 Cordis situs. 17. 40. & 19. 30
 Cor membrana operit. 17. 40
 Cor homini ad sinistram uergit
 potius. 18. 1
 Cor hominis rotundius. 18. 1
 Cordis sinus perui ad pulmonē.
 18. 10
 Cordis meat* ad pulmonē. 18. 10
 Cor uenarū principium. 18. 40
 Cordis uenae. 18. 40
 Cor primum in ouo uidetur. 85. 40
 Cor quam partem in animalibus
 obtnear. 29. 30
 Cordis mucro. 29. 30
 Cor arteriae iungitur. 17. 30
 Cor subit spiritus. 17. 30
 Cor est oibus qbus sanguis. 28. 30
 Corde boues quidam ossiculum
 continent. 28. 40
 Cor esse neruorū originem. 18. 1
 Cordis uentriculus uenae quaedā
 pars est. 16. 10
 Cor serpentum. 31. 1
 Cor in medio sinu sanguinē te-
 nuissimum habet. 18. 20
 Cordula aquatilis animal. 8. 10
 Cordulum nomine animal 115. 10
 Cornua a radice caua i mucrone
 solidum exeunt. 40. 10
 Cornigera animalia. 21. 40
 Cornu etiam uolantes suos pul-
 los pascit. 88. 20
 Cornicis gula. 31. 30
 Cornu cū noctua bellum gerit.
 114. 1
 Cornices petunt litora. 118. 20
 Cornicū formae tñ inc ubi 89. 1
 Cornu ceruini incensu fugantur
 plurima insectorum. 13. 40
 Cornua ceruorum. 40. 10
 Cornua q solida, q caua sint. 22. 1
 Cornua q rariōe flectuntur. 120. 20
 Cornua discerpit ab ossibus 40. 1
 Cornua cū adligerē pon* quam
 ossi. 40. 10
 Cornu cerui sinistram non inue-
 nitur. 116. 20
 Cornuum color. 40. 1
 Cornua in Phrygia boues mo-
 uent. 40. 10
 Cornice intesta latent. 124. 10
 Cornice quae animalia integantur
 46. 20
 Cornice intesta latendo exiūt se-
 necutem. 125. 10
 Corui pennae frigore mutantur.
 42. 10
 Coruus hostis tauri est. 134. 20
 Coruorum nidificatio & fetus.
 144. 30
 Corui gula. 31. 30
 Coruo bino cornua oriunt 116. 30
 Coruus quot pariat. 88. 10
 Corui tempus incubandi. 88. 10
 Coruo ubi fel sit. 29. 20
 Coruus uulpi amicus est. 134. 40
 Coruinam speciem gerentes ue-
 nere non ualent. 9. 20
 Coruulus piscis cum utero fert
 optimus est. 132. 20
 Costae a spina oriuntur. 39. 1
 Costis pectus imposum est. 39. 1
 Costae octonae. 15. 20
 Costae turdulorum. 15. 20
 Costae quae sint serpentib*. 31. 10
 Coturnices sibi nidū non faciunt
 118. 40
 Coturnices q pinguiore. 122. 1
 Corn quo pacto capiuntur. 18. 1
 Coxa. 14. 40. & 20. 20
 Coxarū doloribus unde miren-
 dus sanguis. 35. 20
 Crabronum uermes. 76. 10
 Crabronum fauus. 79. 10
 Crabronum futura. 79. 40
 Crabronū proles qñ fiat. 79. 40
 Crabrones ducē habentes in ter-
 ra nidificant. 79. 10
 Crabrones ubi nidificent. 79. 10
 Crabrones unde uiuant. 155. 20
 Crabronum cubilia. 155. 20
 Crancrorum saxanliū cibis. 116. 1
 Crangines. 49. 20
 Crea. 15. 40. 30
 Crex bellū habet cū gulgulo. 134.
 Crista auiū partem ex pinnis, par-
 tem ex alia materia. 27. 10
 Crocodilus. 8. 1
 Crocodili quo pacto purget den-
 tes. 157. 20
 Crocodilus fluuiantis superiōrē
 maxillam mouet. 39. 1
 Crocodili non possunt sine aqua
 uiuere. 114. 40
 Crocodilus quem Aegyptus fert,
 linguam non habet. 15. 20
 Crocodili lien. 28. 40
 Crocodilus fluuiantis noctu in
 aqua, interdū in terra agit. 35. 30
 Crocodili magnitudo. 89. 10
 Crocodili augeri quandiu uiuat
 89. 10
 Crocodili quo loco & quor par-
 ant oua. 89. 1
 Crocodili fluuiantis curis. 15. 30
 Crocodilo quo pacto crura fle-
 ctantur. 20. 10
 Crocodili latent. 124. 10
 Crocodili in testina. 30. 30
 Crocodilus qmodo naret. 10. 40
 Crocodili cauda. 10. 40
 Crocodili fluuiantis oculi. 25. 30
 Crocodili testes. 32. 20
 Crocodili genus innocuū. 133. 40
 Crus. 15. 40
 Crura quomodo flectunt anima-
 lia. 20. 10
 Crura quadrupedum osse & ner-
 uo constant. 21. 30
 Crura hominis. 16. 10
 Crusta intesta omnes sensus ha-
 bent. 58. 30
 Crusta intesta animalia. 11. 20. &
 49. 20
 Crusta intesta qbus cōueniant cū
 lis quae sanguinem habet. 31. 20
 Crusta opera dormiunt. 61. 1
 Crustata hyberno tempore con-
 duntur. 124. 30
 Crustaceorū cibis. 115. 10. & 116. 1
 Crustatum nullum adie naturale
 sonum. 50. 30 30
 Crustata qmodo oua foueant. 75
 Cresta de genitura elephitorum
 falsa scripsit. 47. 10
 Cubitus. 15. 30
 Cuculus saxa peti, ut nidificet.
 84. 1 59. 30
 Cuculus piscis uocalis existimat.
 Cuculi natura & prus eius. 89. 20
 Cuculus quid cōmune cum acci-
 ptre habeat. 88. 20
 Cucul* in alieno nido oua sua
 adit. 88. 30
 Cuculus immutat colore. 158. 20
 Cuculi fetus. 144. 10
 Cuculi timidas. 144. 20
 Cucumere pingues redduntur su-
 es. 120. 1
 Cucurbita capitur salpa. 116. 20
 Culices unde generentur. 76. 30
 Culex exiit senectutem. 115. 40
 Culices palustres. 8. 10
 Culicis aculeus. 11. 10

I N D E X.

- Culices uinarij unde nascantur. 77.10
 Culices quomodo pugnēt. 16.10
 Culices acida petunt. 18.40
 Culicidga qualis auis sit. 118.1
 Cuniculi timidi. 9.30
 Cunilam aues ad uulnera utuntur. 117.30
 Cunila aduersantur ueneno uiperar. 137.30
 Cursores pisces gregales. 8.40
 Curuca. 117.40
 Curs non habet sensum. 41.1
 Curs non coit uulnerata. 41.1
 Curs consilat perpetuo contextu. 41.1
 Cutem omnia habere quibus est sanguis. 41.1
 Curs quibus sit communis. 34.30
 Curi omnium inest lentor quidam mucosus. 40.40
 Cymidem quam aue nominent Iones. 140.40
 Cynoraista uocatur ricinus. 81.1
 Cyprini quoties anno pariant. 93.1
 Cyprini branchia. 27.40
 Cyprini palatum. 57.30
 Cyprini morbus. 127.30
 Cyprinorum generatio tarda. 91.30
 Cyprini omni magnitudo. 91.30
 Cyrenensis ager copiam habet cicadarum. 81.30
 Cytisus auget lac. 46.30
 Cynisus dum floret, lacti incommo-
 dus. 46.30
- D
- Damar sanguis non concre-
 scit. 18.30
 Damar deest fel. 29.1
 Dasquidi quid comedant. 116.30
 Decretorum dies in morbis. 77.40
 Delphinus lacte nutrit factum su-
 um. 91.30
 Delphinus dormiens spirat. 117.1
 Delphino ubi testes locati sint. 33.30
 Delphini sagaciter odorant. 58.30
 Delphino peculiaris natura. 114.
 Delphinus felle caret. 39.10 (40)
 Delphini animal generat. 10.30.
 & 91.10
 Delphini quia ratione capiuntur. 57.30. & 58.30
 Delphinus in Ponto est. 123.10
 Delphini ubi habentur silius. 10.30
 Delphinus etiam mammam ha-
 bet. 17.30. & 45.30
- Delphinorum mores. 157.40
 Delphini genitale. 12.30
 Delphinorum celeritas. 158.1
 Delphini in terra erupunt. 158.10
 Delphino non sunt auriculae. 13.40
 Delphini nomen & Graecis & La-
 tinitus usitatum. 5.40
 Delphinus quo loco continetur su-
 as mammamas. 17.30
 Delphini stridor. 59.40
 Delphinus uocem habet. 60.40
 Delphini quomodo dormiant. 61.
 30. & 91.30
 Delphinorum coitus. 65.10
 Delphinus quotannis ad iustam
 magnitudinem perueniat. 91.30
 Delphini quod tempore latent. 91.30
 Delphini erga sortem charitas. 91.30
 Delphinorum uita est longa. 91.30
 Delphinus ossa habet. 39.30
 Delphini quot procreant. 91.10
 Delphini brachia non habent. 10.30
 Demonstratio quibus rebus fiat.
 Dentes serpentum. 11.10 (12.10)
 Dentes maxillares quando homi-
 ni nascantur. 24.1
 Dentes piscium serrati sunt. 23.30.
 & 27.40
 Dentes crocodili. 35.30
 Dentes simia ut homo habet. 24.30
 Dennum ordo triplex manucho-
 ra bellux. 31.30
 Dentes echinorum. 54.40
 Dentes canini qui sunt. 33.40
 Dentes maribus plures quam fe-
 minis. 33.40
 Dentes ossei gingiuis impositi
 sunt. 14.30
 Dentes puerorum. 113.1
 Dentes leari. 27.40
 Dentes emulantur ossium natu-
 ram. 40.10
 Dentes equorum. 100.30
 Dentes canini declarant maxime
 aetatem equi. 101.30
 Dentes quibus mutantur. 35.30
 Dentes alimi quos gnomonas uo-
 cant. 101.30
 Dentes qui homini mutant. 35.30
 Dentes maxillares octogesimo
 anno creuerunt quibusdam muli-
 eribus. 24.10
 Dentes elephantum utrinque qua-
 tuor, quibus molit. 24.10
 Dentes alios habent elephanti ma-
 res, alios feminas. 24.10
 Dentes maxillis inhaerent. 39.1
 Dentes firmissimi. 39.1
 Dentes priores acuti. 23.30
- Dentes interiores plani. 23.30
 Dennum uarietas. 23.10
 Dentes uming non habent quae
 cornua gerunt. 23.10
 Dentes quibus plures uiuaciora
 sunt. 23.40
 Dentes quibus rariore, sunt bre-
 uioris uitae. 23.40
 Dentes nigri sunt canibus aetate
 prouectus. 23.40
 Dentes equo calidiores reddun-
 tur. 23.40
 Dentes caninos canes mutare.
 23.30
 Dentes nouos enasci prius quam
 extrudantur ueteres. 23.30
 Dentes serrati quibus sunt, habent
 os relictum. 24.30
 Dennum indicia anni canis. 23.30
 Dentes serrati quibus. 23.10
 Dentex litoralis piscis. 122.30
 Dentices gregales sunt. 135.30
 Den nces quid comedant. 116.30
 Denicus fel. 29.10
 Denicus branchia. 27.40
 Den nre incipiunt pueri septimo
 mense. 112.40
 Dictamnus caprae sagitta transi-
 x quatuor in Creta insula. 157.10
 Dignus quot aubus sint. 26.30
 Dignorum partes. 15.30
 Diogenes Apolloniarum de uenis
 opinio. 34.30
 Dissimilares partes. 7.1
 Dissimilantur parum officia. 10.10
 Dolentibus lumbis unde mitti-
 tur sanguis. 35.30
 Domitia sibi parantia. 9.1
 Dorium. 15.30
 Dorium polypi. 48.1
 Dorium piscium. 39.30
 Dorium spineum aut osseum ha-
 bent sanguine praedita. 39.30
 Doris doloribus unde sanguis
 mittatur. 35.30
 Draco quod pacto medeat sibi. 137.30
 Draco dissidet cum aquila. 124.1
 Duces habentia. 8.40
- E
- Echinus uidetur non habere
 olfactum. 39.10
 Echini genera. 51.1. & 54.30
 Echini orum aculei. 11.40
 Echinus uisus ad dissolutiones uri-
 nae. 54.30
 Echini roti candidi apud torone.
 54.30
 Echinorum spinar. 54.30
 Echini

Echini cibo idonei agilius ceteris mouentur. 54.30
 Echinis omnibus oua sunt. 54.30
 Echinis quiddam nigricans non esculentum inest. 54.40
 Echinatorum caput. 54.30
 Echinatorum excrementi ostiū. 54.30
 Echinis quando sit copia ouorū. 68.40
 Echini quādo meliores sint. 68.40
 Echinis sunt quini dentes. 54.40
 Echinis quid sit proprium. 54.30
 Echinis nulla est caro. 54.1
 Echinis stella nocet. 72.40
 Echinatorum corpus. 55.1
 Echini quo pacto spinis utantur. 55.1
 Echinometra. 54.30
 Elapho monte sunt ceruæ scissæ aure. 103.20
 Elegini gregales sunt. 115.20
 Elaphas q̄ habuit quiescat. 20.10
 Elephantum mammarū. 20.10. & 22.10
 Elephantū pugnat inter se. 115.1
 Elephantū inter se differunt multum. 115.10
 Elephantorum uenatio. 115.10
 Elephantorū coitus. 64.20. & 103.40
 Elephantis nasus. 14.10
 Elephantis disciplina. 5.30
 Elephantū ubi habeat testes. 12.10
 Elephantū intestina. 30.30
 Elephantorum fornicū genitale. 22.30
 Elephas quandiu uterum ferat. 71.20. & 103.40
 Elephantū pullus. 102.40
 Elephantū secur sine felle. 29.1
 Elephantorum cura in uarijs casibus. 110.10
 Elephantorum morbi. 110.2
 Elephantū etiam lapides deuorant. 110.10
 Elephantus minime hirtus. 21.10
 Elephantū genitale. 22.30
 Elephantū ad coitū effert. 96.30
 Elephantus qualem uocē edat. 60.40
 Elephantū ingenium. 157.10
 Elephantorum ætas. 157.20
 Elephantū passus. 130.40
 Elephantū potus. 130.40
 Elephantū uitæ spaciū. 130.40
 Elephantis nomē uisitatū utriusque linguae. 1.40
 Elephantū extra. 30.30
 Elephantus statim dentes habet æditus. 24.10

Elephas linguam exiguā habet. 24.10
 Elephantū facile māsuecunt. 9.10
 Elephantū nasus. 20.1
 Elephantum natura. 9.30
 Elephantorum morbus. 128.40
 Elephantus femina quo ætate anno coire incipiat. 71.10
 Elephantus mas quando inire incipiat. 71.10
 Elephas quantum sortum edat. 71.20
 Elephas singulos parit. 71.20
 Elephantus grauidam non tangit. 71.20
 Elephantū nō sunt ungues. 40.20
 Elephantū digitū & crura. 19.40
 Elephantū iuniores & seniores capiuntur. 115.20
 Encrauli siue (ut alij uolunt) encrauchioli unde generent. 94.20
 Ἐπικροτες ἵππῳ, id est, uisū degit ambiguum. 127.1
 Ephemerum animal. 77.30
 Ephemerum quot notis se moueat. 11.20
 Ἐπιγλυφίδας nō habet quæ oua pariunt. 27.10
 Epitricæ uacæ lactis abundantes. 46.40
 Epirus gignit magnas quadrupedes. 46.30
 Epitragæ pisces. 62.10
 Equæ libidine concitate in quā celi partem currant. 96.30
 Equæ incenduntur libidine. 96.30
 Equæ lac. 45.40
 Equæ secundas deuorat. 101.20
 Equæ regis Scytharum. 157.30
 Equas euentari. 96.30
 Equæ purgatio post partū. 92.20
 Equæ indicium suæ libidinis præstant. 97.1
 Equæ grauida marē parit. 109.30
 Equæ facile parit. 92.20
 Equarum libido quomodo extinguatur. 97.1
 Equi feminas suas norūt. 97.10
 Equarum cōceptus indicium. 92.20
 Equæ stans emittit partū. 120.40
 Equorum uitæ spaciū. 100.40
 Equus quādiu augeatur. 101.1
 Equarum societates. 116.10
 Equarū ergo pullos amor. 116.10
 Equicerui cornua. 21.10
 Equicerui barba. 21.1
 Equicerui magnitudo. 21.1
 Equiceruus ubi gignatur. 21.1
 Equi seniores fecundiores sunt. 100.30

Equi fluuiatilis os. 24.20
 Equi fluuiatilis pes. 21.30
 Equus fluuiatilis qualis. 24.20
 Equi fluuiatilis uox. 24.20
 Equi fluuiatilis aqua ceteri non possunt. 114.40. & 129.40
 Equi matri similes mammas habent. 22.20
 Equi dentes in senectute. 33.40
 Equi amant aquam turbulentā. 120.30
 Equorum natura non est stabilis. 101.30
 Equorum morbi. 129.10
 Equi quib⁹ pascuis letent. 129.40
 Equi etiam somniant. 60.40
 Equorum oculi uariant interdū colorem. 112.20
 Equi dentes. 23.10. & 103.20
 Equi pes. 21.30
 Equorum uox. 69.40
 Equorum uisū. 20.40
 Equus apud Opuntā annorum quadraginta potuit coire. 101.2
 Equos tor morbis quot homines infestari. 129.30
 Equos quæ animalcula necent. 129.30
 Equus quādo coire incipiat. 72.20. & 100.1
 Equæ quādiu ferat uterū. 100.20
 Equus animal salacissimū. 100.20
 Equus sorbendo bibit. 119.40
 Equi etiam cani fiunt. 41.1
 Equi quando sanguine detracto inueniuntur. 129.10
 Equus quādo fit in uigore. 101.1
 Equus balneum amat. 129.40
 Equorum cibis. 120.30
 Equæ quādiu generare possunt. 70.20
 Equus quādiu uiuat. 70.20
 Equus non habet fel. 29.1
 Equire. 96.30
 Equifelis uere tantū parit. 68.1
 Erica piscis uocalis habitus. 19.10
 Erica quoties anno pariat. 91.1
 Erihaca. 79.10
 Eruca suis nocent. 130.20
 Eruca unde nascantur. 76.1
 Erucis sunt cicindela. 76.30
 Eruum augeat lac. 46.30
 Eruum prægnantibus non prodest. 46.30
 Eruo bones pingues redduntur. 120.10
 Erelis piscis oua parit. 92.1
 Europæ animalia fortiora. 131.20

INDEX.

Exanguis quæ sint. 10.10
Excrementa communia animalibus sunt. 14.10
Excrementi ostium testaceorum. 13.30
Excrementum duplex. 9.40
Exemplorum uis. 5.1.

F

Faba & fabarum herba boves pinguescunt. 110.1
Fabæ lactis copiam faciunt. 46.40
Facies quæ pars sit in homine. 12.30
Faciei partes. 12.30
Falcata avis pennis plurimum uallet. 8.1
Farrago quando utilis iumentis. 120.30
Fasiana pulueratrix est. 159.10
Fauaginem quâ nominent. 71.10
Fauces. 14.10
Fauum conficiunt primo apes. 78.30
Faus quid noceat. 130.30
Faus est floribus constructus. 78.40
Faus extruunt ocellis sexangulis. 79.30
Faus crabronum. 79.30
Fesces quomodo coeant. 64.30
Fetum forminx libidinosæ sunt. 64.30
Felis partus. 104.40
Fel non est delphino. 19.10
Fel quo loco in piscibus positum sit. 20.10
Fel serpentum. 31.1
Fel quibus animalibus non sit. 18.30. & 18.40
Fel ubi ad miraculum usque grâde. 18.30
Fel in aibus quem locum fortitum sit. 19.30
Fellus locus in animalibus. 18.40
Femur. 14.40. & 15.40
Femoris uenæ. 14.40
Femora. 39.10
Femora hominis carnosa. 21.30
Fera quæ perpetuo sint. 9.10
Fiber ex aqua uisum querit. 119.30
Fibra in animalibus. 10.10
Fibræ quædam saniem continent. 58.30
Fibrarum natura. 18.30
Fibræ tendunt à neruis ad uenas. 18.30
Fibræ in sanguine. 58.30
Fibra omnibus communis. 14.10

Fibula à spina oritur. 39.1
Ficarij culices unde generentur. 81.40
Ficedula. 117.40
Ficulno succo lac cogitur. 46.10
Ficu pinguis sit sus. 110.1
& 118.30
Fidiculæ appendices. 31.30
Fimbria auriculæ pars inferior. 13.30
Fistula quibus sit. 10.30
Flores purpurarum. 71.1
Florus oditequum. 134.30
Florus, spinus, ægidus odiu inter se exercent. 135.1
Fluore alui laborant elephanti. 130.10
Formina. 9.40
Formina in marem facile mutatur. 115.30
Formina in sinistro latere mouet. 108.10
Forminx tractabiliores maribus sunt. 135.10
Formina minus sunt animosæ. 133.10
Forminarum genitalia. 31.10
Forminis sanguis nigrior. 44.40
Forminx malitiosiores maribus sunt. 133.30
Forminx ualidiores habent inferiores partes. 61.30
Formina mare infirmior. 61.30
Forminx caro humidior quam maris. 61.30
Forminx acutiorem uocem habent. 69.40
Forminx ferociunt à partu. 96.10
Forminx maiores euadunt quam mares in quibusdam animalibus. 61.30
Forminx quomodo mingit. 11.30
Fortis quomodo se moueat. 111.40
Fortis iam aditus quomodo curandus. 111.30
Fortis quando in utero mouetur. 108.10
Fortum præcedit in pariendo aqua. 111.10
Fortum quædam similia habere cum parente. 110.40
Fortum in utero læsum metachærum uocant. 98.1
Formicæ. 47.30
Formica ciuilis est. 8.40
Formica sibi domum facit. 9.1
Formicarum labores. 5.10
Formicarum coitus & partus. 80.1

Formicæ quâdo nascantur. 67.30
& 80.10
Formicæ origani puluere fugiunt. 58.40
Formicarum ingenium. 149.10
Frangere quid sit. 106.1
Frigus mutat pennas auis. 42.10
Fringillarius accipiter. 117.30
Fringillago. 117.30
Fringillæ cibus. 117.30
Frons quæ sit pars hominis. 11.30
Frons indicat mentem. 12.40
Frões magna segne indicat. 12.40
Frons in homine parua mobilis significat. 12.40
Frons lata mentis mobilis indicat. 12.40
Frons rotunda iracundum arguit. 12.40
Frugilega. 117.40
Fucæ cibus. 116.40
Fuca piscis mutat colorem. 113.30
Fuca sola inter pisces nidificat. 131.10
Fuca pusillæ bis pariunt anno. 92.30
Fucus ut apes pennas erodant, quo pacto efficiendum sit. 79.10
Fuci unde proueniant. 78.10
Fuci carent a culco. 78.30
Fuci quid agant in alucarijs. 100.30
Fulica ubi uisitet. 118.30
Fulicarum aucupatio. 146.10
Fulio ubi pariat. 91.30
Fulloni pennæ uagina incluse. 151.40
Fufanei pisces. 67.30
Fusæ nei quando optimi. 113.30
Fufaneis quies nocturna est. 113.30
Fuscina qui pisces capiant. 61.30

G

Galadæ conchæ. 51.10
Galem Græci mustellam uocant. 4.1
Galerita. 143.30
Galgul* cû Lybio pugnat. 134.10
Galguli avis magnitudo et color. 118.1
Gallerucæ unde oriuntur. 77.1
Gallerucæ pennæ uagina incluse. 55.40
Galli post uictoriam canunt. 60.10
Gallinago qualis sit. 141.40
Gallinago nidificat humil. 139.30
Gallus ouum à coitu decem diebus perficiunt. 85.30
Gallus nonnullæ bis parit. 8.40
Gallina pulueratrix est. 159.10
Gallina

Gallinæ ferme omnibus anni temporibus pariunt. 69.10
 Gallinæ quot diebus fecum excludant. 84.40
 Gallinarum iuuentæ fecundiores sunt ueteribus. 87.20
 Gallinæ quo pacto coeant. 64.10
 Gallinarum generosarum fecunditas. 83.30
 Gallinæ hadrianæ. 83.30
 Gallinæ qualem cristam fornicus sit. 17.10
 Gallinacei quomodo castrentur. 159.20
 Gallinacei libidinosi. 9.10
 Gallinacei ingluuias. 31.20
 Gallinacei appendix. 11.40
 Gallis maribus solus in suo genere canis est datus. 60.20
 Gammarus. 49.20
 Gammari quando exuantur fenestrate. 126.1
 Gammarorum genus crusta testum. 11.30
 Gammarorum coitus. 66.10
 Gammari ubi proueniant. 74.20
 Gammari quare ratione capiantur. 18.40
 Gammarorum intestinum. 50.40
 Gammari color. 50.1
 Gavia alba aquas amat. 118.20
 Gavia quoroua pariant. 67.20
 Gavia gula. 31.30
 Gavia unde petat cibum. 118.10
 Gavia ab harpa dissidet. 114.10
 Gemini magna ex parte similes sunt. 118.2
 Genæ non possunt coalescere. 15.2
 Generandi ratio. 110.20
 Generationes animalium uariæ. 69.10
 Generosum quod sit. 9.20
 Genitale membrum. 19.10
 Genitalis membri foramina. 19.10
 Genitale marium. 22.20
 Genitale quomodo formentur in utero. 111.10
 Genitale membrum mulieris quale. 15.10
 Genitalia fimarum. 25.10
 Genitale cicadæ. 81.10
 Genitale cameli. 64.30
 Genitalis differentia munerosa est. 22.30
 Genitale hominis carnosum cartilaginofum est. 22.30
 Genitale neruofum quibus sit. 22.40
 Genitalium meatus piscium. 17.20

Genitale & testes quæ contineant condicos. 25.30
 Genitale officum quibus sit. 22.40
 Genu. 16.1
 Gibbæ. 49.20
 Gibber. 15.30
 Gingiæ carne constant. 14.20
 Ginni, quos uocant, ex equa prodeunt. 102.20
 Gladius piscis unde dictus. 27.40
 Gladii pisces alio agitant. 127.10
 Gladiolum. 48.40
 Glandes animalcula testacea ubi generentur. 72.20
 Glande recte suginantur sues. 110.2
 Glandes carnem humidam faciunt in suis. 128.40
 Glaucus quando fit melior. 132.20
 Glaucus ætate latet etiam. 124.40
 Glauci appendices. 31.20
 Gliræ in arboribus latendo pingues fiunt. 125.30
 Glutinum ex qua re fiat. 40.40
 Gobio litoralis est piscis. 122.40
 Gobionis appendices. 31.20
 Gobiones ubi panant. 92.20
 Gobionis cibus. 116.40
 Gobiones gregales sunt. 115.20
 Gobiones gaudent fluuijs. 126.30
 Gobionaria apua. 94.20
 Graculus piscis parit autumnus. 95.20
 Graculi gregales sunt. 115.20
 Grandines suum tolluntur npha. 128.30
 Grandinosi quomodo cognoscantur. 123.30
 Grus animal ciuile. 8.40
 Grues quomodo uolent. 122.10
 Grues non tenere lapidem, ut quidam putant. 122.10
 Grues nigrescunt in senectute. 42.10
 Grues quod se conferant. 121.40
 Grues ubi pugnent cum pigmeis. 121.40
 Grues inter se pugnant. 141.1
 Grues quot oua pariant. 141.1
 Grues gregales sunt. 8.40
 & 122.20
 Grues statim semina coeunt. 64.10
 Gruum prudentia. 140.1
 Gruum dux uigilat. 140.1
 Gula. 17.1
 Gula serpentum longa est. 30.40
 Gula uulpis omnis est. 28.30
 Gula ad uentrem tendit. 30.2
 Gula crusta intestorum. 51.30
 Gula non omnibus similis. 18.20

Gula finit in uentriculum. 17.10
 Gula colli pars. 14.30
 Gulam pauci pisces habent. 29.30
 Gustus hominis. 16.20
 Gummi colli pars. 14.30

H

H Adrianæ gallinæ quotidie pariunt. 83.30
 Haliæ. 145.10
 Halosachna. 141.30
 Hami pisces gregales. 8.40
 Hami fel. 29.10
 Heracleonici cancri. 49.20
 Hercules quomodo procreatus sit. 109.40
 Hercules laus. 4.10
 Hercules unam tantum feminam genuit. 110.30
 Herinacæ testes. 31.20
 Herinacæ quales pilos habeant. 11.40. & 40.40
 Herinaceorum solertia. 137.30
 Herinaceorum coitus. 64.10
 Herodotus Brysonis rhetoris pater. 87.40
 Hesiodus nesciuit aquilam non aut certe raro bibere. 126.10
 Hiatula omnis grauida capitur. 92.10
 Hiatula in alto est. 122.40
 Hiatulæ carne uescuntur sola. 116.20
 Hiatulæ uenter sæpe præcidit. 116.30
 Hiatularum genus piscium. 62.20
 Hinnuli coagulum laudatissimum. 46.20
 Hippardium capronas gerit. 21.1
 Hippeas quosdam cancos appellat. 49.30
 Hippelaphus iubam habet. 21.1
 Hippelaphus unde dictus. 21.1
 Hippomanes. 96.40
 Hippomanes adheret nascens pulli fronti. 101.20
 Hippurus piscis abscondit. 124.10
 Hircæ uites. 70.30
 Hirci pingues minus sunt fecundi. 70.30
 Hirci tempore coitus ferocunt. 96.20
 Hirundo bis anno parit. 69.1
 Hirundo bis anno nidificat. 87.40
 Hirundinis pullorum oculi. 87.40
 Hirundines maris strident. 59.40
 Hirundo etiam carne uescitur. 117.30

INDEX.

Hirundinem pennas mutare frigore.	43. 10	Hominis ætas ad coitū apta	69. 30	Imbrium tempore multa animalium in mari videntur.	124. 40
Hirundinis fellis locus.	29. 20	Hominis genitale.	22. 20	Iudæa producit mantichorā.	23. 20
Hirundinum nidi.	84. 1	Hominis partum situs.	16. 10	Inda habet paruum serpentem,	
Hirundinis ingenium.	138. 1	Hominis cerebrum.	16. 30	cuius remedium ignorat.	131. 1
Hirundinum oculi.	31. 10	Hordeario morbus equorum.	129. 20	Indiam suum non habere.	130. 40
Hirundinum ventriculus.	11. 30	Hordeo pinguefcit fus.	120. 1	Infans iam natū vocem emittit.	
Hirundines quō fecedant.	125. 1	Humerarius nervus.	138. 10	Ingluies auium.	31. 20
Hirundo magis pennis quā pedibus ualet.	8. 30	Humerorum ossa scapulae vocantur.	39. 10	Ingluies qualis sit.	31. 20
Homo plurimum seminis genitalis emittit.	47. 1	Humor est omnibus animalibus.	10. 1	Inguen.	15. 10
Homo mas quādiu generare possit.	70. 30	Hyæntæ natura.	104. 10	Innum præcreari ex mulo & equa.	103. 10
Homo semina quādiu parere possit.	70. 30	Hyæntæ genitalia.	104. 1	Insecta.	47. 30
Homo superiorem partem habet minorem.	22. 40	Hyænta molitur homini infidias.	119. 10	Insecta impennata.	47. 10
Homo quādo somnare incipiat.	61. 30	Hyemis & imbrium signū.	100. 10	Insecta latent.	124. 1
Homo omnes sensus habet.	57. 1	Hypanis fluuii quadrupedes uolucres fert.	77. 20	Insecta plurima quæ pacto nascantur.	69. 20. & 75. 40
Homo animal ciuile.	8. 40	Hypenemia oua.	84. 30	Insecta quo pacto coeant.	66. 30
Homo solus faciem habet.	12. 30	Hypenemia quæ uocentur.	63. 30	Insecta etiam dormire.	61. 30
Homo quid cum animalibus habeat commune.	113. 40	Hypocondrium.	14. 40	Insecta senectutem etiam exulit.	125. 40
Homo solus aurem non mouet.	13. 40	Hytrix latet.	103. 40	Insecta procal sentiunt.	58. 30
Homo solus ambidexter.	20. 1	Cystrices conduntur certo tempore.	125. 10	Insectorum feminæ maiores euadunt quā mares.	62. 20
Homo qualis.	16. 10	Hystrices quales pedes gerant.	11. 40	Insecta uermem pariunt.	75. 30
Hominis os.	24. 20			Insecta quando potissimum ualeant.	130. 10
Hominis saluia contra uenenosius facta.	132. 1			Insecta pereunt oleo.	110. 20
Homo aliter quā quadrupedes obriunt pilum.	24. 30			Insectorum genera plura.	55. 40
Homo quid peculiariter habeat.	9. 30			Insecta aculos habent.	56. 10
Homiæ prorsus extenuato mulæ uenç videntur, quæ nō possunt in mortuis uideri.	34. 30			Insecta sonus.	59. 30
Homini maxillares dentes quando nascantur.	24. 1			Insecta quæ saliant.	56. 30
Hominis uenter.	30. 10			Insecta quid pro carne habeant.	56. 20
Hominis quot notis mouentur.	11. 1			Insectorum intestinum.	56. 30
Hominis partes.	12. 20			Insecta pennata.	47. 30. & 56. 10
Hominis cunis est tenuissima.	40. 40			Insecta membranæ uolant.	11. 1
Hominis pili.	20. 40			Insectorum partes.	55. 40
Hominis semen genitale quando incipiat.	105. 40			Insecta diuulsa etiam uiuere possunt.	56. 1
Hominis uenæ crassiores.	18. 20			Insectorum discrimen in sexu.	62. 10
Hominis gressus.	23. 1			Insectorum oculi.	56. 1
Hominis natura anceps est.	8. 40			Insectorum partes sensoriæ.	56. 1
Hominis testes.	32. 20			Insectorum pectus.	121. 20
Hominis proprium est loqui.	60. 20			Insecta intereunt sulphuris odore.	58. 40
Hominis stercus contra uenenum ualet.	157. 10			Insectorum generationis tempus.	77. 40
Hominis partes exteriores.	16. 30			Insecta fugantur suffusa cornu ceruini.	58. 40
				Insecta quo tempore coeant.	67. 20
				Insectorum mutationes in figuris quot diebus perficiantur.	77. 40
				Insecta quo pacto intereant.	78. 1
				Insecta quæ sint.	81. 10
				Insecto	

I N D E X.

Insectorum ingenium. 149. 1
Internodium digitorum. 15. 30
Intestinum simplex. 17. 30
Intestina elephantis sinuosa sunt. 40. 30
Intestinorum discrimina. 30. 30
Intestina maiora quæ habeant. 30. 30
Intestinum rectū quibus fit. 30. 30
Inuidorum supercilia. 12. 40
Iubata animalia. 20. 40
Iugale à spina oritur. 39. 1
Ivryg auicula quid peculiariter habeat, qualisq. sit. 26. 30
Iugulum. 15. 30
Iuli. 47. 30
Iulie gregales sunt. 135. 20
Iumenta quæ nominemus. 12. 1
Iumenta potu pinguescunt. 120. 30
Iumenta quo pacto incrementa capiant. 35. 1
Iuencæ qua ratione augeantur. 120. 30

L

Labeo quando coëat. 95. 10
Labeones quando pariunt. 63. 10
Labra quæ sint. 14. 10
Lac quando definat. 113. 10
Lac quid in se contineat. 45. 30
Lac cameli. 102. 40
Lac mulieris quid utile sit. 110. 10
Lac in maribus non gignitur. 45. 40
Lac in mulierum mammis. 113. 1
Lac quando unte. 100. 1
Lac qua re cogatur. 46. 10
Lac quorū sit caseo in unte. 46. 10
Lac extinguit quoddam genus pabuli. 46. 30
Lac cameli. 45. 40
Lac eque. 45. 40
Lac asinae. 45. 40
Lac tenue & crassum. 45. 30
Lac quod plus contineat casei. 45. 30
Lac eorum quæ non utrinq. dentata sunt coit. 45. 30
Lac leporinum. 104. 30
Lac in uris quibusdam effectum. 14. 30. & 46. 1
Lacti inest pinguedo. 46. 1
Lac caprinum miscere quoddam ouillo. 46. 1
Lac quod potissimum spissetur. 46. 1
Lac bubulum crassissimū. 45. 40
Lac non coit frigore. 45. 40

Lacigne spissatur. 45. 40
Lac quando fiat in animalibus. 45. 40
Lac qd fit utile. 45. 40. & 46. 40
Lac aliquando edulis quibusdam efficitur. 45. 40
Lac quo pacto in capris quæ non pariunt, fiat. 45. 40
Lac quando utile. 97. 40
Lac mulierum quod fit optimū. 46. 40
Lac melius habent fuscæ quàm candidæ. 46. 40
Lac quale infantibus salubrum. 46. 40
Lac in oibus animalibus in mam mis est. 45. 10
Lactis copia quibusdam. 46. 1
Lac ad caseos aptum. 46. 10
Lactis copiarū indicium. 46. 40
Lac diu durat, si non coëant animalia. 46. 40
Lactis copiam habent edaciora. 46. 30
Lactes. 17. 30
Lacertæ lien. 28. 40
Lacertæ uulua. 33. 30
Lacertæ crura. 20. 10
Lacertæ chamæleo simile animal. 35. 30
Lacertæ quo pacto conuiueant. 16. 40
Lacertæ ubi pariant oua. 83. 1
Lacertarum coitus. 64. 40
Lacerti uenter intestinalis. 30. 30
Lacerti gregales sunt. 135. 40
Lacertus agilis. 15. 30
Lacertis quales testes sint. 32. 30
Lacertus latendo exiit senectam. 135. 30
Lacerti Arabiæ. 131. 10
Lacerti neruorum frequentia præditi sunt. 38. 30
Lacerti quot pedes habeant. 10. 30
Lacertis caudæ amputatæ renascuntur. 31. 10
Lacerti quandiu lateant. 124. 10
Lacerti cauernas subeunt. 9. 1
Lamia ex cartilagineis. 65. 10
Laser serpens. 131. 40
Larax. 8. 1
Larax gaudet fluminibus. 119. 30
Larax pilus. 119. 30
Larina lingua an à Græca supertur. 4. 1
Lena à Leone quid differat. 104. 10
Lene mammæ. 22. 10
Leguminum uermibus fiunt ani

malia pennata. 77. 1
Lendes à quibus generentur. 81. 40
Leo quomodo mingat. 22. 30
Leonis ungues. 40. 30
Leonum grexus. 20. 30
Leonum mores. 9. 20. & 156. 1
Leonis fortitudo. 5. 10
Leo & lupus ceruarius inimici sunt. 135. 1
Leo constat ossibus solidissimis. 39. 20
Leo quot canulos pariat. 104. 1
Leo quibus locis nascatur. 104. 1
Leo quos dentes mutet. 104. 10
Leonis ossa uidentur nullam habere medullam. 39. 20
Leones quo pacto coëant. 64. 1
Leoni quid loco tali sit. 11. 40
Leonis uenter. 30. 30
Leoni corpus hirtum. 20. 40
Leoni sunt dentes ferrati. 23. 10
Leonis edendi modus. 119. 30
Leo in ediam diu perferre potest. 119. 30
Leo raro excrementum emittit. 119. 30
Leonis alui status. 119. 30
Leonis urina. 119. 30
Leonis interiora grauiter olent. 119. 30
Leo ignem timet. 156. 10
Leonum ætas. 136. 10
Leonum genera. 156. 30
Leonis pes. 11. 30
Leones contra efferantur. 96. 20
Leonis ceruix osse rigida constat. 19. 30
Leonis os. 24. 20
Lepus acetabula habet uulua. 34. 10
Lepus quo pacto mingat. 22. 30
Lepus habet coagulum. 46. 20
Lepores quo pacto coëant. 64. 1
Lepores superferant. 104. 20
Leporis lac. 99. 1
Lepores Aegypti. 131. 1
Leporis coagulum medetur p. fluuii alui. 46. 20
Leporum genus quoddam uidetur habere bina iecora. 39. 40
Leporum femina marem saepe in coitu superuenit. 64. 1
Leporum sanguis quomodo con crescat. 38. 30
Lepores timidi. 9. 20
Lepores superferant. 67. 30
Leuirata quo loco habeat fel. 39. 10

Libellæ fel.	19. 10	Literarium studium.	1. 20	Locustarum nomina.	4. 1
Libidinosis quidam pili celerius sefe promunt, quidam maturius desuunt.	41. 40	Liua columba.	69. 10	Locustæ moriuntur meta poly- porum.	116. 1
Librorum Aristotelis de animali bus ordo.	1. 10	Liuzæ discunt.	112. 10	Locustis data est uita diurna.	74. 30
Lienem in dextro latere inueni- re, prodigiosum est.	19. 40	Loca in mores animalium uim habent.	131. 40	Locustarum genus.	47. 30
Lien uenæ annexus est.	18. 40	Loca plurimum tenent uirium ad plantæ & animantia.	68. 20	Locutio quid sit.	59. 20
Lien quibus fit exiguus.	23. 40	Locellorum appellatio.	35. 20	Locutio hominum uaria.	60. 30
Lien quibus fit.	28. 40	Locusta.	49. 20	Loligo.	10. 40
Lien serpentibus exiguus est.	31. 1	Locustæ quo pacto sonant.	59. 30	Loligo mas à femina quid disse- rat.	75. 30
Lien elephanti.	30. 30 & 29. 40	Locusta marina caret sanguine.	10. 10	Lolligini uita est breuis.	75. 30
Lienis situs.	18. 30	Locusta mas à femina quid disse- rat.	49. 40	Lolliginum coitus.	66. 1
Lien hominis suillo similis est.	18. 30	Locustarum oculi.	50. 1	Lolligines ubi pariant.	75. 30
Lienaria uena.	34. 40	Locustarum optime sunt grauidæ.	132. 10	Lolligines piscibus uestuntur.	116. 10
Ligula.	17. 10	Locustæ unde generentur.	75. 40	Lolligines quomodo capiant ci- bos.	47. 40
Ligula linguæ pars.	14. 20	Locustarum corpus asperum est.	50. 30	Lolli quo pacto cibum capiant.	47. 40
Ligurini alimentum.	117. 40	Locustæ nare possunt.	8. 20	Lollius quid à lolligine differat.	48. 20
Ligurini uoce ualent.	142. 20	Locustæ dormiunt.	61. 1	Lolligines sunt.	135. 20
Limaces quomodo lateant.	123. 40	Locustarum genus crusta testum	11. 30	Lollius lolligine grandior.	48. 10
Limariæ ubi pariant.	68. 1	Locustarum uulua.	51. 1	Lolliorum os, cerebellū & oculi.	48. 20
Limariæ gregatim ambulant.	135. 20	Locustæ pugna solent cū serpente	137. 30	Loqui proprium hominis.	60. 20
Limariæ quoties pariant.	67. 30	Locustarum dentes & caruncula pro lingua.	50. 30	Lumbi.	15. 20
Limariarum uita.	95. 30	Locustarum pedes.	49. 30	Lumbis dolentes uix pariuntur.	112. 1
Limosæ pisces gregales.	8. 40	Locustæ quibus locis proueniāt.	74. 20	Lumbrici unde generentur.	76. 1
Limus producit testacea.	72. 20	Locustæ quando exuunt fenestra- tem.	126. 1	Lumbricorum genera.	76. 1
Lingua elephantis exigua est.	24. 10	Locustæ exuuntur crusta sua per uer.	74. 30	Lumbricorum larum quo iudicio medici inesse deprehendūt.	76. 1
Linguz color uariis est, quibus sunt uarii pili.	41. 40	Locustarum ouum.	74. 1	Lupus inimic⁹ est asino.	124. 20
Lingua uiruli marini bifida.	31. 1	Locustarum coitus.	66. 10	Lupus ceruarius.	30. 20
Lingua piscium.	28. 1	Locustarum mares minores sunt quā feminæ.	80. 30	Lupi canarij partus.	104. 40
Lingua loco echinus est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ ubi pariant.	80. 30	Luporum mores.	9. 20
Lingua suam pueri regere ne- queunt.	60. 20	Locustarum uermes.	80. 40	Lupi ceruarij partus.	104. 40
Linguz omnes quadrupedes ha- bent.	35. 20	Locustæ in fine ueris pariunt.	80. 40	Lupus piscis oua parit.	92. 1
Lingua pars sentiens.	14. 20	Locustæ quo casu pereant.	80. 40	Lupi quo pacto coeant.	64. 20
Linguz differentiz.	14. 20	Locustarum oua per hyemem du- rant.	80. 40	Lupus liquide audit.	58. 10
Lingua quali cōstet carne.	14. 20	Locustæ maiores pisces conuin- cere possunt.	116. 1	Lupi carne uestuntur tantum.	116. 20
Lingua auium uaria.	26. 40	Locustarum intestinum.	50. 40	Tupus piscis melior est cum non fert uterum.	132. 20
Linguz omnia que caro fennit.	14. 20	Locustarum cubilia & cubus.	116. 1	Lupi pisces quomodo capiuntur.	68. 1
Lingua purpuris longior digito est.	72. 20	Locustæ incestus.	116. 10	Lupi faciunt coitus tempore.	96. 20
Lingua piscium.	26. 20	Locustæ quomodo pugnent.	116. 10	Lupus perpetu⁹ ferus.	9. 10
Lingua piscium imperfecta est.	57. 20	Locustarum collegium.	116. 10	Lupi pisces quomodo capiuntur.	61. 20
Linguz loco quibusdam est pala- rum.	57. 20	Locustæ quo pacto generent.	74. 1	Lupi genitale.	22. 40
Lingua insectorum.	56. 1	Locustæ oua quādiu in utero ge- rant.	74. 1	Lupus quando pariat.	68. 10
Lingua serpentum.	30. 40			Lupi ubi cum canibus coeant.	131. 20
Linguz serpentum bifida.	31. 1			Lupus piscis bis in anno parit.	67. 10
Linguz est saporis percipere.	57. 20			Lupi Aegypti.	131. 3
Lingulaca auis.	112. 20			Luporū	

INDEX.

Luporum cibus terra etiam est .
119. 10
Lupi quando comedant herbas.
119. 10
Lupi qui hominem petat . 119. 10
Lup⁹ quor⁹ pinnas habeat . 10. 40
Luporum partus . 104. 40
Lusciniæ quando canat . 158. 40
Lusciniæ pullos suos modulos
docet . 60. 30
Lusciniæ quor⁹ oua pariat . 67. 30
Lusciniæ quandiu condatur .
67. 30
Lusciniæ cantus . 5. 10
Lusciniæ & mares & feminae ca
nunt . 60. 30
Lutea avis unde dicta sit . 141. 10
Luteæ nudus . 141. 20
Luteolæ cibus . 117. 30
Lutris . 8. 1
Lutris unde uictum quarrit .
119. 30
Lycurgus in condendis legibus
belli maiorem quam pacis ratio
nem habuit . 1. 1
Λυκουργος αὐτῶν, id est liguritus .
127. 10
Lymphari equum quid sit . 129. 20
Lynx ex uerso mingit . 22. 30
Lynx femoralium habet . 11. 40
Lynces uerſi coſeunt . 64. 10
Lyra piſcis uocalis exiſtimatur .
59. 30

M

Mæna uterum ferens me
lior est . 135. 10
Maix exuunt ſeneſcutem . 116. 1
Malida aſinorum morbus . 130. 1
Malleoli hominis . 16. 10
Malleolus pars pedum . 39. 10
Malleoli pars calcar eſt . 39. 10
Mammæ . 14. 30
Mammæ uſſa habet quaternas .
21. 10
Mammæ uarias habet animalia .
21. 10
Mammæ elephant . 25. 10
Mammæ hominis . 20. 1. & 21. 10
Mammæ quæ animalia non ha
beant . 25. 30. & 27. 10
Mammæ cameli . 21. 30
Mammæ uirorum . 106. 30
Mammæ quibus dant ſunt . 45. 30
Mammæ carent oua parientia .
45. 30
Mammæ delphini . 27. 30
Mammæ puellarum uariæ . 106. 30
Mammis declaratur ætas ad coi-

tum marura . 69. 30
Mammæ in uentre quibus . 21. 30
Mandibula maxillæ pars . 14. 20
Mantichoræ deſcriptio . 23. 20
Mantichoræ dentium ordo . 25. 20
Manus . 15. 30
Manus multis continentur ner
uis . 18. 20
Manus partes . 15. 30
Mare habet dulcem humorem .
115. 30
Mare tempore canis euerſitur .
124. 40
Mare mira habet animalia .
56. 40
Mares tempore coitus ferociunt .
96. 10
Mares à feminis ſegregantur .
97. 10
Mares dentes plures quam femi
næ habent . 25. 40
Mares magis quam feminae ha
bent has partes quas ceu arma
natura animalibus dedit . 61. 30
Mares habent ſuperiores partes
ualidiores . 60. 30
Mares longioris uitæ quam fe
minæ ſunt . 62. 20
Marinarum animalium diuiſio .
9. 20
Mariſcæ unde ſiant . 44. 40
Marta muſſela . 3. 40
Mas . 9. 40
Mas in feminæ facile mutari po
teſt . 115. 30
Maſculus in dextro latere moue
tur . 108. 10
Matrix eſt oſtium uulue . 33. 10
Matrix auiſ forma . 122. 20
Maxilla duplex . 14. 10
Maxillæ quibuſdā pilis integun
tur . 41. 40
Maxillæ oſſa . 19. 1
Maxillam inferiorē animalia o
mnia mouent , excepto crocоди
lo . 19. 1
Maxillares dentes quando ho
mini naſcantur . 24. 1
Maxillares nullum animal mutat
33. 30
Medica herba . 120. 30
Medica exinguit lac . 46. 30
Medicinæ exempla unde peti poſ
ſunt . 5. 30
Medullam ſenſu carere . 44. 10
Medullæ ratio . 45. 10
Medullæ uas oſ eſt . 45. 10
Medulla nouellorum animalium
cruenta . 45. 20

Medullæ parū ſues habent . 45. 20
Medullam leo non uel certe pa
rum habet . 45. 20
Medullam alia oſſa habent , alia
non habent . 39. 10
Mel opimum . 157. 20
Mel candidum in quibuſdā lo
cis . 79. 30
Mel autumnale melius eſt . 78. 40
Mel unde fiat . 78. 40
Mel quando ſpiſſetur . 79. 1
Mel dulcius eſt quod craſſius .
79. 1
Mella ſiccitas auget . 78. 30
μυλακησις αὐκουλῶν . 117. 40
Melcagridum oua . 84. 10
Membra animalium . 7. 10
Mēbrada aqua phalerica gignit .
94. 20
Membrana præciſa non coit .
42. 40
Membranae in animalibus . 42. 30
Membranae maximæ quæ cor &
cerebrum ueſtiunt . 42. 30
Membrana quibus ſit communis
14. 20
Membranae continentes cerebrū .
16. 30
Membrana uolantes . 11. 1
Menſiū proſuuiæ lunæ curſum
ſequuntur . 107. 1
Menſtrua quæ difficilius ſuant .
107. 1
Menſtrua quæ nō habeant . 107. 20
Menſtrua in quas res abſumuntur .
107. 20
Menſtrua quando primum appa
reant . 106. 1
Menſtrua alba ex qua cauſa pro
ueniant . 106. 1
Menſtrua alba extenuant corpus
106. 1
Menſtrua ſiunt in mulieribus .
45. 1
Menſtrua quando deſiſtūt . 110. 10
Menſtruorum purgatio nulli fe
minæ inter animalia æque ſit ac
mulieri . 97. 20
Menſtruorum ſignum & in ou
ibus . 97. 20
Menſtrua etiā prægnantibus uſq
in poſtremum gerendi tempus
euenire . 107. 10
Mentum maxillæ pars . 14. 10
Mergi . 8. 1
Mergus ubi uiſitetur . 118. 20
Mergi quor⁹ oua pariant . 67. 20
Mergus ubi pariat . 8. 1
Merops ubi pariat ſuæ prole 84. 1

I N D E X.

Meropis pietas. 5.10. & 141.10	Monedularū genera tria. 143.30	Mulier ut non concipiat, quomodo faciendum. 107.40
Meropis descriptio. 141.20	Monnfringilla aus. 117.40	Mulieris conceptus indicium. 107.40
Merula bis anno parit. 69.1	Mora profunt subus. 128.20	
Merulū pīces mutantur. 112.20	Mordellæ ex vermiculis nascuntur. 77.10	Mulieribus quid eueniat à conceptione ad partum usq. 108.30
Merula turturem amat. 115.1	Mores uariant iuxta diuersitatem locorum. 131.40	Mulieris quo tempore pariant. 109.1
Merula later. 125.10	Morum in animalibus uestigia. 113.30	Mulieribus grauidis deficiunt piluli congenini. 109.1
Merulū nidus. 141.20	Mormur quando pariat. 95.20	Mulierum in partu dolores uerhemennissimi. 112.1
Merula mura colore. 118.40	Morphna aquila cuius Homerus meminit. 145.1	Mulier apta ad concipiendum. 107.40
Merularum genera duo. 142.40	Morus animalium. 11.20. & 20.30	Mulier in tetra Caria quid eueniat. 41.20
Metachocorum uocāt forum in uero laetum. 98.1	Muco quandiu uterum ferat. 95.10	Mulieris uehemennius in partu laborant quā alia animalia. 112.1
Milio sus pinguis fit. 120.1	Mucones quando pariant. 68.20	Mulieris quæ facilius pariant. 112.10
Milius paucos dies later. 125.10	Mugilis carne abstinet. 116.20	Mulierum granidarum morbi. 108.30
Milius ubi fel habet. 29.20	Mugilis appendices. 31.20	Mulieris impubes. 106.20
Milius pugnat cū coruo. 114.10	Mugilis melior est cum non fert uterum. 112.20	Mulier non crescit post tertium partum. 106.10
Milus exiguus lien. 28.40	Mugilis in litore uersatur. 122.40	Mulier æstiuo tempore magis ad coitum stimulat. 67.1
Milui carnuiori sunt. 117.20	Mugilis quando pariat. 68.10	Mulier etiam aliquando super se tauit. 109.40
Milui quō secedant. 125.1	Mugiles quosdam limo nasci. 68.20	Mulieris mores. 113.10
Miluum bibere rarum est. 113.20	Mugiles ubi pariant. 68.1	Mulier quorū annos generare possit. 70.30
Mili tempus excubandi. 88.10	Mugilibus quot sine pinna. 17.20	Mulieris membrum genitale. 15.10
Minli. 52.10	Mugiles qua ratione capiuntur. 65.30	Mulieret quot pariant. 109.30
Minlis qualia sint labra. 52.20	Mugilis piscis oua parit. 92.1	Mulier grauida urum patitur. 109.40
Minli etiam solent fauiscare. 72.20	Mugiles uiuunt abscissa cauda. 125.20	Mulieres uaria concupiscunt urum ferentes. 109.1
Minlis innasci cancos. 72.30	Mugilis liquidius inter pisces audit. 58.10	Mulier calua unam habet futuram. 12.30
Molaris piscis partus. 95.20	Mugilis partus. 95.20	Muliones culices sentiunt. 58.30
Moliceps aus. 141.10	Mugiles quos pariant. 67.30	Mullus parit autumno. 95.20
Mollum differentia est in sexu. 61.40	Mugiles de mari in lac⁹ ascendunt. 93.30	Mulli appendices. 31.10
Mollia quæ uocant, sensibus omnibus prædita sunt. 58.30	Mugiles dormientes capiuntur. 61.20	Mulli gregales sunt. 115.20
Mollia quando pariant. 68.30	Mugiles sponte nascentes. 91.40	Mullus piscis ter parit. 67.30
Mollia quomodo dormiant. 61.1 & 20	Mula aliquando gemellos peperit. 100.20	Mullorum cibis. 116.20
Mollia ouum concipiunt. 74.40	Mulæ in Syria. 12.1	Mullus litoralis est. 122.40
Mollium partes. 47.40	Mulam quoq. grauidam faciam esse. 102.10	Murena quomodo repar. 10.40
Mollia quæ uocāt, humorē propter cibum petunt. 115.10	Mulæ in Syria pariunt omnes. 102.10	Murenæ tel. 29.10
Mollia grauida optima sunt. 132.10	Mulæ non menses, sed crassiorē urinam habent. 92.30	Murenæ carnem comedunt, præterea nihil. 116.20
Mollium genera ubi grandiora reddantur. 11.10	Muli ubi. 21.30	Murenæ partim in litore, partim in alto uersantur. 122.40
Mollia quo pacto coeant. 66.1	Muli coitus. 102.10	Murenæ non habent pinna. 27.20
Mollia naturalem sonum non edunt. 59.30	Mulus quandiu lactet. 101.1	Murenarum branchiæ. 17.20
Mollum ouum quomodo crescat. 74.1	Mulus quando sit in uigore. 101.1	Murena later. 114.20
Mollia effundunt ramentū metu perculā. 48.30	Muli uilli. 20.40	Mucens
Mollia omnia habent quedā capillamenta. 48.30	Mulus semper cicur. 9.10	
Mollium differentia. 48.10	Mulo fel non est. 29.1	
Mollia non habent uiscera. 48.30	Mulorum uita longa est. 102.20	
Mollia quæ uocet. 47.30		
Monedulæ ingluuiet. 11.30		
Monedulæ pisces semel in anno pariant. 67.30		
Monedulæ pisces quādo opam. 119.20		

INDEX.

Murenæ coitus. 64.40
Murena omnibus anni temporibus parit. 67.40
Murenæ ouum. 40.30
Murena aquanlis q loco pariat oua. 81.1
Mus domicilium sibi parat. 9.1
Mures potu moriuntur. 111.10
Mures ponici latent. 115.30
Mures Arabiæ. 111.10
Muris aquanlis lien. 114.40
Murus à murena differt. 68.1
Mures aquanles. 114.40
Murium nonnullis deest fel. 119.10
Murium mira fecunditas. 105.10
Mures uasant segetes. 105.30
Mures citò abolerunt. 105.20
Murem in mure gravidâ inuentâ 105.30
Mures si salem lambant, imple-
tur. 105.30
Mures Aegyptij. 105.30
Mures bipedes. 105.30
Murium plura genera. 105.30
Mure coitus diu durat. 66.30
Mustax quibusdam pilis obduci-
tur. 41.40
Mustæ uolando sonant. 59.30
Mustæ unde oriuntur. 77.1
Mustis binæ pennæ. 56.10
Mustulus piscis pilos in ore loco
dentium habet. 43.30
Mustulus coitu gignuntur uer-
miculi. 61.40
Mustæ quâdo generentur. 67.30
Musta sibi domum facit. 9.1
Mustarum gustus. 111.30
Mustæ quomodo pungant. 56.10
Musta anteriore parte aculeum
gerit. 11.10
Mustela odit cornicem. 114.10
Mustela quo pacto aues capiat. 117.30
Mustela serpentes impugnat. 117.30
Mustelorum partus. 67.40
Mustelæ genitale. 114.40
Mustela dimicatura cum serpen-
te rutam comedit. 117.30
Mustelorum omne genus ex car-
tilagineis. 65.10
Mustelæ nomen. 4.1
Musteli nebris. 90.1
Mustelo sunt branchiæ detectæ. 10.20
Mustelæ rusticæ genitale. 114.40
Musteli stellares bis mense pariunt
90.40
Musteli leues quibus locis oua in

se contineant. 90.10
Musteligenis quales branchiæ. 17.40
Mustæ unde dicatur. 48.30

N

Nandi uim habentia. 8.20
Nares ut homo simia ha-
bet. 14.30
Nares gressiliû, quæ animal gi-
gnunt, cartilagine constant. 119.40
Nares mobiles sunt. 14.10
Naris elephantis. 14.10. & 10.1
Narium foramina. 17.10
Nasus pars faciei. 14.1
Nasus spiritus instrumentum. 14.1
Nasi interseptum. 14.10
Nasi inane. 14.10
Nates. 14.40
Nates hominis. 11.30
Natex qualis sit. 54.1
Nateis pastio. 54.1
Nateis saxis adherescunt. 54.10
Nateum quem uocemus. 54.1
Nateis ubi nascantur. 71.30
Nateis qua industria capiuntur. 59.10
Natrix. 8.1
Naturæ opera. 4.30
Naturæ ingenium ubi contem-
plandum. 4.40
Necydalus unde fiat. 76.20
Nerui natura fistilis est. 118.10
Neruorum alimentum quale sit. 18.20
Nerui incisus solidari non po-
test. 118.20
Nerui plurimi in pedibus, mani-
bus & scapulis sunt. 118.20
Neruos omnia habent, quibus
sanguis est. 118.20
Nerui animalibus communes. 14.20
Neruorum rigore capiuntur equi. 119.10
Nerui piscium. 118.20
Nerui prætenues quibus sint. 118.20
Nerui quomodo per totum cor-
pus diducti. 118.10
Neruorum summæ partes. 118.10
Neruorum originem in corde ef-
se. 118.1
Nigri fetus unde generentur. 98.10
Nigrum oculorû in animalibus
uariat. 11.10
Nigæ uermes creantur. 77.10

Nius alumnus infectorum ge-
nus. 77.30
Nobile quod sit. 9.10
Noctua. 146.1
Noctua ambulans. 9.1
Noctua noctu uagatur. 9.1
Noctus appendices. 114.40
Noctus exiguus est lien. 118.40
Noctua bellum habet cû orchilo. 114.1
Nocturæ gula. 11.10
Noctua quomodo capias. 112.30
Noctus speciem gerentes conui-
uent etiam superiori palpebra. 116.40
Noctua auis aduncis unguibus. 117.30
Noctua non diu abscondit. 115.10
Nomina olim septimo die im-
posita infantibus sunt. 119.30
Numa Pompilius pacis studiosus
fuit. 1.10
Nutricibus quæ obfint. 111.10
Nymphæ appellantur insecta, cû
uermes incipiunt formari. 76.10

O

Obstetricis officium. 112.10
Occiput. 116.40
Occiput quæ capitis pars sit. 112.10
Occiput uacuum esse. 112.30
Oculus, id est subigit. 118.10
Oculata quid comedat. 116.30
Oculi crusta interiorum. 112.30
Oculorum uariis color. 11.10
Oculi sapiarum primum gran-
des. 75.10
Oculi habent neruosos meatus
ad cerebrum. 57.10
Oculi in cerebrum finiunt. 11.30
Oculos habent omnia animalia,
præter testa insecta & imperfecta. 11.1
Oculi hirundinum. 11.10
Oculi chamaeleontis. 114.40
Oculi auium sine cilij. 116.30
Oculi hois quantum distent. 116.20
Oculi nigrum quod dicatur. 11.1
Oculi candidum. 11.1
Oculorum anguli. 11.1
Oculorum in animalibus uarie-
tas. 11.10
Oculorû in homine situs. 11.40
Oculi cæsi sunt equis quibusdam
11.20
Oculi modici peroprimi. 11.20
Oculorum situs. 11.20
Oculi conditi clarissime cernunt.
11.20

INDEX.

Oculi qui modice conuulsi sunt, optimos fubeſce mores demonſtrant. 11. 30
Oculi rigidi impudentiam ſignificant. 13. 20
Oculi nimium conuulſentes, impudentiæ indices ſunt. 13. 30
Oculi ſoli homini uarij. 13. 30
Odorandi mentus auium. 26. 30
Olea opimat oues. 121. 10
Oleaſter opimat pecus. 131. 10
Olee flore apes prouenire. 78. 1
Oleas amant cicadæ. 81. 10
Olera iuuantur pluuiâ. 126. 30
Olfactus fedes. 57. 20
Olfactus unde adminiſtratur. 14. 10
Olfactus piſcium. 57. 30
Olfactus piſcium argumenta. 58. 10
Oliuæ copia ſimul & apum quaerit. 78. 30
Ololyginem æduntranæ. 60. 1
Olor aquas amat. 118. 20
Olor repugnat aquilæ. 134. 40
Olor alter alteri deuorat. 134. 40
Oloris mores. 140. 40
Olores canunt morituri. 140. 40
Oloris appendices. 31. 40
Olores gregales ſunt. 8. 40
& 132. 30
Omali deſcriptio. 30. 10
Omentum. 17. 10
Omenti pinguedo. 43. 30
Omentum quibus fit. 42. 40
Omenti origo. 42. 40
ὅπως ἴσχυται quomodo tranſſule rit. 71. 40
Orcinæ ubi pariant. 68. 1
ὀρίων opus cunilam eſſe. 137. 20
Origanum puluere formicæ fugantur. 58. 40
Orſodagnæ ubi creentur. 77. 10
Oryx unicornis & biſulcus. 11. 40
Os quod fit. 14. 10
Os hominis. 24. 10
Os quid diſſerat à cartilagine. 19. 40
Os præſiſum non reſcit. 19. 40
Os quam partem uocet. 9. 40
Os quibus fit commune. 34. 30
Oris magnitudo in animalibus. 24. 10
Os reſciſſum quib* animalibus fit. 24. 30
Oſſium extrema nonnulla conſtant cartilagine. 19. 40
Oſſa neruus ligantur. 18. 10
Oſ calæ. 58. 40

Oſſa leonis videntur nullā omni
no habere medullam. 39.30
Oſſa leonis in primis ſolida ſunt.
39.30
Oſſa auiū inter ſe differunt. 39.30
Oſſa qua ranone cohaereant. 38.30
Oſſa capini quō ſint. 39.10
Oſſium minimum ſpina eſt. 38.40
Oſſa ſuis membranis nudata ſy-
derantur. 42.40
Oſſium quædam medullam ha-
bent, quædā non. 39.10. & 46.20
Oſſa non multum diuerſa que
habeant. 39.10
Oſſa humerorum. 39.20
Oſſa fragilia ſunt. 40.10
Oſſifraga. 146.10
Oſſifragæ magnitudo, eiufq̃ ci-
bus. 117.70
Oſſifragæ benignitas. 5.10
Oſſilem quendam polypum ap-
pellant. 49.10
Oſphyſ. 14.40
Oſtreæ. 8.1. & 47.10. & 51.10
Oſtreę ſe nequeunt mouere. 8.30
Oſtreę ubi origo ſit. 72.30
Oſtreę ſcabræ ſunt. 52.30
Oſtreis innafcuntur cancri. 72.30
Oſtreum genus. 31.30
Oſtreis qualia ſint labra. 52.30
Oſtrearium genus omne opti-
mum eſt, cum ſert uterum. 132.10
Onus qualiſ auiſ. 123.30
Ouum quale primum ſit. 84.30
Oua bicolora teſtudinis ſunt.
82.40
Ouum mollium quale ſit. 74.40
Oua hypenemia humidiора ſunt
84.30
Oua que generent. 10.30
Oua quædam etiam inſecunda
coitu concepta. 87.10
Oua gemina binis conſtant ul-
tellis. 87.10
Oua quædam binos pullos ædūt
87.10
Ouum omnium auium durum
haber putamen. 84.30
Oua aquaticarum differunt à ter-
reſtribus. 84.10
Ouorum color. 84.10
Oua oblonga feminam ædunt.
84.20
Oua rotundiora marem ædunt.
84.20
Oua in Aegypto ſimo obruta æ-
dunt pullos. 84.30
Oui pidiū color. 89.30

Oua quo pacto reddantur forci-
da. 81. 10
Oua nitelli & albuminis discri-
men. 81. 10
Oua piscium. 91. 1
Oua parientia sanguinem enam
habent. 15. 10
Oua in repidis uasis sponte ad-
derunt pullos. 84. 30
Oua quædam uento concipiunt.
64. 30
Quorum differentie. 10. 30
Quorum crocodili quantum sit.
83. 10
Oua parientium quadrupedum
coitus. 64. 30
Oua locustarum. 74. 1
Oua echinorum. 14. 30
Quorum in piscicola. 89. 40
Oua piscium magna parte pe-
reunt. 91. 10
Oua quæ pariunt omnia, cortice
mununtur. 11. 30
Oua parientia incertum an fo-
mnicent. 60. 40
Quum urinum. 87. 30
Quum polyptiquale sit. 74. 40
Quipara quæ uocer. 11. 30
Quiparis omnibus æt æteria &
gula, sed uariè. 15. 30
Quium mamma. 22. 10
Quies stultæ. 115. 40
Quis ex poru pinguefit. 122. 1
Quibus sal dandum. 122. 1
Quies quid edant. 121. 1
Quis bibita quadâ aqua nigros
agnos generant. 43. 10
Quium coitus. 70. 10 & 98. 10
Quium urina. 11. 30
Quillâ lac accommodâ ad casu.
46. 10
Quibus fabæ augent copiam la-
ctis. 46. 40
Quies pauciores pariunt quæ iu-
niores sunt. 70. 40
Quies pinguedine renum mori-
untur. 43. 40
Quies quot annos parere possint
70. 30
Quium pes. 21. 30
Quibus uox propria ad coitum.
60. 10
Quies seniores si tempestiue libi-
dine incitantur, quid significet.
98. 30
Quium iuniorum libido tempe-
stua quid significet. 98. 30
Quies fornicare. 60. 40
Quis iura quæ concrefant. 42. 30

I N D E X.

Oues qua causa geminos parit. 98.10
Oues magnæ in Epiro. 46.30
Oues quæ sint frigoris patientiores. 121.10
Oues quot menses uterum ferat. 98.10
Ouis cerebrum non est pingue. 43.40
Oues latissima cauda. 130.40
Oues cõgregantur facto strepitu. 136.1
Ouis abortum facit ob tonitrua. 136.1
Oues quomodo cubent. 136.1
Ouibz diu durat lac. 46.40
Oues grauidæ abortum faciunt, si glandem copiosius edierint. 118.40
Oues pinguescunt gerentes uterum. 97.40
Ouium sanguis quo pacto spissetur. 138.30
Ouium uiræ longitudo. 98.10
Ouium duces. 98.10
Oues Aethiopicæ longioris sunt uiræ. 98.20
Oues rediuos habent. 81.1

P

PAbulorum diuersitas. 46.30
Pace nihil melius. 1.10
Paguri cancri. 49.20
Palatum pars oris. 14.10
Palatum carnosum quibusdā pro lingua est. 57.10
Palea opimat pecus. 121.10
παλαιοσπον, id est alleclatrics. 138.30
Palpebræ oculorum. 11.1
Palpebræ non possunt coalescere. 11.1
Palumbarius accipiter. 117.20
Palumbes. 69.10
Palubes hyeme nō gemit. 139.10
Palumbes camporū incolæ sunt. 9.10
Palubes trimestres coeunt. 87.30
Palumbium uita. 87.30
Palumbium incubitus. 89.1
Palumborum quidam latent, quidam non. 125.10
Palumbium cibus. 118.1
Palumbi iuguiues. 11.20
Palumbes bina qua pariūt. 81.40
Palumbes discunt. 123.10
Palustrum o uia pallida. 84.10
Pamphila, Planis filia dicitur prima rexisse bombycia. 76.30

Panthera qua ratio uenit. 137.20
Pantheræ odore bellæ delectantur. 137.20
Pantheræ pes. 21.30
Pantheræ ubi sint. 131.20
Panthera perpetuò fera. 9.10
Pantheræ dentes sunt serrati. 21.30
Pantheræ mammae. 21.20
Panthera femina animosior mare. 133.10
Pantheræ remedium. 137.10
Papauer quid uocet in testa intestus. 57.1
Papauerculum uocant mulieres excrementum infantis primum. 118.30
Papilion antennæ ante oculos pretenduntur. 56.20
Papilla. 14.30
Papiliones ex crucis nascuntur. 76.1
Papilionum genus quoddā qualem producat partum. 75.40
Papillæ simiæ. 24.40
Papillæ non sunt conspicuæ delphinorum. 27.20
Papillæ quaternæ uaccis sunt. 22.10
Pardalichianus uenenum. 117.10
Pardales qualis sit auis. 141.30
Pari auis cibus. 117.30
Pariendi tempus hominis. 109.20
Parus multa ædit oia. 142.1
Pascua ad carnis bonitatē faciūt. 121.10
Passeres pisces quoties pariant. 67.30
Passeres mares diutius uno anno non posse durare. 138.30
Passerum uentriculus. 31.30
Passerum genus piscium. 63.20
Passeris cibus. 117.30
Passeris sel. 29.20
Pastinaca prolem non potest recipere. 90.20
Pastinaca pinnis caret. 10.40
Pastinaca quomodo uenit. 147.10
Pastinacæ coitus. 64.30. & 65.1
Patellæ. 52.10
Patellæ ostium excrementi. 51.30
Patellæ ubi nascantur. 72.30
Patella mouetur. 52.30
Patellæ uagantur. 73.10
Patellæ ubi habet papauer. 57.20
Patellæ absoluantur ut quantant cibum. 115.40
Patellam aurem marinam appellant quidam. 51.30
Pauoues sæpe infœcunda oia pariunt. 84.40

Pauonum mores. 9.30
Pauo quot dies incubet. 89.10
Pauo quot quotiesq; pariat. 89.10
Pauones quo tempore coeant. 89.10
Pauonum oia gallinis subsiciuntur. 89.10
Pauonis superbia. 5.10
Pauonis uita. 89.10
Pectines. 52.20. & 59.10
Pectines strident. 59.40
Pectines locis arenosis nascuntur. 72.20
Pectines quomodo lateant. 123.40
Pectines cum uterum ferunt, meliores sunt. 132.10
Pectines citò crescunt. 72.30
Pectus. 15.20
Pectus animalium. 20.1
Pectus costis est impositum. 39.1
Pectoris sinus. 14.30
Pectuncululi. 52.10
Pectuncululi quosdam cæcos nasci. 72.30
Pedatim incedere. 20.30
Phalangia unde procreet. 75.40
Pedeſtrum animalium diuisio. 8.20
Pedes cancorum. 49.10
Pedum fissura multiplex. 31.30
Pedes carnosius quibus. 21.30
Pedis partes. 15.40
Pedis ossa. 39.10
Pedes multis cõninentur neruis. 38.20
Pedes solidos habentes. 21.30
Pedes chamæleonis. 25.40
Pedes plures quam quatuor habentia. 10.30
Pedes bisulci. 21.30
Pedes quæ animalia habeant. 10.30
Pedes duos habentia. 10.30
Pedes quaternos habentia. 10.30
Pedum in finis officium. 24.40
Pediculi qua causa largius proueniunt. 82.10
Pediculos procreat uestis ex ouium pelibus facta. 121.20
Pediculis etiam aues infestantur. 82.1
Pediculus piscis circa delphinum. 82.10
Pediculi carnis humore aluntur. 81.40
Pediculi unde nascuntur. 81.40
Pediculorum coiru lentes procreantur. 64.40. & 81.40
Pediculis uexantur pisces. 61.30 & 82.10

I N D E X.

Pedculi genus ferum uocatum.	Phalangij quo pacto pariant.	Pili pubis indicant ætatem maru- ram ad costum.
82.1	80.10	69.30
Pedculi magis pueros infestant.	Phalagij partus numerosus est.	Pilorum mutatio unde fiat.
82.1	80.30	40.30
Pediculos fœminæ magis sentiunt.	Phalangij proles matrem occidit.	Pili duri in regione calida sunt.
82.1	80.30	40.30
Pedculi genus marinum quale sit.	Phalangia fœmina maior quàm mas.	Pili molles in regione frigida cre- sunt.
81.10	61.10	40.30
Pelagius lollius.	Phalaris aquas adamat.	Pilorum natura qualis sit.
43.30	118.30	40.40
Pellæ coitus difficilis est.	Phalerica apua.	Pili fissiles sunt omnes.
114.30	94.30	40.40
Penelope desiderat aquas.	Phasianæ pediculis uexant.	Pili caui sunt uirgine.
118.30	81.1	41.10
Penis propria pars maris	Phasianorum oua.	Pili palpebrarum desuunt rebus ueneris.
15.1	84.10	41.30
Penna apum renasci non potest.	Pherecydes Syrius quo morbo pe- rierit.	Pili euiusq; subnasci in quibus pos- sunt.
41.30	81.40	41.30
Penna uolantes.	Philosophandi in naturalibus or- do & ratio.	Pili in sua radice lentorem habent.
10.40	4.30	41.40
Pennis habentes aues uocamus.	Phocææ partus.	Pili uerticillares quibus sunt, ha- bent euiusmodi curæ.
11.1	91.10	41.40
Pennis uolantium pedes.	Phocenam etiam Pontus habet.	Pilos quæ habent, animal gignit.
11.1	113.10	11.40
Pennis auium frigore mutantur.	Phœnice fert cancores miræ uelo- citatibus.	Pili cani quibusdam redditæ ex æ- gritudine.
41.10	49.30	41.10
Pennis caule constant.	Phœci peculiare est, ut oculos ap- petat.	Pili ocyus cani sunt operati.
36.40	142.30	41.10
Pennis quedam auium mutant.	Pholis quomodo se tuat.	Pilorum color mutatur in senes- centia.
42.10	148.1	41.1
Pennis quibus crusta cõtreguntur.	Phoxini admodum parui adhiuc oua habent.	Pili à qua parte primùm candes- cant.
11.1	91.10	41.1
Pennis quaternas habentia.	Phoxini ubi pariant.	Pili in morbis quibusdam crescunt
11.1	91.1	1.70
Pennis præfectæ non possunt re- parari ut pili.	Phrygius cascus.	Pili cogeniti libidinosius celerius desuunt.
41.10	46.10	41.40
Pennis quæ integuntur, quales ha- beant audiendi meaus.	Phycos appellant purgamentum maris Pontici.	Pili qui in homine primùm na- scuntur.
11.40	92.30	41.10
Pennis appendices.	Picare quid dicatur.	Pili capitis primi per ætatem de- fluunt.
31.30	108.30	41.30
Pennis brachia.	Picæ nidus.	Pili animalibus cõmunes.
27.40	141.30	34.30
Pennis ubi pariant.	Pica uocem mutat sæpe.	Pilos non omnia habent.
92.1	141.10	11.30
Pennis conductur.	Picus martius.	Pilosa quæ sint.
124.30	118.1	30.40
Pennis ingluuias.	Picus martius cur tandat arbo- res.	Pilulario pennæ uagita inclusæ
31.30	139.40	55.40
Perdix pulueratrix est.	Pici genera.	Pinguescunt serè melius fame præ- surgata.
159.30	139.40	120.1
Perdices ubi pariant.	Picus martius in arbore nidos fa- cit.	Pinguescunt quibus est paruus uen- ter.
89.40	139.40	41.30
Perdices uox ante pugnam.	Pigargus.	Pinguescunt ætate prouecta po- tius quàm uouella.
60.10	144.40	44.1
Perdices appendices.	Pigmæ.	Pinnæ pinnotheræ.
31.40	131.40	72.30
Perdices uox.	Πικρίς & idē esse quod agrestis lactuca.	Pinnæ erectæ quo loco quoque pacto proueniant.
60.30	137.30	72.30
Perdices qua ratione incubent.	Pilare malum in mammis mulie- rum.	Pinnæ an pliat, an animalia sine dubitatur.
89.1	111.10	140.1
Perdices libido.	Pili præcisi nō ab incisura augen- tur, sed ab radice.	Pinna auriculæ pars superior.
9.10. & 89.1	41.1	13.30
Perdices asilum concipiunt.	Pili proportionalia quæ dicun- tur.	Pinnæ se non mouent.
65.40	40.30	52.30
Perdices uoce manum concipi- unt.	Pilos qui habeant.	Pinnæ sedem non mutant.
65.40	40.30	72.40
Perdices uolatu mariū utero in- grauescunt.	Pili hominis.	Pinnas binas quæ habeant.
61.40	10.40	10.
Perdices coitus.	Pilorum discrimina.	
64.40	40.30	
Perdix quomodo cõcipiat.	Pili duriore proueniunt ex cute duriore.	
31.30	40.30	
Perdices olfactus.	Pili lepore sunt in bucca, etiam & resupina pedum parte.	
85.30	42.10	
Perdices ultra.	Pili herinaceorum.	
87.30	40.40	
Perdices suos pullos resonat ut gallinæ.	Pili in mento mulierum non na- suntur.	
139.1	41.30	
Perdix ingeniosa est.		
139.1		
Phager piscis frigore lædit.		
126.40		
Phalangæ coitus.		
66.40		
Phalangia diu in ediam pferat.		
119.8		

Pinnis que utantur, 10. 30
 Pinnothera qua ratione pisces ca-
 piat, 77. 10
 Pinnothera qualis sit, ubiſq; naſca-
 tur, 73. 10
 Pipo cum lutea cerrat, 114. 1
 Pipo uenatu culicum uiuit, 118. 1
 Piro pinguetudine ſues, 120. 1
 Piſcatores quid caueant, 57. 40
 Piſcatores quomodo capiant pi-
 ſces, 61. 10. & 65. 30
 Piſcatores quid obſeruent in liro
 re in alto piſcaturi, 74. 30
 Piſces ſei habent, 39. 10
 Piſces olfaciunt, 57. 30
 Piſces quo tempore oprimi ſint, 113. 10
 Piſcibus ferme omnibus gula de-
 eſt, 39. 40
 Piſcium cor, 39. 30
 Piſces mares turgidos habet me-
 anus genitali ſemine, 90. 30
 Piſcium coitus, 65. 1
 Piſces nidorem ſanguinis fugiunt, 58. 20
 Piſcium appendices, 31. 10
 Piſces ſeruatam deuorant, 116. 10
 Piſcium generale uirus, 45. 30
 Piſcibus os eſt reſciſſum, 18. 1
 Piſcium oculi, 18. 1
 Piſces nare poſſunt, 8. 30
 Piſcium ouiparorum coitus raro
 cernitur, 65. 40
 Piſcium diſcrimen loca faciunt, 68. 10
 Piſcium lingua, 35. 30. & 35. 1.
 & 57. 10
 Piſcium meatus in quibus conti-
 neant ſemen, 65. 30
 Piſcium oua etiam ſine mare con-
 cepta ſecunda ſunt, 65. 30
 Piſcibus extenuatis ſquamæ du-
 riores efficiuntur, 45. 1
 Piſces quot non ſe moueant, 11. 1
 Piſcibus præcidit uenter in os, 30. 1 & 115. 30
 Piſces quare dormientes non fa-
 cile capiuntur, 61. 1
 Piſces pulcibus uexantur, 61. 1
 Piſces inſeſtant pediculi, 82. 10
 Piſcium nerui, 38. 20
 Piſces nonnulli animal gignunt, 11. 40
 Piſces quibusdam cibo ſunt, 9. 1
 Piſces capiendi ratio, 57. 40
 & 127. 40
 Piſces multi ſemel pariunt, 67. 30
 Piſcium oculi primum apparent, 99. 10

Piſces quibus ab alijs animalibus
 diſferant, 17. 40
 Piſces plurimi ſquamofi, 17. 40
 Piſces pauci ſcabri, 17. 40
 Piſces quo tempore maxime ca-
 piantur, 117. 30
 Piſcibus uulgaris peſtis non uide-
 tur accidere, 127. 30
 Piſcium oua parientium coitus, 65. 30
 Piſces uorant maris ſemen proli-
 ficum, 65. 30
 Piſces mares oua ſeminarum uo-
 rant, 65. 30
 Piſces ſunt ſanguinis participes, 18. 1
 Piſces quid diſferant quod ad par-
 tum attinet, 18. 1
 Piſces qui oua pariant, 18. 1
 Piſces qui gignant animal, 18. 1
 Piſcium oſia, 19. 30
 Piſcium peculiare ſpinulæ p car-
 nem paſſim, 39. 30
 Piſcium gen^a numero ſum, 17. 10
 Piſcium pars ſupina, 17. 10
 Piſcium cauda, 17. 30
 Piſcium partes, 17. 10
 Piſcium ouum unicolor eſt, 89. 30
 Piſcium generatio in ouo quid diſ-
 ferat ab auum, 89. 10
 Piſces optimi quibus in locis, 116. 10
 Piſces inſeſtantur frigore, 116. 40
 Piſcis qua ratione in ouo augea-
 tur, 89. 30
 Piſcium uulæ figura unde pe-
 tenda, 89. 40
 Piſces quod animal, quibus ouum
 generant, 89. 30
 Piſces ſuaues ſunt cū lætè, 124. 30
 Piſcibus uermes innaſcunt, 95. 10
 Piſcium diuerſa pariendi tempo-
 ra, 95. 10
 Piſces quidam dentes in lingua
 habent, 18. 1
 Piſcium ſemen genitale, 31. 30
 Piſces quid loco teſtium habeat, 31. 30
 Piſces non habent teſtes, 31. 10
 Piſcium conceptus magna ex par-
 te uere agitur, 68. 30
 Piſces etiam loca ut aues mutant, 122. 1
 Piſcium ſenectutis ſigna, 122. 30
 Piſces uerbaſco herba moriunt, 127. 40
 Piſcium greges duces habet, 121. 1
 Piſces branchias habent, 17. 30
 Piſces qui optimi ſint poſt partum, 122. 30

Piſcibus odorandi meatus nulli
 conſpicui, 18. 1
 Piſcibus imbres cõducunt, 126. 10
 Piſcibus in eſt materia ex qua glu-
 tinum concoquitur, 41. 1
 Piſcium ouum quomodo creſcat, 74. 1
 Piſcium magna ex parte pinnæ
 quaternæ ſunt, 17. 30
 Piſcium longorum pinnæ, 17. 30
 Piſces gregales, 8. 40. & 115. 30
 Piſces fornices deuorant inſir-
 miores, 115. 30
 Piſces quibus meſib^a pariant, 68. 10
 Piſcium auditus, 57. 30
 Piſcium oua quæ diſſipentur, 91. 30
 Piſcium ſemina maiores euadunt
 quam mares, 61. 30
 Piſces humore uiuunt, 8. 1
 Piſces cur iuxta liroa pariant, 92. 30
 Piſces in Ponto circa Thermo-
 doontem amnem plurimi pa-
 riant, 91. 30
 Piſcium ſomni argumenta, 61. 10
 Piſcium lacuſtrum partus, 91. 40
 Piſcium ouorum multitud, 91. 10
 Piſces qui generant animal, 91. 1
 Piſcium genera multa latent qui-
 buſdam temporibus, 124. 10
 Piſcium uulæ 30. 40. & 115. 30. & 89.
 Piſces enī ſenectute uiciant, 120
 132. 30
 Piſces ouum generantes, 40. 30
 Piſcium ſebum, 43. 30
 Piſces carent pulmone, 18. 40
 Piſces celeriter creſcunt, 95. 40
 Piſcium dentes, 31. 30. & 17. 40
 Piſces pauciſſimi læues, 17. 40
 Piſces pelagi, 122. 40
 Piſces mammæ nō habent, 17. 10
 & 45. 30
 Piſcium ſemina uiuaciores, 62. 30
 Piſces non habent reſtes, 29. 30
 Piſcium captura quando fiat, 124. 40
 Piſcium maris & ſemina genita-
 lia diſferentia, 90. 40
 Piſcium coniugia aguntur, 95. 1
 & 115. 30
 Piſcium greges conſiſtunt, 95. 1
 Piſcium ſitus in utero, 112. 30
 Piſces nocte paſcere ſolent, 117. 30
 Piſcium in ſexu diſcrimen, 62. 1
 & 92. 1
 Piſces in aqua exigua uiuere non
 poſſunt, 117. 10
 Piſcibus plerique ſei in teſtino an-
 nexum eſt, 129. 10

INDEX,

Pisces quidam nec mares nec foeminae sunt. 63.30
 Pisces dormiunt. 61.1
 Pisces cito crescunt. 68.1
 Pisces saxatiles bis pariunt. 67.10
 Pisces habent sensum gustus. 57.20
 Piscibus quae esca sit grata. 57.20
 Piscium naturam regiones mutant. 95.40
 Piscis uariis delectantur escis. 58.10
 Piscibus apta loca. 117.1
 Pisces qui mutantur. 112.20
 Piscium saxatiliu cibis. 116.40
 Pisces qui squamis reguntur, oua pariunt. 91.1
 Pisces saxatiles conduntur. 114.20
 Piscium genera ex limo etiam produciuntur. 93.48
 Pisces uocis expertes sunt. 129.30
 Pituita communis animalibus. 14.20
 Planta. 15.40
 Planta non causa uersutum ingenium significat. 16.1
 Plantarum munus. 114.10
 Plantae mutant colorem. 111.40
 Plantea gregalis est. 112.30
 Plinij libros deprauatissimos fuisse. 2.30
 Podagra equos uexat. 119.10
 Podagra equorum signum. 119.10
 Podagra canum. 112.40
 Podagra bubus quid noceat. 119.1
 Podex. 10.1
 Pollex. 15.30
 Polybij de uenis sententia. 35.20
 Polypus. 10.40
 Polypum quandam nauem uocant. 49.10. & 148.40
 Polypti quo pacto coeant. 66.1
 Polypti comedunt locustas. 116.1
 Polyporum genera multa. 49.1
 Polypus quando pariat coetate. 68.30
 Polypti ouum. 48.40. & 68.30 & 74.40
 Polypus animal forficundum est. 68.40
 Polypus mas quid differat a foemina. 68.40
 Polyporum brachia quanta fiant. 48.10
 Polypti uita. 75.30
 Polyporum cibus. 116.10
 Polypus quomodo foueat oua. 75.20
 Polypti ingenium. 148.20
 Polypus sibi obnoxius est. 148.30

Polypti quo pacto ex qua procedant. 74.40
 Polypti primu perexigui. 74.40
 Polypus in quo loco aedat ouum. 74.40
 Polypti quomodo capiant. 58.40
 Polyporum genus. 47.40
 Polypus uno brachio in coitu utitur. 48.1
 Polypti fistula. 48.10
 Polypus quomodo natet. 48.10
 Polypis aetatis utuntur piscatores. 58.20
 Polypti caput. 48.40
 Polypus qua ratione suis brachijs utatur. 48.1
 Polypti optimi sunt grauidi. 112.10
 Pompilus polypus. 49.10
 Pontus belluas piscibus inimicas non habet multas. 112.10
 Poples. 16.1
 Poples quae pars dicatur. 38.10
 Porphyrio qualem gulam habeat. 31.30
 Porphyrio quae pacto bibat. 119.40
 Porus ex pure fit. 44.40
 Praecordia. 18.20. & 18.30
 Praprium. 15.1
 Primade in caeno se abdunt. 124.1. 20.1
 Principis officium. 1.10
 Pristes oua non habet. 91.10
 Proferum, humorem uocant mulieres. 111.20
 Profluuium sanguinis. 45.1
 Promuscidas quae habeant. 52.40
 πρὸς αὐτὸν quid significet. 71.30
 Pruina nocet armentis. 110.30
 Psittacus loquitur. 112.30
 Psichrus annis. 42.10
 Pubescunt solum homines. 69.30
 Pubes tardissime canescit. 41.10
 Pubescere quid incipiat homo. 96.30. & 105.40
 Pubescant oportet qui sunt habiles ad gignendum. 41.30
 Puellae quo aetatis tempore praecipue debeant custodiri. 106.10
 Pueri qui incipiunt dentire. 112.40
 Pueri sua membra regere nequeunt. 60.30
 Palex. 149.20
 Pulices unde nascantur. 81.40
 Pulices unde uidentur. 81.40
 Pulicum coitu uermiculi proueniunt. 61.40
 Pulicariae herbae usus in polyptis capiendis. 58.40

Pullum ante pullum emittitur ab equa. 129.30
 Pullus in ouo quo pacto augetur. 85.40
 Pullus in ouo quo pacto locatus sit. 86.30
 Pullus in ouo dormit, sed non semper. 86.40
 Pulmo auium. 29.40
 Pulmo quibus animalibus sit. 18.30
 Pulmonem pisces non habent. 18.40
 Pulmone quae careant. 18.40
 Pulmo plurimum sanguinis continet. 18.10
 Pulmo non retinet sanguinem, dissectis animalibus. 18.10
 Pulmo non omnibus in eodem loco. 18.30
 Pulmo in duas partes discitur. 17.10. & 36.20
 Pulmo qua causa sanguine repletus uideatur. 16.20
 Pulmo serpentum. 31.1
 Pulmo hominis. 17.10
 Pulmo ouiparorum. 17.10
 Pulmo quibus uenis connectatur. 17.20
 Pulmones animalcula testa testa sponte proueniunt. 72.40
 Pulmo quibus deest, uocem non habent. 59.20
 Pulmo excipit arteriam. 30.1
 Pulmonem habentia spirant. 8.10
 Pumilio. 101.20
 Pupilla oculi quae sit. 31.1
 Pupillarum institutio communis est animalibus. 44.1
 Purgationes ante partum periculose. 112.30
 Purgationes post conceptum. 108.1
 Purgationes etiam quibusdam lactantibus fiunt. 112.10
 Purpure quomodo se conuertant. 71.20
 Purpure unde nascantur. 71.30
 Purpurarii genera multa. 71.40
 Purpure flos quid deterrimus. 72.1
 Purpure quo pacto nudantur. 72.1
 Purpure quae generentur. 68.40
 Purpure apud Siggum et Lectum Idem promontoria. 71.40
 Purpure Carig. 71.40
 Purpure pelagiae. 71.40
 Purpure ubi magna, ubi parua sint. 71.40
 Purpure sunt carniores. 115.40

I N D E X,

Purpuris quis fit pascendi modus
72.10
Purpuræ ubi nigrae, ubi rubrae
sint. 71.40
Purpuræ quando capiuntur. 72.1
Purpuræ quando lateant. 72.1
& 123.40
Purpuræ ubi habent florē. 72.10
Purpuræ longum uiuendi tem-
pus. 72.30
Purpuræ breui crescunt. 72.30
Purpuris qualis lingua. 56.10
Purpuræ pluuijs infestant. 118.1
Pyraus curipus qualis ferat echi-
nos. 68.40
Pyrausta fauis nocet. 110.30
Pyrrhicæ oues. 46.30

Q

Q Vadripedes brachiorum
uice crura habent. 19.30
Quadrupedum pars maior cau-
dam habet. 10.30
Quadrupedū finis in utero. 11.30
Qualitate affectuum differentes
partes. 7.20

R

R Abies canum. 118.40
Rabie tentant equi. 129.20
Raie ouum. 90.1
Raie fecunditas. 91.30
Raie branchiae. 10.20. & 27.30
Raia pinnis caret. 10.40
Raia quomodo coeat. 65.1
Raie fel. 29.10
Raie hyeme conduntur. 124.30
Rana. 8.1
Rana quo pacto generet. 28.1
Ranae coitum noctu magna ex
ex parte agunt. 60.10
Ranarum fortis. 95.1
Ranarum ulularis. 60.1
Rana qua ratione pisces capiat.
146.1
Ranae uulua. 31.30
Ranae coitus. 64.30
Ranae feminae maiores euadunt
quam mares. 62.10
Ranae uiuere sine humore neque
unt. 114.40
Ranis lingua est. 60.1
Ranae lien. 28.40
Raucedo suum. 118.10
Rediuos q animalia habent. 82.1
Rediui unde oriuntur. 77.1
Regulus auis. 117.40
Reguli auiculæ fortitudo. 5.10
Reminiscencia solius hois. 9.30

Remora pisciculus an habeat pe-
des. 28.20
Remora usus. 28.20
Renes maxime pinguescunt.
42.40
Renes testudinis marinae. 29.20
Renes utuli marini. 18.40
Renes canum. 18.40
Renes an sanguinem habent. 19.1
Renum meatus. 19.1. & 31.1
Renum uenae. 19.1. & 37.10
Renes quæ habeant. 29.20
Renum finis. 18.40
Renum dexter quid differat à si-
nistro. 18.40
Renculus uentris finis. 30.10
Rhomban piscis nomen. 91.1
Rictus proprius canum. 82.1
Riparia auis. 8.30
Romani pōsses quo pacto pa-
ce usi sint. 1.30
Rostrū aues habent propriū. 26.30
Rostrum auium ab osse quid dif-
ferat. 40.1
Rubecula. 119.1
Rubelo omnis grauida capitur.
92.10
Rubelio in alto uersatur. 122.40
Rubeliones genus pisciū. 62.20
Rubeta occidit apes. 121.40
Rubetæ lien. 28.40
Rubetæ alimentum. 117.30
Rubecula. 117.40
Rubicilla. 117.40
Ruminando deficiuntur anima-
lia. 160.1
Ruminantium uenter. 30.10
Rupex ubi uisetur. 118.10
Rura odor infestus serpentibus
est. 127.30
Ruricilla. 119.1

S

S Al facit ut pecudes maturius
coeat. 98.30
Salamandra igne non absumitur
77.20
Salamandrae nomen est græcum
& latinum. 3.40
Sale si mulier immodice uti, sine
unguibus infans nascitur. 110.1
Salinum quid nuncupem. 42.20
Sandaraca. 79.1. & 132.10
Sandaracq ueneno iumenta inte-
reunt. 119.30
Salpa quid edat. 116.30
Salpa liquide audit. 38.10
Salpa autumnio parit. 68.10
Salpæ pisci sterces cibus est. 68.10

Salpa semel parit. 67.30
Salus auis. 142.1
Sanguine carentes animantes nō
habent uiscus. 36.30
Sanguis in feminis. 42.1
Sanguine abundat mulier. 42.1
Sanguinem habentia magis adole-
scunt. 11.10
Sanguis afini. 44.30
Sanguinem quæ multum, quæ
non multum habeant. 44.20
Sanguis uasa. 44.10
Sanguis integer qualis, qualisq
corruptus sit. 44.10
Sanguinis integri sapor. 44.10
Sanguis teperrans qis sit. 44.10
Sanguis concrecit. 44.20
Sanguis quorundā nō coit. 44.20
Sanguis taurorum concrecit ce-
lestrime. 44.10
Sanguis quorundam fibras non
habet. 18.30
Sanguis bubali quo pacto con-
crecit. 38.30
Sanguinis & uenarum natura ul-
denar principium. 14.20
Sanguinem quæ habeant. 10.10
& 11.20. & 28.30
Sanguis rubentior quibus multū
carnis est. 43.20
Sanguis in animalibus. 10.10
Sanguinem à carne ebibi. 35.10
Sanguis sensu caret. 44.10
Sanguinem non habent quæ pe-
dibus pluribus quam quaternis
constant. 10.10
Sanguinea facile putrent. 44.30
Sanguis hominis. 44.30
Sanguinis mittendi ratio. 33.10
Sanguis putrescens pus fit. 44.40
Sanguinis profluuium unde ue-
niat. 44.40
Sanguis nigrior quibus parum
carnis. 43.20
Sanguinis paricipes pisces sunt.
28.1
Sanguis nō spissari potest fibris
detrahit. 18.30
Sanguis communis omnium est.
34.10. & 44.10
Sanguinem quæ habet, iecore præ-
dita sunt. 28.40
Sanguis in dormientibus interio-
ra perit. 44.40
Sanguis ex sanguine fit. 44.40
Sanguis palpirat. 44.30
Sanguis ipsarius est per torum cor-
pus. 44.30
Sanguis primū orit in corde. 44.30

Sanguine effuso uita interit. 44. 30
Sanguine ualde humefcēte mor-
bus infestat. 44. 40
Sanguis cordis tenuissimus ubi
fit. 18. 20
Sanguinis & uenarum difficultas
cognitio. 34. 20
Sanguis in uenis continetur. 14. 10
Sanguinis aliquid in corde est si-
ne uenis. 34. 30
Sanguinis morbo minus infestā-
tur mulieres quam uiri. 45. 1
Sanguis recipit discrimē ætatum
ratione. 45. 1
Sanguis in iuvene & sene. 45. 1
Sanguis nonnunquam in corpo-
ribus concrefcit. 45. 10
Sanies fibris continetur. 38. 20
Sanies quibus fit cōmunis. 34. 20
Sanies quid fit. 45. 10
Sanies in animumbus. 10. 10
Sarda piscis adeundo pōnnum ca-
pitur. 123. 10
Sarda bis parit. 67. 30
Sardē unde oriuntur. 94. 20
Sardinæ unde oriuntur. 94. 20
Sargiaci gregarij sunt. 135. 20
Sargus bis in anno parit. 67. 30
Sargus quando coctat. 95. 1
Sargus autumnō parit. 68. 10
Sargi alimentum. 116. 40
Sargones quando pariant. 68. 10
Sarpēdis cū fert, cōmendat. 131. 30
Satherium unde quærat cibum. 119. 30
Satyrj cibus. 119. 30
Scamander amnis mutat oues. 43. 20
Scapulæ. 15. 20. & 39. 1
Scapulæ multis continentur ner-
uis. 18. 20
Scarabei. 47. 30
Scarabei senectute exuuntur. 135. 40
Scarabei gignunt ex uermibus. 76. 30
Scarabei uirides unde oriuntur. 77. 1
Scarabei membrana nolant. 11. 1
Scarabeorū pennæ crusta tegunt. 11. 1
Scarabei pilularij conduntur per
hiemem. 77. 1
Scarabeis diu durat coitus. 66. 40
Scarabei quales habeant pennas. 56. 20
Scarabeus litoralis piscis. 122. 40
Sarus unus piscium ruminat.

31. 10. & 116. 40
Sarus quid comedat. 116. 20
Sari uenter. 31. 10
Sari dentes. 27. 40
Sari branchiæ. 27. 40
Schadones crabronum quando
fiunt. 79. 40
Schadones quando opime. 79. 1
Schadones aliquando sine pedi-
bus prodeunt. 79. 10
Σχίστω, quomodo transulerit. 108. 10
Scolopendræ maris incolæ sunt. 28. 10
Scombri gregales sunt. 135. 20
Scombri qñ coctant. 95. 40
Scordulæ ex ovo thunni prode-
unt. 95. 40
Scorpionis aculeus. 56. 10
Scorpionis appendices. 31. 20
Scorpionis brachia. 56. 10
Scorpiones ubi pariant. 68. 1
Scorpiones uermiculos pariant. 80. 10
Scorpiones à suis liberis perimū-
tur. 80. 10
Scorpiones quot pariant. 80. 10
Scorpio bis parit. 67. 30
Scorpiones ubi nocui, ubi non. 131. 40
Scroplæ lac. 99. 1
Scrotum. 15. 1
Scrotum quod uocemus. 31. 1
Scythiæ equabus grauibz equi-
tant. 100. 40
Sebum ab adipe quid distet. 43. 30
Sebum piscium non concrefcit. 43. 30
Sebo quæ pinguescant. 43. 30
Sebū q loco aialis cōstitat. 43. 30
Semen infecundū & fecundum
quale fit. 106. 40
Semen genitale omnia emittunt
quibus sanguis est. 47. 1
Semen genitale quando genera-
tur in animalibus, quandoq; fe-
cundum fit. 69. 10
Seminis qui plus reddant. 107. 30
Semen quando reddatur fecun-
dum. 106. 30
Semen genitale piscibus copio-
sum. 90. 30
Seminis generatio in hoīe quoto
anno incipiat. 69. 30
Semen genitale cum spiritu exit. 111. 10
Seminē emitendo quomodo di-
ferant animalia. 94. 0
Semen genitale lentum est. 47. 1

Seminis genitalis color. 47. 1
Semē genitale frigore non coit. 47. 1
Semē genitale in aqua probatur,
an fecundum sit. 47. 10
Semē genitalia. 15. 10
Semperationes. 144. 1
Senectus generadi uim tollit. 71. 10
Senectute etiam pisces deteriores
fiunt. 131. 10
Senectutem quæ exuant. 135. 30
Sensuum instrumenta. 16. 20
Sensus quot sint. 57. 1
Sennendi uis lata est. 114. 10
Sepia mas feminæ adiuuat. 135. 30
Sepia quomodo naret. 10. 40
Sepia corpus. 47. 30
Sepia quo loco pariat. 75. 20
Sepia caret sanguine. 10. 10
Sepiæ quo pacto capiant. 58. 40
Sepiæ atramenti usus. 148. 10
Sepia quomō oua foueat. 75. 20
Sepiæ maiores pisces uincunt. 116. 10
Sepiæ promuscides habēt. 47. 40
Sepiæ qñ uterum ferant. 75. 10
Sepia uere parit. 68. 30
Sepia femina quid à mare distet. 68. 30
Sepiæ uita breuis. 75. 30
Sepia habet plurimum atramenti. 48. 30
Sepiæ optime sunt grauidæ. 135. 10
Sepiarum coitus. 66. 1
Sepiæ oua qualia sint. 75. 1
Sepiolæ quomodo ex ouis exeūt. 75. 1
Sepiæ alius & oua. 49. 1
Sepiæ mas quid differat à femi-
na. 49. 1. & 75. 30
Sepiarum magnitudo. 48. 10
Sepia mas ouis æditi semen aspi-
git. 92. 30
Sepiarum partus quō colloctetur. 74. 30
Sepiarum carunculas deustas ha-
mis affigunt ad capiendos pisces. 58. 10
Sepium. 48. 40
Σεπτικόν medicamentū. 131. 40
Septuāran fuerunt. 15. 30. & 18. 20
Serpens marina. 147. 10
Serpens multelæ est aduersarius. 134. 40
Serpētes feminæ maiores quam
mares euadunt. 62. 20
Serpentes longum sibilum edunt. 60. 1
Serpētum linguæ bifidæ sunt. 31. 1
Serpentes

I N D E X.

Serpentes sine cibo diu uiuunt.	Sexus discrimen in animalibus.	Simonidis cuiusdā carminis sententia.
119.1	61.40	67.10
Serpentibus pedes nō sunt.	Sicaliz agri leonini pascua.	Sincipiti cerebrum subdūm est.
28.20	43.40	12.30
Serpentes quando exuant sententiam.	Siculi maris loca semper per brumā habet dies alyoneos.	Sinciput quæ pars sit capitis.
125.30	67.10	12.20
Serpētes testes non habent.	Siennelis medici Cypri opinio de uenis.	Simia imbecilliora.
31.10	14.10	15.20
Serpentum caudæ renascuntur.	Silicea testa intesta coitum ignorant.	Sipharum lacus.
31.10	71.20	17.20
Serpentes oua ædunt in lucem.	Siliceo regmine operta olfactum habent.	Sirenis minor.
31.40. & 31.40. & 34.1	59.1	150.1
Serpentes quomodo moueantur.	Silpia exiit senectutem.	Sirenis maior.
31.1	125.40	150.1
Serpentum coitus.	Silua.	Sitta cum aquila pugnat.
64.40	117.40	134.30
Serpentum dorsum.	Siluro quo loco fel positum sit.	Sittæ auis mores.
39.20	29.10	142.20
Serpentis uernatio, senectusue.	Silurus formina p̄stat mari.	Somniare multa præter hominē animalia.
74.30	132.30	60.40
Serpentum cor.	Siluri oua duā mare custodiuntur.	Somniare quando pueri incipiunt.
11.1	91.10	61.30
Serpentum discrimina.	Siluri quomodo pariant.	Somnium nonnullos homines immutauit.
28.10	91.1	61.40
Serpentes pleriq; terrestres.	Siluri ouum quantum fiat.	Somnus & uigilia animalium.
28.10	91.20	60.40
Serpentes maris indigenæ.	Siluri ouum quantum fiat.	Somniant etiā recens nati pueri.
28.10	27.40	112.40
Serpentum hen.	Siluri branchiæ.	Sonus in animalibus quomodo elidatur.
31.1	127.30	59.20
Serpentes infiduosæ.	Siluri morbus.	Sophisiam Græci uocant Rhetorem.
9.20	25.1	5.1
Serpentum uulua.	Simiarum umbilicus.	Spadones caluitij immunes sunt.
30.40. & 34.1	107.	41.20. & 159.30
Serpentum uiscera.	Simiæ quibus causis degenerent.	Spargi pices per ætatem parit.
30.40	25.1	68.10
Serpentum arteria.	Simiæ plus temporis degunt p̄næ quā erectæ.	Sparagi echini.
30.40	25.1	54.20
Serpentum mare inhabitantium genera plura.	Simiæ nates non sunt.	Spinax prolem recipere non possit.
28.10	25.1	90.20
Serpentem sacrum minutum fugiunt alij magni.	Simiæ caudam non habent.	Spina.
131.1	25.10	15.20
Serpentes latente.	Simiæ parum hominem, partem quā drupedem referunt.	Spina constat uertebris.
124.10	24.30	18.40
Serpentum pulmo.	Simiæ species.	Spinarum in echinis usus.
31.1	24.30	55.1
Serpentum iecur.	Simia ubi pilosa sit.	Spina ossium initium.
31.1	24.40	18.40
Serpentum genus sanguineum.	Simiæ cilium.	Spina quibus sit cōmunis.
11.40	24.40	14.20
Serpentum oua.	Simiarum lacerti.	Spinaces musteli quo loco continentur oua.
81.20	25.1	90.1
Serpentum uenter.	Simiarum femora.	Spini auis cibis.
30.40	25.1	117.40
Serpentibus eadem partes quæ la certis sunt.	Simiæ binas mammarum papillas habent.	Spiratio animalium.
30.40	24.40	8.10
Serpentum lingua.	Simiæ habent partes interiores humanis similes.	Spiritus quo pacto subeat caua pulmonis.
30.40	25.10	17.20
Serpentum felis situs.	Simiæ quo pacto moueant pedes & brachia.	Spongiarum genus triplex.
31.1	24.40	71.10
Serpentes quo pacto se exuant.	Simiarum manus.	Spongiz achilleæ.
125.40	24.40	71.10
Serpens mures persequens.	Simiæ omnia rudiora quā homo habet.	Spongiz hirci.
137.30	24.40	71.10
Serpentum uiscus.	Simiarum uestigiū quale.	Spongiz ubi nascantur.
118.40	24.40	71.10
Serpentes uini cupidi sunt.	Simiarum pedum officiū.	Spongiarum alimentum.
118.40	24.40	71.20
Serpentes quid loco testium habeant.	Simiæ testæ sunt crassiore pilo q̄ homines.	Spongiz sensum inesse.
32.20	24.40	71.20
Serpentum semen generale.	Simiæ quibus cum homine conueniant.	Spōgiz insunt bestiolæ q̄dā.
32.30	24.30	71.20
Serpentum oculos renasci.	Similares partes.	Spongia renascitur.
31.10	7.1	71.30
Serpentum meatus in quibus cōtinentur semen.	Similares animalium partes quæ sunt.	Spongiz molliissimæ.
65.20	34.10	71.30
Serpentes cauernas subeunt.	Similari parte sensus continentur.	Spongia sensum creditur habere.
9.1	10.10	8.20
Serpentes cæciliz.		Spongia similis plantæ est.
92.30		114.10
Serpentum uenterculus.		Spongiz Helleponti quales sunt.
31.1		43.10
Serpentes quale habeant intestinum.		Spongiz calorem immodicū nō patiuntur.
31.1		71.30
Serum lactis.		
45.30		
Seselim herbam edit cerua post partum.		
116.20		

I N D E X.

Spongiæ optimæ quo loco rep- riantur. 73.30	Sumen. 14.40	Sus annum quintumdecimum nacta, non generat. 70.40
Spongis uiuis q̃lis sit color. 73.30	Supercilia hirsuta redduntur per fenestutem. 41.30	Sus fera formosa melior est mare, 103.1
Spongiarum genus uocant aply- fias. 73.40	Suppuracione equi etiã infestã tur. 129.10	Sus ferus quãdiu cū feminis con- uerſetur. 103.1
Spuriæ quor̃es pariant. 67.30	Sura. 15.40	Suem altero oculo amiſſo, breui exingui. 98.1
Squama piſces tantum integunt. 7.30. & 40.20	Surdi qui ſunt, iſdem etiam mud. 60.20	Sus quor̃ annos uiuat. 98.1
Squatinæ quo loco ſel poſiti ſit. 29.10.	Sues ſylueſtres ab urbanis quid differant. 11.1	Sus pinguis procluior ad coitũ. 70.40
Squatinæ bis parit. 67.40	Sui corpus hirtum. 10.40	Sus pinguis ſera minus habet la- ctus. 70.40
Squatinæ quando pariat. 68.10	Suum uenter amplius. 30.10	Sus proles quando optima. 70.4
Squatinæ q̃modo pariant. 90.10	Suum uox ad coitum. 60.10	Sus mas ſi pinguis eſt, omni anni tempore inire poteſt. 71.1
Squatinæ duo partus. 91.1	Suum os. 14.10	Sus quo pacto aliquando coeat. 70.1
Squillæ quo pacto coſant. 66.10	Suum mammæ. 11.10	Suis concipientis ſigna. 71.1
Squillæ quale ouum habeant. 51.1	Sus non amittit dentem ullum. 33.30	Sues in terra Illyriorum. 11.30
Squilla animal cruſta inſectum. 49.10	Sues parum medullæ habent. 45.10	Sues in Præonia ſolidos pedes ha- bent. 11.30
Squillæ mutantur. 112.10	Sues ſexminæ dentes non habent exertos. 62.40	Suisbus quomodo pendet teſtes. 12.10
Squillæ gubbiæ quãdiu uterum ferant. 74.10	Suis ſexminæ genitale. 11.30	Sues quot meſes uterum ferant. 97.40
Squilla parua. 54.1	Suum ſerarum coitus & partus. 103.1	Suum coitus. 97.40
Squillarum inſectinum. 50.40	Suum pedes. 11.30	Sues quando incipiunt coire. 70.10 & 67.1
Stella animal reſta reſctum, calida eſt. 71.40	Suis cerebrum pingue eſt. 41.40	Sus ſexmina quando pariat. 70.10
Stellati ex muſcelorũ genere quo ties pariant. 67.40	Sus primo partu ædit paucos. 70.40	Supercilia iuxta naſum inflexa. 12.40
Stellio cum araneo belligerat. 114.10	Sus grandinem ſola concipit. 118.40	Supercilia ſub fronte. 12.40
Stellio mutat cutem. 115.30	Sues ſylueſtres peruicaces. 9.10	Supercilia indicant animũ. 12.40
Stellionum morſus ubi exiſtales ſint. 112.1	Sues gaudent pabuli mutatione. 118.30	Supercilia reſta mollem arguunt animum. 12.40
Stelliones quãdiu lateſc. 114.10	Suum pediculi. 81.1	Suturæ quot ſint in calua uiri. 39.1
Stellioſes ſexminæ maiores quã mares. 61.10	Suum morbi. 118.10	Suturæ caluæ. 11.10. & 18.40
Stercus cõmune animalib⁹. 14.10	Sues cum excitantur libidine, ag- grediuntur homines. 97.10	Syracufis quomodo porator quid- dam, ouis terra obrutis, excluſe- rit ſerum. 84.10
Sternutamentum qua parte aga- tur. 14.1	Sues uirulentos iclus minime ſen- tiunt. 113.40	Syria quales oues habeat. 110.40
Stefichorus de Alcyone. 67.10	Sues quibus rebus pingues ſiant 120.10	Syrie mulorum genus. 103.1
Stirpes quomodo proueniant. 61.10	Sus lupo obſistere poteſt. 120.10	
Stirpium alimentum. 61.10	Suis uiui & mortui põdus. 120.10	
Stirpibus quid commune ſit cum animalibus. 61.10	Sus præcipue radicibus gaudet. 119.40	
Struma morbus ſuum. 118.10	Sus facile pingueſcit. 120.1	
Strumus auis. 143.40	Sues capite ſæpe laborant. 118.10	
Strumus ſecedit. 115.10	Sues laborant alui profluuiũ. 118.10	
Stryacis ſuffitus fugat multa infe- cta. 58.40	Sues quando rauceſcunt. 118.10	
Subaquila. 145.10	Sues quo pacto curandi. 118.10	
Subare. 96.10	Suis urbani & ſeri differẽtiæ. 103.1	
Subnatale. 15.10	Sues ſeri quo pacto caſtrentur. 103.1	
Subulones unde dicantur cerui. 116.30	Sues fieri ſeruiunt. 96.10	
Sudor cruentus unde ſit. 44.40	Sues fieri quomodo ſe arment. 96.10	
Sulphuris odore inereunt infe- cta. 58.40	Sues quo pacto grandinoſi ſiant. 118.10	
Sulphure fugantur formicæ. 18.40		

T

Tabanus anteriore parte aculeum gerit. 11.10	
Tabani quomodo moriuntur. 78.1	
Tabanioſ. 52.40	
Tabanis qualis lingua. 52.40	
Tabani ſanguiuorũ ſunt. 111.10	
Tabani unde naſcantur. 77.1	
Tabificis pili creſcunt. 41.40	
Tactus hominis. 16.10	
Tactus omnibus animalibus cõ- munis. 10.40. & 57.10	
Tactus	

I N D E X.

Tactus in qua parte corporis con
sistat. 10. 10
Talpa oculis caret. 11. 10
Talpe oculorum uestigium quo-
modo inueniatur. 11. 10
Talpe domicii sibi parant. 9. 1
Talpis uisus deest. 57. 1
Talparum oculi. 57. 10
Talum quo loco continentur. 31. 40
Talum que habeant. 21. 40
Tauri genitale membrum rigidū
est. 64. 10
Tauri Epirl. 97. 10
Tauri tempore coitus cum femi-
nis, aliis non. 97. 10
Tauri quando seuiant. 96. 30
Tauris robustiora sunt quam uac-
cis cornua. 61. 40
Taurorum sanguis cito durescit.
44. 20
Tauri sanguis crassus. 44. 30
Tempora capitis pars. 14. 1
Tempora hominum celerius ca-
nitiora sentiunt. 41. 10
Tendo que pars sit. 18. 10
Teredo similis crabronibus est.
155. 40
Tere interstina, que uocant, ubi
quomodo generentur. 94. 40
Tere interstina pariunt anguillas
94. 40
Terrestre animal qbus ex causis
dicatur. 115. 30
Terrestriū animantium diuisio. 8. 10
Testa infecta oia latent. 113. 30
Testaceorum os. 52. 40
Testa interforū nullum est discrimen
in sexu. 61. 40
Testa infecta omnes sensus ha-
bent. 58. 30
Testa infecta optima, cum graui-
da sunt, habentur. 132. 10
Testa infecta plūs similia. 114. 10
Testa interforū animalium de-
scriptio. 52. 1
Testis inclusa unde oriant. 71. 30
Testarū uarietas magna est. 51. 10
Testes. 19. 10
Testibus iā exēptis, initu penus
actio, taurum progenerasse 39. 10
Testes ouiparorum. 13. 30
Testes q animalia nō habeat. 67. 30
Testium in animalibus situs. 31. 10
& 159. 20
Testes elephanri. 22. 30
Testibus dolentibus unde mira-
tur sanguis. 15. 20
Testes auium quādo grandiores
efficiantur. 89. 20

Testes gemini. 15. 1
Testes cuius naturæ. 15. 1
Testes qbus rebus continentur. 33. 1
Testes non sunt piscibus. 27. 20
& 32. 10
Testium capita accipiunt uenas
ex aorta & à renibus. 33. 1
Testium flexuosi meatus. 33. 1
Testium meatus descriptio. 33. 1
Testibus excisis quid meatus eo-
rum accidat. 33. 1
Testudinum coitus. 64. 30
Testudo ex genere ouiparo sola
habet uescam. 43. 1
Testudini amarū quiddam inest.
54. 40
Testudinis testes. 32. 20
Testudines maris non uidentur
posse absq aqua uiuere. 114. 40
Testudo cum ederet uiperam, cu-
nilam edit. 137. 20
Testudo marina renes habet. 29.
Testudinis oua. 81. 40 (30)
Testudinis uenter. 30. 30
Testudinis lien. 28. 40
Testudinum marinarum cibus.
115. 40
Testudines lutarij humore carere
non possunt. 114. 40
Testudo lutaria quo loco pariat
oua. 83. 2
Testudines maris quot oua pa-
riant. 83. 1
Testudines habent uescam. 65. 10
Testudo est in genere oua parien-
tium. 65. 30
Testudines abruptum sibiū re-
dunt. 60. 1
Tettigometra. 84. 1
Themiscyze apes. 79. 30
Thos quales intus partes habeat.
30. 20
Thos uocant lupt ceruarij. 156. 30
Thorax hominis. 12. 20
Thoracis pars. 14. 30
Thunna quando pariat. 69. 10
Thunna semel parit. 67. 30
Thunnus mas differt à femina.
67. 30
Thunni asilo uexantur. 127. 20
Thunni quando coeant. 95. 40
Thunni quid comedant. 116. 20
Thunni pingues sunt. 95. 30
Thunni gregales pisces. 8. 40
& 135. 20
Thunnos quomō capiūt. 61. 10
Thunnus post arcturum melior.
122. 40

Thunni dextro oculo magis ui-
dent. 133. 20
Thunni ubi lateant. 124. 20
Thunni lates sunt. 27. 40
Thunni ubi pariant. 68. 1
Thunnus quantus uisus caputū
sit. 132. 30
Thymo delectantur apes. 153. 10
Tibia. 15. 40. & 19. 10
Tibie hominis. 21. 30
Tilloni pisci qd accidat. 127. 30
Tineæ nascunt in lana, si araneus
includatur. 82. 20
Tineæ qbus lanis innascant. 82. 20
Tineæ unde nascantur. 76. 1
Tinunculus raro bibit. 118. 30
Tinunculus auis fœcūdus est. 83. 40
Tinunculi ouum rubrū est. 84. 10
Tinunculi uentriculus. 31. 30
Tiphia tollunt grādines suū 128. 30
Tipulæ unde oriuntur. 76. 30
Tipulæ in quo genere aquæ cele-
nus proveniant. 76. 40
Tiriso lac habet. 91. 10
Tosus lapis unde proueniat.
44. 40
Tonitru, incubante gallina, oua
percutit. 84. 40
Tonillæ. 14. 20
Torpedo ex cartilagineis. 65. 10
Torpedo quomodo capiat pisces
147. 10
Torpedinis fel. 29. 10
Torpedines quomō pariat. 90. 10
Torpedinis numerosus ser. 90.
Torpedo quādo pariat. 62. 10 (20)
Torpedinis brachiū. 27. 30
Torquilla auicula unde appella-
ta. 26. 30
Trixipilare malū in imis 113. 10
Tringæ auiculæ cibus. 118. 10
Trinici herbæ comedūt canes ad-
uersus lumbricos. 137. 30
Trochil' cū aquila pugnat. 134. 30
Trochilus aquas amat. 118. 20
Trochili ingenium. 140. 20
Trochili aues purgant dentes cro-
codili. 117. 20
Trogoditæ unde dicant. 121. 40
Tuber cameli. 11. 10
Tubera. 52. 10
Tuberū natura carnosa est. 114. 10
Turbinatorum differentie. 52. 30
Turbinatorū genus omne se mo-
uet. 52. 30
Turdus mutat colorem. 158. 40
Turdorum genera tria. 142. 1
Turdorum nidi. 84. 1
Turdus etiam latet. 135. 10

Turdus in litore uersatur. 122. 40
Turdi branchiæ. 17. 40
Turdulorū gentis coſtit. 15. 20
Turtur. 69. 10
Turtur & luteus pugnat. 134. 10
Turtur cū ignaria diſſidet. 134. 10
Turtur bina parit oua. 81. 40
Turturi euenit crepus alui. 159. 10
Turturis cibus. 118. 1
Turturum uita. 138. 30
Tyrrannus auicula. 117. 40

V

Vaccarum urina. 97. 30
Vaccæ purgatio à partu. 92. 20
Vaccarum libido. 97. 1
Vaccæ incendantur uenere. 96. 30
Vaccæ minores natu ad coitum prouiores. 97. 1
Vaccæ coitum aſſectantis purgatio. 92. 20
Vaccam anniculam peperiffe. 70. 30
Vaccæ cum grauidæ ſunt & pariuntur mare, portendit hyemes & umbres. 100. 10
Vaccæ quando coſeant. 99. 40
Vaccæ quandiu uterum gerant. 99. 40
Vaccis infirmiora quàm tauris ſunt cornua. 63. 40
Vaccis quandiu lac durer. 46. 40
Vaccarū conceptus indiçit. 92. 30
Vaccæ tauros quare raro ferant. 64. 10
Vaccas quaſdam nominant ſetauras. 120. 20
Vaccæ coitum cupientes crebrius mingunt. 97. 1
Vaſginipennes q̄ uocentur. 11. 1
Varices quibus ſunt, minus calue ſunt. 42. 1
Varices ex q̄ materia fiât. 44. 40
Vbera fungoſa ſunt mulierum. 19. 1
Vberum diuerſitas. 106. 30
Velæ auis deſcriptio. 142. 10
Venarum concurſus. 17. 40
Venę hominis quo modo coſſent. 34. 30
Vena in animalibus. 10. 10
Vena maior qua re coſſet. 36. 10
Venę quomodo per corpus ſparſeantur. 35. 20. & 35. 10. & 38. 1
Vena aorta. 35. 40
Vena aorta neruoſa eſt. 38. 1
Venę hominis. 18. 10
Venę in utero. 111. 40

Venę multe ac tenues ſparſæ in iecur obliterantur. 37. 1
Vena maior quas corporis partes adeat. 36. 10
Vena maior oritur in cordis ſinu maximo. 36. 10
Venę iugulariæ. 35. 20. & 36. 30
Vena lienis. 37. 1
Vena omenti. 37. 10
Vena pancrei. 37. 10
Venę aortiæ grefſus. 36. 40
Vena communis omnibus quibus ſanguis eſt. 34. 20
Venę ſanguinis conceptacula. 44. 10
Venarum ortus. 35. 30
Venarum cognitio unde poſſit haberi. 35. 40
Venę ad teſtes tendentes. 35. 10
Venę ſeminarie. 35. 10
Venę ſunt arctiores quibus multum carnis eſt. 43. 20
Venę ad ueſicam peruenientes. 37. 20
Venę ad genitalia peruenientes. 37. 30
Venę ad uterū pertinentes. 37. 30
Vena tranſiens iecur. 18. 40
Venę quæ ad renes perueniunt. 37. 10
Venarum aortiæ & maioris in capitis renum figura. 37. 10
Venę quo pacto cor cōplectantur. 35. 40
Vena cuius meminit Homerus. 36. 20
Vena ad cerebrum perueniens. 36. 30
Venę nō omnibus eadem. 37. 40
Vena maior etiam in paruis animalibus euidens eſt. 17. 40
Venę principales abolentur in mortuis animalibus. 34. 10
Venarū & ſanguinis natura principium putatur. 34. 20
Venter. 14. 40
Venter ſimplex quibus ſit. 30. 20
Venter auium. 26. 10
Venter piſcium. 31. 30
Venter hominis. 30. 20
Venter arctior eſt ijs quæ habent multam carnem. 43. 20
Venteris diſſerentiæ. 30. 1
Venteris quaternos ſinus quæ habeant. 30. 10
Ventre plurima pingueſcunt. 43. 40
Venteris ſitus in animalibus. 30. 1
Ventriculus. 9. 40

Ventriculus ſerpentum. 31. 3
Ventriculus humanus qualis. 17. 30
Veni ſpongias reddūt diuiores. 37. 30
Vento quædam concipiunt. 65. 30
Venus quo ætatis tempore uitæ da puellis ſit. 106. 10
Venereq̄ uoluptatis cupidine geſtunt omnia animalia. 96. 10
Venere non ualentes. 9. 20
Ver tempus plurima animalia ex citat ad uenerem. 66. 40
Vere piſcium conceptus agitur. 68. 20
Verbaſco herba moriūtur piſces. 127. 40
Verenle quale animal. 16. 40
Vermes ex quibus prodeunt inſecta. 76. 10
Vermes quales ſint q̄ in capite ceruorum naſcuntur. 19. 1
Vermiculi araneorum. 80. 30
Vermes nati in aridis lignis ſunt ſcarabei. 76. 30
Vermes ex niue ſunt. 77. 10
Vermium generationis primordium. 76. 40
Vermium oua. 10. 30
Vermium diſſerentiæ. 10. 30
Vertebæ foramine medio perung ſunt. 38. 40
Verticem quam partē caluæ uocemus. 12. 30
Vernices duas habentes. 12. 30
Vertibula. 32. 10
Vertibula oliſactum non habere. 59. 10
Vernuli excrementum. 55. 10
Vernuli os. 55. 20
Vertibulorum color. 55. 20
Vertibula quæ appellantur. 8. 20 & 55. 1
Vertibula ubi naſcantur. 72. 30
Veſicam membranam eſſe. 43. 1
Veſica ualde rendi poteſt. 43. 1
Veſica quibus animalibus data ſit. 43. 1
Veſica ouipari generis ſoli teſtudinī data eſt. 43. 1
Veſica in deſunctis nullum recipit humorem. 43. 1
Veſicam quæ non habent, idem meatus ſicco & humido excremento eſt. 62. 20
Veſicę ſitus. 19. 10
Veſica hominis. 19. 10
Veſicam quæ habent, habent & alium. 9. 40
Veſica

Vesica præcisâ coire nō potest. 42.1	Vites hircescere quid sit. 70.30	Vngues ab ossē differunt. 40.1
Vesica recipit etiam sicca. 43.10	Virellus oui. 85.10	Vngues animalibus communes. 34.30
Vespeæ intus conditum habent a- culum. 56.10	Vitra quot habeat pinnas. 37.20	40.40
Vesparum fertura. 79.40	Vitululo marino pedes sunt. 8.30	Vngues hominis. 40.30
Vespis diuulsis non deest inuaci- tas. 56.1	Vituli marini inuicem pugnant. 111.30	Vngues habent quibus sunt digi- ti. 40.10
Vespeæ quomodo capiuntur. 154.2	Vitululus marinus non habet auri- culas. 11.40	Vngues omnes aues habent. 26.10
Vesparum uermes. 76.10	Vituli marini aqua carere nō pos- sunt. 114.40	Vngues quo loco generentur. 72.20
Vespeæ ubi nascuntur. 79.30	Vitulorum tempus castrandi. 159.40	Vngues quæ aues habent, calcare carent. 27.2
Vespeæ phalangia perimūt. 77.10	Vituli marini cornus. 64.30	Vniualue qđ genus uocet. 52.10
Vespa animal ciuile. 8.40	Vitululus marinis maribus grande genitale est. 64.30	Vocæ gregales sunt. 115.10
Vesparum genera. 154.10	Vitululus marinus mammas habet. 45.30	Vola quę manus pars sit. 15.40
Vespeæ quibus locis & tempori- bus oriuntur. 155.1	Vituli marini cauda. 20.30	Vola scissurę indices longitudi- nis uite sunt. 15.40
Vespernilio cute uolat. 11.1	Vituli marini renes. 18.40	Volucres quo genere testis tegan- tur. 18.40
Vespernilio acetabula habet uul- uæ. 14.10	Vitulorum uox. 70.1	Volucrum cauda. 26.40
Vespernilio noctu uagantur. 9.1	Vitululus marinus lingua scissa est. 11.1	Volucres quomodo uolēt. 10.40
Vespernilioni pedes sunt. 8.30	Vitululus marinus ambiguum ani- mal. 91.30	Volucrum differentiæ. 8.30
Vigilia & somnus animalium. 60.40	Vituli marini partus. 91.30	Volucres multæ partum eiciunt ex nido. 88.10
Vinago quid edat. 118.1	Vitululus partum nutrit mammis & lacte. 91.30	Volucres quæ gregales. 8.40
Vinago columba. 69.10	Vituli marini descriptio. 91.40	Volucrum agrestium domicilia. 140.10
Vinago duo oua parit. 81.40	Vitululo marino mugit in somno. 91.40	Volucres in aqua degentes. 8.1
Vinum cōuulsionis causa. 115.20	Vituli marini dentales ferrati sunt. 83.20	Volucrum tempus ad uenerem. 67.1
Vinum nocet grauidis. 110.30	Viuerra. 4.1	Voluptas animalium in quo con- sistat. 114.26
Viperæ uino capiuntur. 118.40	Viuerræ genitale. 22.40	Vox ferinarum acutior. 62.30
Viperæ sub saxis condunt. 124.10	Viuipara quæ sunt. 11.30	& 69.40
Vipera animal gignit. 114.40	Vlna. 15.30	Vox differt à sono. 59.26
& 81.10	Vlula. 217.30	Vox equarum & equorum. 69.40
Vipera quo tempore exuat senes- centem. 125.30	Vlula colare rapit. 134.10	Vox hominis qđ muretur. 105.40
Viperæ uulua. 14.1	Vlula descriptio. 142.30	Vocis mutatio indicat tempesti- uam ueneri ætatem. 69.30
Vipera quo pacto generet. 31.40	Vmbilico aluntur animalia in u- tero. 111.20	Vocis differentiæ. 60.30
Vipera deuorat scorpionum. 132.1	Vmbilicus pulli oritur à corde. 86.30	Vox qua refine mutatione serue- tur. 106.1
Vipera quot pariat. 81.10	Vmbilicus simiæ. 25.1	Vocales quomodo proferantur. 59.20
Viperæ ouum. 81.10	Vmbilici quando sua oua habent. 69.1	Vpupa parit sine nido in cauis. 84.1
Vireo auis. 143.10	Vmbilicus pars uentris. 14.40	Vpupa mutatur colore. 158.30
Vireo docilis est. 142.10	Vmbilici animalcula testa interfecta sunt. 52.1	Vpupæ nidificatio & partus. 142.1
Vir ad coitum hyeme procliuat. 67.1	Vngulæ ab ossibus differūt. 40.1	Vpupæ montium in colore. 9.10
Vir quandiu sit habilis ad gene- randum. 70.30. & 110.20	Vnguium & ungularum incre- mentum augetur in senectute. 42.1	& 140.20
Vir impubes. 106.20	Vngulum discrimina. 40.20	Vragem quam auem Athenien- ses uocent. 84.1
Viri calua quot futurus habeat. 12.30	Vnguium color. 40.2	Vrina quadrupedum crassior qđ hominum est. 97.10
Viri mores. 132.30		Vrinæ distillationis aptum me- dicamentum. 14.10. & 137.40
Virus crocodili. 25.30		Vrinatrices. 8.1
Virtutes unde commodè accipi- antur. 5.1		
Visui certa sedes est. 57.20		
Vita brevis quibus sunt rariores dentes. 23.40		
Vitæ ambiguae animalia quæ sint. 114.30		
Vita longior quibus sunt plures dentes. 23.40		

I N D E X.

Vrinatrix aquas adamat. 118.20
 Vrsā uris animosior. 133.10
 Vrsā qua causa lateat, ambigitur.
 135.30
 Vrsi uenter amplior. 30.30
 Vrsi propter suos catulos ferociunt.
 96.10
 Vrsi faciunt coitus tempore.
 96.20
 Vrsus morsu bibit. 119.40
 Vrsi corpus hirtum. 20.40
 Vrsorum coitus. 64.10
 & 105.40
 Vrsi fugientes suos portant catulos.
 137.1
 Vrsi arum herbā comedunt cum ē lanibulo egrediuntur. 135.20
 & 137.10
 Vrsus animal omnium est, 119.10
 Vrsus quo pacto suos ferocipiat
 119.20
 Vrsus qua ratione ulncat taurum
 119.20
 Vrsi incessus. 119.20
 Vrsā uterum fert mignia dies.
 103.40
 Vrsi foris paruos. 103.40
 Vrsā latet. 103.40. & 135.20
 Vrsā quando prodeat cum suis catulis. 135.20
 Vrsā forte non capitur. 135.20
 Vrsi intestinum. 135.20
 Vrsi quot mammās habeant.
 22.10
 Vrtica adhæret saxi. 55.20
 Vrtica caro. 55.20
 Vrtica os. 55.20
 Vrticæ genus à saxi aberrat. 55.30
 Vrtica excrementum non habet.
 55.30

Vrticarum genus duplex. 55.30
 Vrticæ per hyemem cibo sunt donec.
 55.30
 Vrticæ æstate rarefunt. 55.30
 Vrticæ ubi nascuntur. 73.1
 Vrticæ natura carnosa est. 114.10
 Vrticæ piscibus uestuntur. 115.40
 Vrticæ genus duplex. 73.1
 Vrticæ genus quoddam. 8.20
 Vterus feminæ propria pars.
 14.40
 Vterus est uulvæ pars interior.
 33.20
 Vterini fratres. 33.20
 Vteri situs. 19.20
 Vux nominæ quæ uocentur.
 14.1
 Vulneratam uesticam aliquando curatam. 43.1
 Vulpanser. 118.30
 Vulpi cum circo accipitri inimici sunt.
 134.20
 Vulpi genitale osseum. 22.40
 Vulpes quot pariat. 104.30
 Vulpes grauida secedit. 104.30
 Vulpes cum serpente amice uiuit
 135.1
 Vulpium ingenium. 9.20
 Vulpecula cute uolat. 11.1
 Vulpeculis piscibus quis generandi modus.
 90.10
 Vultures quot oua pariant.
 87.40
 Vulturum genera. 117.30
 Vultures ex diuerso orbe aduolare opinio fuit. 87.40
 Vultur ubi nidificet. 87.40
 Vultur & æfalo inimici sunt.
 134.40
 Vultur repugnat aquilæ. 134.40
 Vulua pars feminæ propria. 15.1

Vulua quo pacto paranda sit, ut concipiat. 107.40
 Vulua animalium. 19.20
 Vulua testudinis. 33.30
 Vulua serpentum longa est. 14.1
 Vulux ceruix matris uocatur.
 33.20
 Vulua bipedū & quadrupedum omnium infra septemtransuersum.
 33.20
 Vulux auium iuxta septemtransuersum.
 33.20
 Vulux piscium. 33.30. & 89.20
 Vulua serpentum. 30.40
 Vulux nō sunt similes omnium.
 33.1
 Vulux sinus geminos habent iuxta genitale. 33.20
 Vulux initium quale sit. 33.20
 Vulua supra aluum est. 14.1
 Vulux acetabula quæ habeant.
 14.1
 Vulux pars interior quibus nominibus appelletur. 33.20

X

X Anthum pro scamandro
 Homerum dixisse. 41.20
 Xylophthorus uermiculus. 81.30

Z

Z Ephyria oua. 84.40

F I N I S.

IN RELIQVOS

Aristotelis de animali =
bus libros Index.

A



Cetabula quæ habeant. 256. 10
Adeps & seui quid differit. 175. 1
Adulta habent caliditatem omnia. 172. 20
Africa quare semper aliquid noui adferat. 256. 40
Alimentum qua ratione dispense natura. 254. 40
Alimentij ratio duplex. 255. 1
Amix fel. 201. 40
Anaxagoras de maris & furminæ generatione. 274. 30
Anguilla quo pacto nascitur. 230. 40
Anima an in semine sit. 244. 30
Animæ plena omnia. 272. 40
Animæ officium. 176. 40
Animæ præstantia. 241. 10
Anima vegetalis. 246. 10
Animalium munus. 240. 30
Animalia quomodo generentur. 213. 30
Animalia vitæ breuissimæ. 107. 40
Animaliū & plantarū quodāmodo similis generatio est. 271. 40
Animalium magnitudinis metra. 255. 1
Apes fucos generant. 271. 40
Apes sine coitu generare. 271. 30
Apes officiose sunt. 271. 10
Apes sequuntur suos reges. 271. 10
Apes à regibus proficisci. 271. 10
Apes multæ à regibus paucis generantur. 271. 20
Apum scetus quando superet. 271. 10
Apum reges à laboribus immunes sunt. 271. 10
Apum reges videntur nati ad solis procreantem. 271. 10
Apum duces quomodo generentur. 271. 30
Apum reges alijs apibus maiores sunt. 271. 20
ἀπόδοις. 245. 40
Aporcellum. 259. 20
Araria ex qua materia consistit. 190. 30
Arbores quomodo nascantur. 213. 1
Asina quādiu ferat uterum. 258. 40

Asina conceptus incontinens est. 258. 30
Asinæ mammæ. 214. 30
Asinus frigidū animal est. 258. 30
Asinus ubi non sit. 258. 30
Asinus sel non habet. 201. 40
Aues quædam cæcos pariunt pullos. 286. 10
Aues forminx minus uenerem appetunt quā mares. 285. 10
Auium uterus. 225. 10
Auium oua bicolora. 259. 40
Auium & piscium generationes cur differant. 265. 10
Aues uncæ salaces nō sunt. 260. 10
Auius menstruorū decessio non sit. 261. 1
Auium uenter. 199. 30
Aues acuti uisus sunt. 182. 40
Auius omnibus testes sunt. 219. 10
Auium meatus auditorij. 182. 10
Auium lingua. 185. 40
Auium generatio ex ouo. 263. 10
Aues hyperinx sunt. 260. 40
Auius qualis cura erga prolem. 263. 30
Aues quid inter se differant. 218. 2
Aues quæ propria habeat. 218. 10
Aues carent mammis. 217. 30
Aues quæ uolaces, quæ non uolaces sint. 219. 10
Auius quibusdā pedes ad nandum apti. 219. 20
Aues parue uolaces sunt. 260. 30
Aurium situs in quadrupedibus. 182. 1
Aurium meatus. 181. 20

B

Bisulca perfectū animal pariunt. 285. 40
Bonasis cornua inutilia sunt. 189. 1
Boues quidam quomodo pascuntur. 184. 30
Bouum testes. 225. 10
Brachiorum flexus. 213. 30
Branchiarū multitudinis & patuitatis causa. 221. 20
Buccina quomodo tegatur. 205. 1
Buccina quid loco seminalis natura emitrat. 272. 20
Buccinæ ouum. 274. 1

C

Cæcos quæ pariant. 286. 2
Cæpe quomodo sobole o-

riantur. 272. 30
Calidiora quæ sint animalia. 242. 20
Calidius quid sit. 171. 40
Calor mouet. 242. 30
Caloris participia omnia uiuentia. 173. 30
Cameli fel. 201. 40
Cameli mammæ. 214. 30
Cancellorum pedes. 209. 40
Canes Indici unde generentur. 256. 40
Canis cæcos generat. 252. 1
Canum mammæ. 214. 10
Canis catuli. 286. 1
Cancrorum dentes. 204. 30
Capinus sanguis temperatus. 211. 40
Capræ mammæ. 214. 30
Caprarum uenter. 199. 20
Cartilagineorum generatio. 227. 30
Cartilagineorum oua. 259. 40
Cartilaginea quo tegumentum generare consistit. 221. 40
Cauda animalium. 183. 30
Cauda piscium. 220. 20
Caudam quæ habeant. 215. 10
Caudarum differentie. 215. 30
Causarum genera. 221. 10
καύσιμος uas sicile significat. 253. 10
Cerebrum calorem corporis moderatur. 177. 2
Cerebri fluxiones unde sint. 177. 1
Cerebri qui plus habeant. 177. 20
Cerebrum bipartitum est. 196. 1
Cerebrum quid à medulla differat. 176. 30
Cerebri morbi. 177. 30
Cerei cor. 193. 20
Chameleo timidissimus. 217. 40
χοίρει uocantur secundæ. 249. 30
Cibus in semen conuertitur. 260. 40
Cibi continentiora quæ sint animalia. 200. 30
Cicadæ quo pacto generentur. 250. 1
Cicadarum natura. 107. 30
Clunis auius est. 219. 40
Coagulum quæ habeant. 200. 40
Coagulum ex qua materia consistat. 201. 1
Cochlex coeunt. 273. 1
Cælestium rerum certior status, quā terrenarum mortalium. 163. 30

INDEX.

Corum & solem cur parentis no-
mine uocant. 224. 10
Coſunt animalia diuerſi generis
256. 40
Coitus prouocat meſtrua. 261. 20
Columba cecos generat. 286. 10
Columbarium bina parit. 260. 30
Columbarium genus ſepe parit.
260. 10
Collum. 190. 10
Colli uſus. 212. 1
Collum habent quibus eſt pul-
mo. 211. 40
Collum auium. 218. 10
Compoſitio rerum triplex eſt.
169. 10
Conceptus ſit ſine uoluptate ſe-
minis non raro. 217. 1
Conceptus habet in ſe animam
uitalem. 246. 10
Concoquendi modus. 173. 30
Cor principium uenarum. 179. 1
Cor uiuis nō obnoxium, ut alia
uiſcera. 193. 30
Cor quorundam animalium os
etiam habet. 194. 40
Cor ſanguinis initium. 170. 30
Cordis diſcrimina quod ad mo-
res atinet. 193. 10
Cordis ſitus. 192. 30
Cordis in animalibus locus. 191. 30
Cornix cecos generat. 286. 10
Cornua quibus ſunt, non habet
utrinque dentes. 190. 1
Cornuum conſtitutio. 188. 30
Cornuum uſus. 179. 40
Cornua quomodo ſiant. 253. 10
Coſtarum uſus. 179. 10
Crabronum generatio. 271. 30
Crocodilo fluuiatili lingua non
eſt. 216. 20
Cruſtati generis mas & femina.
266. 20
Cruſtacea quomodo coſant. 229. 30
Cruſtatorum dentes. 204. 30
Cruſtatorum ſumma genera. 209. 30
Cuculus parum generat. 260. 30
Cutis generatio. 253. 30

D
Dama non habet ſel. 201. 40
Deſinendi uſus Socratis
temporibus increuit. 164. 10
Delphini reſtes. 225. 30
Delphini oſſa. 179. 20
Democritus Abderites de gene-

ratione maris & feminæ. 274. 30
Democriti falſa ſententia. 257. 30
Dentes ſemper accreſcunt. 255. 1
Dentes alijs decidunt, alijs non.
255. 40
Dentium in animalibus uſus. 180. 1
Dentium hominis diuiſio. 187. 10
Diſſerētia uiuerſalis, ſpecies ha-
beat necesse eſt. 164. 40
Digni hominis breues quare ſint
in pedibus, in manib⁹ uerò lon-
gi. 216. 10
Digitorum compoſitio ingenio-
ſa. 213. 30
Diuidendi ratio. 164. 40
Diuini officium. 212. 10

E

Echini optime munit⁹ eſt. 205. 10
Echini ouum. 105. 40
Echin⁹ ſus uox, id eſt retraheretur.
164. 10
Elementorum compoſitio. 169. 10
Elementorum naturalium initium
171. 40
Elephant⁹ naſus. 184. 10
Elephantis quid ſit loco narium.
218. 10
Empedocli error. 274. 30. &
217. 40
Epipetrum Parnafus fert. 106. 30
Equa menſtruoſa non eſt. 285. 10
& 258. 30
Equa grauida coitum panitur.
285. 1
Equæ mammæ. 214. 30
Equis ſelle caret. 201. 40
Equi qui mammæ habent. 214. 30
Equi genitura calida eſt. 258. 40
Excrementorum meatus diuerſi.
228. 40
Exercitatio dum mulier geſtat u-
terū, facit ut facile pariat. 286. 40

F

Facies hominis. 188. 30
Fel quæ animalia habeant. 201. 40
Fel quo loco animalia habeant. 201. 40
Fibræ in ſanguine terrenæ ſunt.
174. 10
Fieri aliud ex alio. 233. 30
Femina præbet hoſpitiū ſemi-
ni. 276. 20
Femina quare ſanguine abundet. 276. 30

Femina quæ ſepe generat, mi-
nus libidinoſa ſunt. 283. 10
Femina & maris ratio. 224. 10
Femina quare marem deſideret.
251. 1
Feminiū ſexum leſionē na-
ture eſſe. 286. 30
Femina maribus frigidioreſ de-
bilioresq⁹ ſunt. 286. 30
Femina prouenit à ſiniſtra parte
174. 30
Femina ſolidæ libidinoſiores ſunt.
285. 10
Femini prius quàm maribus ui-
gor uenit. 286. 30
Femina tardius in utero perficitur
quàm mas. 286. 10
Fetus in utero nimio motu fri-
guntur. 286. 20
Fetus in utero per umbilicū au-
gentur. 256. 1
Formicarum generatio. 230. 1
Fuci ſunt oſioli. 271. 10
Fucorum prouentus uberior.]
271. 1
Fus quid ſignificet. 253. 10

G

Gallix prouincia frigida eſt. 258. 40
Gallina plura parit. 260. 10
Gallinæ hadrianæ. 262. 20
Gallinæ perierunt ſuccunditate a-
liquando. 260. 40
Gemini homines nati quare uiu-
ſeruentur. 286. 30
Generis per diſſerētiā diuiſio.
164. 30
Generandi uis in aſino exigua.
259. 1
Generare quare exacta non poſ-
ſint. 225. 40
Generatio animalium quare ſit.
241. 10
Generationis principium me rem
& feminam eſſe. 224. 10
Genitale membrum quare ſit qui-
buſdam, quibuſdam non. 226. 30
Genitale membrū neruoſum eſt.
226. 10
Genitalis membri mutatio. 215. 1
Genitura quibus deſit. 257. 10
Genitura aſini frigida. 258. 40
Genituras aſina emingit. 258. 30
Geometricæ rationes. 258. 20
Ginnus ex mulo. 259. 20
Gula ex qua materia conſtitet.
190. 20
Gula uſus. 190. 10
Gula

INDEX.

Gula quid sit. 190.10
Gulæ situs. 190.30
Gulam quæ non habeant. 190.10
Guttur ex quibus constat. 190.30
Gutturis usus. 190.10

H

Herinae res. 216.30
Hirundo cæcos excludit. 186.10

Hirundinis pollorum oculi pun-
cti sanantur. 286.10

Homo diuinitatis particeps. 180.10. & 212.10
Homo quare erectus incedat. 177.30

Homo copiosius alijs purgatur. 218.1
Homo præfœcundum animal est 285.1

Hominis caro. 185.10
Hominis nuditas. 211.10
Homo multa habet arma. 211.10

Homines pilosi libidinosiores. 285.40
Hominis pedes. 216.1

Homo cur titillatur. 198.30
Humida potentia aut actu. 173.1

Humor multiformia producit. 272.1
Hyenæ cor. 191.10

Hyalyra membranæ. 249.30
Hyperinæ aues & plantæ fiunt. 260.40

I

Iecur multum ad longam bre-
uiemq. uitam facit. 202.10

Iecur quomodo se habeat. 196.10
Ignis in alio corpore est semper. 272.10

Imbribus crebris foras fucorum
multus fit. 271.10

Infantes pomiliones sunt. 212.20
Infantes quo pacto in utero nu-
triantur. 216.30

Insecta quas partes ad cibum con-
ficiendum habeant. 204.1

Insecta quædam diu coeunt. 271.10
Insectorum partes. 271.30

Insecta cur habeant multos pedes. 108.1
Insectorum aculeus. 108.10

Insecta quare habeant pedes pri-
ores longiores. 209.1

Insecta quod loco linguæ habeat. 186.10

Insectorum genitalia. 215.10. &
230.10

Insectorum coitus & generatio. 230.1. & 242.1

Insecta terræ uermis habent na-
turam. 271.20

Insectorum natura. 200.10
Insectorum usus. 199.1

Instrumentariæ partes omnes dis-
similares sunt. 170.1

Insectorum pedes. 208.1

L

Labor excrementa cõsumit. 286.40
Lacerti testes. 215.10

Lacertis qualis sit lingua. 216.30
Lactæ quæ careant. 217.30

Lactes. 201.10
Lænx partus imperfectus. 286.1

Læna effœta redditur. 260.40
Leo cæcos generat. 252.1

Leonis ossa. 176.1
Leonis collum. 212.1

Leonis mammæ. 214.10
Leonum generatio. 271.20

Leophasis sententia de genera-
tione. 276.1

Lepus superfoetatur. 285.10
Lepus pilos multos habet. 285.10

Lepus coagulatum habet. 200.40
Leporis cor. 191.20

Lienis in animalibus usus. 196.40
Lien quibus exiguus sit. 196.40

Lienis morbi. 197.1
Lingua hominis. 185.20

Lingua quibus animalibus sit, quibus non sit. 190.40
Locustæ quo pacto generentur. 230.1

Locustis nannib. cauda utilis est. 209.40

Logica demonstratio. 258.10
Lolliginum pedes. 210.40

Lunæ locus. 272.20
Lupus cæcos generat. 252.1

Lupæ partus. 286.1
Lupus ceruarius imperfectum gi-
gnit. 286.1

Lupi collum. 212.1

M

Mammis carent aues. 217.30
Mamma cõceptaculum lactis est. 217.10

Mammæ ceruicium. 214.30
Mammarum usus in maribus. 214.1

Mammarum officium in femi-
nis. 214.1

Mammæ elephantis. 214.10
Manus cur homini dant. 211.1

Manuum uariis usus. 215.20
Mas calidior femina est. 276.20

Mas proficitur à parte dextra. 274.10
Mas in generatione quid præstet. 276.10

Mas & femina quid differant. 214.20
Mas præstat feminæ. 241.20

Maris partes quæ sint. 214.30
Mas animal est quod in alio gi-
gnit. 214.20

Mares in hominum genere poti-
us imperfecti nascuntur quam fe-
minæ. 286.20

Maris qualitates. 272.10
Mare plurima gignit. 271.40

Mariæ non accidunt feminis
menstrua habentibus. 236.30

Membranarum officium. 159.10
Mellis copia quando proueniat. 271.1

Menstruorum purgatio, seminis
exitus est. 285.10

Menstrua semen incoctum sunt. 285.10
Menstrua forminarum. 214.40

Menstruorum & seminis initium. 218.10
Menstrua a uibus & piscibus nul-
la sunt. 261.1

Menstrua quo tempore possi-
mum fiant. 248.1

Menstrua quibus desint. 257.10
Menstrua esse excrementa. 216.20

Mentem diuinam esse. 246.30
Metachetrum in porcis. 259.20

Metus quid faciat. 174.20
Mitulorum ouum. 274.10

Mollia cur tergis copulatur, igne
ratur. 230.1

Mollium partes exteriores expli-
cantur. 210.20

Mollium generatio. 217.40
Mollium coitus. 219.40

Mollium mas & femina. 266.20
Mulorum corpora magna qua-
re sint. 259.10

Mula concipere potest. 259.10
Mulieres quæ sunt steriles. 257.10

INDEX.

Mulierum fecunditas quo pacto
probetur. 257.20
Mulieres differunt à cæteris ani-
malibus uterū ferendo. 286.40
Mulierum uterus. 225.10
Mulier grauida coitū patit. 285.1
Mulieres ægrè degunt quū ferūt
uterum. 286.40
Mulierum uita ociosa. 286.40
Mulieres quæ se exercēt, facile pa-
riunt. 286.40
Mulieribus quibusdam grauidis
purgatio fit. 285.30
Multifida complura imperfectū
pariunt. 285.40
Mulus selle caret. 201.40
Mulorum genus solum sterile est
257.1
Muri cor magnum est. 191.30
Muscarum generatio. 240.10
Mustelæ cor. 191.30

N

Natorū generatio. 259.30
Narium situs. 181.30
Nates habet homo. 215.10
Nates. 205.1
Natura uitæ infinitum. 221.40
Naturæ opera omnia mirabilia.
167.40
Naturæ operum omniū finis est.
168.10
Nerui ex lentore. 247.10
Neruorum copia in corde est.
192.30

O

Oculi quomodo gignuntur.
254.1
Oculi uenere immittuntur. 257.30
Oculos animalia cuncta habet.
182.30
Oculorum meatus. 181.30
Omentum pingue est. 202.40
Omenti usus officium dē. 203.1
Omentum qualis membrana sit.
201.40
Omenti ortus. 202.40
Oryx habet unum cornu. 189.10
Os animalium. 188.1
Ossa quo pacto fiant. 257.30
Ossū in corporibus usus. 178.10
Ossa continua sunt. 178.40
Ossium principium. 179.1
Ossa ab igne resoluī nō possunt.
251.70
Ouium syderatio. 198.1
Ouium uenter. 199.30
Oua imperfecta ædita quomodo

augeantur. 265.40
Oua quo pacto corrumpantur.
265.40
Oua urina. 265.40
Oui luteum & candidum diuer-
sam habent naturam. 264.1
Oua palustrum. 262.10
Ouum quomodo in utero hæ-
reat. 262.30
Ouum piscium unicolor. 259.40
Ouum à uerme quid differat.
241.40
Oua subuentanea quare fiant.
261.1
Ouum auium. 259.40
Ouum cartilagineorum. 265.1
Ouum quæ gignant perfectum.
241.40
Oua quæ ædita augeantur. 242.1
Oua pisciū cur imperfecta ædan-
tur. 227.10
Oua q̄ pacto perficiantur. 227.30
Oui luteum cibus est pullis. 264.
30
Ouum quo pacto augeatur.
261.30
Oui testa quo pacto fiat. 262.40
Ouum quomodo gignat. 263.10
Oui uirellū lactis loco est. 263.10
Oua quomodo foueantur ut ex-
cludantur. 263.20
Ouum nullū exangue animal
generat. 261.40
Oua subuentanea minus suauia
sunt. 261.20
Ouorum putamina humore li-
quescent. 253.10
Ovipararum quadrupedum den-
tes. 216.40
Ordinem habet quicquid secun-
dum naturam est. 271.1
Ostreæ quo pacto proueniant.
271.40
Ostreæ non emittunt semen.
274.1
Ostrearum oua. 274.1
Ostreæ plantæ aquatiles. 273.1

P

Palpebra uulnerata non co-
alescit. 182.30
Palumbes cæcos generat pul-
los. 286.10
Pantheræ cor. 191.30
Parmeder putauit mulieres cali-
diores uiris esse. 271.30
Partus qua ratione reddatur faci-
lis. 286.40
Passer parit cæcos. 286.10

Pecūnum ouum. 274.10
Pectus auiū ad uolandum aptum
218.40
Pectoris situs. 213.40
Pedes unde dicti sint. 220.30
Pedes in generatione nullum ha-
bent differentiam. 242.10
Pedum differentie. 215.30
Penis quib⁹ longior est, infirmi-
diores sunt. 226.40
Perdix plura parit. 260.10
Perdicum partus. 261.30
Pisces & coles dicitur. 276.30
Phalangia quomodo generentur.
230.1
Pisces, delatio. 276.40
Phrenes. 198.20
Pisces, corruptio. 276.40
Pica cæcos generat. 286.10
Pili argumento sunt libidinis.
285.30
Pilorum hominis in capite causa.
183.30
Pinguetudo sensu caret. 175.20
Pinguia quare sint infecundio-
ra. 236.40
Pisces qui diutius in sicco uiuere
possint. 221.1
Piscium coitus. 226.20
Piscium dentes. 187.40
Piscibus exiguus lingue usus.
226.20
Piscium sel. 201.40
Piscium uteri. 225.10
Piscium gen⁹ mutilatum est par-
tibus exterioribus. 220.20
Piscium fecunditas. 227.10. &
261.40
Piscium generationes cur disse-
rant à generatione ouium.
265.10
Piscium quorundam uterus præ
multitudine ouorum disrumpit-
tur. 265.40
Piscium genus ouiparum est.
264.40
Piscium oculi. 183.10
Pisces feminæ paulatim pariunt
266.30
Pisces mares paulatim emittunt
semen. 266.30
Pisces omnes feminæ non sunt,
ut quidam opinantur. 266.10
Pisces non sunt testes. 222.1
Piscibus menstrua nulla prodeunt
261.10
Piscium conceptus sine mare.
261.20
Podex. 200.20
Pollices

INDEX.

Pollicis usus . 219. 30
 Pollutionem & maribus & femi-
 nis accidit . 249. 1
 Polypi generatio . 250. 1
 Polypi promulciscuntur cur careant .
 251. 10
 Pomilionum generatio . 259. 20
 Pomilionis forma . 262. 20
 Plantis & animalibus non abili-
 milis generatio est . 271. 40
 Plantæ hyperinæ fiunt . 260. 40
 Plantarum seminis principium .
 261. 40
 Plantarum ortus . 224. 1
 Plantarum munus . 240. 20
 Plantæ in terra multæ nascunt .
 272. 1
 Plantæ sunt ostrea torrena . 272. 1
 Præcordia . 198. 10
 Principium in quibus querendū ,
 in quibus non . 252. 40
 Principiū in generatione . 276. 10
 Prius multiplex est . 252. 10
 Pubes feminis prius uenit quam
 maribus . 286. 30
 Pueri quidam imperfecti nascun-
 tur . 286. 10
 Pueri mobiliores sunt in utero q̃
 foeminæ . 286. 20
 Pueri quare nequeant continere
 caput . 254. 20
 Pulcum generatio . 230. 10
 Pulmonis usus . 195. 10
 Pulmonis differentia . 195. 30
 Pulmo uolucrum . 195. 30
 Pulmonem quæ habent, calidio-
 ra sunt . 242. 20
 Purpuræ . 205. 1
 Purpuræ ouum . 274. 10
 Putredo quid sit . 272. 40
 Pygmæorum generatio . 259. 10

R

Raia quomodo natet . 211. 10
 Rana non parit animal .
 219. 40
 Ranæ corpus . 264. 40
 Ranarum pinna . 221. 10
 Rationi quando credendum .
 271. 20
 Rationes inanes quæ sint . 258. 20
 Renes quæ habeant . 197. 40
 Renes hominis . 198. 1
 Renes quid faciant in corpore .
 196. 30
 Renes ouium oppletur obfita
 te . 198. 1
 Renum dexter superior finitro

est . 198. 20
 Renes quare reddant furdum o-
 dorem . 198. 10
 Renes humidi excrementi rece-
 pracula . 198. 10
 Rhinobati creduntur ex squati-
 na & Raia gigni . 256. 40
 Rostra auium differunt . 218. 20
 Rostra auium . 179. 40. & 185. 10
 Rostra quo pacto fiant . 253. 10
 Rubelliones pisces omnes ferui-
 na . 251. 20

S

Sanguis tenuior & calidior
 ingeniosior est . 171. 10
 Sanguinis fons cor est . 170. 30
 Sanguinis differentia . 171. 1
 Sanguis fortior qui sit . 171. 10
 Sanguine omnes partes corporis
 constant . 194. 10
 Sanguinis profuua . 194. 40
 Sanguis cibo augetur . 174. 1
 Sanguis bonus unde sit . 174. 10
 Sanguis non omnis fibras conti-
 net . 174. 10
 Sanguis sensu caret . 175. 20
 Sanies sanguinis . 174. 40
 Scarabei quo pacto nascantur .
 230. 10
 Scrofa habet commodum alimen-
 tum porcellis suis . 286. 10
 Semen esse excrementum . 254. 10
 Semen emissum quare aliquando
 iuuat . 255. 1
 Semen propter calorem fecun-
 dum . 246. 30
 Semē an habeat animam . 244. 30
 Seminum principium . 262. 40
 Seminis fecunditas . 257. 20
 Semen quale sit fecundius . 276. 10
 Semen frigidum infecundū est .
 226. 40
 Semen quæ emittant, quæ non .
 230. 30
 Semen an ex toto corpore ueniat
 230. 40
 Seminis in animalibus differentia .
 255. 10
 Seminis natura . 244. 1
 Semē omnium album est . 245. 40
 Semen quid sit . 253. 20
 Senectus prius uenit feminis q̃
 maribus . 286. 30
 Sensus similibus partibus ad-
 scribitur . 170. 10
 Sensoria bipartita sunt . 196. 10
 Sensorium primū quid sit . 181. 30

Sensuum principium cor esse .
 181. 1
 Sepix pedes . 210. 40
 Septentrionis officium quod sit .
 198. 10
 Serpentes non sunt testes . 222. 1
 & 225. 1
 Serpentum natura . 201. 10
 Serpentum pulmo . 201. 20
 Serpentum uiscera oblonga sunt
 201. 30
 Serpentes fel . 201. 40
 Serpentes quomodo nantent . 220.
 40
 Serpentum coitus . 226. 20
 & 227. 2
 Seuum & adeps quid differant .
 175. 1
 Seuum habent quorum sanguis
 corpulentior est . 175. 1
 Seuum quæ habeant, & quæ adi-
 pem . 175. 10
 Sicca actū & potentia quæ sint .
 173. 1
 Simia forma ambigua est . 215. 30
 Simia non habet nates . 215. 30
 Simia caudam non habet . 215. 30
 Similes partes humida . 170. 40
 Similes partes sicca . 170. 40
 Similium partium differentia .
 169. 40
 Somnus unde proficiatur .
 177. 10
 Spina in corpore quid dicatur .
 179. 1
 Spongia quatenus uiuat . 206. 20
 Squannæ pinna . 221. 10
 Squallæ quid à canceris differant .
 209. 40
 Sterilitatis causæ . 257. 1
 Steriles sunt & mulieres & uiri .
 257. 1
 Sterile est totum mulorū genus .
 257. 1
 Styrpium excrementum . 180. 20
 Styrpium uenter . 173. 30
 Struthio plura parit . 260. 10
 Struthio Aphricus qualis sit .
 222. 30
 Substantiæ partim mortales, par-
 tim immortales . 167. 20
 Suis partus . 286. 1
 Sus quæ sit partus numerosi . 286. 1
 Sues inveniuntur solida ungula .
 286. 1
 Sus copia alimēti abundat . 286. 10
 Suum testes . 225. 10
 Suum mamma . 214. 20

INDEX.

T

Tactus primus sensus. 178.1
 Tali usus. 215. 40
 Terra quare mater dicat. 224. 10
 Testa in testaceis qd faciat. 178. 10
 Testatorum generatio. 267. 40
 Testatorum genera. 205. 1
 Testatorum brualium discrimen
 209. 10
 Testatorum corpus non multi-
 plex est. 209. 10
 Testans quis sit augendi modus.
 271. 40
 Testes hominis. 225. 10
 Testes quæ non habeant. 222. 1
 Testes quare quibusdā intus, qui-
 busdā foris habeantur. 228. 20
 Testiculos cur natura dederit.
 225. 30
 Testudo lutaria uestica & renibus
 caret. 197. 40
 Testudo uesticam habet. 197. 30
 Testudinis testes. 225. 10
 Tinunculus fecundissimus est.
 260. 30
 Tubera quomodo uiuant. 106. 30
 Turbinatorum differentia. 209. 20
 Turtur generat cæcos. 286. 10

V

Vaccarum mammae. 214. 30
 Vena maior quantum ab
 aorta distet. 195. 1

Venarū principiū cor est. 119. 40
 Venarū gratia uiscera esse. 196. 20
 Venæ oēs unius pars sunt 178. 40
 Venus unde dicta. 245. 40
 Venus quare debilitet. 235. 1
 Venæ duæ principales. 192. 40
 Veneris uoluptas. 231. 10
 Veneris celerioris quæ sint. 225. 40
 Venter suillus. 200. 10
 Venter caninus. 200. 10
 Ventris officium. 199. 1
 Vermis ab ovo quid differat.
 241. 40
 Vermes nani quo pacto augean-
 tur. 261. 30
 Vertibula parum à plantis disce-
 runt. 106. 20
 Vescicam quæ habeant. 197. 20
 Vescicæ officium. 197. 20
 Vespræ quo pacto generentur.
 230. 1. & 271. 30
 Vespertilioes. 222. 10
 Viri qui sint steriles. 257. 10
 Viscera quibus animalibus sint,
 quibusq; non sint. 191. 20
 Viscera quid à carne differant.
 199. 40
 Viscerum corpus quo pacto co-
 agmentetur. 199. 1
 Viscera quibus similia. 201. 10
 Viscerum forma. 196. 1
 Visus ubi habeat uim suam. 181. 1
 Vitæ hirciæ quid sit. 285. 20

Viruli marini pedes. 222. 20
 Vituli marini meatus auditorij.
 182. 10
 Vitulorū marinorū lingua. 226. 20
 Vitulus marinus felle caret. 201. 40
 Viuparorum alia perfectū, alia
 imperfectum animal pariunt.
 285. 40
 Viuparorum generatio. 227. 30
 Vmbilicus uenis constat. 250. 20
 Vmbilicus auium. 219. 1
 Vmbilico augentur fetus. 266. 1
 Vngues quomodo fiant. 253. 10
 Vnguibus quare digiti muniant.
 216. 10
 Vnguium usus. 223. 30
 Vngularum usus. 179. 40
 Vniuersalia quæ sint. 266. 40
 Vrinæ profluvium. 235. 30
 Vrisæ catuli inarticulati. 286. 1
 Vrisæ quatenus uiuant. 106. 40
 Vterum ferentes à cæteris mulie-
 res differunt. 286. 40
 Vteri omnium bipartiti sunt. 225. 10
 Vterorum differentie. 260. 1
 Vulnere mortentem aliquando
 ridere. 198. 30
 Vulpes cæcos parit. 252. 1
 Vulpis partus. 286. 1
 Vuluarū discrimina multa sunt.
 227. 10

FINIS.

THEODORI GAZAE THESSALONI

CENSIS PRAEFATIO IN LIBROS DE ANIMA-

LIBVS ARISTOTELIS AD NICOLAVM

QVINTVM PONTIFICEM MAX.

21



YCVRGVM Lacedaemonium, qui leges ciuibus suis consti-
tuit, reprehendunt nonnulli, Pontifex summe Nicolae quinte,
quod ita tulerit leges, ut belli potius, quam pacis rationem ha-
buisse uideretur. Numam uero Pompiliū regem Romanū
laudant maiorem in modum, quod pacis adeo studiosus fuerit,
ut nulla causa moueri ad bellum pateretur, quorū sententiam,
etsi aliās probo, ut debeo (nihil enim pace cōmodius, nihil san-
ctius) tamen cum uita hominū ita ferat, ut bella uitari interdum sit suscipiendū, si res ur-
geo praefiniendum, consulendumq̃, ut & bellum interdum sit suscipiendū, si res ur-
get, & pax seruanda sit semper, si fieri potest: nec belli ratio unq̃ probanda sit, nisi ut
demum rebus compositis, quieto, tranquilloq̃ animo uiuamus. Non enim ad pu-
gnam, & homicidia, non ad discordias, & bella nati sumus, sed ad concordiam, &
humanitatem. Itaq̃ principis institutum, atq̃ officium id esse reor, ut pacem sum-
ma opera petat, seruet, & colat. Quod cum Romanos pontifices ferē omnes fecisse
20 quoad potuerint, intelligam, laudo illorum animum, quod neq̃ ab instituto naturę
bonę recesserint, & preceptū autoris diuini seruauerint, quod sapissime pacem concil-
liarint, & cōmendarint. Sed usum nonnullorū ausim reprehendere. Pace enim, qua
uti debuerant ad literarum, & artium bonarū studia, et uirtutum officia, illi quidem
ad uoluptates parum honestas abusi sunt. quod cum omni hominū ordini sit turpe,
tum pontificis personę turpissimū est. Fuerunt tamen & qui recte pace uterentur,
& pontificatum magna cum laude gererent, quibus te similem uideo planē success-
sisse. Prestas enim doctrina, & moribus: quo sit, ut nomen tuum immortalitati man-
dandum censeas, studio potius literarum, quā nuncp̃ pereunt, quā uel ædificio-
rum, quā breui tempore delentur, uel thesauri gemmarū, & auri, cuius heredes in-
30 mici plerunq̃ succedunt: utq̃ uoluptates, quę animi lumen extinguunt, respuas,
unamq̃ literarum uoluptatem, quę animum illustrare potest, expetas, atq̃ in ea re
quiescas. Itaq̃ omnes pontificem talem habuisse letamur, & quisq̃ siue ciuis, siue pe-
regrinus studeat pro uiribus rem afferre, quā & uirtutum tuarum laudem, & animi
tui uoluptatem augeat. Quem enim ob eius merita nō solum ueneramur, & obser-
uamus, sed etiā perinde ac patrem amamus, ei perlibenter opera studiorum no-
strorum dedicanda putamus. Alij igitur aliā: ego tibi libros Aristotelis philosophi,
quos de natura animalium scripserat, conuertere in latinū sermonem uolui, existi-
mans rem tibi gratam me facturū, si hi libri latinis literis mera industria mandaren-
tur, & cultius, atq̃ integrius, quā actum ab alijs adhuc est, exponerent. Videbam
40 per multa errasse interpretes, tum imperitia linguae, tum Aristotelicę disciplinę insci-
tia. Itaq̃ officium esse putauī, ut si quid facultatis in me esset, quā praestare hæc pos-
sem meliora, rem aggrededer, & pro uiribus dignius quicq̃ efficere conarer. Labo-
raui equidem hac in re uehementer, quoniam nihil adiumenti ab ijs, qui eadem in-
terpretari uoluere, capere poteram. Aut enim græce illi dixerunt, quæ latine audire
homines latini desiderant, aut rerum aliarum nomina alijs improprie tribuerūt,
aut noua ipsi inepte finxerunt. Sententiam uero autoris passim adeo deprauarunt,
ut argumento quidem interpretationis eorum nemo tam indoctus sit, qui non re-
ctius iudicare de rebus naturæ, quā Aristoteles posse uideatur. Locutionis etiam
genus ne tale quidem, quod legi posset, non modo non Aristotelis eloquentia dis-
A

gnum, adhibere potuerunt. Quod si quid præ sua facillima cognitione peruerit ab omni ueritate non potuit, id etiam propter incultum, horridum & ineptum sermonem interpretis uix intelligi potest. Afferrem hoc loco scripta illorum interpretum, erroresque sigillatim enumerando reprehenderem, nisi longior essem in re non dubia, præsertim apud te princeps doctissime, qui ut ante doctior pro tuo singulari iudicio semper damnaui illorum interpretationem, melioremque desiderasti, sic nunc factus princeps accuratius agis, ut hæc aliquando explanentur, & una cum sui auctoris sententia lucem latinæ linguæ recipiant. Utinam tantum facultatis in me esset princeps sapientissime, ut hoc meum interpretandi genus esse optimum illud, quod quaeris, confirmare possem. Sed quoniam hoc plus est, quam ut uel homo modestus de se polliceri debeat, uel meæ uires attingere possint, nihil ego tale de me. Illud uero dicere licet, hanc esse omnibus, quæ adhuc factæ sunt, horum librorum interpretationem, & philosophis ad eloquendum commodiorem, & eloquentibus ad disputandum utiliorem, et utrisque ad Aristotelis sensum percipiendū aptiorem. Nec acta equidē egi, sed à male conuersis primus ego latinis hoibus aperui, quæ his libris Aristoteles scripserat. Sed illuc redeo. Me plurimū elaborasse in his libris interpretandis fateor, cū nihil à primis interpretibus illis iuuari possem: sed omnia ex consiliis ueterū auctori petere necesse haberem, lectione longa, notationeque uaria. Plinius, Cornelius, Columella, Varronē, Catonē, M. Tullius, Apuleius, Gellius, Senecam, cōpures alios linguæ latinæ autores euoluere diligentius oportuit: quorū libros, uel semel accurate iegisse laboriosum est, nedum ad usum interpretandi accommodasse. Non enim ita uisum uerborū accipit interpres, ut suo arbitrato rem disponat, mandatque locutioni sed totidem ferè uerbis sensus alienos accommodare exprimere cogitur, quod perdifficile est. Accedit ad hæc altera causa laboris, quod exemplaria græca, libros hos de animalibus dico, mendosa admodū habemus, uel libroriorū culpa, uel eo casu, quem apud Strabonē geographū legimus. In his enim emendandis elaborare interpres sine dubio debet, ne ipse errasse in conuertendo uideatur. Ita enim plerique iudicant, ut si quid bene ab interprete dicitur, id auctori operis tribuant. Si quid male, id interpreti uitio ascribant. de ijs interpretibus loquor, qui nō minus laudis mereant in conuertendis aliorū libris, quam illi, qui eos magna cū laude ediderunt: non de ijs, qui & sibi, & auctori, quem interpretant, dedecus pariunt. Quid autē: cum uel ipsa latina exemplaria, quorū ope iuuari nitimur, nō minus sint emendanda, quam græca. Quæ enim utilitas librorum Plinij satis interpreti asseretur, nisi emendarent, & corrigerent? Iam ante ætatem nostram, seculis multis iacuit inutile opus eius auctoris, quod de historia naturali inscribitur, scilicet propter innumeros libroriorū errores. Quis enim auctoritate, tum scriptoris, tum rerum scriptarum peteretur, & à pluribus scriberetur, tamen legi ne à doctissimis quidē uiris poterat, usque adeo mendosum, corruptumque habebat. Caruerunt certe diu latini hoies magno fructu eorum librorū, quantū nunc doctrina insigni, singularique industria Ioannis Andreae, præfatis Halerensis, facili facta est, & lectio eorum librorū, & imitatio. Hic enim primus hos libros emendauit, atque utiles reddidit. Quod munus, si in cæteris quoque libris corrigendis hic subiisset, labor sanē aut nullus, aut longe minor scriptoribus interpretibus relinqueretur. Sed quoniam hunc uirum, alia munera tui felicissimi principatus, & reipublicæ à literarū studijs priuatis diuerterint, accidit res cuius proculdubio difficilior. Mihi autē uel illa difficultas laborē accumulat, quæ non ad eos interpretes spectat, qui res difficiles græce dicant, faciles uero latinis uerbis improprie peruertant: sed ad eos, qui ne ea quidē inconsiderata relinquunt, quæ antiqui auctores negligentia quadā non facile excusanda prætermiserunt, qualis quæstio, de Thoë quadrupede, & panthere, de dasypode, de lynce, de alijs plerisque occurrat.

currat. Sed an ego dignū quicquid uel meo tanto labore, uel tuo desiderio efficere poterim, tu mihi eris & iudex, & cenfor. Fuit quidē studiū mihi certandi, nō cum interpretibus illis, quos uincere nullū negotiū est, sed cum Aristotele ipso, ut libros, quos ille Alexandro regi suo principi nō minori industria, quā doctrina conscripserat, hos ego tibi principi meo latinos redderē nō deteriores. Sed an effecerim, quod mihi statueram, tu uideris. Habes uero in hoc codice libros duodeuiginti: scilicet nouem de historia animalium, quatuor de partibus, quinque de generatione. Historia primū obtinet locū, atque ut nomen ipsum significat, expositionē continet rei, quod est, siue ut sic quod scholae philosophorum nostrae aetatis, quia est dicere solent. Mox libri de partibus, ac de generatione, causam cur ita sit, declarant: alteri finalem praecipue, alteri agentē. Cum enim rem, cuius causam reddere uolumus, exploratā cognitione quod est, habere debeamus, recte & scribitur historia animalium, & praecedit in edocendis causis, unde nam, aut quē ad finē, siue cuius gratia, condita quaeque sunt a natura, praecipue in quā finalem, agentēque causam. Nam obiter quidē materialis quoque passim pro rei desiderio exponit, ut simul aut necessitatis, notaque melioris ratio declararetur, aut ex quo, undeque consistant, quaeque demonstraretur. Sed quantum libris nouem interpretatio haec historiarum consummat, tamen qui nonus in exemplari graeco continetur, hunc ego septimū collocaui: nec id temere factū existimo. Agitur enim in eo de hominis generatione, quā rem Aristoteles continuū a generatione ceterorum animalium pollicetur explicaturū. Itaque cum quinto & sexto libro ceterorum animalium generationē exposuisset, nulli dubio esse debet, quin ille septimū hunc collocauit. Sed Appellicon Teius, de quo Strabo plura, ut alia permulta in excribendis Aristotelicis libris deprauauit, sic id permultas uidetur, existimans ultimum esse totius historiae collocandū: quoniam cum Aristoteles agere de generatione inciperet, ultimo loco de homine dicturū pollicitus est. At ille nō ultimo totius historiae dixit, sed eius loci, quē de generatione tractaret: quod patet ex ijs, quae in sexto, qui secundus de generatione est, locū eum absoluit, scribit: Sequitur, inquit, ut pari modo de ijs, quae in terrestriū genere animalium pariunt, atque etiam de homine disseramus. Tertius igitur hic a primo de generatione collocandus est: quo fit, ut idem septimus totius ordinis historiae habeatur. Sūt etiam exemplaria, tum graeca, tum uero latina, quae habent fragmentū quoddā historiis additū: sed id causas quasdam materiales, agentēque generationis humanae exponit, nō historiam completiue. Itaque nō inter historiae libros hoc ego ponendū duxi: sed si collocandū uspsam est, libris de generatione, meo quidē iudicio coniungendū est. Inspicere singulos hos libros, ac legere uelis summe princeps, quoad tuae occupationes patientur: ut & re explorata iudicare, & si quid uoluptatis est in legendis naturae operibus, oblectari possis. Nō enim me offensurū tuas aures puto, quantum nō græco mihi patrio, sed peregrino uitor sermone. nō quod ab interprete dicitur id ex graeco exemplari intelligere desiderabis, ipsa latina oratio sensum Aristotelis ita explicabit, ut minime græcā desideres: nihil miscet, nihil inculcat, nominat usu ueterū probatissimorum autorū genera animalium. Si quid noui imponit, ita inserit, ut familiare, cognatūque id quoque uideri possit. Si quid graece appellat, id nō durum occurrit. aut enim usitatū, & (ut ita dixerim) uagū latinis est, quale est nomen delphini, cameli, elephantis, crocodili, ichneumonis, aspidis, salamandreae, & reliquorum generis eiusdem. aut ita sonat, ut nō minus latinū esse, quā græcū uideatur. Cur enim tetricam auem, aut oreem, aut derum, nō eodem hoc nomine uocē, si nō comperio latinū, cum quasi latinū sit, ita congruat? Quis latracem ambiguam illam belluam, aut balerum, fluuiatlem piscem ita nominans, peregrinū sonare uidebitur? Nec uero contemnendū uulgus interdū est, si quid nōdum a literarū professoribus nuncupatum, suo ipsum nomine appellat: ut brucum genus locustae terrestres, quod Graeci atelabum uocant. Aut martam genus mustelae rusticae, quod Graeci

dicta dicunt, quibus plura eius genera sint, nec temere actum dixerim, si quis uer-
 uerq; nomine ea complectitur: planius enim ita docebimus, si id martam, aut uiuer-
 ram uocemus, mustelæ aut nomen in eo tantum remaneat, quod græci Galem ap-
 pellant, eodemq; modo, si locustæ illius terrestres alterū genus locustam, alterū brus-
 cum nuncupemus. Sedenim sufficit lingua latina singulis græcæ orationis, siue uo-
 cabulis, siue sententijs: quanq; nonnulli, quæ latine exprimere nequeunt, hæc inopie
 linguæ tribuunt latinæ, suamq; pauperiem uitio dare linguæ locupletissimæ audet:
 quos satis conuincit à M. Tullio puto, cum ille linguæ Romanæ ne copia quidē uer-
 borum à græca superari auro met. Exclamat ille aliquantulū quidem importune: O
 inopem interdū linguam græcam, sed nō sine causa, quando nonnulli ita cōtendunt, 10
 ut Græcis nihil deesse, Latinis permulta desiderari pronūciant. Sed de his hæc enas.
 Aristotelis uero laudem, quibus mos interpretū sit, eum, quē interpretant auctorem,
 uberius laudare, tamen si latus persequare, uereor ne mihi idem obijciatur, quod illi,
 qui apud Lacedæmonios, de Herculis laudibus agere uoluit: Quis Herculeum uitu-
 peret, aut minus bene de eo sentiat? Quis illum nō inter deos immortales enume-
 ret, colat, obseruet, ut tu laudare uelis, Lacedæmonij subdiderunt. Tanta est enim
 Aristotelis existimatio, tanta autoritas iam apud omnes mortales, ut frustra quis præ-
 dicet, quo ingenio, qua doctrina hic fuerit, quo artificio rem quācumq; explicandā
 sibi statuerit, tractet: quanta uis in hoc differendi, quanta in cognoscendis, expo-
 nendisq; rebus diligentia. Hūc & Latij decus M. Tullius ita laudat, ut excepto Pla- 20
 tone, facile philosophorū principē appellet. Excepit ille quē amat, laudat uero, quem
 doctissimū esse iudicat. Missa hæc facio. Librorū quos interpretatus sum, fructum,
 quantus sit, explicasse quoad possum, & locus hic patitur, non ab re fuerit fortasse.
 Omnis enim philosophandi ratio naturalis, ubi à primis illis naturæ inijs, materū
 dico, formā, finem, agens, & motū (ut ita loquar) emerferit, hic uersatur, ac diutissi-
 me immorat, hic suas uires exercet, atq; multiplicē, uariam, & admirabilē rerum cō-
 stitutionē amplissime explicat. Persequi ordine discrimina omnia, quibus natura
 suas animantes differre inter se uoluit: colligit summa genera, reliqua sigillatim ex-
 ponit: partitur in species genera: & singula, quæ circiter quingenta numero in his
 continentur libris, describit: pergit quæq; explanans, quemadmodū oriant, siue terre 30
 stria, siue aquatica: quibus nam constant membris, quibus uescant alimentis, qui-
 bus afficiant rebus, quibus moribus prædita sint, quantū uiuendi spatij datū cuiq;
 est, quanta corporis magnitudo, quod maximū, quod minimū est: quæ forma, quis
 color, quæ uox, quæ ingenia, quæ officia: deniq; nihil omittit, quod in animalij ge-
 nerē natura gignat, alat, augeat, & tueatur. Quæ omnia eō spectant, ut, quod san-
 ctissimus quoq; autor ille, quē deus sibi ueluti supellectilem quandā preciosam ele-
 gerat, admonet, ex ijs, quæ à natura pro ueniūt, deum immortale, ex quo ipsa pen-
 det natura, intelligamus, admiremur, atq; colamus: qua re nihil pulchrius, nihil gra-
 uius, nihil dignius homini esse potest. Tantis fructus horum librorū est. Nec audi-
 endi sunt, qui inquit: Multa Aristoteles de musca, de apicula, de uermiculo, pau- 40
 ca de deo. Permulta enim de deo is tractat, qui doctrina rerum conditor exquiritis-
 sima, conditor ipsum declarat: nec uero musca, nec uermiculus omittendus est, ubi
 de naturæ mira solertia agitur. Ut enim artificis cuiusvis, sic naturæ ingeniū in minu-
 tissimis potius cōtemplandū est. Quinetiā cum rerum causas cognoscere pulcherri-
 mum sit (hac enim una cognitione, homo perfici, absoluiq; potest, ut deo immortali
 similis, quoad eius fieri potest, euadat) his sanē libris plene docemur, cur quæq; res in
 animalū genere ita sit: planeq; felicitatē assequimur illam nobiliorē, quæ in actione
 animi consistit, quā sapiens quoq; poëta prædicans: Felix, inquit, qui res potuit co-
 gnoscere causas. Quid de anima loquar, de qua toties publice, priuatimq; disputat?
 Nulq; suorum librorū, tam aperte philosophus hic suam opinionē exponit, quam in
 his libris,

his libris, quid anima sit, undeque in corpus recipitur. Ad hęc mores illi, & uirtutū officia, quibus utrum appellamus bonū, laudeque profequimur, longe melius hinc accipi possunt, quam uel a rhetore, quē Graeci sophistam uocant, uel a predicatorē, nō mine iam trito latinis auribus. Ius enim saepenumero uita discrepat à præceptis, & melius hortantur alios, quam ipsi officio fungantur: ut interdum frustra illa uirtutis egregia laus recitata sit, proluxa eorum præceptio uacet, & iaceat, cum exempla desiderēt uitæ, præceptoris & autoritas, quā qui respicit, facilius & mouetur ad uirtutem, & in officio tenetur. At uero in contemplandis animalū moribus exempla suppetunt omnium officiorū, & effigies offerunt uirtutū summa cum autoritate naturæ omnium parentis, nō simulate, non cōmentitiæ, nō inconstantes & labiles: sed uere ingenuæ atque perpetuæ. Quis enim tam per uersa natura hostis sui generis est, quin emendetur, & mitigetur, cum nullū animal occidit à sui generis belia uideatur? Quis tam in parentes impius, ne cum ciconiæ auis, aut meropis pietatem erga parentes intelligat, pientior efficiatur? Quis adeo inhumanus, illiberalisque est, quem ossifragæ benignitas in pullos aquilæ nō faciat benigniorē? Quis tam piger, iners, & segnisis est, quin excitetur ad uitæ munera, cum formicarū, aut apum labores, atque industriad intuetur? Quem nō pudeat per metum peccare, cum nō solum leonis animum inuictum cogitat, sed etiam reguli auiculæ, quæ cum aquila pugnat, certatque de imperio? Quis principem bonū non colat atque obseruet, cum si rex apum in itinere aberrauerit, omnes eum inquirere, odoratūque sagaci persequi, donec inuenierint, cognitū habere gestarē etiam regem à plebe, cum uolare nō potest, & si perierit, omnes discederet? Nunquid parum exempli ad boni principis siue desiderium, siue obseruantiam datur? Quis princeps non ad clementiam facile inuitetur, cum reges apum armari quidem aculeo, sed eo nunquā uti intelligat? Quæ fides, quis amor in canibus? Quanta in elephantis mansuetudo? Quæ in anserē uerecundia? Quantum studium ornatus, ac polituræ in pauone? Quanta opera uocis amoenæ, suauisque in lusciniæ? Quid de iustitia apum dicam, quæ colligunt quidem ex ijs, quibus aliquid dulcedinis inest, sed sine ullo fructuū detrimentor? Quid de castitate elephantis, qui quam impleuerit coitu, eam rursus nō tangit? Aut columbæ, quæ neque coire cum pluribus patitur, neque coniugium iam inde à primo ortu initum deserit, nisi uidua, aut ecclesibz? Disciplina autē & eruditio elephantis, quem non faciat studiosiorē? Omnino nulla pars uitæ humanæ est, quæ nō suorum officiorū exempla cōmodissime hinc accipiat. Nam, ut omitam artes illiberales, quæ & ipsæ ingenijs animalū non parum iugantur, ualitudinis exempla quæso unde cōmodius peti, quam ex animalibus possint? Loca pro temporis conditione solent illa mutare: nō plus edunt, aut bibunt, quàm sibi salubre sit: nō diutius dormiunt, quàm ratio ualitudinis postulat: modum mouendi, quiescendique seruant: nouit sua quodque medicamenta: uluit sua quodque sorte contentū, & gaudet. hæc late à medicis præcipiunt. At uero exempla, in quibus uis maior, quàm in præceptis est, ab animalibus certiora præbent. Ad do utilitatem, quæ in dicendi facultate ex hac animalū ratione afferri potest. Comparationes enim, assimilationesque illæ, quas Graeci parabolas uocant, quæ plurimum orationem exornant, auditorēque tenent, hinc uarie, copiose, aptissimeque accipi possunt: ut siue oras, siue cōmunem partiris cum alijs sermonem, eloquens, aptus, suauisque esse possis. Poëta uero unde nam pulchrius sua illa rara, & mira accipiat, quàm ex his libris, qui naturæ arcana rimantur, enarrant, aperiunt? Medicus autē, quod fateatur, se sua inde ordiri, ubi philosophus desinit, nuncque plenius, quā hic uiderit: quodque à Galeno medicorū principe tradiatur, Aristotelem primū anatomen, hoc est, membrorum dissectionem scripsisse, hic agnosceret: & quod idem & primus, & optimus fuerit autor, percipiet. Iam & philosophi nostræ ætatis, qui quadrifarij rerum causam ex prima illa librorum naturalis auscultationis institutione, accipiunt quidem

cōmuni quadam ratione: sed quemadmodum his natura utatur, in constitutione, generationeque animalium, parum, autore Aristotele, uident, inopia scilicet exemplaris Aristotelici, quod legere possint, hic uidisse aliquando gaudebunt, & Physici, quo se appellant, dignius de cætero profitebuntur. Rationes enim ideo quarimus uniuersales, ut demum res particulares, & sensiles teneamus. Accedit ad hæc uoluptas, qua iuuari, ac perfici quāuis actionem Aristoteles ait, quam in contemplandis rebus naturæ auidissime capimus. Nam si pictor nos uehementer oblectat, cum animal scite pinxerit: quanto uehementius natura ipsa afficiet uoluptate, cum eius tam multa, & uaria animalia, mira membrorum conuenientia, inauditaque moderatone, & elegantia facta. Cum hos legimus libros, contemplamur profectò quàm uariis, ac pulcherrimis fructus horum librorum, & utilitas amplior, quàm ut uerbis exprimi possit. Sed quorsum hæc? Vt si in traducendis his tam necessarijs, tamque commodis, & amoenissimis libris, satis ego interpretis munere functus sum, tu sententiam feras princeps doctissime, ædasque in usum publicum opus, quod ego sine tua auctoritate ædere nec possum, nec debeo. Si quid etiam dignum ex meo ingenio exit, quod in ea bibliotheca ponatur, quam magnifice consulens hominū comuni utilitati, condere statuisti: si quid inquam tale effici mea opera potuit, censeas ea ipsa bibliotheca tanquam ciuitate donari hunc codicem, nōdum cognitum, aut ullam in sedem receptum. Non ego primus te constituo iudicem: iam pridem consensu omnium doctiorum uirorum habitus es existimator, & architectus eorum, qui in studijs liberalibus elaborant. Facit enim tua illustris doctrina, tuumque summum ingenium, ut nemo te uel iudicio grauior, uel auctoritate locupletior habeatur. Principem etiam summum te nuper quidem habuimus: sed, quod optauimus, talem habemus, ut facile temporibus his tuis sperare possumus publicam illam felicitatem, quam Plato uir doctissimus futuram confirmat, cum aut philosophi regnant, aut reges philosophantur. Tu enim & philosophus es illustris, & fortuna summi imperij uirtuti tuæ coniuncta est. Lege igitur princeps sapientissime, & iudica, an ego rem tibi non repudiandam attulerim: & si bene, ut spero cesserit, age pro tua liberalitate, ut pari studio laborem suscipere alterum, pluraque indies afferre huiusmodi opera possim.

ARISTOTELIS STAGI

RITAE DE HISTORIA ANIMALIVM LIBER
PRIMVS, INTERPRETE THEODORO.

In quibus animalia inter se differant, quibus uel cōueniant, eorundēq; nature diuersitas. Cap. I



ANIMALIVM partes, aut incōposite sunt, quæ scilicet in
similes sibi partes diuidunt, ut caro in carnes, & ob eam
rem similes appellentur: aut cōposite, quæ aptæ secari in
partes dissimiles sunt, nō in similes: ut manus nō in manū
secat, aut facies in facies: quapropter eas dissimiles no-
minemus. Quo in genere partium sunt quæ nō modo par-
tes, uerum etiā mēbra appellentur: uidelicet quæ cum ipsæ
totius integritate describantur, habeant tamē intra se par-
tes diuersas suiūq; generis opificia, ut caput, ut pes, ut ma-
nus, ut totū brachiū aut pectus: quippe quæ & ipsa par-

*A animalium partes
duplex sunt plures aut
compositæ*

tes sint totæ, & ex partibus cōstent diuersis. Quæq; aut pars dissimilans ex similarib;
constat, ut manus ex carne, ossibus, neruis. Habent uero animalia partes, aut eadē
sibi omnes, aut diuersas. Partes easdem uel specie intelligi uolo, ut hoīs nasus, aut oculus,
specie cum naso, aut oculo hoīs alterius cōuenit, et caro cū carne, et os cum osse.
Quod idē de equo, & ceteris quæ specie inter se cōsentire statuimus, intelligi debe-
re: ut enim totū se habet ad totū, sic partes singulæ sese ad singulas habeant necesse est,
uel genere, quanq; excessu, defectu uel inter se differant. De ijs loquor, quorū idem
est genus: uerbi gratia, auis, aut piscis: id enim utrūq; differentijs consumit generis,
Et species cōplures, tum pisciū, tum etiā auium habent: differunt uero inter se partes
penē plurimę eorū contraria affectuū qualitate, ut coloris, aut figuræ, eo qd alie ma-
gis, alie minus affectæ ijs ipsis qualitatibus sint. Multitudine etiā & paucitate, & ma-
gnitudine, paruitateq;, & omnino excessu, defectuq; discrepant, cum alijs crusta, alijs
testa pro tegmine habeat: et alijs rostrū porrectius sit, ut gruibus: alijs breue. Penna
item alijs uerius, alijs parcius data est. Sed tamē in ijs quoq; ratio partium nō ullarū
diuersa est, cum alia calcari, aut aliquo armenī aculeo, alia nihil eiusmodi habeant:
& alijs apex in capite sit, alijs desit. Sedenim qd propē dixerim, partes plurimę, et ex
quibus tota moles cōpacta est, aut eadē sunt, aut ratione contrariorū, & per excessū
sum, defectūmq; differunt. Pluris enim, minorisq; rationē, refertur ad excessum defe-
ctūq; putauerim oportere. Nō desunt quibus partes nec species sint eadē, neq; ex-
cessu, defectu uel, sed proportionē cōueniant: quomodo os cum spina, & unguem
cum solida ungula, & manū cum forcipato pedis, et pennā cum squama conuenire
animaduertimus. Quod etiā penna in auiū genere est, idem squama in piscibus ha-
berur. Partes quas singula animalia habent, hunc in modū diuersas, easdem uel intel-
ligimus, atq; etiā situ contemplamur. Sunt enim complura, quæ eadē habeant par-
tes, sed non situ eodem: uerbi causa, mammas alia in pectore habent, alia in femini-
bus. Partes aut similes, aut molles, ac humidæ sunt, aut siccæ, & solidæ. Molles in-
quam, uel omnino, uel quādiu in sede maneant naturali, ut sanguis, sanies, adeps,
seuum, medulla, semen genitale, fel, lac, ubi haberi id potest, caro, & quæ ijs propor-
tione respondeant. Item excrementa omnia, modo tamen diuerso, ut pistrina, & se-
dimenta alui, atq; uescicæ. Siccas ac solidas intelligi uolo, neruū, cutem, uenā, pilum,
os, cartilaginē, unguem, cornu: æquiuoce enim ad genus appellamus, cum cornu
tum figura, tum toto dicimus. Item quæ ijs proportionē respondent. Animalia uel
ro differētijs, aut per uitas, aut per actiones, aut per mores, aut per partes cōstitui de-
gnū est. Quibus de rebus primū formula quadā agendū, deinde generatim discus-
sione diligentiore differendū cēsemus. Profecto differētijs quæ in morib; uicibus, actio-

*in a uicibus
et uicibus ab actio-*

nūq̃ ratione uerſant̃, colligi debēt, eo qđ alia ſint aquatilia, alia terreſtria. Et aquatiliū ordo duplex: alia em̃ in fluido degūt, uicūq̃ petūt ex humore: quē etiā humorē per uices recipiūt, & reddūt: nec uiuere poſſunt, niſi uerſent̃ in humore. quod pluri mā piſciū parti euenire apertū eſt. Alia degūt quidē in fluido, uicūq̃ inde emoliſcuntur: ſed aërem nō humorē recipiūt, & foris parere ſolēt. Cōplura huius generis ſunt partim grefſilia, ut lutris, latas, crocodilus: partim uolucres, ut mergi, ut uirinatrices. Quinetiā quē nullis pedib. innitant̃, ut natix. Nō nulla cum uicū in humore exerceant, nec foris uiuere queāt, niſi uel aëris uel humoris recipiūt, ut urticę, ut oſtreę. Aquatilis aut̃ generis alia marina, alia fluuiatilia, alia lacuſtria, alia paluſtria, ut rana, ut cordula. Terreſtriū uero animantiū, alia accipiūt, reddūtq̃ aërē (quę res ſpiratio 10 nominat̃) ut homo, & quęcūq̃ terreſtria habēt pulmonē. Alia cū uis aëre recipiāt, tamen ſedē in terra perpetuō tenēt, & uicū indidē capiunt, ut uelpę, apes, & reliqua inſecta. quo noīe ea appello, quorū corpus incifuris præcingit̃, aut parte tantū ſupina, aut etiā prona. Sed cū terreſtriū plura, ut dicū eſt, cibū ab aquis petant, nullū generis aquatilis eſt, qđ & aquā recipiat, & terrā cibi cauſa petat. Sūt porro, quę primū uiuāt in humore, deinde forma immutata, foris uitā incipiunt agere, ut culices paluſtres: ex ijs em̃ aſili proueniūt. Ad hæc, alia ſedē ſtabili degunt, alia mutabili, & uaga. Sedes ſtabilis in humore tantūmodo eſt. Terreſtriū nulla ſtatu immutabili uiuūt. At aquatiliū plura ſaxis affixa uitā omnē traducūt: ut conchę genera cōplura. Quinetiā ſpōgia ſenſum habere aliquē credi: argumēto, qđ multo difficilius abſtrahunt̃: niſi 20 clanculū agat̃, ut reſerūt auuſſores. Sūt item, quę & adherere ſoleant, & quę libuit abſoluūt: ut genus quoddā eius, quā urticā uocamus: quippe cum nōnulla ex ijs nō ſit abſolute paſcañ. Nō deſunt cōplura, quę cū ſint abſoluta, mouere tamen ſe nequeant, ut oſtreę, & quę tota ſimplici, minioriſq̃ teſta operta, uerſibula appellant̃, & calli, aut tubera. Vis item alijs nandi tributa eſt, ut piſcibus, ut mollibus, ut cruſtaceis, uelut locuſtis. Quædā ambulare poſſunt, ut genus cancrorū: quippe qđ quanq̃ ſit apte natura aquatilis eſt, tamen uim habet ambulādī. Terreſtriū uero, alia uolucres ſunt, ut aues, ut apes: quę modo inter ſe quodā alio differunt. Alia pedeſtria, quorū item alia grefſilia, alia reptilia, alia traſſilia ſunt. Animal qđ uolucres tantū ſit, ut piſcis natatilis ſolūmodo eſt, nullū nouimus. Nam & quę pennis cutis uolāt, ingredit̃ poſſe 30 ſunt. Vnde uelpertilionis etiā pedes ſunt, & uitulus marinus pedes habet minutos. Sic nōnullę aues de pedes ſunt, quę ob eam rem apedes, a paruitate pedū nūcupantur: qđ genus auiculę pennis plurimū ualet, ſicut cætera q̃q̃ prop̃ ſimilia, ut pennis præuale, ſic pedib. degenerate uident̃, ut hiriſdo, & ſalcia, ſiue riparia: hæc enim omnia, & moribus, & uolatu, & ſpecie proxima inter ſe conſpiciunt̃. Apparet apes omnibus anni tēporibus. Riparia æſtate tantū, cū imber inceſſit: tunc em̃ & apparet, & capiſ. deniq̃ rara hæc auicula eſt. At uero quę grefſilia, eadēq̃ natatilia ſint, cōplura reperiunt̃. Necnō differēcias illas uitę, actionesq̃ animantiū cōtinent. Sunt enim alię gregales, alię ſolitarię, tum uolucres, tum nantes, tum etiā pedeſtres. Vitā alię ancipitē degūt, ut eadē modo ſocietate, modo ſolitudine gaudeāt. Item alię ciuiles, alię inciuiles. Tū ex gregalibus, tum etiā ex ſolitarijs ſunt, gregales in uolucrū gene 40 re colūbi, grues, olores. Nullū cui ungues aduñd gregatilis eſſe perpēdimus. Cōplura etiā inter nantes piſciū genera gregatim degere ſcimus, ut q̃s curſores uocant. & thunnos, & limoſas, & hamias. Hois naturā ancipitem ſocietatis, ac ſolitudinis eſſe, apertū eſt. Ciuiles appello animātes, quę labori cōmunicāt idem, quarū opus cōmunis eſt: opera, munusq̃ idē om̃i eſt, qđ nō om̃ib. gregalibus cōpetit. Ciuilis generis eſt homo, a piſ, uelpę, formica, grus. Quarū alię ſub duce degunt, ut grues, ut apes: alię nulli ſubditę imperio ſunt, ut formicę, & alia innumera penē genera. Sunt item tam ex gregalibus, q̃ ex ſolitarijs, alię quę ſedē nunq̃ mutant, alię quę mutare ſtato tēpote ſolēt. Et alię, quę carne uelcant̃, alię quę frugibus, alię om̃ia attingāt.

Non

Nō defunt, quę cibo ſui generis utant̃, ut apes, ut aranei. Apes em̃ melle, & quibusdam alijs dulcibus alunt̃. Aranei uenatu muſcarū uiuūt. Nōnulla piſcibus ueſci natura uoluit. Ad hęc, alię aut uim habent uenandi, aut ingenio recōdendi cibi dotatae ſunt. Alię nec ad uenandū aptę, nec ad recōdendū. Itē alię domicilia ſibi parant, ut talpa, muſ, formica, muſca, apis. Alię nullis ſe includere caſis patiunt̃, ut plures tam inſecti generis, q̃ quadrupedis. Quinetū locis diſcrimen aliud exiſtit: quippe cū alię cauernas ſubeant, ut lacerti, ut ſerpētes: alię per ſumma telluris degant, ut canis, ut equus: ac alię foramina ſibi excauent, alię nunq̃ eo munere fungant̃: & alię noctu uagent̃, ut noctua, uel ſpētillo: alię interdiu tantū. Addo etiā alias eſſe cūcres, alias ſeras. Et alias perpetuō cūcres, ut hoiem, ut multū: alias perpetuō ſeras, ut pantherā, ut lupū: nōnullas etiā facile poſſe māſueſcere, ut elephātos. Sed quin aliter partiendū eſt. Genera em̃ quęcūq̃ placida ſunt, hęc eadē ſera q̃q̃ poſſunt reperiri, ut ſues, equi, hoies, oues, caprę, canes, boues. Itē alię mutę omnino ſunt, alię ſtrepitū tantū elidūt, alię uocē etiam formāt. quartū alię loqui poſſunt, alię uocē ſolam nullis expri- mendā literis redditū. Atq̃ alię loquaces, alię taciurnę, alię oſcines, alię inoſcines. Omnium uocalium animantium cōmunis mos eſt, ut ſui in ſuis tēpore potiſſimū canāt, & blaterēt. Alię pręterea camporū incolę ſunt, ut palūbeſ: alię in otis, ut upupe: alię cū hoibus degere ſolent, ut colūbi. Item alię copia libidinis gaudēt, ut perdicū genus, & gallinaceorū. Alię minus Venere ualēt, ut quę coruinā ſpeciem gerūt: quippe quę raro ſoleant coire. Marinarū etiā animantium alię pelagicę, alię litorales, alię ſaxatiles ſunt. Ad hęc, alijs data uis eſt dimicādī, alijs ingeniū cauēdi, & euitādī. Viribus poſſent, quę iniuriā uel inferant alijs, uel illarū ſibi propulſent, ſeipſ defendant. Cautę & prouide ſunt, quę aliquid in ſeipſis pręſidij habent cōtra inferendā iniuriā. Diſſertū pręterea moribus. Nam alię mites, remiſſę, & minime peruiaces ſunt, ut boues. Alię animoſę, peruiaces, brutę omnino, ut ſues ſylueſtres. Alię ingeniōſę ac timidę, ut cerui, lepores, cuniculi. Alię ſliberales, perfidę, inſidioſęq̃, ut ſerpentes. Alię liberales, fortes, & nobiles, ut leones. Alię generoſę, feroces, inſidioſę, ut lupi. Nobile em̃ id eſt, qđ ex bono prodiit generis: generoſum aut̃, qđ nō ā ſua natura degenera- rit. Et alię aſtutę, malicioſę, callidę, ut uulpes. Alię animoſę, & amatrix, & aſſentatrix, ut canes. Alię mites, & māſuetudini addictę, ut elephātes. Alię uerēdixę, & cautę, ut anſeres. Alię inuidię, & ornatus ac politturę ſtudioſę, ut pauones. Homo unus ex numero animalium omnium uim obtinet cogitandi. Et cū memorię, atq̃ diſci- plinę cōplures animates eſſe participes poſſint, nulla tamē pręter hoiem poteſt re- miniſci. Sed de moribus, uitęq̃ generis cuiuſq̃ diligentius poſt.

Quę corporis partes animalibus communes, quę item proprię ſint.

Caput II



Minū aut̃ partes cōmunes animalium ſunt, quā cibis recipi, et in quā deuorā. Quas quidē partes & eaſdē eſſe, & diuerſas, nihil prædictis ratio- nibus prohibet. Aut em̃ ſpecie, aut exceſſu, aut ut proportionē, aut ſitu de terminandū eſt. Ab ijs alię cōmunes plurimorū animalium partes habent̃, & quā cibi excrementū emittit̃. Non em̃ hęc omniſ pars eſt. Partē, quā cibis recipi, os appellamus: in quā deuorā, uentriculū. Reliqua pars multiplici nomine ſignificā. Sed cum duplex ſit excrementū, hoc eſt ſiccū, ac humidū: quę partē illam humidū excrementū capientē habent, hęc ſicci quoq̃ receptaculū cōtinent. Quę uero hoc habēt, nō illud etiā habere omnia nouimus. Quamobrē quę ueſicā habēt, alium eadē etiā obtinēt. At uero quę aluū habēt, nō omnia & ueſicā poſſidēt. Humidi nāq̃ excrementū cōceptaculū, ueſicā: ſicci, aluū nominamus. Reliquis magna ex parte tum et̃, quas enumerauimus partes tributę ſunt, tum etiam quā ſemen genitale mittit̃.

Quomodo animalia inter ſe diſſerant in feminis proliſci emiſſione.

Caput III

Quæ modo gignere animal poſſunt, aut in ſe ipſa ſemen proliſci mittūt, aut in alterū. Fœmina qđ in ſe mittit, appellat̃. Mas, quod in alterū. Sed in nōnullis

Quid nobile -
generoſum

Homo
Nullum animal
reminiscitur de
hominem

discrimē id fœminę & maris nō est. Species quoq; partū quę ad ipsam pertinet procreationē, diuersa est, cū alia uulua habeant, alia quod uulua proportionē respōdeat. Partes hæ sunt quę necessarię uel omnibus, uel plurimis datæ animalibus sunt. Omnibus uero sensus unus tactus inest communis. Itaq; pars qua sentiendi uis ista contineatur, nomine uacat. Alijs enim eadem, alijs ex proportionē habetur.

Humorem quodq; animal habere, aliter tamen uel huius, uel illi inesse.

Caput IIIII



Vmorē item genus quodq; animalū cōtinet, quo si aut per uim, aut per naturā ipsam priuet, in pernitiē agatur necesse est. Habent etiā id diuersum, in quo humor ille & fiat, & contineat. Sunt hæc in alijs sanguis, & uena: in alijs, quod ijs proportionē respondeat: quæ quidē imperfecta sunt: atq; alterū fibra, alterū sanies dicit. Tactus itaq; in parte corporis similari consistit, ut in carne: aut in aliqua generis eiusdē. deniq; in parte sanguinea, aut in ea, quæ ex proportionē uice illius habeat. Omnibus tamē parte similari sensum hunc cōtineri certū est, sicut ē cōtrario potētias agētes partibus dissimilibus tributas esse aperitur: ut ori ciborū confectionē: pedibus, aut alis, aut quibusuis proportionē accōmodatis, officiū incedendi. Ad hæc, animalū alia sanguinē habent, ut homo, equus: deniq; omnia, quæ aut perfecta pedibus carent: aut binis, quaternis uel pedibus cōstant. Alia exanguia sunt, ut apes, ut uespæ. Atq; inter marina, sœpia, locusta, deniq; omnia, quæ pedibus plus, quā quaternis innitantur.

Quę animalia perfectū animal, quę oua, quę uermem gignāt: quōue ritu quęq; incedāt. Cap. V



Tem alia animal gignūt perfectū, alia ouū, alia uermem. Procreāt animal, homo, equus, uirulus marinus: & reliqua, quę pilis integunt: atq; in genere aquatili, quæ cete appellamus, ut delphini: & quæ cartilaginea uocantur. Quorū alteris fistula data est, brachiæ defunt, ut delphinis, & balenis. Habēt delphini fistulā à dorso, balenę à fronte. Alteris brachiæ detectæ, ut mustelo, raia, & reliquisq; generis eiusdē. Ouū id ex fœtibus perfectis uocamus, cuius ex parte principio animal consistit. Reliquū uero alimēto ei, quod gigniū, est. Vermis id est ex quo toto, animal totū per subiecti fœtus formationē, incrementūq; gigniū. Animalū ergo quæ animal generant, aut oua intra se prius cōficiunt, ut cartilaginea: aut illico animal intra se formāt, ut homo, ut equus. At uero in lucem fœtu perfectio, aut animal editur, aut ouū, aut uermis. Ouū ipsum aut putamine continet testaceo, & bicolor est, quale autū esse uidemus: aut cute molli obducit, unicolorq; est, quale cartilaginea, uermesq; pariūt. Vermes item aut cōtinuō mobiles sunt, aut immobiles. Sed de ijs accuratius post, cū de generatione ageſ, differemus. Nunc animalū reliquas differentias addimus. Enimuero alijs pedes natura dedit, alijs negauit. Et quæ obtinēt pedes, aut binos hæc habēt, ut hoies, atq; aues, duo hæc tantūmodo genera. Aut quaternos, ut lacertū, ut canes. Aut plures, ut centipedes, & apes. Verū quæcūq; ambulant, omnia pedes pari numero possidēt. Quæ aut in genere natante pedibus carēt, hæc aut pinnis natant, ut pisces (quorū alij quaternas, binas scilicet partes prona, & binas supina habēt, ut aurata, ut lupus: alij binas tantū, qui longi leuesq; sunt, ut anguilla, ut congrū) aut nullas omnino habēt, ut murena: sed ita mari urunt, ut terra serpentes, modicq; similī repunt in humore. Cartilaginei quoq; generis alia quæ pinnis carent, uidelicet quæ plana sunt, & caudā habent, ut raia, & pastinaca, suāq; ipsa latitudine natant. Raia tamē pinnas habere uidemus, & quæcūq; suam latitudinē nō colligunt in mucronē. Quæ aut pedes habere putant, ut mollia, tum pedibus ipsis, tum pinnis natant, & quidē ijs celerius, iners aut alucius ducit: ut sœpia, lolligo, polypus potest, sœpia & lolligo nequeunt. Crusta insecā, ut locusta suis caudis natant, celerimeq; retrorsum, pinnarū caudæ adiunctarū beneficio. Crocodilus etiam pedibus natat, & cauda: quā similem siluro habet, quoad paruum magno licet conferre. Volucrū aut alia penna uolant, ut aquila, ut accipiter: alie membrana

Raia certe
Theodor. pro
natrachio, siue
rana quādoq;
uerit: nisi alio
terrena lingua
librarius erra
uerit.
† Cordula

brana sicca, ut apes, ut scarabei: alię cute, ut uulpecula, ut uespertilio. Volant pennis, aut cute, quę habent sanguinē. Membranis siccis, quę sanguine carent, ut insecta. Sūt porro, quę uel pennis, uel mēbris uolant, omnia bipeda, aut apeda. Angues enim circa Aethiopiā tales uolare narrant. Genus pennatū, autem appellamus: reliqua duo genera nomine carent cōmuni. Volucris autē generis exanguis alijs pennis, rū tutelę crusta superuenit, ut uaginipennes possint nūcupari, uel ut scarabei. Alijs pennę nulla crusta integunt: quorū alia bipennes sunt, alia quadripennes. Gerunt pennas quaternas, quę aut grandiora sunt, aut aculeo in aluo armanī. Vaginipennis illius ordinis nullum est, quod aculeū gerat. Bipeda anteriore parte aculeos gerunt: ut musca, tabanus, asilus, culex. Omnia quę sanguine carent, minus, q̄ quę habent sanguinē adolefcunt, paucis marinis exceptis, ut mollū nō nullis: quę quidē generā grandiora locis tepidis redduntur, & mari potius, aut dulcibus aquis, q̄ terra. Omnia quę se mouent, aut quaternis notis mouent, aut pluribus. Quaternis tantum, quę habent sanguinē: ut hoies binis manibus, binisq̄ pedibus: aues binis alis, & binis pedibus: quadrupes pedibus quaternis, pisces pinnis quaternis. Nam & quę pinnis aut nō amplius binis, aut nullis, ut serpentes, utinī, quaternis ea quoq̄ notis nihilominus mouent: flexus enim quaterni ijs agunt, aut bini cū pinnis binis. At uero quę sanguine uacua pedibus se pluribus moueant, siue uolucres sunt, seu pedestres, ijs certe motus per notas plures exerceat: ut animal, quod ā uita die uno describenda ephemerū appellatū est, pedibus quatuor, pennisq̄ totidem mouetur. Quippe quod nō solū uitę suę ratione propriū id merito habeat, sed etiā cum quadupes sit, uolucres quoq̄ est. Omnia porro tam quadrupeda, q̄ multipeda modo sibi illi moueri solita sunt: cunctis enim motus per diametrū agitur. Verum cum cetera ducibus binis pedibus incedant, cancer unus quaternis regi solitus est.

Quę animalia habeant sanguinem, quę uel eodem carent.

Caput VI



Vmma uero animalū genera, in quę singula digerant, rediganturq̄ animalia, quibus scilicet illa cōsummant, & consent, hec sunt, auis, piscis, cetus: quę quidē omnia habent sanguinē. Ad hęc genus testa interiectū est, quod ostrēū, siue conchā appellamus: & crusta inclusum aliud, quod noīe uacat cōmuni, ut locustarū, & cancrorū, & gammarorū genera: aliud item molle, ut lolligētes, ut lollij, ut sepię. Adde genus insectū: quę omnia genera sanguine carent. Et quorū natura pedes habere patit, multis hęc pedibus cōstant. Sed insectorū uel aliqua uolucres esse apertū est. Reliquorū animalū genera nulla pręterea ampla intelligunt, unū enim quod plura genera cōtineat, nullū est. Sed aut simplex est, nullis ipsum specificis euariis discriminibus, ut homo: aut diuidi quidē potest in species, sed nullis noībus distinctas. Quę enim genere quadrupede nō pēnato continent, sanguinē quidē omnia habēt: sed alia animal pariūt, alia ouū. Dixerim hęc ouipara, illa uiuipara. Quę igitur animal generant, pilos nō omnia habent: quę aut oua pariūt, cortice omnia muniunt. Cortex hic loco squamę similis potest appellari. Pedestre sanguinē, quod pedibus careat ex natura, generis serpentū est, idq̄ inter cū cortice est. Verū cum cetera serpētes oua pariāt, uel pera una animal gignit. Nō enim pilos omnia habent, quę animal generant: quippe cū nōnulli ex piscibus animal procreant. Quę tamē pilos sortita sunt, animal omnia progignūt. Nam pilos quoq̄ effigie aculei spiculatoros, genus quoddā esse pilorū putandum est, quales herinacę, atq̄ hystrices gerunt. uicem enim uillorū, nō pedum, ut echinorum aculei pręstant. Generis quadrupedū, quę animal gignunt, plures quidem species intelliguntur, sed nullis ferē notatę nominibus. Singulorū enim nomina habentur, ut hominis, leonis, equi, cerui, canis, reliquorumq̄ ad hunc modū. Nullis ferē inquam, quoniam genus unum, uel super ijs omnibus, quę iumenta no-

minamus, est: ut equo, asino, mulo, ginnō, innō, & mulis, quas terra Syria fert, quæ similitudine quadam nomen mularum acceperūt, quanquam non omnino eadem qua mulæ specie continentur. Coeunt enim & mutua inter se ratione progeniūt. Naturam itaque eorum, quæ minus genere certo continentur, seorsum sigillatim consideremus, necesse est. Hæc ita impræsentiarum formula exposuisse quadam prægustandi gratia placuit, uidelicet ut quibus de rebus tractandis, et quatenus esset perlegendum intelligeretur: post accuratius de iisdem differemus, ut primum differentias, atque accidentia, quæ iuncta cuiusque sunt, accipiamus, deinde ad eorum comperendas causas enitamur: ita enim effici potest, ut uia, rationeque docendi utamur naturæ congrua, cum commentatio singulorum antecedit. Hinc enim aperi-
tur quibusnam de rebus, & ex quibus effici demonstrationem oporteat. Primum itaque partes animalium, ex quibus constant, enumerasse par est: ijs enim possi-
mum, atque in primis, tota quoque ipsa inter se differunt, uidelicet, aut eo, quod alia ha-
beant, alia careant: aut situ, & ordine, aut differentiis, quas antehac exposuimus, id est specie, excessu, proportionem, & affectu contrarietate. Sed primis partes homi-
nis explicare debemus. Ut enim numeros ad id quod sibi quisque exploratū, certumque habeat, probare solet, ita ceteris quoque in rebus agendum est. At homo animalium maxime omnium notum nobis necessario est. Partes igitur hominis exteriores, & si non sensum effugiunt, tamen ne sequela, & series continuanda doctrinæ præter-
mitatur, atque etiam ut sensum ratio comitetur, partes primum enumerabimus offi-
ciales, siue instrumentales, deinde simularium ordinem prosequemur.

De summis in hominis corpore partibus, & quid caput, quid item thorax sit. Caput VII



Vimæ igitur partes, in quas primas totum diuiditur corpus, hæc sunt: caput, collum, thorax, brachium duplex, crus duplex. Thoracem eam partem appello, quæ a collo ad pudenda usque trunca pertendit. Capitis autem pars, quæ capillis inlecta est, calua appellatur, cuius pars prior sinciput, nouissime consistere solita. Omni enim ossium corporis, ultimum id concreuit, & induratur. Posterior occiput est. Media inter occiput & sinciput, uertex. Cerebrum sincipiti subditum est: occiput inane. Calua ipsa sanè tota, os
rarum, rotundum, cute gracilentia obductum est. Habet futuras, quæ mulieris est, unam in orbem: quæ autem uiri, tres in idem magna ex parte coeunt. Iam uisum etiam sine ulla futura caput uiri est. Verticem caluæ, medium discrimen, & aquamentum capillorum uocamus: quod nonnullis geminum est. Sunt enim qui facti à natura biuertes sint, uerum non osse, sed capillorum æquamento.

Quid facies in homine. Caput VIII



Adiæm partem eam nominamus duntaxat in homine, quæ caluæ subiecta est. Nam piscis aut bouis faciem dicere non solemus. Partes faciei frons, quæ sub sincipite posita inter id ipsum, & oculos est. Quibus hæc magna, segnes: quibus parua, mobiles: quibus lata, mente moueri idonei: quibus rotunda, iracundi.

De supercilijs, oculis, palpebris, cilijs, pupilla, nigro, candido, angulis: & de ijs animalibus quæ oculis careant. Caput IX



Vpercilia sub fronte bipartito distincta: quæ si in rectum porriguntur mollem subesse animum significant. Si iuxta nasum inflexa sunt, austerum notant, & acerbum. Sed si iuxta tempora inflectuntur, derisorem dissimulatoremque indicant: si uero in totum demissa, notam inuidie habent. Oculi ijs subiacent duo, legitimo scilicet naturæ officio: quorum partes

partes superius inferiusq̃ tegentes, palpebræ appellantur. Pîlos, qui extremo palpebrarum ambitui adherēt, cilium nominamus. Humor oculi interior, quo uidemus, pupilla est. Quod eam ambigit, nigrū dicitur. Quod postremo nigrum circumdat, candidum, siue albugo. Pars cōmunis superioris, inferiorisq̃ palpebræ, angulus est, quem duplicem uterq̃ oculus habet; alterū iuxta nasum, alterum iuxta temporā. Qui si iusto sunt longiores, notam morum maleficorū præbent: si carnosius repectuncolorum sunt, qui naribus iunguntur, malitiam præferunt. Habent profectō oculos, tum cætera animalium genera omnia, præterquam testa interfecta, & si quid imperfectum aliud est: tum ea, quæ animal generant omnia, præter talpam; 10 quam modo quodam habere dixerim, cum tamen omnino habere negem: quippe cum omnino quidē nec uideat, nec perspicuos habeat oculos. Verum si quis prætentam membranam detrahit, locus oculorum apparet, & pars nigra eorundem: situs deniq̃, & descriptio eadem, quam legitimam conspicui oculi obtinent, utpote cum obducta cute oculi pressi, confusi, oblæsiq̃ essent, dum crearentur.

De oculorum uarietate in quibusq̃ animalibus.

Caput X



20

Andidum oculi magna ex parte simile in omnibus est. At quod nigrum dicitur, uariat. Alijs enim atrum, alijs admodum cæsum, alijs fuluum, alijs caprinum, quod morum optimorū indicium est, & ad ceruendi claritatem primatum obtinet. Solus ergo potissimum animalium homo numerosa oculorum uarietate notatur, quum cæteris in suo singulis genere, color sit idem, equis exceptis, qui interdum oculis proueniāt cæsijs. Sunt oculorum alij grandiores, alij parui, alij modici, qui optimi habentur: item alij nimium prominentes, alij conditi, alij modice siti. Qui conditi sunt, clarissimi cernere in genere quoq̃ brutorum animalium possunt. Modicus tamen situs, notam morum est optimorum. Et, aut nimium conuiuent, aut rigidi, intentūq̃ constant, aut modice nutant. Notam morum laudabilium habēt, qui mediocriter conuiuent. Reliquorum alteri impudentiæ, alteri inconstantiae indices sunt.

De aure, naso, temporibus, maxillis, labris, gingiuis, dētribus, lingua, palato, colomella, corumq̃ in quibusq̃ animalibus differentijs.

Caput XI



30

Vis, pars capitis qua audimus, est, ita ut nulla spiratio desideretur. Erat enim Alcmaeon, qui capras spirare per aures credidit. Auris pars exterior, cui est nomen auriculæ, parte constat superiore, pinna: inferiore simbra: tota autem ipsa ex cartilagine, carneq̃ constituta est. At pars interior forma anfractui cochleæ similis desinit in os, quod auriculam planē imitatur, in quod quasi nouissimū uasculum strepitus deuenit. Hinc meatus ad cerebrum nullus est. At in oris palatum usq̃ semita pertendit, & uena de cerebro descendit eodem. Oculi quoq̃ in cerebrum finiunt, & uterq̃ positus super uenula est. Aures homini tantū immobiles: nam eorum quæ sensum obtinent 40 audiendi, alijs auriculæ sunt, alijs defunt, meatusq̃ patent ipsi audiendi, ut ijs quæ penna, aut cortice, squama ue integuntur. At ea quæ animal generant, omnia aurículas habent, excepto uitulo marino, & delphino, & reliquis ita cetarijs. Nam & quæ cartilaginea appellauimus, animal pariunt. Verum homo unus, aurem non mouet. Vitulus ergo marinus meatus continet manifestos, qua audit: at delphinus audit quidē, sed nullis cauernis, quæ uicem præstent aurium. Cætera suas aurículas omnia mouent. Situm aures hominis eundem in orbe, quo oculi obtinent: non ut quadrupedum nonnullis positæ superius sunt. Aurium aliæ leues, aliæ pilosæ, aliæ medium tenent, quæ quidem ad audiendū aptissimæ sunt. Morum hinc præscita nulla habentur. Item aliæ maiores, aliæ paruæ, aliæ mediocres: & aut nimium, aut

B

parum, aut mediocriter arrecta. Notam moram optimorum habent quæ mediocres. At quæ magnæ, arrectæq; ultra modum stultitiæ indices sunt, aut loquacitatis. Partem inter utrumlibet oculum, & aurem, & uerticem positâ, tempora appellamus. Item pars faciei nasus, quæ meatum præbet spiritui: aerem enim ea parte reddimus, & accipimus. Si nuntamentum quoq; eadem agitur parte. quod status uniuersi eruptionis est, signum augurale, & unum ex spirituum omnium generibus sanctum, & iacrum. Tum etiam spiritum trahi in pectus, & inde reddi necesse est: quod fieri non potest, nisi naribus spiremus: cum recipratio spiritus de pectore per gurgulionem, non de capite parte aliqua actitetur: sed datur uiuendi facultas, etiam si desit spiratio. Olfactus quoq; id est, sensus odoris, hac eadem parte sumministratur. Mobiles esse nares natura uoluit, nec sicut aures immobiles sua compage. Pars nasi, quæ cartilaginea nares discriminat, interseptum uocamus. Meatum uero utrunq; inane. Nasus enim bipartito distinctus est tramite. Elephantis proluxa, ualidaq; naris augetur: eiusq; usus idem qui manus: ea namq; cibos tam siccos quam humidos colligunt, capiunt, & in os admouent soli antmantium omnium. Est præterea maxilla duplex, cuius pars prior mentum, posterior mandibula est. Mouent animalia omnia maxillam inferiorem, crocodilo fluuiali excepto: is enim unus superiorem mouet. Labra mox à naso habentur, caro permobilis. Quod autem intra maxillas, & labra describitur, os est: cuius partes palatum, & fauces. Inest pars sentiens saporem, lingua, uim istam sentiendi præcipue obtinens parte sui primore. Nam si interiore tangat, minus sentiet. Omnia præterea quæ caro sentire potest, lingua etiam potestur durum, calidum, frigidum, sua quauis parte, sicut & saporem. Hæc aut lata est, aut angusta, aut mediocris, quæ quidē optima, & explanatissima est. Item aut absoluta, aut constricta, qualis tortorum, balborumq; est. Carne soluta, rara, fungosa, lingua constat. Eius pars quædam ligula est. Bifida oris compago, tonsillæ. Multitida gingiuarum appellantur: carne hæc constat, intrusq; dentes ossi coherent. Parte uero penltiore paratricula pendet, alia uuigera, uenæ applicata, columella nomine, quæ si immodice humefacta intumescat, inflammeturq; nomine uix uocatur, & strangulat.

De collo, pectore, eorumq; partibus.

Caput XII



Ollum, quod inter pectus, & faciem est. Cuius pars prior guttur, posterior gula. quantumq; colli ipsius cartilagineum priorem obtinens situm, uocem transmittit, & halitum, id arteria nominatum est. At uero quantum interius carneum spinæ præiacet, gula dicitur. Pars autem posterior colli extrema, ceruix appellata est. Partes thorace tenus dispositæ hæc sunt. Thorax ipse parte priore, posterioreq; constat. Mox à collo pectus priorem obtinet situm bipartitum, in mammam parte sui utraq; extuberans. Mammis laxior contextus corporis est, iuncta papilla, per quam feminis lac transmissum elicitur. In maribus etiam lac fieri potest: uerum caro ijs spissa, mulieribus fungosa, foraminulentaq; est.

De uentre, inferiorib; uisq; ad feminale membrum.

Caput XIII



Enter infra pectus est parte priore, eiusq; radix umbilicus est. Cuius dici pars subiecta in latus utrunq; ista dicitur. Quæ autē recte subiungitur, fumen est, siue abdomen. Cuius postremum, aquaticulus. Sed super umbilicū hypochondriū est, à cartilagine, quasi subcartilagineum denominatum. Cauum autē commune subcartilagiū, & ilium, chologo est. Partem posteriorem lumbi pari structura præcingunt, unde nomen osphym inditum est. Partis uero excretoriæ, quod subditum quasi stragulum est, nates appellatur. In quo autē semur uersatur, coxa, & acetabulum. Pars feminae propria, uterus

uterus, aut uulua est. Maris, penis, foras postremo thorace propendēs, parte sui pri-
ma carne propemodum confās, & æquabili facie turbinata. Nomen à glande pars
hæc mutuata est: quam quæ integit cutis, uacat nomine: quæ uulnere obductio coa-
lescere nequit, sicut nec genæ, aut palpebræ præcisæ reduci ad unitatē queūt. Totū
tamen, quod ex ea cute, glandeq; cōstat, præputium est. Reliqua pars cartilaginea
est, & augeri ampliter potest, & ingredi, atq; egredi contrā, q̃ iumentorum. Subia-
cent membro genitali testes gemini, cute obducti, quod serotū nominamus. Testes
ipsi nec eiusdē naturæ sunt, cuius caro, nec multū à carne dissidēt. Sed quæadmodū
hæc se habeāt, ac oīno de cæteris huiusmodi partibus, postea accuratius differemus,

10

De uarietate feminalis membri, utri, & mulieris.

Caput XIII



Mulieris autem genitale contrā, quā uiui formatum est. Cauum enim
subditū pubi est, nō sicut maris propensum, ac prominens. Cervice ab
utero effertur, accessum prolifico maris femini præbēs. Exitū humidū
excrementi suo sexus uterq; genitali habet subministrandū. Commu-
nis collis, & pectoris pars, iugulū est. Costæ, brachij, & humeri, ala. Fe-
moris, & imi uentris, inguen. Pars item interior femoris, & naris communis, coles;
exterior, subnatale. Thoracis iam partes omnes primores diximus.

De dorso, cæterisq; partibus posterioribus.

Caput XV

20



Orsum pone, pectus est. Cuius partes scapulæ, & spina, infraq; è res-
gione uentris, lumbi habentur. Communes autē partis superioris, infe-
riorisq; costæ octonæ. Nam de hominibus gentis turdulorum, quos
septenis costis ferunt creati, nullius idonei autoris testimonio constat.
Habet sanē homo suas partes ita dispositas, ut in eo & superius sit, &
inferius, & prius, & posterius, & dextrum, & sinistrum. Constat sanē dextrum & si-
nistrum ex similibus ferē partibus, atq; eisdem. Verum sinistra omnia sunt imbecil-
lora. At posteriora prioribus, & superiora inferioribus discrepant: præterq; quod
inferiora similitudinem superiorem præferre ea dixerim ratione, qua uenter imus
respondere assolet faciei, in corpulentia, uel gracilitate: & crura cum brachijs com-
munem ineunt rationē. Itaq; quibus cubiti breues, ijs etiā femora magna ex parte
breuia sunt: & quibus pedes exigui, ijs manus quocq; paræ habentur. Membri ue-
ro superioris bipartitam compactionem, brachium, siue uulnam appellamus. Cuius
partes, lacertus agilis, gibber, cubitus, manus. Partes manus, palma, & digiti quinque
numero. Digiti pars quæ se inflectit, nodus siue articulus est: quæ rigida constat, in-
ternodum dicitur. Digtus pollex nuncupatus, uno inflectitur nodo, cæteri binis
adducuntur. Inflexus uero, tum brachij, tum digitorū omnium agitur in interiora.
Brachium ad gibberum appellatū inflectitur. Nodus quo cum brachio manus iun-
gitur, coartaturq; brachiale uocamus. Pars interior manus uola dicit: carnosa est;
& scissuris uitæ indicibus distincta: longioris scilicet uitæ, singulis aut binis ductis per
totam: breuioris binis, quæ nō longitudinē totam designent. Exterior nervosa est;
& nomine carens. Membri inferioris bipartita compactio crur est. Huius femur,
quod biceps. Mola, quod locum orbiculatum foris adiectum est. Tibia, quod gemi-
no osse subiaceret. Cuius pars prior crea, posterior sura, caro nervosa, uenosa uē, alijs
retracta à poplite, quibus nates sunt pleniores: alijs detracta, quibus graciliores. Po-
stremū cruris malleolus geminus utriq; partitus lateri est. Pes autē, quod multiplici
osse constat. Cuius pars posterior calx, prior discretæ in digitos quinque est: media
plantæ nomine explicatur, cuius quod carnosum inferius, solū attingit. Vestigium
est, quod superius, pronam conficit partē, nervosum, & nominis adhuc indigū est.
Hæret summis digitis unguis, & nodus interuenit: sed non nisi uno inflexu addu-

cuntur. Quibus pars interior plantæ nō caua, sed ita pleniuscula est, ut solum tota attingat uestigio, n̄ uersuti sunt, & fraudulenti. Cōmune femoris, & tibiæ, genu poplesq̃ est. Partes maris, ac scēminæ cōmunes hæ sunt: quarū situs, quemadmodum ad superius, inferius, prius, posterius, sinistrū, dextrū se habeat, tametsi per corporis summa uisū explorat, ac patet, describēdus tamen is quoq̃, recitandusq̃ est eadem illa de causa, qua superiora enumerauimus omnia, scilicet ut series cōmentandis feruetur perpetua, dum ordinē persequimur omnium, quo minus lateat ea, quæ non modo eodē homines, quo cætera animalia possidēt. Ergo superiora, inferioraq̃ hominem omnium maxime animalū habere, ratione locorū naturalū intelligimus. Eius enim partes tam superiores q̃ inferiores, ad situm orbis uniuersī superiorem, 10
inferioremq̃ dispositæ s̄. nt. Idem quæ priores, posterioresq̃, atq̃ etiā dextræ, sinistræq̃ habētur: cum cæterorum animalium genus, uel omnino respectu eiusmodi careat, uel cōfusus ita cōsiet. Caput itaq̃ cæteris omnibus superiōrē obtinet situm, corporis sui ratione. At homo, quoniam (ut modo diximus) ad uniuersī orbis habitum institutus est, idcirco partē etiā istam habet respondentē parti sublimi uniuersī, Caput, ceruices, & collum, excipiūt tum pectus & dorsum. Alterū prius, alterum posterius est. Subiacent ijs uenter, & lumbi, genitale, & nates: mox femur, & tibia: postremo pedes. Crura uero anteflectūt eodē scilicet quo & incedūt. Pedis etiā pars mobilior eodē se flectit. Calx ē tergo positus est. Malleoli, sitū imitant auriū: quippe qui latera teneāt imi cruris, quomodo aures iūctæ lateribus capitis habētur. Brachia 20
ex latere corporis sinistro, dextroq̃ dependēt, atq̃ se introflectūt, ita ut homini potissimum deuexa crurum & brachiorum aduersa inter se sint. Sensus autē, partesq̃ eorū sensorias, oculos dico, nates, linguā, eodem scilicet priorē in partē spectātes habemus. At auditū, eiusq̃ partem sensoriam, id est aures, à latere, eodē in orbe, quo oculos. Distāt oculi hominis sibi interuallo, proportionē magnitudinis respectu cæterorum animalium, minimo. Tactus ē sensibus homini exquisitissimus, deinde gustus: reliquis superatur à multis. Ita partes exteriores collocatæ, atq̃ dispositæ sunt, nominatūq̃ præcipue, & cognitæ per usum, situmq̃ euidentiorē habentur.

Cum quibus animalibus hominis cerebrum, gula, arteria, & uenter conueniant.

Caput XVI.



T uero interiores contrā. Sunt enim hominum in primis incertæ atq̃ incognitæ. Quamobrem ad cæterorū animalū partes, quarū similes sint humanæ, referentes, eas cōtemplari debemus. Primum igitur cerebrum capitis priorē obtinet situm, non modo in homine, uerum in cæteris etiā animalibus, quibus ea pars data est. Omnis autem in ijs 10
est, quæ sanguinē obtinent, & ob eam rem sanguinea appellatur: atq̃ etiā quæ molli nomine speciali nuncupatur. Sed homo plurimū cerebri proportionē magnitudinis, ac humidissimū habet. Continent id membranæ duæ: altera ossi adherens, ualida: altera ipsum cerebrum attingēs, infirmior. Bipartitum omnium cerebrum est, postremumq̃ igitur, quod cerebellū appellatur, quod certe & tactū, & speciem 40
mam habet diuersam. Pars uero posterior capitis, inanis, & caua omnibus est, pro ut in singulis magnitudine uariatur. Quibusdā enim caput grande, facies subiecta capiti parua, ut quæ rotunda sunt facie. Alijs caput paruum, maxillæ longæ, uel ut generi omnium ceterorum. Cerebrū omnibus priuatū sanguine est, nec uenā intra se ullā continet, & ad tactum frigidū per naturā est. Habet suo in medio plerisq̃ omnibus cauum quoddā exiguum: membrana obhærēte uenosa, cuticulariq̃ obducitur. Ossē postremo cōtinetur tenuissimo, infirmissimoq̃ omnium capitis ossium, cui nomen occipiti. Meatus ab oculis terni ad cerebrū pertinet, ita ut maximi, & mediocres ad cerebellū tendāt, minimi ipsū cerebrū adeant. Minimi ij sunt, qui propiores nari-
bus

bus oriuntur. Maximi porro illi æqui distāt, nec usquam coire possunt. Mediocres
coeunt: quod præcipue in genere piscium pater: & cerebro sunt ij propiores, q̃ ma
gni. Minimi perq̃ laxo inter se distant interuallo, & nunq̃ ob eam rē possunt coire.
Gula intra collū est, ab angustia & longitudine nūcupata: cui comes arteria iūgitur,
priorē obtinēs sitū in omnibus ijs, quæ eam habere naturæ placuerat. Habēt autem
omnia, quibus pulmo est. Natura cartilaginis arteria constat, & sanguinis per q̃ ex
gui compos est, uenulis cōplexa tenuibus. Quod ad superiora, id est oris habitum
pertinet, ē regione posita est foraminibus nariū, quæ in oris partem patefciūt. Vnde
tit, ut quoties inter bibendū humor retrahitur, effluat ex ore per nares. Iūgitur lin
10 guæ postremæ, quæ ligula nominata est, posita inter ea, quæ modo dixi, foramina:
uide licet apta, quæ per uices arteriæ foramentū, quod ad os spectat, operiat. Arteria
altero sui extremo, cū lingua ima cōiungitur, altero ad pulmonis intercapē dinē de
scēdit, tum in utraq̃ finditur partē pulmonis. Esse nanq̃ bipartitū pulmo omniū
expetit. Verū in ijs, quæ animal generāt, distinctio non æque apparet, minimeq̃ in
homine. Est præterea hominis pulmo simplicior, nec ita multifidus, ut non nullorū
animal procreantū est, nec leuis, sed inæquabilis est. At in ouiparo genere, ut aui
bus, & quadrupedibus, quorū partus oui primordio inchoari solitus est, pars altera
pulmonis multū discissa ab altera est, ita, ut binos habere pulmones uideatur. Atq̃
a singulari arteria partes in utraq̃ pulmonis latus duæ dependent. Venæ quoq̃
20 maiori, ac alteri, cui nomen est aortæ, pulmo connectitur. Spiritus uero quoties in
flatur arteria, caua subit pulmonis. Hæc mucronata specie cartilagineis diducuntur
corpufculis, de quibus foramina quoquouerſus per diminutiones arditionibus, sub
inde ampliora ex cipiētibz transmittuntur. Cor etiā arteriæ iungitur, obefis, cartila
gineis, fibrosisq̃ uinculis: & qua annectitur, cauum est. Spiritus dū arteria inflatur,
an subeat cor, minus in nōnullis cōstat scilicet minutis. At in grādiōribz animalibz,
spiritum cor subire ipsum apertum est. Arteria ita se habet: & accipiēdi, reddendiq̃
tantūmodo spiritus officio fungitur. Nihil etenim aliud uel siccum, uel humidū pa
ti ipsa uidetur: sed ubi in eam tale quid deerrauerit, tandiu torquetur, dum excutiat
quod delapsū est. Gula ab ore & ipsa dependet, continua tum spinæ, tum arteriæ
30 nexu fibrarum: & per septum tranſuersum in uentriculū finit, carnis speciem refe
rens, & pariter distendi in longum latumq̃ habilis. Venterculus autē humanus ca
nino similis est, quippe quī nō multo amplior sit, quā intestinū, sed quasi intestino
similis ampliori. Tum intestinū simplex flexuosis orbibus est, a quo proximū inte
stinum admodum amplum. Alius autē ipsa suillæ similis est: quippe quæ & ampla
sit, & quod usq̃ in sedē porrigitur, breue id, corpulētumq̃ transmittat. Omentum
medio a uentre dependet, quod non nisi pinguis membrana est: sicut etiā in cæteris
animantibus, quæ unum continent uentrem, & utraq̃ parte oris dentata sunt. La
40 ctes super intestina positi sunt, qui & ipsi latiore constāt membrana, & pinguescūt.
Pendēt ex uena maiore, atq̃ aorta, uenasq̃ per multas frequenti concursū dese
rentes. Gula, arteria, uenter, ita se habent.

De corde hominis, cæterorumq̃ animantium, & eius sede.

Caput XVII.



Or sinum triplicē continet, iacet paulō a pulmone superius ad arteriæ
fissuram, opertum membranæ inuolucro pingui, & corpulento, qua
uenæ maiori adnectitur, & aortæ. Iungitur cum aorta suo mucrona
to turbine, in pectusq̃ parte eadem uergit omniū pariter, quæ pectus
fortiuntur. Omnibus uero tam pectore cōstitutis, quā ea ipsa parte
carentibus, cor æque suo mucrone in partem uergit priorem: uerum latere sapius

B 3

Lactes reddit
Theod. pro me
fenterio. Quo
modo autē ex
eufetur, uide ad
pud Hermol.

potest, quoniam dissectio animæ dimoueat. At parte sui ampliore, & gibba, superiora corporis spectat. Habet maiorem partem sui mucronis carnosam, & spiliam, & nervulos suis in cauis continet. Situm cæteris animalibus in medio pectore est, in quibus scilicet pectus inest. Homini tantum in partem sinistram potius uergit, paulo a mammarum dislinatione ad laeuam inclinans papillam pectoris parte superiore: nec magnus est, & specie tota non oblongus, sed rotundus. Parte tamen extrema in acutum se colligit, exitusque penè in mucronem. Habet, ut modo exposui, sinum triplicem: maximum dextro in latere, minimum in sinistro, medium magnitudine inter sinistram & dextrum. Omnes ad pulmonem foraminibus peruij redduntur. Quæ res in uno tantum perspicua est. Inferius uero à nexu suo, maximo sinu uenæ coniungitur maiori, ad quam lactes etiam sunt. Sinu autem medio aortæ annexum est. Quinetiam ad pulmonem meatus à corde ducitur perpetui, findunturque eodem, quo arteria, modo, in omnes pulmonis partes: & meatus, qui eodem ab arteria tendunt, sequuntur. Verum hi superiores obtinent situm, neque ullo communi foramine ad illos committantur, sed sua ipsi copulatione spiritum, quem cordi transmittant, recipiunt, pertinet enim alter ad cauum dextrum, alter ad sinistram. De uena maiore, ac de aorta separatim ratione communi post differemus. Sanguinis autem plurimum pulmo ex cæteris continet membris, quæ animal pulmonis compos, idemque uiuiparum intus, foris uel constituitur: quippe qui totus inanis sit, & fungosus, ac riuulos uenæ maioris singulis suis fistulis excipiat. Errant enim qui sanguinis uacuum pulmonem esse arbitrantur, decepti scilicet conspectu eorum pulmonum, quos dissectis detraxerint animalibus, quorum sanguis ilico effluit uniuersus. Cor unum ex reliquis uisceribus sanguinem habet. Et cum pulmo non intra se, sed in uenis contineat sanguinem, cor eundem intra se continere apertum est: singulis enim suis sinibus sanguinem tenet, uerum tenuissimum medio. Sub pulmone septum transversum pectoris est, quæ præcordia, & cinctum appellat, colitis, & subcartilagineis, & spinæ annexum, parte media tenue, membraneaque exiliter contextum. Venas etiam per se continet portectas. Sunt porro hominis uenæ crassæ proportionem humani corporis,

De iecinore, liene, felle, renibus & uescicæ.

Caput XVIII



Ecur supra septum positum à dextro latere est. Lien à lauo æque in omnibus, quæ membra ista disposita habent per naturam, non prodigiose. Iam enim legitimum illum locum in nonnullis quadrupedum lienem cum iecinore permutasse uisum est. Ventri lien annectitur, quæ omentum obducit. Est hominis lien suillo similis, sed specie angusta, & longa. Iecur magna ex parte, maximeque animalium numero felle caret. Verum in nonnullis id habere sibi adnexum uidetur. Rotundum iecur hominis est, ac simile bubulo. Felle priuationem uel in uicinis nonusquam percipi certum est: quippe cum parte quadam agri Chalcidici Euboicæ fel nullum pecori sit. At in Naxo, omnibus ferme quadrupedibus adeo grande, ut qui sacra fecerint aduenæ stupefacti, rem scilicet prodigij loco sibi arbitrantes, non talem esse naturam terræ illius quadrupedum, licet uenæ maiori adnexum est, nulla ex parte aorta attingens. Vena enim quæ à maiore proficiscitur, iecur transigit, qua portæ appellatæ iecoris habentur. Lien quoque uenæ uni maiori adnexum est. uena enim inde ad lienem pertendit. Renes post hæc iuxta spinam ipsam adheret, bubulis similes. Dexter in omnibus, quibus sunt renes animalibus, superiorem obtinet locum, minusque pingui obducitur, & ferior est: quod uel in omnibus æque liquidum manifestatur. Pertinet ad renes meatus tam ex uena maiore, quam ex aorta, sed non ad cauum. quod alij amplius, alij arctius sua media parte continent: præterquam in uitulo marino, cuius sanè renes, quamuis bubulis similes sint, tamen omnium solidissimi uisuntur. Meatus uero qui

eò pertinent, omnes in renum corpus absumuntur: cuius rel argumentū est, quod sanguine carent, nec intra se quicquam con crescere ostendunt. Habent igitur, ut modo dixi, sinum exiguum, à quo meatus duo insignes ad uesicam deueniūt. Alij etiam ex aorta frequentes, ac ualidi eodem pertendunt. Ex medio autē renum singulorum uenæ singulæ, cauæ, neruosa dependunt, spinam prætereuntes ipsam angusto itinere: tum in utranq; abolentur coxam, ac denuò ibi porrectæ apparent, demumq; in uesicam descendunt. Hæc enim loco ultimo posita est, meatibus annexa illis porrectis à renibus ad ceruicem, urinarium producentem meatum, & serè circumundiq; extenuatis in fibras membranulis proximis, quodammodo septo illi transuerso pectoris deligata. Est profectò uesica hominis proportionem, quàm cæterorum, amplior.

De genitali membro, & testibus: quibus uel corporis partibus mai à sexmina differant.

Caput XIX



Enitale ceruici uesicæ adnectitur, foramine foras directo perulum: sed paulò inferius altero intra eandem semitam cōiugio deductum. Quorum foraminum alterū ad testes, alterum ad uesicam, neruosum, cartilaginofumq; tendit. Testes ex eo manibus pendēt: de quibus postea partium communi examine, quemadmodum se habeat, differemus. Hæc eodem modo uel in sexu semineo omnia natura conformauit, atq; disposuit. Nulla enim parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero: cuius forma qualis sit, ex confectionum descriptione petendū, expectandumq; est. Situs eius ad intestina infra aluum à parte priorē: tum uesica iuncta supra uterū est. Sed de uteris quoq; pariter omnibus differendum postea est. Neque enim similes dati omnibus sunt, nec forma simili constituti, si uterus cæterorum quoq; animalium uulua dicenda est. Partes hominis, tum interiores, tum exteriores, has, talesq;, & ad hunc modum haberi perspectum est.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER SECVNDVS,
INTERPRETE THEODORO.

Quæ animalia in quibusdam conueniunt, in quibusdam autē differant. Caput I



CAETERORVM animalium partes, aut cōmunes omnium sunt, ut superiore uolumine explicatum est: aut aliquorum generum propriæ. Eadem autē, diuersæ uel inter se sunt, eo modo quo superius dictum est: quippe cum omnia serè animalia genere diuersa, partium quoq; suarū plurimas specie habeant diuersas: & aut proportionem tantū easdem, genere autē diuersas: aut genere tantū easdem, specie autē diuersas. Sunt etiam complures, quæ alijs datæ, alijs denegatæ sunt. Ergo quadrupes quæ animal generant, caput, collum, & omnes capitis partes forūitur: uerum ipsæ singulæ partes forma inter se differunt. Iam leoni ceruix osse uno rigida constat, nec uer tebris ullis iungitur. Interiora autē omnia canibus similia continentur. Habent quadrupes, quæ animal generat, omnes uice brachiorum crura priora: sed præcipue, quæ multitudine sunt, hæc manibus suo digitato pede respondent. hoc enim ad plura quasi manum utuntur. Partem etiam læuam minus quàm homo absolutam habet, & agilem: excepto elephanto, qui digitos numero quinq; indiuisos, leuiterq; discretos, crura priora multo posterioribus longiora, & malleolos posterioribus imis cruribus possi-

det. Habet præterea talem tantamq̃ narem, ut ea manus uice utatur: quippe qui non nisi ad os illam admouens, & bibat, & edat: suo etiam rectori eam erigit, atq̃ offert, & arbores quoq̃ eadem prosternit. & quoties immerfus per aquam ingreditur, ea ipsa edita in sublime, reflat, atq̃ respirat. Ad unciuscula parte sui postrema, naris hæc est, sed flecti non potest: cartilaginea enim, & proinde rigidiuscula est. Solus etiã animalium homo ambidexter, hoc est, dexter manu utraq̃ nascitur. Pectus animalia omnia humano proportionatum pectori habere uidentur, uerum non simile. latum enim pectus humanũ est, cætera angusta. Nullum est enim quod præter hominem mammas parte gerat priore. Elephãtus mammas duas quidem, sed non in pectore habet, sed paulò citra. Flectunt autẽ crura priora contrã, atq̃ posteriora: & e contrario quàm homo membra inflectunt, exceptio elephanto. Quadrupes enim quæ animal generant, genua ante se flectunt, suffragines in auersum: aduersaq̃ inter se habent conuexa curuaturæ crurum suorum. Elephas, non ut alii qui retulerunt, agit: sed considendo crura inflectit. nequit tamen præ nimio pondere, utrunq̃ in latus æquilibrio quodam uergere: sed aut læuo incubat, aut dextro, atq̃ eo ipso habitu requiescit. Flectit hic certe suos posteriores poplites modo hominis. At ouiparis quadrupedibus, ut crocodilo, lacertæ, & reliquis generis eiusdem crura, tum priora, tum etiã posteriora retro flectuntur, paulum in latus uergentia. Nec secus in cæteris mulipedibus agitur, nisi quod medijs pedes subinde ambigui amplius in latus flectuntur. Homo inflexum membrorum suorum eodem e contrario agit: quippe qui brachia retrorsum flectat, quanquam ita, ut paulum uergat in latera exteriora, crura autẽ contrahat recte. Sed quod antẽ tam priora, quàm posteriora inflectat, nullum est. Omnibus uero humeri, armi uel contrã, quàm cubiti, aut crura priora flectuntur. Coxæ etiã contrã quàm suffragines. Cum itaq̃ homo contrã, quàm magna pars cæterorum animalium flectat, sit, ut si qua alia membris huiuscemodì constant, ea quoq̃ e contrario flectant. Aues etiam suos inflexus similes quadrupedibus agunt: crura enim quæ bina habent, in posteriora curuant. alas, quas uice brachiorum, aut crurum priorum obtinent, in priora. Vitulus marinus tanquam læsa, imperfectaq̃ quadrupes est: quippe qui continuo à scapulis pedes habeat manibus similes modo ursæ. In quinos enim linduntur digitos, qui singuli ternis articulis flectantur, & unguibus muniuntur non magnis. Pedes quoq̃ posteriores quinq̃ discretos digitos habet, & curuatura & unguibus cum primis conuenientes, uerum forma proximos piscum caudis. Motus animalium quadrupedum, ac multipedum, per diametrum agitur: quo modo subsistere etiã solent. Initium autem incedendi omnibus à dextris partibus. Gradiuntur pedatim leones: & genus camelorum utrunq̃, bactrianũ dico, atq̃ arabium, pedatim incedit, cum pes sinister non transit dextrum, sed subsequitur. Partes, quas homo habet priores, quadrupes infra habet supinas. Quas autẽ ille posteriores, hæc pronas. Magna item quadrupedum pars caudã habet: nam uitulo quoq̃ marino cauda inest, quamuis exigua, cerui modo. De genere simiarũ postea dicemus. Omnia ferẽ quadrupeda, eademq̃ uini para, sunt pilosa: nec hominis modò læuia esse nouimus. Homo certe paucissimis, exquisitq̃ integris pilis, nisi in capite, qua quidẽ parte hirtissimus omnium ipse est. Cæteris quæ pilis uestiunt, partes prone pilosiores sunt, supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilosæ habentur. At homo contrã. Cilium etiã homini utraq̃ in palpebra, & alæ oppletæ pilis & pubes: quod cæteris abest. Carent enim cilio palpebræ inferiores, sed paulò inferius pilis rari nonnullis exeunt. Ipsorum autẽ quadrupedũ pilis interiorũ, alijs corpus totũ est hirtũ, ut sul, ursæ, cani. Alijs collũ hirtius pari undiq̃ modo, ut leoni, & reliquis iubat. Alijs prona tantũ ceruicis, à capite ad summos artus ulli geruntur, ut equo, ut mulo, & reliquis capronatis, quo in genere bonafus, quoq̃

quoq; è syluestribus cornigeris enumeradus est. Quinetià hippelaphus satis lubæ
summis continet armis, qui à forma equi, & cerui, quam habet composita, nomen
accepit, quasi equicervus dici meruisset. Necnon fera, quæ & ipsa ab equo Hippar
dium nominata est, capronas parte gerit eadem. Sed utrunq; id genus tenuissimo
lubæ ordine à capite ad summos arcos crinescit. Propriū equicervus uillus, qui eius
gutturum modo barbæ depēder. Gerit cornua utrunq;, excepta femina equicervini
generis: & pedes habet bisulcos. Magnitudo equicervi non diffidet à ceruo. Gignit
tur apud Arachoras: ubi etiā boues syluestres sunt, qui differant ab urbanis, quan
tum inter suos urbaños, & syluestres inter est. Sunt colore atro, corpore robusto, r
10 ctu leuiter adunco, cornua gerūt resupinatiota. Equicervus cornua sunt capræ pro
xima. Elephātus in quadrupedū genere hirtus minime est. Caudæ etiā animalium
pili corporis modum imitantur, dummodo cauda nota aliqua auctiore dependeat:
est enim nōnullis tam exigua, ut uix dignosci à sensu possit. Camelus propriū inter
ceteras quadrupes habet in dorso, quod tuber appellat: sed ita, ut Bactrianæ ab
Arabijs differant. Alteris enim bina, alteris singula tubera habentur. Sunt etiam
omnibus singula parte ima, quale in dorso tubera, quibus incubat reliquū corpus,
& firmetur, quoties in genua inclinātur. Papillas quatuor modo uacæ habet came
lus, caudam asino similem, genitale retro. Genua singula in singulis cruribus sunt,
& flexus artuum, nō ut quiddā perhibent plures: sed propter alui interuallū plures
20 esse uidentur. Habet etiā talum similem bubulo: clunes proportionē magnitudinis
paruos. Bisulcum id animal est, nec utrinq; dentatum. Sed bisulcum sic est, ut pes
parte superiore scissus paululū sit ad flexum digiti secundū: parte autē priore sum
ma, quadripartito findatur discrimine paruo, quantū primotenus digiti inflexu, &
quiddam inter fissuras, perinde ut in anserum pedibus adiectum contexat. Pes uer
stigio est carnosus, ut ursæ: qua de causa eas quæ per exercitum longiore itinere fa
tiscunt, calceant carbatinis. Omnium quadrupedū crura ossē neruoq; abundant,
carne deficiunt. Quinetiā nullū, quod pedibus constet, excepto homine, pedes ha
bere carnosos perspectū est. Coxarū etiā carne exuberante, in clunes uacant, quod
in genere auiū conspicī apertius potest. At homo contrā: quippe qui nullā ferē sui
30 corporis partē tam carnosam habeat, q̃ nates, femora, tibias. Quas enim suras uo
camus, nō nisi carnis copia, parte tibiarū posteriore complētur. Quadrupedū autem
quæ sanguine consistāt, eademq; animal generāt, aliæ multitudine sunt, quales homi
nis manus, pedesq; habentur. Sunt enim quæ multiplices pedū fissura digitentur, ut
canis, leo, panthera. aliæ bisulcæ sunt, quæ forcipem pro ungula habeāt, ut oues, ca
præ, cerui, equi fluuiatiles. aliæ infisso sunt pede, ut quæ solipedes nominantur, ut
equus, mulus. Genus sanē suūm ambiguum est. Nam & in terra Illyriorum, & in
Pæonia, & nonnullis alijs locis sues solipedes gignūtur. Bisulca igitur binis fissuris
utrinq;, id est à parte priore, posterioreq; diducūtur. Solipeda eam partē continentē
ex toto habēt. Sunt item animantiū, alia cornigera, alia mutila. Quæ cornua gerūt,
40 bisulca magna ex parte per naturā sunt, ut bos, cervus, capra. Quod autē idem &
solipes, & bicornis sit, nullū est, quod nos adhuc norimus. At solipes, idemq; unicolor
ne est, quanq; rarū, ut asinus Indicus. Ille enim & unicornis, & solipes est. Vnicor
nis uero, idemq; bisulcus oryx est. Talum etiā asinus Ille Indicus solus in solipedum
genere possidet. Sus enim, ut modo dixi, ambiguus est: quo fit etiam, ut talo careat
probiore. Per multa ex bisulcorū numero talum habēt. At uero multitudine nullum
adhuc talū eiusmodi habere cognitū est, ut ne hominē quidē habere certū est. Sed
lynxi femitalo simile quiddā: leoni autē tortuosum in anfractu est, quale effingunt.
Omnia uero qbus datus est talus, cruribus etiā posterioribus continēt, ita ut erectus
in suffragine parte sui prona foras, supina intorsum spectet, & quæ ueneres uo

cantur, intus aduersæ sibi posite sint: quæ canes, foris: quæ antennæ, supra habeantur. Situs talorum omnium talis est. Sunt nonnulla, quæ simul bifurca sunt, & iubam habeant, & cornua bina, orbem inflexu mutuo colligentia gerant, ut bonafus, qui in Præonia terra, & Medica gignitur. Quæ autem cornuta sunt, eadem omnino quadrupeda esse certum est, nisi quid per translationem cornu habere dicatur: quemadmodum Aegyptij de colubris Thebanis perhibent, quasi aliquid illis ueluti uestigium cornus extuberet. Ceruo ex cornigeris unum cornua tota solida, cæteris caua quodam tenus, & mucrone demum cōcreta sunt. Pars caua ex cute potius oritur, quam solidum quiddam osse enascens subit, impletque totam: quomodo cornua bouum constare uidemus. Soli etiam ceruo cornua omnibus annis decidua, initio à bimatu: cæteris perpetua, nisi per uim aliquam amittant. Mammæ item haberi uarie certum est. Nam & inter se ipsæ quadrupedes, & ab homine mammarum differunt ratione. Membrorum etiam quæ ad uenerem coitum accommodata habentur, discrimen planè est. Patet ratio uaria mammarum: cum alijs mammæ parte priore, hoc est, in pectore, aut iuxta pectus sint binæ, binisque papillis, ut homini, ut elephanto sub armis duæ, tam maris, quam feminae perquam exiguae, nec pro corporis uastitate, ita ut eas à latere conspiciere propemodum nequeas. Viriæ mammæ habet quaternas. Alijs mammæ inter femina binæ, papillæque binæ, ut ouibus. Alijs papillæ quaternæ, ut uacis. Quibusdam nec in pectore, nec in feminibus mammæ, sed in uentre habentur, & quidem plures, uerum non omnes pares, ut canibus, ut suis. Cum itaque cætera id genus habeant plures, pantheræ quaternas uentre medio gerunt. Camelus quoque in uentre mammæ duas cum papillis quatuor habet, ut bos. Leæna etiam duas in uentre. Maribus solipedis generis nullæ sunt mammæ, nisi ijs, qui matri similes prodierunt: quod in equorum genere evenit. Genitale marium alijs foris est, ut hominibus, equo, & alijs multis: alijs intus, ut delphino. Quibus foris est, ijs aut ante habentur, ut homini, & reliquis quæ modo dixi, aut retro. Quinetiam ijs, quæ ante gerunt, aut & penis, & testes absoluti pendunt, ut hominibus: aut aluo adherent, & aut plus, aut minus absoluuntur. Non enim pariter apro, & equo membrum hoc absolutum est. Elephantus etiam genitale equo simile habet, sed paruum: nec pro corporis magnitudine. Testes idem non foris conspicuos, sed intus circa renes conditos habet: quocirca intum celerius agit. Alijs itaque testes absoluti, ut equo: alijs non absoluti, ut apro. Sus femina, genitale ea continet parte, qua pecoris ubera habentur: & cum per libidinem turget, ac prurit ad coitum, sursum tantisper hoc retrahit, uertitque foras, ut inde maris coitus sit facilius. rescissum id longe productius, & dehiscens amplius est. Genitale maxima animalium parte ita se habet. Nonnulla ex aureso mingunt, ut lynx, leo, camelus, lepus. Mares igitur ita inter se discrepant, ut expositum est. Feminae omnes ex aureso mingunt: quippe cum etiam femina elephantorum genitale, ut cæteræ, inter femora habeat. Genitalis uero ipsius differentia numerosa est. Alijs enim cartilaginofum, carnosumque est, ut homini: quod ut parte carnosâ inflari nequit, sic cartilaginosa intumescit, excrefcitque. Alijs neruofum, ut camelus, ut ceruo. Alijs osseum, ut lupo, uulpe, mustelæ, ictidi, id est mustelæ rusticæ, quam uiuerram interpretor: nam is quoque osseum gerit. Ad hæc, homo cum ad iusta incrementa peruenit, partem superiorem habet minorem quam inferiorem, contra, atque cætera animalia, quæ sanguine consistunt. Partem superiorem intelligi uolo, quantum de capite ad eam pertinet partem, qua exitus patet excrementis. Inferiorem autem, quantum ab ea ipsa subsequitur reliquum corporis. Animalibus ergo, quæ pedibus inniti natura uoluit, crura posteriora partem complent inferiorem. Quæ autem pedibus carent, ijs cauda, & quicquid uice caudæ, simileque habetur, pro parte inferiore est. Tales perfectis iam incrementis animantes euadunt. Discrimen

men autē in crescēdo est. Homo enim prius quā aduītor sit, partem superiorem corporis habet maiore, quā inferiorē : & quo per aetatem amplius augetur, eo contrā uenit, ut inferiora sint superioribus lōgiōra. Quamobrē unus ipse non modo eodem ingredi solet, infirma adhuc aetate, quo iam firma ingreditur: sed primum dum infans est, quadrupes reprat, deinde se erigit, bipesq; incedit. Sunt quæ ex proportionē incrementi partis utriusq; capere soleāt, ut canis. Nonnulla primum parte superiore minora sunt, pōst maiora cum creuerint, eadē parte euadunt : ut iumēta. nullū enim ex ijs addita aetate auctius redditur ea parte, quæ ab ungula ad clunem porrecta est. Dentes etiā cæterorū animalū multiplici differentia, tum inter se, tum
 10 hominis ratione euariant. Habēt enim dentes omnia, quæ quadrupeda, sanguinea, quæ uulpara sunt, sed uarie. Sunt enim alia utrinq; dentata, alia altero dentium ordine carent. Quæ enim cornua gerunt, hæc non dentata utrinq; sunt: quippe quæ primoribus maxillæ superioris careāt dentibus. Quamquam sunt nonnulla, quæ & cornibus uacent, & utrinq; dentata nō sunt, ut cameli. Item alia dentes habent exteros, uel ut aper: alia sine ijs sunt. Et alijs dentes serrati, ut leonī, pantheræ, canī. Alijs continui, ut equo, ut boui. Sunt enim dentibus serratis, quorū series acutorum dentium mutua insertionē pectinatim se cōstipat. Quod autē simul & dentē exertum, & cornu habeat, nullū est: nec uero quod simul & serratis dentibus sit, & alterutrum habeat illorum, hoc est uel cornu, uel dentem exertum. Primores maxima ex parte
 20 habent acutos, interiores planos. Vitulus marinus serratis omnibus est, ut generi piscium affinis: piscibus enim serē omnibus serrati sunt dentes. Genus autē, quod duplicem dentium ordinem habeat, nullum nostrō in orbe est: uerum apud Indos (si Ctesia credendū est) bellua gignitur (ut ille scribit) cui nomen mantichoræ, dentes triplici utrinq; ordine, magnitudo, hirsutudo, & pedes leonīs, facies & aures hominis, oculi cælij, color rubricæ, cauda scorpionis modo terrestris aculeo armata, spiculaq; agnata iaculans, uox fistulæ, tubæ uel non absimilis, cursus non minoris perniciousitatis quā ceruus, feritas tanta, ut nunquam possit mitescere, appetitus præcipue carnis humanæ. Mutantur dentes, tum hominī, tum etiā quibusdā alijs animalibus, ut equo, mulo, asino. Homini primores mutantur. Maxillares autē nullum
 30 animal mutat. Sus, nullum omnino dentem amittit.

An canes mutant dentes, quo uel modo uetustiores à recentioribus distinguantur.

Caput II



E canibus diuersa sentētia est, quippe cum alijs nullum ijs decidere dentem opinētur, alijs caninos tantū appellatos mutare uelint, quos etiam homo amittit: uerum hoc latēre, propterea quia nō ante mutant, quā pares intus enascantur. Quod idem uel in cæteris scilicet feris euenire uerisimile est. Et quidem caninos tantum mutare perhibentur. Aetas uetustiorum, recentiorūq; canum dentibus iudicatur. Iuuenibus enim dentes canidi, & acuti: aetate prouectis, nigri, obtusiq;.

Dentes equorum in senectute candidiores fieri, pluresq; mares, quā feminas habere dentes.

Caput III



Gitur certe in equis cōtrā, atq; in cæteris animalibus: cum enim cæteris senectute dentes nigrescant, equo candidiores redduntur. Planos ab acutis determināt, qui canini appellātur, formæ utrorūq; participes: quippe qui infra latiusculi, supra acutiusculi sint. Maribus dentes plures q; feminis, ut in genere hominū, ouīū, suū, caprarū patent. In cæteris nondum exploratum est. Quibus plures, hæc uiuaciora magna ex parte sunt. Quibus pauciores & rariores, hæc magna ex parte uitæ sunt breuiores.

Hominibus circiter nicesimum annum genuinos dentes gigni.

Caput IIII



Omini nouissimi maxillares, quos genuinos uocamus, circiter nicesimum annum gignuntur, & uiris & mulieribus. Iam uero quibusdam mulieribus anno etiam octogesimo maxillares illi nouissimi non sine dolore exierunt. Viris quoque idem euenisse accepimus: quod certe ijs accidit, quibus in iuuentute ipsi genuini nati non fuerint.

Elephantes mares à feminis distare in ordine dentium.

Caput V



Elephanto dentes utrinque quatuor, quibus conficit cibum, atque in farina speciem molit. Duo præterea prominent grandes, quos mares grandiores, resimatosque habent: feminae minores, & contra quam mares: uergunt enim deorsum, pronique deuant. Statim cum natus est elephantus, dentes habet: quanquam grandes illos, non illico per spicuos obtinet.

Exiguam esse elephantis linguam.

Caput VI

Linguam perquam exiguam habet, atque interius positam, quam in cæteris sit, ita ut uix eam uidere possis.

Que animalia in oris magnitudine discrepent, ibique de equo summatili egyptio.

Caput VII



Ris etiam magnitudine discrimen existere a animalibus planum est: alijs enim os rescilum, ut canis, leoni, denique omnibus quibus dentes ferrati. Alijs paruum, ut homini. Alijs mediocriter, ut generi suum, equo summatili, quem gignit Aegyptus: iuba equi, ungula qualis bubus, rostrum resimatum. Talis etiam inest bisulcorum modo, dentes exerti, sed leuiter, cauda apri. Vox equi, magnitudo asini, tergoris crassitudo tanta, ut ex eo uenabula faciant: interiora omnia, equi & asini similia.

De genere simiarum, quod partim hominem, partim quadrupedes imitatur.

Caput VIII



Vnt quæ natura accipite, partim hominem, partim quadrupedem imitantur, uel ut simia, cæbi, canicipites. Sic enim cynocephalos appello. Cæbus, simia gerens caudam est. Caniceps etiam eadem forma, quæ simia est, sed maior, ualidiorque, & facie caninae similior, unde & nomen accepit: hæc moribus ferocioribus est, & dente robustiore, caninoque propiore. Simia tam parte sui corporis prona pilosa est, utpote quadrupes, quam supina, ut specie gerens hominis, qui contra, atque quadrupedes, obtinet pilum, ut dictum iam est. Sed crassiore pilo simia uestiuntur, longeque hirtiores parte utraque sunt. Conueniunt cum homine plurimum sua facie, quippe quæ nares, aures, dentes, tam primores, quam maxillares hominis more habeant. Cilium etiam cum cæteræ quadrupedes non in utraque palpebra habeant, simia habent, quanquam prætenue ac prolixius, potissimum in inferiore. Cætera enim quadrupedes inferioribus carent cilijs. Habent simia in pectore binas mammarum papillas, & brachia hominis modo, sed hirtiuscula, quæ & ipsa, & pedes ut homo inflectunt, hoc est, ita ut circumferentia membrorum utrorumque obuersæ inter se adducantur. Ad hæc manus, digitos, ungues homini similes, uerum omnia rudiora, efferaioraque. Pedes sui generis habent: sunt enim uel ut manus maiusculæ, & digitis ut manus constant medio longiore. Vestigium etiam manus simile est, nisi quod in longum se porrigat, & uolam referent tendat ad postrema. Callosius hoc altera sui parte extrema est, & calcem inepte, atque exalter imitatur. Pedum officium duplex est: ijs enim & ut pedibus, & ut

& ut manibus utuntur, inflectuntq; eosdē perinde, ac manus. Lacertos & femora habent breuia proportionē cubitorum & ubiarum. Umbilicum qui emineat, nullum habent: sed durum quiddam continetur loco umbilici. Partem corporis superiorem multo maiorem habent, quam inferiorem, uidelicet more quadrupedum: quinarij enim ferē ad ternarium ratione constant. Degenerant ergo, tum ea de causa, tum etiam quod pedes manibus habeant similes, & quasi ex manu, pedesq; consutitos. Calcis enim postremum ad pedem, reliquæ autem particule ad manum facile referunt: digiti namq; uolæ speciem gerunt. Degunt plus temporis pronæ quadrupedū more, quam erectæ. Carent natibus, utpote quadrupedes. Priuatę cauda sunt, utpote bipedes. Exigua enim omnino cauda inest, quatenus nota solum habetur. Genitale etiam femininæ mulieris est: mari potius canis, quam hominis.

De cæbis.

Caput IX



Aebi (ut superius dixi) omnes caudam habent. Partes uero interiores humanis similes, genera hæc omnia continent. Partes animalium uiuiparorum exteriores ita se habent.

Viupara quadrupeda quibus cum cæteris quadrupedibus conueniant, & differant. Cap. X



Quadrupedes quæ oua pariunt, eademq; sanguinem habent (Terrestre autem ac sanguinis particeps nullum oua ædit, quin idem aut quadrupes sit, aut pedibus careat omnino) omnes caput, collū, dorsum, pronam atq; supinam corporis possident: pedes etiam priores, posterioresq;, & quod pectori proportionetur, modo uiuipari quadrupedum generis. Caudam quoq; habent longiorem, exceptis paucis. Sed hæc omnia pedes in plures digitos habent discretos. Ad hæc, omnibus his sensus totidem, quot cæteris quadrupedibus sunt: & lingua omnibus data est, excepto, quem Aegyptus fert, crocodilo: nam ille similis quibusdam piscibus est. Cum enim pisces omnino spinei, nec absolutam continent linguam, tum uel maxime nonnulli adeo læuem indiscretumq; eum ipsum linguæ tributum locum sortiuntur, ut nisi admodum labrum diduxeris, ne uestigium quidem linguæ inspicere queas. Auriculis tamen hæc omnia carent, meatusq; tantum habent audiendi. Carent etiam mammis. Nec genitale, aut testes foris obtinent manifestos, sed intus conditos. Nec pilo, sed cortice omnia recta sunt. Dentibus etiam serratis sunt omnia. Crocodilo fluuiatili oculi sunt suis, dentes magni, exertiq;, ungues robusti, cutis corticosa, contra omnē ictum inuicta, uisus in aqua hebes, extra acerrimus. Dies itaq; in terra parte maxima agit, noctes in aqua teporis ratione: tepidiorem enim aquam experitur, quam aërem.

De chameleone, & eius cum cæteris similitudine.

Caput XI



Chameleo figura totius corporis lacertam planē representat. Latera dorsum ducta uentri iunguntur, ut piscibus: & spina modo piscium eminet: ostium simiæ porcarie similitimum, cauda prælonga, in tenue desinens, & longis implicata in se orbibus lori modo permultis. Elatior à terra est, quam lacerta: inflexus crurum perinde, ut lacertæ. Pedes singuli bipartito secantur, partesq; talem inter se habent situm, qualem pollex ad manus reliquam partem obiectum. Sed ipsæ etiam reliquæ partes paulotenus in digitos quosdam finduntur: uidelicet primores, triplici fissura interius, duplici exterius: posteriores interius duplici, exterius triplici. Vnguiculi adunci. Corpus asperum, ut crocodilo. Oculi in recessu cauo intus recepti, prægrandes, rotundi, cute simili, atq; reliquum corpus obducti, media sui parte perquam exigua detecti, quæ uident. Quæ quidem uidendi sedes nuncq; cute operitur, nec pupillæ motus: sed totius oculi uertatione in orbem mutationemq; quoquo uersus aspicit, quæ uelit. Mut

tat suum colorē inflatus. Verum & niger nō longe dissimilis crocodilo est, & pallidus, ut lacertæ. maculis distinctus, ut pardus, nigris. Mutatur color toto in corpore, nam & oculi concolores reliquo corpori redduntur, & cauda eundem colorem accipit. Motus ei piger admodū, ut testudinis est: pallefcit cum moritur, defunctusq; colorem eundem seruat. Gulam atq; arteriam situ eodem continet, quo lacerta: carnem nusquā nisi in capite & maxillis, & postremo caudæ admodum exiguum possidet; nec alibi sanguinem quā in corde, & oculis, & loco à corde superiore, & uenulis hinc tendentibus. Verum nec in ijs quidem ulla copia, sed paucillum habetur sanguinis. Cerebrum paulò superius oculis positum est, & propè ijs contiguū. Cute autem exteriore detracta oculis, quiddam lucens ueluti anulus æneus tendis, nulla pelle interceptus cingit. Membrana in omni serè corporis partes multæ, ac ualidæ, longeq; firmiores quā in cæteris, tendunt. Dissectus hic totus spirare præterea diu potest, motu admodū exiguo adhuc circa cordis sedem extante. Et cum omnes corporis partes contrahit, tum uel maxime costas cogere, atq; adducere potest. Lienem conspicuum nusquam continet. Subit cauernas, & latitat more lacertarū.

De animi natura, & quibus cum cæteris terre animalibus conueniant.

Caput XII



IN auiibus etiam partes nonnullæ similiter, atq; in ijs, quæ exposui, animalibus habentur. Omnibus enim caput inest, & collum, & dorsum, & supina pars corporis, & quod pectori proportionetur. Crura etiam bina hominis modo, sed quæ in auersum flectantur, eodem ritu, quo quadrupedes faciunt, ut dictum iam est. Carent manibus, pedibusq; prioribus. Peculiare inter cætera animalia alas possident, & clunem femori similem longiorē, uentremq; medio tenus porrectū, cohaesione perpetua, ita ut ipsum diuisum semur esse uideatur. sed enim femur parte alia iunctū tibie est. Sunt femora sane maxima ijs auiibus, quæ ungues habent aduncos, & pedibus quā cæteris robustius. Copia omnibus auiibus unguis est. Multifidæ etiam omnes quodāmodo sunt, quippe cum pars maxima digitata sit, & nantes quāuis planipedes, tamen & ipsæ digitos perfectos, distinctosq; habeant. Omnibus quæ se efferunt, quaterni digitati sunt, terni in priore parte, singuli in posteriore maxima ex parte pro calce. Paucis quibuscū utrinq; bini, ut auiiculæ, quæ lyncem uocant. Hæc paulò maior, q̃ fringilla est, colore uario. Habet sibi propriā digitorū, quā modo dixi, dispositionē, & linguam serpentibus similem: quippe quā in longitudinē mensura quatuor digitorū porrigat, rursumq; contrahat intra rostrū. Collū etiam circumagit in auersum, reliquo quiescente corpore, modo serpentū: unde torquilla uulgo appellata est, quanq̃ turbo ab antiquis. Ungues ei grandes, & similes ut monedulis exeunt: uoce autē stridet. Os sibi propriū uolucres possident: nō enim labra, non dentes, sed rostrum habent. Auriculis etiam carent & naribus, meatusq; odorandi in rostro continent, audiendi in capite. Oculi omnibus, sicut cæteris animalibus bini, sine cilijs. Grauiores palpebra inferiore conniunt. Nictantur omnes ab angulo obeunte membrana. At uero quæ speciem nocturæ gerunt, superiore etiam palpebra conniunt. Hoc idem cortice infecta animalia quoq; faciunt, ut lacertæ, & reliqua generis eiusdem. Conniunt enim palpebra inferiore omnia, quanq̃ nō more auium nictant. Volucres item nō pilis, nō squama, nō cortice, sed pennis teguntur. Pennæ omnes caule constant. Cauda etiam tali, qualis data quadrupedibus est, uolucres carent: sed pennis cōditam gerunt, breuem, quæ longipedes, ac planipedes sunt: maiorem autem, quæ contrario constant, quæ uel contractis ad uentrem pedibus uolant, cum illæ caudæ pusillæ gerulæ, porrectis in caudam cruribus ferantur. Lingua omnibus est, sed uarie: alijs enim longa, alijs breuis, alijs lata, alijs angusta. Omnium maxime anim aliu

animalis post hominē literas proferre nonnulla auium genera queunt, uidelicet ea
 præcipue, quibus lingua latior est. Lingua autem illam minorem operiendi minis-
 stram, nullum ex ijs, quæ oua pariunt, superimpositā suæ arteriæ continet: sed mea-
 rum ipsum modo trahunt, modo laxant, pro sui cōmodi desiderio: atq; ita efficitur,
 ne quid ponderis in pulmonem delabatur. Sunt nōnulla ex a quibus genera, quibus
 natura calcar etiam dederit: sed nulli datum hoc est, cui ungues adunci sint. Vola-
 ces porrō notantur, quæ ungues habent aduncos: calcarigeræ, quæ præ sua graui-
 tate sint ad uolandū ineptiores. Ad hæc, auium nōnullis crista addita est: quam cum
 cæteræ pennarū eminentia quadam extructam gerant, gallinaceus unus peculiarē
 10 sibi sortitus est: sic enim institutā, ut nec caro sit, nec à natura carnis omnino aliena.

De genere piscium, eiusq; differentijs.

Caput XIII



iscium genus inter ea, quæ aquas incolunt, unū distingui à cæteris su-
 re potest, cum forma euariet numerosiore. Habet id caput, & prona,
 & supina. Parte qua uenter, & uiscera continent, supina habet: caudā
 continuā, indiuisamq; parte gerit posteriore uarie. Piscium nulli ceruix,
 nulli manus, aut pedes, nulli testes, nulli mammae. Sed mamma cæte-
 ris quoq; negata est omnibus, quæ animal nequeant generare. Nec uero uiuiparis
 omnino data est, sed ijs tantū quæ protinus intra se animal formāt, nec primū ouū,
 20 deinde animal. Vnde fit, ut delphinus etiā mammæ habeat: animal enim concipit
 illico, & creat. Continet hic suas mamas nō parte superiore, sed prope genitale. nec
 modo quadrupedū papillas cōspicuas habet, sed uelut alueolos quosdā humoris du-
 os, utroq; de latere singularē, ē quibus lac fluit, quod ore catulorū sestantū parentē
 excipiat: idq; iam à nōnullis perspectū est. Pisces igitur (ut modo dixi) nec mamas
 habent, neq; meatū genitaliū ullum intus conspicuū. Branchias autem rem habent pe-
 culiarem, quibus humorē, quē ore acceperint, reddūt atq; etiā pinnas, quas magna
 ex parte quaternas gerūt. A tramen longis, ut anguillæ, binæ iuxta branchias herēt.
 mugilibus etiā quos lacus Siphariū gignit, binæ: atq; etiā ei quā uitam appellāt. Nō
 nullis ē longis nullē omnino sunt pinne, ut murenæ. nec branchiæ integræ, ut cæte-
 30 ris piscibus habent. Qui autem branchias habent, aut intactas continent eas, aut dete-
 ctas, ut cartilaginea genera omnia. Qui intactas habent, ijs in obliquū utroq; latere
 tenent. Quæ tegumēto carent, cartilaginea dico, ijs si plana sunt, parte inferiore, su-
 pinaq; habent: ut torpedini, ut raia. sed si oblonga sunt, eorū lateribus adherent, ut
 in quouis mustelino genere cernit. Raia tamen deductas in latera habet brāchias,
 tamen nō spineo intactas operimento, ut quæ nō cartilaginea sunt, sed cuticulari.
 Item branchiatorū ipsorū alijs simplices branchiæ sunt, alijs duplices. omnibus tamen
 simplex, quæ nouissima corpori admota est. & alijs paucae, alijs multæ: uerum in
 utrunq; latas æque paritæ omnibus sunt. habent quibus paucissimæ sunt, singulas
 branchias utrinq; easq; duplices, ut aper. alijs binæ utrinq; alteræ simplices, alteræ
 40 duplices, ut congro, ut scaro. alijs quaternæ utrinq; simplices, ut accipenser, dentici,
 murenæ, anguillæ. alijs quaternæ duplici ordine, nouissima excepta, ut turdo, per-
 cæ, siluro, cyprino. Musteligenis etiā duplices, & quinæ utraq; ex parte sunt. gladio
 à rostri mucrone ita appellat, octonę duplices. Ita branchiarū colligitur numerus.
 Sed præter branchiarū discrimē, pisces à cæteris animalibus differūt, eo quod nō pla-
 lis ut terrestria, quæ animal generāt, nō cortice, ut nōnullæ oua parientes quadru-
 pedes, nō penna, ut genus auiū integunt: sed plurimi squamosi sunt, pauci quidam
 scabri, paucissimi laues. Ergo cartilagineorū alia a spera, alia laeta sunt. Congri etiā
 & anguillæ, & thumni, laues sunt. Dentis omnia piscium genera habent serratos,
 pectinatimq; coeuntes, excepto scaro: ac omnia serie dentium acuta, atq; multiplici

fulcidnt. in lingua etiam dentes nonnullis. Lingua autem ipsam durā, & penē spineā habent, & ita adherentē, ut interdū carere lingua uideant. Orescissum, ut nonnullis ouiparis quadrupedibus est. partes audiendi, odorandi, deniq; sentiendi nullae conspicuae, praeterquam oculi habent. latent etiam meatus, quibus sentire necesse sit. Oculi omnibus sine palpebris, sed non duri. Est omne sanē piscium genus sanguinis particeps: discrimine autem partus sic discrepant, ut alij oua pariant, alij animal. Pariunt oua omnes qui squama conteguntur. Animal omnē, qui genere carulina gineo continentur, excepta rana.

De genere serpentum.

Caput XIII



Elíquum ex ijs, quae sanguinē habent animalibus, gens serpentū est, quod cōmune ambobus superioribus esse potest. Sunt enim alij terrestres, alij aquatiles; quanq; maxima pars sit terrestris, exigua uero aquatilis, scilicet fluminū incolae. Sunt etiā maris indigenae serpentes terrestribus similes, nisi quod caput habeant congrui. & quidē genera eorū complura sunt, colore numerosae uarietatis. nasci eos nō in altissimis gurgitibus certum est. Scolopendras etiā, quas centipedes uoco, maris incolae esse nouimus, specie terrestribus similes, magnitudine paulō minores, colore rubetiores, numero pedum copiosiores, & crurū tenuitate graciliores. nasci locis saxosis solent, & modo serpentum, nō magna altitudine gurgitiū. Caret pedibus genus omne serpentū, ut pisces. nam remora errore nonnulli pedes habere prodiderunt, expes enim omnino est. Sed quoniā pinnae habeat pedibus similes, hūc fit ut pedibus instare uideatur. pisciculus quidā hāc est, saxi assuetus, in cibos nō admittendus, nomē à remorandis nauibus adeptus, utilis ad iudiciorū causas, & amatoria ueneficia, ut aliqui uolunt. Partes exteriores sanguineorū animalium quāenam sint, & quot numero, & quibus inter se differentijs dissonent, explicatum iam est.

Quae membra quodq; animalium genus interiora sortiatur.

Caput XV



Vnc interiorū ordinē persequemur, & primū in eo genere qd sanguine consistat: hac enim ratione summa genera à cæteris differunt, quod hāc sanguinea sunt, illa exanguia. Sanguine praedita sunt, homo & quadrupes, quae animal, ouum uē parit: atq; etiā aues, pisces, cetæ: & si quid aliud uacans nomine, quoniā genus nō sit, sed species simplex in singulis intelligat, ut serpens, ut crocodilus. Igitur quae quadrupedes uiuiparae sunt, ijs gula atq; arteria omnibus est, & eodē situ, quo hominī. Oviparis etiā quadrupedibus, atq; auibus eadē illa adiuncta uidemus, sed discriminē species affert earum partū. Deniq; omnia quae aërem accipiūt, & reddunt, habent pulmonē, arteriā, gulā, & sitū gulæ atq; arteriae similē, quanq; eas partes dissimiles: pulmonē autē ne sitū quidē similē continent. Cor item omnibus est, quibus sanguis & septū transuersum, quod praecordia, & cinctus appellat: uerū hoc in minutis praesua tenuitate, exiguitateq; nō aequē spectari potest, nisi in corde. Peculiare est, quod de nonnullis bubus proditū est: genus enim quoddā bouum suo in corde ossiculū cōtinere aiunt. At uero pulmo nō omnibus datus est: pisces enim & omnino quae branchias habent, carent pulmone. Iecur in omnibus est, in quibus sanguis. Lien magna ex parte omnibus, quibus sanguis: sed magnae parti eorum, quae nō animal, sed oua pariunt, lien usq; adeo exiguus est, ut propemodū sensum effugiat: quod magna in parte auium experimur: uerbi causa, in columbis, miluis, accipitribus, noctuis. Capriceps auis lien omnino caret. In quadrupedibus etiam ouiparis similis ratio est: nam ea quoq; admodū exiguum habent lienem, ut testudo, mus aquatilis, rubeta, lacerta, crocodilus, rana. Fel alijs adnectit iecori, alijs minime. Ex genere enim quadrupedū quae animal generant, ceruo, &

dame

damae deesse notatū est: atq; etiā equo, mulo, asino, uitulo marino, & murū nōnulis. Ceruis Achalinis cognomine, fel cōtineri in cauda credit. Est, qd ibi cōtineri aūt, colore quidē simile felli, sed nō ita ut fel humidū, sed lienī simile parte interiore. Vermes tamē cerui cōtinent omēs suo in capite uiuos, qui nasci solent sub lingua in cōcauo circiter uertebram, qua ceruici innectit caput, magnitudine haud minores ijs uermibus, quos maximos carnes putres adiderint. Cigni uniuersi atq; cōtignis solent numero adeo circiter uiginti. Sed ceruus felle (ut dictum est) uacat: quancū eius intestinū a marū adeo est, ut ne a canibus quidē attingat, nisi ceruus prapinguus sit. Elephanto etiā iecur sine felle: inciso tamē parte qua fel adherere solet, humor fel-
 10 leus effluit plus minus. Delphinus inter ea quę mare excipit, pulmonēq; habent, unus felle priuatus est. Aues, piscesq; omēs fel habent: & quadrupes quę oua pariunt, dixerim in uniuersum, omēs aut plus aut minus fellis sortiunt. Sed pisciū, alijs in iecore positū est, ut musteligenis, & siluro, & squatinæ, leuiratæ, torpedini: atq; ex longis anguillæ, acui, libellæ. Pulchro etiā, in iecore inest proportione corporis maxime omniū copiosum. Alijs intestino annexū est, dependēs a iecore, meatibus quibusdā perpetuis summę tenuitatis. Ergo hamia suo intestino pari processu obductū habet, sæpe etiā replicatū, reducēq; aliquatenus: reliquis collectim intestinis cōmissum est, aut semotius a iecore, aut propius, ut ratæ, accipenser, dentici, murene, gladio. Sæpe etiā genus idem utrunq; patitur sitū, ut conger: alijs enim ad iecur, alijs in
 20 fra se positū adheret. Qd etiam in aubus pari modo perspectū est: alijs enim uentri, alijs intestino iungitur, ut columbæ, coruo, coruini, hirundini, passerī. Alijs iecori simul, & uentri, ut capricipiti. Alijs iecori simul, & intestino, ut accipitri, muluo,

Que animalia renibus, & uescica careant.

Caput XVII



Enes atq; uescicæ omēs, quę animal generāt, quadrupes possidēt. At uero ex ijs, quę oua pariunt, aues, piscesq;, non habent. Quadrupedū una testudo marina habet magnitudine ad ceterarū partū rationem, similes bubulis renes ei omnino adherent, quasi ex multis exiguis constituti. Bonafus etiam interiora omnia bubus similia continet, situs idem earum partium est omnibus, quę ex ijs constant.

Quam corporis partem in quibusq; animalibus cor, iecur, pulmo, lien,

fel, & uenter obtineant.

Caput XVII



Or proorsus in medio pectore omnibus præterq; in homine est: huic em parti potius leuæ commissum est, ut antè exposui. Tendit omnibus priorem in partē, suo turbinato mucrone, præterq; piscibus: ijs enim nō ita esse uideri potest, cum eorū cor suū mucrone nō ad pectus spectantē, sed ad os habeat, extremūq; inde pendens, qua branchiæ dextræ, atq; quę sinistræ inter se cōiunt, copulanturq;. Sūt etiam meatus alij de corde ad branchias tendentes singulas pro desiderio magnitudinis: hoc est, maioribus laxiores, minoribus arctiores: inter quos crassa admodū, & candida fistula est, quę de cordis extremo oritur. Gula paucis in piscibus inest, ut congro, anguillæ, ijsq; exigua. Et iecur qui habent, si nō fissum est, dextro latere totum continet: si fissum a principio usq;, dextro maior pars applicata est. Quibusdā em partes sepositæ sunt, nec eadem certa origine continet, ut inter pisces mustelino generi, & inter quadrupes leporum generi cuidā, quod tum alibi, tum etiam in Syacino agro circiter Bolbam lacum gignit: quippe quos bina habere iecinora credideris, quoniam meatus procul admodū cōstant: quod idem uel in pulmone spectare auiū licet. Lien etiam parti sinistræ adnectitur iecori aduersus, sitūq; ualet iusto naturæ. Quod si qua dissecta quadrupede lienē latere cōtineri dextro, iecur sinistro uisum est, prodigiose id euenisse
 40

C 3

putandū. Tendit arteria omnibus ad pulmonē, quemadmodū post explicabimus. Gula ad uentrē perfertur, transigens septū transuersum, scilicet in ijs quæ habeant gulam: pisces enim magna ex parte gula carent, ut dictum est, ut quæ annexum statim ori uentrem habeant. Quocirca sæpius euenit grandibus nōnullis, ut dum per impetū insectantur minores, uentriculus in os procidat. Habent omnia quæ adhuc enumeravi, uentrē situ consimili: septo enim transuerso cōtinuū subest, intestinūq; de eo porrectū finit ad exitū cibi, & eam partem quæ podex dicitur. Sed uentris dissimilitudo primū, quod quadrupes uiuiparæ, cornigeræ, altera maxilla dentatæ, quaternos eiusmodi habet: sinus: quæ quidē & ruminare dicunt. Gula eū incipiens a ore deorsum tendit ad pulmonē, septūq; transuersum: hinc se ad uentrem appli-
cat maiorē, qui parte inferiore asper, interceptusq; est, ac prope gulæ cōmissurā si-
num sibi adnexū habet, quē ex argumēto reticulū uocant: est enim uentri extrinse-
cus similis, intus reticulis mulierum implexis, magnitudine multo q̄ uenter minor.
hūc excipit omasum parte inferiore asperū, cancellatū, crustatū, magnitudine reticu-
culi. Abomasum uenter ab eo alius longit, magnitudine amplior omaso, forma ob-
longior, cancellis intus, & crustis multis, magnis, & leuibus innormatus: mox inte-
stinum iam sequit. Cornigera altera maxilla dentata, omnia ad hunc modū suū ha-
bere uentrē certum est. Sed differūt inter se magnitudine, aut figura, atq; etiā quod
gula, uel in mediū uentris tendat, uel in latum uergat. At uero omnia dentata maxilla
utraq; uentres singulos habet, ut homo, canis, sus, ursus, leo, lupus. Quinetū thos,
quē lupum ceruariū appellem, interna omnia lupi similia habet. ijs igitur omnibus
simplex uentriculus est, quē excipit intestinū: uerum alijs amplior, ut sui, ut urso: &
suillo quidē crustæ lēues pauciores sunt. Alijs arctior, nec multo amplior intestino,
ut canis, leoni, homini. Ceterorū etiā species omniū respectu eorū, quos modo enu-
meraui, distinguuntur. Alijs enim uenter suillo similis, alijs canino, tam in maiore. q̄
in minore anima liū genere. Sed discriminē in ijs quoq; magnitudine, figura, corpulē-
tia, exilitate uē oritur: atq; etiā situ gulæ, quo meatū ad uentrē ducat, & conuio
iungat foraminī. Intestinatorū etiā natura utriq; illi animalis generi, hoc est, utraq;
dentato, et altera maxilla dētrato, sibi differt magnitudine, crassitudine, replica mētis.
Sūt certe maiora omnia intestina nō utrinq; dentatis: nec immeritō. nam ipsa ita den-
tata omnia sunt auctiora: pauca enim parua eo in genere habent. Admodū parū
inter cornigera nullū est. Quibusdā etiā appēdices sunt intestinatorū. Rectū autē in-
testinū nulli est, cui nō parte utraq; dentes. Elephanto intestinū ita est sinuosum, ut
alios habere quatuor uideat. in hoc etiā cibus recipi: nulli enim conceptaculū cibi
aliud separatū adest. Extra quoq; eidē suillis proxima, sed maiora. Iecur enim qua-
druplo maius bubulo est: & reliqua pari ratione, excepto liene: hic enim minor ex
proportione est. Hæc eadē ratio uētris, intestinatorūq; uel in ouiparis quadrupedibus
est, ut in testudine tum terrestri, tum etiā marina, in lacerto, crocodilo utroq; omni-
bus deniq; generis eiusdē. Simplicē enim unūq; habent uentrē, aut canino, aut suillo
similem. Genus serpentū nulla euariat ratione: & omnia ferē proxima lacertis ex
terrestri ouiparo genere habere species, si pedes ijs demas, lōgitudinē addas: quip-
pe quod intestiū cortice sit, & prona, supinaq; perinde atq; lacerti habeat, sed testu-
bus caret. nec alio modo q̄ pisces meatus duos cōeuntes in idē, & uulū longā, ac bi-
fidam habet. Cætera interna eadē serpētib; sunt quæ lacertis. Verū omnia earū ul-
scera, propter lōgitudinē, & angustā corporis, longā, arctaq; habent, ita ut digno
sci præ suæ figuræ dissimilitudine nō queant. Arteria nāq; longā admodū est, atq; etiā
gula longior. Arterię origo ita iuxta os ipsum posita est, ut esse sub lingua uideat. &
quidē uidet linguæ præminere, quoniā lingua contrahit, nec ut cæteris manet. Lin-
gua autē ipsa tenuis, longā, & atrī coloris est, atq; si extrahas, porrigi longius potest.

Peculi-

Peculiare præter cæterorū linguas serpentibus, & lacertis est, ut summa eorū lingua bifida sit: sed præcipue serpentū, quippe quæ tenuissimis quibusdā quasi capillamentis discreta uibret. Vitulo etiā marina lingua scissa est. Ventriculū serpentes, uelut intestinū laxius habent, canino similē: tum intestinū longū, tenue, & ad exitum usq; uniforme. Cor arteriæ postremæ adheret exigū, sed longū, & renū speciem referat: quā ob rem uideri interdū potest minus mucronē suum dirigere ad pectus. Pulmo deinde adnectū simplex, fibrosus, fistulosus, prælōgus, lōgeq; à corde sepositus. Iecur item longū, & simplex. Sed lien exiguus, rotundusq; ut lacertis. Fel similiter atq; in piscibus habet: natriibus enim adnexū iecori est, cæteris intestino magna ex parte adhæret. Dentes exerti omnibus sunt. Costæ totidē, quot dies mensem integrū complent: singulis enim tricenæ. Euenire serpentibus idem, quod pullis hirundinū nōnulli aiunt: oculis enim serpentū laceratis subnasci alios referit. caudæ etiā la-
certis, atq; serpētibus amputatæ renascunt. Hæc eadem ratio intestinorū, & uētris piscium quoq; est. Venter enim ijs unus, & simplex, sed figura uaria est: nonnullis enim diuersa omnino species uentris est, ut ei quæ scarum uocant, qui & ruminare solus pisciū creditur. intestinū etiā simplex replicans se, qd in unum, continuumq; resoluitur. Peculiare piscibus, & magna ex parte aubus appendicum agnatio est. Sed aubus subter, & pauca: piscibus superne circa uentriculū exeunt. & nōnullis complures, ut gobion, mustelo, perca, scorpion, siccicula, mullo, scaro, minoli: cui
parte altera plures exeunt, altera una tantū. alijs pauca, ut iecorino, glauco. auratæ etiā pauca. Tum aut ipsi eiusdē speciei consortes inter se differunt. Auratarū em̄ alijs plures, alijs pauciores. Sunt etiā quibus nullæ omnino sint, ut magnæ cartilagineorū parti: cæteris ita ut alijs pauca, alijs uel plurimæ habeant. Omnes tamen pisces ad ipsum uentrem eas appendices continent. Aues, & inter seipsas differre, & à cæteris discrepare animalibus, interiorū partium ratione, apertū est. Alijs enim ingluuius præposita uentriculo est, ut gallinaceo, palumbo, columbo, perdici. Ingluuius cutis in ampliū sinuata est, qua primū cibis ingestus continet incoctus. hæc parte qua iungitur gulæ, angustior est, mox amplior, tum qua definit in uentriculum, arctior. Venter parti plurimæ carnosus, callosusq; est, cutis intus robusta, crustatisq; facile detrahi integra potest. Alijs ingluuius deest, sed eius uice gula pertinet
latis, & potentior, uel tota, uel qua propius uentriculū adit, ut monedula, coruo, cornici. Quinetiā coturnici gula amplior infra, & capricipiti pars inferior paulo latior est, atq; etiā noctuæ. At anatæ, anseri, gaulæ, cataractæ, tardæ, gula tota ampla, & lata est. Multis etiā alijs aubus gulā huiusmodi esse perspectū est. Nec desunt quibus uentriculus ipse similis sit ingluui, ut tinunculo. Sunt item quibus neque gula, neq; ingluuius amplior sit, sed uentriculus longior, scilicet auiculis omnibus, qualis palser, aut hirundo est. Sunt etiā, quāuis pauca, quæ ingluui, gulæq; amplitudine careant: longitudine autē admodū prolixa utantur, uidelicet quæ longa, angustaq; colla habent, ut porphyrio: quæ serē omnes alui excrementū humidius, q̄ cætera solent, reijciunt. Coturnici præ cæteris hæc propria habent, ut & ingluui, & gulam prope uentriculū amplam, & latam habeat. Distat ingluuius à parte gulæ propinqua uentriculo multū, pro magnitudinis proportionē. Tenue quoq; intestinum parti plurimæ auium est, & simplex resolui potest. Appendices autem illæ pau-
cæ in aubus sunt, ut dictum est: nec suprà, ut in piscibus, sed infra qua
definit intestinum. habent eas non omnes, sed plurimæ, ut
gallinaceus, perdix, anas, ciconia, ascalaphus, anser,
olor, tarda, noctua. minoris etiā generis
nonnullæ habent, sed perexi-
gue, ut passer.

12 ARISTOTELIS STAGIRITAE DE HISTORIA ANIMALIUM LIBER TERTIUS, INTERPRETE THEODORO.

De situ & forma genitalium membrorum omnium animalium, eorumque differentijs. Caput 1



DE CÆTERIS interioribus partibus, quot nam, aut quales sint, & quas inter se habeant differentiās, dictū iam est. Reliat ut de ijs, quæ ad generationē ministrant, differamus. Ergo & cœmi-
nis omnibus intus conditæ habent, maribus autē multiplici differ-
rentia euariant. Nam inter animalia sanguinei generis, alijs tes-
tes nulli omnino sunt: alijs sunt quidē, sed intus. Et ijs quæ intus
cōtinent, aut lumbis adherēt circiter sedem renū, aut aluo credi-
ti sunt. Alijs foris dependent, quibus genitale aut aluo annexū sustinet, aut demis-
sum pendet cum testibus. Nec uero modo eodem ad aluum omnibus continēt, sed
aliter ijs, qui ex aduerso mingunt, aliter ijs, qui ex auerso. Piscis igitur nulli sunt tes-
tes, nec cæteris quibus branchiæ, neque ulli serpentū, nulli denique quod pedibus careat,
nisi intra se formare animal possit. A uibus testes dati omnibus sunt, nō tamē qui foris
pendeant, sed qui intus adherēt lumbis: quo modo quadrupedibus quoque ouipa-
ris habent, ut lacerto, testudini, crocodilo, & inter ea quæ animal generant, herina-
ceo. Quæ autē intus cōtinent, ijs ad aluū ne cūnt, ut delphino ex ijs quæ pedibus ua-
cant: ut elephāto, ex ijs quæ quadrupedes uiuiparæ sunt. Cæteris cōspicuos esse tes-
tes natura uoluit. Discrimē autē eorum, qui ad aluum, aut locum proximū positi in
propatulo sunt, diximus. Aut enim hærent annexi retro, nec tremuli pendunt, ut
subus: aut ante propensi, demissi que gerunt, ut homini. Pisces, ut modo dixi, & ser-
pentes, testibus carent: sed meatus continent binos, qui de septo exorti, latus spinæ
utrumque perrepent, cōtinentque superne in unū, atque ita ad ostiū excrementi finiant:
quod enim ad spinā est, id superius nomino. Pleni hi meatus humoris scitifici red-
duntur tempore coitus, attrituque mutuo semen effluit genitale candidum. Sed qui-
busnam ipsi inter se differentijs discrepent, in dissectionibus speculari oportet. nos
etiam diligentius post exponemus, cum sua singulis reddiderimus. Omnibus autem
quæ oua ædunt, siue bipeda, siue quadrupeda sunt, testes lumbis innexi infra septū
continent, uel candidiores, uel pallidiores, uenulis admodum tenuibus circumdati.
Meatus de singulis singuli pertinent, eodemque cōiunt supra ostiū excrementi, si-
cut agi in piscibus dictū est: usque meatus qui ex coitu amborum cōsistit, genitale est. quod
in minoribus latet, in maioribus uero, anferem dico, & reliqua huiusmodi, eiden-
tius est, cum recens inierint. Meatus autē tam ijs, quam piscibus lumbis adherent,
subter aluum, uentrem, & intestina, inter uenam maiorem, de qua meatus ad tes-
tem pertinent utrumque. Sed ut piscibus lentior ille prolificus tempore initus haberi
sentitur, meatusque latissime patent: ubi uero id tempus præterijt, incerti uel meatus
ipsi interdum redduntur: sic autem testes, prius quam coire incipiant, alijs exigui,
alijs omnino obscuri sunt: at uero cum uenerem exercent, insigni tantisper ma-
gnitudine augentur. quod apertissime palumbis & perdicibus euenit: atque ita
ut hybernæ mensibus ne ullos quidem testes in ijs haberi nonnulli arbitrentur.
Quibus autem parti priori testes commissi sunt, ijs aut intus iuxta aluum condun-
tur, ut delphino: aut foris in aperto ultima aluo positi sunt. Quibus utrisque cum
cætera sint eadem, unum illud discrimen existit, quod quæ intus continent suos
testes, nulla cute habent obductos: quæ autem foris, hæc coniectos in concepta-
culum,

eulum, quod scrotum uocamus, gerunt. Testes uero ipsi omnibus gressilibus uis-
uiparis sunt ad hunc modum. Meatus duo uenales ad capita testium de uena aorta
pertendunt, & alij totidē a renibus eodem deueniunt, sed ij sanguinolenti, illi quos
mittit aorta, exangues sunt. A capite autem ipsorum testium meatus excipit spulioe
illo superiore, atq; neruosiore: qui progressus per testem fleuit sese inde, & caput
eiusdem repetit: unde rursus in idem coeunt, & in parte priore subeunt genitale.
Qui caput repetunt, ipsi tam continua membrana obuolantur cum ijs, qui residens
testibus, ut unus esse meatus uideantur, nisi membranz diuortium feceris. humorē
adhuc sanguineum continet is, qui residet, sed minus quā illi superiores. At uero
10 qui reuersi ceruicē subeunt genitalis, humorem iam habent candidantē. Quinetiam
de uelica meatus perfertur, & se ad ceruicē applicat, quē uelut putamen cannalicu-
latum ambit id, quod penem uocamus. Specta ea quę dixi descriptione hac: Sit α.
initium meatuū, qui de aorta profisciscunt. x x, meatus descendentes ad capita testiu.
α α, qui ab ijs assident testibus. β β, qui repetunt scilicet quibus humor candidans cō-
rineretur. A, genitale. u, uelica. ψ ψ, testes. Excisis detractis ue testibus, meatu sursum
se retrahūt. Castrare solent duobus modis: aut enim testes nouellos adhuc frangūt,
aut adultos iam firmosq; excidunt. Taurū aliquando excisum inuē protinus acto,
progenerasse traditū est. Testes animalū ita se habere cognitū est. Vuluę siue ute-
ri, nec eodem situ habent, nec similes omnium sunt: sed differunt inter se, tum eorum
20 quę animal generant, tum illorum, quę oua pariunt. Habent omnes qui iuxta ge-
nitale continent, sinus geminos, alterum in latere dextro, alterū in sinistro. Initium
uero unum est, & cōmune ostium, quasi ceruix carnosā admodum, cartilagineaq;
parti plurimā auctissimāq; animantū tributum est. Pars uuluę interior, loci, & ute-
rus appellatur: unde fratres uterinus cognominamus. ostium autē & ceruix, matricē
dicitur. Sed bipedes, atq; etiam quadrupedes quę animal procreant, omēs uuluam
aut uterum infra septum trāuersum cōtinent, ut homo, canis, fūs, equus, bos. Cor-
nigera quoq; omnia sicut eundem. Extrema plurimarū uuluarū, quę cor-
nua uocant, inuolui inspectū est. At eorum quę oua edunt, sicut nō similis omniū
est. Sed autium uuluę iuxta septum annexę sunt: pisciū infra, sicut bipedū, aut qua-
30 drupedum quę animal pariunt: sed tenues, & membrana constantes, & longę, ita
ut in minutissimis pisciculis sinū uuluę utrunq; iungi in faciē oui unius uideatur,
tanq; bina habeant oua ij pisces, quorū ouum arenidū est: non enim continuū, sed
quoddam areulentū est. ita diffundi in multa potest. Vulua autē ceruicem habet
carnosā, callosāq; parte inferiore: at superne qua septo iungitur, membrana cō-
stat, & prætenuis adeo est, ut oua extra uuluā esse existimes. A uibus ergo auctiori-
bus membrana conspectior est, & per ceruicē inflata extollit, atq; sinuat. At in mi-
noribus obscuriora hæc omnia habent. Quadrupedū quoq; ouipararū hæc eadem
ratio uuluę est, ut testudinis, lacertę, ranę, & reliquorū generis eiusdē. Enimuero
ceruix una in uno, & caridior est: fissura autē & oua proxima septo sustinentur.
40 Necnō ea, quę in genere pedibus priuato animal adunt in lucē, posteaq; oua inter
se pepererūt, ut musteli, & reliqua cartilaginea dicta (quicquid em̄ inter marina pe-
dibus orbatū, & branchias habens animal generat, sub eo nomine intelligi) ijs uul-
ua partita, pertinēsq; ad septū quomodo a uibus est. atq; etiam de medio sui bipartitū
sinus, arcior ad septū usq; pertendit: ac oua tam hic, q; supra ad septi originē consi-
stunt: mox prolapsa in spaciū latius fœtus animales excludunt. Sed eorum ipsorum
differētia uuluę, qua tum inter se, tū uero a ceteris piscibus discrepent, accuratius per
dissectiones spectari figuris singulis potest. Serpentes etiā tam ab ijs supradictis, q;
inter se differre apertum est. Vipera enim animal ædit, postquam intra se oua pe-
perit, cum cætera serpentum omnia genera oua ædant in lucem, quo sit, ut uipe-

ra uni uulua similis, ut cartilagineis sit. Tendit porro serpentibus uulua prolixior modo corporis exorsa inferius uno cōtinua meatu, diductaq; in latus spinæ utrumque, quasi duplex meatus usq; ad septū: in qua oua ordinatim gignunt, & ædi inde nō singularim, sed serie continente solent. Vulua omnibus quæ & intra se, & foras animal generant, supra alui posita est: quæ oua pariunt, ijs infra, lumbis adheret. Quæ animal ædunt in lucem, cum intra se oua generarūt, ijs anceps ratio est: nam & infra lumbis adiungit ea pars uulvæ, qua oua continet, & supra intestina ostiū eius sustinet. Ad hæc discrimen uuluarū est, quod cornigera, & una parte dentata, acetabula habent uulvæ, dum partū gerunt: atq; etiā parte utraq; dentatorū, lepus, mus, uespertilio, eadē illa acetabula suis cōtinent locis. At cetera utrinq; dentata animalis fecunda, pedibus prædita, uulvam laucem omnia habent, & partus ipsi uulvæ, non acetabulis adheret. Partes dissimilares animalium interiores, exterioresq;, hunc in modum haberi cognitum est.

De partibus animalium similaribus, ibiq; Syennesis Cyprij, Diogenisq; Apolloniæ opinioniones de sanguine, & uenis.

Caput 11



Similium sanguis potissimū cōmunis animalibus sanguineis omnibus est, nec minus cōmunis ea pars est, qua sanguis continet, quæ uena dicitur. Locū aut cōmunitatis secundū obtinent ea, quæ ijs proportionatur, hoc est sanies, & fibra, atq; etiā caro, quod præcipue corpus animalium inest. Os item, & quod uice fungitur ossis, ut spina, & cartilago. Adde cōmunitati eiusmodi, cutem, membranā, neruos, ungues, pilos, & quæ ijs ex proportionem respondeant, ad hæc, adipem, sebū, atq; extremēta, sterqus dico, pituitam, bilem, tum flauam, tum etiā atram. Sed cum natura sanguinis uenarūq; principium esse uideat, primum de ijs disserendū est: præsertim cum autores nōnullos ex ijs, qui res eas tractarint, minus recte dixisse intelligā. Causa uero ignorationis occul-
tationis earum partū, ac perdifficili cōtuitui tribuenda est: nam in animalibus mortuis natura uenarū principiorū abolet, propterea qd ipse in primis effluente sanguine languescant, & collabant, ex ijs em quasi uase, uniuersus sanguis effundit: quippe qui omnis in uenis continet, præter exiguū, qui in corde est. In uiuis aut fieri nō potest, ut quemadmodū habeant, cernant: intus em natura earum occultat. Itaq; alij, cum in cadaueribus dissectis inspicere, summa principia cernere nequiuērūt. Alij in hominibus admodū extenuatis per ea, quæ extrinsecus uiderent, interna uenarum principia definire. Syennesis medicus Cyprius ita scribit: Venæ corporis crassiores oriunt ad hunc modū, & tendunt de oculo propter supercilium, per dorsum ad pulmonē sub māmīs. Altera de latere dextro ad sinistrū, altera de sinistro in dextrum: & altera per iecur in renem, ac testem, altera ad lienem, & renem, & testem. Postremo ad genitale perferit. Diogenes Apolloniata hæc: Venas hoīs constare ad hunc modū nouimus: duæ maxime habent, quæ per uentriculū propter dorsi spinā pertendūt, altera dextrorsum, altera sinistrorsum, utraq; ad pedē sibi subiectū: & in caput eadē per iugulū propter humeros efferunt: hinc sparsa ramorū serie, aliz minores membris omnibus sanguinē riuant, de dextra dextrorsum, de sinistra sinistrorsum. Maxime aut illæ duæ cor adeūt, circa ipsam spinā dorsi: alteræ item duæ paulò superius per pectus sub ala utraq; in manū dispensatæ pertendūt, quarū altera lienaria, altera iecoraria uocant. Harū postrema ita scindunt, ut parte pollicē adeant, parte uolam: tamen ex ijs ramorū tenuiorū frequētia in digitos, manūq; spargitur totam. Propagines tenuiotes à primis uenis mittunt, à dextra ad iecur, à sinistra ad lienem, & renes. Quæ aut pertinent ad pedes, scinduntur qua femur iungit, tenduntq; per totum femur: quarum maxima femur ex auerso perrepat, crassaq; apparet: altera

tera paulò interius minus crassâ procedit per femur: tum propter genu tendunt ad
 crus, pedemq; inum, quo modo ad manus. hinc subeunt plantam, & se spargunt in
 digitos. Complures etiâ tenues de eisdem illis ad uentrem & costas sparsæ obre-
 punt, quæ potrectæ per iugulum petunt caput, apparentq; crassiusculæ in ceruicē;
 quarum extrema fissura multiplici permeant per caput, dextra dextrorsum, lini-
 stra sinistrorsum; atq; utraq; ad aurem desinunt. Sunt præterea uenæ collo com-
 missæ iuxta maiorem, paulo minores, utroq; ex latere transeuntes, ad quas pluri-
 ma illarum capitis pars contendit: quæ immeritæ per iugulum mittunt alias ad scapu-
 las, & manus. apud lienariam etiâ, & iecorariam, aliæ paulò minores apparent,
 10 quibus adigere cultellum solemus, quoties aliquid sub cute affligit. At si quid circa
 uentrem infestat, sanguinem ex iecoraria, & lienaria mittimus. Quinetiam ad miam
 mas hinc aliæ pertinent. Sunt item quæ de utraq; perferantur ad testes, per dorsū
 medullam, tenues: atq; etiâ aliæ quæ subditæ cuti tendant per carnem ad renes,
 cessentq; ad testes uiris, ad uterum mulieribus. Prodeunt primæ à uentriculo am-
 pliores: tum attenuantur, dum de parte dextra in laeuam, indeq; transeant ad dex-
 xtram, quæ seminariz nominantur. Sanguis crassior à carne exhibitur: sed cum ad
 loca deuenit, tenuis redditur, et calidior, & spumofus. Syennesis, ac Diogenes ita.

Polybij sententia de uenarum ordine, ibiq; falsarum opinionum refutatio. Caput III

20 **P**olybius hæc. Venarum paria quatuor habentur: primum quod à sin-
 cipite ortum tendit per ceruicem, summa perreptans latera spinæ, ad
 clunes & crura: deinde per tibias ad malleolos exteriores, & pedes,
 quam ob rem doloribus dorsū, & coxarum, de poplitibus malleolis ue-
 xteris sanguinem mitti solitum est. Secundum uenarum par de ca-
 pite circum aures per ceruicem, quæ iugulariz dictæ sunt, intrus propter spinam &
 lumbos ad testes & femora perfertur: atq; per poplites & tibias, tendit ad interio-
 res malleolos & plantas: quapropter doloribus lumborum & testium sanguinem
 ex poplitibus, aut malleolis mittimus. Tertium par uenarum à temporibus per cer-
 uicem sub scapulis porrigitur ad pulmones: & altera de parte dextra in sinistram
 30 pergens, mammam subit, & ad lienem, renemq; descendit: altera de sinistra in dex-
 xtram procedens, à pulmonibus mammam subit, mox iecur petit, & renem: utra-
 que postremo ad testes desinit. Quartū par ortum parte priore capitis, de sede ocu-
 lorum per ceruices ad humerosū clauiculas deuenit: unde per lacertos ad agilem,
 mox per cubitos ad uolam & digitos, ad malas etiâ de humero propaginem mit-
 tit: quæ costas perreptat, dum altera ad lienem, altera ad iecur perueniat, deinde
 utraq; eminens per uentrem ad genitale desinit. Hæc ferè sunt, quæ à cæteris medi-
 cinæ autoribus dicta accepimus. Nec defunt naturæ interpretes, qui tamen si accura-
 tius perinde ut medici non tractarunt de uenis, tamen omnes earum ortum à capite,
 atq; cerebro deducunt: quod error est. Cum itaq; perdifficile sit uenarum exa-
 40 men, solis in strangulatis animalibus iam antè extenuatis effici potest, ut satis perci-
 piat, cui hæc res curæ sit. Sedenim natura uenarum ita se habet. Duæ intra pe-
 ctus uenæ continentur spinæ appositæ, altera maior, altera minor: maior partem
 priorem adit, minor posteriorem: & maior dextram potius sedem obtinet, minor si-
 nistram: quam aortam nonnulli uocant, eo quod neruosa eius pars conspicit uel in
 mortuis potuit. Ambæ ex corde originem ducunt: transigunt em totæ cætera uisce-
 ra per quæ tendunt, suâ seruantes naturâ, ut nihil contrahant detrimenti, quo mi-
 nus & sint uenæ, & appellentur. Sed cor nō eodem permeat modo: uerum ei tanq;
 suæ parti continuantur, magisq; ea, quæ prior, & maior est. Situ autem tali ori-
 untur, ut altera supra, altera infra sit, & cor inter se positum amplectantur. Habent

intra se corda omnia sinum triplicem, sed magnitudine varia. minutissimorum enim animalium sinus arctiores sunt, ita, ut unus, qui amplior est, uix conspici possit, reliqui sensum effugiant. Mediocrium animalium secundus etiam conspicuus est: maximorum perspicit omnes possunt. Et cum priorem in partem cor suo mictione spectet, ut dictum est, sinus qui amplissimus est, dextrum supremumque recipit situm, minimus sinistrum, mediocris medium. qui autem maximus inter eos est, hic longe reliquis ambobus amplior est: omnes tamen ad pulmonem foramine spectant perpetuo, sed propter exiguitatem meatuum latent, præterquam in uno. Oritur ex eo amplissimo, supremoque sinu uena maior, sedemque dextram tenet, mox per medium sinum formam recipit uenæ, utpote cum ipse uentriculus cordis uenæ particula sit, in qua sanguis restagnet. Aorta de sinu medio exit, non eodem modo, sed per fistulam multo arctiorem in it societatem, & tendit ad latere cordis, cum uena maior sua radice eorum transigat, cum se promittit. Vena item ipsa maior membrana, & cute constat. Aorta arctior est, & uehementer nervosa, deductaque longius, hoc est, ad caput, aut imas partes in angustum admodum coarctatur, ac nervi naturam ex toto accipit. Pars prima uenæ maioris sursum a corde proueniens, scinditur bipartito. Adit alterum membrum pulmones, alterum spinam & uertebam colli nouissimam. rursus membrum, quod pulmonem adierit, bipartito se scindit, quia pulmo in duas partes distinctus sit: deinde singulas fistulas, singulaque foramina subit, amplius ampliora, arctius arctiora, ita, ut pars nulla sit sine foramento, et uenula: quamquam postrema diminutionum præ sua exiguitate uisum effugiunt: quo fit, ut pulmo omni ex parte refertus sanguine uideatur. Hos autem uenæ meatus induci supra fistulas ex arteria pertinententes, certum est. Membrum alterum, quod ad spinam, & colli uertebam diximus tendere, per spinam ipsam porrigitur. quam uenam Homerus notat, cum ait: Venamque inciderat omnem, Quæ per dorsa means ceruices fertur ad imas. Hinc uenula singulae ad singulas costas, & uertebas feruntur. Finditur etiam bipartito hæc eadem uena iuxta uertebam, quæ supra renes posita est. Ita hæc membra uenæ maioris, in ramos sparguntur: sed rursus parte superiore, quæ ex corde protenditur scissam numerosiore uenarum propagine, duo petit loca: quippe quæ alias in latera, & humeros mittat, quæ mox per alas homini ad manus feruntur, quadrupedi ad pedes priores, auiibus ad alas, piscibus ad pinnas, quæ parte prona continentur. quarum uenarum capita iugulares, quæ primum scinduntur, appellamus. sed quæ scissæ ceruicem subeunt, iuxta pulmonem arteriam tendunt, quibus interdum foris apprehensis corruunt homines sensibus ereptis, & palpebris compressis. ita porrectæ, amplexæque arteriam ad interuallum aurium feruntur, quæ maxillæ faucibus coeunt. Denuo inde scinduntur in uenas quatuor, quarum una remeans per cololum, & humerum descendit, & cum priore propagine ad flexum brachij copulatur. secunda ad palmam & digitos cessat. tertia de utraque fede aurium ad cerebrum pertinet, atque in multos præter ues ramulos spargitur: itaque membranam custodem cerebri subit. Cerebrum autem ipsum omnium expers sanguinis est, nec aliquid uenæ, uel auctioris, uel minoris in id cessat. Reliqui rami, qui ab eadem uena mittuntur, partim ambiunt caput, partim ad sedes sensuum, dentesque, gracili uenularum serie terminantur.

De aorta uena minore, eiusque sede.

Caput IIII



Ena etiam minor, quam aortam diximus nominari, eodem spargitur modo in ramos, qui partes uenæ maioris consequantur: uerum meatus eius, & uenulae multo minores sunt, quam uenæ maioris. locis a corde superioribus, uenas hunc in modum haberi nouimus. Pars autem maioris uenæ

uenæ cordi subiecta, fertur elatior, per septūq; applicata, tum ad aortam, tum etiam
 ad spinā membraneis flaccidisq; meatibus continet, mox uena ad iecur ab ea mittit
 breuis, sed lata: de qua multæ ac tenues sparſæ in iecur obliterantur. Rami inde ab
 ipsa iecur transigente duo procurrunt, quorū alter ad septum, & præcordia dicta
 cessat: alter superat repetit, ductusq; per alam ad lacertum brachij dextrile porri-
 git, quæ cæteris uenis se applicat iuxta flexum interiorem. Quamobrem sanguine
 hinc misso, dolores iecoris quidam leuari possunt. Pars altera uena eiusdem breuis
 quidem, sed crassa, latus per sinistrum, pergitq; ad lienem, quæ sparſa in ramulos
 subit, itaq; aboletur. Quinetiam ab eadem maiore propago pari modo ad lacertum
 10 sinistri brachij mittitur: sed quæ ad brachium dextrum procedit, eadem quæ pertin-
 git ad iecur, est. Hæc uero diuersa ab ea, quæ ad lienem pertinet, est. Aliæ item a ue-
 na maiore duæ propagantur, quarum altera ad omentū, altera ad id, quod à carne
 pancreum appellatum est. de qua uenarū frequentia per lacies tendunt, quæ omnes
 in unam desinunt uenam grandem, per totum intestinum & uentriculū ad gulam
 usq; porrectam, quæ & ipsa ramos de ijs quas perrepat partibus, spargit complu-
 res. Vtræq; igitur, tam maior, quàm aorta, renum tenuis, una atq; perpetua tendit.
 hic capitibus renū potius adhærescunt, findunturq; bipartito, uelut in literam lam-
 bda, aut V literam inuersam. uergitq; magis in partē posteriorē corporis uena ma-
 ior, quàm aorta. Spinæ annecti aortam potissimū circa cor uenulis prætenuibus &
 20 neruosis, notum est. Ducitur eadem de corde nimirū amplitudine insigni, sed pro-
 cedens arctior, atq; neruosiore euadit. mittit ea quoq; ad lacies ramos, quemadmo-
 dum maior, uerum longe minores: per angustos enim & fibris proximis, quippe
 quos extenuatos in fibras, causas tamen, cessare ad uenterimus. Ad iecur aut lienem,
 nulla ab aorta pertinet uena. Rami autem illi, in quos uenam scindi utraq; dixi, ad
 coxam utraq; proficiunt, atque os ipsum attingunt. ad renes etiam a maiore,
 aorta q; uenæ deueniunt: sed cauum non subeunt renum, uerum in corpus eorum
 absuntur. Necnon alij duo meatus ab aorta ualidi & perpetui ad uescicam pro-
 cedunt: atq; etiam alij de cauo renum eodem ueniunt, qui nihil commune cum ue-
 na maiore sortiuntur. Singulis item renibus de medio uenæ exorsæ, causæ, neruo-
 30 sæq; iuxta spinam ipsam per uenas se porrigunt: mox in coxam utraq; condun-
 tur, ac delirescunt. deinde denuò porrectæ in clunes apparent: quarum & ipsarum
 postrema, ut in sexu uirilī ad uescicam, genitaleq; coniungunt: sic in femineo ad uul-
 uam, aut uterum pertinent. Nullam sanè uenam de maiore uuluum adire uidemus,
 cum de aorta multæ, frequentesq; ueniant. Ramis etiam tum aortæ, tum etiam ma-
 ioris, aliæ mittuntur propagines: quæ primum ad inguina ampliusculæ, causæq; ac-
 cedunt: deinde per femora, cruraq; in plantas, & digitos sinūt. Atq; etiam duæ aliæ
 per inguina & femora commutatis uicibus perferuntur: altera de parte dextra in si-
 nistrā, altera de sinistra in dextrā, ac cæteris uenis circa poplites se coniungunt.
 Quemadmodum uenæ se habeant, & undenam suam originem ducant, apertum
 40 iam est. Continet autem genus animantium omne sanguinis compos, uenarū in-
 ria, & genera summa, eo quo exposuimus modo: nam reliqua copia uenarum non
 simili ratione in omnibus est, neq; enim partes eodem modo, aut eadem in omni-
 bus habentur. nec uero æque in omnibus patet uenarum series, sed potissimum in
 ijs constat, quibus sanguinis copia & præcipua magnitudo est. nam in minutis, san-
 guinis uel inopibus, uel per naturam, uel per immodicam corporis obesitatem, haud
 æque inspicere possunt. Alteris enim meatus quasi alueoli quidam multo intersepti li-
 mo permiscuntur: alteris paucæ, eademq; fibræ potius quàm uenæ continentur.
 una tamen, quam maiorem ex præcipua magnitudine cognominamus, potissimū
 euident in omnibus etiam minutis animalibus est.



Eruorum mox ordinē perfequemur. Origo eorum quoq; in corde est. Id enim neruulos suo ampliore uentriculo continet. & uena aorta appellata, neruosa est, & quidem postrema eius neruo omnino consistit: quippe quę nullo intus cauo distinguant, tendanturq; modo neruorū, qua deiununt, applicata ad nodos ossium lubricos. Ceterū natura neruorū nō more uenarum continua de eodem initio procedit. Venę enim, ut in depictis canabis, hoc est sonibus riuo multiplici sparsis patet, figuram totius corporis distribuūt, ita, ut corporibus admodū extenuatis, partes omnes uenulis referre conspiciant. Locutus enim idem uenulis in macilentis, carne in corpulentis redundat. Sed nerui ducti distractiq; passim ad artus, & flexus ossium applicant. quod inde etiam per se potest: nam si eorum natura esset cōtinua, late iam in extenuatis corporibus continentia omniū pateret. Summę neruorū partes, quę membrū ad salendum accommodatum continet, poples dicta: & quę se geminam porrigit, tendo nomine: & quę ad uires corporis iuuant, attendo, & humerarius. reliquę quibus ossium nodi deligantur, nomine uacant. Nam ossa omnia siue fors uicissim tangunt, siue alteri inferitur alteri, neruis ligantur: & circiter ossa quęuis neruorū copia ducitur, capite excepto: id enim non neruis, sed futuris ipsorum ossium continetur. Nerui natura fissilis in longitudinē tendit, scindi per latitudinem nō potest. Intendiq; uehementer idonea est. Humor circa neruos mucori similis, albidus, glutinosusq; consistit: quo ipsos neruos & nasci, & ali certum est. Nerus ignem nō patitur, cum uena patitur: & incisus solidari non potest. Pars corporis nulla stupore tentatur, quę neruo caret. Neruis plurimis, pedes, manus, & scapulę continent: atq; etiam ceruices, & lacerti. Quibus datus est sanguis, si idem omnibus nerui adiuncti sunt. Sed quę nulos habent articulos, priuataq; pedibus, & manibus sunt, ijs prætenues, incertiq; habentur. quod propter in piscibus, qui iuxta pinnas positi sunt, si præcipue ueniunt in conspectum.



Fibrę inter neruum, & uenam, suam habent naturam: & nonnullę huiusmodi saniem appellatum, continent. tendunt a neruis ad uenas, ac inde ad neruos. Secundū etiam genus fibrarum est, quod consistere in sanguine solet: quantq; nō cuiusq; animalis. Spissari autem sanguis nō potest, si id genus fibrarum detrahatur: spissatur uero, si non detrahatur. Genus id ergo fibrarum tametsi maiore ex parte in sanguine animalium inest, tamen cerui, damę, bubalę, & aliorum quorundam sanguini deest: quocirca eorum sanguis non similiter, atq; ceterorum concreuit. Sed ceruorum perinde ut leporū solet spissari, uidelicet non coitu firmiore, ut ceterorum, sed fluido, quale lac est, qd sine coagulo sponte coierit. Bubali sanguis aliquantulo amplius spissatur: quippe qui proxime ouillo, aut paulo minus consistat. Vena, neruus, & fibra ita se habent.



Sua alia ab alijs nexa, & omnia inter se apta, unam continentant seriem modo uenarum: nec est ullum os, quod seorsum ipsum per se maneat. Initium uero in omnibus, quę ossibus constant, spina est: quę compacta ex uertebis a capite ad coxas porrigitur. Vvertebrę omnes foramine medio peruicę sibi iunguntur. Extat os capitis continuum, nouissimis superimpositum uertebis, quod calua dicitur. Eius pars serrata, futura nomine significatur. Pars hæc non simili modo in quoq; genere animalium habetur. Alijs enim osse continuo calua perficitur, ut canis: alijs compacto, ut homini, eiusq; scem

nae futura circulariter est. Mari tres in summū uerticem ascendunt future, coeuntq; in figurā triangulāe speciem, sed iam & tri caput uisum sine ulla futura est. Constat sane caput non quatuor ossibus, sed sex. quorū duo exigua, scilicet reliquorū comparatione circa aures posita sunt. Maxillae à capite protenduntur, ossa duo: quarum inferiorem animalia omnia mouent, excepto fluuiatili crocodilo. hic enim unus nō inferiorem, sed superiorem mouet. Maxillis, dentium genus inhaeret. os partim cauum, partim solidum, & adeo firmum, ut solum inter ossa ferri aciem respuat. Oritur à spina, fibula, iugale, & ordo costarum. Pectus etiam costis impositum est. quae quidem aduersae inter se coeant, cum reliquae breuiiores sint, quam ut facere idem queant. Nullum enim animal est, quod circa uentrem os habeat. Sunt item ossa humerorum, & quae scapulae appellantur, & quae ijs annexa dependent, brachia, & manus. Modus idem compaginum, uel in ijs est, quae crura habent priora. Acetabulum infra, qua spina definit, à coxa est: & ossa iam crurum oriuntur, quibus femora & tibiae constant, pernae, aut culinae nomine. quorum pars malleolus est, & malleoli calcar: uidelicet in ijs, quae habent malleolos. ab ijs ossa pedis minuta, & plura subiacent. Quae igitur ex sanguineis pedestribus animal generant, haec ossa non multo diuersa habent: sed ad proportionem tantūmodo duritia, mollitie, magnitudine differant. Ossium item animalis eiusdem, alia medullam intra se continent, alia minime. Sunt nonnulla, quae suis in ossibus nullam omnino habere medullam uideantur, ut leo: quod admodum exiguum ac tenuem habeat, eamq; in paucis ossibus, scilicet enim inferioribus, atq; brachijs. Constat profecto leo praecipue omnium animalium ossibus solidis: sunt enim adeo dura, ut ex eis concussis, ignis uelut à silice elidatur. Delphinus etiam ossa habet, non spinas. Ceterorum animalium sanguineorū ossa, aut paulo inter se differunt, ut auium: aut proportionem eadem sunt, ut piscium. Qui enim inter eos animal generant, cartilaginem pro spina habent: ut ea, quae cartilaginea appellauimus. qui autem oua pariunt, spinam continent: quae perinde ut dorsum in quadrupedum ordine habetur. Sed proprium in piscibus est, quod nonnullis spinulae quaedam praetenuis separatim per carnem inhaerent. Serpentinibus etiam dorsum piscium more compleri apertum est. At uero ea quae inter quadrupedes oua pariunt, os aut spinam pro suae magnitudinis modo meruerunt. maiora enim ossis naturam potius obtinent, minora spina potius in ossis uicem fulciuntur. Omnia prorsus animalia quae sanguinem habent, dorso constant, aut osseo, aut spineo. cetera ossa alijs insunt, alijs desunt. ut enim partes corporis quaeque habentur, ita ossa quoque ad partes accommodata habentur. Quibus enim crura, & brachia desunt, ijs pernae aut culinae praedictae etiam desunt. Nec uero ijs quibus partes, eadem quidem, sed dissimiles sunt, eadem ossium ratio seruatur: sed aut purius minoris uel modo differunt, aut proportionem. Ossa igitur ita se habent.

De cartilagine, eiusq; cum osse differentia.

Caput VIII

Cartilago differt ab osse pluris, minoris uel ratione, cum aliā natura eadem, qua ossa constet. Et quemadmodum os praefectum nunquam recrescit, ita & cartilago rupta nunquam reparatur. Terrestrium, quae & animal gignunt, & sanguinem habent, cartilago nullo foramine hiscit, nec ossium more medullam continet. At uero aquatiliū cartilagineis, quod per dorsum proportionatum ossibus tendit, cartilago est, humorem in medullae speciem continens. Gressiliū quae animal gignunt auriculae, nares, extremaq; ossium nō nulla cartilagine constant.

D 3

De ungue, ungula, cornu, & dentibus, eorumq; cum ossibus
conuenientia. Caput IX



Vnt item alia partium genera, quæ naturam nec eandem habent, quæ ea quæ expoliata sunt, nec longe ab ijs remotam, ut ungues, ungulæ, cornua: præterea rostrum, quale datum auiibus est. hæc enim & flexilia & fissilia sunt, cum nullum os uel flecti, uel findi possit, sed fragile quoddam habeatur. Colores cornuum, unguium, ungularum, pro cuius pilorumq; colore sequuntur. etenim cutis nigra, cornua nigra, & ungulæ nigra oriuntur: & candidæ pari modo in colore respondent, & cornua, & ungues, & ungulæ. medijs etiam medium eadem colorem præferunt. At dentes naturam ossium æmulantur: quam ob rem hominum nigrorum, ut Aethiopum atq; similitum, dentes & ossa candent: ungues nigri modo suæ cutis apparent. Cornua parte plurima caua sunt ab radice, quatenus ambiunt os, quod ortum à capite cauo cornu infertur, totumq; implet: in mucronem tamen solidum exeunt, & simplici parte extrema constant. Certeis tantummodo tota solida, & sparsa in ramos, & omnibus annis decidua, nisi castrentur: cum ex cæteris cornigeris nullum cornua amittat. De castratis autem postea differemus. Adhærent cornua cuti potius, quàm ossi: unde fit, ut in Phrygia & alibi boues sint, qui cornua perinde ut auriculas moueant. Quæ habent ungues (habent autem quibus digiti, digiti uero ijs sunt, quibus pedes, excepto elephantis: huic enim digiti indiuisi, ac leuiter formati, nec ungues omnino sunt) hæc ergo, aut rectis unguibus sunt, ut homo: aut aduncis, ut inter pedestria leo, inter uolatilia aquila.

De pilis, & ijs quæ pilorum pice funguntur.

Caput X



De pilis, atque de ijs quæ uicem pilorum suppetunt, & ob eam rem pilis proportionalia dicuntur, atque etiam de cute, res ita se habet. Pilos habent quæ pedestria, eademq; uiuipara sunt. Cortice autem integumentum, quæ ouipara sunt pedestria. Squama uero pisces tantum, qui ouis arenidum illud pariunt. Nam ex longis conger, tale ouum non ardit, nec murena. anguilla uero nullum omnino ouum generat. Crassitudinis, tenuitatis, cõpitiæ, & magnitudinis pilorum discrimina, pro partium quibus adhærent conditione, atque pro cutis qualitate proueniunt. fit enim magna ex parte, ut pilis & duriores, & crassiores cuti crassiori enascantur. Plures autem longiores humidioribus locis, atque cauatiorebus (dummodo sint ad gignendum pilum idonei) prodeunt. Hoc idem de genere quoque tam squama munito, quàm cortice intelligi licet. Quæ igitur molles suapte natura pilos habere solent, hæc per usum pabuli meliores, duriores incipiunt gerere: contra autem molliores, paucioresq; ea, quæ duros, copiososq; habuerint, eadem illa scilicet ratione. Regionum etiam tepore, aut frigore differentia est, ut pilis hominum locis calidis duri, frigidis molles oriuntur. Sunt molles, qui promissi & simplices: duri, qui crispi.

De pilis & cute, & ijs quibus pilis & cutis.

Caput XI



Atura omnium pilorum fissilis est: sed pluris minoris uel ratione inter se differunt. Nonnulli paulatim adeo duritate degenerant, ut non pilis præterea, sed spinis similes esse uideantur, ut pilis herinaceorum. Quod idem unguibus etiam euenit: quippe cum in nonnullis animalium, genus unguium præ nimia duritudine, nihilo ab ossibus differat. Cutis homini proportionem magnitudinis tenuissima est. Inest in cute omnium lentior quidam mucosus: utrum alijs minus, alijs magis: ut in tergore bubulo, ex quo glutinum facere solent.

lent. Quinetiam ē piscibus glutinum à nonnullis excōquitur. Sensu cutem ipsam carere constat, maximeq; in capite, quoniam ibi nulla interposita carne ossi adhæreat. Vbiq; cutis per se, ac sine carne est, uulnerata non coit: ut in gena, bucca, præputio, palpebra. Contextu perpetuo cutis in omnibus animalibus continuatur: nec alibi interpellatur, quàm ubi naturales meatus solent euaporare, atq; etiam in ore, & unguibus. Cutem omnia habent quibus est sanguis: pilos non omnia: sed sicut distinctum iam est. Mutatur color pilorum in senectute, candidique pili efficiuntur in hominibus. quod uel cæteris animalibus accidit, sed non satis aperte, præterquam in equo. Candescunt pili à parte suppositrema. Plurimus tamen canorum numerus candicans illico existit: qua ex re patet canitiem non ariditate committi, ut quidam uolunt. nihil enim illico aridum gigni solet. Cutis autem uiuio, quod uiciliginem appellamus, pilos omnes produci canos apertum est. Iam nōnullis pili dum ægrotarent, incanuerūt: quibus in bonam ualitudinem restitutis, nigri renati sunt, canis defluxis. Canescere pilos ocyus opertos, quàm detectos, distictosq; aduertimus. Tempora hominum, & partes primores quàm posteriores celerius canitiem sentiunt. pubes nouissime canescit. Pili in homine animalium omnium uno partim simul, partim postea per ætates gignuntur. Congeniti sunt pili capitis, & superciliarum, & palpebrarum: post geniti, pubis primum, mox alarum, postremo menti. Loca enim quibus pili proueniant, totidem sunt congenitis deputata, quos post genitis. deficiunt ac defluunt maxime, primiq; per ætatem pili capitis, non tamen omnes, sed tantum priores: parte namque posteriore caluus nemo efficitur. Ergo capitis leuitatem, caluitium nuncupamus: quam rem in supercilijs salitium appellamus, quoad melius uocabulum inuenerimus. neutrum eorum priusquam coëptus coïtus ueneris sit, accidere nouimus. Caluitij mulieres esse immunes, & pueros, & spadones, apertum est. Pili post geniti, ijs, qui ante pubertatem castrati sunt, non exeunt: & post pubertatem excis, soli decidunt, præterquam pubis. Pili in mento mulieris non prodeunt, nisi interdum pauci, cum menstrui cursus substituerunt: & ut in terra Caria mulieribus sacerdotibus euenire alunt: quod diuinationis indicium interpretantur. Reliqui pili, qui postea gigni solent, mulieribus quoque proueniunt, sed parcius. Fieri potest, ut homo, tum mas, tum etiam fœmina, pilis post genitis careat, iam inde ab ortu naturæ ultio contracto: & nisi ut pubescant, contingat, steriles in gignendo sunt. Crescunt ceteri pili plus minus uel, prout singulorum ratio postulat, maxime in capite, mox in barba, & præcipue quibus pili tenuiores. Nonnullis etiam supercilia per senectutem adeo hirsuta redduntur, ut tondendum sit. quod propterea euenit, quia cohesioni apposita sint ossium, quæ senescente ætate laxantur, & inde plus humoris transmitti patiuntur. At uero pili palpebrarum, nunquam plus iusto excrescunt. defluunt rebus ueneris incoëptis, eoq; magis, quo usus ueneris fuerit amplior. eosdem etiam lentissime omnium canescere clarum est. Pili euulsi subnasci denuò possunt, dum citra ætatis florem degitur, nec ulterius. Habet autem genus quodq; pilorum ad suam radicem lentum quandam humorem, quo proclius ubi euulsum est, si qua leuiuscula tangat, adhæret, ut ea trahere possit tenacius. Quibus uero animalibus uersicolores sunt pili, eisdē etiam in cute uariis ille color habetur, atque etiam in lingua. Barba non parī modo effunditur omnibus, sed alijs tam maxillæ, quàm mustax, & mentum, pilorum frequentia integuntur: alijs mentum leue, & mustax: maxillæ pilosæ cernuntur. Caluescere minus solent, qui mento sunt bipartito. Crescunt etiam pili quibusdam in morbis, ut præcipue in tabificis. Quinetiam in senectute & defuncto augecunt, durioresq; redduntur: quod idem unguibus quoque euenit. Libidinosis pili congeniti maturius defluunt: post geniti, celerius sese promunt. Minus, qui uarices habent;

caluescunt. Et si calui habere inceperint, pilos nonnulli producunt. pili præcis non ab incisura augentur, sed inferius ab radice exeunt: atque ita euadunt longiores. Piscibus quoque extenuatis ac senescentibus, squamæ duriores, crassioresq; efficiuntur. Quadripedum etiam uilli, lanæ uel, senectute prolixius augentur, quanquā rarefiant, sicutq; pauciores. & ungulæ quoque maiores in senectate redduntur. quod idem rostris etiam auium euenit. Incrementum unguicularum idem, quod unguis est.

De pennis auium, & earum mutatione, aliorumq; animalium, è potu quorundam fluminum.

Caput XII



ENNÆ auium nullæ per ætates mutantur, præterquam grûm, quas nigrescere in senectate perspectum est. At uero per affectus temporarios, quoties frigora urgent acriora, pennæ uolucrum unicolores interdum è nigris, aut nigriusculis, albidis uel, in albas transeunt, ut corui, passeris, hirundinis. cuius rei contrarium, ut quicquam ex genere albo ueniret in nigrum, nunquam uisum est. Temporum quoque uicissitudine bona pars auium ita colore immutatur, ut quænam sint, latere possint, nisi rem peritius noueris. Aquarum item diuersarum usu, nonnulla suos immutant colores: alibi enim candida, alibi nigra redduntur. Sunt etiam aquæ multis in locis, quas cum oues biberint, moxq; inierint, nigros generent agnos: ut in terra Assyride agri Chalcidici Thraciæ facit amnis, quem præ nimia frigiditate Psychrum uocant. Et in Antandria quoque duo sunt fluuij, quorum alter candorem, alter nigrætiæ pecoribus facit. Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur: quæ ob rem Xanthum pro Scamandro nuncupatum ab Homero autumant. Lepori uni pili, & in bucca intus, et sub pedibus sunt: cum cetera animalia nec intra os habeant pilos, nec parte pedum resupina, sed prona. Musculus etiam piscis pilos in ore intus habet uti ce dentium, quibus omnino caret, suillis similes. Sed pili, ut dictum est, præfecti augeri ab radice possunt, superne non possunt. pennæ autem nec ab radice, neque superne ab incisura possunt reparari, sed cadant, necesse est. Nec penna apum, aut quæuis insissa renasci potest, cum euulsa est. Aculeo etiam apibus detractio, nullus subnascentur alius: imò breui moriantur, necesse est.

De membranis in sanguineis animalibus.

Caput XIII



VNT & membranæ in sanguineis animalibus: quæ quidem pars similis cuti prætenui, spissæq; est. Sed diuersum sanè genus id adest, quippe quod hæc nec fissile, nec euulsile sit. Ambit singula, tum ossa, tum etiam uiscera membrana, tam in maiore, quam in minore animalium genere: uerum in minore sensum effugit, quoniam admodum tenuis, atque exigua sit. Maximæ inter membranas duæ sunt illæ, quibus cerebrum operum munitur, altera supra adhæret ossi, quæ firmior, & crassior est: altera infra contigua cerebro, mox quæ operit cor, magna habetur. Præcisâ membrana ipsa syncestra non coit: & ossa suis dispoliata membranis syderantur.

De omento.

Caput XIII



Mentum quoque non nisi membrana est: quod omnia habent, quæ sanguine non carent, sed alia pingue, alia macilentum. Oritur id, & dependet in ijs, quæ animal generant: eademq; denata parte utraque sunt, à medio uentre qua ueluti quædam sutura ducitur. nec secus in ijs, quæ altero dentium ordine carent, à maiore uentre dependet.

De uesti

De uesica, & quomodo generentur calculi.

Caput XV



Uesica etiam membrana est: sed genus id aliud membranæ est, quippe quod tendi ingenue possit. Non omnibus data uesica est, sed nō tantum, quæ animal gignunt. ouipari autem generis nulli, præter testudinem, data est. Nec uesica præcisa coire potest, nisi ad ipsum exordium suæ ceruicis. quanquam non ignoro ita aliquando contigisse, ut uulnerata uesica solidesceret. sed quod admodum raro contingit, parum id obseruandum censeo. Defunctis nihil humoris in uesicam transmittitur. At uiuis non solum humor, sed etiam sicca quædam concrementa descendunt, ex quibus calculi conficiantur. Iam nonnullis talia in uesica consisterunt, quæ nihilo differre à conchylijs uiderentur. Ergo de uentis, neruis, fibris, cute, membranis, atque etiam de pilis, unguibus, ungulis, cornibus, dentibus, rostro, cartilagine, ossibus, eorumque proportionabilibus statuendum ad hunc modum est.

De carne.

Caput XVI



Carnis autem hæc, & quod carni simile in genere sanguineo, est omnibus inter cutem, & ossa, aut quæ ossi proportionem continentur. Ut enim se habet spina ad os, ita carnis æmulum illud ad carnem. Diuisibilis undique caro est, nec uenarum aut neruorum more in longum secari tantum idonea. aboletur, & in uenas, fibrasque transit, quoties animal extenuatur, & gracilescit. Vertitur item in pingue, quoties pabuli copia suppetit. Quibus multum est carnis, ijs uenæ arctiores, & sanguis rubentior, & uenter ac uiscera parua. Quibus parum, ijs uenæ ampliores, sanguis atrior, uiscera maiora, & uenter auctior. Pinguescunt intra carnem, quibus paruus est uenter.

De adipe, & sebo: & quæ animalia adipe, quæ sebo pinguescunt.

Caput XVII



Adeps autem & sebum differunt inter se, cum sebum fragile usquequaque sit, & cum refrigit, concreseat: adeps liquidus sit, minusque aptus durari, lura enim sebo opimorum concrescunt, ut ouis, ut capra. Adipe pinguium liquida resistunt frigori, ut equi, ut suis. locis etiam discrepant. Adeps enim inter carnem cutemque solet consistere: sebum in fine carnis semper est. Omentum quoque adipe pinguescentibus adipeum est, sebo obesit febale. Quæ parte utraque dentata sunt, adipe pinguescunt: quæ una, sebo. Iecur est uisceribus adipeum nonnullis consistit, ut inter aquatilia cartilagineis: quorum iecinoribus colliquis oleum facimus. ipsa tamen cartilaginea nullo discreto adipe carni, uentrique adherente pinguescunt. Piscium sebum adipem præ se fert, nec concreescere solet. Animalia quæuis aut intra carnem, aut seorsum pinguescunt. E quibus autem pingue separatum non est, ea minus per uentrem, omentumque pinguescunt, ut anguillæ. paucum enim est eis sebum in omento. Plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & præcipue quæ parum se moueant. Cerebrum, ut adipe pinguescentium, pinguiusculum est, uelut suis. Sic sebo obesum, squalidiusculum fenitur, ut ouis. Renes ex uisceribus maxime pinguescunt. uerum dexter minus semper, quam sinister. & quamuis uehementer fuerint pingues, tamen aliquid semper medijs deest. Quæ sebo pinguescunt, magis quam quæ adipe, in renibus opimandis luxuriant, ac omnium præcipue oues, quippe quæ renibus pingui undique obductis intereant, quod ubertate pabuli sit, ut in Sicilia agro Leontino fieri constat.

diei agere oves ad pascua pastores locis illius solent, quo minus capiant pabuli.

Pupillas omnibus animantibus easdem esse.

Caput XVIII



Mnium uero animalium commune pupillæ institutio est. omnibus enim quæ partem hanc possident, nec duris oculis sunt, sebo constiat. Minus esse fecunda, quæ adipe pinguescunt, siue mares, siue foeminae, notum est. Omnia ætate proejecta potius quàm nouella pinguescunt: sed præcipue, cum iam suæ longitudinis ac latitudinis modum adeptæ, augeri in profundum incipiunt.

Sanguinem omnibus communem, & necessarium esse animantibus sanguini: de quo sanguinum uarietate.

Caput XIX



Anguis in primis necessarius, communisque sanguineis omnibus animalibus est: nec aduentitius suppetit, sed uernaculus atque intimus in omnibus integris, atque impuudis habetur. Venas hic uasæ sibi, & conceptacula habet: nec in ullo alio, nisi in corde, præter uenas continetur. Tactum nullo in genere sentit: sicut excrementa quoque in alio contenta, sensu carere certum est. Quinetiam cerebrum & medulla tactum non sentiunt. Effluit sanguis quancunque partem incideris carnis uiuæ, ac incorruptæ. Si sanguis integer est, rubet, & dulcis saporis est: sed si uel natura, uel morbo sit uittatus, atrior cernitur. Nec uero admodum crassius, aut admodum tenuis est, qui optimo habitu constet. humidus & calidus semper est, quandiu in corpore animalis continetur. At ubi effluerit, conerescit omnium, præterquam ceruorum, & damarum, & si quid aliud natura eiusmodi sit. Itaque cæterorum omnium sanguis spissari solet, nisi fibræ quibus refertus est, eximantur: sed celerrime omnium sanguis tauroorum coit, durescitque. Copia sanguinis in primis animalibus ijs, quæ animal & intra se formant, & in lucem edunt: mox ijs sanguineis, quæ pariunt oua. Quæ autem uel natura, uel arte, bono habitu sunt, ijs nec multum admodum sanguinis est, uelut ijs, quæ per aliquam portionem recentem sanguine exundant: nec parum, uelut ijs quæ nimium sunt obesa, quippe cum præpinguia omnia sanguinem quamuis purum, tamen paucum habeant: & quo plus pinguedinis, eo minus possideant sanguinis. pingue enim omne exangue est. Obesa item sanguinem habent imputidum, quanquam sanguis & quæ sanguinea sunt facile putrent: ac præcipue quæ ad ossa propius applicantur. Homini sanguis tenuissimus ac mundissimus. tauro & asino inter ea quæ animal generant, crassissimus & nigerrimus: parte etiam inferiore crassior, & atrior est, quàm superiore. Palpitat intra uenas sanguis omnium animalium, pulsusque simul undique mouetur: solusque omnium humorum sparsus per totum corpus animalium est. Et semper quædiu uita seruat, sanguis unus animarum, & feruet. oritur primum in corde, antequam totum corpus formetur. Si multum sanguinis effluat, anima deficit: si nimium, uita interit. Si sanguis immodice humescit, morbus infestat: sic enim in speciem saniei diluitur, & adeo ferescit, ut iam nonnulli sudore cruento exundant. Idem etiam interdum causæ est, ut qui effluerit, aut omnino conerescere nequeat, aut incomptè particulatimque spilletur. Dormientibus porro sanguinis copia partes exteriores deserit, subitoque interiores, ita ut ad actio cultello non æque effluere possit. Fit per cõcoctionem ex sanie sanguis, ex sanguine adeps. Vitiato excrecenteque sanguine, profluuium uel e naribus, uel per infera mariscis mouet, aut uarices fiunt. Idem putrescens pus reddit, quo demum cõcalescente porus, id est, rosus lapis consistit. Foeminis sanguis nigrior & crassior, quàm maribus est, dummodo cætera assint, pariter quæ uel ab ætate, uel à sanitate proficiant. & minus sanguinis

guinis per summa corporis foeminarum est: plus enim parte interiore continetur. Sed omnium foeminarum maxime mulier sanguine abundat. Et quæ menstrua appellamus, plurima fieri in mulieribus solent: quod genus sanguinis uitiatum ægro-
tansq; fluit immodice, atq; profluuium ob eam rem dictum est. Ceteris morbis san-
guinis minus mulieres infestantur, quam uiri. paucis item mulieribus sunt maris-
scæ, aut uarices, aut eæ nanibus profusio sanguinis. & si quid eorum acciderit, detri-
mentum in menstrua decumbit. Aetatum etiam ratione sanguinis discrimen, tum
in modo, tum in genere recipit. etenim in ætate admodum iuuenili saniem trahit, &
largior est: in senectute autem crassius, niger, & paucus. medium tenet in media fir-
maq; ætate. Concrefcit etiam facile senum uel in corpore sanguis, qui per summa
est: quod idem nunquam iuuenibus euenit. Sanies, sanguis incoctus est: aut quia
concoctus nondum est, aut quia in serum degenerauerit.

De medullis, lacte, sero, & caseo.

Caput XX



Edullæ rationē ijs addere debemus: nam ea quoq; humidis annu-
meranda generibus in nonnullis sanguineis animalibus est. Omnia uero
quæ suapte natura humida in corpore sunt, conceptaculis quibusdam
tanquam uasculis cōtinentur: ut sanguis in uenis, medulla in ossibus.
Alia in membranis, aut cutibus, aut uentribus. Nouellis adhuc ani-
malibus, medulla cruenta admodū est: ætate prouectis, ut adipe pinguescentibus, adi-
pem trahit. sic sebo deputatis generibus, sebum præ se fert. Sed quancūq; medulla nō
nisi inclusa ossibus est, tamen nō ossa omnia medullā intra se continent: sed ea tantū
quæ caua habent: tamen ne ipsa quidē omnia continent. ossa enim leonis partim
nullā, partim admodū exiguā habent. quamobrē nullā omnino medullā leones ha-
bere nōnulli putarunt, ut dictū est. In suillis etiam ossibus minus medullæ est: et nō
nullis omnino deest. Hæc serè semper in animalibus natia & cōgenita humidū ge-
nera habent. Adnata autē posterioraq; sunt, lac & genitura: quorū alterum non eo-
dem modo in omnibus est, sed quibusdā pro genitura thorj genitale uirus sui ge-
neris habet, ut piscibus. Quæ uero lac habent omnia, māmīs id continent. Mamme
autē datæ ijs sunt, quæ animal & intra se concipiunt, & in lucem adunt: ut ea quæ pi-
lis integuntur, uelut homo, & equus. Ceteræ etiam in aquatili genere, ut delphinus,
uitulus marinus, balæna. Hæc enim māmās habent, & lac. At ea quæ oua pariunt,
aut ouo intrus concepto, animal pōst in lucem excludunt hæc, & māmīs carent & la-
cte, ut pisces, ut aues. Genus autē unum quodcūq; lactis habet tum saniem dilutam, qd
serum uocamus: tum corpulentū quiddā, qui caseus dicitur. Plus casei lac illud ha-
bere uidemus, quod crassius est. Coit lac eorum, quæ nō utrinq; dentata sunt. quæ
propter caseus ex ijs sit, quæ inter urbana, dentium ordine carent superiore. eorum
autem quæ utrinq; dentata sunt, lac coire nō potest, sicut nec pingue, & tenue, dul-
ceq; est. Tenuissimū camelus est, mox equæ, tum asinæ: crassissimū bubulū est. Nullū
lac coit frigore, sed serum potius trahit. Igne nimirum omne spissatur, & crassescit.
Nulli serè animalium lac fieri solet, antequam uterum ferat: nec dum ferunt, utile
omne est, sed primū, nouissimūq; inuile. Non pregnātib; aliquādo, sed raro, edu-
līs quibusdam efficitur, ut lactescant. etiam quibusdā mulieribus natu maioribus,
suctu frequentiore, lac prodijt, & copia tanta, ut infantem enutrire potuerint. Vbe-
ra etiam caprarū, quæ coitū non patiunt, pastores mōtis Oetæ utrica perficāt uehe-
menter, ut dolore infligant, itaq; primū cruentū humorē eliciunt, mox purulentū,
postremo lac non minus, quā ex ijs, quæ uenerem pariant. Maribus magna ex
parte, nec bestijs, nec hominibus gignit lac. fieri tamē potest, ut aliquibus interdū gi-
gnatur, nam & in Lemno insula caper ex māmīs, quas geminas iuxta genitale ge-

rit, tantum lactis emulgebatur, ut colostrā inde conficerent. quod idem etiam proli masculæ capri illius euenisse accepimus. Sed hæc ostentis annumeranda potius ducunt. nam & Lemnio illi pecoris domino consulenti, Deus amplius incrementū peculij futurū respondet. Viris post pubem exiguū nōnullis exprimi: ueruntamen per suctū frequētiore, uel multū prodisse aliquibus traditū est. Lactis inest pinguedo, quæ etiam concreto oleū propē trahit. Caprinū lac misceere cum ouillo Siculi, & quibuscumq; sit copia caprini, consueuerunt. Coit, spissaturq; potissimū, non modo quod plurimū habet caseum, uerumetiam quod squalidiore. lactis copia quibusdā maior, q̄ ad fœtus alendos satis sit. Cōmodum ad conficiendū, reponendūq; caseum præcipue ouillum, caprinūq; est: mox bubulum, equinū, ac alininū misceant ad phrygium caseum conficiendū. Bubulum fertilius caseo est, quā caprinum. cum enim ex amphora lactis caprini formagines obolæ unde uiginti conficiantur, bubulum eadem mensura triginta facit, ut pastores cōfirmant, quibusdā quantum satis ad fœtum sit, tantum gignitur: nec ulla copia, aut ad reponendum cōmoditas suppetit, ut quibus mammæ plures, quā binae, nulli enim in eo genere lac, uel copiosum, uel caseo utile. Cogitur lac succo siculno, & coagulo. Succus lana exceptus paulillo lacte ablutur. quod iniectū lactis copiam densat, atq; collostrat.

De coagulo, & pabuli genere, quod lactis copiam extinguat, quodq; idem augeat.

Capit. XXI

20



Oagulū, lactis substantia est: quippe quod in eorū uentriculo, quæ adhuc lactent, continetur. Est ergo coagulū lac, ignē habens intra sese, qd cum animalis tepore concoquere, caseum traxerit. Habent coagulum omnia ruminantia, & inter dentata utrinq; lepus. Quo uetustius coagulum est, eo præstantius. tale profluuiū alui mederi præcipue potest: atq; etiam qd leporis est. sed laudatissimū hinnulū. Plus minus uel emulgeri, discrimen aut pabuli, aut magnitudinis animalium efficit. Nam pusillæ buculæ, quas Phasiana regio fert, singulæ abunde beneficium pabuli mulgent. & Epitroticæ uaccae præ præcipua magnitudine, amphoras singulas singulæ implent lactis, mensuræq; eius dimidium mammis duabus præstant. cretus qui mulget, aut paululū se inclinat, quoniam fendo ubera contingere nequeat. Cæteras etiam quadrupes magnas terra eadē Epirus gignit, excepto asino: sed præcipue boues et canes. Pastu opus est grandibus largiore. quē terram illam abunde præbere, & loca singulis anni temporibus accōmodata habere certū est. Boues igitur egregiam magnitudine ibi sunt: atq; etiā oues pyrrhicæ, à Pyrrho rege ita cognominatæ. Papuli genus aliud copiam lactis extinguit: ut medica herba, & præcipue ruminantibus. Aliud auge, ut cynisus, ut eruiū. Sed cynisus dum floret, incōmodus est: urit enim tantisper, atq; extinguit. Eruium pregnantibus nō prodest: facit enim partū difficiliore omnino. Quæ in quadrupedū genere sunt edaciora, eadē ut ad possidendū meliora, ita ad lactis etiam copiam esse foecundiora, uidelicet dum alimēti copiam habeant, planū est. Nōnulla etiā flaruosa, pastu exlita, copiam efficiunt lactis: ut fabæ largius datæ ouibus, capris, bubus, capellis. faciūt enim ut ubera demittant. Indiciū autē futuræ copiae lactis, cum ante partū ubera spectant deorsum. Edurat diu lac omnibus, si nō coeant, nec pastu careant copioso. sed omnī maxime quadrupedū, ouibus: quippe quibus mulctra mensium octo spacio continueat. Deniq; ruminantibus lac & copiosius, & caseo utilius emulget. Boues circa Toronam, paucis ante partū diebus, lacte carent: reliquo tempore habent per penū. Mulierū lac cōmodius lactentibus est, quod liuorem trahit, quā quod candidum est. & fuscæ salubrius habent, quā candidæ. Est porro ad alendum ualidius, in quo plus casei est: sed infantibus salubrius, quod minus casei contrahat.

De semine

De semine genitali, & eius natura.

Caput XXII



Emen genitale omnia emittunt, quæ habent sanguinē. Quid & quæ admodū conferat hoc ad generationē, suo loco dicitur. plurimū uero proportione corporis homo emittit. Pīlos habentiū semen lentū est: cæterorū nullam habet lentitām. Album omnium est. nec audiendus Herodotus, qui Aethiopes geniturā colore nigro promere scripserat. Exit profectō semen hoc genitale, albū & crassum, si integrū est: sed foris tenue totū redditur & nigrum. Nunq̃ id gelu concrefcit: imō admodū extenuat̃, & aque tum colorem, tum etiam substantiā trahit: calore aut̃ coit, & crassescit. & quod de uulua effluxerit, aliquandiu in ea iam immoratū, id crassius prodit. nō nunq̃ etiam siccum, contortumq̃. Delabitur in aqua quod fecundū est, atq̃ subsidit: quod aut̃ insecum dum est, diffunditur, atq̃ exolefcit. Falsum etiam est quod Ctesias de genitura elephaniorum scriptum reliquit.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE HISTORIA ANIMALIVM LIBER QVARTVS, INTERPRETE THEODORO.

De animalibus que sanguine careant, quatuorq̃ eorum generibus.

Caput I



DE PARTIBVS animalū habentiū sanguinē, quas cōmunes, quas uē proprias singula habent genera: atq̃ etiā de ijs quas similes, dissimilesq̃ appellauimus: deniq̃ de omnibus, tam interioribus, quā exterioribus partibus, dictū iam est. Nunc ordinem animalium, quæ sanguine carent, persequemur. Genera in hoc ordine plura sunt. Primū quæ mollia appellauimus, hoc est, quæ sanguine carent, & foris carne molli obducta, solidi intus, modo sanguinei generis cōtinent: quale sepia est. Secundū quæ crustis tenuib. operiuntur, hoc est, quæ partē solidam foris, mollem carnosāq̃ intus continent. Durū illud eorū regmen, nō fragile, sed collisile est: quale cancerum genus, & locustarū. Tertiū quæ silicea testa cōclusa muniunt̃, hoc est, quibus pars carnea intus, solida foris, fragilis atq̃ ruptilis, nō collisilis: quale genus concharū, & ostrearū est. Quartum infecta omnia. quod quidē genus multas, & uarias cōplectit̃ species animalū. Sunt porro infecta, quæ, ut nomē ipsum declarat, incisuras parte suā uel supina, uel prona, uel etiam utraq̃ habent: nec ossē quicq̃ discretū aut carneū, sed quiddam inter hæc ipsa mediū cōtinent: quippe quæ corpore pariter intus, forisq̃ duro consistunt. Sūt alia impēnata, ut iuli, ut cētipedæ. alia pēnata, ut apes, uel pē, scarabei. alia utroq̃ modo, ut formicæ. est etiā pars formicarū pēnata, pars impēnis. qd idē uel in ijs, quas cicindelas uocat, licet cōtemplari. Partes eorū quæ mollia nominauimus exteriores, pedes uulgarī nomine, siue brachia: & ijs continuū caput: tum alueus siue sinus cōtinens interiora, quē pinnulæ ambiunt in orbem. caput enim nonnulli minus recte appellarunt. Euenit in mollibus sanē omnibus, ut caput inter pedes, et uentrem habeatur. Brachia tergo octona omnibus binis acetabulorum ordinibus, ductu perpetuo omnibus, excepto genere uno polyporum. Sepiæ, lolligines, & lolij, peculiare binas fortiuntur promuscides longas, acetabulo parte extrema bino asperiusculas, quibus capiunt, & ad ora admovent cibos. ijs etiam quoties tempestates urgent, ad saxa aliqua adhaerentes se ueluti anchoris iactis stabiliunt. pinnulæ

autem, quibus alueum circumdari diximus, natant. Polypus ergo suis brachijs, ut pedibus ac manibus utitur: quippe qui duobus supra os positus cibum admoveat. Vltimo vero quod & acutius, & solum albicans est, & parte sui extrema bifurcatum, dorsoq; adnexus (Dorsum autem partem leuem appellant, à qua acetabulorum ordo inchoatur) hoc ultimo inquam brachio in coitu utitur. Filulà idem ante alueum positam supra brachia gerit cauam, qua mare transmittit, quantum suo admiserit alueo, quovis aliquid ore capit: eamq; modo in dexteram partem transfert, modo in sinistram, hac eadem filulà suum quoq; atramentum fundere assolet. Narat obliquus, pedes in eam porrigens partem, quod capitis nomine appellatum est. Atq; ita efficitur, ut cum natar, prospiciat in aduersum (nam oculi supra sunt constituti) & os habeat ex aduerso. Caput illud polypis quandiu uiuit prædurum, & quasi inflatum est. Tangunt, ac tenent brachijs supinis, membranamq; interiectà totam extendunt in arenam ramen elapsis, facultas apprehendendi, retinendiq; nulla est. Differunt polypi à cæteris quæ modo enumeraui mollibus, eo quod alueus polyporum paruius, & crura prælonga: cæteris è diuerso, alueus amplius, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediendi. Ipsa autem inter se discrepant, quatenus lolligo longior, sepià lator est. Lolligine uero longe grandior, qui lollius nominatur: quippe qui uel in cubita quinq; excrescat. Sepiæ quoq; aliquas in bina augeri cubita notum est. Brachia etiam polyporum tantundem, atq; etiam plus magnitudinis capiunt. Sed lolliorum genus pusillu admodum est, & facie quoq; à lolligine dissidens. Pars enim lollij, quæ exit in acutum, lator est. Pinnulæ etiam circumdantes illæ totum in lollio alueum ambiunt, cum in lolligine partem aliquam relinquunt. Pelagius tamen lollius non alio modo, quam lolligo constitit. Caput omnibus inter crura, quæ & brachia, & barbæ, & cirri appellantur. Eius pars oris habitus est, in quo dentes duo, supra quos oculi totidem grandiusculi, quibus discrimen exigua quadam præstat cartilago continens cerebellum. Inest etiam in ore caro quadam exigua, qua uice lingue utuntur. Lingua enim nullis hoc in genere data est. Alueus à capite amplioris capacitatis propensius, cuius caro fissilis est, uerum non per directum, sed in orbem, cutemq; omnibus interiecta est. Os gula excipit angusta, & longa, quam guttur sequitur ampliusculu, neq; absimile aubus, cui iungitur uenter, tanq; omasum, facie clauiculæ buccinorum. Intestinum ab eo tenue, partem repetens superiorè ad os fertur, quod laxius, quam gula est. Viscera mollia nullis, sed habent quam mutem appellant: atrumq; illud humorem, cui nomen atramentum, quod plurimum in sepià est. Effundunt suum id atramentum omnia metu perculsa, sed præcipue sepià, mutis ergo sub ore est, & gula per eam tendit. At uero atramentum infra continet, qua intestinum petere incipit superiora: foramenq; suum eadem obuolutu habet membrana, qua intestinum, atq; idem meatus emittendi atramenti, excrementiq; est. Capillamenta etiam quadam in corpore omniu habentur. Sepiæ, lolligini, & lollio, partes duræ, ac solidæ intus per dorsum, & corporis prona continentur, quas non eodem appellatum nomine: sed quod inferum sepijs est, sepiu uocant: quod lolliginibus, id gladiolu. Differunt enim, quod sepium robustum, latumq; est, inter spinam & os mediam præ se ferens naturam, fungosam intra se complectens, & friabilem corpulentiam. Gladiolus arctior, & cartilaginiosior est, forma etiam discrepat, uidelicet pro alueorum modo, quibus ipse insertus continetur. Polypis nihil solidum intus, sed caput cartilagine propè constat, quæ senescentibus maiorè in modum indurescit. Differunt foemina à maribus, quia in mare meatus ille subditus gulæ à cerebello in sima aluei pertendit, idq; ipsum ad quod fertur, speciem marmæ imitatur. In foemina duplex idem illud, supraq; habet, utroq; tamen in sexu corpuscula quædam rubenta parti eiusmodi subiuncta spectantur. Ouum polypi unum incomptum foris, & grande, intus humorem candicantem concolorè

Mutis, id est, mutis, à το μήναι, id est mutire, pro mutis facere. Id in sepijs, & omnino mollibus aspicitur: alio nomine papauer appellatum.

concolorem totum, atq; æquabilem cōtinens. Tanta est eius oui ubertas, ut uas impleat amplius capite polypi ipsius. Sepiæ alueus bipartitus est, oua candidiūa grandini similia complectens permulta. Sed quisnam sitis singularum quas enumerauimus, partium sit, ex descriptione dissectionum contemplare. Cum uero mares in hoc genere à fœminis differunt, tum uel maxime sepiæ id probant. Mas enim pro na sui corporis nigriora supinis potius, partesq; omnes asperiores habet quàm fœmina, & lineis interuenientibus uarias; caudam etiā acutiorem. Sed polyporum genera plura sunt, est enim quod & conspectius & maximum est, citius terreni maiores quàm pelagij sunt, & quod corpore exiguo uariocq; est, cibo ineptū. & quod elodonam uocāt, crurum prolixitate diuersum. & quod unum ex mollium numero simplicem acetabulorum ordinem agat. Cætera namq; omnia duplici calculantur. Ad hæc, quod alij bolitanam, alij ostiolem appellāt. Duo item uisuntur genera conchis indita, quorum alterum nautam aliqui uocant, alterum pompilum, siue ouum polypi, testa ijs ut pectunculis cōcaua, simplex tamen nec ita destinata, ut ei inhæreant. sæpius ij iuxta terrā pascitur; unde euenit ut fluctibus iactati in aridam elidantur, & testa dilapsa nudi capiuntur, aut in terra anima extinguuntur. Constant exiguo corpore, facie similes bolitanis. Est etiā qui cochlearū more siliceo tegmine ita muniatur, ut nunquam egredi solear, suaq; interdum brachia exerat. Sed de generibus mollium satis dictum iam est.

Plin. nautiliū
& pompilum
eundem facit.

24

De animalibus, quæ crusta integuntur.

Caput II



Rusta autem insectorum genus primum locusta: cui proximum genus alterum est, quem gammarū uocant. Differt is à locusta brachijs, quæ denticularis forcipibus protendit; atq; etiā quibusdā alijs discriminibus, quamquam nō multis. Tertiū genus squilla est. Quartum cancer. quorum sanè plura habentur genera. Squillarum enim genere continentur gibbæ, crangines, & paruæ, quæ maiores nunquam effici possunt. Cancrorum etiam genus multiplex est, nec facile enumerandū. Maximum quas Maïas appellant. Secundum paguri, & quos heracleoticos uocant. Tertium fluuiales, cæteri minores, & nullis penè nominibus annotati. Genus cancrorū littorale Phœnice fert, tantæ uelocitatis, ut uix consequi sit: unde hippeas, hoc est equites illos appellauerunt. ijs nihil ferè intus propter inopiam pabuli. Genus item aliud est, quod magnitudine cancrum non excedat, facie gammaris simile, sed ijs omnibus (ut antè dixi) pars dura, & testacea soris pro cute est, mollis & carnea intus, supina corporis planiora & tabellatiora sunt, quibus & oua deponunt cum pariunt. Pedes locustis utroq; ex latere quini, ultimis annumeratis, qui in forcipem exeunt denticulatum. Cancris etiā omnes deni cum forcipibus sunt. Squillarum generi, quas gibbas uocamus, quini utrinq; situ, quo cæteris. quorum proximi capiti acutiore, & quini utrinq; alij uetri subiuñti, quorum extrema latiuscula sunt. tabellæ ijs nullæ parte supina: prona similis locustarum est. cancris è diuerso: quippe quibus primi utrinq; quaterni, tum terni alij, ordinem eodem modo explentes. reliqua bona pars corporis pedibus caret. Flectuntur omnium crura in obliquum, sicut & insectorum. Brachia forcipata quibus sunt, introrsum se flectunt. Locustis & cauda est, & pinnæ quatuor assunt. Squillis etiam gibbis cauda, & pinnæ quaternæ. Cranginis quoq; lateri caudæ utrinq; pinnæ adnexæ sunt: quarum pinnarū mediæ utroq; in genere spinulis horret. Verum in Crangine lauiora, in gibbis acutiora sunt. Cancris ex cruce staceis solis cauda deest, & corpus rotundum est, cum locustis quilibet longum sit. Differt mas locusta à fœmina, quod fœminæ primus pes duplex, mari simplex, pinnæ etiam parti supinae adnexæ, fœminæ maiores, & quæ collo proximæ sunt,

E

minores habentur. mari omnes aque minores, nec usquam per diminutionem dissimiles. Ad hæc, mari in nouissimis cruribus, uelut calcaria maiuscula prominent acuta, quæ femina parua habet & leuiora. utriq; tamen cornua ante oculos bina, longa, & aspera, quibus alia minuta & leuiora cornicula subiacent. Oculi ijs omnibus duri & apti, tum intro, tum foras, tum etiam in obliquum moueri: quales etiam sunt parti plurimæ cancerorum, imò uero mobiliores. Gammæ color, quod ex toto dixerim, niit: nigrisq; maculis dispersis euariat. pedes inferiores ad grandes usque dispositi octo, tum grandes ipsi longe maiores, extremaq; parte latiores, quàm locustæ habentur: sed non specie eadem. dexter enim suum extremum, latum, & oblongum, & tenue habet: sinister crassum, & rotundum. Vterq; tamen scissus in extremo, perinde ut maxilla tam infra, quàm supra dentatus est. Verum dexter pusillos, serratosq; dentes continet omnes: laeuis primos serratos, intimos uelut maxillares, scilicet parte inferiore quatuor, & continuos: superiore tres non continuos. Vterq; tamen partem mouet superiorem, ad inferioremq; alstringit. Blephus enim uterq; situ inferiore tanquam nati ad capiendum, premendumq;. Duo supra eos grandes habentur: alij hirtiusculi, paulò ab ore inferiores. mox branchiæ os circumdant, non sine hirsutia frequentes, quas assidue mouet. Flecilit, atque in os adducit duos illos hirtiusculos pedes. furculi etiam graciles geruntur à pedibus, qui ori proximi habentur. Dentes huic quoq; duo, ut locustæ. supra quos cornua breuiora, tenuioraq;, quàm locustæ. Quatuor item alia adsunt cornua, specie quidem duobus illis similia: sed tenuiora, & breuiora. super hæc oculi constituti sunt parui, crassiusculi, non ut locustæ, maiusculi. frons quasi quædam acuta & aspera supra oculos extat latior, quàm locustæ. Denique facies acutior, & pectus latius quàm locustæ, totumq; corpus mollius, & carnosius. Pedum autè octo numero, pars scissa in extremo biturcatus: pars definit in diuisa. quatuor enim bifurces sunt, reliqui quatuor simplices ex toto pertendunt. Quod autem collum appellat, quinque partium foris est: & sextum latius illud situm loco nouissimo habetur, tabellis continuatum quinque. interiora uero, in quibus femina prius pariunt, quàm foetum ædant, hirtiuscula quædam quatuor continentur, quibus singulis spinæ singulæ breues, arrectæq; eminent ad exteriora. Pectus, corpusq; totum læue est, non more locustarum aculeatum, & asperum. Verum in pedibus magnis aculeos partis exterioris maiores esse manifestum est. Foeminam hoc in genere nullum discrimen à mari distinguit. nam & mari & feminae forceps alteruter grandior more incerto est, parem uero utrunque neuter unquam habere uisus est. mare omnia eius generis ore excipiunt. Sed cancri parte oris exigua adducta respuunt: locustæ suas ad branchias transmittunt, quas ipsæ plures, quàm cætera habent. Communis enim omnibus branchiarum adnexus est. Dentes omnibus bini. locustis enim duo primores, & in ore caruncula quædam constituta pro lingua est. Tum uenter os protinus excipit, præterquam locustis. Iis enim gula ante ventrem exigua, mox à uentre intestinum, quod locustis, & squillis, & papauer recte in eadem finit, qua excrementa emittunt, & oua pariunt. Cancris autem, qua applicatum illud operculum geritur medio applicamini ipsius: uerum ijs quoque parte exteriori, qua oua pariunt, definit. Foeminis item huius generis locus ouis deputatus iuxta intestinum omnibus est. Et quam mutem, siue papauer appellarunt, amplius parcius uel habent hæc omnia genera. Discrimina propria contemplari in singulis congruum est. Locustis igitur, ut modo dixi, dentes bini maiusculi, & uenter quo humor similis muti continetur. caruncula etiam inter dentes linguæ repræsentans effigiem: & gula ab ore breuis, quam uenter membraneus excipit, cuius ostio tres denticuli inhaerent: duo aduersi, reliquus infra. Intestinum uero à uen-

tris latere simplex, pari crassamento ad excrementi usque ostium fertur. Hæc locustæ, & gammari, & cancris fortuntur, sed locustis meatus quoque à pectore pendens, ad excrementi exitum pertinet: qui foemina pro uulua est, maribus genitalis seminis receptaculum sufficit. meatus hic iuxta cauum carnis continetur, ita ut media caro interiaceat: intestinum enim deuexum pertingit, meatus uero cauo applicatur. nec secus, quam in quadrupedum genere hæc habentur. Nulla maris meatum ac foeminæ differentia distinguit: quippe cum uterque tenuis sit, & albidus, & humorem intra se continens pallentem, uterque etiam ex pectore pendet. Squillas etiam ouum, clauiculasque, similem in modum habere certum est. Maribus sane præ
 10 foeminis propria in pectoris carne bina quædam candicantia constant, discreta à cæteris partibus colore, formaque promiscidi sepiarum proxima: uerum hæc tota in uertiginem more buccinorum papaueris, quorum origo ab acetabulis, quæ subdita pedibus nouissimis ordinantur. Caro in ijs quoque est colore sanguinis rubra, & tactu lento, nec similis carni. ab hoc, pectori antractus alter strue buccinea; crassitudine lineæ sese porrigit: sub quo duo quædam arenæ conditioni similia, semini genitali accommodata, intestino adnectuntur. hæc in mare. Foemina autem ouum rubidum parit, membranaque obuolutum prætenui, uentri laterisque utriusque intestini annexum, atque ad carnem usque adhærens. Partes has habet interiores atque exteriores.

20 De partibus animantium crusta interiorum, quibus ut cum ijs, quæ sanguinem habent, conueniant.

Caput III



Ed cum animalia quæque sanguinea, partes tum interiores, tum etiam exteriores, suis quasque appellatas nominibus habeant, genus quod sanguine caret, pluribus uacat. Iam enim uiscera, quæ cuiusque sanguineo insunt omnia, nullum exangue quod habeat, nouimus: sed communes generi utrique partes, gula, uenter, intestinum. Cancris autem forcipes, pedesque haberi, & ij quales essent, dictum iam est. omnibus uero magna ex parte grandior ac ualidior forceps dexter, quam læuus est. Quinetiam de oculis diximus, uisum parti plurimæ esse in obliquum. Alueus uero totius corporis
 30 ris indiscretus est: nec enim caput distinctum, nec aliud quicquam. Oculi non eodem situ omnibus positi, sed alijs è latere supra, continuo sub prono, amplo distantes discrimine: alijs in medio breui discrimine, ut Heracleoticis, aut maijs. Os oculis subditum, in quo dentes duo, ut locustis: uerum non rotundi, sed longi. Tegmina dentes operiunt duo, inter quæ talia interiacent quædam, qualia locustarum dentibus adnecti exposui. Humorem igitur ore accipit, tegminibus illis depellendo: emittitque meatu oris superiore, obductis meatibus, quæ interfluxit. Duplex ille meatus sub oculis est. Quoties ergo aquam acceperit, utroque tegumento os obturat, atque ita respuat humorem. Gula post dentes breuis admodum est, ita ut pro
 40 dio intestinum simplex & tenue procedit, quod sub applicato exteriori operculo definit, ut dictum est. Quod autem inter tegumenta interiacet, huius, sicut locustarum, dentibus adnectitur. Humor intus in alueo pallidus, & minuta quædam oblonga, albida continentur. Rusta etiam alia, maculis dispersis. Differt à foemina mas, magnitudine, crassitudine, & operculo. id enim amplius in foemina est, & distantius, & hirsutius, & opacius, quale etiam foeminæ locustarum fortuntur. Partes crusta interdicti generis, ita se habent.

diuvs continuo,
 & nullo medio

De animalibus, quæ testa integuntur, eorumq; inter se differentiis.

Caput IIIII



Væ uero testa operiuntur animalia, ut umbilici, cochleæ, purpuræ, & omnia quæ ostrei, aut conchæ nomine appellamus, atq; eam echinorum genus, carnē quæcunq; habent, similiter atq; cruditata habent: quippe quæ intus eam contineant, testaq; foris claudantur, nec intra se durum habeant quicquam. Sed ipsa inter sese numerosa discrepant differētia, tum testæ, tum carnis interioris ratione. Alijs enim in eo genere nulla est caro, ut echinis: alijs est, sed penitus inclusa, nec ulla ex parte conspecta, excepto capite, ut terrestrium limacibus, & ijs quæ cocalia quidam appellarunt, & aquatiliū purpuris, buccinis, cochleis, & reliquis omnibus turbinatis. Cætera aut duplici constant ualuula, aut simplici, ut genus alterum bivalue, alterum univalue possit nuncupari. Bivalue appello, quod gemina testa continetur: univalue, quod testa singulari clauditur. Sunt item quibus altera pars superficiei detecta, carnem ostendat, ut patellæ. Bivaluis generis pars clusilis est, ut pectunculi, & mitili. eiusmodi nanque omnia parte altera ligata, altera soluta constant, ut & concludi possunt & aperiri. Alia binis quidem conclusa ualuulis sunt, uerum utroq; latere connexa, ut ungues, siue digiti. Nō desunt quæ testa tota occultentur, ut nulla ex parte carnem deiectam habeant: ut quæ uertibula, siue rubera, & callos appellamus. Ipsarū etiam testarum magna uarietas: nam aliæ squæ, ut ungues, mitili, & cōcharum quædam, quas aliqui Gialadas appellant. aliæ scabræ, ut ostrea, pinna, & conchæ nonnullæ, & buccina. quædam etiā pectinatim diuisæ, ut pectunculi, & concharū nonnullæ. Crassitudine quoq; differunt, & tenuitate, tum totius, tum partis, uelut laborum. Alijs enim labra tenuia, ut mitilis: alijs crassa, ut ostreis. Item alia se mouent, ut pectines, quos etiam uolare nonnulla uident. Nam & de ferramento quo capiuntur, sæpe exiliunt. alia item natura immobili sunt, ut nunquam sedem, in qua hærent, sponte ipsa mutare ualeant, ut pinna. Omne sanē turbinatorū genus mouetur & serpit. patella etiam saxis absoluti, in pastumq; ferri solita est. Commune autē & ijs quæ adhuc enumeravi, & cæteris testacei generis, ut testa intus æqualis latusq; habeat. Caro bivaluis & univaluis generis ita testæ adhæret, ut nisi per uim nequeat detrahi. At turbinati laxior continetur & absolutior, cui generi peculiare est, ut testæ postrema à capite intorqueantur. Operculum etiā eadem iam inde ab ortu naturæ omnia gerunt. Mouentur item eadem omnia parte dextra, non ad uertiginem siue clauiculam, sed in aduersum. Partes exteriores eius generis differentiis ijs uariantur. Interiorum natura similis quodāmodo in omnibus est, maximeq; in turbinatis. differunt enim inter se magnitudinis excessusq; affectu. Nec uero multum univalue, ac bivalue genus conclusile sibi dissident: quippe quæ parum differentie inter se afferant: quanquam longe ab immobilibus discrepent, quod latius postea patebit. Natura ergo turbinatorum similis constat, nec nisi magnitudine uariat, ut modo dixi, alijs enim partes maiores, atq; euidentiores: alijs minores obscurioresq; sunt. Ad hæc discrimen illud duritiæ, mollitiæ, cæterarumq; generis eiusdem affectionū. Caro enim prima in ore testæ, quam omnia torosiusculam habent, alijs magis talis, alijs minus. Caput eius medio partis prominulum iungitur, & cornicula duo, quæ pro magnitudine animantis plus minus capiunt incrementi. Exerunt caput more omnia eodem, idemq; per motum retrahunt intrō. nonnullis etiam os, & dentes acuti, breues, & tenues, ut cochleis. Promuscidias item gerunt modo muscarum: quod quidem membrū linguæ effigiem præ se fert. Habent hoc idem & purpuræ & buccina firmū, & torosum, quo similiter ut asili atq; tabani, quadrupedum tergora penetrant: imō longe ualidius, testas enim eucarum possunt perforare. Venter os protinus excipit, similis in umbilicis gutturi auium: habentq; parte inferiore

inferiore duo quædam albida, torosa, mammis similia, cuiusmodi carunculas uel in
 sepijs esse aduertimus: sed hæc torosiora. Gula à uētre duplex longa porrigit se usq[ue]
 ad papauer: quod postremum, fundo commissum est. Hæc ergo, ut in purpuris &
 buccinis cōspicua, in clauicula testæ cōtinentur. Quod autē gulæ subiungitur, inte-
 stinum est, gulæ ipsi continuum, simplexq[ue] ex toto, usq[ue] ad exitum, cuius initii cir-
 ca anfractum papaueris est, qua & laxius hæret, quod enim papauer appellamus,
 quasi materia uacans, atq[ue] excrementitia, magna sui parte in omnibus testaceis ge-
 neribus inest. Hinc sursum uersus replicans, carnis repetit sedem, finitq[ue] ad caput:
 unde eijcitur excrementum, pariter in omnibus turbinatis generibus, tam aquaticis
 10 quàm terrestribus. Membrana in grandiusculis umbilicis à uentre gulæ attextitur
 continua, per quam meatus prolixior albicās colore, similis superioribus illis mam-
 millantibus carniculis tendit. Habet etiā incisuras, quales in ouo locustarum habentur:
 uerum hoc albidum, illud rubidum est. Nullus exitus huic, nullū foramen pos-
 streum patet, sed prætenui membrana cauo perductus angusto cōtinetur. Ten-
 dunt ab intestino ad imum nigratitia quædā aspera, atq[ue] continua, qualia uel in testu-
 dine uisuntur, sed minus nigra. Cæteri quoq[ue] umbilici hæc habent eadem: sed quo
 minores, eo minutiora. Vniualue autē & bialue genus, partum ijs simile est, par-
 tim diuersum. caput enim & cornicula, & os obtinent, atq[ue] etiā quod linguae speciem
 gerat: uerum hæc in minoribus sensum præ sua exiguitate effugiunt. Nonnulla
 20 etiā in exanimatis, aut nō mouētib[us] percipi nequeunt. Papauer illud, quod etiam
 mutem appellamus, omnia habet, sed nō loco eodem, nec par, nec ex æquo manife-
 stum, sed patellæ in imo, bialuia uero ad partē, qua mutuo testarū complexu con-
 tinentur. Capillamentis etiā illis hæc omnia circundantur: & quod ouum appellat,
 tempore quo gigni solet, ambitu alterius lateris orā cōtinetur, uidelicet ijs, quibus
 datum id à natura est, sicut etiā albugo umbilicis, id enim illis iunctum simile intelli-
 gimus. Sed eiusmodi partes, ut dixi, cum conspicuæ in magnis habeantur, in paruis
 tamen aut nullo pacto, aut uix sentiuntur: quamobrē in magnis pectunculis præci-
 pue patent. quod genus id est, cui altera ualularum latior, uelut tegmen superpo-
 sita est. Ostium excrementi cæteris à latere est. foramen enim quod egerant, omnia
 30 habent: quippe cum papauer illud, ut dictū iam est, excrementitiū quiddam omnia
 membrana contentū sortiatur. At illi, quod ouum appellant, foramen, nullo in ge-
 nere tributū uidemus, sed carni ipsi intumescit: nec eadem qua intestinū parte con-
 tinetur, sed dextera, cum intestinū habeat sinistrā. Cæteris ergo talis excrementi exi-
 tus est. At uero patellæ ferē, quam marinam aurem quidam appellarunt, parte ima
 testæ excernit, qua foramen habetur. Vētre[m] etiā post os esse, in hoc eodē patellæ
 genere constat, atq[ue] etiā ouis illa similia. Sed quis eorū cuiq[ue] situs sit, diligētius ex dis-
 sectionibus petendū est. Quem autē cancellū appellant, cōmunis ferē socius crusta-
 torum, & testatorū generum est: quippe qui specie locustis similis spectetur, nasciq[ue]
 seorsum per se solitus sit. Verū quod testam deinde petit, quam ingressus uia tradu-
 40 cat, hinc similis testa cōtectis animantibus est: quapropter is in ancipiti esse, genusq[ue] si
 bi uēdicare utrunq[ue] uidetur. Forma tamen (quod simplicius dixerim) similis araneis
 est, nisi quod partem capiti & pectori subditā ampliore[m], quàm aranei habeat. cor-
 nicula duo rufa tenuia gerit, quibus oculi rotidē subiacēt, qui nunquam intrō rece-
 dant, ut cancrorū, sed semper eminentes appareant. os sub ijs est, quod uelut capil-
 lamentis quibuscūq[ue] pluribus circundatur. ijs pedes subiuncti duo bifurces, quibus
 cibum ori admoveat. Bini item utriq[ue] adhærent lateri, & tertius paruus. Thoracis
 pars inferior mollis tota est, dissectoq[ue] sinu pallidū intus cernitur. Meatus ab ore ad
 uentrem pergit. foramen excrementi perspicui nullū potest. pedes ac thorax duritiem
 præ se ferunt, sed minus quàm cancri. Nexu nullo testis adhæret, purpurarum mo-

do & buccinarum, sed absolutus liberq; uagatur. Oblongior est qui turbinē subit, quam qui neritem, quem naticem interpretamur. genus enim diuersum est, quod in natice degit, cetera quidem nō ab simile: sed dextrum bifurculum pedem paruum habens, cum lauum grandiusculum habeat, & ingredi eodem ipso grandiore potissimum solet. Tale profectō genus, uel intra conchas, quarum adhesio similis ceteris est, reperitur: quod & squillam paruam appellant. Naticæ testis leui, ampla, & rotunda, forma buccinis proxima est: papauere tamen non nigro, ut illa, sed rubro. testæ adnexum corpus mediū eius firmiter est. Pascuntur hæc mari tranquillo, absoluta saxis. At quoties flatus urgent, cancelli hospites illi sese in saxa recipiunt, atque lanibulis tutantur. Natices saxis adhærescunt more patellarum, & muricum, ac cæterorum generis eiusdem: nec nisi tegmine dimoto adhærent, quod uelut operculum sibi possident. Vsum enim quem bivaluibus pars utraque administrat, eundem altera exhibet turbinatis. Caro intus, qua oris habitus. Modus hic idem muricibus, purpuris, atq; omnibus generis eiusdem. Quibus uero sinister pes grandior est, ij nunquam cum turbinatis hospitantur, sed cum naticibus tantum meunt societatem, ut dictum est. Sunt inter cochleas, quæ intra se bestiolas habeant similes gammaris pusillis, qui uel in flumine gignuntur: sed ea differentia, ut pramollem intra suam testam carunculam habeant. Forma quales nam sint, ex dissectionibus contemplare.

De echinorum genere.

Caput V

20



Chinis caro negata est, idq; ipsum habent peculiare, ut nullam intus carnem contineant. Nigra quædam in omnibus uice carnis spectamus. Genera echinorum plurima. Primum quod cibo idoneum est, in quo quæ oua appellant, magna, esculentaq; consistunt, pariter in maiore corpore & minore, nam nouelli adhuc paruicq; pleni uiculi illis constant. Secundum ac tertium spatagi, & brissi, quæ genera pelagia sunt, raræq; inuentu. ad hæc, quæ echinometra appellatur, quasi matrem, aut matricem dixeris echinorum, quæ quidem omnes magnitudine excedit. Genus item aliud est minutum, spinis longis, prædurisq; gigni in alto gurgite solitum, quo nonnulli ad distillationes urinæ medicamento utuntur. Circa toronem echini nascuntur candidi, & testæ, & spina, & ouo: augeri forma productiore, quam ceteri soliti. Spina ijs parua, nec rigida, sed mollior. nigra autem illa ori applicata, plura, & ad foramen exterius coeuntia habentur, sed disiuncta inter sese, quibus quasi interueniens liminum discriminantur. mouentur agilius, & frequentius, qui sunt cibo idonei: cuius rei argumentum, quod semper aliquid algæ suis spinis implexum gerant. Sunt ergo omnibus oua, sed nonnullis exigua, nec cibo apta. Euenit autem, ut quod caput appellant & os, uersum in terram sit. quod uero ad excrementi exitum deputatum est, id supra habeatur. quod idem omnibus turbinatis, patellisq; euenit. passus enim de imis petatur, necesse est. Vnde fit, ut os inuersum ad pastum sit, excrementum uero superius parte prona testæ contineatur. Dentes quini echinis omnibus sunt, caui intrinsecus: inter quos caruncula quædam interiacens linguae officio fungitur, mox iungitur gula, deinde uenter in partes quinque distinctus, plenus excrementi: cuius meatus omnes in exitu excrementi coeunt, qua testæ forata est. uentri autem subdita sunt, quæ oua appellant, membrana obducta diuersa, eodem in omnibus impari quinario numero: quorum quod nigricat, parti creditum est superiori, ex dentium origine pendens, amarum, nec esculentum, quale in multis inesse animaduertimus, aut certe eius proportionale. nam & in testudine, & in rubeta, & in rana, atq; etiam in turbinato genere, & in molli, sed colore diuerso, & aut omnino

omnino inguſtabili, aut magis ab uſu cibario alieno. Corpus echini priore atq; no-
uiſſima parte ſpiſſum, & continens: cætera uero nō continuum, ſed ſimile laternæ,
cui non obducta membrana eſt. Spinis ſuis echini utuntur, perinde ac pedibus: iſi
enim nitibundi mouentur, ſed emq; permutant.

De uertibulis, & urticis, deq; eorum animantium natura.

Caput VI



10

Væ autem uertibula, ſiue callos ſpeciali nomine à regiminis qualitate
appellamus, naturam inter hæc genera peculiarem ſortiri norum eſt:
iſi enim ſolis corpus totum tegumēto includitur, cuius durities inter
teſtam & corium eſt: quamobrem modo præduri bubuli tergoris ſeca-
tur. Adhæret ergo id genus ſaxis ſua teſta, duoq; ſepoſita inter ſe ſora-

20

mina exigua admodum habet, & uiſum uix patientia, quibus humorem accipit &
reddit. Excrementū enim nullum in eo ſpectatur, quale in cæteris oſtreis, uel echin-
næum, uel quod appellant papauer, continetur. Diſſectis, primum membrana ner-
uoſa, cruſta ambiente obſenta oſtenditur, qua uertibuli caro ipſa continetur, nulli
ē cæteris ſimilis, in omnibus tamen ſui generis eadem. Adhæret hæc utroq; ex late-
re membranæ circundanti, & corio: & qua adhæret, arcuius in partem utranq; eſt,
uidelicet quā tendit ad meatus ductos ſoras per cruſtam, quibus redditur & acci-
pitur cibus & humor, quali alterum ſit os, alterum oſſium excrementis delegatum.

30

Nec modus idem, ſed alterum craſſius, alterum tenuius eſt, cauumq; intus utrin-
que, exiguo quodam interueniente cōtinuo, humorq; in altero cauo conſiſtere ſo-
litus eſt. pars uero alia quæ uel inſtrumentalis, uel ſenſualis ſit, nulla omnino perci-
pitur: neq; excrementū quicquam (ut dictum iam eſt) quo in cæteris more con-
tinetur. Color uertibulis, aut pallidus, aut rubidus eſt. Vrtica etiam ſui generis cer-
nitur: quippe quæ & adhæreat ſaxis, more nonnullorum inteſtorum teſta: & in-
terdum ſaxis abiuncta uagetur. Nulla huic teſta, ſed corpus omni ex parte carnem
præ ſe fert. Sentit, & manū admotā corripit: adhæreſcitq; perinde ac polypus ſuis
brachijs, ita ut caro intumeſcat. Os medio in corpore continet, & de ſaxo quali de
teſta uiuit, & prænatantes piſciculos excipit, retinetq; ſicut manu admotā homi-
nis agi dictum eſt, deuoratq; in hunc modum quæcunq; naſta eſt eſculenta. Ab-

40

ſolui etiam ſaxis genus quoddam urticæ (ut modo dixi) notatum eſt, quod & echin-
nos, & peſtunculos, in quos offenderit, corrodit. Excrementum nulla in urtica
eſſe uidetur, ſed hæc re ſimilis ſtūpibus eſt. Duplex genus percipitur urticarum:
alterum corpore paruo, quod cibo aptius eſt: alterum maiuſculo duroq; quale cir-
ca Euboicæ Chalcidem gigni ſciimus. ſunt omnes hybernis menſibus carne conſtan-
te atq; rigidiuſcula, quamobrem per id tempus capiuntur, ciboq; idoneæ ſunt. At
æſtate rareſcunt, & reſoluuntur, præmadent enim & marcent, ut ſi teigeris facile
diſcerpantur, atq; diſpereant. Deniq; nulla tantisper euelli integra poteſt, ac aſius
impatientia ſaxa ſubire interius ſolent. Partes iam expoſui mollium, & uel cruſta,
uel teſta inteſtorum, tam exteriores, quàm interiores.

De inſectis, eorumq; uarietatibus, & natura.

Caput VII



Vnc de inſectis pari ratione tractādum eſt. Continet genus uel ſpecies
plures: q̄ſarū nonnullis, quamuis cognatis, nomen nullū commune
eſt inditū, ut api, crabroni, uelpæ, cæterisq; generis eiufdē. Item quibus
pennæ uagina inclufæ continentur, ut gallerucæ, fulloni, pilulario, &
reiſquis generibus eiufdem. Omnīū ergo partes cōmunes tres illas haberi conſtat,
caput, alium, & quod inter hæc ſitū eſt: quale in cæteris peſtus, doſumq; habetur,
unum, id quod interiacet, magna ex parte eſt. Quæ tamen ſunt longa & multiplex

da, ijs ferē totidem sunt quæ interiacent, quot incisuræ. Insecta diuulsa etiā uiuere possunt omnia, exceptis ijs, quæ uel admodū frigeāt, uel præ sua exiguitate quamprimū refrigerētur. Nam uel ipis quoque diuulsis, nō deest uiuacitas. Vnit ergo cum pectore, tum caput, tum etiā aluus: at sine eo caput auulsum uiuere non potest. Diutius ea uiuunt diuulsa, quibus corpus longū, pedesque multi, & pars quæ abscessa est, in utrumque se mouet extremū. nam & caput uersus ingreditur, & in caudam: ut in ijs, quas uocāt centipedas, moueri uidemus. Oculi in omnibus patent: sed nulla ex cæteris partibus sensorijs manifesta est, præterquam lingua in nōnullis, quæ uel testa intectis omnibus data est, quæ & gustant, & cibū attrahūt. hæc alijs mollis, infirmaque est: alijs dura, & ualida, ut purpuris, tabanis, asilis, atque alijs plurimis. Omnia enim quibus nō in aluo aculeus est, linguā eiusmodi ueluti arma gerūt. nec dentes habent quibus iunctū id est, exceptis quibusdā paucis. Nam & muscæ eo ipso pertingentes, cruorē mouent, & culices eodē acris pungunt. Habēt aculeos item pleaque insectorum, uel inxus cōditos, ut apes, & uespæ: uel extra prominentes, ut scorpion: qui etiā unus inter insecta longo spiculo armatur. is brachia quinque bifidis dentata forcipibus habet, atque etiā bestiola, quæ in libris similis scorpion creatur. Quæ autē in eo genere uolucū sortiuntur naturam, ijs præter cætera membra pennæ adnexæ, alijs binæ, alijs quaternæ, ut apibus. nullis binæ, quibus in aluo aculeus. Item ex uolucibus ipsis, alia pennas crusta superueniente, quasi uagina inclusas gerunt, ut scarabei: alia detectas habent, ut apes. nullis uolatus regitur gubernaculo caudæ. & penna ipsa nullo caule constat, nulla scissura discernitur. Ad hæc, antennæ nonnullis ante oculos prætendūtur, ut papilioni, & fulloni. Quæ uero ex ijs salūt, hæc uel crura posteriora habēt longiora, uel gubernaculis quibusdā saltui accommodatis fulciūtur retrō curuatis, ut crura quadrupedū. Omnibus partes corporis pronæ differūt à supinis, sicut uel in cæteris animantibus est. Quod autem pro carne in ijs habet, id nec testā imitatur: neque quod in testaceis genus carnis continet, sed mediā quandā inter hæc refert naturam: quamobrem his nō spina, nō os, non aliquid sepiō simile, nō testā ambiētē natura dedit: ipsum enim corpus se sua duritia rueri potest, & seruare: nec est quod aliunde muniri desideret. Cui omnia circumdantur, sed admodū tenui. Partes insectorū exteriores has esse, atque in hūc modum se habere cōstat. Intra sinū ab ore intestinū pluribus directū, ac simplex usque ad exitum fertur: paucis id est replicatū. Viscus nullū in ijs, nullū pingue, sicut neque in cæteris, quæ sanguine carēt. Ventrem etiā nonnulla habere aduertimus, à quo reliquum intestinū uel simplex, uel replicatū proficiscit, ut locustas. Cicada inter hæc, & omnino in animalium genere una ore caret. prolixum quiddā compactum, inditū sumēque gerit, simile ei quod linguæ speciem refert, in ijs quibus aculeus in ore: eoque ipso rore haurit, alimentū unū & peculiare. Excrementū cicadis nullū in aluo reperitur. Plura earū sunt genera, quæ magnitudinis modo differūt: atque etiā quod alijs corpus sub transuerso septo præcinctū distinguitur, membranamque liquidō refert: ut ijs quas ab argutulo sono, achetas appellant: alijs nō ita est, ut cicadastris. Sunt uel in mari nonnulla animalia effigie insolent, & sui generis: quæ quoniam rara inuentu sint, cōstitui in genus nō decet. iam enim piscatores uidisse se retulerūt quædam trabunculis proxima, pullo colore, tereti figura, pari ex toto crassamento. Item alia seu torū effigie, colore rubro, pinnulis crebris. Ad hæc alia, quæ gentile uirtutem imitant, tum specie, tum magnitudine, sed pennis subnexis binis loco testū, eisque ueritile nomen inditum est. exceptumque est aliquādo genus tale hamorum frequentia usitata. Partes animalium omnium interiores exterioresque generatim, tum propriæ tum communes, ita se habent.

Quibus animalibus insit sentiendi uis.

Caput VIII



Vnc de sensibus differendum est. Non enim pariter in omnibus uis inest sentiendi: sed alijs sensus omnes, alijs pauciores dedit natura. Sunt sane sensus qui plurimi habeantur, & supra quos nullum adesse alium generis sui nouerimus, numero quinque: uisus, auditus, olfactus, gustus, tactus. Homo igitur, & quaecumque terrestrium animal generant, atque etiam quæ & sanguinem habent, & animal pariunt, omnia hos omnes habere sensus uideamus, nisi quid læsum, lacessitumque sit: quale genus talparum, cui uisus deest. Non enim oculos in aperto id habet: cute tamen detracta, quæ crassiuscula obiecta sedem luminum opacat, oculi intus lacessiti imperfectique uisuntur, sed ita, ut partes easdem habeant omnes, quibus oculi integri constant. Habent enim nigricantem illum orbiculum, & quod intra eum continetur, quam uocant pupillam, atque etiam portionis albidæ ambitionem: sed non tam liquidò, quam oculi conspecti & emittentes. nec in partem exteriorē apparere hæc possunt, propter cutis obductæ corruptionem, utpote cum natura inter generandum lædatur, atque ita opus inchoatum relinquatur. pertinent enim à cerebro, qua cum neruo coniungitur, meatus duo nervosi ualidi ad ipsas oculorum sedes, qui in dentes superiores liniunt. Cætera igitur, & colores & sonos sentiunt, atque etiam odores, saporesque. Quintum autem sensum, quem tactum appellamus, omnia habent animalium genera. Ergo in nonnullis uel ipsæ sensoriæ partes latissime patent, ac præcipue uidendi. Nam uisui sedes certa descripta est, atque etiam auditui: cum alijs auriculæ promineant, alijs foramina pateant meatus audiendi. Olfactus item pari modo constitutus est diuersorum. Nam autium generi foramina tantum sunt odorandi, cum alijs permultis nares etiam habeantur. Similis & linguæ partis saporum percipiendorum ministræ ratio est. Aquantium tamen generi quos pisces uocamus, data quidem est lingua, sed imperfecta, incertaque: olfacta enim, nec absoluta. Sed palatum nonnullis carnosum pro lingua est, uelut inter fluuiales cyprino, ita ut nisi diligenter inspexeris, lingua id esse uideatur. Pisces autem sensum gustus habere constat, eo quod multi suis quibusdam saporibus gaudent, & escam in primis ex pisce amia expetunt, & piscium pingue, ut qui gustatu eiusmodi delectentur, uoluptatemque ex eo genere esculenti capiant.

Auditus uero, olfactus uel nullum continent membrum manifestum. Quod enim tale uideri potest per loca narium, id non ad cerebrum usque transmeat, sed partim obseptum & cæcum mox desinit, partim ad branchias fertur. Audire tamen, atque olfacere pisces palam est. sonos enim immodicos, ut tritemium remigia, fugere uisuntur. Itaque fit, ut facile intra sua stabula capiantur. Nam etsi externus strepitus paruus est, ijs tamen qui demersum in humore suum auditum habent, æque omnibus ingens, molestus, grauisque occurrit, quod certe uel in delphinorum captura euenit. Cum enim piscatores repente alueis uniuersum circumdederint gregem delphinorum, inde obstrepenes in mare, efficiunt ut terribi erumpant: uniuersi in littora, capiunturque tentato grauatoque capite, præ strepitus inflanti nimietate, quam ne in delphinis quidem pars ulla est manifesta, quæ sensum ministret audiendi. Ad hæc, inter piscandum quammaxime cauent, ne uel remo, uel rebus moueant strepitum: sed cum aliquo in loco gregatim pisces stabulari intellexerint, certo intervallo coniectantes retia dimittunt, ut neque remo, neque imperu cymbæ strepitus ad locum deueniat piscium; & omnibus præcipitur nautis silentio quammaximo nauigent, dum gregem circundant. Nonnunquam ubi aggregare pisces placuerit, idem facit quod in delphinorum captura: obstrepunt enim tactis lapidibus, ut deterribi in artius coquant, atque ita uniuersi uretiantur: & antequam circumue-

niant, omnem, ut modo dixi, strepitum uerant. At cum circumdatum iam est, clamandum, obstrependumq; iubent: strepitum enim tumultumq; sentientes perterriti compelluntur, interrumpuntq; incauti. Item ubi piscatores è longinquo pisces agminatim pascentes, ac per tranquillissimamq; maris summa oberrantes alperere, libuitq; magnitudinem genusq; cognoscere, si silentio sensimq; accesserint, latent, supernatantesq; adhuc comperiunt. At si quem priusquam occupant strepitum citarint, fugam inde planè arripere uidentur. Addo etiam pisciculos fluuiatiles cottos nomine, qui sub faxis stabulantur. Capiuntur enim à nonnullis saxo percusso, sub quo latent: protinus enim inde exturbantur, ut qui audiant, & caput per strepitum tententur. Pisces igitur audire ipsi ac alijs eiusmodi documentis constat. Sunt autem qui uel maxime animalium pisces auditu ualere arbitrentur, uidelicet hominum experimento, qui assidue in mari uersantur, remq; piscatoriam percallent. Sunt uero qui liquidius inter pisces audiant, mugilis, chromis, lupus, salpa, & reliqui id genus. Cetera piscium genera minus audiunt: quamobrem minus gurgitibus uersari potius solent. Olfactus quoq; similis intelligitur ratio: escam enim nò recentem attingere pars plurima piscium recusat, nec eisdem escarum generibus omnes capiuntur, sed uarijs, scilicet sui agnitione odoris: quippe cum uel scetida nonnullis accommodetur, ut salpa sterfus. Complures item piscium in speluncis latètes, quoties euocare capium piscator uoluit, fauces specus odoribus illinunt cetarijs, itaque protinus excitant. Anguillam item hoc eodè capi modo palam est. Vas enim salsamentarium ponit obitaculo in eius os indito, quod colum uocant. Nidores deniq; potius genera quaq; piscium appetunt: unde etiam carunculas sepiarum deustas, odoris gratia escam hamis affigunt. ita enim fit, ut pisces audius accedant. Polypos etiam assatos, non nisi nidoris causa nassiss inditos dimitti assueant. Quinetiam flutæ quoties uel piscium lotura, uel naui sentina eiecta est, fuggiunt, ut odorem sentientes. Sanguinem quoque suum sagaciter pisces odorari dicuntur. quæ res eo patet argumento, quod quoties sanguis effusus piscium est, fuggiunt, & loca petunt longinqua. Omnino uel esca putrida nassiss iniecta, nunquam subire, aut appropinquare patiuntur: sic recente nidorulentaq; protinus uel è longinquo festinantes irrumpunt. Constant hæc eadem in delphinorum genere latius, cum enim nullam partem auditui deputatam aperte delphini habent, tamen capiuntur per strepitum capite aggrauato, ut dictum iam est. Et cum olfactus quoq; partem nullam sensoriam habeant manifestam, tamen sagaciter odorantur. His igitur in animalibus sensus inesse omnes, apertum iam est. Reliquos animantium ordo, qui quadripartito diuiditur, hoc est molli, crustato, testato, insecto, quemadmodum se habere uideamus. Ergo niollia, & quæ uel crusta uel testia operiuntur, atq; etiam insecta, sensibus prædita esse omnibus constat: nam & uisu, & olfactu, & gustu. Insecta enim tam pennata, quam nò pennata procul sentiunt, ut mel apes, & culices dicti muliones: quod nisi odore agnoscerent, nunquam è longinquo sentirent. Sulfuris item odore genera insectorum multa intereunt. Ad hæc formicæ, origani sulfurisq; puluisculo insperso, suas relinquunt cauernas, alioq; migrant. Cornus præterea ceruini, facto incensu, plurima insectorum pars fuggiunt: sed præcipue styracis suffitu. Iam sepiæ, polypi, gammari, odore escarum allectati capiuntur: & polypi quidem ita adhæserunt, ut a uelli inde non possunt, sed truncari potius patiuntur. At uero pulicaria herba admota, protinus ab odore eius resiliere dicuntur. Gustus etiam similis ratio: interdum enim cibum persequuntur diuersum, nec eisdem saporibus omnia delectantur. Nam apes nullà ad rem putidam solent aduolare, sed dulcia petunt. culices nulla dulcia gestiunt, sed acida. Tactu uero sentire (quod

(quod etiam ante dixi) omnibus datum animantibus est. Quæ autē siliceo tegmine operiuntur, olfactum gustumq̃ habere cōstāt, argumento elcarū. purpuris enim efcas putidas purpurarij emoliuntur, & accedunt ipsæ ad eiusmodi efcam à longe, utpote odorantes. Sensus item saporū ijs in se, eisdem illis rationibus patet. sapore enim rerum earundem quæq̃ delectantur, ad quas ueniūt odoribus inuitata, quos gratos senserunt & discreuerunt. Adde quod quæcunq̃ os obtinent, ijs & uoluptas per saporum attractionem euenit, & dolor. De usu & auditu quamquam nihil certū, manifestūq̃ habemus: unguēs tamen ad strepitum se subtrahere, inferiusq̃ subsidere cernuntur, quoties ferramentū sentiunt admoeri. exiguo namq̃ extant: reliquo autem toto corpore perinde ac in cubili occuluntur. Pectines quoq̃ admo-
 10 to digito dehiscunt, mox comprimūt se ut cernentes. Natices item qui capiunt non aduerso statu, sed secundo adeunt, quoties efca persequuntur: nec uoce ulla, sed silentio agunt, utpote cum & olfaciant, & audiant. nec fieri posse aiunt, quin subterfugiant, si uox proferatur. Echinus inter testacea genera, quibus facultas ingrediendi est: uertibula, glandesq̃, inter immobilia eiusdem generis olfactum minime habere uidentur. Sensus ad hunc modum animalium generi natura dispē-
 15 sauit & tribuit.

Quæ animalia nocem, quæ sonum, quæ murmur edant, quæ item loquantur.

Caput IX

MOx quemadmodum uox se habeat, differemus. Differt proculdubio uox à sono, & tertia his adnumeranda res est locutio. Gutturē parte una uox agitur: quocirca quibus pulmo deest, ijs nulla uocis emittendæ facultas est. Locutio nō nisi uocis per linguam explanatio est. Vocales igitur literæ à uoce & gutture: consonantes lingua, & labris proferuntur: quibus literis omnē locutionem confici nulli dubium est. Quamobrem quibus animalium lingua libera absolutaq̃ nō est, ea neq̃ uocem emittunt, neq̃ sermocinātur: at sonus elidi uel alijs paribus potest. Ergo insectis animalibus, neq̃ uocis, neq̃ locutionis ulla facultas: sonusq̃ ijs spiritu interiore mouetur, non exteriorē. Nullum enim ex ijs spirat, sed alia murmur ædunt, ut apes: alia canere dicuntur, ut cicadæ. omnia uero in eo genere membrana, septo transuerso subdita, quæ præcinctum corpus distinguitur, sonāt: ut genus cicadarum attritu spiritus. Muscæ etiam, apes & reliqua ijs similia, cum uolant, sese attollūt & cōtrahunt. Sonus enim attritus interioris spiritus est. Locustæ suis gubernaculis atterētes sonāt, nullū mole, nullū crustatum, uel uocem uel sonū aliquē mittit naturalē. Pisces uocis quidem expertes sunt: quippe qui neq̃ pulmonē, neq̃ arteriā, aut guttur obtineant: sed sonos quosdam, stridoresq̃ mouent, qui uocales esse existimātur, ut lyra, ut chromis. his enim quasi grunnius quidā emittitur. Aper etiā piscis, quem amnis Acheolus gignit, uocalis habitus est, & erica, & cuculus. alter enim quodāmodo stridet, alter perinde ut cuculus aus obstrepat, unde nomen accepit. Quæ omnia creditū illam uocem emittunt, aut attritu branchiarum, quas horridiusculas continent: aut suis interioribus, quæ circa uentrē habētur. Spiritus enim inclusus in his est, quem dum atterunt atq̃ agitant, sonos illos elidunt. Necnon cartilaginei generis nonnulla stridere uidentur: uerum ab his uocem emitti ulla, recte dici non potest. at sonum, siue strepitum reddi uerius dixeris. Nam & pectines quoties per summa humoris nitibundi feruntur, quod uolitare dicunt, stridere sentiuntur: atque etiam marinæ hirundines, quæ sublimes uolitant, haudquaquam mare attingentes. sunt enim his pennæ latæ & longæ. Ut igitur per uolatum auium strepitus, quem alæ excutunt, nulla uox est: ita nec eiusmodi sonorū aliquis uox iure appelleretur. Delphinus item stridet ac murit, effrens se in aërem: sed non quemadmodū ea, quæ superius

enumeravi. hic enim & pulmonem & arteriam habet, proindeq; nōnihil uocis potest promouere. lingua tamen libera absolutaq; caret, & labris, quibus uocis aliquē possit articulum afformare. At uero quæ & linguam habent & pulmonem, si quadripedes aut omnino pedestres ouiparæ sunt, uocem quidem emittūt, sed exilem, & alia longum sibilum ædunt, ut serpētes: alia abruptum & perexiguum, ut testudines: alia uocē exilem atq; imbecilem. Ranis lingua sui generis est. pars enim prima, quæ cæteris absoluta est, ijs coheret, modo quo tota ferē piscium. intima uero absoluta ad guttur applicatur, qua suam uocem solent emittere. Et quidem genus illud ulularius, quam ololyginem nominant, mares intra aquam reddunt, ut ciant ad coitum foeminas. Sunt enim singulis animalium uoces propriæ ad initum & uenereum coitum, ut & suis, & capris, & ouibus. Reddunt ranæ suā ololyginem illam, maxillæ inferioris labro demisso pari libra, cum aqua modice recepta in fauces, superioreq; intenta. Flagrant tantisper oculi modo lucernæ, cum sinus buccarum maxillis distētis interluceat. Coitum enim noctu magna ex parte agere uisum tur. Genus autem uocem mittere potest: ijsq; præcipue facultas consociendæ locutionis, quibus lingua mediocriter lata, uel tenuis. Mares ac foeminae partim uocem reddunt eandem, partim diuersam. Garrulæ linguacioresq; sunt auium minores: & circa coitum maxime talem effici unamquaq; auem moris est. Alijs in pugna uox, ut coturnicibus: alijs ante pugnam, ut perdicibus, dum suos aduersarios prouocant: alijs cum uicēre, ut gallinæ. Canunt item nonnulli mares perinde ut fuscæ foeminae, sicut in lusciniarum genere patet. Foemina tamen cessat cantu, cum incubat, pullosq; educat. Sed in nonnullis generibus cantus maribus tantū datus est, ut gallinæ, ut coturnicibus. Quadrupedum autem genus, quod animal procreat, uocem uarie mittit: neq; est quod loqui possit, sed proprium id hominis est. Quibus enim locutio, ijs etiam uox. At quibus uox, nō ijs omnibus & locutio est. Qui furdiam inde ab ortu naturæ sunt, iidem etiā muti. uocem ergo emittere possunt, locutionem autem nullam. Pueri ut cætera sua membra cōtinere ac regere nequeunt, sic etiam linguæ sunt impotentes, & quidem imperfecti, & serius lingua absoluntur. itaq; magna ex parte balbutiunt, tortiq; lingua sunt. Differūt tum uoces, tum etiam locutiones, tractu ratione & regionis. Vox igitur acuminē grauitateq; maxime notescit: nec species discrepāt generis eiusdem. At uox explanata, quam esse quasi locutionem uel brutorum dixeris, differt & cæterorū animalium, & eorum quæ genere eodem continentur loci ratione. uerbi gratia: Perdicum alij caccabant, alij strident. Et auicularum nonnullæ haud uocem eandem mittunt, quam sui parentes, si præceptæ paternæ caruerint educatione, moribusq; & cōtibus cæterarum auium insueuerint. Iam uero luscinia modulos suos pullos docere, uersusq; quos imitarentur tradere uisa est: utpote cum non perinde locutio ut uox per naturam proueniret, sed acquiri posset per disciplinam & studium. unde homines quoq; locutione utuntur uaria, cum uocem omnes reddant eandem. Elephantus citra nares ore ipso uocem elidit spirabūdā, quemadmodū cum homo simul & spiritum reddit, & loquitur. At per nares simile tubarum rauritati sonat.

De somno & uigiis animalium, multa; præter hominē animalia somnare.

Cepit X



De somno & uigiis animantium, nulla quæstionis obscuritas est. Nam omnia pedestria, & prædita sanguine, dormire ac uigilare sensu ipso percipiuntur. Quibus enim palpebræ adiunctæ sunt, conuiuendo obdormiscunt. Item somnare nō solum homines, sed etiam equos, & canes, & boues palam est: atq; etiā oves, & capras: deniq; genus omne quadrupedum, idemq; animalis fecundum. Declarant id canes suo latratu, quem per

per quietem agunt. quanq̃ de ijs quæ oua pariunt, incertum hoc est. Sed dormire ea, item certum. Aquatiliū quoq̃ somnus apparet, ut piscium mollium, & crusta opertorum, locustarum inquam, & ceterorum generis eiusdem. Sunt autem isthæc omnia somno exiguo contenta: dormire tamen videntur. Argumentum uero quamuis nullum deduci ab oculis potest, quia palpebris carent: ipsa tamen quiete cernuntur placida seu poporata. Pisces enim uel manu facile caperentur, dum dormiunt, nisi pediculis & pulicibus appellatis sollicitarentur. Nunc uero si somno dati immorentur, noctū ab innumera multitudine illarum bestiarum occupati absumuntur. Gignuntur hæc in profundo maris tanta fecunditate, ut etiam escam de pisce emolitam, si diu in uno manserint, totam corrodant atq̃ absumant. & quidem sæpenumero piscator escam demissam glomeratis undiq̃ his bestiolis, perinde ut pilam recipit. Sedenim pisces dormire argumentis potius huiusce modi arbitrari licet. sæpius enim piscator adorsus pisces usq̃ adeo latet, ut possit etiam manu tollere, aut certe fuscina nullo indice sensu ferire. Quiescunt tantisper ex toto: neq̃ parte alia, quam cauda leuiter mouentur. Constat hoc idem uel ipso impetu quem faciunt, si dum quiescunt, motum aliquid fuerit. expauentes enim uelut somno exturbati feruntur. Quinetiam in petris stabulantes capiuntur, uidelicet propter somnum. & sæpe thunnarij circumretiunt thunnos dormientes. quod argumentū constat, quia admodum quiescentes, leuiterq̃ pandentes albida oculorum capiuntur. noctu potius quam interdiu dormiunt, ita sopiti, ut ne iacta quidem fuscina moueantur. & magna ex parte uel ad arenam, uel ad terram, uel ad lapidem aliquem procumbentes quiescūt imis gurgitibus, uel sub saxo, aut litore abditū. Plani autem piscium arena sese occultant. deprehendunt itū ipsius arenæ, tolliturq̃ fuscina percussū. Lupi quoq̃, & aurate, & mugiles, & id genus alij, fuscina interdiu sæpenumero dormientes capiuntur: alioquin ex ijs nullus fuscina posse capi existimatur. Cartilaginea uero ita interdiu dormiunt, ut uel manu tollantur. Nam delphini, balenæ, & quæcunq̃ fistulam gerunt, ædita per summa æquoris fistula, dormiunt: qua etiam spirant, pinnas suas mouendo leuiter. tam delphinum stertentem etiam nonnulli audiē. Mollia quoq̃ ad morem similem dormiunt, ut pisces. nec secus quæ crusta operiuntur. Insecta etiam animalium dormire argumentū, quod requiem capiunt, motuq̃ omni proculdubio cessant. quod præcipue patet in apibus: quiescunt enim noctu, & conticescunt, ut nullus omnino bombus sentiat. Constat hoc idem uel argumento eorum, quæ maxime in conspectu nostro, & intra nostros parietes uersantur. Non enim modo quia clare non uideant, idcirco noctu quiescunt (nam omnia quibus oculi duri, exiliter uident) sed etiam ad lucernarum lucem nihil somnus quiescere uidentur. Homo maxime animalium somniat. Aeditis nuper in lucem, & in infantibus adhuc nullum penitus contrahitur somnium: sed plurimis anno circiter quarto aut quinto ætatis uisa incipiunt. Produntur tamen & uiri & mulieres, qui nunq̃ quicquam somniarint. quorum nonnullis in processu ætatis accidit, ut uiso somno mutarentur habitu sui corporis, uel in mortem, uel in morbum. De sensu, de uigilia, de somno, res ita se habet.

De sexu masculino & femineoq̃, eorumq̃ in animalibus differentijs.

Caput XI



Sexus autem masculinus & femininusq̃, non in omnibus animalibus est. Sunt enim quibus id desit, ac similitudine quadam & parere dicantur, & ferre uterum. Sexus ergo discrimen in animalibus quæ uitam stabilem uiuunt, aut omnino in ijs quæ testa integuntur, nullum omnino est. At in mollibus & crusta opertis mas habetur, & femina. In pedestribus quoq̃ tum bipedibus, tum quadrupedibus, sexus uterq̃ est: atq̃ etiam in

ijs quæ animal per coitum generant, aut ouum, aut uermem. Cæteris igitur in ge-
 neribus simplicirationis modo, aut est, aut deest: uerbi causa, ut in quadrupedibus
 omnibus, alterum mas, alterum foemina est: sic in testa opertis, sexus deest discriminẽ.
 sed quemadmodum in genere stirpium, aliæ fructum ferunt, aliæ sterilem sortiuntur
 naturam: ita etiam in ijs est. At uero in genere insectorum, & piscium, sunt quæ
 omnino sexus hoc discrimen alterutram in partem non habent. nam anguilla ne-
 que mas, neque foemina est: neque prolem ex se aliquam potest procreare: sed qui eam
 capillamentis & lumbricis quædam similia interdum adnexa sibi gerentem uidisse
 aiunt, inconsiderate id asserunt, antequam aduertant, qua parte illa gerantur. Neque enim
 aliquid eiusmodi est, quod animal creet, nisi prius generarit ouum, quod in nulla an-
 guilla uisum est. Et quæ animal gignunt, suo in utero foetum continent, non in uer-
 triculo. Ita enim non secus, quàm cibus concoquerentur primordia geniturae. Quæ
 autem differentiam maris & foeminae anguilla notarunt, scilicet alteram caput ha-
 bere amplius atque oblongius: alteram, hoc est foeminam, repandius: hæc non maris,
 ac foeminae differentia est, sed generis. Sunt enim piscium nonnulli epiptiræ, ab
 hirci sterilitate appellati: quo in genere carini & balagri ex amnicis annotantur, qui
 nec ouum nec semen ullum prolificum unquam habeant, sed qui solidiores pingui-
 oresque in eo genere sunt, ijs intestinum paruum est, & laus præcipua in pastu. Ad
 hæc, in testaceis atque in stirpibus, quod pariat & generet, est: quod autem maris fun-
 gatur officio, deest. Sic etiam inter pisces genus passerum est, & rubellionum, & hia-
 tularum: oua enim in ijs omnibus reperiuntur. Sed in pedestribus sanguineis non
 ouiparis, maxima ex parte maiores longiorisque uitæ sunt mares quàm foeminae: præ-
 terquam in genere mulorum: eius enim foeminae & maiores sunt & uiuaciores,
 quàm mares. At in ijs quæ aut ouum pariunt, aut uermem, ut piscibus atque inse-
 ctis, foeminae maiores suis maribus euadunt: ut serpentes, phalangia, stelliones, ra-
 nae, & inter pisces pusilli cartilaginei generis, & pars plurima gregalium, & genus
 omne saxatile. Foeminas autem piscium maribus esse uiuaciores constat, eo quod
 foeminae uetustiores quàm mares capiuntur. Partes superiores prioresque in quo-
 cunque animalium genere, maribus sunt potiores, ualidiores, & aptiores. Quæ au-
 tem dici possunt inferiores, posterioresque, eas foeminae habent robustiores, tum in
 hominibus, tum in cæteris animalibus omnibus, quæ pedestria sunt, atque animal
 generant. Quod tamen omnino dixerim, foemina inneruior atque infirmior est, pli-
 lum etiam habet tenuiorem, quàm mas: aut quod uice plii ad proportionem ha-
 beri natura statuerat. Caro quoque humidior est foeminae quàm maris, & genua
 planiora, & crura tenuiora: sed pedes elegantiores, uidelicet quocunque in genere
 hæc partes habentur. Vox item foeminis omnibus tenuior & acutior, boue excepto,
 bubus etenim foeminis uox grauior, quàm maribus est. Partes autem quas uelut ar-
 ma natura animalibus dedit, ut dentes, cornua, calcaria, & cætera generis eiusdem,
 eas certe in nonnullis generibus omnino ut mares habent, sic foeminae non habent.
 uelut generis ceruini, foemina cornuum inops, mutilaque est: & auium nonnullarum,
 quibus data calcaria sunt, foeminae omnino ijs carent. pari modo, ut suæ
 foeminae dentibus uacant exertis. At in nonnullis generibus
 sunt quidem hæc sexui utrique, sed maribus potio-
 ra: ut cornua tauris robustiora, quæ uacis,

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER QVINTVS,
INTERPRETE THEODORO.

Omnium animalium generis partitio.

Caput I



XPO SVI partes animalium omnium, tum interiores, tum exteriores: atq; etiā de sensibus, de uoce, de somno, & quæ forminæ mares uel sint, satis iam explicasse existimo. Restat ut eorundem generationes persequamur: exoriscip item à primis, ordine apto & commodo differamus. Sunt porro generationes animalium multæ ac uariæ: partim dissimiles, partim quodammodo similes. Sed cum genera antè, ut res exigit, digessimus, nunc quoq; eodem modo tractare tentemus, præterquam quod initium tunc ab homine, cum de partibus ageremus, sumēdum censuimus. Nunc de eo nouissime differere placet, quoniam plurima ipse de se afferat explicanda. Ergo ordiendum ab ijs est, quæ testa integuntur: mox de ijs, quæ crusta ambit, agendum. & reliqua deinceps ad hunc modum exponenda sunt, hoc est, mollia & insecta. deinde piscium genus duplex, ouiparum dico, atq; uiuiparum, tum auium genus. ad postremū de pedestri dicendum est: quo in genere quæ animal generent, quæ oua pariant, prætermittenda non sunt. Euenit ut commune animalia cum stirpibus habeant, quod alia semine, alia sponte naturæ oriantur. ut enim stirpes, aut semine stirpiū aliarum proueniunt, aut sponte erumpunt, primordio quodā contracto ad ortum idoneo: quarum alix ex terra alimentum sibi hauriunt, alix in stirpibus alijs & nasci, & augeri solent, ut in libris de stirpibus siue plantis exposuimus: sic animalia nasci alia ex animalibus solent per formæ cognitionem, alia sponte, nullo cognitionis semine antecedente creantur. quorum alia humo, aut stirpe putrescente consistunt, ut complura insecta generantur: alia in animalibus ipsis excrementisq; partium gignuntur. Quæ igitur nisi sui cognati semine nunquam procreentur, ijs omnibus ortus per coitum est, dummodo sexus discrimen id habeant, quod marem ac foemina describere potest. Nam in piscium genere, nonnulla nec mares nec foemina gignuntur: quæ licet genus idem cum alijs sortiantur, tamen specie differunt. Quædam etiam sui generis omnino consistunt. Nec desunt quæ mare uidua, sexu uno foemineo formentur: quæ perinde ut aues pariunt, quæ uento oua concipiunt: quibus ab argumento conceptus nomine hypenemia, quasi subuentanea inditum est. Verum ea quæ aues concipiunt, omnia sunt infœcunda. Ita enim eorum natura nihil ultra ouum creare potest, nisi quo alio modo maris opera contingat. Sed de his diligentius post differemus. Piscium uero nonnullis cum sponte naædiderint oua, euenit ut ex ijs animal progeneretur. Sed alia ex se ipsa id faciunt, alia non sine opera maris: ut de his quoque sequenti disputatione commentabimur planius. simile enim ferè, & in genere auium existit. Quæ autem per se, uel in animali, uel in terra, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus creantur, eademq; maris ac foemina sexu distincta sunt, ijs coeuntibus gignitur quidem aliquid, sed ex quo nihil amplius gigni possit: uerbi gratia, coitu pediculorum, lenes dictæ procreantur: muscarum, uermiculī, pulicum, genus uermiculorum ouī speciem referens, ex quibus nec ea quæ generarint proueniunt, nec aliud ullum animal, sed id quod sunt, sordes tantum persistunt. Primum igitur de ijs quæ solent coire dicendum est: mox de cæteris ex ordine, quæ uel singulatim, uel ex comuni accidunt ratione, exponemus.

oua uerbi gratia
aut. ff. vi.
animalib;



Oitus nec similes omniū sunt, nec similem in modum aguntur. Quæ enim ex sanguineis pedestria uiuipara sunt, eorum omnibus masculis datum quidem est membrum ad officium generationis aptum. Verum non omnia simili modo coniunguntur: sed quæ retro urinam mittunt, aversa coeunt, ut leones, lepores, lynces. Leporum etiam foemina sæpenumero marem prior superuenit. Cæterorum magna ex parte modus coeundi idem est. plurimæ enim quadrupedes more coeunt iusto, foemina m scilicet mare supergrediente. Genus quoque autum omne eodem illo ac simplici more coniungitur. Differentias autem uel in auiibus has annotamus, ut alie foemina confidite humi, mare superueniente coeant, ut gallinæ: alie non confidite foemina, sed stante, ut grues. & quæ ita coeunt, rem quamcelerrime peragunt: mas enim supersiliens citò, ut passeris, perficit. Quadrupedum ursæ demissis cruribus, quemadmodum cætera, quæ pedibus innitendo exercent uenere, admodum parte maris supina, ad dorsum foeminæ coeunt. Herinaceis coitus erectis partibus, supinis hærentibus sibi aduersis. Inter ea, quæ animal generant, augenturq; magnitudine insigni, nec ceruæ mares suos patiuntur, nisi raro: nec uaccæ tauros, propter rigorem genitalis, nisi mæq; tentiginem, sed clunibus subsidibus semen recipiunt genitale. sic in ceruis mansuetis heri uisum est. Lupi eodem coeunt modo, quo canes. Feles non parte posteriore se iungunt, sed mas stat, foemina subiacet. Sunt porro in eo genere foeminæ ipsæ natura libidinose & salaces: itaque mares ad coitum ipsæ frequentes alliciunt, inuitant, cogunt: puniunt etiam nisi pareant. Cameli sedente foemina coeunt, nec auersi, sed complectente mare, ut cæteræ quadrupedes agunt, & coitum toto die exercent. petunt recessum solitudines cum libet coire, nec aliquis eò potest tutò accedere, petunt recessum solitudinis. Genitale camelis nervo ita constat, ut uel ex eo confici possit, quo arcus fidissime intendatur. Elephantum etiam solitudines petunt coituri: sed præcipue secus flumina, & quæ pasci consueuerunt. Subsidit foemina, clunibusq; submissis insit pedibus, ac innititur. Mas superueniens comprimit, atq; ita munere uenere o fungitur. Vituli marini modo animalium retro mingentium coeunt, & diu ligati in coitu eo hærent, ut canes, genitale ijs maribus grande est.



Vinetiam pedestrium quadrupedes, quæ oua pariunt, eodem coeunt modo, quo ea quæ animal generant, mare superueniente: ut testudo tam aquatilis quam terrestis. habent uero in quod meatus contingant, & quod per coitum adhareant, ut rana & pastinaca, & reliqua generis eiusdem.



Væ autem pedibus carent, & longo sunt corpore, ut serpentes, ut muræ, ijs coitus circumplexu mutuo supinarum partium agitur. & quidem serpentes ita circumuolutæ sibi ipsæ cohererent, ut unus serpentis bicipitis corpus totum esse uideatur. Hoc eodem modo lacertarum etiam genus complexu simili coit.

De coitu piscium.

Capit V



lices omnes exceptis planis cartilaginei generis, admotis inuicem
 partibus supinis copulantur. Plani autem eius generis, ijdemq; ha-
 bentes caudam, ut raia, pastinaca, & reliqua huiusmodi, non solum
 admotis supinis, sed etiam tergo foeminarū supinis marium superpo-
 sitis, modo cauda impedimento nullo ob crassitudinem sit, coeunt.
 At squatinæ, & quibuscunq; plenior cauda est, his attritu mutuo tantum partium
 supinarum coitus agitur. Sunt qui se uidisse confirmant nonnulla ex cartilagineis
 aversa modo canum terrestrium coherere. Foemina in omni cartilagineo gene-
 re maior quā mas est. quod idem ferē uel in cæteris generibus piscium esse con-
 stat. Cartilaginea uero præter ea quæ enumerauimus, sunt bos, lamia, aquila, torpe-
 do, rana, omneq; genus mustelorum. Sed omnia cartilaginea hunc in modū coire
 apertius notatum à pluribus est: moriuntur enim in coeundo diutius omnia quæ ani-
 mal generant, quā quæ oua. Delphinis quoq; omniq; cetario generi hic idem mo-
 dus est coeundi: planis enim admotis partibus agunt; nec parū multum iue tēporis,
 sed mediocri in coitu ipso cōsumunt. Differūt nonnulli mares cartilaginei generis
 à suis foeminis, eo quod maribus bina quædā circa excrementi ostium pendēt, quib-
 bus foemina careant, ut perspicui in genere mustelorum potest: in his enim quod dixi,
 omnibus est. Testes igitur nec pisces habēt, nec ullum aliud genus quod careat pe-
 dibus: sed binos meatus, tum serpentes, tum etiam pisces masculi continent, qui
 foetifico semine cum coeundi est tempus, implentur, & lacteum omnes emittunt
 humorem. Colligunt hi sese in unum caput, quemadmodum in auium genere uis-
 nitur quod subeat. Continent enim aues intus suos testes, ac cætera animalia quæ
 & pedes habent, & oua pariunt. Hoc ergo inseritur, atq; in locos, & receptaculum
 tenditur foeminarum. Pedestribus uiuiparis idem meatus foris extat, & seminis, &
 excrementitij humoris, alter intus meatus ducitur, ut dixi, cum partium differētiās
 explicarem. Sed quibus uesica deest, ijs idem meatus sicco etiam excremento perti-
 net foris: intusq; alter iuxta habetur. quæ quidem similiter tam in foeminis eorum,
 quā in maribus sunt. Carent enim uesica, præter testudines, quarum foeminae sin-
 gularem habēt meatum, quantū uesicam obtineāt. Sed testudo in eorum, quæ oua
 pariunt genere est. Piscium oua parientium coitus minus patet: quamobrem com-
 plures foeminas proliſicum maris uorando impleri crediderūt. Id enim fieri sapius
 cernitur. nam tempore coitus foeminae mares sequētes id faciūt, uentremq; eorum
 suis percussit rostris. quo etiam fit, ut mares semen & celerius fundant, & largius.
 tempore autē partus mares foeminas sequentes, quæ illar oua ædiderint, ipsi mordi-
 cus uorant: pisces uero ex ijs quæ remaserint, oriuntur. Circa Phœnicem pisces uel
 mutuo sexuū aspectu capi accepimus. mugiles enim mares à piscatore subducun-
 tur, quorū aspectu foeminae congregantur, atq; ita obretiuntur, uersatq; uoce mares
 capiuntur subductis foeminis. sed deuoratio illa feminis genitilis, quia sapius cer-
 nitur, argumentum coitus talis ementitur. Faciunt hoc idem quadrupedes quoq;
 tempore enim coitus nō nihil humoris suo genitali, tum mares, tum etiam foeminae
 emittunt, atq; admotis ad genitalia naribus odorantur. Perdices si aduersæ maribus
 steterint, uentusq; inde afflet, ubi mares stant, concipiunt, & maritantur. plerunq;
 etiam uoce marium utero ingrauescūt, si gestiunt, ac libidine turgent. uolaru quoq;
 supernæ marium effici idem potest: uidelicet dum mas ipse in foeminā foetifico spi-
 ritum demittit. ore hianſe, exertaq; lingua, & mares & foeminae coeunt. At uerus
 piscium ouiparorum coitus raro cernitur, quoniam congressionem quamprimum
 digressio sequatur, fieri tamen ita eorum coitum uisum est.



Ollia, ut polypi, sepia, lolligines, modo eodem omnia coeunt: oribus enim inuicem admotis, complexuq; mutuo brachiorum libidinem explent. Ergo polypis coitus, cum alter capite uulgo appellato in terram uerso, nitibundoq; explicat porrigitq; sua brachia, alter superuenit, passisq; brachijs singulis ad singula subiacetis acetabulorum consueptu mutuo adhærescit. Marem etiam nonnulli aiunt gerere, quod genitalis speciem referat suo brachio, in quo duo amplissima acetabula habentur. neruo id quasi constare porrectum ad medium usq; brachium confirmant, totumq; nari foeminae anecti. Sepia, ac lolligines ora applicantes, & brachia inter se componentes, nantesq; in aduersum coeunt. narem etiā dictam in narem inferunt. natus alteri retrorsum, alteri anteverfus in os agitur. Pariūt ea sui corporis parte, quæ fistula dicitur, quæ & coire eas nonnulli arbitrantur.



Enera crusta operta, ut locusta, gammar, squilla, & huiusmodi relictæ, more quadrupedum retro mingentiū coeunt, scilicet, ut locumina caudam supinam exponat, mas suam superponat, & applicet. coire solent in eunte Vere iuxta terram. iam enim coitus omnium id genus exploratus est. interdum etiā cum scis matureseunt, coire incipiunt. Hoc eodem modo gammar quoq; & squilla coeunt. Cancrī parte priore copulantur, sua opercula loculosa illa, rugosaq; mutua consertione componentes. Primum cancer minor ab auerso superuenire solet, tum maior ubi ille superuenerit, uertit se in latus. Nulla re differt foemina a mare, nisi quod operculum applicabile illud amplius, & distantius, & hirsutius foeminae gerant, in quo oua pariunt, & quæ egerunt excrementum. membrum autem quod mas in foeminam inserat, nullum omnino habetur.



Insecta auersa coeunt. deinde quod minus est, superuenit malus, hoc est, mas foeminam. nec mas in foeminam genitale ullum inserit membrum more animalium cæterorum: sed foemina sursum in maris receptum, caudæ ultimum suæ meatum quandam præducens reflectit; qui in nonnullis maior quàm proportione totius corporis esse uidetur, cum ipsa parua admodum sint. Sed sunt etiam in quibus minus inconueniens aestimetur. planum hoc fuerit, si muscas coitu uenereo copulatas diuiseris. tardo etiam quæ cōsuerint, seiunguntur digressu: diu namq; eorum copulatio durat: quod in ijs quæ in nostro conspectu uersantur, facile patet: uerbū causa, in muscis, in scarabeis. Omnia enim ad hunc modum coeunt, uidelicet muscæ, scarabei, uerticilla, phalangia, & si quid aliud generis eiusdem coire solet. Phalangijs, quæ texunt, coitus agitur hoc modo. cum foemina deductam araneam traxerit, mas eandem mutuo trahit, quod ubi sæpius fecerint, coeunt, & auersis clunibus copulantur: nam propter alutum orbicularem modus hic coniungēdi ijs congruit. Coitum omnium animalium fieri ad hunc modū apertum est. Tempora autē coitus descripta, & ætates certas ad uenerem singulis animalium natura fixit, & statu. ergo plurimorum animalium natura uult quidē rem uenerē per id tempus, cum hyemis cessante sæuitia, æstatis clementia oritur: quod sanē tempus ueris est, quod plurima & uolatilia & pedestria & natantia ad coitum excitantur. Sed sunt quæ per autumnum etiā & hyemem

mem coant, atq; parant: ut nonnulla cum aquatiliū, tum uolucrum genera. Hoc minū maxime temporibus omnibus oportunus coitus est: atq; etiam plura alia per deftris generis, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore aspernantur, uide licet propter teporem, & pabuli ubertatem. quorum tempus etiam gerendi utri breue est, ut suis, ut canis, & uolucrum quæ sæpius pariunt. Complura etiam educationi suorum paruū consulendo, noui nisi commodō tempore coeunt. Sit mulatur ad uenerem mas hominū magis tempore hyberno, foemina æstiuo. Genus autem auiū (ut dictum est) parte plurima Vere, ac ineunte æstate colit, & parit, excepta alcyone, quæ circa brumam parere solita est. quamobrem quorū bruma serena existit, dies alcyonei appellantur, septem ante brumam, & septem à bruma, ut Simonides quoque suo carmine tradidit, ut: Cum per mensem hybernum Iupiter bis septem molitur dies teporis. demētiam hanc temporis nutrīcem sacram uariā, & pictā alcyonis mortales dixere. tranquillū uero tantisper tempus efficitur, sita euenit, ut bruma austrina uergilijs aquilonis fiat. Septem primis diebus nidum conficere autem hanc fertur, reliquis septem parere, educareq;. Dies alcyoneos fieri circa brumam, non semper nostris locis contingit: at in Siculo mari penē semper id euenit. Parit alcyon circiter quinq; oua.

Que animalia semel, quæ ue pluries in anno pariunt.

Caput IX



Ergi, & gaulæ saxi maritimis ouabina, terna ue pariunt: sed gaulæ æstate, mergi à bruma ineunte Vere. & incubant cæterarum auiū more, sed neutra earum auiū conditur. Omnium rarissimū uidisse alcyonem est: ferē enim circa uergiliarum occasum, brumamq; ipsam apparet: & ubi primū per portum non plus quā nauem circumuolat, statim abit, ut nusquam præterea uideatur. quomodo Stesichorum quoq; eius meminisse notum est. Luscinia etiam parit æstate quinq; aut sex oua. conditur ab autumno usq; ad uernos dies. Insecta hyberno quoq; tempore coeunt, & serenis austrinisq; diebus nascuntur ea, quæ se abdere non solent, ut muscæ, formicæ. Semel anno magna pars syluestrium animalium parit, quæ scilicet non, ut lepores, superfoetant. Pisces plurimi etiam semel pariunt: ut ij quos susaneos, ex argumēto cognominant, quia fusim retibus capiuntur, ut thunni, limariæ, mugiles, spuria, mone dula, chromes, passerēs, & reliqua generis eiusdem, excepto lupo: huic enim soli ex eo genere partus bis anno exercetur: sed posterior infirmior est. Sarda quoq; & faxatiles bis, excepto mullo: hic enim solus ter parit: quod ex foetu ipso, statutaq; intelligit. ter enim aliquibus in locis partus apparet. Scorpio bis, & sargus Vere, ac autumno. salpa semel autumno. Thunna etiam semel. Sed quoniam partem præture, partem ferō producat, hinc foetificare bis creditur. ædit primam partem circa mensem Decembrem à bruma, alteram Vere. Differt mas thunnus à foemina, eo quod foeminæ pinnula iuncta sub uentre est, aphareus nūcupata, quæ mari deest.

Quoties, quibus ue anni temporibus certilaginea pariunt.

Caput X



Artilagineorum squatina una bis parit: nam & incipiente autumno, & circa uergiliarum occasum: sed per autumnum felicius. Singulis uero foeturis partus septeni, aut octoni proueniunt. nonnulli ex mustelorum genere bis mense putantur parere, uidelicet qui stellati appellantur: quod ideo uidetur, quia oua eorum non simul perficiuntur. Non defunt quæ omnibus anni temporibus pariunt, ut murena: cuius partus & numerosior est. & quæ prodierint ex paruo, celerī incremento adolefcunt, ut & equifelis, nam eius etiam partus de minimo in maximum celerissime augetur. Sed

murena omnibus anni temporibus parit. equifelis uere tantum. Murus non idem quod murena est: quippe cum murena sit uaria, atq; infirmior: murus unicolor, & robustus, colore larici arbori similis. dentes etiam tam intus quam foris possidet. Sexus discrimine perinde ac in cæteris uolunt, ut alterum mas sit, alterum foemina. exeunt hæc in terram, & sæpe in ea capiuntur. Fit ut pisces omnes celeri incrementa perficiantur: sed præcipue graculus inter minora. Solet hic parere iuxta littora, algosis, densisq; locis. Cernua etiam breui ex paruo insignem magnitudinem accipit. Limaria ac thunni in ponto pariunt, nec uspiam alibi. Mugiles, auratæ, lupi, locis ijs maxime ædunt, quâ flumina exeunt. Ordina, scorpiones, & multa alia genera in alto fecundant.

Quibus mensibus pisces pariant, maiori ex parte.

Caput XI

Pariunt pisces plurima sui parte mensibus his tribus, Martio, Aprili, Maio. autumnopauci, ut salpa, sargus, & nonnulla alia generis eiusdem, paulo ante æquinoctium. Adde ijs torpedinem, & squatinam. Sunt certe quæ uel per hyemem, æstatem uel, suos ædant partus, ut dictum est. per hyemem lupus, mugilis, acus, per æstatem mense Iunio Thunna circa solstitium parit. hæc folliculo quiddam simile, in quo ova exigua, multatq; consistunt. spargi etiam per æstatem pariunt, mugilum labeones, sargones, mucones, capitones. grauescere uero mense Decembri incipiunt, geruntq; diebus tricenis. Mugiles aliquos non coitu, sed limo, arena uel nasci constat. Conceptus igitur piscium magna ex parte uerno agitur tempore: sed tamen, quod dictum est, & æstate, & autumnno, & hyeme nonnulla coitu implentur. Verum nec pariter omnibus, aut simpliciter, aut generatim id euenit: nec plurimæ parti, ut uerno tempore, nec uero cæteris illis temporibus tam numeroso partu fecundatur, quam Vere. Deniq; latere non decet, ut stirpium, & quadrupedum animantium generi plurimum interesse ex regione, non solum ad cæteram corporis felicitatem, sed etiam ad coitum, partumq; ampliorem: sic in piscium quoq; ratione locis ipsis discrimen plurimum oritur, non ad magnitudinem tantum, habitumq; uegetiorem, uerum ad coitum etiam & partum, ut ea dem alibi pluries generent, alibi minus.

Molle genus piscium uerno tempore parere, septiam uero omnibus anni temporibus.

Caput XII

Mollia quoq; uerno tempore pariunt, & sepia in primis. parit hæc omnibus anni temporibus, perseveratq; in ædendo ouorum numero dies quindæcim. quoties autem ædiderit, mas è uestigio sequens, atramentum ouis superinfundit, atq; ita efficitur, ut solidescant. incedere coniugatum solent. Mas uariis magis, quam foemina, dorsoq; attriore est. Polypus hyberno tempore colit, uerno parit. latet circiter menses duos. Ouum ueluti circum ædit, fructui populi albæ simile. perquam fecundum hoc animal est. nam de eo quod ædiderit, copia innumera prouenit. discrepat mas à foemina, eo quod capite est productiore, & quod genitale piscatores appellant, albidum suo in brachio continet. fouet polypus ova quæ ædiderit: quamobrem deterrimi tantisper efficiuntur: haud enim in pastum prodire patiuntur. Quinetiam purpuræ Vere generantur, & buccina hyeme abeunte. Genus denique omne quod testa operitur, uerno autumnalique tempore habere cernuntur ea, quæ ova appellant, exceptis echinis cibo idoneis: quippe quibus etsi per ea tempora præcipue ubertas ouorum est, tamen nullo tempore committitur, ut ouis omnino careant: sed maxime plenilunijs, diebusque tepidis restituntur, redduntq; pleniores, præterquam ijs quos Pyraus fert Eurypus: nam illi hybernis mensibus meliores sunt, parul

parui quidem, sed pleni ouorum. Ad hæc umbilici pariter omnes, hoc eodem tempore sua oua habere uisuntur.

De auium sectura, & quoties, quibus uic anni temporibus hirundo, merula, columba, & gallina pariant.

Caput XIII



Vium syluestres, ut dixi, semel magna ex parte coeunt, atq; pariunt. Verum hirundo bis parit, & merula, sed eius primi partus intereunt frigore hyberno: omnium nanque aulium prima hæc parit, posterior rem autem partum educat, & feliciter ducit ad finem. At uero quæ aut urbana sunt, aut traduci possunt ad mores mitiores, hæc sæpius generant, ut columbæ, quæ tota æstate foetant. Gallinæ etiam ineunt, & pariunt omnibus anni temporibus, exceptis brumalibus diebus. Columbæ uero generis plures species sunt: est enim liuia dicta à liuore, diuersum certe à columba genus, quippe quæ minor, quàm columba sit, & minus patiens mansuescere. liuet etiam plumis, & penè nigricat, & pedibus rubidis, scabrosisque est: quas ob res nullus id genus cellare alit. Maximo inter hæc genera corpore sunt palumbes, secundum magnitudinis locum uinago obtinet, paulò maior quàm columbus est. minimum ex ijs turtur est. Pariunt columbæ omnibus anni temporibus, pullosq; educant, si locum apricum habeant, & cibum. sin minus, æstate tantummodo foetant. Sed proles præstantior uere, quàm autumnus est: deterrima æstate, & omni
no tempore calidiore.

Cellare, in cella.

De sectura uiuiparorum animantium, & quo ætatis tempore incipiat, quo uic desinat.

Caput XIII



Erat etiam differunt ad coitum animalia: primum enim magnæ eorum parti semen non simul incipit & excerni, & posse generare: sed ut illa prolifica postea accedit. nouellorum enim in omnibus animalium generibus, prima emissio seminis, aut infœcunda est, aut si fœcunda sit, imbecilliora tamen generat & pauciora. quod potissimum in hominum & quadrupedum animal gignentium genere, atque etiam auium patet: alterum enim prolem pauciore procreat, alterum oua ædit pauciora. A etas uero accommodata ad coitum quæq; suo in genere plurima ex parte serè tempus idem sortitur: nisi quid præmaturet, & aut aliquam ob rem monstrosam, aut ex detrimento naturæ, & uitio anticipet. Res igitur homini innotescit, tum uocis mutatione, tum etiam testium, non magnitudine tantum, uerum etiam specie, quemadmodum mammis etiam declaratur: sed præcipue ortu pilorum pubis. Semen autem ferre incipit circiter annos bis septem: sed uim genitalem recipit circa annos ter septem. Cæteris animalibus denegata pubertas est, alijs enim nulli omnino dati sunt pili, alijs supina in parte nulli, aut pauciores, quàm in prona. At uocem immutari non nullis apertum est. Alijs partes corporis aliæ quædã significant semen tam initium, uiresq; prolificas sibi trahere. Vox fœminæ magna ex parte acutior, & iunioribus quàm uetustioribus acutior est. nam ceruini etiam generis mares uocem grauiorem, quàm fœminæ mittunt. Vox autem maribus in hoc genere, cum tempus coeundi est: fœminis autem cum metuerint, breuis uox fœminæ est, maris productior. Canibus item senescentibus uox grauior redditur. Equorum etiam uoces differre palam est. fœminæ enim simul ac natæ sunt, uocem exiguam mittunt, ac tenuem: mares exiguam quidem & ipsi, sed pleniorē tamen, & grauiorē, quàm fœminæ, & indies maiorem reddit. Bimus cum est, atq; inire incipit, uocē magnam, grauiorēq; mas mittit: fœmina maiorem, quàm antè, & clariorē usq; ad uigelimū ætatis annum magna ex parte, sed ab hoc tempore imbecilliorē tam mares, quàm fœmina

nae reddunt. Magna igitur ex parte, ut dixi, uox marium, foeminarumq; differt, eo quod mares grauius sonant quam foeminae: quorum scilicet uox, aliqua cum productione emittitur. Verum non in omnium animalium genere ita agitur. Sunt enim in quibus econtrario fit, ut in bubus. nam bouum foemina, grauiorem quam mas agit uocem: & uirulis grauior quam adultis, perfectisq;: quamobrem his castratis uox econtrario mutatur. transeunt enim quae castratur in foeminam. Tempora autem coitus ad hunc modum per aetates natura suis animalibus statuit. Oues & caprae anniculae coeunt, atq; uterum ferunt: sed caprae potius, mares quoq; in ijs ipsis generibus eodem illo tempore ineunt. sed proles differt, quatenus praestantior ea est, quam senescentes mares & foeminae procreant. Sues tum mares, tum foeminae coire incipiunt 10 mense suae aetatis octauo: quanquam mas antequam sit anniculus, prolem generat uitiosam. foemina annicula parit. sic enim tempus gerendi uteri exigit. Sed non omnibus locis eadem aetatis ratio est, ut dixi: iam enim sues, nonnulli tam mares quam foeminae quarto coeunt mense: sexto tamen ita, ut uel progenerare & educare possint. nonnullam apri mense decimo inire incipiunt. Valent iij coitu ad triennium. Canes tam mares quam foeminae anniculi, magna quidem ex parte coeunt: sed nonnunquam uel mense octauo. quod magis foeminae euenit, quam mari. Gerit uterum diebus sexaginta & uno, aut duobus, aut ad summum tribus: nec minus quam sexaginta diebus. quod si quid celerius prodierit, educari ac perfici nequit. Cum peperit, rursum sexto post mense, nec prius coitu impletur. Equus inire tam mas, quam foemina incipit biennio, ita ut ualeat procreare. proles tamen per id tempus minor, & imbecillior est. At uero (quod ex more plurimo agitur) in trimatu coeunt, & proficiunt subinde in generando, ut proles praestantior ad usq; annos uiginti procreetur. Coeunt mares ad annos tricenos ternos: foeminae ad quadragenos: ita ut per totam ferè uitam coitum equis seruari eueniat. Viuit enim magna ex parte mas annos circiter quinque & triginta, foemina plus quam quadraginta. iam & quinque & sexaginta annos uixisse equum proditum est. Asinus tam mas quam foemina mense tricesimo coit: sed magna ex parte nequeunt generare: uerum in bimatu, aut trimatu, & semisse. Sed iam uel annicula uentrem gessisse asellae aiunt, ita ut quod pepererat, educari ac perfici potuerit. Bos etiam annicula peperit, ut educari, augeri, quantum genus exigeret, licuerit. Primordia 30 generationis horum animalium ita se habere perpessum est. Homo mas ad annum usq; septuagesimum, uidelicet termino ultimo potest generare: foemina usq; ad quinquagesimum, uerum id raro. paucis enim proles in eo aetatis tempore procreata est. Sed magna ex parte maribus quintus & sexagesimus annus finis prognerandi est: foeminis, quintus & quadagesimus. Oues parere usq; ad annum octauum possunt. & si bene curetur, uel in undecimum facultas pariendi protrahitur. & quidem fieri potest, ut etiam per totam ferè uitam coeant, tam mares quam foeminae. Hirci pingues multum fructu sunt. quorum argumento uites, quoties per nimiam alimenti copiam luxuriantes fructum non ferunt, hircoscere rustici dicunt. Verum cura extenuandi adhibita, efficitur, ut coeant, atq; procreent. Arietes primum uetustiores foeminas ineunt, nouellas enim minus persequitur. Pariunt, ut dixi, iuniores pauciora, quam uetustiores. Apro ad triennium probitas coeundi edurat. uetustioribus proles deterior gignitur. nullus enim praeterea profectus ei accedit, nulla uirum recreatio. solet inire pabulo satiatus, & cum altera non subegerit, uel initus breuior agitur, & scetus corpore minore creatur. Paucissima sus aedit prima partione, uiget secunda, nec senescens copia foetus deficitur, quam lentius coit. ubi uero quintumdecimum annum nata est, non praeterea generat, sed effera. Si pinguet, ocyus & iuuenis & senescens mouetur ad coitum. si grauida admodum pinguescat, efficitur, ut foeta minus habeat lactis. Proles, quod ad aetate attinet, optima est, cum uiget pariter, quod ad tempora, praestant

præstantior quæ hyemis initio gignitur: deterrima, quæ æstate: quippe quæ parua, exilis, & perhumida sit. Mas si pinguet, iure omnibus anni temporibus potest, nec solū interdiu, sed etiam noctu, aut certe matutino potissimum tempore. senescens autem minus subinde agit, ut dictum est. sæpe qui uel per ætatem, uel per infirmitatem suæ naturæ nequeant expedite coire, quōd formina impotens sustinendi maris fessâ clunes demittit, cubantes unâ cum scemina coeunt. Concipit præcipue sus, cum præ libidine gessiente pruriens auriculas flaccidas demittit: aliter semen à uulua respuitur, relapsūq; euanescit. Canes non per totam coeunt uitam, sed usque ad quendam ætatis uigorem: ad annos enim duodecim magna ex parte, & coeunt, 10 & implentur. Verum iam aliquibus, tum sceminis, tum maribus, uel annum octauum, & decimum, atq; etiam uigessimum nactus facultas non desuit prolifici coitus. nam ijs quoque senectus uim generandi, pariendiq; ut & cæteris tollit. Camelus ab aucto urinam reddit, sed coit quemadmodum dictum iam est. Tempus coeundi in terra Arabia, mense Septembri. fert uentrem menses duodecim: parit singulos: uiui parum nanque est. Incipit & mas, & scemina coire in trimatu. scemina post partum uno interposito anno coit. Elephantus scemina incipit coire anno, aut duodecimo, cum celerrime: aut quintodecimo, cum lentissime. Mas quinque aut sex annos natus, superuenit ineunte Vere. coitum triennio interposito repetit. Quam grauidam reddidit, eandem præterea tangere nunquam patitur. Vterum biennio 20 gerit: parit singulos: uiui parum nanque est. foetum magnitudine bimeltris, aut trimeltris utuli ædit. Coitum animalium, quæ non nisi coeundo progenerent, ad hunc modum habere se intelligimus.

De ijs, quæ silicea integuntur testa, quæ coitus omnino experies sunt.

Caput XV



Mox de generatione eorum, quæ uel coeant, uel non coeant, commentabimur: & primum de ijs, quæ siliceo tegmine operiuntur. hoc enim unum ferè genus totum expers coitus est. Purpuræ uero tempore eundem in locum sese colligentes condunt, quam fauaginem nominant, quæ uelut fauus est apum. uerum non ita elegans, sed quasi e 10 putaminibus cicerum alborum, multa inter se composita, struem unam sua cohaesione coagmentarint. nullum ijs patet foramen, neq; ex ijs purpuræ enascuntur, sed cum purpuræ, tum etiam reliqua testis inclusa, è limbo ferè, & materia putrescente oriuntur. Illa uero coagmentatio fauo similis, tanquam purgamentum, tam ijs, quam buccinis euenit. nam buccinis quoque fauificare in more est. Itaque ne ea quidem, quæ ex testaceis fauos saluant, alio modo, quam cætera testis inclusa generantur. uerum melius, atque uberius quoties præsumt, quæ eiusdem sunt generis, 20 emittunt enim, cum suos ordiuntur fauos, mucorem quendam, ex quo putaminæ cellulæ illæ consistunt. hæc ergo rupta diffusaq; omnia humorem quem continebant, in terram dimittunt. Mox eo quo effuderint loco gignuntur purpuræ. 40 Iæ, exordio admodum exiguo consistentes, quas sibi annexas gerunt, quæ gradus capiuntur. nonnullæ etiam forma nondum distincta cernuntur, si forte prius quam pepererint, capiantur. Foetus interdum per crates, & tegetes, non qualibet elidunt, sed congregatæ eodem, ut facere in mari solent. itaque per angustiam, ueluti uix speciem foetus conformatur. Genera purpurarum plura, & nonnullæ magnitudine augentur insigni, ut quæ ad Sigæum, & Lectum Idæ promontoria gignuntur. Aliæ paræ, ut quas Euripus fert, & Caria. pelagiæ magnæ, scabraeq; sunt, quarum flos magna ex parte niger: sed nonnullis rubidus pusillum, nonnullas ex magnis, uel ad precium minæ euadere nouimus. Paruæ ad litora, & oras reperiuntur flore rubro, partes item Aquiloniæ nigras, Austrinæ

πρὸς πύργους, præsumi, id est, præcis sunt.

ὅπου ἵπτοι, qualibet, id est, quouis loco.

rubras magna ex parte ferunt. capiuntur tempore uerno, cum fauos extruunt. Caniculae tempore nullae ferè capiuntur, non enim tantisper pascuntur, sed se abscondunt, & latent. florem suum inter papauere dictum, et collum continent, textu ipsius flore, aspectu ueluti membranae candicantis, quam detrahunt. tingit haec pressa, & inspicit manum. pertinet eadem suo situ, perinde ut uena, idèq; flos ille celebratur. reliquum contextus quasi alumen est. Cum fauificant purpuræ, tunc deterrimum habent florem. Paruas runduni cum testis: non enim detrahare facile est, maiorum florem testa ablata detrahunt: quam ob rem euenit, ut collum à papauere separetur. Flos enim positus inter haec est, supra eam partem, quam uentrem appellant. Itaq; detractio flore diuidantur partes istae, necesse est. Dant operam ut uiuæ frangantur, nam si prius, quam fregieris, expirarint, florem omnem cum uita euomunt, quapropter solent eas asseruare in nassis, dum ipsae se colligant, atq; requiescant. Veteres nassam escæ adiunctam demittere non solebant: itaq; saepe accidebat, ut purpura iam extracta decideret. At homines nostrae ætatis adiungunt nassas, ne si deciderat, absoluat. quod tunc potissimum euenit, cum plena est, nam si inanis sit, difficile se euellere potest. haec propria eueniunt purpuris. Buccinis etiam modus idem gignendi, qui purpuris, tempusq; idem est. operculum item oris idem tam huic utriq; generi adheret natium, quam cæteris turbinatis omnibus. pasci quoq; exerta lingua appellata sub illo operculo solent. longior digito lingua hæc purpuris est, qua pascitur: & tum conchulas, tum etiam sui generis testam perforare potest. Tempus uiuendi & purpuris, & buccinis longum. Annos enim circiter sex purpuræ uiuunt, & singulis annis incrementum earum patet per orbis: quibus totidè quot annos habent, testa intorta cuniculatim in crepidinem definit. Mituli etiam fauificare soliti sunt. Ostreis qua coenum, ibi origo consistit. Conchæ, chamæ, ungues, peccines, locis arenosis sui ortus initia capiunt. Pinnæ erectæ locis arenosis, coenosisq; ex bysso, id est uillo siue lana illa pinnali proueniunt. quæ custodem intra se continent, aut squillam paruum, aut cancellum: quo quidem custode priuatae pereunt breui tempore. Testacea deniq; omnia sponte naturæ in limo diuerfa, pro differentia limi oriuntur, nam in coenoso ostreae, in arenoso conchæ, & reliqua, quæ modo enumerauimus. Rimis, cauernisq; saxorum uertibula generantur, & glandes, & quæ per summa adherent, ut patellæ, ut natices. Omnia id genus celeri incremento augentur: sed præcipue purpuræ, atq; peccines, quippe quæ anno perfici possint. Cancri colore albido, corpore admodum parui in nonnullis testa operi generis nascuntur: & plurimi quidem in miculis foliatis: mox in pinnis, quos pinnoiheras uocant. Quinetiam in peccunculis, atq; ostreis. Verum si nullum conspicuum capiunt incrementum. Piscatores cancos eiusmodi nasci confirmant, unà cum illis, quorum testam inhabitant. Latent aliquandiu in arena peccines, sicut etiam purpuræ. Nascitur ergo concharum genus quemadmodum expositum est, sed locis uarijs: nam alia uadis, alia gurgite, alia duris locis atq; asperis, alia arenosis: & alia sedem mutant, alia stabiliter degunt. Pinnæ ex ijs, quæ sedem nunq; mutare solent, radice innituntur. Ungues, & conchæ nulla innitentes radice permanent. euulsa uiuere præterea nequeunt pinnæ. Quæ stella uocatur a deo natura calida est, ut omnia contacta protinus decoquat, detrimento etiam summo echinis Euripi Pyrrheni eandem esse confirmant. forma eius stellis, quæ pinguntur, similis est. Quinetiam qui pulmones appellantur, sponte proueniunt. Concha, quæ pictoribus usus est, crassitudine plurimum excedit: & florem illum non intra testam, sed foris habet. competri id genus locis Caria potissimum nouimus. Cancellus ille concharum hospes, principio ex terra, limoq; consistit, mox conchulas ingreditur uacuas: ubi cum excreuerit, transit in concham ampliorem, uidelicet aut naticis, aut turbinis, aut alicuius similis, saepe etiam parua

πυλινδοί, foliatis.

parua buccina subit, ingressusq; ampliorem illam gerit pari modo, & usult in domitio capaciore, rursusq; excrescens aliam petit ampliorem.

De urticis, & spongiarum genere, quo ut modo gignantur.

Caput XVI



- Odus idem gignendi ijs etiam est, quæ nulla testa integuntur, ut urticis & spongijs, qui testa inclusis: per rimas enim, & cauernas, & fauces faxorum oriuntur. Genus duplex urucæ est: aliæ enim linuosis adhærent, quæ nunquam à axis absoluuntur: aliæ plana, & littora amant, quæ suis abiunctæ sedibus uagantur. Patellæ quoq; absolui
- 10 solent, aliq; transire, nasci etiam in cubilibus spongiarum nouimus bestiolam aranei similem, nomen pinnothera mutuantiem, degit hæc intra spongiarum cubile: & aperiendo, claudendoq; pisciculos capit, aperit antequam ingrediantur: claudit, & contrahit cum ingressi sunt. Genus spongiarum triplex statuitur: nam aliæ raræ, aliæ spissæ, aliæ quas nominat achilleas, tenuissimum genus id tertium, & spississimum, & ualidissimū est, quod galeis ocreisq; inseritur: eoq; minus ciere strepitum posse notatum est. genus hoc inuentu perquam rarum est. Quæ autem in genere illo spisso præduræ sunt, atque asperæ, nomine hirci nuncupantur: quæ quidem omnes aut ad saxa nascuntur, aut iuxta litus, lutoq; aluntur: cuius rei argumentum est, quod captæ, limo resectæ omnes cernuntur. quod certe indicat, cæteris
- 20 quoq; adhærentibus, cibum per ipsum annexum hauriri. Imbecilliores propterea sunt spissæ, quam raræ, quia minus alto radicis hæsu innituntur. Sensum etiam spongijs esse aiunt, argumento, quod ad euulsoris accessum contrahuntur, ita ut euelli difficile sit. quod idem etiam faciunt, quoties flatus, tempestasq; urget, ne sua de se depellantur. Sed sunt qui de hoc dubitent, ut qui Toronam incolunt. Narrant tamen proculdubio bestiolas quasdam, uelut tineas, lumbricos uel, & eiusmodi alias consistere intra spongijs, atque ali: quas & euulsis spongijs pisciculi faxatiles deurent, qui uel radices absumunt totas, quæ inhærentes saxi remanserint. Si uenerit fortè, ut spongia abrumptur, residuo item renascitur & completur. Magnitudine amplissima solutæ illæ & raræ spongiæ augentur plurimæ, quæ circa Lyciam
- 30 sunt. Sed mollissimæ, quæ spissæ: nam achilleæ torulosiores ijs constant. omnino quæ altis, tranquillisque insunt gurgitibus, mollissimæ sunt: flatus enim ac tempestates, spongijs quoque ut cætera altitia reddunt duriores, & incrementum impediunt. quamobrem spongiæ Hellepontis spissæ, ac duræ sunt, & omnino quas mare ultra Maleam promontorium, citraq; fert, differunt inter se mollitiæ, duritateq; nec calore immodicum spongiæ patiuntur: sit enim eo, ut more pullulantium putrescant. quocirca optimæ iuxta oras comperiuntur spongiæ, si gurgite alto demersæ sunt: commodè enim temperantur propter altitudinem gurgitis. Color illoris, uisusq; nigricans est. adhærent nec parte, nec toto: intersunt enim fistulæ quædam inanes: sed pluribus passim particulis hæsitat, & quasi membrana extensa subesse
- 40 radicibus earum uidetur. superne autem cæteri meatus concreti propemodum latent. At uero quaterni, aut quini patent, per quos pasci existimantur. Genus item aliud est, quod nomen aplyfias inde accepit, quia nunquam laetetur, quasi illorariam uoces. habet hoc ampliores illos meatus, sed reliquo toto corpore densum est: nihil tamen densius, quam quæ antè enumerauimus genera, quamquam lentius, & ex toto pulmoni similis cernitur. Sensum id genus habere, diuq; uiuere inter omnes præcipue conuenit. cognosci præ cæteris spongijs eo facile potest documentum, quod cum illæ albicent limo subsidente, id semper nigrore ostendit. Quod ad spongijs, & testatorum generationem pertinet, res ita se habet.

De locustis, & earum partu tempore, deq; cæteris crusta opertis. Caput XVII



Locustæ inter crustata, quæ per coitum conceperunt, oua gerunt utero tribus mensibus his, Maio, Iunio, Iulio: tum deinde sub aluo in rugas deponunt, qua oua more uermium augentur. quod idem de mollibus etiam, ac de piscibus ouiparis intelligitur: ouum enim omnium ita accrescit. Fit igitur locustarum ouum arenidum in partes octo diductum; singulis enim operimentis, quæ de latere extant, singula quædam cartilaginea iunguntur, quibus oua adherent: totumque quasi species uux conficitur: unumquodque enim illorum cartilagineorum in plura scinditur: quæ si discreueris, patent: sin aspicias, tantum compositum quiddam apparet. sunt maxima, non quæ iuxta meatum, sed quæ media sita sunt. minimaque nouissima continentur. Magnitudo minimis, quanta granis ficuum est. nec meatum ipsum ulla contingunt, sed per medium hærent: utraque enim ex parte, caudam dico, & aluum, bino maxime distinguitur intervallo: sic enim operimenta quoque disposita sunt. Sed quoniam latera ipsa completi satis non possint, addito extremo cuncta teguntur, idque uelut operculum obturat. Videtur prorsus locusta cartilaginosis illis particulis mandare oua, cum enitur, caudam adducens, & protinus comprimens, inflectensque sese, parere. Cartilagineæ uero illæ appendices per id tempus augentur, atque ouorum capaces redduntur, partus enim in ijs recipitur, ut sepiarum in sarmentis, & quamlibet colluione collocatur. locustæ ad hunc pariunt modum. mox ubi ea sui corporis parte intra diem maxime uigilimum oua concoxerint, abigunt uniuersa, conglomerataque ita in idem, ut & foris congesta appareat. Tum ex eo locustæ proueniunt intra diem maxime decimum quintum. & sæpe minores, quam ut digitæ magnitudinem expleant, capiuntur. excludunt igitur oua ante arcturum: abigunt iam concocta, atque absoluunt ab arcturo. Squillæ gibbæ utrumque menses circiter quatuor ferunt, locustæ asperis, saxosisque locis proueniunt. gammari leuioribus ac terrenis. neutrum genus limosa amat: unde fit, ut gammari apud Hellepontum, & circa Thasum gignantur: locustæ circa Sigæum, & Athon. Coniectantur loca aspera, limosa uel piscatores, oris littoralibus, atque alijs id genus indicij, quoties capturam in alto libet exercere. littora potius uernis, hybernisque temporibus expetunt. conferunt se in altum, æstate uidelicet, cum alijs calorem, alijs frigus persequuntur. his etiam quas nomine ursæ arctos appellant, idem pariendi tempus natura statuit, quod locustis: quocirca per hyemem, & Vere priusquam oua excludant, cibo laudantur: cum excluderint, deterrimæ fiunt. Crusta sua, & locustæ & cæteri, tam nuper nati, quam post, exuitur per Ver, quemadmodum angues membrana uernationis, quam senectutem appellant. Locustis omnibus uita diuturnior data est.

De polypo, sepiæ, lolligine, cæteriisque mollibus ouiparis, deq; eorum sectura & partu.

Caput XVIII



Mollia copulatione, ac uenero coitu, ouum concipiunt candidum, quod in dies arenidum, quale illud crustati generis euadit. ardu polypus suum ouum, uel in cubilibus, uel in figulino, uel in quo alio cauo simili labruscæ florentis racemulis, aut fructui arboris populi albæ, ut dictum iam est, pendunt usque per cubile oua tanta fecunditate, ut collectis uas impleatur longe amplius, quam caput sit, quo continebatur. Polyporum itaque ouis diebus post quinquaginta maxime ruptis, polypuli modo araneorum per quam multi exerpunt, quorum natura sigillatim nondum conspicua est, quamquam forma saris tota apparet: sed ob exiguitatem imbecillitatemque copia interit, iam nonnulli adeo spectantur exigui, ut nulla partium consent distinctione, quamuis ad tactum

tactum moueantur. Oua quæ sepiæ ædunt, magnitudinem myrtorum capiunt,
 & nigrescunt. emissio enim atramento parentis inluduntur, atque ita inficiuntur.
 cohærent inter se ad speciem racemi cuncta uni obducta cuidam nexui: nec facile
 alterum detrahi ab altero potest. mas enim humorem quendam mucoris mittit, cuius
 lentore tenaciter oua sibi cohærescunt, ac crescunt. etiam hæc & cum primum ædi-
 ta candida sint, atque exigua, mox atramento perfusa, nigra, maioraq; redduntur.
 Cumq; sepiola iam intus conlitterit, uidelicet tota ex candido oui interno concre-
 scens, tum rupta oui membranula proles exit. primum pars illa interior cædida, ue-
 luti grando consistit, cum foemina suum atramentum asperferit. Nascitur enim
 10 sepiola ex eo ipso candicante corpusculo uersa in caput, modo auium uentre an-
 nexo. Sed qualisnam sit in his annexus umbilici, nondum exploratum habemus.
 Constat tamen candidum illud subinde diminui, dum sepiola augetur: & ad pos-
 simum, ut luteum auibus, sic candidum his aboleri. primum oculi grandes in his
 quoque, perinde ut in cæteris, apparent. Sit ouum a. b. c. oculi. d. sepiola ipsa. e hoc
 ipsum, ferunt uterum sepiæ uerno tempore. Parsunt intra diem decimiquintum.
 mox oua ædita crassitudine acinorum uix minorū, intra diem item decimumquin-
 tum capiunt. quibus abruptis sepiolæ excluduntur. quæ, si quis prius, prole iam
 perfecta obfeciderit oui membranam, sterusculum mittunt, suumq; præ metu co-
 lorem immutant ex candicante in rubriusculum. Sed cum genus omne crustatum
 20 sibi iuncta contineat oua, itaq; foueat, polypus & sepiæ, & reliqua generis eiusdem,
 oua quæ pepererint absoluta fouent, & præcipue sepiæ: quippe cuius serpentes uer-
 ro alueus iuxta terram, dum hoc facit, appareat. Polypus foemina modo incubat
 ouis, modo in ore sui cubilis assidens, brachium super ouis exporrectum tenet. Se-
 pta parit iuxta terram inter algas & harundines, & si quod aggestum tale insectum
 sit, ut farmenta, aut lapides, aut quælibet alia materiei congeries. Et quidem pisca-
 tor de industria falces farmentorum disponit. hæc perlibenter in eis loculamē-
 tis parit prolixam illam, continentemq; seriem ouorum, qualis cirri muliebris spe-
 cies est. enititur, aluum per interualla reprimens, inspergitq; atramentum, interpo-
 sita quiete: utpote, cum non nisi cum labore emitrat. Lolligines in alto pariunt, con-
 30 fertum ijs quoque ouum, quale sepijs est. Viuendi spacium tam sepiæ, quam lolligini breue:
 nam exceptis paucis bimatum nō complent, polypis etiam tantundem
 temporis ad uiuendum datum est. prodeunt ē singulis sepiarum ouis sepiolæ sin-
 gulæ: quod idem in genere etiam lolliginum sit. Inter lolliginem marem & foemina-
 nam hoc interest, quod foemina intestina continet duo, ueluti mammas: quæ si aluo
 disiecta inspectes, facile uideris. Mas omnino ijs caret. Sepia tum hoc idem discri-
 men habet, tum uero quod mas uarius plus, quam foemina est, ut exposui.

De ijs insectorum generibus, quæ aut ex crucis, aut ex uermibus, aut
ex fimo gignuntur. Caput XIX

40



Nesci generis mares foeminis esse minores, ac superuictu coire, uixq;
 absoluti, dictum iam est. Breui a coitu pariunt, maxima sui parte, quæ
 solent coire. Vermem autem omnia faciūt, excepto genere quodam
 papilionum, quod durum quiddam simile cartamo, id est, cnicici semini
 producit, sed intus fluidum. Vermibus uero ipsis non parte aliqua,
 sicut in ouis animal creatur, sed totus uermis accrescit, & particulatim discretus for-
 matur in speciem destinati animalis. Procreantur porò insecta, aut ex animalibus
 generis eiusdem, ut phalangia, & aranei. ex phalangijs & araneis, ut bruci, locu-
 stæ, cicadæ. aut non ex animalibus, sed sponte. alia ex rore, qui frondibus inludat,
 uidelicet uerno tempore, ut natura fert. Sape tamen & hyberno, quoties trans-

quillum, australeq; tempus diutius consistit. Item alia ex coeno, aut fimo putrescente oriuntur: alia in lignis aut stirpium, aut cæsis: alia in animalium pilis: alia in excrementis, aut iam excretis, aut adhuc intra animantem contentis, ut quæ tinea siue lumbrici appellantur, quorum genera tria sunt, latum, teres, & quod ascarida appellatur, ex quo nihil procreari aliud potest. Laum autem milud solum intestino adherens, parit simile cucumeris semini, quo indicio medici genus id lumbrici inesse intelligunt. Nascuntur papilioes ex erucis, eruca ex uirentibus folijs, maximeq; ex brassica. Primum minus quid milio consistit in folio, mox uel miculi inde contrahuntur, & accrescunt, tum intra triduum eruculae afformantur, quæ acutæ motu cessant, suaq; forma immutantur, appellanturq; tantisper chrysalides, quasi aurelias dixeris. duro intestinae putamine sunt, ad tactum mobiles, meatibus araneosis obductæ, non os, non aliud ex membris, quod conspicuum sit, possident, longo post tempore, putamine obrupto euolant inde animalia pennigera, quos papilioes uocamus. Itaq; primum dum erucæ sunt, cibo aluntur, atque excrementum emittunt. At uero cum in aurelias dictas transierint, nihil uel gustant, uel excernunt. Hæc eadem gignendi ratio cæterorum etiam est, quæ ex uermibus consistant: siue ex coitu animalium uermes, seu sine coitu prodire. nam & apium, & crabronum, & uespertum uermes, quandiu recentes sunt & aluntur, tantisper & stercores emittunt. At cum forma liniameta receperint, sub quafacienympha appellantur, iam neque cibum præterea capiunt, neque ullum reddunt alui excrementum, sed coëcti & contracti quiescunt, nec ullo pacto mouere se patiuntur, usq; dum species destinata perficiatur, quo facto euolat proles, rupto, quo continebatur, folliculo. Quinetiam superæ, & aciz dictæ quibusdam eiusmodi alij generantur erucis, quæ uident ingressu. Parte enim innitentes priore contrahunt sese, adducentes posteriorem, arcuatimq; incedunt. Verum quæq; orta, sibi colorem à sua eruca trahunt. Fit ex quodam uerme grandiore, qui ueluti cornua gemina protendit, suiq; generis est, primum toto immutato, eruca: deinde quæ bombyx appellatur. ex quo necydaus, in ualida dixerim, quæ uaria formarum successio, in semestri temporis spacio cõpletur. Ex hoc animalis genere bombycia illa mulieres nonnullæ retorquendo in silum deducunt, deinde texunt, prima texisse in Cōinsula Pamphila Platis filia dicitur. Eodem modo scarabei tauri gignuntur ex uermibus, qui in lignis aridis nascuntur. primum enim uermes ipsi immobiles fiunt, mox disrupto putamine id scarabei genus exit. Blattas in aluarijs gigni apertum est, quæ & ipsæ pennatæ sunt. A silis latiusculis quibusdam bestiolis, quæ in fluijs supernatant, enascitur: quamobrem magna asileum copia circa aquas, ubi id genus bestiolarum est. Erucis quibusdam corpore piloso, non grandi primum, cicindela æ clunium fulgore nomine indito, fiunt non uolucres: quibus deinde mutatis, pennigera animalia gignuntur, quos citros uocant. Culices muliones ex ascaridis, hoc est tipulis generantur. tipulæ serè in puteis, & ubicunque aqua se colligit, terrena subsidente concretionem oriuntur. fit ut principio sex ipsa putrescens color rem candicantem trahat, mox nigricantem, postremo cruentum. talis cum fuerit, minutissima quædam & rubra specie algulæ prodeunt: quæ ad tempus hærentia suæ originis mouentur, deinde absoluuntur, itaq; seruntur per aquam, tipulæ nuncupatæ. rum paucis post diebus erigunt se super aqua dura, atque immobiles, mox disrupto putamine, culex emergit, ac insidet, donec uel sole, uel flatu moueatur & uolet. Commune omnium uermium est, & eorum quæ ex uermibus proueniunt animalium, ut primordium generationis, aut à sole, aut à spiritu præstetur, sed copiosius ac celerius fiunt tipulæ in aquis, quarum sedimentum uarium ac promiscuum sit, quale in agro Megarico in operis solet misceri: putrescit enim hoc fa-

Herm. red-
dit Blattas in
brassicis

ellius, & autumnno quoque uberius generatur; minus enim humoris esse tunc accidit. Rediui gramine oriuntur. Scarabei uirides, galleruæ iam uocari incipientes, uermibus fimo bouis aut iumentis creatis gignuntur. Scarabei pilularij in fimo quem uoluunt, conduntur per hyemem, paruosq; uermiculos pariunt, ex quibus ipsi procreantur. Quinetiam leguminum uermiculis pennata animalia ratione summi prodeunt. Muscæ ex uermiculis fimi digesti in partes gignuntur, quamobrem quæ eo funguntur munere, contendunt reliquum fimi promiscui discernere, etiam confectum concoctumq; esse fimum confirmant. Principium autem uermiculorum ipsorum exiguum est, quod primum rubescit, atque ex immobili quasi hærens adhuc fibris moueri incipit: mox uermiculus immobilis redditur: qui cum postea motus est, rursus immobilis fit: demumq; generat muscam, quæ flatum, aut solis beneficio moueatur. Tabani ex ligno nascuntur. Orfodagnæ, quas mordellas appellem, ex uermiculis immutatis, qui in brassicæ caule creantur. Cantharidæ ex erucis sici, piri, pini, atque etiam sentis caninæ oriuntur: sunt enim in his omnibus uermes. petit genus id animalis fetida, quoniam ex tali materia constitutum est. Vinarij culices ex uermiculis, qui feces uini acescente gignuntur, originem trahunt. Quinetiam in ijs quæ putredinem nullam posse recipere existimantur, nasci animalia nouimus: ut uermes in niue uetustiore, qui hirti sunt pilis, & rubidi, quoniam & ipsa nix uetustate rubescit. sed in niue mediæ terræ canididi, & grandiores inueniuntur. torpent omnes, ac difficulter mouentur. In Cypro insula, ararijs fornacibus, ubi chalcites lapis ingestus compluribus diebus crematur, bestiolæ in medio igne nascuntur pennatæ, paulò muscis grandibus maiores, quæ per ignem saliant, atque ambulent. Emoritur & hoc genus, & illud niuis alumnus, cum alterum ab igne, alterum à niue dimotum est. Nonnulla corpora esse animalium, quæ igne non absumantur, salamandra claro documentum est: quæ, ut aiunt, ignem, inambulans per eum, extinguit. Hypanis fluuius apud Cymerium Bosphorum sub solstitio desert ueluti folliculos acinis maiores, quibus quadrupes uolucres erumpunt: quod genus animalis in postmeridianum usque diu tempus uiuit, & uolat: mox descendente sole macrescit, & languet: deinde occidite emoritur, uita non ultra unum diem peracta: unde ephemerum, id est, diarium appellatum est. Quæ ex erucis aut uermibus gignuntur aranea inuoluta, magna ex parte principio exeunt hæc ita.

De uesperum generatione, & eius tempore, quando etiam insectorum genera quamplurima perant.

Caput XX



40 Espæ autem ichneumones nuncupatæ, quæ minores, quàm cæteræ sunt, phalangia perimunt, occisæq; serunt in parietinas, aut aliquid tale foramine peruium: deinde illiniunt luto, atque ex ijs incubandum suum procreant genus. Nonnulla ex ijs, quorum pennis crusta superuenit, & ex minutis, quæ nomine carent, nidos sibi è luto paruos aut ad sepulchra, aut ad parietinas confingunt, atque in ijs uermiculos pariunt. Tempus generationis à principio ad finem, maximæ fere parti septenarijs ternis describitur, aut quaternis. Culicum, & uermiformis generis parti plurimæ ter septeni attribuitur sunt. Oviparis quater septeni magna ex parte, septem ex ijs ab initu, concretio, & consummatio oui uendicat sibi: reliquis tribus septenis incubant, atque excludunt, ea scilicet quæ suo procreant fœtu, ut araneus, aut aliquid generis eiusdem. mutationes uero & transitus in figuras alias, trinis, aut quadris diebus, parti maximæ peraguntur: sicut in morbis quoque dies decretorius

euenit. Talis insectorum generatio est. Pereunt striatis, contortisq; membris, ut senectute genus maiorum animalium moritur. quæ pennata ex ijs sunt, pennis etiam conuulsis autumno serè moriuntur. Tabaniquidem uel aqua intercure oculorum cæci intereunt.

De coitu & generatione apum, uariæ opiniones.

Caput XXI



E generatione apum uaria sententiæ est. Alij enim eas parere & coire negant, sed deportare sceturam existimant, nec unde portent, constat inter omnes: sed alij ex flore cerinthi, alij ex flore arundinis, alij ex flore oleæ aiunt, argumentumq; afferunt, quod cum oliuarum 10 prouentus sit largior, tunc plura examina prodeant. Sunt qui fucorum quidem sceturam comportari ab aliquo ex ijs, quæ modo dixi, arbitrantur: sed apum generi ortum præstari à ducibus. Quorum duo sunt genera, alterum fuluum, quod præstantius est: alterum nigrum, magisq; uarium. magnitudo ijs duplo, quam cæteris frugi apibus, auctior est. pars à præcincto inferior proportionē sesquialtera adeo longitudinis habetur. uocantur à nonnullis mares, utpote 20 originis autores. argumento referunt, quod fucorum scetus æditur etiam sine duce, apum nunquam. Aliqui per coitum agi opinantur, maresq; esse fucos, sceminas uero apes esse contendunt. Cæteræ in concavis, insc; fauorum proueniunt. Duces subter ad fauum pendentes oriuntur separatiim sex, aut septem, contra quàm cæteræ turmæ scectura adherentes. aculeum apes possident: fucio ea rent. Reges, ducesq; habent, sed non utuntur: quocirca eos carere aculeo nonnulli existimant.

De apum generibus, & earum ducibus, & ætate, deq; fauorum conficiendione, & scedonibus, id est apum sobole.

Caput XXII



Enera apum plura. optimum, quæ breues, uariæ, & in rotunditatem compaciiles sunt. secundum quæ longæ, & uespis similes. tertium qui tur nuncupatur: grandis hic, & aluo est ampliore. quartum fucus præcipua magnitudine, sed nullo armatus aculeo, & ignauus. quamobrem alueis aliquid intexunt, quo apes subire possint: fuci 30 autem ut grandiores, nequeant. Ducum duo sunt genera, ut dictum iam est. Nec unus in quoque examine dux tantummodo est, sed plures: perijq; ipsum examen, si duces uel non satis habeantur (quod non tam principis desiderio, quam ortus, ut aiunt, ad quem illi necessarii sunt, incidit) uel plures quàm satis: distrahunt enim examen. Prouenit scetus apum parcius. Vere serotino, squalore, rubigine. augent porro mella siccitates, sobolem imbres. Vnde fit, ut simul oliuæ, & examinum copia sit. Fauos primum conficiunt, mox collocant scetum ore emittentes suo, ut ijs placet, qui censent aliunde prolis primordia conuehi. deinde cibi causa mellificant, tam æstate, quam autumno. sed melius mel autumnale est. Construunt fa- 40 uos è floribus, ceram ex lachryma arborum fingunt, mella ex rore aëris, syderum exortu potissimum: & arcus coelestis incubitu contrahunt. omnino ante uergiliarum exortum mel non fit. Fauos itaque, ut dictum est, floribus faciunt. mel autem non ipsas facere apes, sed rorem candentem deferre, argumento est, quod uno aut altero die cellas melle repletas inueniunt apiarij. Item autumno mel, posteaquam detractum est, non reparatur, cum tamen illo etiam tempore flores proueniant. sublato itaque melle, & cibo aut nullo extante, aut exiguo, repeterent certe apes munus mellis conficiendi, si ex floribus possent accipere. Crassescit autem mel con- coctum

coctum iam tempore. Initio enim ut aqua dilutum est, & primis diebus sine crassitudine cernitur, quod si exemptum eo tempore sit, crassitudine caret: tum uicissim maxime die spissatur. Indicium perfectionis in sapore potissimum est: dulcius enim, quod crassius. Colligunt apes ex omnibus, quæ florem calicularum ferunt, atque etiam ex cæteris, in quibus dulcedo est, & lingua susceperunt genus id saporis deportant, sine ullo fructuum detrimento. Vindemiantur initio caprifici aluei: tunc enim mellationis terminus est. Schadones autem (sobolem dico) optimæ fiunt, cum mellificatur: aggerunt suis cruribus ceram, atque erithacam, mel ore euomunt in cellas. foetuposito incubant auium more, exclusus inde uermiculus dum paruus est, facit in fauo obliquus. post deinde sua ipse facultate se erigit, cibumque capit: & fauo ita adhæret, ut retineri uideatur. Foetus apum & fucorum candidus est. ex quo uermiculi fiunt, qui in apes, fucosque transeant. Primordium regum colore cernitur fuluo, corpulentia mellis crassioris, magnitudine ilico proxima suæ futuræ soboli, nec primum ex eo uermiculus gignitur, sed statim apīs, ut aiunt, quæ autem parte foetus constitutus sit, mel ibi est regione conficitur. Schadones, si foetus oppressus intercipiatur, truncatæ sine pennis, & cruribus prodeunt. Sed si libere ad finem generationis uenerunt, rupta qua cinguntur membrana, euolant. Stercus quandiu sit uermis, emittit: postmodum non, nisi perfectæ (ut modo dixi) prodierint. si quis capita ipsi demat, priusquam pennas habeant, pro pabulo nimirum apibus sunt. & si fucum adeptis pennis in alueum reicias, ipsæ reliquorum pennas erodunt. Vita apum anni sex, nonnullæ etiam septem possunt complere. Quod si examen nouem, aut decem annos durauerit, prospere actum esse existimatur. Genus quoddam apum in Ponto est candidum ualde, quod bis menses mellificet. Apud Themiscyram circa Thermooentem amnem, apes tam in terra, quam in alueis faciunt fauos, qui parum admodum ceræ contineant, & mel crassius reddant. Fauus ipse leuis atque æquabilis est, quem non semper, sed hybernis temporibus tantum construunt. copia enim in eo tractu est hederæ, quæ hyeme floreat, unde apes mel capiant. ad Amisum urbem conuehitur à locis superioribus mel candidum crassumque maiorem in modum, quod apes faciunt arboribus sine fauo, quale etiam fieri in Ponto cognitum est. Sunt etiam apes, quæ fauos sub terra triplici ordine faciunt: in quibus mel est, uermis nullus. sed nec faui omnes eiusmodi sunt, nec apes ita omnes consingunt.

Erithacæ, quæ
& sandaracæ
appellatur, &
à Dioscoride ce
ranthemos, ex
arborum succo
gigni modo ge
nita, & uerno
rore, unde uer
nigini uulgo
nomen.

De sectura crabronum, & uespærum.

Caput XXXIII



Rabrones & uespæ, si duce amisso aberrauerint, fauos suæ proli constituunt, in sublimi & foraminibus. crabrones in sublimi, uespæ in foraminibus. sed si habeant ducem, sub terra nidificant. Cællis hexagonalis fauos extruunt omnes, ut apes: sed ex materia corticea quadam, & araneosa. longe tamen lautior fauos crabronum, quam uespærum est. Foeturam modo apum instillant ad latus cællarum faui, & parietibus admovent. Verum non in omnibus cællis inest æqualis foetus, sed alijs iam grandiusculus, ut uel queat uolare: alijs in nymphae, alijs adhuc in uermiculo. Excrementum uermiculis tantum, ut & in apum genere est. manet foetus immobilis, cum in nympha est, & membrana uelatur. Paululum mellis quantum gutta, in cællis crabronum est regione proli paratur: Schadones huius generis non Vere, sed autumnio fiunt, & crescunt maxime plenilunio, hæret & foetus & uermiculus non in imo cællæ, sed lateri.

De partu nonnullorum ex genere bombycum.

Caput XXIII

Plin. sic: Nidos
luto fingit salis
specie applicas
tos lapidi, &c.



Nonnulla ex bombycum genere, nidos in acutum exeūtes ē luto quasi illitos, utri specie affigunt lapidi, aut alicui tali, tam crassos, durosq; ut spiculo perforari uix possint. pariunt in ijs, & uermiculos producunt candidos, membrana obuolutos nigra, seorsumq; à membrana ceram in luto faciunt, quæ multo pallidior sit, quàm cera apum.

De coitu & partu formicarum.

Caput XXV



Oeunt & formicæ, & uermiculum pariunt nulli annexum: qui accrescens ex minutulo & rotundo longiusculus fit, formamq; accipit debitam. 10
ortus eorum uerno tempore agitur.

De partu terrestrium scorpionum.

Caput XXVI



Vin & scorpiones terrestres uermiculos ouorum specie pariunt complures, & incubant, mox ut prolem perfecerunt, pelluntur ab ea ipsa, sicut & araneis accidit, & interimuntur à suis liberis magno numero: sit pius enim undenos pariunt.

De generibus arancorum, & eorum partu.

Caput XXVII



Ranei uero coeunt modo quo dictū est. Pariunt uermiculos, qui non ex parte, sed toti in aranei formam immutantur: nam & rotundi iam inde à primo ortu proueniunt. Cum pepererint, incubant, & triduo peragunt. pariunt omnes in tela: sed alij in subtili & breui, alij in crassiore, & alij omnino in sinu orbiculato, alij ita, ut aliquatenus tela obducta proles muniatur. proles autē ipsa non uniuersa producit: ut tamen quicq; exiit, protinus salt, si umq; mittit, humor similis in uermiculis infictu percipitur, atq; in araneis ipsis recens natis, hoc est crassus, & candidus. Pratenfes aranei in tela pariunt, cuius dimidiū applicatum ipsis matribus est, reliquum foris recipit partum, & incubat eadē in tela, atq; uiuificant. Phalangij in rete, quod crassum confecerint, pariūt, atq; incubant. cæteris lautioribus illis partus minoris numeri est. at uero phalangijs admodum numerosus. Cumq; ipsa proles increuerit, matrē amplexa consumit, & eiicit. sæpe etiā patrem si ceperint: adiuuat enim fœminā incubitu. Pariuntur interdum & trecenti eodem utero. consummātur aranei, & iusta sibi recipiunt incrementa diebus quater septenis, à paruo sui ortus initio ad finem.

De coitu & partu locustarum, earumq; etate.

Caput XXVIII



Locustæ eodem coeunt modo, quo cætera insecta, scilicet minore sue perueniente maius. sunt enim in eo genere mares minores quàm fœminæ. Pariunt in terra fixo cauliculo, quo mares uacant: ac uniuersæ, & loco eodem fœtum deponunt, ita ut quasi fauus esse uideatur. hinc uermiculi speciem oui gerentes oriūtur, qui terra quadam prætenut, 40
tanquam membranula ambiūtur: qua dissecta emergunt locustæ, ac euolant. Tam mollis fœtura hæc est, ut ad tactum leuissimum dilabatur, & pereat. Non summæ telluri partus committitur, sed paulo altius, hic concoctione peracta exeunt ex illo terreno amiculo paruæ locustæ, & nigrantes: deinde cute obrupta, maiores statim efficiuntur. pariūt exitu Veris, & statim à partu moriūtur, uermiculis circa collum innascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Mares quoq; eodem tempore obeunt. Vere terra emergūt. Locis motanis aut tenuibus locustæ nō fiunt, sed planis, rimosisq;. pariunt enim in rimis sua oua, quæ durant hyeme, in terra ineunte æstate proueniunt ex fœtu anni superioris locustæ.

Debru

De brucis, & eorum factura.

Caput XXIX



Ar modo, & quos brucos appellant, pariūt: & cum pepererint moriuntur. intereunt oua eorum aquis autummalibus, cum nimis inceserint. At sicco autumnio largior prouetus brucorum est, quoniam minus oua intereant. in normis enim esse uidetur eorū quidem interitus, quin etiam ortus nulla certe agitur ratione.

De generibus cicadarum, & earum coitu.

Caput XXX



10 Cicadarum duo sunt genera: alia enim minores, quæ primæ prodeūt, & nouissime pereūt: alia maiores, quæ canunt, eademq̃ nouissimæ prodeūt, & primæ intereunt. Sunt quæ canunt præcinctu diuiduæ, siue minores, siue maiores sunt. quæ autem non canunt, indiuiduæ constant. uocant nonnulli grandiores illas & canentes argutas: minores mutas. Sed canere uel in secundo hoc genere possunt paululum, quæ præcinctæ prodierint. Nascenti non possunt cicadæ, ubi arbores defunt: quocirca apud Cyrenam nullæ in campo sunt, cum circa oppidum ipsum multæ proueniāt. Oleas maxime amant, ut minus umbrosas. loca enim frigidiore aspernantur: quam obrem in opacis nemoribus esse nequeunt. Coeunt tam maiores, quam minores supinæ complexu mutuo: masq̃ inserit in foeminā, sicut & cætera insecta agunt. Genitale
20 foemina habet rescissum, quo recipit id quod à mare iniicitur. Pariunt in aruis celsantibus, excauantes asperitate præacuta, quam parte habent posteriore: quomodo bruci etiam solo eiusmodi pariunt: quapropter in Cyrenensi agro copia est. Quin etiam in harundinibus, quo ad miniculo uites eriguntur, nidum foeturæ excauant. & in caulibus squillæ herbæ interdum pariunt: sed hic foetus facile in terram dilabitur. Proueniunt large copia imbrum. Crescit primo in terra uermiculus: deinde sit ex eo quæ tetrigometra uocatur, parentis nomine: quo tempore gustu suauissimæ sunt, antequam cortex rumpatur. postmodum circa solstitia noctu exeūt, statimq̃ rupto cortice, prodeunt cicadæ ex matrice illa cicada, quam modo tetrigometram dixi, nigrae protinus, & duriusculæ, & maiusculæ: atq̃ incipiūt canere. mares utroq̃
30 in genere canunt: foeminae silent. & ante coitum mares suauiores sunt: à coitu foeminae, quippe quæ oua candida, gustu habeant grata. excitatæ cum subuolant, quendam reddunt humorem modo aquæ, quo rustici eas mingere, & excremento non carere, roresq̃ alii asseuerant. Si quis digitum contrahens, ac remittens subinde appropinquet, magis expectant, quam si illic extendat: & quidem transire in digitum alliciuntur: quod enim oculis hebetes sunt, quasi frons aliqua moueatur, digitum ita admotum conscendunt.

De coitu, & generibus pediculorum, culicum, cimicum, quæ ut animalium genera hi insistent.

Caput XXXI

40



Væ ex numero insectorū non carne uiuunt, sed carnis uiuæ humore aluntur, ut pediculi, pulices, cimices, hæc per coitum generat ea, quæ lendes uocatur: ex quibus nihil præterea nasci potest. illorum autem generatio talis est. Pulices minima quadam putredine gignuntur, sed demq̃ sui ortus sordes obtinent aridas. Cimices ex humore, qui per summa corporis animalium consistit. Pediculi ex carne, quibus futuris emergunt, ceu pustulæ quædam sine pure exiguæ: quas si pungas, pediculi exeunt. Accidit morbus hic nonnullis hominibus præ nimio corporis humore. & quidem aliquos scorditate obfisse proditum est, ut Alcanem poetam, & Pherecydem Syrium. quibusdam item morborum generibus copia nascitur pediculorum, Genus pediculi

ferum uocatū, est durius, eo quod magna ex parte proueniat, & corpori detrahi difficius. Pueris pediculi in capillo magis, utris minus, omnino sexminā magis quam mares pediculū sentiunt, minus laborant eorum capita, quibus pediculus in capillo est. Quin & ex ceteris animalibus complura pediculo infestantur, ut aues: & phasianā quidem intereunt, nisi se puluerent. omnino quibus penna caule constat, ijs pediculus gignitur. nec ea quibus pilus est, carēt eodem, excepto asino, qui non pediculo tantū, uerum etiā rediuo immunis est. Boues utrunq; id habent. oues & capræ rediuos habent, pediculis uacant. Suis quoddam pediculi grande, ac durum familiare est. Canibus proprium ricinus, qui ab eodem animali nomen cynoraizæ accepit. Genus autē unumquodq; pediculi ex corpore ipso sui animalis enascitur. Proueniunt largius pediculi mutatione aquarum, quibus lauare se solent ea, quorum natura pediculum patitur. In mari etiam pisces hoc malum infestat: uerum nō in piscibus ipsis, sed limo gignitur simile multipedibus aellis, nisi quod caudam hoc ampliusculam habeat. Genus pediculi marinum simplex unumq; est, ubiq; proueniens: sed maxime in foraminibus, & cauernis, insecta hæc omnia sunt, & multipeda, & exanguia. A filis thunnorum sub pinna oritur, specie scorpionis, aranei magnitudine. Maris, quod à Cyrena in Aegyptum panditur, piscis, pediculus nomine circa Delphinum est, qui omnium pinguisissimus sit, pabuli copia, quæ delphini opera suppedatur.

De genere tinearum, quod in lanis procreatur: deq; xilophiboro, quod in lignis: necnon de ficarijs culicibus, quos caprificus generat. Caput XXXIII



Vinetiam aliæ generantur bestiolæ, ut dictum est, tum in lanis, & quibusuis lanitio confectis, ut tinea, quæ lanis puluerulentis præcipue oriuntur: atque etiam magis si araneus una includatur. si quid enim humoris inest, hic absotbens ampliat siccitatem. nascitur & in tunicis hoc idem uermiculi genus. Tum uero in cera uetusta, ut in ligno, animal gignitur candidum, quod omnium animalium esse minimum existimatur, nomine acari. necnon alia in chartis, aut ijs proxima, quæ in ueste, aut scorpionis, sed sine cauda generantur perquam exigua. omnibus prope exierim, uel sicis humescentibus, uel humidis sicciscentibus, creari animal prodest. Nascitur & uermiculus quidā, cui nomen à corruptēdis lignis, xilophthoro, ac si ligniperdi appelles, nullo minus absurdum: caput enim suo putamine exerit uarium. pedes in postremo habet, ut alij uermes. reliquum corpus tunica araneosa integitur, suocq; tegumento hærentes festucas gerit, ita ut forte eas, casuq; sibi contraxisse dum ambularet, uideretur. Verum ipsæ natiuæ inhærēt tunicæ: & ut limacibus testa, sic totum id uermiculo huic adhæret: nec decidit unquam, sed euellitur, ut natiuum. quod si hanc eius tunicam detrahas, expirat, pariq; modo, atque limax, testa detracta hebetescit. processu utique temporis id quoque in aureliam transit, ut eruca, atque immobilitate usuit. Sed quidam ex eo animalis pennati oriatur, compertum nō adhuc est. Ficaros culices caprificus generat suis pomis: sit primum uermiculus, mox rupta cute euolat culex, mutataq; sede, petit ficus immaturas: quibus se insinuans, facit ne decidan. Quamobrem agricolæ appendere ficis caprifici ficus, & iuxta easdem caprificos serere assolent.

De sectura quadrupedum ouiparorum.

Caput XXXIII



Vadripedis autē sanguinei ouipari generis ortus uerno tēpore quidē agitur, sed coctus nō tempore eodē. alia enim Vere, alia æstate, alia circa autumnū coeunt. utcunq; singulis tempus sequens ad prolem commo dius est. Testudo oua durioris testæ, & bicolore ædit, quale ouū auium est:

est: eaq; defossa, & cooperta terra, ac pauita, & complanata incubat, crebrius repetens: foetumq; sequente anno excludit. Mus aquatilis, siue testudo lutaria in terra scrobe effossa doliꝝ amplitudine parit oua, quæ deserit terra obruta, dieq; tricesimo repetit, resossaq; aperit, foetumq; cōtinuò ducit in aquam. Testudines etiā marinæ egressæ in terram, pariunt oua auium corticalium ouis similia: & defossa, coopertaq; incubant noctibus. ouorum numerus maximus est, nam ad centena pariunt oua. Quin & lacertæ & crocodili tam terrestres, quàm fluuiatiles, sua oua terræ gremio committunt. Lacertarum oua sponte in terra aperiuntur: uitæ enim earum annum non cōplere, sed semestrem finire alunt. Crocodilus fluuiatilis oua sexaginta com-
 10 plurimū parit, uiuitq; diu, maximumq; animal, minima hac origine euadit. ouum enim nō maius quàm anseris, & foetus inde exclusus proportionem est. Attamen cre-
 scit ad quadecim cubiter. Sunt qui eum tandiu augeri, quandiu uiuat, cōsistent.

De uiperæ, ceterarumq; serpentium factura.

Caput XXIIII



Ipera est serpēbus una animal ædit, cum intra se oua primum pepere-
 rit. Ouum hoc unius coloris, & molle, ut piscium est. foetus superne
 consistit: nec cortice continetur, sicut nec pisciū quidem. parit catulos
 obuolutos membranīs, quæ tertia die rumpantur. euenit interdum,
 ut qui in utero adhuc sunt, abrosis membranīs ptorumpāt. singulos,
 20 diebus singulis parit, plures quàm uiginti. Ceteræ serpentes oua pariunt foris con-
 texta, ad monilis, hoc est ornamenti mulierum, quod ambit collum, similitudinem.
 incubant quæ pepererint in terra, & foetum sequente excludunt anno.

Leonem. effert
 reddidit, uiginti
 si frē numero.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER SEXTVS,
 INTERPRETE THEODORO.

Aues omnes oua parere, diuersis tamen anni temporibus, nec in ouorum
 numero omnes conuenire.

Caput I



10 SERPENTIVM, & insectorum, atque etiam quadrupedum
 oua parientium generationes fieri ad hunc modū animaduertimus.
 Aues autē oua pariunt omnes: sed tempus coeundi, pa-
 riendiue nō idem omnibus est: quippe cum aliæ coeant & pa-
 riant omni serē tēpore, ut gallinæ, ut columbæ. Gallina enim
 toto anno, præterquam duobus mensibus brumalibus, parit.
 magna etiā generosarum nōnullis fecunditas, quando uel
 sexaginta ædunt ante incubitum: quanquam ipsæ minus fecundæ, quàm ignobiles
 sunt. Item hadrianæ paruo quidem sunt corpore, sed quotidie pariunt, ferociunt ra-
 20 men, & pullos sæpe interimunt. Color his uariis. Nonnullæ etiam ē corticalibus bis
 die pariunt. Iam aliquæ in tantū coplæ prouenerunt, ut effictæ breui morerentur.
 sed gallinæ, ut dictum est, perpetuò pariunt. Columbæ autem, palumbes, turtur,
 uinago, bina pariunt. sed columba uel decies anno: aliæ semel anno, & parcius ge-
 nerant. Agitur maximo auiū numero partus uerno tempore. Sed alijs aliæ fecun-
 dius pariunt. quod bifariam fit, aut enim quia crebrius, ut columbæ, aut quia nume-
 rosius, ut gallinæ. Omnes, quibus unguis aduncl, parcius generāt, excepto tinun-
 culo, qui plurima in adunco genere parit. Iam enim quatuor eius reperti sunt pul-
 li. sed plures etiā posse procreari apertum est. pariunt ceteræ in nidis. Quæ autem
 minus uolant, ut perdices, ut coruñices, non nidis, sed condenso fruce prolem.

muniant. Sic & alauda, & tetrax. sed hæc suum nidum patere aures cupiunt. Quem uero Bœotij meropen uocant, hic unus subiens terræ cauernas, facit cunabula. Turdi nidos ex luto, ut hirundines faciunt in excelsis arboribus, ita deinceps continuato opere, ut quasi catena quadam nidorum contexta uideatur. Vpupa una suo in genere non nidificat, sed stipites arborum subiens, parit sine ullo stramento in cauis. Cuculus saxa & domicilia petit, in quibus nidificet. Tetrax, quam Athenienses uragem uocant, nec terræ, nec arbori suum nidum committit, sed frutici.

De natura & diuersitate ouorum omnium auium, semineq; genitali,
& incubandi officio.

Caput 11



Vum æque omnium uolucrum duro putamine constat, si modo non deprauetur, sed lege consummetur naturæ. Gallinæ enim nonnulla parit mollia uitio. & bicolor quoque ouum auium intus est, luteum interius, album exterius. sed differunt oua aquaticarum a terrestribus, quod multo plus lutei quam albi, ex proportionem contineant. Differunt & colore inter se oua auium. Sunt enim alia candida, ut columbarum & perdicum: alia pallida, ut palustrum: alia punctis distincta, ut meleagridum, & phasianarum. Rubrum tinunculi est modo minij. Quin & ipsum ouum in se suum habet discrimen, quippe quod parte sui acutum, parte latius sit: quæ quidem parte latiore exit, cum gignitur. Quæ oblonga sunt oua, & fastigio cacuminata, foemina ædunt: quæ autem rotundiora, & parte sui acutiore obtusa, orbiculum habent, marem gignunt. Incubitu auium, foetum excludi, naturæ ratio est. non tamen ita solum oua aperiantur, sed etiam sponte in terra, ut in Aegypto obruta fimo pulicem procreant. Et Syracusis potator quidam, ouis sub stria in terra positis, tandiu potabat, donec oua æderent foetum. Iam uero & cum in uasis quibuscumque tepidis essent coniecta, sponte oua pullos prompsere. Semen genitale uolucrum omnium album, ut ceterorum animalium est. Concipit foemina quæ colerit, ouum superius ad septum transuersum: quod ouum primo minutum, & candidum cernitur: mox rubrum, cruentumq; deinde increscens, luteum & flauum efficitur totum. Iam amplius autem discernitur, ita ut intus pars lutea sit, foris candida ambiat. ubi perfectum est, absoluitur, atq; exit putamine. dum paritur, molli: sed protinus durefcere, quibuscumque emergit portionibus, nisi uitio uulue defecerit. Iam quale certo tempore est, tale aliquando prodijt luteum totum, qualis postea pullus est. Gallina etiam discissa, talia sub septo, quo loco foemina oua adherent, reperta sunt, colore luteo tota magnitudine ouis perfecti: quod pro ostento augures capiunt. Nec audiendi sunt, qui oua hypenemia dicta, a uero quasi subuertanea dixeris, reliquias esse partus, quem coitus fecerit, arbitrentur. Iam enim aliquas gallinarum, & anserum iuuenas experies adhuc coitus parere hypenemia uisum sapius est. Sunt hæc sterilia & minora, ac minus iucundi saporis, & magis humida, quam ea quæ secunda gignuntur, sed plura numero. humor eorum crassescere incubatione uis non potest: sed tam candida, quam lutea pars similis sibi perseuerat. Parit genus id ouis plures aues, ut gallinæ, perdicæ, columbæ, pauones, anseres, & quæ ab anseris, & uulpe composito nomine chenalopeces, id est, uulpanferes dictæ sunt. Excludunt celerius incubantes æstate, quam hyeme. Ideo æstate gallinæ duodeuigesimo die foetum excludunt: hyeme aliquando uigesimo quinto. Discrimen tamen & auium est, quod alia magis alijs fungi officio incubandi possunt. si incubante gallina tonuit, oua pereunt. Quæ autem canicularia, & urina a nonnullis uocantur, æstate magis consistunt. Sunt qui hypenemia, hoc est subuertaneos illos partus zephyria nominant, eo quod uerno tempore aues flatus illos foetidos ex fauonio recipere uideantur. sed idem faciunt

clunt etiā si digito in genitale palpetur. Redditur certe ouum subuentaneum illud fecundum: & quod iam conceptum per coitum est, transit in genus diuersum, si prius coitāt, quæ uel subuentaneum, uel semine maris diuersi conceptū fert, quā ouum ipsum a lutea in candidā ambientem partem proficiat. Ita enim fit, ut subuentanea oua secūda reddātur: & quæ inchoata à mare priore sunt, specie posterioris proueniant. At si iam candidum acceperunt humorem, fieri non potest, ut uel subuentanea in fecunda mutantur, uel quæ per coitum concepta celsātur, transeant in genus maris, qui secundus coierit. Incepta quoq; si adhuc paruis desierit coitus, non accrescunt: sed si continuetur, celeri incremento augentur, iustamq; magnitudinem implent. Naturam uitellus oui, & albumen habent contrariam, non tantū colore, uerumetiam uirtute. Vitellus enim spissatur frigore, albumen non, sed amplius humet, contrā albumen spissatur igne, uitellus non, sed mollis perficitur, nisi peruratur, magisq; in aqua seruēte, quā ad ignem cogitur, atq; induratur. Membrana hæc inter se discernuntur. Grandines autem dictæ, quæ initio uitelli adhærent, nil ad generationem cōferunt, quanquam aliqui ita non existimant. has duas esse certum est, alteram parti superiori iunctam, alteram inferiori. Euenit etiam, ut si quis rupto puramine oua plura in patinam coniecit excreta, & coquit igne molli, & continente, uitelli omnes in medium coctant: albumina autem circudent, & se in oras constituant. Gallinarum iuuentæ pariunt primæ, statim Vere ineunte: & 20 plura quā ueteres, sed minora. denique aues, nisi pariant, laborant morbo, atque intereunt. Inhorrescūt à coitu, ac se excutiūt, sæpe etiam festuca aliqua sese lustrant, quod idem & ædito ouo interdum faciunt. Columbæ caudam distendunt, anseres sese aquis ingurgitant. Celeriter magna pars auium & impletur, & oua subuentanea illa concipit, quod uel in perdice percipi potest, eo quod libidine incitatur, tempore, nam si contra marem steterit semina, aura ab eo flante, sit prægnans: atque extemplo inutilis aucupijs. Olfactum enim esse exquisitū perdicibus creditur. Oui generatio ab initu, & pulli rursus ouo concocto prouentus, non pari temporis spacio euenit omnibus: sed pro magnitudine generantis interest. Ouum gallinæ consistit à coitu, & perficitur decem diebus magna ex parte, columbæ paucioribus, 30 cultas columbis retinendi ouis, etiam tempore parturiendi est. Nam si ab aliquo ueretur, aut penna in nido euulsa, uel quauis alia simili re infestetur, aut etiam sponte morosius habeat, ouum per tristitiam retinet, partumq; differt. Peculiare columbis illud etiam est, ut in coitu, nisi antè mutuò osculentur, mas non ascendat, sed iunior sit, an senior, interest: senior enim primum coitum osculo exorditur: sequentem & sine osculo agit. At iunior quoties libet coire, toties osculatur. Igitur hic ritus columbarum proprius est, atq; etiam ille, ut femina saliant, ac supergressu mutuo agant, si mas non sit, & cum osculo, ut mares. & quamuis nihil altera emitat in alteram, tamen plura sic oua, quā ex maris coitu parit. Verum nullus his nascitur pullus, sed sunt omnia irrita. Generatio uero ex ouo omnibus uolucris euenit, modo 40 quidem eodem, sed tempora differunt, ut dictum iam est.

Quot dierum spacio pullus in ouo generetur, deq; eius creationis
nis ordine.

Caput 111



Allinis porro tertia die, ac nocte postquam cœpere incubare, indicia præstare incipiunt. At maiorum auium generi plus prætereat temporis, necesse est. minori autem minus sufficit. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumen, quæ principium oui est: atq; ouum detegitur ea parte, & cor quasi punctum sanguineum in candido liquore consistit: quod punctum saltem, & mouetur, ut animal. Tendunt ex eo meatui

H

uenales sanguigeri duo tortuosi ad unicum ambientem utranque, dum augetur. Membrana etiam fibris distincta sanguineis, iam album liquorem per id tempus circumdat, à meatibus illis uenarum oriens. Paulo autem post, & corpus iam pulli discernitur, exiguum admodum primum & candidum, conspicuum capite, & maxime oculis inflatis, quibus ita permanet diu: serò enim decrescunt oculi, & se ad ratam contrahunt proportionem. Pars autem inferior corporis, nullo membro à superiore distingui, inter initia cernitur. Meatuum, quos ex corde tendere diximus, alter ad ambiendum album liquorem fertur, alter ad luteum uelut umbilicus. Origo itaque pulli in albumine est, cibus per umbilicum ex luteo petitur. Die iam decimo pullus totus perspicuus est, & membra omnia patent, caput grandius toto corpore est, oculi capite maiores hærent: quippe qui fabis maiores per id tempus emineant nigri, nondum cum pupilla. quibus si cutem detrahas, nihil solidi uideris, sed humorem candidum, rigidumque admodum resurgentem ad lucem, nec quicquam aliud. ita oculi & caput. Iam uero & uiscera eo tempore patent, & alui intestinorumque natura perspicua est. Venæ etiam illæ à corde proficiscentes, iam sese iuxta umbilicum constituunt. Ab ipso autem umbilico uena oritur duplex, altera tendens ad membranam ambientem uitellum, qui eo tempore humet, & largior, quam secundum naturam est: altera permeans ad membranam ambientem eam, qua pullus operitur, & eam quæ uitellum, humoremque interiectum continet, dum enim pullus paulatim increfcit, uitellus seorsum in duas partes secatur, quarum altera locum tenet superiorem, altera inferiorem, & medius humor candidus continetur, nec partem inferiorem à uitello liquor deserit albus, qualis antè habebatur. Decimo die albumen exiguum iam, & lentum: crassum, pallidulum nouissimum inest. Sunt enim quæque locata hoc ordine. prima, postremaque ad testam ouis membrana posita est, non testæ ipsius natua, sed altera illi subiecta. liquor in ea candidus est. deinde pullus continetur obuolutus membrana, ne in humore maneat, mox pullo uitellus subiaceret, in quem alteram ex uenis prorepere dictum est, cum altera albumen ambiens petat. Cuncta autem ambit membrana cum humore, specie saniet. Tum uero membrana alia circa ipsum fœtum, ut dictum est, ducitur, arcens humorem. sub qua uitellus alia obuolutus membrana, in quem umbilicus à corde, ac uena maiore oriens pertinet: atque ita efficitur, ne fœtus alterutro humore attingatur. Vicesimo die iam pullus si quis putamine secto sollicitet, mouet intus sese, pipiisque aliquantulum: & iam ab eodem die plumescit, quoties ultra uicesimum exclusio prorelatur. ita positus est, ut caput super crura dextrum ad motum ilibus, alam super caput positam habeat. quintetiam membrana, quæ pro secundis habetur, post ultimam testæ membranam, ad quam alter umbilicus pertendit, euidens per id tempus est, pullusque in eadem iam totus locatur. & altera quoque membrana, quæ ipsa uicem secundarum præstat, uitellumque ambit, ad quem alter umbilicus procedit, latius patet. Oritur umbilicus uterque à corde, & uena maiore, ut dictum est. Fit autem per id tempus, ut umbilicus alter, qui in secundas exteriores fertur, compresso iam animante absoluitur: alter, qui adit uitellum, ad pulli tenue intestinum annectatur. Iam & pullum ipsum multum humorem lutei subit: atque in eius aluo fecis aliquid subsidit luteum, excrementum etiam album eodem tempore pullus emittit, & in aluo quiddam album cõsistit. Demum uitellus paulatim absumitur totus membrorum haustu, ita ut si pullo decimo die post exclusio rescindas aluum, non nihil adhuc uitelli comperias. Umbilico uero absoluitur pullus, nec quicquam præterea haurit. totus enim humor, qui in medio continebatur, absumptus iam est. Tempore autem supradicto pullus dormit quidem, sed non perpetuò, quippe qui excitetur interdum, & mouens sese respiciat, atque

atque pipiat. Cor etiam eius cum umbilico, ut spirātis reflat, & palpitat. Sed autem ortus ad hunc modum ex ovo agitur. Pariunt autem oua nonnulla infœcunda, uel ex ijs ipsis, quæ conceperint coitu, nullus enim prouenit fœtus, quamuis incubitu foueantur, quod maxime in columbis notatum est. Oua gemina binis constant uitellis, qui ne inuicem confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis medium. alijs uitelli contactu mutuo sine illo discrimine iunguntur. Sunt in genere gallinarū, quæ pariant gemina omnia, in quibus animaduersum est, quod de uitello exposui, quædam enim duodeuiginti peperit gemina, exclusitq; præterquam, si qua essent (ut fit) irrita. Cæteris itaque fœtus prodijt, sed ita gemini excluduntur, ut alter sit maior, alter minor; & tandem in monstrum degeneret, qui minor nouissime prouenit.

Genus columbacearum bina oua, uel terna ad summam partem, dec; eius
fecundationis ordine.

Caput 1111



Pariunt magna ex parte bina oua, quæ specie columbacea continentur omnia, ut palumbes, ut turtur. sed complurimum terna, palumbes, & turtur. Columbae omni tempore, ut dictum est, pariunt. Turtur & palumbes Vere, nec plus quam bis: atq; ita, si prior fœtus corruptus est. frangunt enim oua mares autem complures, sed quamuis tria interdū pepererint oua, nunquam plus duobus pullis educunt. nonnunquam etiam unum tantum. reliquum ouum semper irritum est, quod urinum uocant. Aues magna ex parte anniculæ nequeunt generare. Omnes uero cum parere incipere, semper terē oua continent: quanquam in nonnullis facile ob exilitatem uideri nō possunt. Columbae magna ex parte marem & foeminam generant: priorem marem, posteriorem foeminā. & cum pepererint primum ouum, uno interposito die, secundum pariunt. incubant ambo uicissim, interdum mas, noctu foemina. concoquunt, atque aperiunt citra diem uicesimum ouum, quod prius ædiderint. perforant ouum pridie eius diei, quo pullum excludunt: & fouent prolem ambo ad certum tempus, eodem modo quo oua. foemina in opere sobolis acerbior mare est, ut cæteris quoque à partu euenit animalibus. Pariunt decies anno: nonnullæ etiam undecies. Aegyptiæ uero & duodecies. Coeunt intra annum columbae, quippe quæ semestres nosse incipiunt uenerem. palumbes & turtures etiam trimestres coire, fœtificareq; aliqui referunt, argumento quod larga eorum copia est. Gerunt uterum decem & quatuor diebus, ac totidem alijs incubāt, & totidem alijs fœtus ita uoluerit sit, atq; perficitur, ut uix possit apprehēdi. Vita palumbium uel ad quadraginta annos durare existimatur. perdicū amplius quam ad sexdecim, columba citra dies triginta prole expedita superiore, parit.

De nidificatione, & factura uulturis, & hirundinis.

Caput V



Vltur nidificat in excelssimis rupibus: unde fit, ut raro nidus & pulli uulturis cernantur. Quodcirca Herodotus Brysonis rhetoris pater, uultures ex diuerso orbe nobis incognito aduolare putauit, argumento, quod nemo nidum uidisset uulturis, & quod multi exercitum sequentes repente appareant. sed quanquam difficile nidum eius alitis uideris, tamen uisus aliquādo est. Pariunt uultures oua bina. cætera quæ carne uescuntur, non plus quam semel anno parere exploratum est. Hirundo una bis anno nidificat. pullorum hirundinis adhuc recētium oculi, si quis stimulo eos uexarit, resanescunt: & cernendi uim posica planē recipiunt.

H 1

De aquilæ genere, & ſectis: deq; anſeris, accipitris, milui, & corni partu. Cap. VI



Quilæ oua pariunt terna: ſed pullos binos excludunt, ut ex uerſu, quemad Muſæu referūt autorem, cōſtat. Excludit binos, addit terna, educat unum. Sed quamuis magna ex parte ſic fiat, tamen & tres uiſi aliquando ſunt pulli. Alterum in educando expellunt tædio nutriendi: nam & degenerare ac hebetefcere aquila dicitur, eo tēpore, ut ſœtus ferarum rapere nō queat: nomenq; hinc exaētī, hoc eſt degenerantis aquilæ accipit. unguis etiā eius inuertitur diebus paucis, & pennæ albeſcunt, ut meritō ſuos oderit partus. ſed pullum eiectum oſſifraga excipit, atq; educat. incubat aquila tricenſ diebus, & cæteris quoq; magnis alitibus tempus incubandi tantundem à natura ſtatutum eſt, ut anſeri, ut tardæ. mediocribus uiceni perſiciūt incubationem, ut accipitri, ut miluo. Pariunt milui bina magna ex parte: interdum tamen & terna, totidemq; excludunt pullos. ſed qui ætoliu nūcupatur, uel quaternos aliquādo excludit. Coruus quoq; non modo bina, ut aliqui uolunt, parit, uerum etiam plura. Incubat autē uiginti diebus, & pullos nido expellit. quod idem & aliæ complures uolucres faciūt. quibus enim partus numeroſior eſt, unum ſæpe eſciunt. Genera aquilarum nō æque omnia prolem ſuſtidiūt: ſed difficilior in alendo una, cui nomen pygargo cauda albicans dederat. benignior, quæ tota nigricat colore, nam omnes ferè alites, quibus unguis aduncus, pullos cum primū prouolandi facultas fuerit, nido expellunt, percutientesq; cogūt diſcedere. & cæteræ quoq; aues maxima ferè ſui parte, ut dictum eſt, idem hoc faciūt. cumq; enutrierint, nihil præterea adhibēt curæ, excepta cornice, quæ aliquādiu prouidet. quippe quæ uolantes iam ſuos pullos paſcens ipſa comitetur.

De cuculi natura, & eius partu.

Caput VII



Vculus ex accipitre fieri immutata figura à nōnullis putatur: quoniam quo tempore is apparet, accipiter ille, cui ſimilis eſt, non aſpicitur. ſed ita ferè euenit, ut ne cæteri quidem accipitres item cernantur, cum primum uocē emiſit cuculus, niſi perquam paucis diebus. Ipſe autē breui tempore æſtatis uiſus, hyeme nō cernitur. eſt hic neq; aduncus unguibus, ut accipiter, neq; capite accipitri ſimilis: ſed ea utraq; parte columbum potius, quàm accipitrem repræſentat. nec alio, quàm colore imitatur accipitrem, niſi quod accipiter maculis diſtinguitur, ceu lineis: cuculus uelut punctis. magnitudo atq; uolatus ſimilis accipitri minimo, qui magna ex parte per id tempus non cernitur, quo cuculus apparet. nam uel ambo una uiſi aliquando ſunt. Quinetiam ab accipitre interim cuculus uiſus eſt, quod nulla auiſ ſuo in genere ſolet facere. pullos cuculi nemo ſe ait uidiſſe. parit tamen, uerum nō in nido quem ipſe ſecerit, ſed interdum in nidis minorū auiū: & oua quæ aliena reperiſt, edit. maxime uero nidos palumbum petit, quorū & ipſorū oua eſu abſumens, ſua relinquit. parit maiore ex parte ſingula oua, raro bina. Curuæ quoq; in nido parit. fouet illa, & excludit, & educat. quo quidē præcipue tempore & pinguis, & grati ſaporis pullus cuculi eſt. Pulli etiam accipitrum ſuaues ualde, pingueſq; efficiuntur. Genus eorum quoddam nidos facere procul in petris excelsis, præruptisq; aſſolet.

De auium incubitu, quo ſe tempore mas, quo item ſcæmina incubet.

Caput VIII



Incubat magna auium pars (ut de columbis retuli) ſcæminæ mare ſue cedente. aliqui mares incubandi munus tantisper ſubeunt, dum ſcæminæ intermiſſo incubitu cibum quærunt. Anſerum ſcæminæ tantū incubant, quæ ut cœperūt, nunquam intermittunt, ſed perpetuo ſouent incubitu. Aquaticæ omnes iuxta paludes, & locis herbâ habitibus

tibus nidos faciunt: quo fit, ut uel occupata negotio incubandi, possint sumere cibum, nec omnino inedia laborent. Cornicum etiam foemina tantum incubant, assidueque in opere perseverant, mares his cibum suggerunt, pascuntque incubantes. Palumbium foemina incubat à pomeridiano incipiens, totaque nocte, & usque ad tempus ientaculi perseverans: reliquo tempore munus idem mas subit. Perdices bina ouorum receptacula faciunt: in altero foemina incubat, in altero mas: excluditque sua uterque, & educat. Pulli etiam ipsi subiguntur à mare statim cum procedunt.

De pauone, & eius foetu, quotiesque in anno pariat, deque auium testibus, qui coitus tempore grandiores efficiuntur. Caput IX

- 10 **P**AUO uixit annos uiginti quinque, parit maxime à trimatu, & colores pennarum uarios recipit. excludit diebus tricenis, aut paulo tardius, semel tantummodo anno parit oua duodecim, aut paulo pauciora, nec continuatis diebus, sed binis ternis uel interpolitis. primipara octona maxime adunt. Irrita & subuentanea illa pauones etiam pariunt. Coeunt Vere: & paritus breuit à coitu agitur. Amittit pennas, cum primis arborum frondibus: recipit cum germine earundem. Gallinis subiiciunt incubanda oua pauonia, quoniam mas dum foemina incubat, aduolans ea frangat, quam ob causam & syluestres nonnullae aues pariunt fugientes marem, & incubant. Subiiciuntur maxime bina, cum plura suo incubitu nequeant aperire. curaque adhibetur ut cibis assit, ne desiderio eius discedens, gallina intermitrat fouendi operam. Testes auium grandiores effid tempore coitus certum est. sed salaciorum conspectores sunt, ut gallinaceorum, & perdicum: temperantiorum minus. Aues ad hunc modum coeunt, gestant, & pariunt.

De piscium foetu, eiusdemque inter eos diuersitate, & uuluae forma. Caput X

- P**ISCES haud omnes parere oua dictum iam est. genus enim cartilagineum animal generat: reliqua oua pariunt, sed nec cartilagineis quidem foetus sine ouo. Pariunt enim intra se oua, & augent, atque excludunt, praeterquam raia. Vuluas etiam pisces habent diuersas, ut dictum est. nam qui pariunt oua, bifurcatas habent, atque inferius positas, cartilaginea uero ea specie potius habent, qua aues, sed interest, quod oua non iuxta praecordia omnibus, sed infra nonnullis per spinam consistunt: unde aucta in alium transferuntur locum. Ouum piscium non bicolor, ut auium: sed unicolor omnium est, & plus albi trahens, quam lutei, tam ante, quam postea, cum foetus insidet. Differt piscium generatio ex ouo ab auium generatione, eo quod altero caret umbilico, qui ad membranam testem subditam tendat: alterum enim tantum, qui a uibus ad uentrem fertur, habet meatum. Caetera idem ortus ex ouo auium, & piscium est: quippe cum & foetus in extremo ouo nascantur, & uenae similes ex corde inter initia proficiantur: & caput, oculi, denique partes superiores principio fiant praegrandes, crescente etiam foetu, humor pari modo subinde absumitur: demumque nihil superest, quod non foetum subierit, sicut de uitello auium expositum est. Quinetiam umbilicus paulo à uentre inferius haeret, qui recens natis longior sit, crescentibus paulatim breuior reddatur, demumque se totum intra foetum recondat, ut dictum de auibis est. Membrana quoque eadem ouum, & foetum continet, cui membrana altera foetum per se contra mens subiaceat. humor autem inter membranas positus est. Ad haec, cibus in aluo suggeritur, eodem modo pisciculis albus, quo auium pullis luteus. Figura uuluae ex dissectione petenda est. Discrimen autem inter se ipsi pisces ostendunt, ut mustelini, qui tum inter se, tum etiam à planis ratione uteri differunt. nonnullis enim medio uuluae circa spinam oua adherent, quemadmodum dictum est, ut caniculis, quae cum adcreuerint, absoluta fertur per uulvam bifurcam, annexamque ad pra-

cordia, quomodo & cæteris generis eiusdem in utraq; partem transferuntur. habet tam eorum, quam cæterorum mustelini generis uulua paulò à præcordiis inferius, ueluti mammas albidas, quæ non nisi grauidis habeantur. Caniculæ & raiz, testacea quædam gerunt, in quibus humor ad oui similitudinem cõsistit. figura eius testæ similis tibiærum ligulis est: meatusq; fiunt capillamentorum specie in testis, sed caniculis, quas aliqui ab hinulo nebrios mustelos appellant, foetus rupta dilata p̃saq; illa testa proueniunt. Raizs cum pepererint, rupta testa excluditur foetus. sp̃s naces uero musteli, sic à spina, quam habent, nuncupati, oua ad præcordia continent super mammas: quibus ut descenderint, iam absolutis, foetus innascitur. Idem hic generandi modus & uulpeculis est. Musteli autem leues uocati, oua per uuluam 10 mediam, ut caniculæ gestant: quæ postea in utruq; uteri sinum descendunt. mox animal gignitur umbilico hærente ad uuluam, ita ut ouo absumpto, partus non aliter, quam in quadrupede contineri uideatur, adhæret umbilicus ille prolixus, capite altero ad partem uuluz inferiorē, ueluti ex acetabulo annexus: altero ad medium foetum, qua in parte iecur est. Cibum si resecas, foetum ad oui similitudinem uideris, etiam si non præterea ouum habeat. Secundæ, membranzq; singulæ foetus singulos modo quadrupedum continent. Caput prolis in utero nouæ, adhuc partem spectat superiorem. auctioris iam & perfectioris inferiorem uersus transfertur, mares in læua, foeminae in dextra ingenerantur: atq; etiam parte eadem una foeminae, & mares, uiscera etiam foetus habet, ut iecur: perinde atq; in quadrupede magna, 20 cruentaq; resecto cernuntur. Omnia cartilaginea simul & oua parte superiore circa præcordia continent complura, alia maiora, alia minora, & in inferiore animalia iam exclusa. unde sit, ut genus id piscium sapius mense & pariat, & coar: quippe quod non uniuersa adere soleat quæ conceperit, sed particulatim repetens sarpe, & diu peragens, ut dum superius oua contrahit, inferius coquat, atque perficiat. Cæteri musteli foetus suos & emittunt, & recipiunt intra seipsos. quod idem & squatinæ, & torpedines faciunt. & quidem iam uisa torpedo est grandis, quæ foetus intra se circiter octoginta haberet. Sed spinax unus ex mustelis recipere prolem spinæ impedimento non potest. neque uero pastinaca & raia ex planis recipiunt propter caudæ asperitatem. Raia etiam suam non recipit sobolem, tum capitis magnitudine, tum aculeorum impedimento. nam ne animal quidem una hæc pa- 30 rit, ut dictum est. Discrimen, quo hæc inter seipsa discrepent, & generatio ex ouo ad hunc modum est.

De affluentia genitalis seminis in piscibus maribus sætus tempore, quomodoq; differant genitales meatus maris, & foeminae: deq; cartilagineorum partu. Caput XXI



Ares autem piscium tempore coitus, meatus plenos seminis genitalis ita habent, ut attritu facile semen ipsum effluat candidum. meatus hi à præcordiis, uenæq; maiore oriuntur bifurces. Patentq; eo tempore etiam imperitis, scilicet incremento seminis, & turgentis fastu lib- 40 dinis. interdum enim, ac nonnullis admodum incerti redduntur, ut de testibus in auium genere expositum est. Differunt inter se meatus genitales maris & foeminae, tum alijs rebus, tum etiam quod maris lumbis inhaerent firmius: foeminae mobiles sunt, & membrana tenui continentur. sed hæc quemadmodum se habeant, ex descriptione dissectionum consideranda sunt. Superfoetant cartilaginea genera, & ferunt uterum mensibus complurimum senis: sed sapissime qui ex mustelis stellares uocantur, quippe qui mense bis pariant. initium autem coitus mense Septembri est. Cæteri musteli bis anno pariunt, excepta canicula, quæ semel, omnia in Vere hæc pariunt. Squatina etiam autumno, occasu uergiliarum, qui

qui partus secundus est. primus enim uerno sit tempore: sed secundus felidor est. Torpedo circa autumnum. Repetunt cartilaginea litus & uada, pelago & alto relicto gurgite, cum tempus pariendi instat, ut neque tepore carcant, & progeniem tutius collocent. Piscium cæterorum diuersa genera coire uisum à nemine est. Squatinam solam & ratam hoc facere creditur, argumento piscis cuiusdam, qui nomen ex utroque compositum trahit rhinobati, quasi squatinoraiam appelles. est enim parte priore ratæ similis, posteriore squatinæ, tanquam ex eo utroque proueniens genere. Musteli igitur, genusq; omne mustelinum, ut uulpecula, ut canis: & plañi. ut torpedo, ratæ, leuiratæ, pastinacæ, modo quo diximus gignunt animal, cum
10 intra se oua pepererint.

De partu, & pullorum numero piscium uiniparorum, delphino, balenæ, iutulo marino, & reliquis, quæ cetæ appellantur.

Caput XII



Elphini, balenæ, & reliqua cetæ, quæ non branchias, sed fistulam habent, animal generant. Additur ijs prius, & bos, nullum ex ijs enim oua habere cernitur: sed statim foetum, ex quo redactio in formam animal constat: quemadmodum homo & quadrupedes, quæ animal partunt. Delphini singulos magna ex parte ædunt: interdum tamen & binos. balenæ uel binos complurimum, magnaq; ex parte uel singulos procreant. idem & phocænæ, id est tursioni, partus, qui delphino similis est, nascens in Ponto. sed interest, quod minor tursio est, dorso ampliore, colore cæruleo. Complures eum genus esse delphini opinantur. Spirant quæ fistulam habent omnia, & recipiunt aërem: haud enim carent pulmone. & quidem uisus delphinus est dormire, rostro emerso, ac stertere. lac & delphinus habet, & tursio, quo suos nutriunt foetus, gestantq; eosdem infirmos infantia. adolescit celerius proles delphini, quippe quæ annis decem ad summam perueniat magnitudinem. gestatur utero decem mensibus. partus delphinis æstate, nec ullo tempore alio. Fit etiam ut delphini tricenis diebus occultentur, & lateant circa ortum canis syderis. adultos etiã foetus diu comitantur. Magna erga gnatos charitas in hoc animali est. uiuit annis com-
10 pluribus. Constitit enim nonnullos uixisse annis uiginti quinque, alios etiam triginta. quod cognitum est, præcisa à piscatoribus cauda, ut quos ita reddidissent mari, captos item agnoscerent, & temporis spacium scirent. Vitulus marinus generis ambigui est: nam & mari degit, quanquam humorem non recipit, sed spirat, ac dormit, & egressus in terram parit in litore, ut terrestre. sed quoniam plus temporis mari, quam terra immoretur, cibumq; ex humore petat, ideo in aquaticis de eo narrandum est. Ergo hic animal & concipit statim intra se, & parit: secundas quoque emittit, & lac reddit modo pecudum. parit singulos, aut geminos, & complurimum tres. mammis, quas geminas habet, educat foetum ritu quadrupedum. parit ut homo omni tempore: sed maxime cum primis capris. prolem circa duodecimum diem à partu deducit in mare, subinde assuefaciens. illa declinuis fertur, nec ambulat, cum nondum inniti suis pedibus ualeat. colligere seipse uitulus & contrahere potest: carne enim abundat, mollisq; est, atque ossibus cartilaginosis constat. interficitur difficulter, nisi elisis temporibus capitis: corpus enim totũ carnosum est. mugitus ei in somno. genitale foeminae simile ratæ est.
omnia uero id genus muliebris sexus similitudinem referunt.

Generatio, partusq; aquaticorum, quæ animal, uel intra se, uel foris pariant, ita agitur.

De partu piscium ouiparorum, deq; sexus facimine, & maris discrimine. Caput XIII



Pisces autem qui oua pariunt, uulua bifurcam, ac inferius positam habent, ut dictum est. Pariunt oua omnes, qui squamis teguntur, ut lupus, mugilis, etelis, & qui cādidī appellātur, & qui laeues, praterquam anguilla. ouum ipsum arenidum est. quod est uero cōtinetur, tamen detectum, & per seipsum constare uidetur, quia tota uulua ouis referta est. itaq; sit, ut in paruis quidem pisciculis oua tantummodo gemina esse uideantur: nam ob tenuitatē exiguitatemq; uulua incerta in ijs est. De coitu piscium satis dictum iam est. Sexu autē eos quoq; distinguit apertū est. Pars enim piscium maxima consummat mare & scemina. De rubelione & hiatula ambigit. omnes enim grauidæ capiuntur. consistunt itaq; oua per coitum, in ijs qui uenerem norunt: sed non coitu tantū, uerum etiā sine coitu. quod argumento constat nonnullorum fluuiatiliū; nam phoxini statim, propē dixerim, cum naui sunt, & admodū parui, adhuc oua habent. spargunt sua oua omnes, & magnā ouorum partem (ut narratur) mares deuorant: alia pereunt in humore. Quæ autem locis opportunis ædita sint, hæc seruantur. nam si omnia seruariētur, nimia cuiusq; generis esset copia, nec uero hæc omnia secunda locatur, sed ea certe, quibus ædis mas semen asperferit genitale. sub partu enim mas sequens, semen ouis aspergit: & quæ uitale id uirtus contingerit, ijs pisciculi enascuntur. cæteris prout fors tulit, euenit. hoc idem & in mollium genere fit. mas enim sepiæ, oua quæ scemina ædiderit, persequitur, suum semen aspergens. quod uel in reliquis eiusdē generis fieri ratio est. Verum non nisi in sepijs hoc uisum adhuc est. Pariunt iuxta littora gobiones, suaq; oua lapidū amplexibus mandant, latiuscula, & arenida. Idem & cæteri faciunt, quoniā littora & tepidiora sunt, & tuuora, ne foetus a maioribus absumantur. cibum etiā præbent uberius, unde fit, ut in Ponto circa Thermodoontem annē plurimi pariant: est enim is locus tranquillus, tepidus, & aquarum dulcium copiosus. Pisces qui oua ædunt, semel pariunt annō: prater fucas pusillas, quæ bis pariunt anno. Differt hic in genere mas a scemina, quod nigrior, & squamis amplioribus est. Cæteri pisces oua eodem foramine uulua ædunt. Qui autem acus uocatur, unus tempore pariendī utero delitescente oua emittit. habet enim hic rimam quandam sub uentre imo, ut cæciliæ serpentes. a partu autē uiuit, & uulnus callefcit. Generatio ex ouo similis agit modo, siue intus, siue foris est ouum. summo namq; ouo innascitur foetus membrana obducta. oculi primum patent grandes, & in globi speciem affor mati. quare constat non similiter gigni, atq; ex uermibus, ut quidam putarunt. contrā enim in illis euenit, ut pars inferior maior inter initia sit, oculi & caput postea augeantur. ouo autem rupto, foetus uelut nucleus constat, qui primum nullum accipit cibum, sed ouis humore iam hausto increscunt. post nutriuntur aquis dulcibus fluuiorum usq; dum satis augeantur. Desertur ex Ponto in Hellepontum purgamentum quoddam fluius maris, quod algæ nomine phycos appellant, colore pallidum. florem algæ id esse aliq; uolunt, atque ex eo fucariam algam provenire. fit hoc æstatis initio, cōq; tum ostrea, tum etiam pisciculi eius loci aluntur. Purpuram quoque suum florem hinc trahere nonnulli existimant.

De partu & generatione piscium lacustrum, fluuiatiliūq;.

Caput XIII



Acustres & fluuiatiles pisces quinto suæ ætatis mense uterum gestare magna ex parte incipiunt. pariunt omnes intra annum, nec semen generationis simul omne emittunt, sed modo marinorum. hic quoque semper intra se aliquid plus minus sceminae ouorum, mares liquoris prolifici retinent. pariunt temporibus æstatis. Cyprini quinquies, aut sexies

sexies anno, partumq[ue] syderum ratione potissimum faciunt. erica ter, reliqui semel
 ædunt oua, in stagnis fluuiorum, & arundinetis lacuum, ut phoxini, & percæ. Si-
 luri & percæ continentem emittunt suū foetum, ut ranæ. adeo enim foetus ipse con-
 tinuo sili sibi coheret, ut percæ quidem, quoniam latior est, piscatores in lacu arun-
 dine glomerent, pariunt siluri grandiores stagno altiore, quippe cum nonnulli uel
 trium passuū altitudine pariant. minores breuiore contenti sunt gurgite, præcipue
 ad radices salicis, aut cuiusuis arboris. atq[ue] etiā inter arūdines, & algas, & muscolam
 congeriem, non solum pares cum paribus, sed etiā admodum grandes cum paruis
 ueniunt: admotisq[ue] meatibus, quos aliqui umblicos uocant, foemina ouum, mas li-
 quorem uenereum depromit, & oua, quæ liquor ille uitalis contigerit, candidiora
 extemplo cernuntur, maioraq[ue] reddi eodem die propemodum dixerim. Paulo au-
 tem post oculi foetus existunt cōspicui, qui in quouis piscium genere perinde ut in
 cæteris animalibus statim patefcunt, prægrandesq[ue] apparent. Quæ ex ouis non at-
 tigerit liquor masculi ille uitalis, hæc sterilefcunt, & superuacua sunt: ut in marino
 etiā genere incidit, foecundis iam ouis pisciculo increfcente, detrahitur uelut pu-
 tamen, quod membrana est ouum ambiens, & pisciculum. oua tacta à foetifico ma-
 ris semine, admodum glutinosa reddūtur, ad celspites coeuntia, aut ubi pepererint.
 Mas oua quæ ædita sunt, custodit: foemina abire cum depererit. Tardissimum siluri
 incrementum ex ouo est: quamobrem mas sæpe uel quadraginta & quinquaginta
 diebus assidet, custodiens oua, ne à piscibus occurrētib[us] absumātur. Secundæ est
 tarditatis generatio cyprinorum: pariq[ue] modo oua ædita à mare seruantur. At mi-
 norum nonnulla, uel tertio die speciem pisciculi capiunt. augētur oua, quæ semen
 maris attigerit, ut dictum est: & eodem die, & post, fit ouum siluri, quantū erum
 cyprini & reliquorum generis eiusdem magnitudine milij. hæc ad hunc modum
 pariunt atq[ue] generant. Erica gregatim sua oua gurgit altiori mandar congesta. con-
 trā, quem fullonem appellant, is littora petit tranquilliora, sed is quoque gregalis
 est. Cyprinus, balerus, & cæteri serè omnes uadis intrudūt sese cum parturiūt. ac sæ-
 penumero singulas foeminas mares tredecim, & quatuordecim persequunt. Mox
 foemina oua procedēdo emittit. mares sectantes semen suum, ouis respergunt: ue-
 rum plurima pereunt. quod enim foemina non stabilis, sed mutans continue parit,
 dissipari oua necesse est, uidelicet ea, quæ non in materiem inciderint aliquam, sed
 excepta ab unda ferantur. neque est enim qui sua oua custodiat, excepto siluro, &
 cyprino. sed cyprinus tunc ea custodit, cum cōgesta repererit. Habēt mares omnes
 semen genitale, præter anguillam, quæ neutrum neq[ue] ouum, neq[ue] semen sortita
 est. Ascendūt de mari in lacus & fluuios mugiles. contrā, anguillæ inde in mare ue-
 niunt. pisces maxima quidem ex parte ouo gignuntur, ut dictum iam est.

De generibus piscium. quæ uel limo, uel arena, uel spuma maris ex imbre
 excitata procreantur. Caput XXV

40



Ed sunt qui & limo, & arena proueniūt, etiā ex ijs generibus, quæ
 per coitum, & oui primordio generentur. quod tum alijs locis palu-
 stribus, tum uero apud Gnidū factū olim memoratur. Stagnis enim
 sub canis ortu resiccatis, & limo iam arido, ubi primum imbris res
 stagnare loca inciperent, pisciculi nascebātur generis mugilum, quod
 per coitum procreatur, magnitudine haleculæ paruat: nec in his aliquid uel oui, uel
 seminis continebatur. Quinetiam in nonnullis Asiæ amnibus, quæ effluunt in
 mare, pisciculi quidam magnitudine naricarum modo eodem proueniunt. Sunt
 qui omne mugilū genus sponte oriri opinentur: sed non recte: nam & oua, eorum

In 1780, id est
 n. 1780. id est
 n. 1780. id est
 n. 1780. id est

fœminæ, & semen genitale mares habere cernuntur. Verum genus quoddam eorum est, quod non coitu, sed ex limo, arena uel enascatur. Sed nonnulla uel sponte generare, ex ijs quæ per coitum prodeant, satis ex ijs constat, quæ autem nec ouum, nec animal pariant, ijs ortus uel ex limo, uel ex arena, & per summa facta putredine agitur: qualis etiam apuæ origo spuma nuncupata ex terra arenosa consistit. quod quidem apuæ genus nec incrementum capit, nec prolem affert, & temporis longioris spacio perit, sed denuò nascitur. unde fit, ut breui quodam tempore excepto, omnibus ferè anni temporibus generetur: quippe cum spuma illa ab archiuro autumnali ad Ver usque eduret. effertur id pisciculi genus funditus de terra, argu-
mentū est, quod nisi tempore tepido non capiatur, utpote quod de humo ad sum-
ma, teporis gratia ueniat. Quin & solo agitato, detractaq; eius colluione, copio-
sior & melior exit. cætera apuæ genera deteriora propterea sunt, quia citò augen-
tur. Fiunt locis umbrosis, apricis uel, quoties temporis beneficio solum tepescit: ut
in Attica terra apud Salaminem, & iuxta Themistocæum, & in Marathonæ. lo-
cis enim huiuscemodi spuma illa cõsistit, & tempore tali apparet: sed nonnuscquam
uel cum aqua de cælo incessit, oritur pisciculus hic in spuma, quæ imbre admissio
caluerit, unde nomen spumæ accepit. ferturq; interdum per summa maris, cum
cælum tepidum est, & in spuma fluitante, perinde ac in limo uermiculus uoluitur.
Quamobrem in loca cõplura genus id apuæ adfertur ex alto, & copiose quoq; ge-
neratur, & capitur anno quieto & humido. Reliqua apua fœtura piscium est. quæ
enim gobionaria dicitur, gobiones paruos ignobiles, qui terram subeunt, creat.
quam uero phalericam uocant, membradas gignit: ex quibus sardinæ, ex sardinis
sardæ oriuntur. Genus apuæ, quod in portu Atheniensium nascitur, èncraulos
dictos progenerat. quinetiam genus aliud apuæ est, quod alecum, & mugilum sit
fœtura. Spuma autem altera illa sterilis humida est, breueq; (ut dictum est) tempus
edurat. mox capita & oculi restant. sed iam piscatores quemadmodum deportare
possent, inuenerunt. sale enim aspersa, plus temporis asseruari potest.

Encraicholos
reddidit anti-
quus interpret:
& ita Hesychi
ui habet.

De procreatione anguillarum.

Caput XVI



Anguillæ nec per coitum procreantur, nec pariunt oua. nec uero ca-
pta unquam aliqua est, quæ aut semen genitale, aut oua haberet.
Meatus quoque uel semini, uel uulvæ accommodatos, nulla rescissa
ostendit. Sed hoc unum inter sanguineâ genus totum sine coitu, si-
ne ouo procreatur. quod ita esse argumento constat, quod in non-
nullis feculentis stagnis aqua omni exhausta, & limo detracto, anguillæ denuò ge-
nerantur, ubi aqua accesserit pluuiæ: nam siccis temporibus gigni nequeunt, etiam
in lacu perenni: quippe quæ imbre & uiuant, & alantur. sed hoc genus non coitu,
non ouo creari apertum est. Videntur tamen nonnullæ habere facultatem gignen-
di, quod in aliquibus lumbriculi fiant: his enim generari anguillas creditur: quod
error est. sed certe ex his prodeunt, quæ terræ intestina uocantur, quæ sponte in lu-
tò, humescenteq; humo proueniunt. Iam alix absolutæ ex his uisæ sunt, alix scala-
ptis, discerpentisq; intus apparuerunt. oriuntur hæc intestina dicta, tum in mari, tum
etiam in fluuijs, stagnisq; putredinis maxime ratione: sed in mari, qua
algæ sunt: in stagnis autem & fluuijs iuxta ripas. calor enim
amplius eas subiens partes, facit, ut putreant.
Talis generatio anguillarum est.

De ute-

De utero, & tempore partus aquatiliū, quomodoq; alterum ab altero
in foetibus emittendis differat.

Caput XVII



Artus autē piscium neq; eodem tempore, nec simili modo omnium
sit: nec pari temporis spacio geritur uterus. greges ante coitum ma-
rium, & foeminarum consistunt: sed sub coitu & partu cōiugia agun-
tur. Vterū uero alij diebus amplius tricenarij serunt, alij minus, omnes
tamen spaciū numeris distinguendū septenarijs fortūitur. Plurimum
temporis datur ijs, quos nōnulli appellāt marinos. Sargus coit mense Decēbri, fert
uterū dies triginta. quinetiā in mugilū genere, qui labeo à nōnullis uocatur, & mu-
co, eodem quo sargus tempore coeunt, & tantundē temporis ferūt, laborāt omnes
per id tempus, quo gerūt uterū. Vnde sit, ut tunc potissimū ruant in terrā, atq; ex-
dant, ferūt porro graui stimulo agitati in terrā, atq; omnino id tēporis motu per-
petuo incitātur, donec pariat. sed omniū maxime mugilem ita sollicitari certum est,
requiescūt à partu continuū. exitus pariendi pisciū compluribus est, ubi uer miculū
nati in uentre fuerint. innascuntur enim minuta quēdā a nimalia uer miculi specie,
quæ partū expellunt. Parit solitariorū genus in Vere. plurimis deniq; partus circa
æquinoctiū uernū agitur. cæteris non eadem anni tempestas accommodata est: sed
alijs æstas, alijs autumnale æquinoctiū attribuitur. parit prima hoc in genere anche-
rina, quam aristam appello, & iuxta terram. capito autē ultimus est. consistat id cum
foetus aristæ primum, capitonis nouissime appareat. Mugilis etiā inter primos par-
tum accelerat, & salpa æstatis initio locis plurimis, non uisquam enim autumno.
Quinetiam sacer æstate parit, mox aurata, lupus, mormur, molaris. deniq; omnes,
qui cursiones uocantur ultimi gregalium, nullus & graculus pariunt autumno.
Mullus sua oua limo cōmittit, unde sit, ut serō pariat. Diutius enim frigus cōtinetur
in limo. Graculus post mullum foetificat inter algas, utpote qui locis saxosis degat.
fert uterum longo temporis spacio. Aleces bruma parit. cæteri qui pelagici sunt,
æstate magna ex parte. cuius rei argumentum est, quod minime per id tempus ca-
pianitur. Fœcundissima omnium piscium alec esse uidetur. Raia inter cartilaginea
foetificat numerosius, uerū quod de facili pereunt, hinc efficitur, ut appareant pau-
cæ. addit hæc oua t diuerfa, & iuxta terram. Omnino genus cartilagineū minus fœ-
tificat, quia animal gignit: seruari tamen sua potissimum magnitudine potest. acus
etiā appellata, serō foetificat. Compluresq; eius generis disrumpit, ac dehiscēte ute-
ro pariunt, non tam multitudine ouorum, quā magnitudine. & modo phalan-
giorum proles parentē offusa circumdat: quippe quam discedere statim prolis amor
non sinat. & si tetigeris, fugiunt. Arista atterens aluum arenæ, parit. Thunni etiam
præ nimia pinguedine dehiscunt, nec plus quā biennio possunt uiuere. cuius rei
argumentū piscatores inde deducūt, quod cum aliquando limariæ anno superiore
defecissent, thunni sequenti anno defecerint. Limarij enim thunni prouectiores
ætate anno esse putāt uno. coeunt thunni & scombri mēse Februario post idus,
pariūt iunio ante nonas. addūt sua oua condita quasi utriculo. incrementū autē par-
tus præcipua sumit celeritate. Cum enim thunni in Ponto pepererint, prodeit ex
ouo, quas alij scordulas uocāt, Byzantij auxumas nomināt, quia diebus paucis ado-
lescūt: quæ exeunt Ponto autumno fœtas comitātes: eodē autē redeunt uerno tem-
pore iam adeptæ eam magnitudinē, qua limariæ nomen accipiunt. Profecto omne
pisciū genus celeriter adolefcit, & præcipue in Ponto: quippe cum ibi incrementum
singulis diebus planē intelligatur. sed amīx longe cōspectus. omnino ita existiman-
dum, ut eisdem piscibus, non eisdem locis degentibus, nec coeundi, ferendi uē tem-
pus esse idem, nec foetificandi, aut proficiendi: nam & qui graculi appellantur, non-
nusquam melle tritici pariunt. Verum ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte

Alij tinnicrysa

Theodor. pro
pelamys &
thynnide, red-
dit limariæ, &
scite ex Plin.

res euenit. Congri etiā foeturam intra se continent: sed non omnibus locis æque id constat. nec ipsa foetura satis patet in utero pingui obeforis: inest tamen serie quadam prolixiuscula, ut in serpentibus. quod certe ignis periculo innotescit. pingue enim absumitur, atq; euaporatur: oua autem crepant, & extrusa dissiliunt. Ad hæc si palpites, & atteras digitis pingue, leue utiq; senseris: ouum autem duriusculum. Congri itaq; alij pingue habent, ouum nullum: alij contrā, pingue nullū, ouum autem quale modo exposui possidēt. Sed de coitu, utero, & eiusmodi reliquis cæterorum animantium omnium, tum aquatiliū, tum uolucrum, atq; etiā terrestrium quæ oua pariunt, dictum iam est.

De coitu, cuiusq; tempore, & libidine quadrupedum quæ animal pariunt.

10

Caput XLVIII



Equitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariunt, atq; etiā de homine disseramus. coitū & priuatim & publice omnium diximus. Commune autem omnium animalium est, ut cupidine, uoluptateq; rei ueneræ maxime gestiant, atq; incitentur. Ferocunt foeminae à partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent, sterunt equitem, atque insequuntur. fues quoque feri acerrime faciunt, quanquam per id tempus imbecilles ex coitu reddantur. dimicant inier se mirum in modum armantes sese, & cutem quam crassissimam præparantes, indurantesq; attritu arborum, sæpe etiam luto obducto, ac resiccato, ierigus muicūm contra ictus efficiunt. pugnant adeo acri certamine, grege relicto, ut sæpenumero mortem uterq; aduersarius obeat. Simili modo & tauri efferantur, & arietes, & hirci. Qui enim superiore tempore socij, iugi concordia pascerentur, coitus tempore dissident, & alter alterū libidinis rabie inuadit. Camelus etiam mas facit tempore coitus, siue homo, siue camelus accedat: nam equis quidē odio naturali aduersantur. Idem feris quoq; euenire apertum est. Nam ursi, lupi, leones, acrius per id tempus in eos qui accesserint faciunt. inter se tamen minus hæc dimicant, uidelicet ob eam rem, quia nullum ex ijs gregale est. Quinetiam uer se à suis catulis uehementer ferociunt, ut canes à catellis. Et elephantij quoq; ad coitū efferari solent: quamobrem apud Indos ijs haudquaquam permitti inuitum aiunt. libidinis enim rabie agitati, eas prosternunt male conditas, pluraq; alia incommoda faciunt. mitigari pabuli copia narratur, plagis etiam temperant, adductis alijs quibus ferire præcipiant. Quæ autem non uno tempore, sed sæpius anno coeunt, ut ea, quæ cum homine degunt, uerbi gratia, canes, fues, ut minus efferentur, facit coitus copia. Incenduntur libidine ex foeminis equæ potissimum, mox uaccæ. Equæ itaq; equiunt: unde uocabulum id ab hoc uno animali trahitur, maledictio in mulieres libidinosas. Necnon euentari per id tempus equæ dicuntur: quapropter in Creta insula equos admissarios minime à foeminis semouendos censent. Cum uero ita affectæ fuerint, currunt relicta societate. simile hoc uitium est, ut quod subare in suisbus dicitur, currunt non orientem, aut occidentem uersus, sed ex aduerso aquilonis, aut austri: nec appropinquare quenquam pariuntur, donec uel defatigatæ deficiant, uel ad marem deueniant. Tum aliquid emittunt, quod hippomanes appellatur, eodem, quo illud quod nascitur, nomine. Tale hoc sanè est, quale suis illud, quod apriam uocant: sed hoc præcipue ad a moris ueneficia petitur. Equæ tempore coitus colligunt sese, & societate magis quàm antea gaudent. iactant caudam crebrius, uocem immutant, humorem emittunt suis genitilibus similem genituræ, sed multo tenuiorem, quàm mares, quem hippomanes nonnulli appellant, non quod pullis nascentibus adhæret, accipiet humorem difficile esse aiunt, quod paulatim admodum labitur. Mingunt etiam pluries, atq; inter se ludunt cum equiunt. hæc de equis. Vaccæ rauriunt, & libidine adeo incenduntur,

duntur, ut bubulceas tenere, aut capere nequeant. indicium tum equæ, tum uac-
 cæ suæ libidinis præstant, genitalis specie prominentiore. Vaccæ etiam mingunt
 crebrius more equarum. Ad hæc, uaccæ tauros superueniunt, & sequuntur sedulo,
 & assidue. Turgent ad coitum prius minores natu, quàm maiores, tum in equo-
 rum genere, tum in bouum. Temporis etiam beneficio, & corporis ualitudine pro-
 pensiora redduntur ad uenerem animalia. Equarum libido extinguitur magis iuba-
 tionis, & frons tristior redditur. mares in hoc genere fœminas sibi societate coniu-
 ctas dignoscunt olfactu, etsi paucis antè diebus unâ fuerint. quod si fœminæ diuer-
 sè permisceantur, mares alienas mordendo expellunt, suasq; singuli seorsum ha-
 bentes pascuntur. Tricenæ, aut paulò plures singulis dantur. quoties mas accesserit
 aliquis, confestim in eum maritus conuertitur, & currens gyro aggreditur pu-
 gna: & fœminam, si quâ se mouerit, morfu reuocat. Taurus tempore coitus tantum
 cum fœminis pascitur, ceterosq; oppugnat mares, temporibus cæteris mares inter
 se conuersantur: quod coarmentari dicitur. Iam Epiri prouinciæ tauri sæpius tri-
 mestri temporis spacio non apparent. Omnino sera omnia, aut certe plurima, non
 antè cum fœminis ad commune pascuum ueniunt, quàm tempus sit coeundi. Sed
 cum iam per ætatem licuerit, segregantur mares à fœminis, seorsumq; pascuntur.
 Sues fœminæ, cum libidine excitantur, quod subare dicitur, uel homines aggrediun-
 tur. Canes eodem illo modo affectæ, canire dicuntur. Prominet genitale in fœminis,
 cum ad coitum stimulantur, & locus humescit. equabus humoris aliquid ibi defluit
 per id tempus. purgatio menstruorum sit quidem & cæteris, sed nulli æque ac mu-
 lieri. Oui & capræ tempore coeundi indicantur. quod idem post coitum etiam sit ad
 tempus, mox desistit, donec parturiant: tum denuò indicatur. quare pastores proxi-
 mum esse partum intelligunt. A partu autem purgatio sequitur abunde: primum
 leuiter cruenta, postmodum ualde, uaccæ, asinæ, equæ, modo quidem ampliore
 quàm supradictis emittitur, utpote magnitudine excedentibus, sed multo ex pro-
 portione minus. bos itaq; fœmina cum coitum affecta, leuiter purgatur, quantum
 hemina dimidium, aut paulò plus. Tempus autem coeundi tunc potissimum est,
 cum purgatur. equa facillime omnium quadrupedum parit. uacat admodum pur-
 gamentis, minimumq; emittit profluuii sanguinis, uidelicet pro corporis magnitu-
 dine. Conceptus indicium maxime in uaccis, equabusq; cum menses cessarunt, spa-
 cio temporis bimestri, trimestri, quadrimestri, semestri. sed id percipere difficile est,
 nisi quis tandudum securus, assuetusq; admodum sit. quamobrem non defunt, qui
 menses in his animalibus negent. Mulabus menses nulli mouentur, sed earum urina
 crassior, quàm marium est. Omnino excrementum uesicæ quadrupedum crassius,
 quàm hominum est. Inter eas tamen quadrupedes, oues fœminæ, & capræ, crassio-
 rem reddunt urinam quàm mares. Asinæ contrà tenuiorem quàm mares, & uaccæ
 acriorem. A partu urina quadrupedum omnium crassior redditur, & magis eorum
 quæ minus purgantur. Lac fieri incipit ad speciem puris initio coitus, sed uile postea
 est, cum pepererint. Pinguescunt tam oues quàm capræ, cum gerunt partum, & duntq;
 amplius. quod idem de bubus etiam, ac cæteris quadrupedibus affirmandum est.
 Sunt porro animalia propensiora ad coitum, propè dixerim omnia uerno tempore.
 sed sunt tamen, quæ non eo tempore coeant, uerum prout quæq; alere suos fœtus
 commodius possunt, ita tempus sibi conueniens habeant. Sues cicures uterum fe-
 runt menses quatuor. numerus partus plurimum ad uicenos. si tamen multos pe-
 pererint, educare omnes non queunt. senescentes etiam pariunt quidem simili mo-
 do, sed tardius coeunt. implentur uno coitu. sæpius tamen superuentum patiuntur,
 ea de causa, quod post coitum humorem, quam apriam nonnulli appellant, emit-
 tunt: quod quidem cômune omnibus incidit, sed aliquæ unâ cum hoc semen etiam

admissum efficiunt. Foetus, qui in utero laesus minutusque fuerit, metachœrum dicitur, quasi posithumum uoces. quod in parte qualibet uulue accidere potest. Cum scrofa peperit, primam mammam porco, qui primus in lucem prodijt, præbet. cauendum ne prima subatione ante aures flaccidas coitus fiat, frustra etenim fuerit. At si plena iam auiditate ac desiderio libidinis turgido admissura fiat, unus (ut mos dixi) initus satis sit, prodest apro coeunti hordeū apponere pabulo. quod idem & scrofae foetæ commodū est, sed elixum. Sunt & scrotis alia statim proles foecundæ laudabilis, aliae incrementis melius generant. Suem altero oculo amisso breui extingui magna ex parte nonnulli existimant, plurimis uita ad annos quindecim; aliis quibus etiam propè ad uicenos.

De coitu, foetuque ouium, & caprarum.

Caput XIX



Ves, & capræ ternos, aut quaterno coitu implentur, & si à coitu imber accessit, abortū interit, pariunt maxima ex parte singulos, sed aliquando & binos, & ternos, & quaternos. ferūt quinque mēibus, tum oues, tum capræ. Vnde fit ut locis nonnullis, quibus cœli clementia, & pabuli copia est, bis partat. uita capris ad octonos complurimum annos, ouibus ad denos: sed magna ex parte ad pauciores. duces pecoris tamē uel ad quin denos protrahunt uitam. Singulis ouilibus singuli duces constituuntur, qui quoties suo nomine à pastor e uocantur, antecedunt, quod ab incunte ætate facere assuescunt. Oues æthiopicae uel ad duodecim, & tredecim annos uitam agunt. Capræ etiam ad decem, & undecim. Coeunt tam oues quam capræ, quandiu uiuunt. Pariunt geminos, tum pabuli beneficio, tum si pater aut mater, uim eam geminandi per naturam obtineat. Mares autem aut foeminae generantur uel, tum aquarum, tum admissariorum. Nam & aquæ faciunt, ut foeminae mares uel concipiantur. ad hæc, aquilonis flatu mares potius concipiuntur, austris foeminae. Vis tantu uiuunt, ut uel ea quæ non nisi foeminas pariant, immutet ad proles masculæ procreationem. Spectare ad aquilonem oportet cum coeunt foeminae, quæ mane iniri solent, marem, si serò diei admiseris, non patiuntur. Candidi, nigri uel efficiuntur foetus, si sub lingua arietis uenæ nigrae aur candidæ habentur. cuius enim coloris sunt uenæ, eiusdem & uellus est. uarium etiam, si plures uenarum colores sunt. Quæ aquam salis uiculam bibūt, maturius coeunt. nec solum ante coitum, sed etiā à coitu salendum est. atque etiam uerno tempore. Capris nullum ducem pastores constituunt, quia earum natura non stabilis, sed lubrica atque mobilis est. in grege ouium, si maiores nati u tempestiue libidine incitatur, annum esse felicem gregi pastores confirmant, sed si minores, infelicem.

De coitu, & foetura canum, eorumque uita longitudine.

Caput XX



Anum genera plura sunt. Coit laconicum mense suæ ætatis octauo. & crus iam circa id tempus attollentes nonnulli urinam reddunt. Impletur canis uno initu, quod in furticijs maxime constat initibus. implent enim qui semel inierint. gerunt laconicæ uterum parte sexta anni, hoc est sexagenis diebus, aut uno, uel altero plus, minus uel. Catelli cæci gignuntur, nec ante duodecimum diem uisum accipiunt. Coeunt canes postea quam pepererunt, sexto mense, nec citius. Sunt quæ parte quinta anni uterum ferant, hoc est duobus & sexaginta diebus, quarum catelli duodecim diebus luce carent. nonnullæ quarta parte anni, hoc est tribus mensibus ferunt, quarum catelli diebus decem & septem luce carent. tantundem temporis cantræ etiam foeminae putantur. Menstrua huius animalis diebus septem mouentur, similique euenit, ut genitale promineat, uerum nondum per id temporis coitum patiuntur, sed sequen-

sequentibus septem diebus. tempus enim quo toto canis libidine tenetur, diebus quatuordecim magna ex parte describitur. Verū nonnullæ etiā ad sextūdecimū pruriunt. Purgatio autē quæ cōiuncta partui est, unā cum catellis nascētibz prouenit, crasso pituitosoq; humore. redduntur etiā tenuiores a partu, & lac antē diebus quinq; quā pariant, habent magna ex parte. uerum nonnullis etiā septem aut quatuor diebus anticipat. Vtile statim ut pepererint, est. Genus laconicum, post coitum diebus triginta, habere lac incipit. Crassum inter initia omniū est: deinde processu temporis tenuius redditur. Crassius canum, quā ceterorū animalium lac est, excepto scrofe ac leporis. Indicium in mammis etiā apparet, cum aetatem
 10 cōeundi iam habent. Fit enim perinde ac in hominibz, tumor in papillis mammarum, & cartilago quædam consistit, sed difficile id perceperis, nisi habeas usum rei: carent enim hæc indicia magnitudine. hoc igitur fœminæ euenire certum est. mari nihil eiusmodi accidit. crus mares tollentes, mingunt magna ex parte quidem sexto mense ætatis, sed nonnulli uel serius, octauo scilicet mense id faciunt: atq; etiā maturius quā sexto. quod autem simpliciter dixerim, cum coire incipiūt, tollunt. fœminæ omnes confidentes mingunt. Verum in hoc etiā sexu nonnullæ crure elato minxerunt. Parit canis duodecim complurimum, sed magna ex parte quinq; aut sex. unum etiā aliquam peperisse certum est. Laconicæ magna ex parte octio pariunt. cōeunt quandiu uiuunt, & mares & fœminæ. Peculiare generis laconici est,
 20 ut cum laborarint, coire melius quā per ocium possint. uiuit in hoc eodē genere mas ad annos decem, fœmina ad duodecim. Ceteri canes maxima quidē ex parte ad annos quatuordecim, sed nonnulli uel ad uiginti protrahūt uitam. Quamobrem recte apud Homerum canem Vlyssis uicesimo anno mori aliqui iudicant. Laconici sanē generis fœminæ, quia minus laborant, quā mares, uiuaciore maribus sunt. at uero in cæteris, etsi non late admodum constat, tamen mares uiuaciore sunt. Dentes canes non mutāt, præterquam eos, quos uocant caninos, eosq; quarto ætatis mense tam fœminæ, quā mares. Vnde fit, ut diuersa sit autorum sententiā. Alij enim quod duos tantummodo mutāt, negant omnino ullos mutari, cum eos pau-
 30 cos reperire difficile sit. alij cum hos uiderint, ceteros quoq; pari ratione mutari existimant. Aetatis iudicium ex dentibus sumitur: quippe cum iuniores candidos habeant, & acutos: seniores nigros, & hebetes.

De coitu, & partu boum, deq; maris & fœminæ ætate.

Caput XXI



Os uno initu implet, agitq; uehementer, ita, ut fœminæ uix tolerans succumbar. Si fortē conceptio pererrauerit, uicesimo post die marem fœminæ recipit. Seniores tauri nec sæpius quidem fœminā eandem, eodem superueniūt die, nisi ex intervallo. At iuniores, & eandem sæpius cogunt, & pluries petunt, ac superueniunt uigore suæ ætatis. Sa-
 40 lax minime inter mares bos est, coit qui uicerit. cumq; is uenere iam debilitatus langueret, aggregatur uictus ille languentem, & plerumq; superat. Coire tum mares, tum, fœminæ anno ætatis primo peracto incipiūt, quoad facultas sit procreandi. uerum quod magna ex parte fit, uel anniculi, uel nacti octauum mensem uenerem adeunt. Sedenim quod maxime confessum habemus, bimatu generant. Ferunt utrum menses nouem, decimo pariunt. Sunt qui decē totos menses, exceptis paucis diebus, affirmant. Quod autē in lucem præcurrerit hæc tempora, id abortiuum est, uitaleq; minime, etiamsi paulò maturauerit partum: præmolli nanque, imperfectaq; ungula prodit. Pariunt singulos, geminos raro. Quandiu uiuunt, & coire solent, & parere. Viuunt magna ex parte fœminæ annos quindecim, atque etiā mares excisi, nonnullis ætas, uel ad uiginti annos, atque etiā plures, si corpore be-

ne habito sint, nam excisos assuesciant, & duces cōstituunt boum, ut otium, qui plus temporis quàm ceteri uiuunt usu exercitij, & copia pabuli, uigent quinquen-
 nes maxime, quocirca Homerum quidam recte dixisse aiunt, Quinquennem
 taurum, & bouis lustro florentis. Idem namq; significari arbitrat̃ur. Dentes bimus
 emitit bos, nec uniuersos, ut equus, ungulas, cum dolore articulorum laborat, non
 amittit: sed pedes tantummodo intumescunt uehementer. Lac à partu utile est,
 antequam peperit, caret lacte. quantum lactis prouenerit primum concrefcens,
 perinde ut lapis durefcit, quod ita accidit, nisi aqua admisceatur. Iuuenta recentior
 quàm annicula non patitur uenere, nisi ostento, lamenim uel quarto ætatis men-
 se coisse perspectum est. Initium coitus, plurimis quidem mense Aprili & Maio: 10
 sed nonnullæ etiã ad autumnum usque tempus coeundi deducunt. Cum plures
 grauidæ sunt, & facile inuim patiuntur, nimirum pro signo hyemis & imbrium id
 accipitur, menses & uaccis fiunt, ut equabus, sed minus.

De coitu, & partu equorum, de amissione dentium, deq; maris & fe-
 mine etate.

Caput XXXII



Quos coire incipit bimus, tam mas quàm fœmina: sed hoc in paucis
 fit, pulliq; eorum ipsorū minores imbecillioresq; sunt. Quod autem
 plurimum trimatu, iam mares quàm fœminæ incipiūt, & proficiunt
 subinde ad prolis præstantiam, in uicesimum usque annum. Fert ut 20
 rum equa menses undecim, parit duodecimo mense, equus non cer-
 to dierum numero implet, sed aliquādo uno, aut duobus tribus uel, aliquando plu-
 ribus, ferius certe quàm asinus, equam superueniens implet. Coitus non tam labo-
 riosus equis, quàm bubus est. Salacissimum omnī, tum fœminarum, tum marium
 equus est, hominē exceptio. Iuniorum coitus præter ætatem contingit pabuli boni-
 tate & copia, pariunt magna ex parte equæ singulos, sed gemellos quoq; aliquan-
 do complurimum procreant. mula etiã gemellos peperit, quæ quidem pro osten-
 to accipiuntur. Coire itaq; incipit equus uel tricesimo mense: sed quoad digne pro-
 creare possit, tunc tempus est, cum dentibus mittendis cessauit. uerum iam non
 nullos etiã cum mutant, implere potuisse aiunt, idq; fieri ita confirmant, nisi na-
 tura steriles sint. Equo dentes quadraginta numero sunt, quorum primores qua- 30
 tuor, menses tricesimo mutantur, bini utrinque, supra dīco, & subter, tum ubi præ-
 terea annum compleuerit, quatuor item modo eodem mittuntur: duo superius,
 totidemq; inferius. rursusq; anno altero peractō, simili modo quatuor alij mutan-
 tur, quibus iam præteritis annis quatuor, & mēibus sex, nullus præterea mittitur,
 quanquam euenisse in aliquo certum est, ut cum primis omnes amitterentur: atq;
 etiã in alio, ut cum ultimis omnes. sed hæc raro. Fit itaq; ut equo ferè tempus ido-
 neum maxime sit ad procreandum, cum annum quartum, & sex menses comple-
 rit. seniores equi profectiō fœcundiores sunt, tam fœminæ, quàm mares. Equi uel
 suas matres & filias superueniunt, atque tunc perfectum esse argumentum uidetur, 40
 cum parentes suam incunt prolem. Scythæ equabus grauib; equestrant, cum pri-
 mum se mouerit fœtus, & nimirum eas proficere ad partus facilitatem arbitrat̃ur.
 Ceteræ quadrupedes iacentes parere solent. quo fit, ut fœtus obliqui omnī ex-
 ant. At uero equa cum tempus iam ædendi appropinquit, erigit se, stansq; emit-
 tit partum. Vita equorum plurimis ad decimum octauum, atq; etiã uicesimum
 annum. sed nōnulli etiã quinq; & uiginti, atque triginta egerunt. & si cura dili-
 gener adhibeatur, uel ad quinquaginta protrahitur ætas. longissima tamen uita
 in pluribus ad tricesimū annum, quod magna ex parte fieri norimus. Fœmina ma-
 gna quidem parte quinq; & uiginti annos uiuere potest, sed iam nōnullæ etiã qua-
 draginta

draginta uixere. Minus temporis mares uiuūt, quā scēminā, propter coitum, & qui domi aluntur, minus quā gregarij. scēminā quinquennio finem, tum longitudo-
 tudinis, tum etiam proceritatis sui corporis recipit, sed mas sexennio. post, annis se-
 quentibus totidem crescit in corpulentiam, & ad uiginti usque annos pergit profici-
 ens, uerum celerius scēminā quā mares perficiuntur: quanquam in utero ma-
 res, quā scēminā citius, quemadmodum etiam homines. quod idem, uel in cete-
 ris animalibus quā pariant plura, fieri solet. Lactare mulum semestre temporis spa-
 cium referunt, mox fugi non pati: uinque humorem trahi, & cum dolore. equo
 autem plus temporis tribuunt. Viget & equus & mulus a dentium ortu: cumq;
 10 prodierint omnes, non facile aetatem dignoueris. Quamobrem dici solet, certa sub
 ortu, incerta ab ortu. denique post dentium ortum, eo maxime declaratur aetas,
 quem caninū uocamus. breuior enim hic septennibus est, propter freni attritum
 quod ad eum inficitur: non septennibus maior quidem, sed non uertice extans ad
 actiore. Iunioribus acutior & procerior est. mas omnibus tēporibus inuit, nec cessat
 quandiu uiuit. Scēminā etiam quandiu uiuit inuitur, nec tempus ullum certum libi-
 dinem aufert: sed ingenium hominis arceat, aut uinculo, aut aliquo huiusmodi im-
 pedimento: non tamen quouis tempore facto inuit, facultas enutriendi quod pe-
 peterint, datur. Equum apud Opunta gregariū fuisse accepimus, qui annos qua-
 draginta natus posset coire: sed adiumentum quoad sui pedes priores attollerentur,
 20 desiderabat. Coeundi inuitū equis in Vere. Non statim a partu equa impletur,
 sed intermisso tempore: & melius quarto aut quinto anno interposito procreat.
 Omnino, si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi nouale
 facere necesse est. Equa igitur interposito tempore, ut dictum est, parit: at asina
 continue parere potest. fit etiam in equorum genere, ut alia omnino steriles sint,
 alia concipiant quidem, sed adere nequeant. cuius rei indicium aiunt, quod fe-
 tus circum renes alia quædam, specie propemodum renum, ita cōtinet, ut rescissus
 quatuor renes habere uideatur. Cum equa peperit, statim secundas deuorat, atque
 etiam quod pulli nascentis fronti adheret, hippomanes dictum, magnitudine mi-
 nus carica parua, specie latiusculum, orbiculatum, nigrum: hoc si quis prærupto
 30 odorem moueat, equa excitatur, furitq; agnito eo odore. quapropter id a ueneficis
 petitur, & percipitur mulierculis. Si cum equa ex equo prægnante coierit asinus,
 foetus iam conceptus corrumpitur. Equorum ducem, ut boum, nullum constitu-
 unt: quoniam equorum natura non stabilis, sed mobilis, procaxq; est.

*Quod equine
 cupidini simile
 mortalibus eo
 more accedat.
 Columella.*

De coitu asini, & asine partu, mariq; & scēminæ etate.

Caput XXXIII



40 Sinus tum mas, tum scēminā trigesimo mense coire incipit, eodemq;
 tempore dentes mittit priores: secundos autem sexto mense, atque
 etiam tertios quartosq; eodem, gnomonas hos quartos a dijudican-
 da etate nuncupant. Sed iam uel annicula asina concepit, ut perfici
 proles ac adulescere posset. reijcit semen a coitu nisi interpelletur.
 quamobrem statim post coitum uerberat, insectanturq; parit duodecimo mense.
 singularim magna ex parte procreat prolem. ea namq; natura est, ut unum pariat,
 sed nonnunquam gemellos etiam addit. Asinus quidem equi genituram corrup-
 pit, ut dictum est, sed equus asini minime, cum equa iam asini inuitu conceperit. Lac
 grauida habet mense decimo. A partu die septimo mari iungitur, eoq; die iuncta
 maxime recipit inuitum, sed postmodum etiam patitur. solet hæc, nisi priusquam gno-
 monem amittat, peperit, nunquam postea inuitum recipere. parere uel in conse-
 ctu hominis, uel in luce nolit, sed in tenebras ducitur cum parurit, si priusquam

gnomonem dimississet, pepererit, parere tota sua ætate potest. uita asinis amplior an
 nis triginta, & fœmina uiuacior mare est. Cum uel equus cū asina, uel asinus cum
 equa inierit, multo magis abortus consequitur, quàm cum unigenæ inter se iun-
 gantur: uerbi gratia, equa cum equo, aut asina cum asino. Euenit etiam tempus ge-
 rendi uteri, cum equus cum asino coierit, maris normatid est, ut quanto spacio tem-
 poris mas perficitur suo in genere, tanto etiam foetus, quem ipse procreat, absol-
 uatur. At magnitudine corporis, specie, & uiribus, magis fœminæ, quàm mari si-
 mile euadit quod nascitur, si frequenter coeant, neque ullo interposito tempore celsi-
 sent, quæ ita iunguntur, breui fœmina steriles cit. qua de causa non frequenter ita
 coniungunt, qui curam huic adhibent rei, sed tempus aliquod interponunt. Non
 asinum equa, ut asina equum recipit, nisi asinus sit, qui equam suxerit. Admittunt
 de industria quos hippothelas uocant, ac si equimulgos cognomines, qui in pascuis
 modo equorum uiribus bonis superantes coeant.

De mulo, & eius coitu, & ætate.

Caput XXIIII



Mulus superuenire, coireq; incipit missis dēbus primis: sed septennis
 implere potest, etiam cum equa coniunctus. Innum procreauit. post
 deinde superuenire non solet. mula quoque iam facta grauida est,
 sed non quoad perficeret, atque æderet prolem. In terra Syria super
 Phœnicem mulæ & coeunt, & pariūt omnes: sed id genus diuersum
 est, quanquam simile, prodeunt quos ginnos uocant ex equa, cum in gerendo ure
 ro ægrotauit, more pumilionum in ordine hominū, aut porcorum deprauatorum
 in genere suum, quos posthumos nūcupauit. & quidem ut pumilio, sic ginnus mo-
 dum suo genitrali excedit. Vita mulis ad annos multos. iam quidam uel octogesi-
 mum annum potuit agere, ut Athenis cum templum ædificaretur, qui quamuis di-
 missus iam munere per senectam, commeans tamen, ac obiens iumēta exhortaba-
 tur ad opus: quamobrem decreto à nemine eum arceri à frumentorū aceruis san-
 ctum est. Serius fœmina senescit, quàm mas. Nonnulli fœminam profluuiū urinæ
 purgari aiunt. marem olfactu urinæ prius senescere, ortus eorum animalū talis est,

Plin. sic: Con-
 nitendo comi-
 tandoq; accen-
 debat iumenta
 ad opus.

Indicium ætatis quadrupedum.

Caput XXV



Etatem dignosci quadrupedū confirmant, qui in earum cura sunt con-
 stituti, si cutis prætenta maxillis, detracta, mox relaxata, ilico in suum
 redeat locum. hoc enim indicium recentioris quadrupedis est, ueteris
 contrā, si diutius rugata maneat cutis.

De utero, & ætate cameli.

Caput XXVI



Amelus fert uterum menses decem, parit semper unum tantummo-
 do: unipara nanque est. separant prolem à parente anniculam. Viuit
 diu, plus enim quàm quinquaginta annos, parit in Vere, & lac suum
 usque eò seruat, quo iam conceperit. tum lac, tum caro cameli suauis-
 sima omnium est. bibitur eius lac ad unam mensuram duabus, aut tri-
 bus aquæ admixtis.

De elephantorū coitu, deq; tempore quo uterus fertur, & eorū pullis.

Cap. XXVII



Elephantus tam mas q̃ fœmina incipit coire anno ætatis uigesimo,
 ferendi uteri tempus alij annum & sex menses, alij triennū statuunt.
 causa quamobrē incertum hoc sit, quod non pateat coitus, parit enī
 tens posterioribus cruris, & subsidens cum dolore, pullus æditus ore
 fugit, nō promiscide: & statim cum natus est, cernit, & ambulat.

De coitu

De coitu suum, & eius tempore.

Caput XXVIII



Ves feræ principio hyemis coeunt, Vere pariunt, petentes maxime inuia, prærupta, angusta, & opaca. mas cum foeminis conuersari dies triginta magna ex parte solet. Numerus partus, & tempus ferendi idem, atq; in urbanis suis est. Vox etiã similis: sed foemina uocalior est, mas raro uocem emittit. Mares castrati, maiores ferocioresq; euadunt, ut scite Homerus fingit, cum dicat:

Nutrijt exectum syluis horrentibus aprum.
Instar nõ bruti, sed dorsi montis opaci.

10 Castatur, quod recentibus adhuc morbus pruriet incubuit in testes, quò atteretes eam partē ad arbores, testes exstringunt.

De ceruorum coitu, partu, & natura.

Caput XXIX



Erua plurimum subsidens coit, ut dictum iam est. marem enim sustinere non potest, ob eius contentissimum impetum. Verum tamen aliquando etiã sustinent modo ouium, & socias declinant, cum turgen-
te iam Venere coitum appetunt. Mas non in eadem immoratur, sed mutat; breuicq; interpolito tempore, aliã atque aliam supergreditur.
Coitus ab æstiuo mēse Augusto & Septēbri, implētur paucis diebus, & ab eodem multæ. uterū serunt octo mēses. pariunt magna ex parte unū, sed nonnullæ etiã geminos peperisse perspectū est. parere iuxta uias maxime solēt metu belluarū. Inre-
10 mentum hinnuli celere. purgatio cæteris tēporibus nulla euenit ceruæ. Cum autē parit pituitoso quodā humore purgatur. ducere suū hinnulū ad stabula cōsuevit, quem locū sibi habet refugium, petra disrupa est uno aditu, unde defendere se, repugnareq; solet ijs, qui inuadūt. Vita esse perq; longa hoc animal fertur, sed nihil certū ex ijs quæ narrātur, uidemus: nec gestatio, aut incrementū hinnulitæ euenit, quasi uita esset prælōga. Monte Asiae Elapho noie apud Arginussam, quo loco Alcibiades mortem obiit, ceruæ omnes scissæ aure sunt, qua nota uel alibi, si loca mutarint, dignoscuntur. Et quidē scerus iam inde à primo ortu in utero idem cōtrahit signum. Quaterna ubera foeminis, ut uaccis. Cum mares impleuerint foeminas, separantur per se ipsi, & propter libidinis graueolentiã quisq; solitarius scrobes fodit, foetēt ut
10 hirci, facies quoq; eorū nigrescit aspergine, ut hircorū. degūt ita, quousq; imber accedat, tum pascua repetūt. Hæc ideo ceruo accidūt, quia salax animal suapte natura est, atq; etiã quia pingui abundat. pinguescūt enim æstare supra modū, quam obrē nec currere quidē possunt: sed secundo aut tertio cursu capiūtur ab ijs, qui pedibus insectātur, fugiunt etiã in aquas propter æstū atq; anhelitū. Caro eorū libidinis tempore uitiat, & foetet, perinde quasi hircorū. hyeme itaq; extenuantur, debilitanturq;. Vere autē uigēt maxime ad cursum, cum fugiūt, requiem inter currendū aliquam faciūt, consistentesq; manent, dum qui insequitur, appropinquet, tum fugam item arripit. quod ideo facere uident, quia interiora laborāt, intestinū enim tam tenue, imbecilleq; habēt, ut etiã si leuiter percusseris, possit rumpi, cute adhuc integra.

De ursi coitu, partu, & pullis, deq; hystricis natura.

Caput XXX



10 Rsi coeunt, ut dictū est, non superuenientes, sed humi strati. fert uterū ursæ dies triginta. Parit tum unū, tū etiã duos: sed cōplurimū quinq;. foetū minimū pro sui corporis magnitudine ædit: quippe quæ minorē catto, maiorē mure parere solet. nudum item, & cæcū, & cruribus propemodū, membrisq; alijs plurimis indiscretū, & rudē. coit mēse Februario. parit eo tēpore quo latet. pinguescit per id tēpus tam masq; foemina uehemēt. cū prole enutritur, exit à mēse iam Veris tertio. Hystrix etiã latet, totidēq; diebus fert uterū, & reliqua facit perinde ut ursæ. grauidā capi ursam difficile est.

De partu leonum, & pullorum numero, & de denium mutatione.

Caput XXXI



Eonem auersum coire, urinamq; retro reddere dictum iam est. coit & parit non omni tempore: singulis tamen annis. Vere parit, & magna ex parte geminos, sed cum plurimos sex catulos, nonnunquam etiam unum. Quod de leæna fertur, uuluam cum partu emittere, delira fabula est, facta ex ea causa, quod rarum genus hoc animalis est: nec rationem cur ita esset, comperire autor ille fabulæ poterat. rarum hoc enim est, nec multis nascitur locis: sed Europæ totius, ea parte solî, quæ inter Acheloum amnem, & Nessum est. parit leæna quoque adeo paruos, ut uix post secundum mensem incipiant ingredi. Leones terræ Syriæ quinquies uita pariunt: primum quinque, post uno subinde pauciores, deinde steriles degunt. caret leæna iuba: maris hæc propria est. dentes eos tantummodo mutat leo, qui canini uocantur quatuor, duos superius, totidemq; inferius, idq; sexto mense ætatis fit.

De hyæne natura, meatibusq; genitalibus maris & fœminæ.

Caput XXXII



Hyæna colore lupi propè est, sed hirsutior, & iuba per totum dorsum prædita est. Quod autem de ea fertur, genitale simul & maris, & fœminæ eandem habere, commentitium est: sed uirile similiter, atque in lupis, & canibus habetur. quod uero fœminetū esse uidetur, sub cauda positum est, figura simile genitali fœminæ, sed sine ullo meatu. sub hoc meatu excrementorum est. Quinetiam fœmina hyæna, præter suum illud, etiam simile, ut mas habet sub cauda sine ullo meatu, à quo excrementorum meatus est, atque sub eo genitale uerum continetur. uuluam etiam hyæna fœmina, ut cæteræ huiusmodi fœminæ animantes habet. Sed raro hyæna fœmina capitur, iam inter undecim numero, unam tantū cepisse uenator retulit quidam.

De coitu, & fœtura leporum.

Caput XXXIII



Epores auersi coeunt, ut expositum est. retro enim urinam reddunt. Coeunt & pariunt quoque tempore, dumq; utero ferit superfoetant, & singulis mēsis generant. sed fœtus ædūt nō uniuersos. interpositis enim diebus quot res tulerit, peragunt partionē. habet fœmina lac priusq; pariat, & à partu cōtinuō repetit coitū, & lactans adhuc cōcipit fœtū. lac suillo simile sua crassitudine est. Partū non ut maior sipedū pars, cæcū ædit.

De coitu, & partu uulpis.

Caput XXXIIII

Vulpes superueniens coit. parit cæcos, ut ursæ, atque etiam infirmiores, parturiens ita secedit, ut raro grauida capiatur. Cum partum ædiderit, lingua lambendo resouet & concoquit. parit cum plurimos quatuor.

De partu luporum, felis, ichneumonis, lupi canarij, & lupi cernarij.

Caput XXXV



Vpus fert & parit ut canis, tum tempore, tum etiam fœtus numero. cæcos etiam generat canis modo. coit uno tempore tantum, parit ineunte æstate. fertur de eius partu ad fabulam proxime, lupos omnes intra duodecim dies parere. cuius rei causa usam proferunt fabulose, quod Latonam oberrantem totidē diebus ex Hyperboreis Delum deduxerint sub specie lupæ, propter metum lunonis. Sed an tempus hoc pariendū sit, nondum exploratum habemus. Fertur quidē sic uulgō, sed uerum minime esse uidetur. quale uel illud serunt, lupos semel in uita parere. Feles & ichneumones tot numero pariunt, quot canes, uelcunturq; eisdem. uiuunt circiter annos sex. Lupus item canarius, cæcos parit luporum ritu, numero complurimum quatuor. Quinetū lupus cernarius coitu ut canes impletur, & cæcos generat, numero duos, aut tres, aut quatuor.

quatuor, corpore longior, & cauda porrectior est, sed proceritate breuior, celeritate æque præstat, quamuis crura habeat breuiora. mollis enim & agilis est, pro silireq; longius ob eam rem potest.

De mulis, quos terra Syria fert.

Caput XXXVI



Vnt in Syria, quos mulos appellat, genus diuersum ab eo, quod coitu equæ, & asini procreatur, sed simile facie. quomodo asini syluestres, si similitudine quadam nomen urbanorum accipere. & quidem ut asini illi feri, sic muli præstāt celeritate. Procreant eiusmodi mulæ suo in genere, cuius rei argumēto illæ sunt, quæ tēpore Pharnacæ patris Pharnabazii in terram Phrygiā uenerunt, quæ adhuc extant, tres tamen ex nouem, quot numero olim fuisse aiunt, seruantur hoc tempore.

De natura, & uarij generis murium, deq; pulorum numerositate.

Caput XXXVII



Vrium generatio mirabilis præter cætera animalia maiorem in modum est, tum numero, tum celeritate. iam enim foemina prægnante in uasē miliario aliquādo occupata, paulo post referato uasē, musculi numero uiginti & centū reperi sunt. Mirum etiā percipimus ortum redundantis agrestis murium generis, locis enim compluribus agri tam inaudito modo oriri solent, ut parum ex uniuerso frumenti relinquatur, tam cito absumitur, ut nonnulli mediocres agricolæ, cum pridie metendum statuerint, postridie mane cum messoribus accedentes ad segetem, absumptam inueniant totā. interitus autē minime euenit ratione. paucis enim diebus omnino abolentur, quamquam superiore tempore homines uincere uel sustinendo, uel fues, ut latibula effoderent, admittendo, nō possent. Quinetiā uulpes eos ueniuntur, & cati syluestres in primis: sed tamen superare copiam, & celeritatem prouentus nequeunt: nec aliud quicquam omnino uincit, nisi imbres. ijs enim quamprimum intereunt. Ter per Persicā parte quadam mure foemina rescissa, foetus foeminini prægnantes comperiuntur. Sunt qui uehementer confirment mures, si salem lambant, impleri sine coitu. Aegyptijs muribus prædurus ferē, ut herinacis, pilus est. Sunt etiā alij, qui erecti bipedes ambulant. habent enim crura posteriora longa, priora breuiora, ortus eorum quoq; numerosus est. Sunt uel alia genera murū plura. sed de ijs hæcenus.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER SEPTIMVS,
INTERPRETE THEODORO.

De signis, quæ puerorū feminis emissionē, puellarumq; uiripotentia præueniunt.

Caput I



DE HOMINIS generatione, tum prima in utero, tum posteriore in luce, & usq; in senectutem, quemadmodū se habeāt, quæ suæ naturæ ratione eueniant, loco hoc dicimus. Quæ inter matrem & foeminā differētia sit, & quibusnā partibus constet, ante expositū est. Mas autē primum semen genitale magna ex parte incipit ferre, anno peracto bis septimo: simul etiā pubescere incipit eo tēpore, ut stirpes semen laturas primū florere Alcmeon Crotoniata ait. uox item per id tēpus mutari in sonū asperiorē, inæquabiliorēq; incipit, quanq; nondū grauem. neq; enim acuta præterea est, neq; tota æquabilis: sed similis fidibus in cōtentis & asperis, quod caprire denomināt. idq; potissimū indicat ijs, qui rem uenerēā incipiūt agere. ijs enim uox trāsit in sonū uirilem. Abstinen

tibus uero e contrario sit. et si curā adhibeant (quod aliqui faciunt ex ijs, qui choreis indulgēt) uel longo seruari tempore sine magna mutatione potest. Mammæ etiā extuberant. & genitale non solū magnitudine, sed etiā specie proficit. euenit porro id tēporis, qui iam fricari, cōtrectariq; per libidinē ceperint, ut cum semen emittūt, non modo uoluptate, uerū dolore quoq; afficiūtur. Fœminis etiā per id tēpus exurgunt ubera, quod fratre dicitur. & quæ mēstrua uocātur, et impū: quod sanguis quasi recens occisi animalis est. Quæ autē alba dicuntur, admodum etiā puellis eueniunt, & magis si cibo utuntur humidiori. Hæc incrementū impediunt corporis, & puellam extenuāt. sed menses tunc plurimis sunt, cum iam ubera ad duos digitos prominēt. & uox eodē tempore puellarū mutatur in grauiorē. Deniq; cum mulier uocis acutioris, quā uir sit, tum natu minores acutius, quā maiores sonāt, ut & pueri, quā uiri acutius. Sed uox fœminæ acutior est quā maris, & fistula puellarum acutior, quā puerorū est. Fit etiā, ut per id tēpus custodiri præcipue debeat, maxime enim ad usum rei ueneræ incipiūt, cum hæc incipiunt. Quod si iam inde nihil plus commouere temperēt, quā corpora ipsa nullo adhuc usu uenero, sed sponte mutētur, sequi seruariq; temperatā solet per ætates superiores. nam & quæ admodū puellæ concumbūt, libidinosiores euadunt. & mares siue altera parte, siue utraq; minus cauerint, propēiores eodem efficiuntur. Mearus enim laxantur, red duntq; eo corpus lubricum, & simul uoluptatis, quæ olim gessit, memores, desiderio mouētur præteritæ contrectationis. Prodeunt nōnulli iam inde à primo ortu naturæ impubes, infœcundiq; propterea quod parte sui genitali fuerint deprauati. Mulieres etiā simili modo impubes à natiuitate possunt creari. Habitus quoq; tum marium, tum fœminarum mutātur, ut sint uel sanitati, uel morbo habiliores: & uel graciles uel pleni, beneq; uegeti, nam à pube ex macilentis crassescēt, euaduntq; saniores: alij contrā. quod pari modo puellis etiā euenit. qui enim pueri, aut quæ puellæ excrementis antea corporis redundabant, cum ea ipsa excrementa unā cum semine, aut mensibus fecerantur, sanitati alimentiq; obstant, exeunt. At uero quibus contrā antecesserit, ijs corpora graciliora, & morbis opportuniōra redduntur. excernitur enim de ipsa natura & bene habitis, cum aut semen, aut menses prodeunt. In puellis item diuersitas uberum est: alijs enim admodum magna, alijs exigua sunt. euenit sane, ut corpora immodice crescāt, cum puellæ excrementis redundāt. futuris enim adhuc & nondū profluentibus mensibus, quo plus continetur humoris, eo magis effertur, sursumq; impelli necesse est, donec infra erumpat. Itaq; quod interim incrementum mammæ acceperint, seruant postea. maribus etiā mammæ cōspectiores & fœminatiores, tum iunioribus, tum senioribus efficiūtur, qui humidiores, lauiōres, nec uenulenti sunt, eorumq; ipsorum, ijs magis qui fusci, quā qui cādidi sint. Semen profectō infœcundū usq; ad ter septimum annū est. mox prolificū quidem est, sed exigua imperfectaq; generāt iuniores, & mares, & fœminæ, ut in cæterorū quoq; animalū genere plurimis euenit. cōcipiunt quidē facilius natu minores, sed laborāt in puerperio uehementius. corpore etiā minus magna ex parte perficiūtur. & senescunt celerius mares salaces, & mulieres quæ frequentius pariāt: nam ne incrementū quidem post tertii partum effici posse uidetur. sedātur autē, temperanturq; melius, quæ in rei ueneræ usum luxuriāt, cum partum multoties excuerint. Sed post annū ter septimum mulieribus quidē opportune iam procreatio est. Sed uiris item accedere aliquid potest ad prolem perfectiorem. Semina infœcunda sunt quæ tenuia, fœcunda, quæ grandinis speciem referūt: eademq; potius marem fortificāt. contrā tenuia, nec globulenta, fœminam gignūt. Mentum etiā maris ea ætate pilis integitur.

De men-

Anno tempore puellæ
le debeant custodi
divi

his p̄is v̄s p̄m
n̄l̄iūiā, per
ætates postea
rioris.

De mensibus mulieris.

Caput II



Profluuium autē mensium decrefcente luna contingit : quamobrem nonnulli cauflo ſexum ſcēmineum lunæ tribuunt, quoniam ſimul, ut illa decreſcat, & mulier purgetur, moxq̃ repleantur ambæ, eueniat. paucis menſtrua ſingulis mēſibus mouentur : ſed uno intermiſſo plurimis. facilius agitur cum ijs, quibus breui tēpore, hoc eſt biduo aut triduo profluunt : ſed quibus longum protrahitur, difficilius : laborant enim id temporis. alijs nanque uniuerſim hæc purgatio fit, alijs paulatim. Attamen omnibus corpus grauatur, quandiu effluat humor. Multis etiā cum mēſtrua citantur, & eruptioni propinqua ſunt, ſtrangulationes uuluarum ſequuntur, & crepitus, donec erumpāt. Conceptus mulieribus à profluuiio menſtruorum ſua natura contingit. & quæ ijs carent, ſteriles magna ex parte exiſtunt. uerum fieri poteſt, ut aliæ quæ etiā ſine eorum profluuiio concipiānt, uidelicet quibus tantum humoris colligitur, quantum ijs, quæ purgātur, reſtare ſolet : quanquam non tanta copia, ut & foras poſſint profluere. nonnullæ etiā dum profluunt menſes, concipiūt, poſtea concipere nequeūt : quibus uulua ſtatim à purgatione comprimitur. Sunt quibus prægnantibus etiā menſtrua uſq̃ in poſtreum gerendi tempus eueniānt, quibus accidit, ut parua pariant, & proles aut minus uitalis, aut infirma procreetur. Multis etiā deſiderio coitus, quo uel iuuenilis ætatis ratione, uel quia longo tempore abſtinuerint, tenentur, deſcendunt uteri. & menſtrua ſæpe ter in menſe citantur, donec concipiant : quo factō aſcendunt, & ſuo ſitu conſtituuntur. nonnunquam etſi cætera bene ſe habet uterus, humidus tamen eſt. reſpuit ſemen genitalē, ſi humidus ſit. Omnium autem animalium (ut antè dixi) mulieribus inter ſcēmas plurima hæc purgatio euenit. nam ijs quæ non pariunt animal, niſi tale mouetur, propterea quod hoc materiæ ſuperuacuum uertitur in corporis alimentum. Sunt enim nonnulla maribus ſuis maiora, atque etiā alijs in corticem, alijs in ſquamam, alijs in frequentiam pennarum abſumitur. Terreſtribus quoque animal parientibus, in pilos, & corpulentiam tranſit : homo enim læuior cæteris eſt : atque etiā in urinam diuertitur. plurima enim ex cæteris largius mingunt, & craſſius. At mulieribus uice eorum, quæ dixi omnium, quantum ſuperuacuum ſit, in purgationem menſium uertitur. quod in maribus quoque ſimili fieri modo percipimus, ſeminis genitalis ratione. plurimum enim omnium animalium emitit, comparatione dico magnitudinis ſux : & uero inter ipſos mares, qui humidioreſ natura ſunt, nec ualde carnoſi, plus reddunt : atque etiā plus candidiores, quàm ſuſci. nec ſecus in mulieribus ſit. corpulentis enim multum menſtrui excrementi in corporis alimentum tranſit. & in uſu quoque rei ueneræ candidiores ſua natura plus, quàm ſuſcæ euaporant. præparatur hoc amplius uſu ciborum humidorum, & acrium.

Quo tempore ſiant conceptus

De indiſijs conceptionis, & quot diebus ſpacio mas, quot item ſemina in utero moueantur, deq̃ abortitionibus.

Caput III



Indicium mulierem ſam concepiſſe, cum ſtatim à coitu locus ſicceſcit, ſit certe, ut ſi oris, quo concipitur, labra ſunt læuia, inepa ſunt ad conceptum : labitur enim & effluit ſemen. nec uero ſi craſſa ſunt, commode uſum præſtāt : ſed ſi ad digiti tactum aſperiuſcula, & hærentia ſint, ut alio uſu præparandus eſt uterus, qui concipiat. quod ſi facere ne concipiat, placet, contra agendum eſt. nam ſi labra ſint læuiora, concipere nequeat. Quamobrem nonnullæ ut ſemen incidat, antè uulua ex oleo iuniperino, aut ex ceruſa, thure uel ex ſum iuniperi.

pientes oleo, illinunt. sed si in septimum diem intus permanferit, conceptum iam esse certum est. nam quæ effluxiones uocantur, in uero numero dies fieri solent. purgationes autem accedunt plurimis, cum conceperint, ad tempus quoddam, sed licet triginta dierum, maxime si concepta femina est, quadraginta simas. A partu etiam purgationes eodem dierum numero consequi uolunt, quanquam non æque ita diligenter eueniunt. At uero post conceptum, & dies, quos modo dixi, non item secundum naturam inferius agitur, sed in ubera transfitur, & lac efficitur. Cuius nota inter initia exiguo quodam, & aranæ propemodum specie apparet in mammis. cum iam conceperint, sentiunt præcipue suis silibus, hæc enim nonnullis statim pleniora efficiuntur, quod ipsæ, quæ graciliores sunt, euidentiùs accidunt. Inguina etiam sentiunt, & conceptus argumēto esse possunt. Mares foetus magna ex parte circa quadagesimum diem, dextro potius latere mouetur, feminae sinistro, circiter nonagesimum. Nihil tamen certi in his affirmari licet. multis enim serenibus feminam, motus agitur in dextro, & contra in sinistro, gerentibus marem. Sedenim hæc, & reliqua huiusmodi, ut differunt, eo quo magna ex parte & magis minus ue accidunt, sic accipimus. Finditur etiam foetus hoc eodem tempore, cum ante caruncula in formis conflaret. Effluxiones uocantur, quæ intra septimum diem corruptiones incidunt. Abortiones autem, quæ intra quadagesimum. Et quidem plurimi foetus intra tot numero dies deprauantur. Mas qui quadagesimo die exierit, si in quoduis aliud mittatur, diffunditur, atque aboletur. Sed si in aquam frigidam, cogitur, confistit, & uelut in membranula, qua rupta, foetus ipse apparet magnitudine formicæ masculæ. & membra iam inde discretæ, tum cætera omnia, tum genitalia constant. & oculi quemadmodum in cæteris animantibus prægrædes. Sed femina, quæ intra tertium mensem eruperit, indistincta est: quæ autem quartum adepta est mensem, finditur, & reliquam distinctionis effigiem breui tempore accipit. Cum itaque foetus in utero formatur, femina tardius quam mas perfectionem quarumque partium recipit, & sæpius in decimum mensem, quam mas protrahitur. Sed cum in lucem prodierit, femina ocyus, quam mas & accrescit, & citius floret, & senectute maceratur, & magis, quæ pluries pariunt, ut dictum iam est.

De istis, quæ à conceptione ad partum usque mulieribus eueniunt, quo uero tempore pariant, quolque uno pariu parere possint. Caput IIII

30



Um semen conceperit uterus, statim se contrahit, donec ad septimum mensem uentum sit. octauo iam adaperitur, atque dehiscit. & partus si uiuit, descendit mense eodem, sed si mortuus est, neque ipse descendit, nec uterus per id tempus dehiscit: idque indicium facit, foetum haud quamquam esse uitalem. Euenit profectio, ut mulieres à conceptu corpus totum grauentur, & oculorum caligines, & dolores capitis moueantur. quæ alijs maturius, & serè die decimo accidunt, alijs ferius, prout magis minus ue ex materia superuacua tentantur. Nausea item, & uomitus plurimas capit, & præcipue quibus purgationes consisterint, necdum ad ubera transeant. Aliquæ igitur principio magis laborant, aliæ post, cum iam foetus plenius creuerit. Sæpe etiam multis defillatio urinæ ad postremum infestat. sed magna ex parte, quæ marem ferunt, facilius exigunt, minusque pallent. contra, quæ feminam, sunt enim pallidiores, & grauius degunt. Multis etiam tumores, ex tuberationesque carnis in cruribus incidunt: sed tamen contra etiam nonnullis contingit. Solent appetitus uarij grauidis euenire, citiusque commutari, quod picare quidam à pica uel denominant. & nimirum cum foetum sexus femine ferunt, auidiùs appetunt, minusque re frui iam præsentem, quam cupierint, possunt. fastidiunt enim statim, quod modo uehementer appeterent. Pau-

cis

cis contingit, ut melius habeant, cum uterum gerunt. Sed præcipue tunc fastidiunt, tædioq; fatiscent, cum foetui capillus oriri incipit. Pili congeniti gravidis desunt, paucioresq; redduntur, contra qua parte pilos minime habere solebant, ea magis accipiunt. plus etiã motus magna ex parte mas in utero infert, quã fœmina, & celerius prodit. fœminæ enĩ partus tardior est. Dolor etiã ex fœmina continuus, sed obfusior; ex mare acer, & longe molestior. Quæ paulò ante partum concumbunt, facili pariunt. Parturire interdum mulieres videntur, cum tamen tempus non sit, sed quoniam fœtus inuertit suum caput, ideo initium hoc esse parturienti uidetur. Sed cum cætera animalia omnia singulari, ac simplici modo partum suum perficiant (Vnum enim pariendi tempus statutum omnibus est) homini uni multiplex datum est: nam & septimo mense, & octauo, & nono parere potest, & quod plurimum decimo, nonnullæ etiã undecimũ tangunt, fœtus qui maturius, quã septimo mense prodeat, nullo pacto uitalis est. qui septimo, uitalis quidem hic primus exit, sed magna ex parte infirmior: quamobrem cunabulis ex lana eum obuoluunt, & fascijs alligant. Meatus etiã nonnulli inissi, ut aurum, aut narium serpenumero generantur: sed accrescenti articulantur infanti, & demum suam formam recipiunt. & pleriq; de his quoq; septimo natis uiuere atq; adlescere possunt. Qui autẽ mense octauo nascuntur, uiuere ac adlescere in terra Aegypto possunt, & quibusdam alijs in locis, ubi mulieres fertiliores sunt, multosq; simul facile, & ferunt & pariunt, etiã si monstrosi sint, sed locis Græcæ multi intereunt, nec nisi pauci seruantur. unde sit, ut si quis seruetur, non octauo mense natus existimetur, sed mulierem sui conceptus initium latuisse, infestantur maxime mulieres mense quarto, octauoq;. & si uel quarto, uel octauo fœtus perierit, ipsæ quoq; magna ex parte intereunt. itaq; sit, ne solum mense octauo nati non uiuant, sed etiã ipsis mortuus periculum, quæ pariunt, subeant. Simili modo & qui diurniores, quã undecimo mense nasci videntur, latere putantur. latet enim mulieres conceptus initium, si cum antè inflatus fuerit uterus, ut sæpe accidit, post coierint, atq; conceperint. hoc enim principii esse sui conceptus existimant, quod simile indicium attulit. Ita multiplex perficiendi tempus, pariendiq; diuersum homini datum est. Et cum alia singulos pariant, alia plures, genus humanũ in accipit est. Nam quod plurimũ & locis plurimis agitur, mulieres singulos singulæ pariunt. Sed sæpe & locis plerisq; geminos etiã, ut in terra quoq; Aegypto fieri certum est. pariunt etiã tres, & quatuor. & quidem locis nonnullis ualde ita sit, quod dictum iam est. sed quinque complurimũ nascuntur. Iam enim hoc pluribus euenisse conspectum est, & quædam uiginti, partibus quatuor ædidi: quinos enim singulis partibus enixa est, marq; eorũ pars enutriti & adlescere potuit. Et cum in cæteris animalibus gemini nati, etiã si mas & fœmina sint, nihilo minus enutritur, seruenturq;, quã si mas res ambo, aut fœminæ sint: in genere certe humano pauci gemini seruantur, si alter mas sit, alter fœmina. Mulier & equa omnium maxime animalũ grauidæ coitum patiuntur, cætera ubi grauida fuerint, fugiunt mares, ea scilicet quorũ natura superfoetare more leporis recusat, uerum equa nunquã superfoetata, sed magna ex parte unum tantũmodo generat. At uero in muliere raro quidem euenit, ut superfoetet, sed factum tamen aliquãdo est. Qui itaq; longo post tempore sint concepti, nihilo perfici possunt: sed præmaturius dolorem, quo ipsi, & primus fœtus intereat, mouent. Iam incidit, ut facta corruptiõe duodecim superfoetata puerperia egererent. At uero si proxime à primo conceptu secundus sit factus, absolui adiq; potest, quod superfoetarit, ut quasi gemini nasci uideantur: quomodo Hercule & Iphiclem procreatos esse fabulantur. Nam id etiã constitit adultera quãdam, quæ alterum suum marito, alterũ adultero similem peperit. Iam & cum geminos quãdam ferret, ter-

tium superfoetavit: & cum tempus pariendi iustum iam esset, primos vitales peperit, secundū quinto mense elisit, qui statim mortuus est. Altera cum primum septimo peperisset, qui mortuus est, mox duos iusto mensium numero adidit, qui vixerunt, quædam etiam sub abortu conceperat, atque alterum abegerunt, alterum continuerunt, pertuleruntque ad partum, plurimis si concubuerint mense octavo, infans mucore oppletus exit, esculentorum etiam, quæ mater comederit, sæpe gerulus uenit in lucem. & si sale immodice usa est, ipse sine unguibus nascitur.

De lactis bonitate, & malignitate, deque menstruorum muliebrium fine. Cap. V



Ac quod ante septimum mensem contractū est, inutile est, sed simul infans natalis est, & lac esse utile incipit, prius autem salsum etiam est, ut pecoris. Vino præcipue cum uterum serunt plurimæ infestantur, dissoluitur enim si biberint, atque debilitantur. Principium & finis mulieribus prolis recipiendæ, maribus præbendæ, seminis & menstruorum emissio est. Sed neque cum incipiunt statim prolifica sunt, neque cum desinunt, & iam pauciora sunt, & infirmiora. Quanam ætate incipiant menstrua & semen, dictum iam est. Sed desinunt plurimis menstrua circa quadragesimum annum: quod tempus quæ excesserint, ipsæ ad quinquagesimum seruantur, etiam nonnullæ eo tempore pepererunt, sed ultra hoc tempus nulla potest protrahere.

Vsq; quo maribus sit generandi facultas, & de prolis similitudine cum parentibus, 60
vel cum alijs. Caput VI



Ares plurimi ad sexagesimum generant: quem si excesserint, ad septuagesimum usque procedunt. Et iam quidam annos septuaginta nati, genuerunt. Euenit sane multis & mulieribus & uiris, ut qui coniuncti inter se nequeant procreare, ubi dissociati se iungere cum alijs, queant, quod idem in maris quoque, aut foeminae procreatione nimirum euenire certum est, plerumque enim tum mulieres, tum uiri, quandiu cum eisdem iunguntur, foeminam tantum, marem uero procreant, seiuncti autem contrā. Aetatis etiam ratione immutantur, ut iuuenes inter se foeminas generent, seniores facti marres, aut contrā. Ratio quoque generandi omnino discrimen hoc idem recipit, ut iuuenes nihil procreent, seniores iam incipiant generare. Aut contrā, ut qui antea possent, post nihil possint foetificare. Sunt etiam aliquæ mulieres, quæ uix concipiant, sed si conceperint, perficiant, atque ædant. Aliæ contrā, facile quidem concipiunt, sed seruare non possunt. Sunt & uiri, qui non nisi foeminā procreent, & mulieres, quæ non nisi marem: & contrā, ut de Hercule fabulantur, qui inter duos & septuaginta liberos foeminā unam tantummodo genuit. Quæ concipere nequeant, si uel cura adhibita, aut aliquo casu conceperint, foeminam magna ex parte pariunt potius, quam marem. Multis etiam uiris euenit, ut cum antea possent generare, post nequeant, deinde rursus facultatē recipiant generandi, gignuntur læsi quoque ex læsis, uerbi causa, claudi ex claudis, & cæci ex cæcis, denique similes sæpe numero in re, quæ præter naturam comiteur, & signa habentes sibi cognata hereditaria, ut uerucas, ut nauios, aut cicatrices, aut quid aliud generis eiusdem. Iam tale quid uel tertia prole post regeneratum est, ut cum quidam suo in brachio puncti notam haberet, filius non id retulit, sed nepos ea corporis parte nigritiem quandam habens confusus prodijt. sed raro hæc eueniunt. Integri autem ex mancis ne gignantur, nulla res obstat, & sæpissime ita agitur, similes etiam aliqui parentibus, aut auis, suisque maioribus generantur. Aliqui similitudinis nihil referunt. redditur etiam uel plures eiusdem prosapia, ut in Sicilia eius, quæ adulterium cum Aethiope commiserat,

miserat, filia non colorem patris æthiopis retulit, sed qui natus ex hac est, is auum æthiopem regenerauit. Fœminæ magna ex parte matrī, mares patrī proueniunt similes, sed sit etiā diuerso, ut fœminæ patrī, mares matrī similes procreentur. Particularim etiā similes fiunt, ut alia corporis parte similes sint patrī, alia matrī, gemini uel dissimiles inter se natiā sunt, sed plurimi magna ex parte similes prodeunt. nam & quædam cum septimo die à partu concubuiſſet, concepiſſetq̃, peperit ſimilem ſuperiori quaſi geminū. Naturæ etiā ratione alix ſibi, alix ſuo marito ſimiles generant, ut equa pharſalia cognomine iuſta.

Quomodo ſemen genitale informetur.

Cap. VII



Vm ſemen genitale exit, ſpiritus antecedit, & quidem ipſo exitu conſtat agi cum ſpiritu, nihil enim procul ſine uolentia ſpiritali proijci po-
teſt. Tum inſinuatum in utero, diuq̃ contentum, membrana obdu-
citur: quippe quod antequam diſcernatur, exeat uelut ouum in ſua
membranula contextum, detracto putamine, membrana autem ipſa
uenis reſerta eſt. omnia uero tum natatilia, tum peſtiſtria, tum etiā uolatilia, ſiue
animalis, ſiue oui forma proueniunt, ſimili modo gignuntur, niſi quod alia umbi-
licum habeant uulux adherentem, uidelicet quæ animalis forma enaſcuntur, alia
ouo, alia utrōq̃ modo, ut in quodam piſcium genere: & alia quaſi membranis con-
tinentur, alia ſecundis. primum intra ultimum inuolucrum animal gignitur, mox
altera membrana obueſat, plurima quidem ſui parte uulux adherens, ſed parte e-
tiā ſeiuncta, & aquam continens. humor autē inter has cruentus aquoſuſq̃ eſt,
quem mulieres proferum uocant.

De alimento animalis in utero exiſtentis, deq̃ hominis ſtatu in eodem:

Caput VIII



Agentur animalia omnia quibus eſt umbilicus, per ipſum umbili-
cum, hic acetabulis uulux adheret, ſi ſunt. Sed ſi læuis ſit uulua, ipſi
uulux adheret uena ſubiecta, ſitus in utero quadrupedum omnium
extenſus eſt, expedum autem obliquus, ut piſcium, bipedum uero
inflexus contractuſq̃, ut auium, homo etiā in ſemet conglobatus
ſic geſtatur, ut naſum inter genua, oculos ſuper genua, aures extra genua habeat,
omnibus æque animalibus caput primum ſuperius eſt: ſed cum creuerint, & iam
exitum appetant, deorſum deducitur. Ita ſit, ut omnibus partus ſecundum natu-
ram in caput, contra naturam in pedes, aut inflexo circumactōq̃ corpore agatur.
quadrupedes uel excrementū iam inde habent, & alui, & ueſicæ, alterum in po-
ſtremo inteſtini, alterum in ipſa ueſica. Quibus in uulua acetabula ſunt, foetus ac-
creſcente, acetabula ipſa ſubinde minuuntur, poſtremo abolentur omnia. umbi-
licus autem uelut putamen eſt circa uenas, quarum origo ab utero eſt, aut aceta-
bulis ſi habentur, aut uenæ cōmiſſa eſt. Sunt foetui maiori, ut bovi quatuor uenæ,
minori duæ, minimo una, ut auius. pertinent duæ ad foetum per ſecur, quæ por-
tas appellant, ortæ à uena maiori. reliquæ duæ ab aorta, qua ſinditur, & duæ de
una efficiuntur. Vtrunq̃ uenarum par membranulæ ambiunt, & membranulas
ipſas ambit uelut putamen umbilicus. Collabuntur ſubinde uenæ, & quo foetus
amplius creuerit, eo adductius ipſæ contrahuntur. Foetus autē grande-
ſcens caua uteri ſubit, ubi palpitans iam ſentitur, & circa
genitale parentis interdum uoluitur.

De doloribus mulierum in partu, & que facile, que ut difficulter pariant.

Cap. IX



Vm mulieres parturiunt, dolores multas quidem in partes incubunt, sed plurimis ad alterutrum femur. Cæterum quibus alium tormina uehementer exercent, ocyllime pariunt. quæ lumbos dolent, uix pariunt. quæ in uentre, expeditius. Si mas nascitur, profuit sanies diluta pallidiuscula: sed si femina, cruenta: uerum ea quoque præhuz mida est. sed fieri quoque potest nonnullis, ut eorum neutrum accadat. Cæteris animabus partus non laboriosi eueniunt. minus enim cum parturiunt, infestari uidentur. At mulieribus dolores uehementissimi incidunt, & præcipue stabilibus, & selularijs, & quibus non bona latera sunt, neque facultas retinendi spiritus suppetit. difficilius etiam ædunt, si interea dum per uim retinent, coactæ eruperint respirationem. primum aqua illa subter cutem fusa, per foetus motionem, rupis membranis effluit, deinde foetus in uerso utero, & secundis interna euoluens, foras uenit in lucem.

De obstericis cura, & de infantis exitu, de tarditate durationis ossium,

& dentium amissione.

Caput X



Am uero & obstericis officium pars ingentij, perspicacisq; intelligentiæ est: non solum enim difficultati partus opportune expediteq; succurrendum est, sed etiam contra ea quæ accidunt, protnus agendum ingeniose. & in secundo deligandoq; umbilico infantis prudentia requiritur, & peritiæ. nam si simul secundæ quoque exciderint, uellere umbilicus cum secundis alligatur, superiusq; præciditur. quæ autem deligatum est, coharefcit, & pars continua decedit, si copula, amentumq; dissoluatur, foetus sanguine effuso emoritur. Sed si secundæ non statim cum foetu exierint, dum intus ipsæ, foris autem infans est, deligato umbilico secantur. sæpe uisus est puer emortuus nasci, cum ed infirmo, priusquam deligaretur umbilicus, sanguis in umbilicum, & circa efflueret. Sed iam aliquæ obsterices factæ peritiores, reprimunt intro de umbilico sanguinem, quo factio statim infans, qui modo exanguis deficiebat, recreatur, uitæq; resutuitur. Nascuntur, ut dictum est, secundum naturam cætera etiam animalia uersa in caput. sed pueri manus quoque ad costas porrectas, extensasq; habent. Qui cum exierint, uocem statim emittunt, & manus in os admouent, excrementum etiam reddunt, alij statim, alij breui, sed omnes intra diem: quod excrementi pluris, quàm pro infantis magnitudine est. papauer culis hoc mulieres uocant. colore cruentum, atq; admodum nigrum & piceum est, mox lacteum iam & albidum rediditur. fugit enim confestim ubera infans. uocem antequam egrediarur, nunquam emittit, etiam si cum difficulter egreditur, caput extet, corpus intus sit rotum. Quibus purgationes partum anticipant, difficilius liberantur. sed si à partu purgationes parcius sequantur, nec largius, quàm primæ, neq; ad quadragessim diem perseuerauerint, efficitur ut mulier ualidior sit, & celerius possit concipere. Infantes autem primis quadraginta diebus neq; ridere cum uigilant, neq; lachrymantur: sed noctu & per quietem utrunq; interdum faciunt, nec uero sentiunt magna ex parte cum scalpuntur. Plurimam huius temporis partem dormiunt. cæterum in dies quo subinde auctiores fuerint, eo magis ad uigilandum immutantur. Somnare etiam eos constat, sed sero meminisse possunt imaginum. Cæteris quidem animalibus discrimen ossium nullum est, sed omnia perfecta iam inde à natiuitate proueniunt, at pueris incipit molle est, seroq; duratur. & cum cætera animalia nascantur cum dentibus, pueri septimo mense dentire incipiunt. primum ædunt primo

res,

res, alij superiores prius, alij inferiores, deniq; omnes maturius dentiunt, quorum nutrices lac habent calidius.

De aduentu lactis in muliere, & malo pilari, deq; lactis duratione.

Cap. XI



Post partum, purgationesq; lactis copia excidatur, & nonnullis effluit non solum de papillis, sed etiam passim per ubera. aliquibus etiā per alas, edurantq; in posterū globuli, quoties humor non coquatur, nec exeat, sed redundet. ubera enim tota fungosa ita sunt, ut si in poculo pilum forte hauserit mulier, dolor moueatur in mammis, quod malū
 10 pilare appellant, nec sedatur donec pilus uel pressus exeat sponte, uel cum lacte exogatur. Seruatur lac donec mulier concipiat, tum desinit atq; extinguitur, tam in homine, quā in quadrupedum uiuiparo genere. Quandiu lac emanat, purgationes magna ex parte non fiunt; magna inquam ex parte, quoniam iam quibuldam lactantibus facta purgatio est. Sedenim natura ita fert, ne humor locis pluribus si-
 mul crumpere soleat, nam & mariscas habenti, deteriores accedunt purgationes, & quod in nonnullis accidit, cum delapsus humor à lumbis per anum excernitur, antequā uterum subeat, idem euenit. Quibus dum etiam purgationes non fiunt, inciderit uomitus, securius exigunt.

*πύλας pilare
malum in mam-
mis.*

Pueros ut plurimum ante septimum diem conuulsione interire.

Cap. XII



Olent pueri plurimi conuulsione excipi, & præcipue corpulentiores, & lacte uescentes copiosiore, crassioreq; & nutricem lactentes succi plenam, & corpulentā. nocet etiam ad hoc morbi genus uinum, magisq; nigrum quā album, & quod minus dilutum est, atq; etiam ex
 10 cibis, qui inslent, plurimi obsunt. Et si aluus subsisterit, nocuū est. Plurimi ante septimum diem intereunt. unde fit, ut nomina septimo die imponantur, tanquam saluti iam pueri magis credamus, plenilunio etiam infestantur hoc malo periculosius, & si à scapulis conuulsio oriatur, in angusto spes est.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE HISTORIA ANIMALIUM LIB. OCTAVVS, INTERPRETE THEODORO.

De uarietate actionum, & uictus omnium animalium.

Caput I



GENERATIO, & reliqua animalis natura ita se habet. A cū
 40 ones autem & uitæ, pro moribus uictuq; differunt. sunt enim uel in plurimis cæterorū animalium, uestigia morum animi humani: quanquā hæc apertius in homine discernantur. Inest uirbanitas, feritas, clementia, acerbitas, fortitudo, ignauia, metus, fidentia, ira, malitia. atq; etiam prudentiæ imago inest in multis, quemadmodū cum de partibus docerem, exposui. alia enim eō
 quod magis, minus uel habeāt, comparatione hominis differunt: homoq; ipse cum multis alijs animalibus ita dissidet. quippe cum aliqua ex his magis in homine habeantur, aliqua in cæteris animalibus latius, alia uero differant proportionē. ut enim in homine ars, sapiētia, prudentia, sic in nonnullis brutis inest uis quædam eiusmodi altera naturalis. constat hoc ita esse planē argumēto puerilis ætatis, in qua futurorū habitum, quasi uestigia & semina uideris. & tamen nihil per id tempus animam hominis differre à belluarū anima propē dixirim. itaq; nihil remotum à ratione est, si

K 3

partim eadem, partim similia, partim ex proportionem in cæteris animalibus habentur. sed adeo de inanimatis paulatim, sensimq; ad animata natura transit, ut continuatione ipsa lateat eorum confinium, & medium, utrius nam sit extremi. Iam ab animantium genere primum genus plantarum est, earumq; alia ab alia differt, eo quod magis uitæ particeps esse uidetur. uniuersum autem genus respectu corporum cæterorū quæ anima uacant, ipsū quasi animal est: at respectu animalis, in anime esse uidetur. Sedenim digressus hinc ad animalia continuus (ut modo dixi) procedit. sunt enim maris nonnulla, quæ ambiges animal ne sint, an plantæ: hærent enim, & detracta complura id genus intereunt. uerbi gratia, pinnæ adherent, ungues euulsi uiuere nequeunt. deniq; genus uniuersum eorum, quæ testa integuntur, plantæ simile respectu gradientium animalium est. Quin & uis sentiendi ira habetur, ut aliqua nullum eius indicium præbeant, alia leuiter & perobscure sentire uideantur. Nonnullorū natura corporis carnosa est, ut eorum quæ tubera appellantur, aut urtica. At uero spongia omnino similis plantis est. Cæterū paruo quodā discrimine subinde alia præ alijs iam adipisci uitā, morumq; uidentur. Quod idem in muneribus etiam uitæ percipere licet. plantarū enim nullum aliud munus esse uidetur, nisi quoad similem quæq; sibi faciant alteram, uidelicet quæ semine oriatur. sic animalium etiam quorundam nihil muneris præter generationē acceperis. unde fit, ut eiusmodi actiones sint omnium cōmunes. sed procedente sensu, iam ueneret coitus uoluptate uita eorum discrepat, atq; etiam partus, enutriendæq; proles ratione, itaq; alia simpliciter perinde ut plantæ, officio procreandi fungitur suis temporibus: alia in enutrienda etiam prole laborant, sed cum perfecerint, desistunt, nec ullam in super seruati societate. Alia quæ prudentiora sunt, & plus memoriz forteantur, ciuilius agunt cum prole. Prima igitur pars uitæ animalium in officio procreandi consistit, altera in alendo. In his enim duobus studium omnī uitæq; uersatur. Cibi autem differunt potissimū ratione materiæ, ex qua ipsa quæ aluntur consistunt. Incrementū enim quibusq; secundum naturam ex eadem qua confluerint, materia fit. Quod autem secundum naturam est, id siue contingit: sequunturq; omnia eam uoluptatem, quæ secundum naturam est. Degunt igitur animalia locis disuncta: alia namq; terrestria, alia aquatilia sunt. quam differentiam tripartitam intelligimus, aut enim recipiendi aëris, aut aquæ ratione, altera terrestria, altera aquatilia dicimus. aut quod apta natura sunt seruari temperamēto alterutri, quanq; aërem aquam ue non recipiant, aut etiam quod cibū petant, uersenturq; utrobique diutius. complura enim cum recipiant aërem, partusq; faciant in terra, cibum tamen à locis madidis petunt, uersanturq; in humore partem maximā temporis. quæ sola uitam ambigua agere uidentur, quippe quæ eadem, & uelut pedestria, & uelut aquatica statui possint.

De uictu aquatiliū animalium.

Cap. II



Teorū quæ humorem recipiunt, nullum uel pedestre, uel uolatile est, nec cibum sibi ex terra petit, quanquā multa spirabilis pedestrisq; generis humore gaudent, & ita nonnulla, ut ne uiuere quidem clusa ab aque natura ualeant, ut quæ marinæ testudines appellantur, & crocodili, & fluuiatiles equi, & uituli marini, atq; etiam ex minori genere testudines lutariæ, siue mures aquatiles dicti, & ranæ. hæc enim omnia, nisi aliquandiu spirent, intereunt, & parere, educareq; solent in sicco. Natura omnium maxime animalium superflua, peculiarisq; delphino, & si quid aliud tale, uel in cetero genere, uel in reliquo aquatili sit, ut balæna, & quæcunq; fistulam gerunt. hoc enim genus nec pedestre tantum, neq; aquaticū facile dixerim. Si quidem terrestre, quod aërem recipit: aquatile, quod aquam secundum naturā, est. particeps namq; est

est utriusq; cum & mare accipiat, reddatq; per fistulam, & aërem per pulmonem. habent enim hoc membrū, & spirant. Quamobrem delphinus retibus apprehensus, breui tempore strangulatur, ut qui spirandi facultatem amiserit, foris uero diutius uiuere potest mutiens, & anhelans modo cæterorū spirantium, quinetiam dormiens rostrum exirit supra mare, ut spiret. Sed in utraq; diuisionis tam contrariorū parte collocari hoc genus absurdum est. quamobrè aquatile genus amplius distinguendū uidetur, ut alia accipiat, reddantq; aquā, ea causā quā spirantia aërem, quo refrigeretur, alia propter cibum. Cum enim in humore cibum accipiunt, fieri non potest, quin simul aliquid humoris admittatur: quod admissum, quo emittant, instrumentū habeant necesse est. Quæ igitur proportionē spirationis humore utuntur, branchias habent. quibus autem per cibum humor illabitur, ijs fistula in sanguineo genere data est. Mollibus etiam & crustaceis hoc idem adhibitum est: nam ea quoq; humorem propter cibum accipere coguntur. sed altero illo modo aquatilia sunt, temperationē corporis dico, & uictum, ut quæ accipiant quidem aërem, sed in humore atatem degant, aut quæ accipiant quidem humorem, & branchias habeant, sed terram petant, unde cibum accipiant, quale unum adhuc tantummodo nouimus cordulum nomine: hic enim non pulmonem, sed branchias habet, egressusq; cibum petit in terra. & quadrupes idem est, ut ad ambulandum idoneus. Horum autem omnium natura quasi peruersa uidetur, sicut marium nonnullorum natura sceminam refert, sceminarum marem. exiguis enim quibusdam partibus suis natura animalium immutata, plurimum toto in corpore differre uidetur, quod laillime in excisis patet, particula enim quadam oblecta, totum animal in sceminam uertitur, quapropter in prima etiam ortus constitutione minimæ magnitudinis quoquam immutato, dummodo sit principale, efficitur ut alterum masculinum sceminam reddatur: atque si omnino tollatur, neutrum prodeat. Itaq; terrestres etiam & aquatile esse modo utroq; prædicto, parte animalis exigua immutata potest, ut alia terrestria, alia aquatilia procreentur: & alia uitam simplicem agant, alia ambigunt, propterea quod generatione suæ constitutionis materia tali participarint, qualem sibi in cibo assumunt. Charum enim cuiq; sua uictus est, quod per naturam habetur, ut superius diximus. Sed cum animalia trifariam in aquatile, & terrestre diuidantur: aut enim recipiendi aëris, aquæ uel necessitudine, aut corporis temperatione, aut tertio uictus ratione, uitæ prorsus discrimen pro his diuisionum membris consequetur. alia enim temperandi corporis gratia, & uictus ratione, atque etiam recipiendi aëris, aut aquæ necessitate ita degent, alia temperamenti, uictusq; causā tantum. Igitur eorum, quæ testa operiuntur, nonnulla immota aluntur humore dulci, & potulento, qui per spissā transmittitur, cum tenuior ipse mari concocto eliciatur, quemadmodum & primo naturæ ortu instituiuntur. Dulcem autem contineri humorem in mari, atque ita transmitti & percolari, constat eo experimēto, quo si ex cæra uas tenui latere sinxeris, idē annexa linea in mare demittas inane die ac nocte una, humoris copiam dulcis intra se colliget. Vtricæ pisciculis fortè incidentibus uescuntur, os in medio habent, quod in maioribus euidens est. Meatū etiam ut ostreæ, quo excrementū secedat, habent parte superiore. Vtrica enim ipsa quasi ostreorū caro esse uidetur inclusa saxo, perinde ut testa, patellæ etiam secedunt absoluentes sese, ut uescantur. Quæ autē mobilia, eademq; carne uescencia sunt, ijs uictus ex pisciculis est, ut purpuri. sunt enim carniuoræ, & quidem esca huiusmodi capiuntur: quanq; ijs etiam quæ mari pullulant, alliciuntur. Testudines marinæ conchulas petunt, habēt enim os omnī robustissimū. quicquid namq; in os ceperint, siue lapidē siue quoduis aliud, perfringūt ac deuorāt. exeunt etiā in terrā, & pascunt herbā, laborant plerumq; & intereūt quoties innatantes sic.

facilius possint euadere. Alioquin pauci admodum seruantur. quippe cum delphini celeritas, atq; edendi facultas, mira esse uideatur. Anguillæ paucæ quædam, certisq; locis uescuntur limo, atq; edulij, si quis apponat: sed plurimæ dulci humore uiuunt. Idq; qui uiuarijs anguillarijs dant operam, seruant, ut quam maxime pura, synceraq; sit aqua, affluens semper, & effluens per ripas, ubi uiuaria extruunt, nam nisi aqua sit clara, breui astrangulatæ intereunt. branchias enim habent exiguas. hinc turbare aquâ soliti sunt, qui eas piscantur. Et quidem in Strymone amne circa uergilias capiuntur. tunc enim aqua & lutum aduersus flatibus inturbatur, alioquin satius est quiescere. Anguillæ non superfluitant mortuæ, nec sursum, ut cæteri pisces, maxima parte efferuntur: sunt enim uentre exiguo. pingue in paucis inest. plurimæ eo carent. uiuere exemptæ aquis, uel ad diem quintum, sextumq; possunt. & aquilone plures diutius durant, austro minus. & si æstate de lacu in piscinam transferuntur, uiuere nequeunt: sed si hyeme, facile sedis mutatione patiuntur. nullam deniq; uehementem mutatione tolerant, & quidem æstate: etiam si in frigidam aquâ transfers, omnes plerumq; intereunt. Quin & si exigua in aqua stabulentur, pereunt. quod idem & cæteris piscibus euenit. strangulantur enim si semper eadem in aqua exigua uersantur, quomodo spirantia animalia intereunt, si in aëre exiguo claudantur. Vita anguillis nonnullis uel ad septem, octoq; annos protrahitur. Victus fluuialibus etiam tum ex mutua sui generis præda, tum ex herba, radice, & si quid in ceno comperiant. nocte potius pascere, interdum secedere in altum soliti sunt. Talis piscium uictus est.

De uictu autem, & que carniore, que frugiuore, que uel omniuore sint, que item cibum è terra, que ex aquis petant. Caput III



IN auium genere, quibus ungues adunc, omnes carniore sunt. fruges autem ipse, etiam si in os indideris, nequeunt deuorare, ut genera aquilarum omnia, milui, accipitres ambo, id est, palumbarius, & fringillarius, qui multo inter se magnitudine differunt, atq; etiam buco, qui miluo æquiparatur magnitudine, semperq; ipse cernitur. ad hæc ossifraga, & uultur, & ossifragæ magnitudo maior quam aquilæ, color ex cinere albicans. Vulturum duo genera sunt, alterum paruum, & albicantius: alterum maius, ac multiformius. Nocturnarum etiam nonnullæ aduncis unguibus sunt, ut cicuma, noctua, bubo. species similis noctuæ bubo est, sed magnitudine nostri minor quam aquila. Itē aluco, ulula, asio. Aluco maior gallinaceo est. ulula compar. picas utriq; uenantur. asio minor quam noctua est. hæc tria simili specie constant, & carne uiuunt. Sunt etiam in genere non adunco, quæ carne uescuntur, ut hirundo, alia quæ uermiculos petunt, ut fringilla, passer, rubetra, luteola, parus. cuius genera tria sunt: fringillago, quæ maior est, quippe quæ fringillam æquet. alter monticola cognomine est, quoniam in montibus degat, cui cauda longior. tertius magnitudine sui exigui corporis discrepat, quanquam cætera similis est. Item ficedula, atricapilla, rubicilla, rubecula, silula, curruca, alilus, tyrannus, cui corpus non multo amplius quam locustæ, crista rutila ex pluma elatiuscula, & cætera elegans. cantuq; suauis hæc auicula est. Ad hæc florus, cui magnitudo quantæ fringillæ, & montifringilla, quæ fringillæ similis, & magnitudine proxima est, sed collo cæruleo, & in montibus degit, unde nomen accepit. tum etiam regulus, & frugilega. hæc & reliqua id genus uermiculis partim ex toto, partim magna ex parte aluntur. Spinam appetit ista, spinus, siue ligurinus, carduelus, item quæ auriuittis appellatur: hæc enim omnia uolitant in spinis. uermem autē, & quoduis aliud animal aspernantur. dormiunt hæc, & pascuntur eodem in loco. Alia culicibus gaudent, nec alio magis, quam uenatu

palmarum
pos, id est, atricapilla, quam eandem putant cum ficedula.

culicum uiuunt, ut pīpo, tum maior, tum minor, utrunq; picum martium uocant. similes inter se sunt, uocemq; similem emittunt: sed maiorem, qui maior est. Pascuntur ad maceriem aduolantes. Item galgulus, cui magnitudo quanta turturi ferè est, color luteus. lignipeta hic admodū est, magnaq; ex parte macerie pascitur, uocem emittit magnam. incola maxime Peloponnesi auis hæc est. tum uero enumerādas inter hæc est culicilega dictus, magnitudine parua quanta spinus, colore cinereus, distinctus maculis, uoce parua, qui & ipse lignipeta est. Alia frugibus uiuunt, ut palumbes, columbus, uinago, turtur. uiuuntur semper columbi, atque palumbes, sed turtur æstate tantū: hyeme se condit, latitat enim suo tempore. Vinago autumnopossimū & conspicitur, & capitur, cui magnitudo maior columbo, minor quā palumbi est. Modus maxime capiendi eam dum se in aquam bibendo propendit, ueniūt ad nostra loca cum iam fecerint prolem. cætera uero omnia quæ æstate accedunt, nidulant apud nos, & carne magna ex parte suos enutriunt pullos, excepto columbaceo genere. Omniū ferè auium, aliæ uictum à terra petunt, aliæ à fluuio, aliæ à lacu, aliæ à mari, sed palmipedes in ipsa aqua partem maximā temporis uersantur, & aliquæ ingurgitantes se, querūt quod comedant, fidipedes circa aquam. earumq; nonnullæ terra contentis alitibus uestuntur, quæ scilicet carnem non tangunt. Petit lacus & fluuios ardeola, & albardeola, quæ magnitudine minor est, rostro lato, porrectoq;. Item ciconia, & gavia, cui color cinereus. Ad hæc lunco, cinchilus, albicula, tringa, quæ inter minora hæc maiuscula est, turdo enim æquiparæ: omnibus his cauda motitat. Quinetiam calidris, cui cinereus color distinctus uarie, præterea genus alcedonū aquas adamat, quod duplex est: alterum uocale, harundinibus insidens: alterum mutum, quod ampliore corpore est. utriq; dorsum cœruleum. Trochilus etiam hoc loco ponendus est. Sed apud mare alcedo quoq; uersatur, & carulus. necnon cornices littora petunt, & quæ unda eiecerit animalia, tangunt: nam & his natura omniuora est. tum etiam gavia alba, & fulica, mergus, & rupex uictitant apud mare. palmipedū grauiore circa lacus, & amnes uersantur, ut anas, olor, phalaris, urinatrix. Ad hæc bosca similis anat, sed minor. et qui coruus appellatus est, cui magnitudo quanta ciconiæ, sed crura breuiora. palmipes, narsansq; est, colore niger, insidet arboribus, & nidulat in ijs, hic unus ex hoc genere. Item anser maior, anser minor, qui gregatilis est, uulpanser, capella, penelops, aquila dicta marina, & mare adit, & lacum. Multæ etiam herbis uestuntur. Alites unæ tum cætera, quæ superare possunt animalia, tum aues aggrediūtur, sed non sui generis. carniuoræ sunt modo piscium, qui plerumq; sibi cognatos rapiunt. Genus auium cum omne potu exiguo contentū sit, tum ad uncis nullus omnino usus bibendi est, præterquā paucissimis quibusdam, quæ & ipse raro utuntur, qualis possimū cinunculus est. miluus etiam uisus est bibere, quanquā raro.

De uictu serpentium, & cæterorumq; animalium cortice intestinum.

Cap. IIII



Enus animalium cortice intestum, ut lacerti, & reliquæ huiuscemodi quadrupedes, atq; etiam serpentes, omniuorū est: nam & carnem edunt & herbam. Serpentes omnium maxime animalium uel cupiditæ dediti sunt, sed desiderium ijs quoq; bibendi exiguum, & reliquis, quibus pulmo fungosus est, qualem omnia habent, quæ oua pariunt, & quibus parum sanguinis est. Serpentes uini incontinentes etiam sunt: proinde uiperas aliqui uino cum fictilibus ad sepes disposito uenantur, ebriz enim capiuntur. sed cum serpentes carniuoræ sint, quicquid ceperint succo exucto, reliquū totum per meatum sui secessus emittunt. quod idem omnia ferè id genus animalia faciunt, ut aranei: sed his fors fugendo euaporare mos est, serpentibus intus in uentre. accipit serpens

serpens undelibet quod datur, siue auis, siue bellua est. oua etiam deuorat, sed cum acceperit, reducit, & usq; eò retractat, quoad partē nactus postremā ē directio constituat, tum colligit se, in breuēq; contrahit, ut quod inditū suprà tenetur, in unum extenso corpore deducatur. quod propterea ita facit, quia gulam tenuem habet, & longā, diu & serpētes & phalangia uiuere possunt sine cibo: quod ex ijs, quā pharomacopolæ, id est, pigmentarij alunt, perpendi potest.

De uictu lupi, ursi, leonis, eorumq; quadrupedum, quæ ex lacubus, fluminiq;
uictum petunt. Caput V



Vadrapedū, quæ animal generant, syluestres, ex demq; serratæ dentibus, carne omnes uescuntur: nisi quod lupos alunt terram quandā cum esuriunt, edere. hoc igitur peculiare luporū sit. herbas autem non alio tempore tangunt, nisi cum morbo laborant, quomodo & canes herba ingesta euomunt, atq; ita purgantur. Lupi hominē illi potius petunt, qui inertes & unipetæ quidam sunt, quā qui uenatores. Quam autē alij glanum, alij hyænam appellant, corpore non minore, quā lupus est, iuba quæ equus, sed seta duriore, longioreq;, & per totū dorsum porrecta. molitur hæc insidias hominē. canes etiā (uomitionem hominis imitando) capit, & sepulchra effodit humanæ auidæ carnē, ac eruit. Vrsus animal omniorū est, quippe qui & fructus arborū quas conscēdit corpore lubrico edat, & legumina, & apes perfringens alueos, & caneros, & formicas. carne etiam uescitur, uiribus enim suis cōdens, inuadit nō solum ceruos, sed etiam sues feros, si clam repenteq; potuerit agere. taurus aperto Marte aggreditur, conferta iam pugna, sternit se relapsū, dumq; taurus ferire conatur, ipse suis brachijs amplectitur cornua, ore morsum armis deligit, pro sternitq; aduersarium. Ingredi uel duobus innitens pedibus erectus aliquandiu potest. carnes omnes præmaceratas, & propemodum putres comedit. Leo uescitur quidem carne ritu cætororū syluestrium serratorū, sed cibo incontinenter ad modū uicit, multaq; deuorat solida, sine ullo disiectu, mox nihil triduo, aut certe biduo edit: ferre enim inedia potest, ut qui iam ad multam satiētiā repletus est. parum bibit, excrementū raro emittit. tertio die uel utcūq; accidit, egerit, idēq; durum, aridum, & simile ut canis, flatum etiam alui acerrimū emittit, & urinam grauiter olentem; unde fit, ut canes arbores odorentur. mingit enim crure elato, ut canes ad stipites. sædum quoq; odorē in cibo relinquit ex suo halitu, profcissio namq; leone interiora grauiter olent. Sunt inter quadrupedes, feræq;, quæ uictum ex lacu, & fluiuijs petant. At uero à mari nullum, præterquā uitulus marinus. sunt etiam in hoc genere fiber, satherium, satyrium, lutris, latex, quæ latior lutre est, dentesq; habet robustos, quippe quæ noctu plerūq; egrediens, uirgulta proxima suis dentibus ut ferro præcidat. lutris etiam hominē mordet, nec desistit (ut ferunt) nisi fracti ossis crepitum senlerit. Lataci pilus durus, specie inter pilum uituli marini & cerui.

Quæ animalia lambendo, quæ sorbendo, quæ uē mordendo bibant, quibusq; rebus cornigera

omnia pascuntur, necnon de uictu suis.

Caput VI



libunt, quibus dentes serrati, animalia lambendo: atq; etiam nonnulla ex non serratis, ut mures. Quibus autem continui, sorbendo, ut equi, & boues, ut sus neq; sorbendo neq; lambendo, sed morsu. autum cæteræ sortu. Sed quibus collum est longum, intermittunt, caputq; resupināt. Porphyrio unus, morsu. Cornigera animalia tam fera, quā urbana, & quibus dentes serrati non sunt, omnia fruge, herbaq; uescuntur, nisi uehementer esuriant, siue excepto, qui minime herbæ frugum uē appetens est, sed radicū maxime ex omnibus animalibus, quoniam rictu aptissimo ad id negocij est.

facilime etiam omnium idem hoc animal ad quoduis pabulum affuescit, & celerrime quoque in pinguedine proficit pro sui corporis magnitudine. sexaginta enim diebus pinguescit. quantū autem profecerit, ij cognoscunt, quibus ea res curæ est, ubi ieiunium ad saginā constituerint. pinguescit fame præfatigatus triduo. & cætera quoque omnia ferè melius præfatigata fame pinguescunt. saginant à triduo iam qui sues obeant. Thracæ per saginam, cum primo die potum præbuerint, post interposito uno die præbent, tum duobus, deinde triduo, atque ita subinde augendo numerū usque in septimū, curant. pinguescit hoc animal hordeo, millo, sicu, glande, piro, cucumere. Sed maxime tum hoc, tum cætera, quibus uenter calidus est, quiete, immotioneque pinguescunt. cæterum sues pinguiore redduntur, etiam cum in luto se uoluant. 10 pascere gregatim pro ætate uelle uidentur. lupo etiam suis oblitere, repugnareque potest. Sexta pars ponderis quantum ponderarit uiuus, absumitur occiso in pilos, sanguinē, & reliqua id genus. Tam sues, quam cætera animalia omnia solent, cum lactantur, extenuari. hæc ita se habent.

Quibus rebus pascantur boues, & de eorum incremento.

Cap. VII

Boues & fruge & herba uescuntur. pinguescunt ijs, quæ statim cient; ut eruo, & faba fresa, atque etiam ipsa fabarum herba. Et seniores, si cure incisā spiritui adigas, deinde præbeas pabulum, pingues facies. Ad hæc hordeo uel integro, uel pinsito, & à gluma separato pinguescunt, & 20 dulcibus, ut sicu, & passa: uino etiam & frondibus ulmi: sed præcipue sole, & lotionē calidæ aquæ. Cornua iuniorū tepefacta in cera flectuntur, ducunturque facile, quō uolueris, nec pedum dolores sentiunt, si eorum cornua illinantur cera, aut oleo, aut pice. laborant armenta uehemētius pruina sollicitata, quam niue. Augentur iuuentæ amplius, cum plus tēporis expertes Veneris degunt. Quam obrem terræ Epiri incolæ, quas pythicas uocāt, annis nouem intractas Venerē ferunt, ut incrementū ampliter capiant, & setaurus nuncupant. has numero quas dringentas esse, & proprias regis accipimus, nec posse uiuere locis alijs, quanquam tentatum ab aliquibus est.

De pastu, & potu equi, muli, & asini.

Cap. VIII

Equi, muli, & asini fruge herbaque uescuntur, sed maxime potu pinguescunt. lumenta enim pro aquæ, quam bibant, usu, suo fruuntur pabulo; & quod minus potum aspernatur, id appetentius pabuli est, & plenius obesatur. Farrago pilum expolit, cum frugibus grauida est; sed duris iam horrens arstis inutilis est. Herba medicæ prima salx utilio datur, & cum fœtida aqua rigatur, incōmoda est. Boues claram bibere gestiunt. At equi, ut cameli, turbulentam & crassam suauius bibunt, quippe quæ ne ex fluxu uio quidem prius hauriant, quam pede inturbent. possunt uel ad quatuor dies tolerare sine potu, mox bibunt quæ multum.

De pastu, & potione elephanti, de quo et luto eiusdem, & cameli.

Cap. IX

Elephantus eodem pastu modios Macedonicos nouem, quod plurimum edere potest. Sed tantum dare periculosum est. sex, aut septem dedisse modios, in usu frequenti satis est. sed farinæ non plus, quam quinque, uini etiam quinque mares, quæ mensura heminas continet sex. Iam quidam amphoras aquæ mensuræ Macedonicæ quatuordecim eodem hausit potu, & 40 rursus à meridie eiusdem diei octo. Viuit magna pars camelorū annos triginta, sed multo plures nonnullæ, nam uel ad centesimū annum facultatem uiuendi protrahunt. Elephantem alij annos ducentos uiuere aiunt, alij trecentos.

Quibus

Quibus herbis oves & capra uescantur, & de causa impinguationis eorumdem.

Caput X



Ves & caprae herba uescuntur. pascere oues sedulae, atque stabiles solent. Caprae loca crebro permittunt, summaque tantum contingunt. Pinguescit potissimum ouis ex potu: quamobrem aestate salem dare die quinto soliti sunt, singulis centenis singulos modios. sic enim pecus incolume, atque pinguius redditur. Frequens igitur salis usus eo perinet, quando & paleis copiam salis admiscunt, ut subundae plus aquae hauriant: & autumno cucurbitam sale contactam afferunt: quod lac etiam auget. & agitatae quoque meridie, plus postmeridianis bibunt. foetis distenta ubera pendunt, quibus salis abunde est. opimat pecus olea, oleaster, aphaca, palea, herba, quae omnia efficacia sunt ex sanguine respersa. pinguescunt & haec plenius praefatigata inedia tri-
 10 duo. Aqua quibus autumno commodior aquilonia, quam austrina est. & pascua ad solis occasum spectantia profunt. itinera & labores extenuant. indicant pastores ouem ualidiorem, cum hybernis temporibus pruina, quam susceperit, seruauit, nam quibus uirum minus, parum praesua imbecillitate constantes, discutiunt suo motu quantum susceperint. Caro cuiusque quadrupedis deterior est, cum locis palustribus, quam editoribus pascit. Sunt porro frigoris patientiores, quibus cauda amplior, quam quibus porrectior, & glabrae exuiores, quam uestitiores. crispae
 20 etiam algoris impatientes sunt. Valent melius oues, quam caprae: sed robustiores caprae, quam oues sunt. ouium, quas lupo occiderit, pelles, ac uellera, & facta ex his uestis, longe quam caetera aptiora sunt ad pediculos procreandos.

De pascione, & potu insectorum.

Caput XI



Insecta animalia quibus dentes, omniura sunt. Quibus autem lingua, tantum humore undique eliquando sua lingua uescuntur. quorum alia omniura. Sunt, quibus gustus omniis saporum est, ut muscae: alia sanguiniora, ut tabani, & asili: alia succis plantarum, & fructuum uiuunt. Apis una nullis putidis affidet, nec utitur alio cibo quam
 10 dulci. Aquam etiam libentissime inde hauriunt, quam synceri, clarissimi fontes scaturiunt. Talis animalium uictus est.

ἐκ τῶν λείων, ἐλίκου, ἐκ τῶν γένδων.

De actionibus animalium, & rebus in quibus eadem uersantur.

Caput XII



Actio autem, & omne eorum negocium in coitu, procreatione, atque uictus solertia uersatur: necnon ad frigora, aestus, mutationes denique temporum pertinet. inest enim omnibus sensus natiuus mutationis factae frigore, aut calore. Itaque ut homines alij domicilia hyeme reptunt, alij qui amplioris provinciae principes sunt, sedem pro tempore mutant, ut morae aestate locis frigidis, hyeme tepidis trahant: sic bruta, quae loca possunt permutare, faciunt. Atque alia subsidium in ipsis consuetis sibi locis comperiunt,
 40 alia peregre proficiuntur. Iam ab autumnali aequinoctio ex Ponto, locisque frigidis fugiunt hyemem futuram. A uerno autem ex tepida regione, ad frigidam sese conferunt, aestus metu futuri. & alia de locis uicinis discedunt, alia de ultimis propere discedunt, ut grues faciunt, quae ex Scythicis campis ad paludes Aegypti superiores, unde Nilus profluit, ueniunt, quo in loco pugnare cum Pygmaeis dicuntur: non enim id fabula est, sed certe, genus tum hominum, tum etiam equorum pusillum (ut dicitur) est, degens in cauernis, unde nomen Troglodytae a subeundis cauernis accepere. Plateae etiam migrant, & de Strymone amne ad Istrum aduolant, prolemque ibi faciunt. abeunt uniuersae, ac priores expectant posteriores, propterea quod ubi montem superarint, uideri priores a posterioribus nequeant. Quinetiam pisces
 L

modo eodem, alij ex Ponto, aut in Pontum tranant, alij per hyemem ex alto in littora teporis gratia ueniunt, contrā aestate ex littore in altum uirantes aestum discedunt. Aues quoque imbecilliores hyberno & gelido tempore discedunt in campos, ut tepore potiantur: aestiuo autem repetunt montes, ut aestu careant. semper quæ imbecilliora sunt, prius utrauis ratione discedunt. Iam scombri antequam thunnus, coturnices antequam grues: altera enim Augusto, altera Septembri mense incipiunt. sunt profecto omnia pinguiora, quæ de locis discedunt frigidis, quàm quæ de calidis: ut coturnices autumnno, quàm Vere sunt pinguiiores. Fit enim ut simul de locis frigidis, & tempore calido discedatur. Sunt etiam Veneris appetentiora ueris no tempore, cumq; ex tepido discesserunt. Sed auium, grues, ut dictum est, ex ultimis in ultima abeunt. uolant statu sequundo. quod de lapide narrant, falsum est. Iapidem enim eas tenere fulcimento, quem, ubi deciderit, accipit utilem ad auri probationem aiunt. Palumbes etiam discedunt, & liuiæ, nec hybernare apud nos patiuntur, atq; etiam turtures, & hirundines: sed columbæ manent. Coturnices quoque discedūt, nisi pauca locis apricis remanserint: quod & turtures faciunt. uolant gregatim, tum palumbes, tum turtures, cum accedūt, & cum suo tempore abeūt. Coturnices cum ceciderint, si serenum sit, aut aquilonium tempus, sociantur, & prospere degunt: sed si austrinum, moleste, propterea quod parum uolant: humis dus enim grauisq; aufter est. Quam ob rem qui aucupantur, austrum, non aquilonem obierunt. omnino ægre propter sui corporis pondus uolant. sunt enim corpore grandiore, quàm suis pennis deferri possint, uociferantesq; ob eam rem uolant, laborant enim quasi oppressæ onere. cum hæc adeunt loca, sine ducibus pergunt. at cum hinc abeunt, duobus lingulaca, oto, & matrice proficiscuntur, atque etiam cynchramo, à quo etiam reuocatur noctu, cuius uocem cum senserint aucupes, intelligunt parari discessum. matrix forma perinde ac aues lacustres, est. atque etiam lingulaca, quæ linguam exierit prælongam, unde ei nomen. otus noctuæ similis est. pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde nomen accepit, quasi auritum dicas. nonnulli ululam eum appellant, alij alionem. blatero hic est, & halauricator, & planipes, saltantes enim imitatur. caput inuentus in altero aucupe, altero circumuenit, ut noctua. omnes denique aues unæ breui sunt collo, & lingua lata, aptæq; ad imitandū. Nam & Indica autis, cui nomen psittacæ, quam loqui aūt, talis est, & loquacior cum biberit uinum, redditur. Gregales ex auib; sunt, grus, olor, platea, anser minor.

De actionibus piscium, quorundamq; terrestrium in fugiendis aduersis.

Caput XIII



Piscium alij, ut dictum est, discedūt ab alto ad littus, & contrā de littore in altum, fugientes exuperantias caloris, & frigoris. Sed præstant pelagicis littorales, quippe qui cibo copiosiore, melioremq; potiantur. quæ enim sol ingruit, plura exeūt, ut sit in hortis: nam & lituus niger propius terrā oritur, alter similis erraticis est. Tum etiā bene ex calido frigiditq; temperata sunt loca maris terrena. quo fit, ut & caro eorū pisciū magis conliet, cum pelagiorū humida, mollis, solutaq; sit. Littorales sunt dentex, scarabæus, cernua, aurata, mugilis, mullus, iurdus, draco, pulcher, gobio, atque omne saxatile genus. Pelagiū sunt pastinaca, genusq; omne cartilagineum, & congrorum albi cantium genus, & hiatula, rubelio, glaucus, pagria uerē, scorpiones, congrī nigrares, murenæ, cuculi ambigunt. Sed discernit horum, diuersitate etiam locorum ac temporum existeret potest: ut apud Cretam insulam gobiones, omneq; saxatile genus satis pinguescit. Thunnus etiam post arcturum melior est: iam enim eo tempore ab infestis alij agitatione requiescit, quæ facit, ut sit in aestate deterior. Quin etiam

ἰπποπόσι-
ζοον, ambi-
gunt, scilicet an
littorales an pe-
lagij.

etiam maritimis lacubus genera plura piscium marinorum gigni apertum est, ut salpam, auratam, mullum, alios serè plurimos. Amas etiam in Alopeconneio reperiens, & in Bistonide lacu plurima genera habentur. Monedula magna ex parte non subeunt Pontum, sed in Propontide trahunt æstatem, & pariter hyemem in Aegeo. Sed thunnii, limariæ, amuræ subeunt Pontum Vere, æstatemq; ibi traducunt, & reliqui serè plurimi fusanei, & gregatilis generis eodem transeunt. Est sanè plurima piscium pars gregatilis, nec ullus grex caret duce. Petunt autem Pontum pastus gratia, qui uberior & commodior ibi, propter aquarum dulcium admixtionem suppeditatur. Belluæ quoque magnæ pauciores ibidem sunt, nam excepto
 10 delphino, & phocæna, quam tirsionem interpretor, nihil in Ponto maleficum est, nec delphinus hic magnus est, quanquam extrâ ubi aliquantum processeris, magni habeantur. Tum itaque uictus, tum etiâ partus gratia Pontum subeunt. Sunt enim ibi loca ad partionem aptiora, & humor dulcior ac potentior foetum melius educat. Sed cum pepererint, & proles iam adoleuerit, exest post Vergilius statim: & si hyems austrina sit, tardius, si aquilonia, citius, propter sequundi flatus commoditatem: prolesq; adhuc parua apud Byzantium capitur, utpote cum longior mora in Ponto non fuerit. Sed de cæteris & cum adeunt, & cum exeant, constat. Sarda autem una, cum adit, uidetur, & capitur: sed exiens nusquam uisa adhuc est, quod si qua apud Byzantium aliquâdo capiatur, piscatores sua retia lustrant propter exitus insolentiam: cuius rei causa est, quod solæ ipsæ subeunt litrum amnem,
 20 unde fisso flumine per abdutum terræ meatum defluunt in Adriam sinum. arguameto est, quod ibi contra euenit, quàm in Ponto: exeuntes enim semper capiuntur, subeuntes nunquam. Thunni dextrorsum terram contingentes subeunt, sed remeant contra: laeuum enim in latus se admouent, quod propterea facere dicuntur, quia dextro oculo clarius uidet sua natura, laeuo hebetius. Fusaneis, de quibus loquor, interdum meare, noctu quiescere in more est, pascuntur etiam nocte, nisi luceat luna, ita enim faciunt iter, nec uolunt quiescere. Quidam usuperitici rei marinæ nihilo eos moueri, sed quiescere à bruma ad æquinoctium uernum, ubicunque id temporis sunt, asseuerant. Monedula subeuntes Pontum capiuntur, exeuntes autem minus. optimæ in Propontide sunt, antequam pariant. At ceteri fusanei exeuntes potius capiuntur, & optimi per id temporis sunt. Cum uero adeunt Pontum, proxime Aegeum pinguisissimi capiuntur. quo subinde ascenderit magis, eo magis lentiores fiunt. sæpe etiam flatu austrino uehementius occurrente fit, ut cum monedula & combræ exeant, ac mari inferiore magis quàm circa Byzantium capiantur, discessum, sedisq; mutationem hoc modo faciunt. Hic idem affectus terrestribus etiam euenit, cum se abdunt, & latent. hyeme enim latebras subeunt, tempore iam tepidiore exeunt. ratio uero & latendi & patendi communis animalium ea est, ut sibi contra utriusque exuperantiam temporis opitulentur. latet aliquorum genus totum, aliquorum partim latet, partim non latet. Testa enim inuncta omnia latent, ut in mari purpura, buccinum, omneq; id genus. Sed absolutorum latibulum
 40 euidentius est: conduntur enim secessu, ut pectines facere uisuntur, aliqua leuiore quodam tegmine superimposito delitescunt, ut cochleæ terrestres, id est limaces, & adherentiù mutatio incerta est. Non tamen eodem tempore omnia latent, sed limaces hyeme. purpuræ & buccina canis exortu dies circiter tricenos cõduntur. pectines etiam tempore eodem. sed eorum plurima sanè latent, & algore urgente, & aestu.

ἐξῆν γὰρ τῶν
 ναύων οὐδὲν ἀλλ
 ὄμιον, ὡς ἂν
 ὄμιον γὰρ τοῦ
 πόντου. Plinius
 ut sic: Sed in
 Pontu nulla m
 trat bestia pisci
 bus malefica,
 præter uinū
 los, & paruos
 delphinos.

Quo tempore insectorum genera sese abscondant, aut æstus aut hyemis impetu.

Caput XIII



Insecta penè omnia conduntur, præter ea, quæ uitam in domicilijs cum hominibus agant, quæq; prius intereant, quàm annuū tempus excedant. latet hæc hyeme alia diutius, alia quandiu aliorum uehementia est, ut apes: nam ipsæ etiam cessant, & latent. cuius rei argumentum, quod minime cibum sibi appositum gustare uidentur, & si qua erepsit, ieiuna spectatur, uentre translucente, nullotq; penitus contento, quod manifestum sit. Quiescunt ab occasu uergiliarum usque ad uer. conduntur autem quæq; locis apricis abdita, & ubi sibi cubile constituere tutius solent.

De genere serpentum, quod hyeme abditur, deq; nonnullis piscibus quibus hyeme frigoris causa conduntur, quib; æstate propter calorem.

Caput XV



Anguinei quoq; generis multa se condunt, ut ea quæ interfecta cortice sunt, serpentes dico, lacertos, stelliones, crocodilos fluuiales. Mensibus quatuor frigidissimis hæc latent, nec per id tempus quicquam comedunt. Cæteræ quidem serpentes cauernas subeunt terræ, sed ut peræ sub saxis conduntur. Piscium etiam complures latere nouimus, sed aperitissime hippurum, quem equiselem nominauit, & coruulū siue graculum per hyemem, nam hi soli nunquam capiuntur, nisi certis quibusdam temporibus, eisdemq; semper, cum cæteri omnes ferè semper capiuntur. Murena etiam latet, & cernua, & conger. Saxatiles uero coniugatim mares cum foeminis conduntur, quomodo & fecundificare solent, ut turdi, merulae, peræ. Thunni etiam latet præaltilis gurgitarum ab ortu ad arcturi occasum ultimum, reliquo tempore quiescunt latentes, capiuntur nonnulli ex his, cæterisq; latentibus tempore sui secellus, cum se moueant locis tepidis, aut si temporis insolitæ quietes contingant. Prodeunt enim alia quantum de suo cubili pastum, & præcipue plenilunio, sunt magna ex parte suauissimi, cum latent. Primadæ in coeno se abdunt, cuius rei argumentum est, quod neque eo tempore capiuntur, & dorso feculento, pinnisq; adductis, oppressisq; spectantur. Verno autem tempore prodeunt, & appropinquant ad terram coetes, parientesq; quo tempore foetu grauidæ capiuntur, tempestiuæq; tantisper esse putantur. Autumno uero & hyeme deteriores sunt. Simul etiam mares pleni semine genitali, lacte appellato, per id tempus cernuntur: itaque præstant ad usum. prole adhuc parua difficile capiuntur: adultiore, iam larga captura propter insecti asili stimulum est. latent alia in arena, alia in luto, ore tantum detecto. plurima tempore conduntur solum hyberno, ut crustata, & pisces saxatiles, & raia, omneq; cartilagineum genus, diebus scilicet frigidissimis. quod ita esse eo argumento constat, quod minime cum aliorum est, capiuntur, sed piscium nonnulli æstate etiam latent, ut glaucus: hic enim per id tempus se abdit circiter dies sexaginta. Asellus etiam latet, & aurata plurimum temporis. asellum latere indicio esse uidetur, quod longo interposito tempore capiatur. Pisces uel æstate latere documento illo probatur, quod temporibus syderum fiant capturae, & præcipue caniculæ: mare enim per id tempus euertitur: quod latissime apud Bosphorum patet. limus enim in summa effertur, piscesq; innatant. aiunt etiam si gurgitum ima sapius teratur, plures eadem sagena capi secundo iactu, quàm primo. Tum etiam magnis imbribus multa apparent animalium genera, quæ antè uel nunquam, uel raro uisa fuerint.

De

De animalibus, quæ hyeme occultantur.

Capit. XVI



Vium etiam complures cōduntur, non ut aliqui putant, pauca, nec omnes ad loca tepidiora abeūt, sed quibus loca eiusmodi sunt uicina, solitæ sedi, ijs eō secedere libet, ut & miluos & hirundines agere animaduersum est. Quæ autē procul locis eiusmodi morantur, non mutant sedem, sed se ibidem condunt. Iam enim uisæ sunt multæ hirundines in angustissimis conuallium nudæ, atque omnino deplumes, milui etiam de huiusmodi locis euolasse, cum primū apparerent, uisi sunt. Latibulo genera distingui uel adunca uel rectungua non possunt. nam & ciconia latet, & merula, & turtur, & alauda, de turture quidem maxime omnium cōstat: nemo enim propē dixerim uidisse per hyemem uspiam turturem dicitur. latere autem incipit præpinguis, & quanquam pennas in latebra dimittit, tamen pinguedinem seruat. palumborū aliqui latent, aliqui non latent, sed cum hirundinibus abeunt. Turdus etiam latet, & sturnus, & ex genere unco miluus paucis quibusdā diebus, & noctua.

De quadrupedibus quæ hyeme lateant, de quibus ijs quæ senectutem exuunt.

Cap. XVII



Vadrupedum quæ animal generant, hystrices cōduntur, & ursi: sed utrum propter trigus, an alia de causa, ambigitur. pinguescūt ursi per id tempus, tum mares, tum fœminæ uehementer, ut mouere sese facile nequeant. parit etiam fœmina eo tempore, & tandiu latet quoad tempus sit, ut suos catulos in apertum producat, quod uerno tempore mense à bruma tertio facit. Sed quod minimum, dies circiter quadraginta latet: ex quibus bis septem ita sopitur, ut se nihilo moueat: reliquis postea pluribus latet quidem, sed mouetur, & surgit. foetu grauida uersa, uel à nemine, uel à paucissimis capta est. tempore sui latibuli hoc animal nihil edere certum est: quippe quod neque exeat, & caput uentre in intestinoq; inani uideatur. Narrant eus intestini per incisionem ita conuiuere, ut adductum propē cohæreat. Itaq; ursum latebram egressum primum herbam arum dictam degustare, ut intestinum laxetur, & hiet. Gires etiā latent in ipsis arboribus, pinguescuntq; per id tempus uehementer. itidem mures Pontici generis. Nonnulla ex ijs quæ conduntur, exuunt est, quod senectus uocatur, quod cutis ultima est, & primi ortus operculū. Sed in pedestri uiuiparo genere de urso, quæ de causa lateat, ambigitur, ut dictum iam est. Cortice intacta maxima ferē sui parte secessus suo tempore latent. & exuunt senectutē ea, quibus cutis mollis, nec prædura, & testacea quiddē est, qualis testudini (nam & testudo inter cortice intacta enumeranda est, & mus aquatilis) sed qualis stellioni, lacerto, & præcipue serpentibus est. exuunt enim hæc omnia, tum Vere cum egreditur, tum etiam autumno. Vipera etiā exuit tam Vere, quā autumno. Cum serpens exuere incipit, ab oculis primū detrahi aiunt, ita ut obocæri uideantur ijs, qui rem non intelligūt. tum caput exuitur: glabrum enim hoc omnium antequam reliquum corpus appareat, atq; una ferē nocte & die senectus tota exuitur à capite orsa & caudam, & cute altera intus subnascente ipsa remouetur. Vt enim foetus in uolucro secundarum quo cōtēntus prodierit, exuitur, sic ista senectute detracta renouatur. Insecta enim eodem modo exuunt senectutem, quibus hoc solitum est, ut silpha, & culix, & ea quorum pennæ uagina continentur, ut scarabæi. sed omnia factio iam quod gigni debuerit, exuunt. nam ut partui uiuiparo secundæ, sic uermiculariæ proli operculum circumrumpitur, æque & apibus, & locustis, cicadæ ubi eruperunt, oleis aut arundinibus insidit, & cum rupto operculo exūt, paruum quiddam in eo relinquunt humoris, nec multo post uolant, & incipiunt canere. Locustæ inter marina,

ἡ ὁ μὲν ὁ πον-
τικὸς ὁ λευ-
κός. Plin. Con-
duntur hyeme
Pontici mu-
res, hi δὲ καὶ
αὐτοὶ.

γινώσκαι ὅτι ἐκ-
δινομήσει τὸ
πρῶτον ἐκ τῆς
Plin. Vt extra
sint membra
ne, quod fuit
erat intus.

& gammarum exuunt, aut Vere, aut autumnno post partum. Iam capite alique sunt locustæ, mollem habentes partem superiorē, quod crusta iam circumrupta detracta, esset: inferiore autē duram, quia nondū esset disrupa. non enim similis in his atq; in anguibus exuio sit. latent locustæ menses circiter quinq;. Cancrī etiā exuunt senectutem, molliores quidē perspicue, sed etiā duriore exuere aiūt, ut maias. Cum uero exuūt, mollis admodū crusta subnascitur. & quidē cancri præ teneritate non satis ambulare possunt. exuunt hæc sæpius anno. Sed quænam lateant, & quomodo, & tempore, atq; etiā quæ, & quo tempore exuant senectutem, iam dictū est.

Non omnia animalia omni tempore prospere ualere, quod ne tempus auidus conducit.

Caput XVIII



Iuunt autē animalia prospere non eisdem temporibus, nec omnibus æque exuperantijs. Valetudines etiā, & morbi per tempora progenerum diuersitate uarie accidunt, & in totum non eadem omnibus ualetudo existit. Iam auidus profunt squalores, tum ad cæteram sanitatem, tum etiā ad partum, & præcipue palumbis. At uero piscibus, exceptis quibusdā paucis, imbres conducunt. Incommodi contrā auidus anni pluuij sunt, piscibus siccis. quippe cum autum talis natura sit, ut ne biber quidem largius possint sine detrimento. Aduncæ igitur aues, ut dictum est, uiuunt propē dixerim sine ullo potu: quod Hesiodus nesciuit. facit enim in narratione obfessionis Nini, aquilam augurij præfidem bibentem. Cæteræ aues bibūt quidē, sed parum. nec aliud ullum portioni indulgeat, quod pulmonem fungosum habeat, aut pariat ouum. Cum aues ægrotant, plumæ indicium proferunt. turbantur enim, nec possunt eandem seruant quam habent, cum recte ualent.

Quæ animalia pluuia gaudent, quibus ne noccat.

Caput XIX



Iscium genus maxima ex parte annis pluuijs bene (ut dictum est) uiuit. ita enim nō modo plus cibi nascitur, uerum etiam omnino pluitio humore iuuatur, ut ea quæ terrā gignuntur. olera enim quamuis rigentur, tamen non tantum proficiunt quantum imbre, quod inde arundinibus etiā lacu prognatis euenit. nihil enim ferē accrescunt, nisi aquæ pluuiæ incidant. Indicium uel inde accipi potest; quod pisces plurimi perant Pontum, ut in eo traducāt æstatem. facit enim copia amnis loci illius, ut mare sit dulcius, & cibus largior habeatur, quem iidem fluuij deserāt. Subeunt etiā fluuijs genera piscium complura, & præstant in fluentis & lacubus, ut amia, mugilis. gobiones etiā pinguescunt in fluuijs. deniq; loca prædita lacus commoditate pisces possidēt optimos. ex pluuijs autem ipsis æstiu imbres commodiores sunt parti maximæ piscium, & præcipue cum uer, ætas, & autumnus imbris abundarint, hyems contrā serenior fuerit. ad summam propē dixerim, cum bene hominibus annus cedit, tunc & piscibus feliciter degere cōtingit. locis autē frigidis parū uigent. Maxime infestantur algore, qui lapidem in capite habet, ut chromis, lupus, phager, umbra, facit enim lapidis rigor, ut per algorem gelenur, & excidant. Sed cum plurimis piscium generibus imbres conducāt, in uigili tamen, & capitonē, & el qui a nonnullis murinus uocatur, nocent. fit enim ut pluuijs multi ex his de facili excæcentur, si modum aqua excesserit. solet enim per hyemem potius capito ita affici, nam oculi eius albescunt, & macilentus per id temporis capitur, atque ad postremum malo eodem interit. quod nō magis imbris copia, quam algore accidere uidetur. Iam enim cum albitum in Nauplio agro terræ Argiæ, in uadis multi capiti sunt cæci, cum hyems fuisset asperrima. multi etiā albos habentes oculos capiti sunt. Aurata quoq; hyeme laborat. sed archanas æstate, eoq; tempore extenuatur.

Prodest

Prodest coruulis sermē, præter cæteros pisces annus squalens, quod his quoque ob eam rem cōmodior est, quia per siccitatem potius tepor accidit. loca pro sua natura genera quoque sibi habent ad incolumitatem commodiora. quod enim natura litorale, aut pelagium est, huic suo loco pro naturæ desiderio uersari commodius est. quod autem ambigit, id cōmode utroque degere potest. Sed sunt etiā loca quædam singulis propria, in quibus rectius ualeat. Commodiora (quod simpliciter dixerim) loca sunt ea, quæ algarū copia scatent. pinguioribus enim locis his capiuntur, qui multis & uarijs locis solent pabulari. Nam & quibus alga in cibo est, abunde pascitur; & quibus caro appetitur, plures pisces sibi reperiunt. Interest etiam aquilonia sint, an austrina. genus enim longum aquilonijs melius uiget: & quidē æstate, loco eodem, in aquilonijs plures longi quā lati capiuntur. Thunni & gladij agitantur a silo canis exortu, habent enim utriusque per id tempus sub pinna, ceu uermiculum, quem asilum uocant, effigie scorpionis, magnitudine aranei. infestat hoc tanto dolore, ut non minus interdum gladius, quā delphinus exiliat, unde fit, ut uel in nauigia sæpenuero incidat. Thunni omnium maxime piscium gaudēt tepore, & ob eam rem arenam & litora adeunt. per summa etiam maris innatant, quo teporis potantur. Pisciculi autem seruari propterea possunt, quia spernuntur. maiora enim magni sequuntur. sed ouorum & prolis pars magna proinde absumitur. Cum enim pisces desiderio teporis loca fœturæ adeant, liguriunt quicquid attigerint. capiuntur maxime pisces non multo anteq̃, quā sol oriatur, aut postquam occidit. denique circa solis ortum aut occasum. tempestiue enim iaci tantisper putatur. quamobrem eo tempore piscatores solent retia tollere. tunc enim maxime uisus piscium fallitur, quippe cum noctu quiescant, luce autem iam clariorē melius uideant. Morbus pestilens nullus incidere piscibus uniuersis uidetur, qualis plerunque hominibus, & quadrupedum equis, & bubus, & reliqui generis nonnullis accidit, tum seris, tum urbanis. ægrotare tamen & ipsi purantur. & quidem piscatores pro morbi indicio capiūt, cum aliquot extenuatos languentibus similes, & colore immutatos, inter multos pingues ac ualidos eiusdem generis ceperint. Marinum genus ita se habet.

*ἰσχυροὶ
καὶ, ambigit,
mitam degit am
bigunt.*

*ἀνταρcticῶν,
liguriūt, natiuitas*

Quæ fluuiatilibus, & lacustribus piscibus nocent, quoque in ingenio iidem capiuntur.

Caput XX



Huuiatile & lacustre peste quidem & ipsum immune est, sed nonnullis morbi incidunt proprii. silurus enim canis exortu potissimum (quod sublimis innatet) sideratur, & tonitruo sopitur magno. quod & cyprino accidit, sed leuius. Silurus uel à dracone angue, gurgite parum alto ictus interit. Ballero, & tilloni lumbricus canis exortu innasit, qui debilitat, cogitque ad summa stagni effert, quā æstu intereunt. chalcis, quam æricam appello, uiuo infestatur diro, ut pediculi sub branchijs innad quam multi interimant. quod nulli ex cæteris accidit. moriuntur pisces uerbasco herba, quamobrem cæteri, fluuiatiles, & lacustres ea inficientes capiunt: sed phœnices marinos etiam ita piscantur. Sunt qui duobus quoque alijs capiendi generibus utantur. quod enim altos gurgites annuum pisces per hyemem uitare solent (Cum enim aliās dulcis aqua frigidior sit, tum uel maxime eius ima algenti) idcirco fossam in fluuium ducunt, quam maceris fungentes operiunt, & fœno, atque lapidibus stipant, ut quasi cuniculum faciant, aditu parente ad fluuium, unde impleatur: tum factio gelu nassa inde piscantur. Alterum genus capturæ tale est, cuius usus & hyeme est & æstate. medio amne fruticibus, & lapidibus circumsepiciunt, uno aditu dato modo oris. Tum in eo ore posita nassa piscantur, motis lapidibus.

Testaceo generi anni pluuij profunt, præterquam purpūris: cuius rei indicium est, quod si amnis in mare fluentis aquam gustarint, moriuntur eodem die. uiuit purpura extra mare, quæ capta est, dies circiter quinquaginta. Alit altera alteram, eo quod sua testa gnatum, uel uti algam muscum ue gerit. quæ autem pro cibo ipsæ afferunt, pōderis causa adhiberi aiunt, ut in libra sint grauiores. Cæteris squalor incommodus est. nam & pauciora reddūtur, & deteriora. & quidem pectines tunc magis trahunt rufsum colorem. Iam in Pyrrheo Euripo pectines aliquādo defuerūt, non modo propter sementū, quo piscatores abrađendo ubertim caperēt, uerum etiā propter siccitates. Cæteris etiā testatis imbres conducūt, propterea quod mare dulcius redditur: sed frigus facit prosectō ne uel in Ponto, uel in fluuijs gigni possint, exceptis biforibus paucis, genus nāque unifore potissimum rigore induratur, & interit. Aquatile animalium genus ita se habet.

De morbis suæ, eorumq; remedijs.

Caput XXI



Vadrapedum suæ tribus morbi generibus laborant, quorū unum raucedo uocatur, quo maxime fauces, maxillæq; inflammantur. sed idem malū, uel qualibet alia corporis parte contrahi potest. Iam enim plerumq; in pedem, aliās in aurem decūbit. Putrescit protinus membrum, & ulcus serpit, donec ad pulmonē deuentat, quo tacto mors sequitur. crescit hoc uitii celeriter, nec potest sus quicquam edere cum ita ægrotat, et nā si quantumlibet sit morbi incrementum, curatur à porcarijs, cum malū incipere senserint, haud alio modo quā tota parte abscissa qua cœperit. Reliqua duo genera eodē uocabulo nominātur struma. quorū alterū dolor capitis & grauitas est, quo plurimi laborare solēt: alterū alui profluuiū est, quod irremediabile inodit. alteri succurritur ex uino adhibito naribus, eoq; ipso dilutis, sed difficulter eo quoq; periculo suberahitur. biduo enim aut quadriduo interitus obuenit. Rauefcunt potissimum eo anno, quo mones abunde tulerint, & pinguisimi sint. Iuuat mora celsi dedisse in cibatu, & balneū multū & calidum, & uenæ sub lingua fixæ cultello adactō sanguinē detraxisse. Grandinosi autē sunt sues, quorum crura & collum & armi carne constant humidiorē, quibus partibus uel grandines plurimæ innascūtur. caro dulcior est si grandines habet paucas: sed si multas, humida ualde, & insipida est. Facile qui grandent cognoscuntur: parte enim linguæ inferiore grandines habentur, & si setam dorso euellas, cruorē in radice pili euulsi uideris. Pedibus etiam posterioribus consistere non possunt, qui grandent. carent grandine cum adhuc latent. tolluntur grandines tipha, quæ uel in cibatu utilis est. Sed præcipue alunt, & opimant ficus, & cicer. cibus deniq; non simplex, sed uariis sagina optima est. gaudent enim sues pabuli mutatione, quemadmodū & cætera animalia. tum etiā fieri aiunt cibi uarietate, ut partim infletur, partim impleatur carne, partim opimetur. Glandes suauiter quidem à suis comeduntur, sed carnem humidam faciunt si solæ dantur. & si grauidæ glandem copiosius ederint, abortum faciūt, ut oues: quibus constātius hoc glandibus esitatis accidit, unum ex omnibus quæ nouimus animalibus, sus grandinem concipit.

Quibus morbis infestentur canes.

Caput XXII



Anes tribus laborant uitij, rabie, angina, podagra. facit rabies furorem, & quæ momorderint, omnia rabiūt, excepto homine. Intereūt canes hoc morbo, & quæ morsā sunt, t excepto homine. Angina etiā interimit. & podagra tētati pauci euadere possunt. Rabies camelum etiam prehendit. Elephantos cæteris malis immunes aiunt, inflatio-

ne autem alui acris infestari.

Morbi

ἡ ἀλὴν αὐτοῦ
πρ. id est, ex-
cepto homine.
Leuiter Theo-
dorum uisus est
accusasse Leo-
nicens. affirmās
legendū fuisse,
αὐτοῦ αὐτοῦ
πρ. id est, pri-
mo homine.

Morbi boum gregalium.

Caput XXIII



Oues gregales morbis duobus tentantur, podagra, & struma. facit podagra ut pedibus intumescant: & quamuis non intereant, tamen ungulas amittant. valent melius cornibus pice illitis calida. euenit struma, ut calidius frequentiusque spiretur, quod denique in homine febris, idem in boue struma est. indicium morbi, ut demittat aures flaccant, & ut comedere nequeant, breui moriuntur, adaperitisque pulmo inspicitur putris.

Quibus morbis laborant equi gregales, domesticique, & de morborum indicij & remedijs, necnon de hippomane, & potu equorum, & boum. Caput XXIIII



Quorum gregales morbo immunes sunt, excepta podagra: hoc enim uno laborant, & plerumque ob id ungues amittunt. Sed amissis alij statim enascuntur. fit enim ut altero subnascante ungue, alter amittatur. indicium morbi, ut alter testium dexter palpitet, uel ut paulo citra nares cauum quiddam rugosumque gignatur. At uero equi domestici morbis plurimis obnoxij sunt, laborant ileo dicto, id est tenuioris intestini morbo: cuius mali indicium, ut crura posteriora attrahant ad priora, & ita summoveant, ut promodum collidant. Si ubi antea diebus aliquot sponte ieiunarint, mox in furorem uertantur, sanguine detracto iuuantur. Capiuntur etiam rigore neuorum: cuius indicium, uenae ut omnes neruique intendantur, & caput ceruicesque immobiliter rigent, rectisque cruribus gradiuntur. Suppuratione etiam equi infestantur. Vitiū quoque eorum est, quod hordeatio dicitur, cuius indicium, ut palatum molester, & feruētius spiret equusque ex consuetudine nulli huius mali remedium est, nisi sponte natura emendetur. Quod autem lymphari dicitur, tale est, ut equus ad tibie sonum quiescat, & demittat frontem, cum uero conscenderis, citetur contentius donec retineas. demissus etiam semper tristisque est, si rabie tenetur: cuius indicium, ut auriculas demittat ad iubam, rursusque protendat, idque uicissim faciat. Irremediabile etiam malum, si cordis dolore uexatur: cuius indicium, ut latera subsidant, & illa praefringantur. & si uesica dimoueatur de suo situ: cuius indicium, ne urinam reddere possit, & ut ungulas, clunesque trahat, & si pastinacam deuorant, cuius magnitudo, quae uerticilli bestiolae est (nam morsus muris aranarum, uel ceteris fumentis molestissimus est) pustulae hoc excitantur, & periculo sororem quem defixerit grauida. pustulae enim rumpuntur, ex quo interitus sequitur. sed si non grauida est, non interimit. quinetiam ea quam alij chalcidam, alij dygnidam uocant, suo morsu aut interimit, aut uehementem dolorem mouet. similis haec paruis lacertis est: sed colore serpentis, quam caeciliam nominant. denique homines uisuperit totidem ferre morbis equum, atque etiam ouem infestant, quot hominem referunt. interit ueneno sandaracae & equus, & quoduis iumentum, siue ueterinum. datur in aqua percolatum. abortum etiam facit equa odorē sentiens fungi sumigantis lucernae extinctae, quod & mulierum nonnullis accidit, haec tenus de equorum morbis. Quod hippomanes uocant, haeret quidē fronti nascentis pulli, ut narratur. Sed equae perambulantes abstergentesque, id abrodunt. quae autē de hoc fabulantur, signimenta muliercularum, & professorum carminis incantamentorum esse credendum potius est. Emitteri etiam ab equa prius quam pullum, quod pulium dicitur, certum est. equi uocem quoque agnoscunt equorum quibus cum pugnant. Gaudent pratis riguis, & paludibus. bibunt enim aquas libentius turbidas, quod si clara est, inturbant eam ungulis suis, & cum biberint, lauant se totos, lymphisque potiuntur. balneum enim omnino hoc animal adamat, & aquae deditum est, quamobrem natura etiam equi fluminalis ita constat, ut uiuere nisi in humore non possit. Bos contra quam equus, nisi aqua sit clara, frigida atque lymphida, bibere nolit.

Asinos uno morbo Laborare, frigiditq; impatientes esse.

Caput XXV



Sini uno maxime morbo laborant, quem malidam uocant. quod utrum in capite oritur, facitq; ut per nares pituita multa, ruffa q; effluat, quæ si ad pulmonem descenderit, moriuntur. sed si in capite est, non infert interitum. Impatiens frigoris maxime hoc animal est: quapropter Pontica & Scythica terra asinis caret.

De elephantorum morbis, & eorum curatione.

Caput XXVI



Elephanti morbis inflatione contractis laborant: quo fit, ne possint excrementum uel uesicæ, uel alui reddere. Aegrotant etiam si comedant terram, nisi ea frequenter utantur: nam si frequenter, nihil sentiunt mali. lapides etiam interdum deuorant. necnon fluore tentantur, quo, cum uires languerint, curantur potione aquæ calidæ, & cibo fecni melle imbuti. utrunq; enim id sistit profluuium alui. si per insomniam fessifunt, armis perfricatis ex sale, oleo, & aqua curantur. cum humeri dolent, carnibus suillis assis appositis iuuatur. Oleum alij bibunt, alij non. & si spiculum in corpore inest, eij citur eo quod biberit oleo, ut a sunt. qui autem oleum non bibunt, ijs radix tyrtami decocta in uino datur. Quadrupedum res ita se habet.

De morbis insectorum, & præcipue apum.

Cap. XXVII



Insectorum maxima pars eo tempore ualeat, quo gignitur: uidelicet cum annus talis, quale uer, humidus & tepidus est. Apibus bestiolæ quædam in alueis innascuntur, quæ fauis officiant. Vermiculus item specie aranei nocet fauis, quem alij clerum, alij pyraustam uocant. hic sibi similem forma aranei parit in fauo, & facit ut examen aegrotet. obest etiam alia quædam bestiola similis hepiolo papilioni, qui lucernarum luminibus aduolat. hæc puluerem spirando in alueo parit, nec aculeo ab apibus stimulatur, sed tantum fumo abigitur. Erucæ quoque nascuntur in alueis teredines dicuntur, quas apes non insectantur. aegrotant potissimum, cum sylua flores ruginosos tulerit, atque etiam temporibus siccis. Intereunt insecta omnia tacta ex oleo, sed ce lerrime, si capite illito exponantur soli.

Animalium differentia pro locorum uarietate.

Caput XXVIII



lucifitate etiam locorum differentia oritur. ut enim locis nonnullis gigni omnino aliqua nequeunt, sic alijs generantur quidem, sed pauciora, & uita breuiore, nec prospera. locis etiam uicinis discrimen huiusmodi existit: ut agri Millefij locis sibi propinquis cicadæ alteris gignantur, alteris non. Amnis in Cephallenia insula dirimitur, cuius citra alterum latus cicadarum copia est, ultra alterum nullæ. In Pordoselena, uia interiacet, cuius ultra alterum latus gignitur catus, citra alterum gigni non potest. Terræ Boeotiae in Orchomenio agro talpæ habentur multæ: at in Lebaidico uicino nullæ sunt, neq; si aliunde portatæ eò fuerint, uolunt infodere. In Ithaca insula lepores si aliunde illati dimittantur, uelut nequeunt: sed eodè reuersi, unde maris introierint insulam, moriuntur. In Sicilia formicæ, quæ equites appellantur, non sunt. In Cyrenensi agro ranæ uocales præterito tempore deerant. In Africa non aper, non ceruus, non capra syluestris est. India, teste Cresia, quanquam non fide digno, suem nec ferum nec mansuetum habet. Quæ autem sanguine carent, & quæ secessu tempore conduntur, grandiora nimirum illa possidet. In Ponto neque mollia sunt, neque testata, nisi locis quibusdam pauca. In mari rubro testata omnia mira quadam magnitudine augentur. In Syria oues sunt cauda lata ad cubiti mensuram. Capræ auriculis mensura palmari, & dodrantali, ac nonnullæ demissis, ita ut spectent ad terram. Boues nodos

*An tyrtami le-
gi debeat, an di-
stemi, an ex-
pûgi omnino,
peritiores iudi-
cent.*

nodos scapularum flectunt, ut cameli, in Cilicia capræ tondentur, ut alibi oues. In
 Africa arietes statim cornigeri generantur, nec solum mares, ut Homerus scribit,
 sed etiam foeminae. Contrà in Ponto per provinciam Scythicam nullis cornua ena-
 scuntur. In Aegypto aliqua maiora, quàm in Græcia, fiunt, ut boues, & oues, ali-
 qua minora, ut canes, lupi, lepores, uulpes, corui, accipitres. aliqua magnitudine
 pari, ut cornices, & capræ, cuius rei causam attribuunt cibo, qui alijs large, alijs
 parce sit, ut lupis, & accipitribus. carniuoribus enim parum cibi suppeditatur, pro-
 pter raptus, quo uiuunt, penuriam. aues enim minores paucæ ibi habentur. lepori
 uero, omniq; non carniuoro generi uictus ieiunior ob eam rem est, quod neque
 10 nuces, nec poma sunt diuturniora. Tum etiam multis locis, cœli & situs conditio
 causæ est, ut in terra Illyrica, & Thracia, & in Epiro, alini parui habentur. In Scy-
 thica & Gallica nulli propter immodicum frigus. in Arabia lacerti magnitudine cu-
 bitum excedunt. Mures etiam multo foricibus auctiores, quibus crura priora uel
 palmi mensura, posteriora ad primum digiti nodum habetur. In Africa magnitu-
 do anguium mira, sicut & fertur. Iam enim nonnulli ubi tritrem applicuissent, ossa
 bouum multorum uidisse narrant, quos absumptos esse ab anguibus non dubita-
 rent, cum tritremes productas in altum, quamprimum angues insectarentur, &
 nonnulli aggressi tritremem euerterent. Item leones in Europa potius sunt, & ea
 10 Europæ parte, quæ inter Acheloum amnem, & Nessum est. Pantheræ in Asia,
 in Europa autem nullæ. bestia denique omnes ferè efferationes in Asia sunt, for-
 tiores in Europa, multiformiores in Africa. Vnde prouerbio quodam dicitur: Sem-
 per aliquid noui Africam asferre. facit enim illius situs aquarum penuria, ut feræ
 eodem concurrant bibendi causa. quo quidem loco etiam quæ alienigenæ sunt,
 coeunt & generant. quorum tempora eadem ferendi uterî sint, & magnitudines
 non multo inter se discrepent. redduntur mitiores inter se desiderio fluuij, nam &
 contrà quàm cætera potum quaerunt. tempore enim hyberno magis, quàm æstiuo.
 insuetum nanque his est bibere æstate, propterea quod imbres fieri per id tem-
 pus non soleant, & mures quidem cum biberint, moriuntur. Sed uel alibi coitu alie-
 nigenarum procreari apertum est, ut in Cyrenensi agro, lupi cum canibus coeunt,
 30 & laconici canes ex uulpe & cane generantur. Indicos etiam canes ex tigride &
 cane gigni confirmant: uerum non statim, sed tertio coitu. primo enim belluinos
 adhuc catulos procreari aiunt, alligantur canes locis desertis, & nisi bellua incensa
 libidine sit, sæpe lacerantur.

ὡς τῇ κιλίκῃ
 καὶ, in Gallica.

ἡμεῖς οὖν

Mores etiam animalium pro locorum qualitate differre, uenenatq; serpentum, uel mi-
 tiora, uel asperiora effici.

Caput XXXIX



40

Orum etiam diuersitatem loca efficiunt, ut montana & aspera suas be-
 stias reddit & aspectu effrationes, & uiribus robustiores, quàm pla-
 na & molliora. Argumēto uel sues Athi montis acceperim, quorum
 ne foeminas quidem spectare mares situs inferioris audent. Morsus
 etiam belluarum ex locorum diuersitate plurimum differunt, ut in
 Pharo, locisq; alijs scorpiones non lædunt. At alijs, & præcipue in Scythia multi,
 & magni, & nocui sunt. & si uel hominem, uel quamuis bestiam percusserint, in-
 terimunt. nec sues euadere possunt, quanquam cæteros uirulentos ictus minime
 sentiunt. & nigri eorum potissimum interimuntur. quicq; tamen celerrime interit,
 si ictus adierit aquam. Anguium quoque ictus per loca plurimum differunt. A spīs
 enim anguis, ex quo medicamentum putrescunt illud componunt, in Africa gignit
 40 tur, cuius ictus nullum remedium est. nascitur eodem in agro, in quo laser, serpens
 quidam pusillus, cuius remedium lapis est, quem ex sepulchro cuiusdam regis au-
 dens à cæcis.

σπινθηρ
 serpente ex
 δὲ τοῖς.

tiqui accipiunt, eoq̃ perfuso ex uino bibunt. Italix locis quibusdam morsus etiam stellionum exitiales sunt. Sed omnium uenenatorum morsus grauiores sunt, si aliterum ederit alterum, ut scorpionum deuorari à uipera certum est. Plurimis uero eorum aduersatur salua hominis. Serpens quidam minutus est, quem aliqui sacrum appellant, quem angues præmagni fugiunt. magnitudo huic ad cubitum, species hirsuta. quicquid momorderit continuo circiter putrescit. Est præterea in Indica regione serpens paruus, cuius unus remedio carent incolæ.

Quo tempore piscium genera præstantiora in cibum redduntur.

Caput XXX



Discrimen animalium ut prospere, contra ue exigant, uel utero pleno existere nouimus. Testa enim intacta ut pestines, omneq̃ ostræarū, siue cōcharium genus, atque etiam crusta intacta, tunc optima sunt, cum grauida, ut late in locustis, & reliquis huiusmodi patet. sed quanquam testa intacta grauida dicimus, tamen nullum eorum uel coitum, uel partum uidemus. crusta intacta nimirum & coire, & parere percipiuntur. Mollia etiam præstant, cum grauida sunt, ut lolligines, sepiæ, polypti. pisces cum impleri incipiunt coitu, boni omnes ferè sunt. sed procedente uteri tempore alij præstant, alij non. Alec, siue mæna utero grauis melior est. forma rotundior foeminae, porrectior mari, & latior. Euenit ut cum foetu impleri foemina incipit, maris color in nigriorem, plurisq̃ uarietatis mutetur, & caro deterrima cibo efficiatur. uocantur à nonnullis per id tempus hirci. mutantur pisces, qui merulae, & qui turdi appellantur, atque etiam squillæ. Vere enim nigrescunt, post uer albedinem suam recipiunt. Fuca etiam mutat colorem. cum enim cæteris temporibus candida sit, uerno uaria redditur. solam hanc ex marinis piscibus nidum sibi conseruare, atque in stragula parere aiunt. Alec etiam mutatur, ut dixi, & cærus, ut ex albedine rursus æstate ad nigredinem redeant: quod maxime suis pinnis, & branchiis declarat. Coruulus etiam cum utero fert, optimus est, perinde ut alec. mugilis uero, & lupus, & reliqui ferè omnes squama intacti deteriores sunt, cum ferunt, similes sibi, ferentes & non ferentes pauci sunt, ut glaucus. Vitiantur etiam senectute pisces, & quidem thunni uel ad rem salamentariam senes improbi sunt: multum enim carnis absumentur. quod idem uel in cæteris piscibus euenit. declaratur eorum senectus duritie magnitudineq̃ squamarum. iam captus est thunnus senex, cuius pondus erat ad talenta quindecim, & caudæ interuallum ad cubita duo & quinq̃ & palmum. Fluuiatiles & lacustres pisces optimi sunt post partum, & foeminis genitalis emissionem. Sed nonnulli etiam cum ferunt commendantur, ut sardis. alij damnantur, ut silurus. cum cæteri omnes mares suis foeminis sunt præstantiores. Silurus foemina præstat suo mari. & in genere anguillarum quoque meliores sunt, quas foeminas nominant, quæ nomen foeminae temere acceperunt. Non sunt enim foeminae, sed quia aspectu à cæteris discrepant, foeminae appellantur.

HISTORIAE ANIMALIVM LIBRI OCTAUI FINIS.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER NONVS,
INTERPRETE THEODORO.

De affectionibus animorum omnium animalium, deq; ijs, quæ perpetuas inter se
inimicitias gerunt, & earum causis. Caput I



10

20

30

40

MORE S animalium obscuriorum, parumq; uoluentium tempo-
ris, minus sensu percipiuntur: uiuaciorum euidentiores sunt.
Habere enim uim quandam naturalem animantes in quauis
animi affectione uidentur, hoc est prudentia, stultitia, fortitu-
dine, ignauia, clementia, acerbitate, & reliquis habitibus gene-
ris eiusdem. In nonnullis etiam commune aliquid disciplinae,
eruditionisq; habetur. Alia enim uicissim inter se, alia ab homi-
ne (quæ scilicet auditu non carent) non modo strependi, uerum etiam significandi
differentias possunt dignoscere. In omnibus uero, quorum procreatio est, femina
nam & mare in simili serè modo natura distinxit moribus, quibus mas differt à fe-
mina: quod præcipue tum in homine, tum etiam in ijs, quæ magnitudine præstet,
& quadrupedes uiuiparæ sint, percipitur. sunt enim feminae moribus molliori-
bus, mitescunt celerius, & manum facilius patiuntur, discunt etiam, imitanturq;
ingeniosius, ut in genere canum laconico, feminas esse sagaciores quàm mares,
apertum est. Moloticum etiam genus uenaticum nihilo à cæteris discrepat. At pes-
cuarium longe & magnitudine, & fortitudine cōtra belluas præstat. Insignes uero
animo, & industria, qui ex utroque, moloticum dico & laconicum, prodierint. Sed
feminae omnes minus, quàm mares sunt animosæ, excepta panthera, & ursa. fe-
minæ enim in his generibus esse uidentur animosiores, cum in cæteris sint procul
dubio molliores: uerum malitiosiores, astutiores, insidiosiores feminae sunt, atque
in enutrienda prole sollicitiores. Mares contrà animosiores, ferociiores, simpliciiores,
minusq; insidiosi. Quorum uestigia morum, cum in omnibus serè in sunt, tum uel
maxime in perfectioribus, & præcipue in homine. Hic enim natura perfectissima
est, & ob eam rem habitus isti conspectiores in eo ipso continentur. Itaque mulier
misericaors magis, & ad lachrymas propensior, quàm uir est. Inuida item magis, &
querula, & maledictior, & mordacior. præterea anxia, & desperans magis, quàm
mas, atq; impudentior, & mendacior. quinetià facilius decipit, meminisseq; aptior.
ad hæc uigilantior, segnior, immobilior denique est, & minus cibi desiderans. Mas
uero iuuantior, ut modo dixi, & fortior est. Nam & in mollium genere, cum sapia
icta est tridente, mas feminam adiuuat, femina mare percusso, fugam arripit. Pug-
nant inter se ipsa animalia, quæ loca eadem incolunt, atque eisdem uescuntur cli-
bils. nam si uictus penuria sit, sit certe ob eam rem, ut uel eiusdem generis animantes
pugnam inter se conferant. Et quidem marinos uitulos situs eiusdem pugnare in-
uicem aiunt, & marem cum mare, & feminam cum femina, donec alter ab altero
uel occidatur, uel eiciatur. Idemq; eorum catulos facere. Carniuora etiam & op-
pugnātur à cæteris omnibus, & ipsa cum cæteris pugnat: quoniā uictus his ab ani-
malibus est, unde augures sua dissidia, & confidia colligūt. dissidio bella omnemq;
discordiam statuūt, confidio pacem omnemq; concordiam. Quod si cibi copia sup-
petat, haud scio an ea quæ nunc metuunt, & ferociunt, inter se eant, manfueteq;
cum inter se eunt, cum homine etiam agant. cuius rei indicium facit cura, quam
Aegyptij animantibus impendunt. quod enim apud illos cibo non carent, sed co-
piose aluntur, ideo collegio uel ipsa effertissima degunt. mansuescūt enim sui com-
modi ratione, quale se genus crocodili exhibet sacerdoti locis quibusdam, propter
cibi curam, quæ ibi insumitur. quod idem fieri cæteris etiam locis intelligi licet. Dissi

M

det aquila cum dracone: uescitur enim aquila anguibus. Ichneumo cum phalange: uenatur enim phalanges ichneumo. Auim uariæ dictæ, cum alaudis. pipo cum lutea. oua enim inuicem exedunt. Cornix cum noctua. cornix enim meridie oua surripens nocturæ absumit, cum non clare interdum noctua uideat. noctua contra oua cornicis noctu exedit. estq; altera interdum, altera noctu potior. Item noctua cum orchilo: nam is quoque oua exedit nocturæ. sed die uel cæteræ auiculæ omnes noctuam nimirum circumuolant. quod mirari uocatur, aduolantesq; percutiunt, quapropter aucupes ea cõstituta, auicularum genera multa & uaria capiit. Quin etiam quirex auim appellatur, priuatas contra eandem inimicitias gerit. mustela inimicus cornicis est, quippe qui eius oua, & pullos uiolat. Turtur cum ignaria pugnatur. locus enim pascendi, uictusq; idem eorum est. Gulgulus cum lybio, mliuus cum coruo. eripit enim mliuus à coruo quicquid tenet, ut qui & unguibus sit præstantior, & uolatu. ita fit, ut eos quoq; uictus ratio faciat inimicos. Ad hæc, inter ea quæ cibum sibi à mari petunt, anas, gaula, & harpa, inuicem dissidēt. Buteo in alto genere hostis ranæ, & rubetæ, & anguis est. rapit enim eos, atque exedit. Turtur & luteus pugnat. occiditur à luteo turtur, & à cornice tympanus nomine. colarem ulula, cæteriq; adunci rapiunt, unde his oritur bellum. inter stellionem etiam & aranæum bellum est. deuorantur enim aranei à stellione. pipo inimica ardeolæ est. oua enim & pulli ardeolæ uiolantur à pipone. falco prælium cum asino est, propterea quod a linus spinetis sua ulcera scabendi causa atterat: tum igitur ob eam rem, tum etiam quod si uocem rudentis audierit, oua abigat per abortum, pulli etiam metu labantur in terram. itaque ob eam iniuriam aduolans, ulcera eius rostro excauat. lupus asino, tauro, & uulpi est hostis. Cum enim carne ipse alatur, boues inuadit, & asinos, & uulpes. hac eadem de causa & cum circo accipitre uulpi inimicitia sunt. circus enim, quia unguibus est aduncis, & carne uiuit, uulpem inuadit, ac uulnerat. coruus tauro & asino aduersarius est, quippe qui aduolans feriat, & eorū oculos laceret. Aquila etiam cum ardeola pugnat, unguibus etenim ualens aggreditur. hæc autem repugnando emoritur. æfalo cum uulture. crex cum gulgulo, & merula, & uircone, quem ex flagratione procreatum quidam fabulantur. nocet enim his, & eorum ullis. sita & trochilus cum aquila. sita enim oua aquilæ frangit. aquila tum ob eam rem, tum etiam quod carniores est, aduersatur. Florus odio equum habet. pellitur enim ab equo pabulo herbæ, qua uescitur. nubeculans hic, nec ualens acie oculorum est, quippe qui uocem quidem equi imitetur, atq; aduolans equum fuget: sed interdum excipitur, occidaturq; ab equo. colit hic paludes, & ripas, coloris est pulchri, & uictus facilis. Coloræ hostis asinus est. dormit enim colora in præsepibus, & narem subiens asini ne comedat, impedit. Ardeolarum tria sunt genera, pella, alba, stellata, piger cognomine. pellæ coitus difficilis est, uociferatur enim & sanguine ex oculis, ut aiunt, emittit cum coit. parit etiam ægre, summoq; cum dolore. prælium cum ijs inuit, à quibus læditur, hoc est cum aquila, à qua rapitur: cum uulpe, à qua noctu capitur: cum alaude, à qua oua eius diripiuntur. 40 serpens mustelæ, suisq; aduersarius est. mustelæ, quod eadem in domo uersantur, uictus enim ex eisdem appetatur necesse est. suis uero, quia ab ea deuoratur. æfalo uulpi est inimicus, ferit enim pilosq; eius euellit, occiditq; catulos, unde nanque unguibus est. Coruus uulpi amicus est, pugnat enim cū æfalone: unde fit, ut huic cum ab illo percutitur, auxilietur. Vultur etiam & æfalo inuicem inimici sunt, ungues enim utriq; unci habentur. Aquilæ etiam pugnat uultur & olor, nutritq; eam fæpulus olor. Oloribus uero ut alter alterū deuoret, in more est, maxime in uolucrum genere. sunt porro alia semper inter se infesta, alia hominum ritu, cum res ita tulerit. A finus item & spinus inimici inter se sunt. uictus enim spino à uepribus, quas asinus

tenellas

renellas adhuc pascit. Florus, spinus, ægithus, quem salum uoco, odium inter se ex-
 ercent. & nimirum sanguinem ægithi & flori misceri non posse dicitur. Amici cor-
 nix & ardeola, iunco & alauda, galgulus & lædus. Colit enim galgulus frutera &
 nemora. lædus saxa & montes. suisq; locis uterq; contentus degit pacifice. amici etiā
 pifex, harpa, miluus. Vulpes etiā cum serpente amicē uiuit: ambo enim cauernis
 gaudet. & merula quoq; turturem amat. Leo & lupus ceruarius inimici sunt: cum
 enim carne alantur, uictum ex eisdem petant necesse est. Elephāti etiā pugnant
 inter se uehementer, & dentibus alter alterum ferit. qui autem uictus fuerit, ad eō
 animum amittit, ut ne uocem quidem uictoris toleret. differunt inter se elephantes
 10 mtrum in modum robore, atq; animo. Sunt apud Indos in usu rei bellicæ nō solum
 mares, sed etiā fœminæ: uerū tamen fœminæ pauciores sunt, & longe timidiore.
 euerit ædificia elephantus, dentes admouens magnos. palmas uero sua fronte im-
 pellit, donec declinet, tum pedibus inculcans prostermit in terram. Venatio talis ele-
 phantorum est. conscendunt mites aliquos animososq; elephantos, qui uenantur;
 cursuq; insequuntur feros, quos cum occuparint, ferire præcipiunt suis, dum fatigēt,
 uiresq; dissoluant. Tum rector in defatigatum illum insilit, regitq; falce: post breui
 tempore fera mitescit, atq; obtemperat. Quandiu insidat rector, mitem se quisq; ex
 hibet: cum descenderit, alij mansuetudinem seruant, alij suam repetunt feritatem.
 itaq; immiscetium crura priora præpediunt uinculis, ut quiescant. capiuntur &
 natu iam grandes, & pulli. Sed amicitia, atq; inimicitia in his belluis, uictus uicq;
 20 ratione ita existunt.

De ijs piscibus, qui gregatim, amicisq; uiuunt, qui uero non gregatim ini-
 mici uero sunt.

Caput II



Iscium autem alij gregatim degunt, amicisq; sunt: alij nō gregatim, in-
 imicisq; uiuunt. Qui amici sunt, congregantur, partim cum utero serūt,
 partim cum fœtum ædiderint. Gregales deniq; sunt thunnī, aleces,
 gobiones, uocæ, lacerti, coruuli siue graculi, denticæ, nulli, malleoli,
 elegini, sacri, aristulæ, sargiaci, lollij, papaueres, iulix, limariæ, scombrī,
 monedulæ. horum nonnulli nō modo gregales sunt, uerumetiam coniugales. Re-
 liqui omnes coniugia agūt quidē, sed greges statim temporibus, ut modo dixi, con-
 30 stituunt, scilicet aut cum uterum gerunt, aut post partum. Lupus & mugilis quan-
 quam inimici sunt capitales, tamen statim tempore congregantur. coeunt enim in gre-
 gem sæpius, non solum quæ eiusdem generis sunt, sed etiā quibus idem aut similis
 pastus appetitur, dummodo sit abunde cibarij. sæpe mugiles cauda abscissa uiuūt,
 atq; etiam congrī meatu tenus excrementario. Abscinditur mugilis cauda à lupo,
 congrī à murena. Ineunt prælium maiores contra minores, maior enim quisq; atq;
 robustior, minorem infirmioremq; deuorat. sed de marinis generibus satis.

De genere ouili amente & stulto.

Caput III



Ores autem animalium, ut dictum iam est, differunt inter se fortitudi-
 ne, ignauia, mansuetudine, ferocitate, mente, dementia. iam enim ge-
 nus ouile amēs, & moribus, ut dici solet, stultissimis est, quippe quod
 40 omnium quadrupedum ineptissimum sit, repit in deserta sine causa.
 hyeme obstitat ipsum sæpe egreditur stabulo, occupatum à niue, nisi
 pastor compulerit, abire non uult, sed perit desilens, nisi mares à pastore ducantur.
 ita enim reliquus grex consequitur. Caprarum ex grege si quis unam uillo mento
 dependente, quem aruncum uocant, apprehenderit, cæteræ stant uelut stupidæ,
 suos in unam illam oculos conijcientes. Cubant difficilior oues, quàm capræ: magis
 enim capræ quiescunt, acceduntq; ad hominem familiarius, sed sunt frigoris impa-
 M 2

tientiores, quàm oues. docent pastores suas oues gregari, facto strepitu. nam si cum tonuerit aliqua relinquantur, quæ non concurrerit, abortum, si est grauida, facit. unde fit, ut si quem domi strepitum moueris, omnes concurrant, propter consuetudinem. Cubant oues, capræq; uniuersæ per cognationem. Cum primû sol cõuersus destiterit, capras nõ aduersis præterea inter se oculis, sed auersis cubare accepimus.

De societate boum, equarumq; multo inter se amore.

Caput IIII



Oues & pascunt per societates, atque consuetudines. & si unus aberrat, reliqui sequuntur. quapropter boarii nisi præuenerint, totum armentum requirant, necesse est. Equæ societate coniunctæ, si altera sorte perierit, altera pullum parente orbatum enutrit. Equarum denique genus miro quodam amore prolis teneri putatur: cuius rei indicium est, quod sæpius steriles auferunt pullos à matribus, quos ipsæ amore prosequentes tueantur, sed quoniam lacte careant, deprauant eos quos diligunt.

De ceruæ prudentia in pullis edendis, deq; maris cornuum amissione,

& reparatione.

Caput V



Erarum quadrupedum ceruæ maxime prudentia præstare uidetur, tum quia circa semitas pariat, quò scilicet belluæ propter homines minus accedunt: tum etiam quia cum peperit inuolucrum primum excedit, mox sese in herbâ petit, quam cum ederit, redit ad prolem. Præterea hinnulum ducent in stabula, assuefacit, quò refugere debeat. saxum hoc est abruptum, uno aditu, quo loco eam si quis inuadit, expectare, repugnareq; affirmant. Mas item cum pingerit, quod ualde tempore fructuum sit, nusquam apparet, sed longe secedit, ut qui pondere suæ corpulentia capere se posse facilius sentiat. Cornua etiam locis difficilibus amittit, & quæ inueniri nequeant: unde illud proverbium ortum, Quæ cerui amittunt cornua. Quasi enim sua amiserit arma, cauere ne inermis reperiatur. Cornu sinistrum compertum esse à nemine adhuc fertur: occultit id enim tanquam quodam medicamento præditum. Anniculis nondum cornua nascuntur, nisi quoad indicij gratia sit initium quoddam præterberans, quod breue, hirtumq; est. Bimæ cornua primum oriuntur simplicia, & recta, ad subularum similitudinem, quam ob rem subulones per id temporis eos uocant. Trimis bifida exeunt, quadrimis trifida, atq; deinceps ad hunc modum procedit numerus usque ad annum sextum. Ab hoc similia semper prodeunt, ita ne sit dignoscere ætatem ramorum numero. sed senes cognoscimus maxime indicio duplici illo: dentes enim aut nullos, aut paucos habent, atque adminiculis carent. uocantur adminicula ramis, qui imis cornibus prominent ante frontem, quibus in pugna utuntur iuniores: senes autem carent. amittunt singulis annis cornua mense Aprili, quæ cum amiserint, occultant sese interdum, ut superius dixi, idem opacifaciunt locis, ut muscarum tædio uacant. pascuntur per id tempus noctu, donec recipiant cornua, quæ primum quasi cute uestita, & hirtiufcula emittunt: sed cum creuerint, soli exponunt, ut excoquantur, & sicceant. ubi iam nihil attritu arborum, cum ea scalpant, indolent, tunc ea relinquunt loca, confisi habere iam quo repugnare possint cum res exigit. captus iam ceruus est, hederam suis enatam cornibus gerens utridem, quæ cornu adhuc tenello forte inserta, quasi ligno utridem coaluerit. cerui morsus uel à phalangio, uel à quouis generis eiusdem, caneros edunt: quod idem homini etiam prodesse putatur, sed non caret fastidio. Ceruæ statim à partu exedunt inuolucrum, ut dictum est, nec fieri potest, ut id accipias. prius enim quàm in terram demittant, ipsæ arripiunt, uis in eo medica esse creditur. Cerui sibilo & cantu

cantu uenantium capiuntur. mulcentur enim, alliciunturque ea uoluptate, itaque alter uenantium cantat palam aut sibilat, alter clam ferit à tergo, ubi socius tempus iam esse significarit. sed si ceruus erectas auriculas teneat, acerrime sentit, nec latere insidias possunt: sin demissas, facile interimitur.

De quibusdam animalibus, que prudentia quadam natura instituit.

Caput VI



10

Rix cum fugiunt, suos catulos propellunt, susceptosque portant, cum ab insectante iam occupantur, arbores scandunt. Solent ursi arum herbam comedere, cum è latibulo egrediuntur, ut dictum est: ligna etiam manducant, quasi dentiant. Sed ex cæteris quoque quadrupedibus multæ prudenter sibi opitulari uidentur. Nam & in Cre-

ta insula capras syluestres sagitta transfixas dictamnium herbam querere aiunt: hoc enim spicula ex corpore eijs. Canes etiam ægrescentes herba quadam comesta uomitant. Panthera cum uenenum, pardalianches dictum, ab angore ederit, quo leones etiam intereunt, stercus hominis querit: eo enim ipso iuuatur. quocirca uenatores stercus ibi propinquum suspendunt ex arbore aliqua, ne procul bellua abeat, petens suum medicamentum. itaque insiliens ibidem, & spe capiendi perseverans, in se efferenda emoritur. Eandem sese abscondentem uenari se-

20 runt, propterea quod suo odore belluas delectari intelligat. propius enim ita accedunt, quas corripit. Ichneumo Aegypti, ubi aspidem anguem suum hostem asperit, non prius aggreditur, quam locos uocet, & limo obducto, contra ictus mor sustinet sese torcet. Modus armandi, ut primum madefaciat corpus, & in terra se uoluet. Crocodilis hiantibus trochilidae ues inuolantes depurgant dentes, quo munere & ipsi aluntur. & crocodilus sentiens secum commode agi, nihil nocet, sed cum egredi auem uult, ceruices mouet, ne comprimat. Testudo cum uiperam ederit, mox cunilam edit. quod cum ita sæpius factum animaduertisset quidam, ut gustata cunila uiperam testudo repeteret, herbam euulsit, quo facto testudo interiit, mustela quoties dimicatura cum serpente est, rutam comedit: odor etenim eius

30 herbæ insectis serpentibus est. draco cum per usum pomorum nausea infestatur, succum syluestris lactucæ exorbet: quod ita facere uisus sæpius est. Canes cum lumbicis infestantur, herbam triuci comedunt. Ciconiæ, cæteræque aues cum uulnus per pugnam acceperint, cunilam plagæ apponunt. locustam etiam complures uiderunt, quoties cum serpente pugnat, collum eius prehendere. Quin & mustela prudenter capere aues uidetur. iugulat enim quas ceperit, ut lupus ouem. Serpentem quoque impugnat, eum præcipue qui mures uenatur, uidelicet ea causa, quia ipsa etiam mures persequitur. De herinaceorum sensu locis multis perpen-

40 sum est: ut qui in cauernis sunt, commutent sua cubilia, aquilonum & austrorum mutatione. qui autem intra tecta aluntur, ad parietes discedunt, quod ita fieri cum Byzantijs quidem animaduertisset, consecutus existimationem est, ut tempus futurum posset præagere. Ictus genus mustelæ rusticæ, quod uiuerram interpretor, magnitudine est, quam inelitenensis catellus minor, sed pilo, forma, albedine partis inferioris, & morum astutia mustelæ similis. mansuefecit maiorem in modum. officit aluearibus: mellis enim auida est. aues etiam petit, ut felis. genitale eius osseum est, ut antè dixi, & medicamento urinæ stillationibus esse putatur. datur per ramenta ex uino.

Greec interfec-
ritur, quod ay-
yau, id est, in
uisculo. et Pli-
nius habet, in
uisculo aliquo.

ὀφθαλμοί, cun-
tila bubula no-
cat Plin.

mustela, id
est, syluestris la-
ctuca, intybi
agrestis.

De ea intelligentie parte, qua animalia quaedam hominum rationem repræsentant, ut
hirundines, & omne columbarum genus: deq; ætate columbarum, perdis
cum, & passerum. Caput VII



Minio ratio brutorum magnam refert uitæ humanæ similitudinem, magisq; in minore genere, quàm in maiore uideris intelligentiæ rationem. quod primum in auium genere hirundo in effingendo, constituendoq; nido ostendit. confingit implicito luto festucus ad normā lutaræ paleationis: & si quando luti inopia est, seipsa madefaciens uolat in puluere omnibus pennis. stragulum sibi etiam more hominum facit, duriora primum subiiciens, & modice totū conseruens pro sui corporis magnitudine. atque in enutrienda prole mira tam mas, quàm scemina æquitate laborat. Impartit pullis singulis cibum, obseruans consuetudine quadā, ne qui acceperit, bis accipiat. excramenta etiam pullorum parentes eijciunt. Post adulescentes iam natos circumagunt, forasq; ipso egerere edocent. Ad hæc, columbi pleraq; contemplationis huiusmodi afferunt. neq; enim cum pluribus adolescere, aut coire patiuntur, neq; coniugium iam inde à primo ortu iniiunt deserunt, nisi coelebs, aut uidua. Quinetiam sceminæ parturienti mas adest, & cultu, omnib; officio fungitur. sæpe etiā sceminam pigrius euntem ad nidum propter partus laborem mas percutit, cogitq; intrare, exclusis iam pullis terrā saluginosam puillimum præmanducatam in eorum os inferens, suum ingerit, atque ita præparat ad cibum recipiendum. adultos iam, cum tempus prodeundi ex nido est, mas subigit. Ita magna ex parte columbæ mutuo degunt amore: sed interdum nonnullæ etiā ex maritatis cum alijs coeunt. pugna hoc an mal est. alter alterum in festat, nidumq; alter alterius subit, sed raro. nam etsi ex longinquo minus, tamen apud ipsum nidum summo certamine dimicatur. proprium columbarum & palumbium & turturum esse uidetur, ne collum cum bibū, resuolunt, nisi satis hauserint. mare uno contenta, & turtur, & palumbes uiuunt, nec alterum recipit. Incubant ambo, & mas & scemina. dignosci mas ne, an scemina sit, haud facile est, nisi interiorum aspectu, uita palumbibus longa, nam ad uigessimum quintum, & ad trigessimum annum protrahitur. nonnullas quadraginta etiam annos compleuisse exploratum habetur. ætate autem prouectis unguis accrescunt, quos recidere solent, qui alunt. nihil, quo lædantur aperte, aliud his senescentibus accidit. Turtures & columbæ uel ad annum octauum uiuunt, scilicet quæ ex cæcitate allectrices aluntur. perdices uita ad quinq; & uiginti annos. Nidulantur & palumbes & turtures semper locis eisdē. & cum mares in totū diuturniores, quàm sceminæ sint, in his marem prius, quàm sceminam mors nonnulli alunt, uidelicet documento earum, quæ domi allectrices aluntur. Sunt qui passerū etiam mares anno diutius durare non posse arbitrentur, argumēto quod ueris initio nulli mentum habere nigrum spectentur, sed postea, tanquam nullus anni superioris seruetur. sceminas uero hoc in genere esse uiuaciores uolunt. capi enim has cum uouellis, cognoscitq; laborum callo asseuerant. Degunt ætate turtures locis frigidis, hyeme tepidis, fringillæ contrā, ætate tepidis, hyeme frigidis.

πελάσπιαι, allectrices, et sic dicuntur columbæ aut aures que in rebus seruiuntur ad alios alliciendo.

De ijs auium, quæ nidum non edificunt, deq; perdis ætate.

Caput VIII



Ves grauiore nidos sibi non faciunt, ut coturnices, ut perdices, & reliquæ generis eiusdē. quibus enim uolandi facultas deest, ijs nidus non prodest, sed facta in aprico area (alibi enim nusquam pariunt) atq; materia, ut uepribus quibuscumq; congestis, quoad accipitrum & aquilarum iniuriā deuitare possint, oua ædunt, & incubant. Mox cum excluderint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt suo uolatu ijs claudum

bum administrare, refouent suos pullos sub se ipsa ducendo more gallinarum, & coturnices, & perdices, nec eodē loco & pariunt, & incubant, ne quis locum percipiat longioris temporis mora, cum ad nidū quis uenando accesserit, prouoluit sese perdis ante pedes uenantis, quasi iam possit capi, atq; ita allicit ad se capiendā hominem, eousq; dum pulli effugiūt: tum ipsa auolat, & reuocat prolem. parit oua non pauciora quā decē, sed sæpius sedecim. Malitiosa astutaq; avis hæc est, ut dixi, secernuntur uerno tempore de grege per cantū & pugnam, coniugatum mares cum foeminis, quamcunq; sibi quisq; forte acceperit, oua mares quæ compererint, peruoluunt, & frangunt præ sua salacitate, ne foemina incubet. quod ne accodat foemina emolians, clanculum diffugiens parit. sed sit sæpius, ut præ turgore parturiendi quolibet loco ædat, & mare præsentī. uerum ut oua seruetur, nunquam ex eo quo peperit loco discedit, & si ab homine uisa est, ita se ab ouis astute quemadmodum à pullis subtrahit, labans ante hominis pedes, dum dimoueat. Sed cum diffugerit foemina ut incubet, mares tumultuant, clamitant, pugnamq; inter se conserunt, quos cœlibes uocāt, qui autē uictus in pugna fuerit, sequitur uictoris uenerem patiens, nec ab alio, nisi à suo uictore subigitur. sed si à comite principis, aut quouis uulgarī uincatur, clam à principe ac furto subigitur. Verū hoc nō ita fieri semper, sed certo tempore anni planū est. Hoc idem à coturnicibus quoq; agi animaduertimus. Gallinacæ etiā interdum faciunt. In templis enim ubi sine foeminis munerarij, diu
 30 catiq; uersantur, non temere eum qui nuper dicatus accesserit, omnes subigunt. nec non perdices mansueti iam & domestici subigunt feros, & spernunt, contumelioseq; tractant. perdicem uenatorem dux syluestrium primus inuadit, pugnamq; obuim conserit, quo capto compage alter occurrit, tum alius, atq; ita singulis dimicatur, si mas sit, qui uenatur. Sed si foemina est, ubi dux ad eius uocem occurrerit, cæteræ uniuerse eum inuadūt, seruiunt, fugant ab ea foemina, inuidētes quod non sibi, sed illi accesserit. hic tacitus ob eam rem sæpe accedit, ne uoce percepta oppugnetur. nonnunquam marem adeuntem efficere, ut foemina obmutescat, ne re cognita pugnare cum cæteris maribus cogatur, periti referunt. perdices nō modo canunt, uerum etiam strident, & uoces alias quasdam emittunt. sæpe & foemina in
 30 bans exurgit, cum marem foemina uenatrici attendere senserit, occurrensq; seipsa præbet libidini maris, ut satiatus negligat uenatricē. Vsq; eadeo tum perdices, tum etiā coturnices copia libidinis gaudent, ut in aucupantes corruant, & sæpenumero capitibus eorum residant. Talis perdicum coitus, & morum astutia est. nidulantur humi, ut dixi, tum coturnices tum perdices, atq; etiam aliæ quædam eiusdem parum uolantis generis. ex his item alaуда, & gallinago, & coturnix, nunquam in arbore consistunt, sed humi.

De pico martio, ex tribus generibus eiusdem.

Caput IX



40 Ontra atq; martius picus, qui humi nunquā consistere patitur, tundit hic quercus uermiū & culicum causa, quo exeant. recipit enim egres-
 sos lingua sua, quam maiusculam & latiusculā habet. candit per arbo-
 rem omnibus modis, nam uel resupinus more stellionum ingreditur.
 ungues etiā habet commodiores quā monedula, ad tutiorem arbo-
 rum reptationem: his enim affixis ascēdit. Sunt picī martij cognomine tria genera,
 unum minus quā merula, cui rubidæ aliquid plumæ inest. alterum maius quā
 merula, tertium nō multo minus quā gallina. nidulatur (ut dictū est) in arboribus,
 cum alijs, tum oleis. pascitur formicis & collis. cum collis uenatur, tam uehemēter
 excauare ut sternat arbores, dicitur. iam uero mitescens quidā amygdalum, quod
 rimæ inseruisset ligni, ut fixum constanter ictum reciperet, tertio ictu pertudit, &
 nucleum edit.

οὐκ ἄνεως οὖν
 ἐν τῷ ἀγρῷ
 φωνῶν, ἰδὲ
 κοίσι, quos uen-
 atur picus
 martium.

De prudentia grunon.

Caput X



Rues etiam multa prudenter faciunt. loca enim longinqua petunt, sui commodi gratia, & uolant alte, ut procul prospicere possint. & si nubes tempestatemq; uiderint, conferunt se in terram, & humi quiescunt. ducem etiam habent, & eos, qui clamant, dispositi in extremo agmine, ut uox percipi possit. Cum consistunt, ceteræ dormiunt, capite subter alam condito, alternis pedibus insistentes. dux detecto capite prospicit, & quod senserit uoce significat. Platea fluuiatilis conchas maiusculas, læuesq; deuorat: quas ubi sibi sua ingluuie coxerit, euomit, ut hiantibus iam legat testis exuens, atque edat.

De domesticis agrestium uolucrum.

Caput XI



Omicilia uero agrestes uolucres aptissime ad uictum, & proles salutem moluntur. Sunt alia parentes feliciores, & suorum gnatorum diligentiores. alia minus. & alij ingenium ad uictum acutius, alijs obtrusius est. Colunt alia loca fragosa, & saxa, & cauernas: ut quem a præruptis torrentiũ aluicis charadrium appellamus, quasi hiaticolam dixeris. praua hæc auis, & colore, & uoce: & noctu apparet, die aufugit. Accipiter etiam locis saxosis & arduis nidulatur. auim quas ceperit, cor nunquam edit. Idq; nonnulli in coturnice, & turdo, alij in alijs obseruarunt. quin etiam uenandi differentia adnotatur, ne simili modo æstate, ut hyeme rapiat. Vulturis uel pullum uel nidum a nemine uisum adhuc nonnulli aiunt. & nimirum ob eam rem Herodotus Brysonis rhetoris pater, aliunde situ eminentiore quodam uenire dixit: argumentumq; afferebat, quod breui tempore multi apparent, & tamen unde, constaret nemini. Sed causa huius rei est, quod rupibus inaccessis pariat: neq; locorum plurium incolæ auis hæc est. edit non plus quam unum ouum, aut duo complurimum. Sunt quæ montes colant & syluas, ut upupa, & brenthus: cui & uictus probus, & uox sonora est. Trochilus & frutera incolit, & foramina. capi difficile potest. fugax atq; infirmis moribus est, sed uictus probitate, & ingenij solertia præditus. uocatur idem & senator, & rex. quamobrem aquilam pugnare cum eo referunt.

De generibus auium, quæ apud aquas degunt, deq; chalcide aue, & eius nantura, necnon de concertatione eiusq; cum aquila, & grunum pugna.

30

Caput XII



Vnt alia quæ uitam apud mare traducunt, ut cinclus, qui astutus, & capi difficilis est, sed captus omnium maxime mitescit. læsus hic est: incontinens enim parte sui posteriore. uiuunt apud mare, & fluuios, & lacus palmipedes omnes. natura enim ipsa querit, quod sibi commodus sit. Sed multæ etiam sidipedes circa aquas, paludesq; degunt, ut florus apud omnes, cui color pulcher, & uita commoda. Cataracta mari uictat, & cum se alto ingurgitat, manet non minus temporis, quam quo spacium transteris iugeri. minor quam accipiter auis hæc est. Olores etiam palmipedes sunt, & apud lacus, paludesq; uiuunt: nec probitate uictus, morum, proles, senectutis uacant. Aquilam, si pugnam coeperit, repugnantes uincunt. ipsi autem nunquam nisi prouocati inferunt pugnam. canere soliti sunt, & præcipue iam iam morituri. uolant etiã in pelagus longius. & iam quidã cum in mari Africo nauigarent, multos canentes uoce fiebilit, & mori nonnullos conspexere. Chalcis raro apparet: montes etenim incolit. nigro colore est, magnitudine accipitris, quem palumbarum nominant, forma longa ac tenui. lones cymindem eam appellant. Cuius Homerus etiam

etiam meminit in Iliade, cum dicit:

Chalcida dii perhibent, homines dixere cymindem.

Sunt qui eandem hanc auem nō aliam esse, ac prygem uelint. Interdiu minus apparet, quia non clare uidet, sed noctu uenatur more aquilæ: & pugnat uero cum aquila adeo acriter, ut sæpius ambæ implexæ, deserantur in terram: & uiuæ à pastoribus capiuntur. Parit hæc oua duo, & saxis spelundisq; nidulatur. Grues etiam pugnant inter se tam uehementer, ut dimicantes capiuntur, hominem enim expectare potius, quàm pugna desistere patiuntur. pariunt oua non amplius quàm bina.

De partu & nidificatione picarum, meropis, luteæ, argathylis, & cinnamomi Arabici, deq; ciconiarum & meropum prudentia in ascendis parentibus.

Caput XIII



Ica uoces plurimas cōmutat: singulis enim ferè diebus diuersam emit tit uocem. Parit oua circiter nouem numero. nidum in arboribus facit ex pilis, & lana. glandes cum deficiūt colligit, & in repositorio absconditas referuat. Ciconias genitorum senectutem inuicem educare inuulgatum est. Sed sunt qui meropes quoque idem facere cōfirmant, uicemq; reddi, ut parentes nō modo senescentes, uerumetiam stam, cum iam datur facultas, alantur opera liberorum: nec matrem aut patrem exire, sed in cubili manentes pasci labore eorum, quos ipsi genuerunt, enutrierunt, educarunt. pen-
 20 næ huius auis inferiores pallidæ sunt, superiores cœruleæ, ut halcyonis: postremæ pinnulæ rubræ habentur. parit sex aut septem æstate in præcipitijs mollioribus, in-
 tro uel ad quatuor cubita subiens. Lutea dicta à colore partis suæ inferioris pallido, magnitudine alaudæ est, parit quatuor aut quinque. nidum sibi ex alo herba euulso stirpitius facit, sed stragulum subijcit ex uillo, & lana. hoc idem & merula facit, & pica, interioraq; nidis ex eisdem consternunt. Solerti porro ingenio argathylis in ripariarum genere suum instruit nidum: filis enim intexit lineis specie pilæ, aditu ar-
 30 cto. In Arabia cinnamomus auis appellatur, quam surculos cinnamomi portare, ac nidum ex his conficere aiunt. nidificat excelsis arboribus, & ramis: sed in colæ sagittis plumbatis nidum petunt, atq; ita discusso in terram cinnamomum legunt.

Cinnamulgu à Plin. ab Arist. Cinnamomus: nisi fortè legendum sit, cinnamulgu.

De specie, nidulatione, & partu alcedonum.

Caput XIII



Alcedo non multo amplior passere est, colore tum cœruleo, tum uiridi, tum etiam leuiter purpureo insignis, uidelicet non particulatim colore ita distincta, sed ex indiscreto uarie resurgens corpore toto, & alis, & collo. rostrum subuiride, longum & tenue. Talis species eius est. nidus marinæ similis pilæ, & ijs quæ à flore maris halofachnæ dicantur. Sed colore leuiter ruffo, figura proxima cucurbitis medicinalibus ijs, quibus collum porrectius est. magnitudo maximis amplior quàm spōgiæ, sunt enim alij maiores, alij minores. cōseptus, stipatusq; undiq; est, & crebro tum inani, tum
 40 solido constat. reniuntur ferramento acuto, ut uix possit discindi. Sed si unā & ferro tundis, & manu collidis, facile perinde ut flos aridus maris (halofachnam dico) confrangitur. Manus angustum, quoad sit exiguus aditus, ut etiam si uertatur mare, influere nequeat. habet sua inania proxima cauis spongiarum. Ambigitur ex qua nam materia componatur. Videtur tamen ē spinis potius acus piscis constitui, piscibus enim alcedo uiuit. sed amnes etiam subit, ascendens longius, par-
 tus huc ouis maxime quinque consumitur. foetificat toto suæ
 45 ætatis tempore. parere nata mēses quatuor, incipit.

De partu & nidificatione upupe, pari, atricapillæ, salis, & nireonis. Caput XV



Pupa nidum potissime est stercore hominis facit. mutat faciem tempore æstatis, & hyemis, sicut cæterarum quoque agrestium plurimarum. Parus oua plurima ædit, ut aiunt. Atricapillam etiã plurima ædere aliqui referunt, sed post Africam strutionem. Iam uel decem & septem oua atricapillæ reperta sunt. Sed, plura etiam quàm uiginti parit, & numero impari semper, ut narrat. nidificat ea quoque in arboribus, & uermiculis altitur. proprium huius & luscinie præter cæteras aues, ut lingue summæ acumine careat. Salus uitæ commoditate, & partus numero commendatur, sed alterius pedis claudita te cedit. Vireo docilis, & ad uitæ munera ingeniosus notatur, sed male uolat, nec grati coloris est.

De uelis aue, & eius colore, & statura.

Caput XVI



Elia cum primis uitæ commoditate nota est. consistit æstate in umbra & aura: hyeme in sole & apricis. inspectat paludes ab arudinibus summis. paruo corpore est, sed uoce proba, colore etiam pulchro, necnon ingenio ualet in uitæ officijs, & speciem præ se fert decorâ. peregrina hæc auis esse uidetur, quippe quæ raro nostris locis appareat.

De moribus & natura cregis, fittæ, ulule, certhiæ, & ligurini.

Caput XVII



Rex moribus pugnacibus est, ingenio ualens ad uictum, sed cætera infelix. Sunt & ei, quæ sita dicitur, mores pugnaces, sed animus hilaris, concinnus, compos uitæ facillioris, rem maleficam ei tribuit, quia rerum callet cognitione. prolem hæc numerosam, felicemque progenit. uluit maceriem contundens. Ulula nocte uagatur, ac pascitur: die raro apparet. Colit hæc etiam saxa & speluncas. uictus enim gemini est. pollet ingenio ac industria in uitæ muneribus. Nouimus auiculam quandam exiguum nomine certhiam, cui mores audaces, domicilium apud arbores, uictus ex coltis, ingenium sagax in uitæ officijs, uox clara. Ligurini, & uita & colore ignobiles sunt, sed ualent uocis amoenitate.

De tribus ardeolarum generibus, & earum uita, deque phoicis natura.

Cap. XVIII 30



Rdeolarum pella difficulter coit, ut dictum est, sed sagax & cœnæ gerula est, & operosa. Agere interdum solet: colore tamen est prauo, & aluo humida. Reliquarum duarum (tria enim sunt genera) candida, colore est pulchro, & coit, & nidulatur, & parit probe. pascitur paludibus, lacu, campis, & pratis. Sed stellaris piger cognominata (in fabula est, ut olim e seruo in auem transferit) atque ut cognomen sonat, iners, ociosaque est. talis ardeolarum uita est. Phoici appellatæ, peculiare præ cæteris est, ut oculos potissimum appetat. inimica est harpæ, uictus enim earum similis est.

De duobus merularum generibus.

Caput XIX

40



Merularum duo sunt genera, alterum nigrum & uulgare. alterum candidum, magnitudine quidem compari, & uoce simili: sed circa Cylenam Arcadiæ familiæ, nec usquam alibi nascens. Est enim ex hoc genere quæ similis nigræ sit, sed fusca colore, & magnitudine paulo minor. uersari hæc in faxis, & tectis solita est: nec rostrum rutilum, ut merula habet.

De tribus

De tribus turdorum generibus.

Caput XX



Vrdorum tria sunt genera, unum uisciuorum, quod nisi uisco, atq; resina non uescitur, & magnitudine picæ est. Alterum pilare, quod sonat acure, & magnitudine merulæ est. tertium, quod iliacum quidam uocant, minimum inter hæc, minusq; maculis distinctum.

De aue cæruleo nomine, & eius forma.

Caput XXI



Ouimus & saxatilem auiculam quandā, cui nomen cæruleo, quæ maxime in Scyro colit, saxa amans, magnitudine minor quā merula, maior paulò quā fringilla. pede magno est, scanditq; saxa: colore cæruleo, rostro tenui & longo, crure breui similiter ut pipo est.

De uircone, & mollicepite auius.

Caput XXII



Ireo totus uiridans ex obscuro est. hyeme hic non uidetur, sed æstiuo solstitio potissimū uenit in conspectum. discedit exortu arcturi syderis, magnitudine turturis est. Molliceps eodem in loco semper sibi statuit sedem, atq; ibidem capitur. grandi & cartilagineo capite est, magnitudine paulò minor quā turdus, ore firmo, paruo, rotundo, colore totus cinereo, depes & pennis inualens est. Capitur maxime noctu.

De pardalo, & collurione, deq; auius cæteris, quæ semper conspicue sunt.

Caput XXIII



Ardalus etiam auicula quædam perhibetur, quæ magna ex parte gregatim uolat, nec singularē hanc uideris. colore tota cinereo est, magnitudine proxima superiori; sed pennis ac pedibus bonis. uocē frequentem, nec grauem emittit. Collurio eisdem, quibus merula uescitur. magnitudo eius quoq; eadem quæ superioribus est. capitur hyerno potius tempore. Hæc omnia semper apparēt, atq; etiā ea quæ in urbibus solent præcipue uiuere, ut coruus, ut cornix: nam ea quoq; semper cōspicua sunt, nec loca mutāt, aut latent.

De tribus generibus monedularum.

Caput XXIII



Onedularum tria sunt genera. unum quod graculus uocatur, magnitudine quanta cornix, rostro rotundo, rutilo. Alterum lupus cognominatum paruū, & scurra. Tertium, quod familiare Lydiæ, ac Phrygiæ terræ, idemq; palmipes est.

De duobus laudarum generibus.

Caput XXV



Laudarum duo sunt genera, alterū terrenū, cristatum, galerita à crista appellatum. alterū gregale, nec singulare, more alterius: uerū colore simile, quanquam magnitudine minus, & galero carens: cibo uero idoneum.

De gallinagine, & sturno, earumq; forma.

Caput XXVI



Allinago dicta, per sepes hortorum capitur, magnitudine quanta gallina est, rostro longo, colore attagenæ. currit celeriter, & hominem mire diligit. Sturnus niger, albis distinctus maculis est, magnitudine merulæ.

De ibe, & duobus earum generibus.

Caput XXVII



Bes Aegypti duplici genere distinguuntur. sunt enim aliæ candidæ, aliæ nigræ. candidæ apud Pelusiū tantū non sunt, cum in reliqua tota Aegypto habeantur, nigræ contrā apud Pelusiū tantū, in cætera Aegypto nullæ.

De duobus asionum generibus.

Caput XXVIII



Siones aliqui omnibus anni temporibus patent, & ob eam rem perennes, & temperationes uocabulo cōposito appellātur. qui esui non sunt propter uitium carnis. Aliqui autumno interdum apparēt, nec plus uno aut altero die immorātur: qui & esui sunt, & ualde probantur. differunt hi nullo serē alio à perennibus illis, nisi corpulentia pingui, & quod uox his deest, illis non deest. de generatione eorum, quānam sit, nihil adhuc exploratū habemus, nisi quod fauonijs flauibus apparēt. certū enim hoc est.

De cuculi factu, & eius prudentia.

Caput XXX



Vculus, ut antea dictum est, non nidificat, sed in nidis parit alienis, & præcipue in palumbium, & curucæ, & alaudæ, humi, atque etiam in nido luteolæ appellatæ super arborē. parit hic unum ouum, nec ipse incubat. Sed auis in cuius nido pepererit, ea incubat, excludit, atque enutrit. quæ cum ipse alienigena pullus accreuerit, suos eijcere dicitur, ita ut pereant. Alij eos à genitrice occidi, & dari in cibo cuculi pullo aiunt, uide licet improbatos propter speciem cuculi elegantiorē. sed quanquam plurima ex ijs uidisse nonnulli confirmant, tamen de pullorum interitu non conuenit inter omnes. Alij enim cuculum ipsum repetere nidum, cui suum ouum mandarit, pullosq; deuorare nutritis uolunt. alij pullū cuculi, quod magnitudine præflet, posse percipere cibum omnē oblatum, atq; ita cæteros fame perire autumant. alij ipsum ut fortiores, cæteros passus consortes occidere autores sunt. sed prudenter sanè prolis suæ procreationē moliri uidetur cuculus. Cum enim se ignauum, minimeq; opitulandi potentem nouerit, facit quasi supposititios suos pullos, quō seruari possint. timiditate enim hæc auis excedit, quippe quæ ab auiculis uellatur, & præ metu earum fugiat.

De apodum nidulatione, & caprimulgi forma.

Caput XXX



Podes, quos aliqui cypsellos appellāt, similes esse hirundinū, dictū iam est. Haud enim discerni ab hirundine possunt, nisi quod tibijs sunt hirsutis. nidum specie cistellæ productæ longius, sicut ex luto, uno aditu dato arctissimo, faciunt: idēq; locis angustis intra saxa & specus, ut & belluas deuicare possint, & homines. Quem caprimulgum appellant, auis montana est, magnitudine paulō maior quā merula, minor quā cuculus, moribus mollior. parit oua duo, aut tria cum plurima. fugit caprarum ubera aduolans, unde nomen accepit. Cum suxerit, uber extingui, capramq; excæcari aiunt. Parum clare interdū uidet, sed noctu perspicax est.

De coruorum nidificatione, & factu.

Caput XXXI



Orui locis arctioribus, & ubi non satis cibi pluribus sit, duo tantum incolunt; & suos pullos, cum tam potestas uolandi est, primum nido eijciunt, deinde regione tota expellunt. parit coruus quatuor, & quinque. Tempore quo apud Pharsala hospites Mediæ periere, corui locis Athenarum Peloponnesiq; desuerunt, quasi sensum haberent aliquem, quo inter se rerum euenta significarent, & mouerentur.

De sex aquilarum generibus, earumq; nidulatione, & uenatione.

Caput XXXII



Quilarum plura sunt genera. unum quod pigargus ab albicante cauda dicitur, ac si albicillam nomines. gaudet hæc planis, & lucis, & opidis. hinnularia à nonnullis uocata cognomine est. montes etiam syluamq; suis freta uiribus petit. reliqua genera raro plana, & lucos adueunt. Alterum genus magnitudine secundū, & uiribus, planga, aut clauga

clausa nomine, saltus & conualles, & lacus incolere solitum, cognomine anataria, & morphna à macula pennæ, quasi naviam dixeris, cuius Homerus etiam meminerat in exitu Priami. Tertiū genus colore nigricans, unde nomen accepit, ut pulla & fulua uocetur, magnitudine minima, sed uiribus omnium præstantissima hæc est. Colit montes ac sylvas, & leporaria cognominatur, una hæc fœtus suos alit atque educit, pernix, concinna, polita, apra, intrepida, strenua, liberalis, nō inuida est: modesta etiā, nec petulans, quippe quæ nō clangat, neq; lippiat, aut murmuret. Quartum genus percnopterus ab alarum notis appellatū, capite albicante, corpore maiore quā cæteræ adhuc dictæ hæc est: sed breuioribus alis, cauda longiore, uultus ris speciem hæc refert, subaquila, & montana ciconia cognominatur, incolit lucos degener, nec uitij cætararum caret, & bonorum quæ illi obinēt, expers est: quippe quæ à coruo cæterisq; id genus alitibus uerberetur, sugetur, capiatur, grauis est enim, uictu iners, exanimata fert corpora, famelica semper est, & querula, clamarat, & clangit. Quintum genus est quod haliaetus, hoc est marina uocatur, ceruice magna, & crassa, alis curuantibus, cauda lata, moratur hæc in littoribus & oris, addit huic sæpius, ut cum ferre quod ceperit nequeat, in gurgitē demergatur. Sextū genus gneſium, id est, uerum germanumq; appellant, unum hoc ex omni auium genere esse uerū, incorruptūq; ortus creditur, cætera enim genera, & aquilarum, & accipitrum, & minutarū etiam auium, promiscua adulterinaq; inuicem procreant.

Maxima aquilarū omnium hæc est, maior etiam quā ossifraga, sed cæteras aquilulas, uel sesquialtera portione excedit, colore est rufus, conspectu rara, more eius quā cymindem uocari diximus. Tempus aquilæ operandi uolandiq; à prandio ad meridianum, mane enim quiescit usquedum forum frequens, & prandendum iam sit, senescentibus aquilis rostrum superius accrescit, incuruaturq; subinde magis magisq; ut demū fame intereāt, cui rei data est fabula, ut hoc ita accidar aquilæ, quoniam cum olim homo esset, hospiti iniuriā intulerit. Condunt, referuntq; suo in nido quantum cibi pullis super sit, quod enim die quacq; facultas uenandi nō datur, sit interdum ne quod portent extrinsecus habeant, si quem deprehenderint uiolentem nidum, uerberant suis alis, & unguibus lacerant. Nidulantur locis non plantis, sed cellis, præcipue quidē arduis faxis & præcipitibus, sed arboribus etiam.

Alunt suos pullos donec potestas uolandi fiat: tum nido eos expellunt: post regionem quam ipsi genitores incolunt, tota exterminant. Tenent enim singula aquilarum paria longum tractum, unde sit, ne ullo pacto uicinos habere patiantur. Venantur locis non suo nido propinquis, sed longe distantibus. Rapta non protinus ferunt: sed cum corripuerint & sustulerint, deponunt, expertæq; iam pondus re quiescunt, leporem etiam non statim rapiunt, sed expectant dum prodeat in plana, nec protinus de alto in terram ruunt, sed paulatim descendunt, quæ ideo faciūt, ut tiores ab insidijs sint, considunt etiam locis ædiuoribus, quia difficulter à terra tollitur, uolat sublimes, ut perquam maxime procul aspiciāt, quapropter homines

solum auium omnium aquilam esse diuinam perhibent. Omnes profectio quibus unguis adunc, minime in faxis consistit, quoniam faxi durities impedimēto curuaturæ unguium est. Venatur aquila lepores, huius, uulpes, & reliqua quæ uinere ualeat. Viuit tempore longo, quod diuturnitate nidi eiusdem declarat.

De aut quadam scythica, & eius nidificatione.

Caput XXXIII



Cythiæ terræ incolæ auis est, magnitudine otidis, hoc est auis tardæ, quæ duos procreat pullos. & quæ peperit oua non incubitu fouet, sed condita in leporina, aut uulpina pelle relinquit, atq; ita obuoluta in summa arbore collocat, cumq; à uenatione uacat, custodit, & si quis scandit, impugnat, & uerberat alis perinde ut aquilæ faciunt.

De noctua, cicunia, & ossifraga.

Caput XXXIII



Noctua, cicunia, & reliqua, quæ interdiu nequeunt cernere, noctu ue-
 nando cibū sibi acquirunt. Verū non tota nocte id faciūt, sed uespertino,
 & matutino. Venantur autem mures, lacertas, uerticillos, & eius-
 modi alias quasdam bestiolas. Quæ ossifraga appellatur, probe & so-
 tificat, & uiuit, cenæ gerula, & benigna est. nutrit bene & suos pullos, & aquilæ,
 cum enim illa suos nido eiecerit, hæc recipit eos, ac educat. mittit namq; suos aquila,
 antequam tempus sit, adhuc parentis operam desiderantes, nec uolandi adeptos
 facultatem: quod per inuidiam ita facere creditur. natura enim inuida & famelica
 est, nec copiosa uenationis. magnum tamen quid nanciscitur, cum uenatur. inui-
 det igitur suis liberis tam masculis, atque edaculis, & ob eam rem unguibus
 secat. Pulli etiam ipsi inter se pugnare incipiunt de sede, ac pasto. Itaque à parente
 eiiciuntur, & pulsantur. deieci uociferantur, periclitanturq; Sed ossifraga recipit eos
 benigne, & tuetur, & alit, dum quantum satis sit adolescant. Parum hæc oculis ua-
 let. nubecula enim oculos habet læsos. At uero marina illa clarissima oculorū acie
 est, ac pullos adhuc implumes cogit aduersos intueri solem. percutit eum qui recu-
 set, & uertit ad solem. Tum cuius oculi prius lachrymarint, hunc occidit, reliquum
 educat. Vagatur hæc per mare & littora, unde nomen accepit: uiuitq; auium ma-
 rinarum uenatu, ut dictum est. Aggreditur singulas. cum emergentē obseruarit,
 refugit autē ut euolas uidit aquilam, & metu percussa se rursus ingurgitat, ut in
 diuersa prolapsa emergat. Sed hæc acie oculorum ualens, sedulō aduolat donec
 uel strangulet in humore, uel per summa corripiat. Vniuersas nunquam inuadit.
 arcent enim frequentes, respergentesq; suis alis repellunt.

Fulicarum aucupatio.

Caput XXXV



Fulicæ spuma capiuntur, appetūt enim eam auidiū. quocirca spuma in-
 spersa eas uenari in usu est. Caro earū probi odoris est, excepta parte po-
 steriore & ultima, quæ sola lituum olet. pinguescunt satis, & esui sunt.

De accipitrum generibus numero decem.

Caput XXXVI



Accipitrum genus præcipuum buteo est, triorcha à numero testium
 nuncupatus. secundū a falco. tertium circus. Stellaris autem, palum-
 barius, & pernix differūt, appellantur subbuteones qui lattores sint.
 alij perca, & fringillarij uocantur. alij leues & rubeiarij, qui abunde
 uiuunt, atq; humiuolæ sunt. Genera non pauciora quàm decem esse
 accipitrum aliqui prodiderunt, quæ modo quoque uenandi inter se dissident. Alij
 enim columbam humi confidentem rapiunt, uolantem non appetunt. alij super
 arborem, aut tale quid conscendentem uenantur: sin humi est, aut uolat, non in-
 uadunt. Alij neque humi, neque in sublimi manentem aggrediuntur, sed uolan-
 tem capere conantur. Fertur etiam à columbis quodq; accipitrum genus cognosci.
 itaque cum accipiter prouolat, si sublimipeta est, manent quo consisterint loco: sed
 si humipeta, qui prouolat, est, non manent, sed continuo uolant. Thracie parte,
 quæ olim Cedropolis uocabatur, homines societate accipitrum per paludes aucu-
 pantur. Cum enim ipsi lignis, quæ tenent, arūdines & fruteta mouerūt, quo aues
 euolarent, accipitres desuper insectantur: quorum metu aues perculse terram re-
 petunt. mox homines percutiunt baculis, itaque capiunt. tum partem earum quæ
 ceperint, auium accipitribus impartitūtur. Quinetiam apud Mæotidem paludem
 Iupos esse piscatorū familiares aiunt, & nisi partem suam à piscatoribus acceperint,
 recta cum in terra expansa reliccantur, lacerare. Ratio auium talis est.

De

De ingenio marinorum & fluuialium piscium pro ratione commodioris uitæ.

Caput XXXVII



- Ed in marinis quoque animantibus permulta intelligi possunt, non sine solerti ingenio effici ratione uitæ cōmodioris. Nam & inuulgata illa de rana, quæ piscatrix cognominata est, & quæ de torpedine, uera omnino ceteræ sunt. Rana enim ijs, quæ gemina ante oculos suos dependent, quorum fila capilli speciem referunt, sed postrema rotundis quibusdam præpilantur, quasi esæ causa additis: his inquam, ubi locis arenosis aut sculentis obturbato solo se abscondit, piscatur attollens illa sibi pendentia fila.
- 10 dum enim pisciculi occurrunt, & capita machinamenti pensilis pulsant, ipsa subra hens fila allicit, donec eos suum in os adducat. Torpedo pisces quos appetit, afficit ea ipsa, quam suo in corpore continet facultate torpendi: atque ita retardos præstare capit, & uescitur. abdit se in arena & limo, tum pisces qui adnatantes obtorpuerint, corripit, quam rem plerique conspectam à se retulerunt. Pastinaca etiam seipsa occultat, sed non simili modo, argumentum sic uiuere hos pisces adduci potest, quod sæpius habentes in uentre mugilem capiuntur uelocissimū piscem, cum tardissimi ipsi sint. Tum etiam rana quæ caruerit præpilatis uillorum illis capitibus macilentior capitur. torpedinem autem uel hominibus inspirare torporem certum est. Obruunt arena sese & a fellis, & raia, & passeris, & squatina. cumq̃ nullam sui corporis partem intactam reliquerint, uerberant radiolis sui oris, quos piscatores uirgulas uocant, quas pisciculi cum aspexerint, adnatant quasi ad algas, quibus uesci soliti sunt. Quo in loco anthias sit, nullam sibi belluam esse confessum est, quo iam indico secure spongiores urinantur, & sacrum hunc piscem ob eam rem nominant. sed id casu sic euenire dixerim, quomodo & ubi sit limax neque sus est, neq̃ perdidit. omnes enim limaces ab his eduntur. Serpens marina colore & corpore congro proxima est, sed obscurior atque acrior. hæc si capta dimittatur foris, in arenam rostro quamprimum adactio terebrat, subitq̃ tora. est ore acutiore hæc quam terre stes. Qui autem centipeda appellatur, ubi hamum deuorat, euomit foras sua interiora, donec hamum eijciat. tum recipit intro, ac ualeat eadem, qua antè, salubritate, appetitus his quoque nidorulentorum ut terrestribus est, mordent non ore, sed tactu totius corporis similiter, ut quæ urtica uocatur. Pisces, qui uulpes nuncupantur, cum se deglutisse hamū senserint, sibi opitulantur, ut centipedæ, longius namq̃ sese efferentes hami lineam abrodunt. capiuntur enim locis nonnullis hamo multiplici, gurgite præalto, & fluctuoso. Quinetiam amia cum belluam uiderint altissimam, colligunt sese, & quæ magnitudine præstant, iustrantes gregem circumualant: & si qua uiolatur, defendunt. dentes his ualidi. & iam cum alia belluæ, tum la mia aggressa, uulnera accepisse acris uisa est. Fluuiatium silurus mas plurimum curæ proli impendit. femina ut peperit abit. sed mas quo in loco plurimus foetus constitit, perseuerans oua custodit: nec alium præbet usum, nisi ut pisciculos ne diripiant foetum, arceat idq̃ uel ad quadagesimum, & quinquagesimum diem facit, donec satis iam aucta soboles se tueri à cæteris piscibus ualeat. prehenditur sæpe à piscatoribus ubi oua custodit. dum enim arceat pisciculos, quatit, proflit, & ictum, sonumq̃ mouet. manet apud oua tam ardente animo, ut cum sæpe à piscatoribus oua, si præaltis gurgitibus subsidit, educantur, quoad magis fieri potest, in uadum, ipse tamen eodem studio foetum sequatur, neq̃ deserere unquam patiatur. tunc si minor sit natu, minusq̃ usu exercitatus, facile hamo capitur: sed si peritus & hamifraga est, morfu dentis sui durissimi rumpit hamū, & foetū assidue custodit. Omnia uero tum nantia, tum stabilia, locis eisdem quibus orta sint, aut similibus degunt. suus enim quibuscq̃ cibus in ijs est. Vagantur maxime & oberrant, quæ carne alim

tur, præter pauca, ut mugilem, salpam, mullum, æricam. Quæ autem pholis appellatur, mucorem quem ipsa emittit, sibi obducit, ita ut in eo quasi cubili quiescat. Ueneris testati & expedis pecten potissimum plurimumque se mouet uolatu. nam purpura & eius similia, parum admodum progrediuntur. De Euripo Pyrrhæo pices per hyemem omnes, excepto gobione, foras enatant propter frigus. locus hic enim frigidior est. sed ineunte uere eodem redeunt. Vacat Euripus scaro, & alofa, & reliquis spinosioris generis omnibus. musteli etiã, & spinaces in eo mari nequaquam gignuntur: neque locustæ, polypii, bolitenæ, atque alia quædam genera. gobione m album Euripi non esse pelagium certum est. Vigent pisces ouipari ueris tempore, donec pariant. uiuipari autumno, atque etiã mugiles, muli, & reliqui generis eiusdem. Apud Lesbum insulam omnia tam pelagia quàm Euripica parere solent in Euripo. coeunt autumno, pariunt uere. cartilaginea etiam autumno. mares cum fœminis circa coitum congregantur. Sed uere subeunt Euripum disuncta: neque coniugium reperitur ullũ, donec pariant, cum coitus tempore complura ex his sibi adherentia capiuntur. Mollium astutissima sepia est, sola hæc suo utitur atramento, non modo cum metu, uerum etiam abscondendi causa. polypus atque loligo atramentum prometu mittit, sed accrescit denuò postquam miserit, ut nunquam copia desit atramenti. cæterum sepia, ut dixi, sæpe uel sine pauore suo utitur atramento ad se occultandam. & cum progressa pauulum se ostenderit, redit in atramentum, uenatur etiam suis illis prælongis prætenturis non solum pisciculos, sed mugiles etiam sæpius. polypus fatuus quidem est, cum ad manum demissam hominis accedit. sed prudens rei familiaris, cum omnia colligat, & suo in domicilio recondat. cumque consumpserit quantum utile sit, abigit testas, & cancrorum crustas, & putamina conchularum, & spinas pisciculorum. sui etiam mutatione coloris uenatur pisces. trahit enim sibi colorem similem ijs, quibus appropinquaret faxis. quod idem etiam cum meruerit facit. Sunt qui sepiam quoque facere hoc idem autumentum colorem nanque eam sibi contrahere similem loco, in quo uersatur, confirmant. Sed piscium sola squatina ita affici solet. mutat enim hæc more polypii suũ colorem. Genus polyporum magna ex parte biennio uiuere non potest. sua enim natura tabi obnoxium est. cuius rei indicium, cum pressus polypus aliquid subinde humoris emittat, demumque absumatur totus. quod fœminis à partu potissimum incidit. stupent etiam fœminæ, ut neque undis iactatæ sentiant, & manu urinantis de facili capiuntur. sordescunt etiã, nec præterea assidendo uenari possunt. mares uero aluo tument, & in mucorem lentescunt. Indicium ne bimatum compleant esse uidetur, quod abortu eorum, qui æstate fit, ad autumnum non facile grandem polypum uideris, cum paulò ante id tempus prægrandes spectentur. à partu ita senescere debilitarique tam marem quàm fœminam serunt, ut uel à pisciculis deuorentur, & facile à suis detrahantur cubilibus, cum antea nihil tale ijs usu eueniat. tum uero paruos, nouelloseque quamuis recens natos, tamen nullo eiusmodi malo affici narrant. Quinimò ualidiores esse quàm grandes confirmant. Sepias etiam bimatu non uti uere apertum est. Mollium unus polypus exit in secum, gradiatur per asperiora, uolat læuia. ualidum cum cæteris suis partibus hoc animal sit, collo tamen imbecille cum premitur, est. mollia ita se habent. Conchas tenuiores scabrasque efficere circum se, uelut lorica duram, eamque eo ampliorem, quo ipsæ sunt ampliores, atque de ea quasi latibulo aut casula quadam prodire aiunt. Nauta quoque polypus natura, & uitæ muneribus singularis est. nauigat enim per maria summa elatus, de imo gurgite effert se concha inuersa, ut ascendere possit facilius, & inani scapha enauiget. Vbi uero emerit, concham reuertit. habet inter sua brachia membranulam quandam annexam similem ijs, quæ digitis insertæ palmipedum auium continentur.

tur: uerum illæ crassiusculæ sunt, hæc prætenuis est, & araneæ speciem imitatur. hæc uelificat, cū aura inspirat, citros pro gubernaculis utroq; demittit latere. si quid metuerit, concham protinus mari replet, atq; ita demergit. de generatione incrementi eius conchæ nihil adhuc exploratum habeo. uidetur tamen non ex coitu gigni, sed sponte, ut cætera conchæ prouenire. nec uero an concha solutus uiuere possit, certum adhuc est.

De ingenio insectorum, & formicæ studio.

Caput XXXVIII



Insectorum officiosissimum, & præ cæteris serè omnibus animalibus genus formicarum & apum est. crabrones item ac uespæ, & propè dixerim omnia huius cognata generis. aranei etiam lautiores & strigosiores, ingeniosiores in uitæ muneribus sunt. iam formicarum negotia omnibus in promptu habentur: utq; eadem semita semper ambulant, & cibaria recondunt, & cellas promptuaras faciunt, nec interdiu solum, sed etiam noctibus plena luna laborem exercent, nemo est, qui non uideat.

De generibus araneorum, eorumq; industria in uenatione, & tela conficienda.

Caput XXXIX



Raneorum aut & phalangiorum plura sunt genera. mordax, quod in duo distinguitur, alterū simile ijs, quæ lupos appellantur, paruum, uarium, procax, falax, pulex nuncupatum, alterum maius, coloris nigri, cruribus prioribus nigris, tardum, & lente ambulans, nec uiribus ualens, neque saliens. Cætera, quæ medicamentarij proponunt, aut nullum, aut certe exilium inferunt morsum. Genus secundum, quod lupi nomen accepit, partim exiguum est, quod non texit: partim maius, quod alperam paruamq; telam apud terram, aut fepes orditur. buculis intexere solitum primordijs intus positis obseruatur. dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accurrit, ut capiat, partim uarium est, quod paucam, uilemq; telam sub arboribus facit. Tertium genus, quod sapientissimū lautissimumq; omnium est, texit enim primum filis quoquo uersus distendens in orbem, tum stamina ducens, initio à medio accepto: nec incite mediū ipsum accipit: deinde subtegmina inferens, atq; stipans, cubile & repositorium alibi sibi constituit: sed uenationem in medio sui operis obseruando exercet. Cum enim bestiola eò inciderit, motu medijs excitus occurrit, deuincitq; primū obuoluens araneis, dum defatiget, infirmamq; faciat, tum tollit ac deserit: & si forte fame tenetur, exugit. hæc enim fructio eius est, sin minus, recōdito, quod ceperit, in repositorio, repetit uenandi negotium: sed prius confarcinato, quod per uenatum laceratū est. si quid inter mediū & extrema inciderit, primum ipse in mediū currit, inde ad id quod inciderit, uelut à statuto initio properat. Si quis telam lacerarit texere iterum incipit, uenatur oriente sole, aut occidente: quoniam bestiola temporibus his potissimū offendant. Fœmina & textit & uenatur. mas comes fruendi, non laborandi est. Araneorum lautiorum, & telam spissiore textentiū, duo sunt genera. alterum minus, alterū maius. quod igitur longioribus est cruribus pendens subtus obseruat, ne bestiolæ præ formidine sibi caueant, sed incaute incidunt in partē superiorem. ineptius enim propter sui corporis magnitudinē est. At alterum quod moderatus est, superne obseruat, latens in quodā exiguo suæ telæ foramine. Aranei statim cum æditi sunt, fila mittunt, nō intrinsicè tanquam excrementū, ut Democritus ait, sed extrinsicè de suo corpore ueluti corticem, aut more eorū, quæ suos uillos iaculantur, ut histricis, maiora etiam animalia inuadit, irretitq; suis filis, nam & lacertos paruos aggressus circumdat os, & filis obducit, donec cohibeat: mox ad hærens, morsum deligit. hæc ita se habent.

offu nō pndu
univ. procax,
falax. Plin. acu
mination, assul
tim ingrediendi.

De generibus apum, earumque studio in edificandis suis, deque his herbis, quibus apes aluntur.

Caput XL



Enus est insectorum quoddam nomine adhuc uacans, quo uno comprehendatur: sed formam suarum partium cognatam omnium referens, uidelicet ea quæ fauos faciunt, ut apes, & reliqua similis formæ insecta, quorum genera nouem numero sunt. Sex illa ex his gregalia, apes, reges apum, fuci, qui inter apes degunt, uespæ annuæ, item crabrones, & teredines. Solitaria uero reliqua tria. sirenis minor, qui fuscus totus est, sirenis maior, niger, uarius, tertium, quem bombycem uocant, qui maximus inter hæc est. Formicæ nihil uenantur, sed facta ab alijs colligunt. Aranei nihil faciunt neque recedunt, sed cibum solum uenatu sibi acquirunt. Ex nouem istis, quæ modo enumeravi generibus, apes (nam de cæteris post) nihil uenantur, sed ipsæ sibi cibaria faciunt, atque recondunt. mel enim cibus earum est. cuius rei indicium faciunt, cum apiarij eximere incipiunt fauos. quamuis enim suffiantur, uehementerque ex fumo laborēt, tamen plus mellis tunc ædunt quam prius. quod enim cibi causa sibi recediderint, parcius eo temporibus cæteris uruntur: sed habent etiam quo aliter cibo alantur, quod quidam ceraginen, alij cereum uocant. uerum hoc deterius est, & dulcedine propè fuscus. congerit id quoque ut ceram suis cruribus. Perquam uaria in earum operatione & uita, ratio est. Cum enim alueum receperint mundum, construere incipiunt fauos deferentes ex floribus, atque etiam arborū lachrymis, salicis, & ulmi, & reliquarum, quæ glutinum pariunt. his paulum quoque illinunt, ne bestiolæ nocuæ subeant. uocant hoc opus apiarij rectorium inuim. Aditus etiam si ampliores sunt, fabrica obstruentes coartant. Effingunt fauos primum in quibus ipsæ gignantur. deinde in quibus reges dicti, & fuci. suos certe semper componunt: sed regum, cum fetus largior est, fucorum autem cum copia mellis speratur. fauos regum minores faciunt iuxta suos. fucorum iuxta regum minores, quam suos. Exordium operis à recto aluei, textusque ad pauimentum perperuo stabilimento agit. pluresque ad pauimentum telæ deducuntur. cellæ autem & mellariæ & sobolariæ geminæ omnes sunt. Vno enim eodemque intersepto, duæ sibi iunguntur cellæ, modo poculi gemini: altera intus, altera foris. compages, quæ parietibus faui adherent, arctiores & melle uacuæ relinquuntur, gemino aut triplici uersu. pleniores enim sunt faui, quibus plus ceræ obducitur. pars aditus aluei prior illita est ex commosse: sic enim uocant quod uelut excrementum purgamentumque ceræ est, bene nigrum, acrisque odoris, medentur hoc plagis, & huiusmodi suppurationibus. proximum ab eo rectorium picatus cereus præbet. leuius id quam commosis medicamentum est. Sunt qui fucos & per se fingere fauos eodem in alueo, & cum apibus negotium conficiendi faui partiri dicant: uerum mellificandi nullam habere facultatem, sed uescitum eos, tum eorum pullos melle, quod apes fecerint. manent fuci magna temporis parte intus, cumque exeunt, efferrunt sese summum in sublime, gyroque uolitant, & quasi exercitum faciunt. quod ubi satis iam fecerint, redeunt domum, & epulis perfruuntur. Reges nunquam prodeunt foras, uel ut pascantur, uel alia causa, nisi uniuerſa cum plebe. & si cum pergunt, rex ipse forte aberrarit, omnes inquirere, odoratuque sagaci persequi, donec inueniant, accipimus. gestari etiam eum à plebe, cum uolare non potest. & si perierit, omnes discendere: uel si aliquandiu manserint, fauos quidem conficere, sed mel nullum. nec fieri posse, quin breui omnes discedant. Ceram apes perrepiendo flores, capiunt priorum acumine pedum, mox priores in medios abstergunt, & medios in blazæ posteriorum. atque ita onustæ discedunt. & quidem grauari premiisque onere cernuntur, quoties redeunt. Mos apibus, ne florū plura genera petant uno eodemque profectu,

etu, sed singulis singula. uerbi gratia, à uiola ad uiolam aduolant, nec aliud attin-
 gunt, quousq; suum in alueum redeant. hic se quatiunt, & singulas, tres aut quatu-
 or sequuntur. Sed quid accipiant, haud facile uideris: nec uero quemadmodum
 operantur, uisum adhuc est. Cerae congestio notari potuit in oleis, cum diutius in
 eodem morentur, propter frondem eius arboris ipsiorem. Post hæc edificare in-
 ciunt: nec prohibet quicquam quo minus eadem in cella sint, & pulli, & mel, &
 fuci. Gigni fucos seorsum dicitur, si dux uiuit: sed si obijt, in apum loculamētis oriri
 ex ipsis apibus, atq; hos fieri animosiores, quocirca aculeatos uocari, quamuis acu-
 leo careant. Animo nanque ferendi, non potestate, nomen hoc meruerunt. Sunt
 10 loculi ipsi fucorum ampliores, & singuntur seorsum quoque per se faui fucorum,
 sed magna ex parte fauis apum inferuntur, quapropter secandum est. Genera
 apum plura, ut doxi, duo principū, alterum rufum, quod præstantius est, alterum
 nigrum, magisq; uarium, duplo amplius ape utili. Tertium genus quod optimū,
 breue hoc, in rotunditatem compactile, & uarium est. Quartum longum crabro-
 nibus simile. Præterea quod fur appellatur, nigrū hoc, aluoq; ampliore est. Quin-
 etiam fucus qui omnium maximus est, sed sine aculeo, & ignauus. Differunt inter
 se apes parentibus natæ urbanis, & quæ rustico montanoq; uictu educatis prodie-
 rint. sunt enim hæc syluestres horridiores aspectu, & iracundiores, & minores, sed
 opere ac labore præstantiores. Genus frugi fauos suos æquabiles construit, super-
 20 numq; totum operimentum politum apponit, & ad singulos usus fauum singula-
 tim effingit, uidelicet partē aliam ad mella, aliam ad prolem, aliam ad fucos accom-
 modatam. quod si acciderit, ut eodem in fauo omnia hæc recipiantur, loculus alter
 deinceps dispositus habetur inanis. At uero illæ porrectiores, fauos inæquales con-
 ficiunt, & operimentū retumidum perinde ut crabrones imponūt. sætum etiam,
 & reliqua sine ordine statuunt. duces improbi ex his oriuntur, & copia tum fucorū,
 tum etiam eorum, quos fures uocant. Sed mellis aut nihil, aut admodum pau-
 rum opera earum conficitur. Incubant apes suis fauis, & concoquunt. quod nisi se-
 cerint, uitari ex aranea fauos aiunt. quod si de cætero se continere potuerint, ut in-
 cubitu perseuerent, partis quasi abortus sit: sin minus, toti pereunt faui. Gignun-
 30 tur in ijs quæ uitantur, uermiculi, qui mox pennis subnatis euolant. Curant etiam
 apes, ut faui erecti stent. quod si qui corruerint, erigūt, & pilis fulcitur fornicatis, ut
 subire possint. Cum enim uia qua accedant non datur, cessant incubitu. unde fit,
 ut faui araneentur. Furis & fuci nullum est munus, sed cæteris quibus cum uiuūt,
 iniuriā faciunt: non tamen impune semper, nam deprehenſi interdum à bonis
 apibus occiduntur. Enecant nimirum ipsæ etiam duces, qui plures quā satis sit,
 habeantur: & potissimum improbos, ne principum multitudo seditiones in exami-
 ne faciant. necant præcipue, cum non ampla sobolis copia extitit: nec habent tan-
 quam coloniam mitant. fauos etiam regum eo tempore si parati sunt, diruunt, ut
 pote cum desint, quibus mittendis duces ipsi præficiantur. nec non fauos tollunt fu-
 40 corum, si mellis penuriam coniectantur, nec aluei annonæ superioris anni abund-
 dant. & apiarium eximentem tunc præcipue de melle impugnant, ac præſentes su-
 cos expellunt. & quidem sæpe uiſuntur foris in alueo residentes exules. flagrant
 odio, breues contra longas, easq; alueis pellere conātur: qua in pugna, si illæ vice-
 rint, optimū ita fore examen putatur: sed si hæc solæ remanserint, octose uiuūt, &
 nihil boni integre faciunt. Pereunt etiam ipsæ antequam autumnus sit. student bo-
 næ apes quoad fieri potest, ne quam intra alueum interimant: & si qua interierit in-
 tus, statim foras cadauer educunt. Qui autem fures uocantur, & suos inuicem fa-
 uos offendunt, & alienos, si latuerint, subeunt. sed si capiuntur, capite puniuntur,

nec facile aut latere, aut aufugere possunt. sunt enim in quoque aditu custodes. & fur ipse, si quando surripere ingressum potuerit, adeo in sauetatem repletur, ut nequeat euolare, sed ante alueum uoluetur. itaque fuga perquam difficilis est. Reges nunquam foris uisuntur, nisi cum migratur: & tunc ita, ut reliquæ omnes circa ipsum principem suum glomerentur. Cum uero migrandum est, uox solitaria & peculiaris quædam aliquot ante diebus intus mittitur: & biduo, aut triduo paucæ circum alueum uolant. an rex etiam inter eas sit, nondum exploratum habemus, quoniam difficile cognitu est. Collectæ iam auolant, & per singulos reges diuiduntur. & si forte paucæ prope multas consistunt, concedunt paucæ ipsæ ad plures, ac regem, quem reliquerint, si sequatur, interimunt. discessus & migratio ita agitur, singulis autem muneribus se distribuunt, ut aliæ flores conuehant, aliæ extruant, aliæ poliant fauos, & dirigant. Aquam tunc portant, cum prolem nutriunt. Carnem nullius animalis tangunt, nec opsonium appetunt. Nullum his tempus certum consuetumque est, quo operari incipiant. sed si cibarijs non carent, beneque degunt, æstiuo potissimum tempore opus aggrediuntur, & quandiu serenum sit, assidue operantur. Nouellæ etiam tertio quam prodierint die, statim negocium incunt, si cibus non suppetit. cumque incubant, digrediuntur nonnullæ ad pastum, sed breui redeunt. proles felix examinis quadraginta diebus intermittitur, tantummodo à bruma, cum satis iam cōcreuisse pullitiem fenserint, cibo apposito derelinquunt. ipsa uero cum datur facultas, rupto operculo exit. Bestiolas, quæ in alueis nascuntur, & fauis officiunt, apes notæ melioris tollunt, & rem familiarem tuentur. sed alteræ pro suo uitio negligunt, & perire patiuntur. Cum autem fauos apiarj eximunt, ubi tantum relinquunt, quantum per hyemem sufficiat. quod si factus sit, seruatur examen. sin minus, uel moritur ibidem, si ne discedat hyems obstat, uel deserit sedem, si serenū nanciscitur. mel apibus tum æstate, tum hyeme in cibo est: sed recondunt alterum quoque cibarij genus, cui durities ceræ proxima, quod sandaracam nonnulli appellant. Inferunt iniuriam apibus maxime uestpæ, & auiculæ, quas paros uocant, atque etiam hirundo, & merops, qui apiaster est, tum uero ranæ lutariæ, eas ubi ad aquam accesserint, rapiunt. quamobrem eas apiarj per paludes & stagna, unde apes aquantur, uenari solent. & uestparum latibula, & hirundinum, ac meropum nidos propinquos alueis tollunt. Nullum animal nisi sui generis apes fugiunt. præliantur enim inter se, & cum uestpis: sed cum ruri sunt, nec sibi inuicem, neque ullis alijs iniuriantur. At uero apud suos alueos pugnant acerrime, & hostes quos uicerint, enecant. Intereunt quæ percusserint: quoniam sine intestini eruptione aculeus eximi non potest. sæpius enim euadunt, si qui ictus est, curam adhibet, ut aculeus infixus iunctus cum aluo extringatur, alioquin apis interit. Necant uel maxima animalia ictu sui aculei. iam equus occisus ab apibus est, sed principes minime irritantur, & feriunt. efferunt foras apes uita in alueo defunctas, & cætera. mundissimū omnium hoc animal est. Quamobrem sæpenumero cum alui necessitas est, auolant, & in secessu reddunt excrementum, quoniam male oleat, oderunt non solum foedos odores, sed etiam unguentorum delicias, ex quo fit, ut homines his delibuto percutiant. pereunt apes tum alijs casibus, tum uero cum multi principes orti, partem quisque secum quo libuit abducant. Rubeta etiam apes interimit. subiens enim aditus aluei, afflat, & obseruans rapit euolantes. nullo hæc affici malo ab apibus potest, sed ab apiario facile interimitur. Genus autem apum quod improbum esse, ac fauos fingere asperos diximus, nouellis maxime tribuunt apiarj nonnulli peccareque ita per imperitiā. nouellæ autem sunt anniculæ omnes, quarum examen quotannis auolare solitum est. Nec uero nouellæ ipse

apſæ perinde ac ueteranæ pungunt, cum copîa mellis non ſuppedit. A plarij fucos depellunt, & ficus, ac reliqua id genus dulcia in cibo apponunt. Apum ieniores inſus operantur, hirtioreſq; moræ domeſticæ ratione ſunt. A doleſcentes foris negotium exercēt, & ea, quæ res exigit, portant, leuioreſq; ſunt labore hirtutis detrin. fucos etiam ipſæ interimunt, quos non ſatis loci operibus eſt. tenent enim alui locum penitiorum. Cum morbo examen quoddam laboraret, agmen peregrinum inuaſit, & pugna conſerta, adeptaq; uictoria mella diripiebat. quod cum aparius proſtrerneret, uictum examen itatim egreſſum ulciſcebatur, nec hominem ipſum ullo pacto impetebat. Morbo examina ualentiora poſſimum inſeſtantur cleroſi (ſic enim uocant uermiculos, qui in pauimento naſcuntur) e quibus creſcentibus uelut aranea alueo toti obducitur, & faui carie pereunt. Alterum morbi genus quaſi ocium quoddam & ueternitas apum incidit cum ſocdo alui odore. Paltus grauiſſimus apibus thymum eſt: ſed rubido albidum præfertur. locus æſtate non ſeruudus, hyeme tepidus. ægrotant eo poſſimum tempore, cum per eruginofam materiem operantur. Quos uero ſtatu uehementi iactantur, lapillum geſtant, quo ſc: quaſi fulcro & fundamine quodam ſtabiliant contra ſtatum, bibunt ſi fluuius ſit propinquus, non aliunde quàm ex eo, poſito onere. ſin minus, aliunde humore hauſto pergunt ire ad mel euomendum, cõſeſtimq; negocium repetunt. Mellis conficiendi tempora duo ſunt, uer atq; autumnus. ſed uernum ſuauius, candidius, omnino præſtantius autumnali eſt. conficitur proſecto melius ex noua cera, nouelliſq; ſtripibus. ruſum uero atque deformius faui uitio redditur, quippe quod perinde ut uinum à uafe uitietur, quapropter coquendum id reſicandumq; eſt. Cum autem ex thymo florente faui replentur, ſit ita, ut minus mel coctat & duretur. probatur cui ex aureolo color. quod autem albicat, non eſt ſyncero thymo conſectũ eſt, ſed id oculis & ulceribus commodius applicatur. Mellis exilior pars fluitat, quæ eximẽda eſt: pura uero & ualida ſubſidit. conficiunt ceram cum ſtirpes florent, quamobrem eximenda per id tempus cera de alueo eſt: continuò enim reparatur. Hæc ſunt, unde accipiunt, thymus, ſuſus agreſtis, ſerrula campana, albucum, myrtus, phleus, uirtex, geniſta. Cum ex thymo conficiunt, aquam admixcent, antequam fauus occiperetur. Egerunt alui extremẽta omnes, aut uolantes, ut dictũ eſt, aut certa in parte faui. minores officioſiores maioribus ſunt, ut dixi. pennæ his detrictæ, color niger, dorſum repandum. illæ nitidæ uenulæq; ſunt more ocioſarum mulierum. Gaudere etiam plauſu atque ſonitu apes uidentur: quapropter tinnitu æris aut ſicilis conuocari eas in alueum aiunt: quanquam incertum eſt, an audiant, & uoluptate ne, an formidine ita faciant. quin & focias ocioſas, ac deſides, aut minus parcas pellere in more apibus eſt. partiuntur inter ſe opera, ut antè dixi, & aliæ fauos conficiunt, aliæ mella, aliæ erythacam. & aliæ fauos expoliunt, aliæ aquam important ad cellas, & mella temperant, aliæ munus extrarium ſubeunt. Tempore matutino omnes ſilent, donec aqua gemino aut triplici bombo excitet omnes. tum uniuerſe ad opus prouolant. cumq; redierint, primum item tumultuant, paulatimq; minus ſubinde ſtrepunt, dum una circumuolũtũdo ſuſurret, quaſi dormiendum præcipiat. tum repente omnes conticeſcunt. Diſcitur examen ualere ſuſurri frequentia, & exeundi ingrediendiq; uertiginofa agitatione. tunc enim nouellæ operantur. Eſuriunt ab hyeme poſſimum, cum opus incipiunt. Redduntur ocioſiores, ſi in eximendis fauis plus mellis relinquatur. itaque pro examinis numero relinquendum eſt. Agunt etiam anxius, ſi plus demetatur, quàm ut reſiduum cibo ſufficiat. atque etiam ſi alueus iuſto amplior ſit, deſidioſiores redduntur. ægrius enim quaſi deſperet, operi incumbunt. Caſtrantur faui ſingulis ſextarijs. aut ternis ſemifextarijs, ſed ſi exuberant, binis ſextarijs caſtrari, aut quinis ſemifextarijs

possunt. pauci ternis sextarijs. Impugnātur apes à uestpis, ut antè dixi, quam obrem apiarij eas ueniantur cōstituta olla, & carne in ea posita. ubi enim multæ iam ad carnem accesserint, apposito operculo super ignem ollam ponunt. fuci autem si pauci adsunt iuuant. reddūt enim apes in opere sollicitiores, præfagiunt apes & hyemem & imbres. cuius rei indicium est, quod non auolant, sed sereno adhuc in alueo uoluntur, quo apiarij hyemem expectāt. cum uero mutuo inrer se annexu alia ex alia dependet in alueo, indicium deferendi cubilis est. quod ne eueniat, apiarij alueis affiant ex uino dulci. Expedit consequisse apud aluearia pios, fabas, medicam herbam, suriam, cruiliam, myrtum, papauer, serpyllum, amygdalam. Cognoscūt suas apiarij nonnulli, farina in prato resperfa. Minus apes fecundit, si uet serotinum sit, aut squalor, aut rubigo inciderit. Ratio apum ad hunc modum est.

De duobus uestparum generibus, & earum studio in suis construendis.

Caput XLI



Uesp̄arum duō sunt genera. alterum serum, quod rarum est, nascens in montibus, & pariens nō sub terra, sed in quercu, specie grandius, porrectius, nigrius, uarium etiā aculeatumq̄ est, & robustius, ictuq̄ acerbius quā alterum est. aculeo enim maiori quā ex proportione sui corporis spiculator. uiuit hoc toto anno, & quidē tempore hyberno. quercu cæsa euolare spectatur. exigit hyemem in latebra, & semper in macerie diuersatur. sunt eius alie matricēs, alie operariæ, ut & in altero genere, quod placidius est. Quæ autem sit natura operariæ, ac matricis, in eo ipso placidiore genere percipi facilius potest. sunt enim huius quoq̄ duo genera, alterum duces, quas matricēs appellant, alterum operariæ. maiores mitioresq̄ duces sunt. Aetas operariarum annū non complet, sed omnes hyeme inualeſcente moriuntur. quod ea re constat, quia hyeme incipiente stupeſcant; bruma autem nullæ omnino appareant. duces uero qui matricēs uocantur, tota hyeme uiſuntur, atque sub terra latitant. pleriq̄ enim cum per hyemem ararent, aut foderent, matricēs uiderunt; operarias nemo. ortus talis uestparum est. Duces ubi iam locum sibi opportunum delegerunt, fauos opere æſtuo conſingunt, & uestpeta (cellulas dico) conſtituunt quas ternis foriculis, aut propē, in quibus uestpæ non matricēs nascuntur, quæ cum increuerint, rursus altera ampliora effingunt. quorum item proles cum creuerit, alia faciunt, ita, ut postremo autumno plurima amplissimaq̄ uestpeta condita habeantur. in quibus dux quæ matrix uocata est, nō inſuper uestpas, sed matricēs ſam procreat, quæ quidē ſuperne poſt ſumma uestpeti uermiū ſpecie multo grandiorum gignuntur, in cellulis continuatis quatuor numero, aut paulō pluribus. alioqui in creſcendi ratio duobus eadē quæ uestpis est. Sed cum uestpæ operariæ fauis aſſuerint, non præterea duces operātur, sed operariæ ipſæ cibū ſuis duobus ſummiſtrant. quod ea re conſtat, quia duces non item euolant, ſed intra teſta quieſcūt. Cæterum utrum duces anni ſuperioris nouellis iam procreatis duobus interimantur à uestpis nouellis, idq̄ ſimili modo eueniat, an plus etiā temporis poſſint uiuere, nondum exploratum eſt. nec uero ſenectutē matricis, & uestparum generis ſeri, aut aliquem huiusmodi affectum annotare adhuc quiſquam potuit. Eſt autem matrix latior, ponderoſior, craſſior, & maior quā ueſpa: uolatuq̄ haud plurimum ualet, præ pondere enim ſui corporis uolare longius nequit. quō ſit, ut ſemper in ueſparijs ſedeant effingentes fauos, & munere fungentes cellario. in ſunt porrō matricēs nuncupatæ in ueſparijs plurimis: ſed aculeatæ ſint, nec ne, ambigirur. uidentur tamen & ipſæ ut apum duces, gerere quidem aculeum, ſed nō extringere, aut ſerire. Veſparum autem alia caret aculeo, ut fuci. alia habent. minores imbecillioresq̄ ſunt, quæ carent, neq̄ repugnant, contrā quæ habent, maiores, robuſtæ, atq̄ pugnares, quas

quas nonnulli mares appellant. foeminas uero eas, quæ carent. Pleræq; ex ijs quæ aculeum gerunt, amittere eum putatur hyeme instante: sed hoc ex nemine qui uisidisset, accepimus. Vespæ temporibus siccis locisq; asperis potius oriuntur, ortus sub terra agitur, fingunt suos fauos ex congerie, ac terra: & ab eodem primordio quasi stirpe unumquensq; ædificant. cibum uel ex floribus quibusdam, & fructibus petunt: sed quamplurimum ex carne. coire nonnullæ etiã ex cæteris uisæ sunt: sed an ambæ aculeo careant, aut habeant, uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est. Ferarum etiã nonnullæ coire uisæ sunt, & alteram gerere aculeum consitiit, sed de altera incertum est. foetus nō partu prouenire uidetur. statim enim au-
 10 ctior quàm partus uespæ patiatur, existit. Si uespā ex pedibus ceperis, bombilareq; si uisæ, aduolant quæ aculeo carent. quod non faciunt, quæ aculeatæ sunt. itaq; argumentum quidam hoc utuntur, ut alteræ mares sint, alteræ foeminae. Capiuntur hyberno tempore in speluncis, & quæ aculeum habent, & quæ carent. condunt alitæ sua uespæ pauca, & exigua: alitæ plura & ampliora. Capitur magna matricum pars à solstitio apud ulmos. colligunt enim hinc lentam & gummosam materiam. prodiere locis quibusdam matricæ ortu admodum numero, cum superiori anno uespæ atque imbrum copia præcessisset. capiuntur per præcipitia & terræ rimas, præruptaq; directiora, omnesq; uisuntur aculeum gerere. talis uespæ ratio est.

De crabronibus, uisq; coram, & alucis.

Caput XLII

10 **C**rabrones non floribus, ut apes, sed carne magna ex parte uiuunt unde fit, ut uersari uel in stercore sæpe soleant. uenantur etiã muscas mascululas, quas ubi ceperint, abscisso capite, reliquum corpus gestantes auolant. Sed pomum etiã dulce appetunt. cibis his talis est. Duces more apum, uespærumq; habent, qui proportionem ad crabrones maiores, quàm uespærum ad uespas, & apum ad apes sunt. degunt hi quæque intus, ut uespærum duces. faciunt sibi alueum sub terra crabrones, terra egesta, & ut formicæ excavant. missio enim ut apum, nulla uel eorū uel uespærum fieri solet. sed qui subinde oriantur nouelli ibidem manent, & alueum terra egesta faciunt ampliore: amplificant maiorem in modum, & iam ex ualentiore quodam examine qualli tres, & quatuor fauorum pleni excepti sunt. nec uero cibum ritu apum sibi recondunt, sed ieiunij latent per hyemem, quo tempore plurimi moriuntur. an etiã omnes, nondum certum est. duces non plures uno singulis eorum examinibus oriuntur, ut inter apes gignuntur plures, qui examina distrahunt. Sed si qui crabrones suo alueo aberrarint, colligunt se ad aliquam arborem, fauosq; ibi conficiunt, qui uel sæpe conspiciui apparent. in quibus unum procreant ducem. qui cum adoleuerit, agmen adducit, & secū in alueo collocat. De coitu crabronum nihil adhuc exploratum habeo, nec unde foetificent. Sed cum in genere apum careant aculeo, & fuci, & reges: atque etiã uespærum nonnullæ in aculeatæ sint, ut
 30 antè dixi, crabrones omnes armari aculeo uidentur. Sed de eorum duce confiderandum accuratius est, an aculeum habeat.

De genere bombycum, & tereclinum, & aramq; foetibus.

Caput XLIII

Bombyces sub faxis apud ipsam terram foetificant, binis aut paulò pluribus cellulis. mellis etiã prauituti idam inchoatio in his reperitur. Tereclino nō ab similibus crabronibus est, sed uaria, & latitudine proxima apibus. cupedia haec est, & ad culinā, & pisces, & huiusmodi delicias singularis aduolat. foetū sub terra ædit, ut uespæ. multiplex huius quoq; tereclini est, & longe amplius q; uespæ, atq; porrectius. Muneris uitæq; ratio apum, uespærum, & reliquorum generis eiusdem, ad hunc modum est.



Aeterum in moribus animantium (ut dictum iam est) percipi differentias licet, præcipue quidē ad fortitudinem, & timiditatem: sed ad mansuetudinem quoq; & feritatem etiam in ipso syluestrium genere. Leo enim quamuis in edendo ferocissimus sit, tamen passus, & fame iam uacans, facilis mitisq; maiorē in modū est. nihil hic suspicatur, nullius suspiciosus est, festiuus, ludibundus, beneuolus admodum suis cum socijs, & familiaribus est. in uenatu dum cernitur nunquam fugit, aut metuit. sed etiam si uenantium multitudine cedere cogitur, sensim pedatimq; discedit, crebro subsistens atq; respectans. nactus uero opaca, fuga qua maxime potest uelocē, se subtrahit, donec in aperta deueniat, tum rursus lente incedit. Sed siquādo locis nudis atq; patētibus cogitur fugā aperte arripere, currit cōtentus, nec salit, cursusq; eius continēs, ut canum inēditur, cum tamen ipse insectas, ubi iam propinquarēt, insilit. Vera etiā illa de eo narrātur, ignē præcipue formidare, ut Homerus quoq; testatur cum dicat: Ardentesq; facies quas quamuis scēuat, horret. & percussorem agnoscere, atque ex obseruato inuadere. Si quis etiam non percusserit, sed insectet, hunc si ceperit, non unguibus lacerat, nec ulla iniuria afficit, sed quatit solum: atque ubi ita perterruit, dimittit. Adeunt urbes, & iniuriam hominibus inferūt, potissimum tempore suæ senectutis: tunc enim per corporis imbecillitatem, & dentium defectionem uenari nequeunt. Viuere annos multos putantur. & quidem qui captus est claudus, dentes complures fractos habebat. quo argumento quidam longam esse leonum ætatem existimarunt, haud enim hoc accidere, nisi longo tempore potuisset. Leonum duo sunt genera: quorum alterum breuius, crispiorēq; pilo, quod ignauius est: alterum longius, pilosq; probiore, quod generosius est. fugiunt interdum leones demissa inter crura cauda, ut canes. iam uisus est leo, qui cum suem aggredere-tur, ut setis horrentem aspexit, fugeret. Infirmitas paritellum est contra ictus, sed reliquo corpore multas patitur plagas, & capite ualidissimo est. Quæcunque uel momorderit, uel unguibus lacerarit, sanies pallens admodum de his ulceribus effluit, etiā per fascias, atque spongas, nec reprimi ullo pacto potest. curantur eodem modo, quo morsus canini, ulcera. Thoes etiā quos lupos ceruarios diximus, hominem diligunt, & neque offendunt, neque metuunt ualde. pugnant cum canibus & leonibus, quo sit ne eodem in loco sint ceruarij & leones. optimi ceruarij quiminores sunt. genera huius alij duo, alij tria statuunt, plura ijs esse non uidentur. Sed ut piscium, auium, quadrupedum genera aliqua, ita ceruarij quoque per tempora immutantur: & colorem diuersum hyeme ætate uē trahunt, atque æstate nudi, hyeme hirti redduntur.

De natura, specie, & partu bonasi.

Capit. XLV



Onasus gignitur in terra Pæonia, monte Messapo, qui Pæoniæ, & Medie terræ collimitū est, & monapios à Pæonibus appellatur, magnitudine tauri, sed corpore quā bos latiore. breuior enim, & in latera auctior est. Tergus distentum eius locum septem accubantium occupat. Cætera forma bouis similis est, nisi quod cerutx iubata armorum tenus, ut equi est, sed uillo molliore, quā iuba equina, & compositiore. color pili totius corporis flauus. iuba prolixa, & ad oculos usque demissa, & frequens colore inter cinereum & rufum: non qualis equorum, quos partes uocant, est, sed uillo supra squallidiore, subter lanario. nigri aut admodum rufi nulli sunt. uocem similem boui emittunt, cornua adunca in se flexa, & pugna inutilia gerunt,

gerunt, magnitudine palmari, aut paulò maiora, amplitudine non multo arctiore, quàm ut singula semihextariū capiant, nigritie proba. antix ad oculos usq; demissæ, ita ut in latus potius quàm antè pendeant. caret superiore dentium ordine, ut bos, & reliqua cornigera omnia. crura hirsuta, atque bifulca habet, caudam minorem quàm pro sui corporis magnitudine, similem bubulæ. excitat puluerem, & fodit, ut taurus. tergo contra ictus prauvalido est. Carnem habet gustu suauem: quam obrem in usu uenandi est. Cum percussus est fugit: nisi defatigatus nusquam consistit. repugnat calcitrans, & proluuie alui uel ad quatuor passus proiciens: quo præsidio facile utitur, & plerunq; ita adurit, ut pili insectantiū canum absumantur.

10 sed tūc ea uis est in simo, cum bellua excitatur. & metuit. nam si quiescit, nihil urere potest. talis natura & species huius animalis est. Tempore pariendi uniuersi in montibus nituntur. Sed priusquàm foetum ædant, excremento alui circiter eum locum in quo pariant, se quasi uallo circundant & muniunt. largam enim quandam eius excrementi copiam hæc bellua egerit.

De ingenio & sagacitate elephanti.

Cap. XLVI

Elephantus omnium ferarum mitissimus, & placidissimus est: quippe qui permulta officia, & erudiatur, & intelligat. quando etiam regem adorare condiscit. ualet sensu, & reliqua sagacitate ingenij excellit: quam impleuerit coitu, eam rursus nō tangit. Viuere elephantos mares alij annos ducentos, alij centum & uiginti aiunt. foeminas etiam ferè totidem: sed florere ætate circa sexagesimum narrant. hyemis ac frigoris impatiens hoc animal esse dicitur. amat amnes, & quanq; non fluuiatile sit, tamen riparium dici potest. incedit etiam per aquam, & eatenus mergitur, quatenus eius pro muscis superat. refert enim per eam, & spiritum accipit, & reddit. sed natare satis pondere sui corporis non potest.

20

Camelum matrem nunquā superuenire, deq; prudentia equi regis Scytharū.

Caput XLVII

Ameli matres nunquā superueniunt suas, sed etiam si quis cogat, ipsi non patiuntur. iam cum aliquando admissarius non haberetur, curatior pullum matri opertæ admisit. qui dum coiret, delapso operimēto agnouit matrem, & quamuis coitum absoluerit, memor tamen commissi sceleris, paulò post camelariū illum morfu defixo interemit. Fecerunt etiam regi Scytharum fuisse equam egregiam, ex qua mares generosi omnes gignerētur. quorum unum, qui præstantior haberetur, cum ut ex matre procrearet, placeret, admissum omnino recusasse. opertam deinde latuisse matrem, ut imprudens superueniret. uerum ubi à concubitu faciem matris detectam agnouerat, fugam properasse, atq; seipsum actum præcipitem interemisse.

30

De mansuetudine, amore, & celeritate delphinorum.

Cap. XLVIII

In marino etiam genere plurima de delphinis narrantur indicia morum placidorum ac mitium. amores quoq; in pueros, & affectus libidininis, cum circa Tarentum, & Cariam, tum etiam locis alijs referunt. fertur etiam delphino apud Cariam capto atq; saucio, ingentem reliquorum multitudinem conuenisse ad portum, immorari amq; donec piscator dimiserit eum, quem ceperat. tum omnes simul recepto captiuo rediisse, paruos item delphinos magnus aliquis semper comitatur custodie causa. iam conspectus est delphinorū grex, maiorum & minorum promiscuus, post quem, duo quidam paulò post uiderentur delphinulū defunctum labentem in unum subire,

40

& in summa pelagi dorso euehere, quasi miserantes, ne ab aliqua bellua deuoraretur. Quinetū de uelocitate huius animalis mira & incredibilia quēdam accepimus, omnium enim uelocissimū esse creditur animalium, tum aquatiliū, tum terrestriū, supersiliunt etiam malos nauigiorū maiorum, quod tunc potissimum euenit, cum aliquem insectantur piscem, quem deuorent, tunc enim si quem imperiūt, longius fugit, ad ima gurgitum persequitur propter famis necessitatem, quod reditus longior sit, retinent sese, quasi spaciū cogitantes, conuersi seruntur perinde ac sagitta perniciēs, ut celeritate opportuna longo transmissio iuinere ad locum spirandi deueniant, quo impetu sit, ut se eiacularent in aërem, & supersiliant malos nauigiorū, quæ fortē affuerint, hoc idem urinatores faciunt, cum se in profundum demiserunt. pro uiribus enim conuersi enixius efferuntur, ut spirent, degunt coniugari mares cum fœminis. Quæritur quamobrem in terram erumpant, hoc enim interdum eos facere incerta de causa dicitur.

De his animalibus que pro actionibus afficiuntur, moribusq; immutantur.

Caput XLIX



Sed, ut quoque animalia pro suis affectibus agere, sic pro suis quoque actionibus affici immutariq; moribus solent, partes etiam corporis nonnullæ sæpenumero ratione agendi immutantur, ut in auium genere euenit. Crallinæ enim cum mares uicerint, cucurliunt, & exemplo marium tentant superuentu coire. crista etiam caudaq; erigitur, ita; ne facile præterea sit, an fœminæ sint cognoscere. nonnunquam etiam calcaria parua ipsæ enascuntur, iam uero & mares uisi nonnulli sunt, qui cum fortē fœmina interisset, ipsi officio matris fungerentur, in pullos ductando, fouendo, educando, ita, ne cætero uel cucurire, uel coire appeterent, quin & iam inde à primo ortu naturæ, ita nonnulli mares effœminati proueniunt, ut neq; cucuriant, neq; per coitum agere uelint, & uenerem eorum qui tentent superuenire pariantur. Cuculus etiam immutatur colore, & uocem minus explanat, cum se abditurus est, quod facere ex ortu caniculæ solet, apparere autem incipit ab ineunte uere ad eius syderis ortum. Abditur & ea, quam oenantham quidam appellant, ac si uisuloram dixeris, exortu eiusdem syderis: occasu uero apparet. uirat enim interdum frigora, aliàs æstum, Necnon upupa cum colore, tum uero specie immutatur, ut Aelchylus poëta satia carmine suo exposuit:

Quin fert sui spectantem, & epopem mali,
Colore speciem multimodo pingens suam,
Saxicolam, & improbum arma gestantem alitem.
Adulti infantis forma hic sese refert.
Nam uere candicans ubi extitit nouo,
Æstate tum deinde, ut recanduit seges,
Alas repente uariis maculatas quatit.
Vagatur hic semper fastidiens locos.
Deserta quærit nemorum, & in uitas plagas.

Complures etiam aliæ aues immutantur per tempora, & colore, & uoce: ut merula, quæ ex nigra redditur rufa, & uocem mittit diuersam. strepitat enim per hyemem, cum per æstatem tumultuans cantet. Mutat & turdus colorem, quippe qui collo æstate uariis, hyeme murino distinctus spectetur: uoce tamen eadem est, Luscinia canere solet assidue diebus ac noctibus quindecim, cum sylua fronde incipit opacare, dein canit quidem, sed non assiduò, mox adulta æstate, uocem mittit diuersam, non insuper uariam, aut celerem, modulatamq; sed simplicem. colore etiam

etiam immutatur. & quidem in terra Italia per id tempus alio nomine appellatur. apparet non diu: abdit enim sese & latet. Rubeculae, & quae rutilillae appellantur, inuicem transeunt. estq; rubecula hybemi temporis, rutililla aestiui. nec alio fere inter se differunt, nisi pectoris colore & caudae, sic & ficedulae & atricapillae uicibus comutantur, sit enim ineunte autumnno ficedula: ab autumnno protinus atricapilla. nec inter eas discrimen aliquod nisi coloris & uocis est. Auem autem esse eandem constat: quia dum immutaretur, hoc genus utrunq; conspectum est, nondum absolute mutatum: nec alterutri adhuc proprium ullum habens appellationis. Nec mirum si haec ita uoce aut colore mutantur, quando & palumbes hyeme non gemunt, nisi quod aliquando ex asperissima hyeme placidum tempus successisset, gemuerit: quod apud peritos in admiratione habitum est. ceterum ineunte uere genere incipit. Deniq; aues tunc maxime, plurimasq; emittunt uoces cum coeunt. Mos autem uium est, ut aliae sese in puluere uoluent, aliae sese lauent, aliae nec puluere neque balneo utantur. Sunt pulueratrices, quae non altiuolae, sed terrae propinquae, ut galina, perdix, attagena, alauda, fasiana. Lotrices, nonnullae rectungues, & quae circa fluuios aut paludes, aut mare uersantur. Aliae utrunq; tum lauare, tum puluerare solent, ut columbus, ut passer. Aduncarum pars maior neutrum facit. haec ita se habent. Proprium nonnullis auium euenit crepitus alui, ut turturi. pars etiam nouissima alui earundem uehementer citatur, cum uocem reddunt.

20

De ijs animalibus quae castratione immutantur, quae ut ruminant.

Cap. I.



Vtantur uero animantium aliqua forma & moribus, non modo per aetates & tempora, uerum etiam castratione. castrantur autem ea quibus sunt testes. Sunt autibus testes intus lumbis haerentes, & quadrupedum ijs quae oua pariunt. At uero ijs quae animal generant, eademq; terrestria sunt, plurima quidem parte foris, sed nonnullis etiam intus continentur. omnibus uero postrema aluo habetur. Castrantur gallinae accipiter nouissima suae alui, quae cum coeunt, concidit. hanc enim si duobus aut tribus ferramentis adusseris, capos facies. quod si perfectus est qui castratur, crista pallefcit, & cucurire definit, neq; coitum uenereum repetit. sed si adhuc pullus est, ne inchoari quidem ex ijs quicquam potest, cum accrescit. quod idem in homine quoq; accidere certum est. Nam si puer adhuc excidatur, neq; postgeniti pili innascuntur, neq; uox immutatur, sed suum seruat acumen. At si iam puber, postgeniti defluunt pili, praeterquam pubis. haec enim quamuis minuat, tamen manet. sed congeniti non defluunt. nemo enim spado caluescit. Quadrupedum etiam excitorum uox omnium in feminam immutatur. Sed cum cetera nisi nouella castrantur, intereant, aper unus quae aetate castratur, non refert. omnia deniq; si dum crescunt, castrantur, maiora & elegantiora quam incastrata euadunt. sed si posteaquam adoleuerunt, & iam incremento constituerunt, castris, nihil praeterea accedere ad magnitudinem potest. Cerui, si cum per aetatem nondum cornua gerunt, castrantur, non adunt cornua: sed si cornigeri exciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur. Viculis tempus castrandi anniculis est, alioquin minores deformioresq; euadunt. Modus castrandum hic est. Tractus deorsum testes, atq; obtentos, pressosq; in imum scorti, cultello adactis, extrudunt. mox fibras sursum, quoad maxime fieri potest, reprimunt, & plagam infarciunt capillamentis, ut sanies effluere possit. & si inflammatur, ignem adhibent scorto, & respergunt. Si bos a recenti castratu ineat, procreare potest. Apria etiam scropharum castratur, ne praeterea coitum appetat, sed breui tempore obefcet. Castratur autem cum biduo ieiunarit, suspensa pernis prioribus, recisa cute inter femina, quam maribus testes maxime continentur. hac enim parte adheret uuluis apria

dicta, cuius exigua parte absola confarcināt. Cameli etiam foeminae castrantur, com-
eis uti in praelio libet, ne concipiant utero. nonnulli superioris Asiae incolae camelos
uel ad tria millia possident. Currunt cameli celerius quam equi Nissani, propter la-
xiorē sui gradus glomerationē. & castrata denique auctiora quam incastrata eua-
dunt. Animalia quibus ruminare in more est, proficiunt, delectanturque non minus
in ruminando, quam edendo. Rumināt quae superiore dentium ordine carent, ut
boues, oves, caprae, ex feris nullum adhuc ruminare constat, praeterquam ea quae alio-
quando cum hominibus exigunt, ut ceruus. hunc etenim ruminare planum est,
sacient potissimum cum ruminant omnia, & hybernīs praecipue mensibus solent ru-
minare. septem ferē mensibus hoc faciunt, quae intra tecta aluntur, gregales leuius
minusque temporis ruminant, quoniam foris pascuntur. Sunt etiam ex dentatis utrinque
nonnulla quae ruminant, ut mures Pontici, & piscis, quem ab ea re ruminalem quon-
dam appellarunt. Sunt item alui fluentioris ea, quibus longiora sunt crura, sed pro-
pensiora ad uomitū, quibus latius pectus est. Idcirco tum in quadrupedum genere,
tum in avium, tum etiam in hominum ita esse magna ex parte perpersum est.

HISTORIAE ANIMALIVM FINIS.



ARISTOTELIS DE PAR

TIBVS ANIMALIVM ET EARVM CAVSIS, LIBER

PRIMVS, INTERP. THEODORO.

Duos esse et contemplandi et docendi praecipue habitus.

Caput I



NONNI contemplandi genere, omnique tum nobili-
iori, tum ignobiliori docendi via & ratione, duos esse
habitus constat, quorum alterum scientiam rei appella-
lasse, alterum quasi peritiam quandam, bene est. Homi-
nis enim probe periti officium est iudicare perspicaciter
posse, quidnam recte, aut non recte ab eo qui docet ex-
ponitur. quippe cum & hominem omnino peritum ta-
lem esse existimemus, & peritiam ipsam non nisi facul-
tatem huius officij esse statuamus. Sed hunc omnibus
ferē in rebus ualere iudicio arbitramur numero unum:
illum uero certae naturae alicui delegamus, fieri enim potest, ut rem unam quispiam,
ita ut alius omnes possit iudicare. Quamobrem naturalis quoque historiae siue contem-
plationis limites huiusmodi aliqui poni debent, ad quos iudex modum explicandi
referre possit, & approbare semoto illo ueritatis examine, quoniam modo res ita ne,
an aliter se habeat. Verbi gratia, utrum substantias singulatim discutiendas coepisse
praeslet, hoc est naturā hominis, aut leonis, aut bouis, aut alius cuiusquam generatim
exponere aptius sit: an rebus subiectis, quae communiter omnibus accidunt, comuni
usui quodam potius agendum. Sunt enim complura, quae eadem in multis generibus
diuersis inter se sint, ut somnus, spiratio, auctio, diminutio, mors. Ad haec, reliqui id
genus

genus affectus, et dispositiões. Nihil enim adhuc certi explanatiōis habetur, quod de his dicere possimus: sed cum singulatim agimus, eadem sæpe de multis referre necessesse est. Nam & in equis, & in canibus, & in hominibus, ea quæ modo dixi, omnia insunt. quapropter qui singulatim agere per accidentia uelit, sæpenumero uerba eisdem de rebus facere cogetur, quæ scilicet eadem animantibus adiunguntur sunt specie diuersis. Sunt etiam fortasse, quæ cum eandem sortiuntur appellatiōem, discriminē distinet species, ut animalium incessus: quippe qui specie unus esse minus uideatur. discrepant enim inter se uolatio, natatio, ingressio, repletio. Quam ob rem quoniam modo tractandum sit, latere non cōuenit, utrum inquam cōmuniter primum per generis complexiōnem, post uero res proprias considerare oporteat: an protinus quæque persequi singulatim rectius est. non enim de hac re adhuc præfinitum est. Nec illud confessum est, utrum, ut mathematici rem suam cœlestem demonstrare consueuerūt, sic homo rerum naturalium studiosus, primum quæ patent in animantium genere, partesque singulas explorare, deinde causam quam ob rem ita sint reddere debeat: an secus agendum sit. Ad hæc, cum plures causas generationis naturalis esse uideamus, scilicet eam, cuius gratia res gignantur, atque eam, unde mouendi principium sit definiendum de his etiam est, quænam prima, quæ secunda haberi debeat. Principatum sane illa obtinere uidetur, quæ sub hoc uerbo, cuius gratia significamus. hæc enim ratio est. ratio autem principium est pariter in rebus, tam arte, quam natura constitutendis. Vbi enim uel per intellectum, uel per sensum medicus sanitatem, opifex ædes definiat, rationes & causas rei, quam facit, reddere solet: & cur ita faciat, subiungit. quantū illa, cuius gratia, causa, & ratio boni & pulchri, naturæ operibus potius, quam artis coniuncta est. Necessitas uero non æque in rebus naturæ omnibus inest, ea uidelicet, ad quam omnes ferè autores rationes referre tentant prius, quam doceant, quot modis accipi necessarium debeat. Inest idipsum rebus quidem æternis simpliciter, absolutèque ratione: sed caductis etiam gignendisque omnibus ex suppositiōe tribuitur: quomodo in artificiosis, ut ædibus, & quibuscumque alijs generis eiusdem. Materiam enim talem adesse necesse est, si domus, aut quicuius alius finis futurus sit: atque etiam fieri, moueri que illud primum oportet, deinde hoc, ac deinceps ad hunc modum

itur ad finem, cuius gratia res quæque & efficitur, & est. eodemque modo in rebus quoque natura gignendis agitur, quantū demonstrandi modus, necessitatisque ratio, in naturali doctrina diuersa atque scientijs speculatiuis est. dixi de his alio loco. principium enim alteris quod est, alteris quod erit, accommodatur. Quod enim talis sanitas, aut homo, hoc uel esse, uel factum iri necesse est. non quia hoc uel est, uel fuit, illud necessario uel est, uel erit. neque huiusmodi demonstrationis necessitate ita perpetuitate annectere possumus, ut dicere liceat hoc esse, quoniam illud est. sed de his etiam alio loco disputatum à nobis est, & quibus in rebus id liceat, & quæ possint reciprocari, & quam ob causam. Latere autem ne illud quidem oportet, an ita agendum, quemadmodum priores autores, qui, quomodo res quæque fieret, quam quomodo esset, tractare maluerunt.

non enim inter hæc parum interest. sed enim exordiendum quod dictum iam est, ut primum res persequamur, quæ quoque in genere cōspectiores, promptioresque habentur. deinde causas reddamus, et generationem. hoc enim in ædificijs etiam potius euenit. quod enim forma ædium talis est, aut quod tales sunt ædes, idcirco fieri ædes hunc potius in modum censemus. generatio enim substantiæ gratia est, non substantia generationis gratia. Quam ob rem Empedocles plerumque in animalibus propterea ita cōtineri, quia ita, cum orirentur, acciderit, male ait: ut & spinam haberi talem, quod per contortione disungi, frangi que accidit: nescius & quæ semen genitale, quod consterit, uim talem habere oportet, & quam res, quæ effecerat, prior esset non modo ratione, uerum etiam tempore. Gignit etenim homo hominem, itaque ortus talis euenit

specie, quoniā talis qui gignit est. Quinetiā de ijs, quæ sponte fieri uidentur, pariter atq; de artificiosis animaduertere licet. Nonnulla enim uel sponte eadem quæ arte, fieri possunt, ut sanitas. His igitur causa efficiens similis antecedit, necesse est, ut ar-
condendarū statuarū prior statuis est, quādo sponte fieri nequeunt. Artem autē o-
peris, esse rationē omni abiunctā materia certū est. Fortuitis quoq; ratio similis est :
ut enim ars se habet, ita existunt. Quam ob rem censendū ita potissimū, ut ob eam
rem membris his homo constet, quia hoc homini esse est. Non enim fieri potest, ut
sine his membris homo sit: sin minus, proximū tamen aliud quicq; opinandū, & uel
omnino fieri aliter non posse, uel bene ita fieri tantū posse statuendum. Cum itaq;
talises sit, generationē in hunc modum, talemq; euenire necesse est. Quapropter 10
membra non sine ordine oriuntur: sed primū hoc, deinde illud, atq; in hunc modū
omnia, quæ natura cōsistunt, disponūtur. Veteres igitur illi & primi naturæ inter-
pretes, materiale principiū, atq; eiusmodi causam, quānam, qualisq; esset, indaga-
runt: & quonā pacto hinc tota orirētur, & quo mouente, ut discordia, & cōcordia,
aut mente, aut casu, temeritateq; spontina docuerunt: cum subiecta materia talem
quandam præ se ferre naturā uideretur, ut feruidam ignis, gelidam terrā, & alter le-
uem, altera grauem. sic enim mundū etiā generant. hæc eadem de ortu plantarū
& animalū quoq; referunt. Ventrem enim, aluū, omnēq; cibi & excrementi con-
ceptaculū, ita cōstituisse, cum in corpore humor laberetur & rueret, nares ex rupto
paruisse, cum spiritus siue status transmearet atque dispelleret. At uero aer & aqua 20
non nisi corporū materia est. naturā enim omnes ex ijs corporibus componūt atq;
constituūt. Quod si homo, ceteraq; animalia, membraq; eorum natura constet, di-
cendū profectō de carne, de ossē, de sanguine, deniq; de omnibus tam simili, quā
dissimili stue compactis: ut de facie, de manu, de pede, qua quodq; eorū tale sit, &
qua ita consent facultate siue uirtute. non enim satis est eatenus tantū nosse, quib;
bus ex rebus compositū sit, ut igne, terrāue: sed perinde agendū, ut si de lecto, aut
de quolibet alio generis eiusdem ageretur. formam enim potius, quā materiā eius
declarare tentaremus: ut æs, aut lignū: uel si id minus, totius quidem ipsius speciem
non omitteremus. lectus enim hoc in hoc est, aut hoc tale est. Quocirca uel ipsam si
guram explanari, qualisq; forma sit, indicari congruit. quippe cum formæ natura 30
potior sit, quā materiæ. Igitur si animalū membrorūq; unumquodq; figura, co-
loreq; est, recte Democritus dissērit, qui ex ijs ipsis putasse animalia constare uideē.
quippe qui perspicuū esse dicat, qualis forma sit homo, quasi sua ipse homo figura,
coloreq; pateat. Atqui mortuus homo, quāq; figuræ formam habet eandem, ta-
men homo non est. Ad hæc, fieri nō potest, ut manus sit quocunq; modo constans,
ut ænea, aut lignea, nisi æqui uoca nominis cōmunionē. sicut quæ picta est, urpote
quæ suo fungi officio nequeat, quomodo nec lapideæ tibie sūt assequi munus pos-
sunt. neq; medicus pictus artem medicinalem exercere potest. pari ratione mem-
brorū quoq; hominis uita functi nullū id esse insuper potest, quod erat, cum uiue-
ret: ut oculus, manus, pes, reliqua. Ergo simpliciter admodū & pingui minerua dictū 40
hoc est, ac perinde quasi faber de lignea manu loquerē. Sic enim naturæ illi explo-
ratores ortus & causas referunt figurarū. à quibus enim facultatibus condita fue-
rint, exponūt. Itaq; faber securim fortasse, aut terebrū dicit: illi terrā & aërem. sed
melius faber, ut qui parum sufficere arbitretur, si usq; eò dicat, quod instrumēto in-
cidente, partim caua, partim plana extiterunt: sed adiiciat, quonā talem a degerit
ictum: & causam, cur ita, exponat, uidelicet, ut talem aut talem formam opus acci-
peret. Constat igitur nō recte illos dissēuisse, atq; animal tale esse dicere oportere,
& quid, qualeq; tum id ipsum, tum etiā membrum unumquodq; explicari opor-
tere, quomodo de forma lecti docendū est. Ergo si animal, uel anima, uel pars ani-

ma, uel non sine anima est. quamprimū enim à corpore anima discessit, animal esse definit, neq; membrum ullum nisi figuræ suæ ratione idem relinquitur, modo eorum, quæ tabulæ transisse in lapidem narrant, si hæc, inquam, ita statui debent, hominibus naturæ studiosi sanè interest de anima & disserere & scire. & si non de omni anima, tamen de ea ipsa, quæ tale animal est, & quidnam anima, aut certe pars ista animæ sit: atq; etiā de ijs, quæ tali eius substantiæ accidant, præsertim cum bifariâ naturam intelligamus, ut altera pro materia sit, altera pro substantia. quæ quidem, & ut mouens, & ut finis est, talisq; animalis anima, uel omnis, uel pars aliqua eius sit. Nam ob eam etiā rem, qui de natura agit, eo amplius docere de anima, quā de materia debet, quo materia natura potius per animam, quā e contrario est. lūgnum enim, & lectus, & tripes, propterea est, quia idem potētia illa est. Sed quæret quispiam, animaduertēs ad id, quod modo dixi: Vtrum de anima omni docere naturalis scientiæ intersit, an de aliqua una, at si de omni, nulla certe præter naturalem philosophiam relinquatur scientia. intellectus enim, siue mens, rerum intelligibilis est, itaq; rerum omniū notiones naturalis una tenebit. Est enim eiusdem scientiæ, ut tam de intellectu, quā de re intelligibili doceat: siquidem eadem contemplatio omnium est inter se coniunctorum, sicut sensus etiā, & rei sensibilis. An non omnis anima principii motus est: neq; partibus animæ omnibus id tribui debet, sed augendi principii idem putandum, quod & in plantis, est, alterandi uim eandem, quā sentiendi: deferendi autem aliud quicquā, non uim intelligendi: delationē enim uel in ceteris esse animalibus nouimus, intellectū siue mentem in nullis. Constat igitur non de anima disserere omni oportere: quandoquidē non anima omnis natura est, sed aliqua eius pars una, aut etiā plures. Ad hæc, rem à materia abstractam nullam potest scientia naturalis cōtemplari, cum natura rei alicuius gratia facta omnia. rebus autem abstractis abiunctū, id est, quod sub hoc, cuius gratia, uerbo intelligimus. ut enim ars in artificiosis, ita in rebus ipsis aliquid esse principium aliud, & talis causa uidetur, quā ex uniuerso perinde ut calor, frigorisq; primordia habemus. Quamobrē uerisimilius dixerim cœlum & factum esse ab eiusmodi causa, si factū est, et magis esse ob eam causam, quā anima facta caduca atq; mortalia. ordo enim, & ratus certusq; status, longe magis in rebus patet cœlestibus, quā in nobis. incerta autem, inconstans, & fortuita conditio in genere mortali potius est. At illi genus animalium quodq; natura constare, extitisseq; censent. Cœlum autem forte sponte tale constituisse uolunt, in quo nihil fortunæ, nihil temeritatis deprehendi potest. Rem autem hanc esse illius gratia asserere ubiq; solemus, quoniam finem intelligimus aliquem, in quem motus (si nulla res prohibet) terminetur. quocirca eiusmodi aliquid esse constat, quod naturā uocamus. non enim quodlibet, & utcumq; fors tulit, ex quouis semine oritur, sed hoc ex hoc, neq; ex corpore quolibet semen quodlibet prodit, principii namq; & efficiens rei, quæ gignitur, semen est. sunt hæc enim natura. & proinde ex hoc nascuntur. Atq; etiā priusquā hoc, illud est, unde semen expromitur. Semen enim ipsum generatio est, finis uero substantia. utrisque autem his prius illud est, à quo proficiscitur. semen enim bifariam accipitur, uidelicet ex quo, & cuius. nam & à quo decessit, eius semen est, ut equi & eius quod ex illo futurum est, ut muli. uerum non eodem modo, sed ut dictum iam est. Ad hæc, semen non nisi potentia est. Potentia autem quemadmodum ad actum se habeat, nouimus. causæ igitur hæc sunt duæ numero: altera cuius gratia, altera ex necessitate. multa enim gignuntur, quia necesse est. Sed quæret fortasse quispiam, quam necessitatem intelligi uelint, qui res fieri necessario aiunt. neuter enim accipi potest eorum modorū, qui præfinitur in ijs, quæ per philosophiam tractata sunt. Tertius autem ijs, quæ habent generationē rebus est, alimentū enim

neutro illorum modorū esse dicimus necessariū: sed quia fieri non potest, ut res sine eo sit, ideo necessitatem ei adscribimus, quod quasi ex suppositione est. ut enim quia securi scindendum sit, durum aliquid esse necesse est: & si durum, uel æneum, uel ferreū: ita cum instrumentū sit corpus (est enim tum membrū unūquodq; rei alicuius gratia, tum uero totum ipsum) efficitur profectō, ut esse tale atq; ex talibus constare necesse sit, si illud cuius gratia ipsum est, futurū sit. Constat igitur duos esse causæ modos, ac potissimū utrunq; assequi uerbis oportere. sed si minus id fieri potest, tamen pro uiribus eniti ad eius significationē, omnesq; nihil ferē de natura docere, qui hoc non dicunt, existimare. Principiū enim rerū natura potius, quam materia est. Empedocles etiam in eam interdum incidit, ductus ab ipsa ueritate: & sub-
stantiā atq; naturā esse rationē fieri cōpellitur: ueluti cū os quid sit, reddit, quippe
qui non aliquid elementū unum esse id uelit, non duo, aut tria, non omnia, sed mixtionis elementorū rationē. Igitur & carnem & ceteras eiusmodi partes hūc eundem in modū esse apertū est. Causa uero quamobrem antiquiores illi autores non ad hunc uenerint modum, quod quid res esset, atq; substantiæ definitionē ipsam explicare haudquāq; solebant. Sed Democritus hanc tetigit primus, nō ramen quod ad rerum naturalium studium putauerat necessariā, sed quoad ab ipsa retraheretur. Socratis uero rēponibus usus quidem definiendi increuit, sed indagatio rerū naturalium desijt. nam omne philosophandi studiū ad utilem uirtutē, ciuilemq; usum translātū est. Licet quod modo dixi, ita demonstrare. Data animalibus spiratio est huius gratia rei, sed eam propter has effici res necesse est. necessitas uero aliās ita significat, ut si res cuius gratia futura sit, hæc haberi necesse sit. aliās ita, ut sic se habeant, aptaq; sua natura ita sint. egredi enim calorem, rursusq; ingredi, cum in re obuia offendatur, aëremq; interlabi necessariū est. Sed cum aer exterior refrigerando retorquet, ingressus atq; egressus caloris interioris rei alicuius gratia agitur. Hic modus tractandi est. hæc ad id genus doctrinæ uia & ratio attinet, hæc & eiusmodi sunt ea, quorū causas accepisse operæpretium esse ducimus.

Contra eos, qui genus singulare in duas diuidunt differentias.

Caput II



Vnt uero, qui genus in duas secando differentias accipiant singulare. quod quidem partim non facile, partim nullo pacto fieri potest. non enim defunt, quorū una tantū sit differentia. cetera autē superuacua sint. uerbi gratia: pedatū, bipes, fissipes, multissidū, hæc enim una potissima est. sin minus, sæpius idem dici necesse erit. Ad hæc, genus quoduis distrahi nō debet: ut, exempli gratia, aues aliæ in hoc, aliæ in illo diuisionis membro collocetur. quod ad itæ illæ diuisiones faciunt, quippe cum ita fiat, ut autum aliq; cum aquatilibus constituantur, aliæ in alio ponantur genere. Sed ut nomen huic similitudini auis, illi piscis indicū est, sic aliæ sunt quæ nomine uacent, ut illa compos sanguinis, aut expers. utraq; enim nomine uno carent. Quod si nihil ex ijs quæ generis societate iunguntur, distrahi debet, frustra illa seorsum in duas partes distinctio agitur, cum seiungi ac distrahi sit necesse, si ita diuidatur. Sunt enim ex multipedibus alia in terrestri, alia in aquatili genere.

Contra eos, qui differentias per priuationes diuidunt.

Caput III



Priuatione item diuidere ita necesse est. Et quidem id faciūt, qui seorsum in duo secant. At priuationis, qua priuatio est, nulla est differentia. non enim fieri potest, ut species eius sit, quod non est: uelut impeditari, aut impennati, sicut pennati & pedati. Differentia autem uniuersalis species habeat, necesse est. nam nisi habeat, cur uniuersalibus potius adnumerari, quam singularibus debeat. Sed quantū sunt differentia quæ uniuersales

sales

*in quibusdam
retraheretur,
impelleretur.*

sales sint, & species habeant, ut pennatus, cum pennarū alia fissā, alia continua sit, pedatus etiam partim mulgidus est, partim bifidus, quod in bisulcis animalibus patet: partim continuus nulla fissura ductus, qualis eorum est, quæ solidam habent ungulam, tamen difficile est, ut in eiusmodi differētiis, quarū species sunt, disparare, ut quoduis animal contineatur in ijs ipsis, nec idem in plures ueniat, ut pennatum & impennatū, ambo enim hæc in eadem specie possunt contineri, ut formica, ut nitedula siue cicindela. & alia quædam utrunq; recipiunt. omnium uero diffinitum, imò impossibile est, ut in ea quæ sanguine carent, ita diuidamus, differentiam enim unamquamq; in aliquo singulari inesse, & proinde opposita necesse est.

10. Quod si fieri non potest, ut ijs, quæ specie inter se differunt, species aliqua subitaneæ indiuidua, unaq; in sit, sed differentiam intercedere necesse est, ut avis ab homine differt. bipedis enim ratio alia diuersa est, uel si sanguine constant, sanguis diu screpat ipse, nisi pro nulla essentia parte debeat haberi, sed si hoc ita est, differentia una duobus inerit. Quod si ita sequetur, apertum iam est impossibile esse ut prius ratio sit differentia. Quinetiam totidem differentiarum erunt, quot animalia indiuidua, siquidem & ea ipsa indiuidua sunt, & differentiarum indiuiduarum. neque ulla differentia cōmunis est. Quod si ita fieri potest, ut non cōmunis, sed indiuidua sit, constat quæ diuersa sunt specie animalia in eodem, per illam quidem cōmunem contineri. Itaq; necesse est, ut si propriæ sint differentiarum, in quas omnia indiuidua cadant, nulla cō-
20. munit sit. sin minus, quæ diuersa sunt, ueniant in eandem: cum neq; indiuiduum idem, diuersas per distinctionē adire debeat differentias, neq; diuersa eandem, atq; omnia in ijs ipsis oporteat contineri. species igitur indiuiduas colligi ita non posse, ut diuidunt qui animalia, aut quoduis aliud genus seorsum in duo lecant, apertum iam est. sit enim autoribus illis, ut ultimas differentias totidem esse, quot animalia omnia indiuidua specie necesse sit. Cum enim genus aliquod sit, cuius differentiarum primæ album & nigrum habeantur, atq; eorum utrorumq; alie sint, itidemq; ulterius usque ad indiuidua, efficitur perfectio, ut ultimæ, aut quatuor, aut aliquo numero eliciantur, uidelicet qui ab uno multiplicari possit. Totidem autē species quæque erunt, cum differentia species sit in materia, neq; enim sine materia pars ulla esse
30. potest animalis, neque sola materia. non enim quoquo modo habens quid, corpus animal est, nec partium ulla, ut sæpius dictum est. Ad hæc, diuidendū ijs rebus est, quæ sitæ in substantia sunt, non ijs quæ accidunt, ut si quis ita figuras diuidat, ut alie angulos pares duobus rectis, alie pares pluribus habeant. accidit enim triangulæ figuræ, ut pares duobus rectis angulos habeat. Oppositis item diuidendum est. distant enim inter se opposita omnia, ut albedo & nigredo, ut rectitudo & curuitas. quod si altera diuersa sunt, diuidendū per opposita est, & non ita, ut alterum natione, alterum colore distinguatur. Animata etiam cōmunibus corporis & animæ numeribus diuidenda sunt. quod in ijs etiam quæ modo diximus, patet. Alia enim gressilia sunt, alia uolantia. Sunt enim nonnulla genera, quibus datum utrunq; est,
40. ut partim uolucres, partim inuolucres sint, uelut formicarū genus. atq; etiam syluestris urbanique ratione ita diuidetur, qd error est. sit enim, ut quæ specie sunt eadem, hæc distinguere uideamur. Cum omnia quæ urbana sunt, eadem syluestria quoq; reperiantur, ut homines, equi, boues, canes in terra Indica, sues, capræ, oues. quæ si æquiuoca sunt, non seorsum distincta sunt. sed si eadem specie uniusq; sunt, iam fieri non potest, ut syluestre atq; urbanū pro differentijs recte capiat. Omnino quancumq; differentia diuidis, una tantum diuisione id accidere necesse est. Quapropter generatim sumere animalia tentandū est, ut à uulgo iam autore distinctū est genus auis, piscis, ceterorū quæ singula multis differentijs describuntur. nec bipartita illa sectione agendum est. Sic enim aut omnino fieri nō potest, ut instituti assequamur,

cum idem in plures cadat diuisiones, & contraria ueniant in eandem. aut una tantum
 proueniet differentia, quæ uel simplex, uel per complexione[m] speciem ultimam refe-
 rat. sed si non differentia differentia accipis, diuisionem effici continuam perinde ut
 orationem coniunctione unam necesse est. uerbi causa, occurrat ijs qui ita diuidere
 cõsueuerunt aliud pennatũ, aliud impennatũ. pennati aliud urbanũ, aliud syluestre;
 aut aliud album, aliud nigrum. non enim differentia pennati urbanum, album ue-
 rit: sed hoc principium est alterius differentie. impennato autem per accidens est.
 Quamobrem pluribus diuidendum protinus differentijs quod unum est, ut nos
 censemus. Si enim priuationes differentiam facient, quam in bipartita sectione fa-
 cere nequeant. Apertum uel inde est, fieri non posse, ut ex singularibus speciebus
 quicquam accipiamus, bipartita generis sectione. & quidam fieri posse putarunt.
 Impossibile est enim unam differentiam esse eorum, quæ ut singula diuisionem re-
 cipiunt, siue simplicia, siue complexa accipiantur. simplicia dico, si non habeant diffe-
 rentiam, qualis fissipedato est. complexa autem, si habeant, ut multitudine[m] ad fissi-
 pides est. id enim illa sibi uult continuatio differentiũ, quæ de genere per diuissi-
 onem deducuntur, perinde quasi quid unum omnis hæc series referat. quanquam
 uocabulo euenit, ut ultima tantum differentia esse uideatur, uelut multitudine[m], aut
 bipes. pedatum autem & multipes superuacua sint. At uero plures huiuscemodi
 differentias haberi non posse constat eo argumento, quod cum pergis subinde, de-
 uenies quidem ad ultimam differentiam, sed non ad summam, & speciem: quæ qui-
 dem differentia, uel fissipes tantum est, uel omnis complexio. uerbi gratia, si homi-
 nem diuidens pedatum, bipes, fissipes componis. At si homo bipes tantummodo
 esset, hæc differentia una sufficeret. Sed quoniam hæc una non est, multas esse non
 sub una diuisione necesse est. Atqui fieri non potest, ut plures eiusdem sub biparti-
 ta una sint sectione, sed singulæ singulis finiantur necesse est. itaq[ue] fieri quoq[ue] non po-
 test, ut per bipartitam illam diuisionem, aliquod singulare animal accipiamus.

De genere & specie. Caput IIII




Ed quæret quispiam, cur principio homines non cõplectendo appella-
 rint nomine uno generis, quod bestias tum aquaciles, tum uolucres
 contineret. Sunt enim nonnulli affectus, tum his, tum cæteris animalibus
 omnibus cõmunes. Verũtamen recte ad hunc modum definitũ,
 distinctumq[ue] est. genera enim quæcunq[ue] excessu inter se differant, &
 plus, minus uel recipiant, hæc uni subiecta sunt generi. quæ autem proportionẽ re-
 cipiunt, hæc seorsum posita sunt. uerbi gratia: Auis differt ab aue, aut eo quod ma-
 gis habeat quicq[ue], aut superantia[m] ratione. aues enim altæ penna sunt longiore, aliæ
 breuiore. Pisces uero proportionẽ ab auib[us] differũt. quod enim penna in auib[us]
 est, hoc idem squama in piscibus habetur. uerũ id facere in omnibus non facile est.
 magna enim pars animalium eadem affecta est proportionẽ. sed cum ultimæ species
 substantiæ sint, quæ quidem species nullo speciei discrimine differant, ut Socrates,
 Coriscus, efficitur prosectio, ut uel uniuersalia explicari prius, uel idem sepius dicere
 necesse sit, ut dictum iam est. Vniuersalia uero cõmunia sunt, quæ enim in pluri-
 bus insunt, hæc uniuersalia appellamus. Sed quæstio existit, utra tandem tractari
 debeant. qua enim substantia est id, quod specie individui est, potissimum dixerim
 fore, si quis de singulis indiuiduis specie seorsum considerare potuerit. atq[ue] ut de ho-
 mine, ita de auib[us] esse agendum. habet enim hoc genus species, sed non de ijs, ue-
 rum de singulis indiuiduis auib[us], ut de passere, de grue, de reliquis huiuscemodi.
 sed si ita eueniet, ut sæpe de eodem dicatur affectu (quoniam cõmunis pluribus sit)
 efficietur sanẽ, ut seorsum referre de singulis, & sub absurdum sit, & prolixum. Cæ-
 terum

terum scite fortasse agetur, si quæ ad genera attinent, ea cõmuni negotio explicemus: uidelicet quæ recte ab hominibus definita dicuntur, quæq; naturam sortuntur cõmunem, & species non longe inter se differentes complectuntur, ut auis, ut piscis, & si quid aliud sit nomine quidem uacans, sed genere pari modo species continens. Quæ autem non eiusmodi sunt, hæc singillatim doceamus, ut de homine, & si quid aliud tale habeatur. Genera autē si quam similitudinē præ se ferant, figuris ferē partium, totiusq; corporis describuntur: quale genus auium, aut piscium est. mollia etiā atq; ostrea figurarū affinitate sua genera describunt. Partes enim eorum non proportionis similitudine discrepant, quomodo os hominis, & spina piscis, sed potius affectionibus corporis, id est magnitudine, paruitate, mollitie, duritate, lenitate, asperitate, & reliquis generis eiusdem: atq; omnino eo quod magis, minus uel quicquam habeant. Sed quemadmodū ratio tractandæ naturæ probari debeat, utq; de ijs rebus uia apta, facillimeq; contemplari docereq; possimus, atq; etiā de diuisione, quem in modum fieri possit, ut commodè species sumantur, & quā bipartita sectio partim fieri nequeat, partim frustra fiat, dictum iam est. Quæ cum iam præfinita explicataq; sint, de ijs quæ deinceps sequantur agamus, indeq; ordiamur.

De substantijs naturalibus, partim mortalibus, partim immortalibus.

Cap. V

20  Vbstantiæ quæ natura constant, partim ingenitæ, immortalesq; seculis omnibus sunt: partim ortus participes, atq; interitus intelliguntur, sed partem illam æternam, & proinde nobilem ac diuinā minus contemplari propterea possumus, quod admodū pauca illius modo sensui patent. quorum beneficio, tum de ea ipsa parte diuina, tum de ijs quæ nosse cupimus, facultas nobis cogitandi indagandiq; suppeditetur. Res mortales atque caducas, ut stirpes, ut animantes, quod eas socias familiaresq; habemus, nosse uberius possumus: quippe cum multa inesse quoq; in genere percipere possit, quicunq; nō laborem recusat pleniorē, utrunq; tamen studium nos delectat. Res namq; illas superiores, tametsi leuiter attingere possumus, tamē ob eius cognoscendi generis excellentiā amplius oblectamur, quā cum hæc nobis iuncta omnia tenemus: quemadmodū quamlibet partem, minimamq; corporis nostrarū puellæ deliciarū uidisse gratius ac iucundius est, quā cæterorū hominum membra tota perspexisse, & contractasse. At hæc inferiora, quia & plura sunt, & cognosci plenius possunt, idcirco præstantiam sibi scientiæ uendicant. Quinetiā quod & nobis propiora, & naturæ familiariora sunt, hinc aliquid cum rerum diuinarū studio reperiunt, atq; compensant. Sed cum iam satis de illis egerimus, nostramq; explicauerimus sententiā, restat ut de animante natura disseramus, nihil pro uiribus omittentes, uel uilius, uel nobilius. nam & in ijs, quæ hoc in genere minus grata nostro occurrunt sensui, natura parens & autor omniū miras excitat uoluptates hominibus, 40 qui intelligūt causas, atq; ingenuè philosophātur. absurdum enim, nullaq; ratione probandum est, si imagines quidē rerum naturalium, non sine delectatione propterea inspectamus, quod ingenium unā contemplamur, quod illas considerit, id est, artem pingendi, aut fingendi. Rerum autem ipsarum naturæ ingenio, miraq; solertia constitutarū contemplationē non magis persequamur atq; excoleamur, modo causas perspicere ualeamus. Quam ob rem uiliorū animalium disputationem per pensionemq; fastidio puerili quodam spreuisse, molesteq; tulle dignum nequaquā est, cum nulla res sit naturæ, in qua non mirandum aliquid inditū habeat. Et quod Heraclitū dixisse ferunt ad eos, qui cum alloqui eum uellent, quod forte in casa furnaria quadam caloris gratia sedentem uidissent, accedere temperant,



ingredi enim eos fidenter iussit, quoniam, inquit, ne huic quidem loco dii defunt
 immortales. Hoc idem in indaganda quoque natura animantium faciendum est. Ag-
 gredi enim quæque sine ullo pudore debemus, cum in omnibus naturæ numen, &
 honestū, pulchrumque insit ingenio. Quippe cum naturæ operibus iunctum illud
 præcipue sit, ubi nihil temere, viceque fortuita committatur, sed alicuius gratia omnia
 agantur, finis autem, cuius gratia quicquid uel constat, uel conditum est, boni, hone-
 stique obtinet rationem. At uero si quis cæterorum animalium contemplationē igno-
 bilem, abiectamque putat, iam hic de se quoque idem arbitrari debet. Non enim fieri
 potest, ut ea sine magnā abominatione inspiciamus, ex quibus corpus constat hu-
 manum, ut sanguinē, carnē, ossa, uenas, reliqua generis eiusdem. Omnino ita cen-
 sendum, ut qui de quauis corporis parte, aut de uase aliquo disputat, non de mate-
 ria, aut eius materię gratia doceat, sed formæ totius ratione. sicut & cum de ædibus
 agitur, non de lateribus, non de luto, non de lignis, sed de forma ipsarū ædium do-
 cemur. Pari ratione, qui de natura agit, de compositione, totaque substantia tractet,
 non de ijs, quæ nunquam eueniūt ut à substantia separentur. sed primum ea distingui
 singulis in generibus necesse est, quæ per se animalibus accidunt omnibus. post ue-
 ro causas persequi eorum conandum est. Quod igitur antè diximus, multa in mul-
 tis animalibus insunt cōmunia, partim simpliciter ratione, ut pedes, pennæ, squamæ,
 atque etiam affectus similiter: partim proportionē. proportionē inquam, quod alijs
 pulmo datus est, alijs pulmo quidem negatus, sed uice pulmonis iunctum aliquid
 est, quod pulmonī respondeat, alijs item sanguis inest, alijs sanguinis iunctum aliquid
 le, quod eandem in genere exanguis obtinet uim, quā sanguis in corpore illo san-
 guinis habet. Verū si seorsum de singulis disputetur, eueniet quod dictum iam est,
 ut sæpe eadem iterentur, dum de omnibus quæ adiuncta sunt agitur, quippe cum
 eadem compluribus iuncta habeantur. Hæc ita placeat præfiniri, & statui. Cum
 autem instrumentū omne rei alicuius gratia sit, & partes corporis quasque gratia esse
 alicuius uideamus, id autem ipsum esse alicuius gratia, non nisi pro aliqua actione
 fieri, patet iam totum etiam corpus constare alicuius gratia actionis plenioris. Non enim
 scitō, ferræ gratia facta est, sed ferræ sectionis gratia, cum scitō quædā usio sit.
 Quapropter corpus etiam totum animæ grātia conditum est, & membra officiorū
 gratia constant, & munerum, ad quæ singula accommodantur. primum igitur actio-
 nes, tum omnium cōmunes, tum eas quæ suæ singulis generibus, speciebusque ha-
 beantur, exponi oportebit. cōmunes dico, quæ adiunctæ omnibus sunt animalibus.
 suas autem propriasque appello, quarū differentias per excessum, siue superan-
 tiā comparando accipimus. Verbi gratia: A uem pro genere pono, hominē pro
 specie, & quodcumque ratione illa uniuersali, nullam differentiam recipit, nam alia pro-
 portionē, alia genere, alia specie rationem complent cōmunitatis. Quorum itaque
 actiones rerum aliarū gratia dispensatæ sunt, hæc etiam quorū sunt actiones, modo
 eodem inter se differunt, quo actiones. Item si quæ priores sint actiones, & pro fine
 aliarū capiantur, quo modo ipsæ se habent, eodem membra etiam habent, quorū
 illæ sunt actiones. Addo tertium, quæ cum sint, aliquid inesse necesse est, affectus
 & actiones intelligi uolo, ortum, incrementū, coitum uenerium, uigiliam, somnū,
 incessum, & quæcumque huiusmodi alia possunt generi animalium tribui. membra
 appello nasum, oculum, atque etiam totam faciem, quæ partes quoque uocamus.
 pari modo de cæteris item intelligendum est. Sed de modo, uiaque tractandi
 hactenus. causas nunc explicare, tum cōmunium, tum propriarū
 conemur, exoristiā primis, sicut statuimus.



10 x quibusdam, & quot numero membris singula animalia constarent, libris historiarum, qui de his scripti à nobis sunt, planius explicauimus. Nunc quas ob causas quæq; ad hunc modum ita se habent, consideremus, uidelicet ita, ut omnis ratio seiuncta ab ijs, quæ per historias exposuimus, tractetur. Cum itaque tri-
 20 plex sit compositio, prima statui potest ea, quæ ex primordijs conficitur ijs, quæ nonnulli elementa appellant, terram dico, aquam, ærem, ignem. sed melius fortasse dici potest ex uirtutibus confici elementorum, ijsq; non omnibus, sed ut antè expositum est, humiditas enim, & siccitas, & caliditas, & frigiditas, materia corporum sunt compositorum. Cæteræ autè differentiæ eas sequuntur, ut grauitas, leuitas, densitas, raritas, alperitas, lenitas, & reliquæ id genus affectiones. Secunda constitutio ex primis illis natura similarium partium in animalibus est, ut ossis, ut carnis, & reliquorum generis eiusdem. Tertia & ultima numero, partium dissimilarium est, ut faciei, manus, & reliquorum eiusmodi membrorum. Sed cum contrà in generatione atque in essentia agatur, quæ enim post-
 30 riora sunt generatione, hæc natura priora sunt. & quod primum natura est, id ultimum est generatione. non enim ædes, laterum aut lapidum gratia sunt, sed hæc ædium gratia petuntur. quod idem de quauis alia materia intelligimus. nec inductione tantum id patet, uerum etiam ratione. omne enim quod gignitur ex aliquo, & ad aliquid suam generationem deducit, & à principio ad principium pergit, hoc est, ab eo quod primū mouet, & naturam iam aliquam obtinet ad formā aliquam, aut talem quæpiam finem. homo enim hominem gignit, & stirps stirpem, ex materia, quæ subiecta singulis est. Cum igitur generatio & essentia ita se habeant, tempore materiæ generationemq; esse priorem necesse est: ratione uero essentiam re-
 40 cuiusq; & formam. patet hoc definitione generationis: quippe cum ædificationis definitio contineat ædium definitionem, ædium definitio non contineat ædificationis definitionem. idemq; in cæteris euenit. Quam ob rem elementorum materiam esse similarium partium gratia necesse est. Sunt enim hæc posteriores illis generatione. ijs autem ipsis dissimilares sunt posteriores. iam enim finem hæc tenent ac terminum, ternario constitutionem adeptæ numero, scilicet ut perfici generationem in multis natura fert. Constant igitur animalia ex utroq; membrorum hoc genere. uerum similia dissimilarium gratia habentur. illorum enim officia sunt & actiones, ut oculi, ut narium, & faciei totius, item digiti, manus, & brachij totius. sed cum actiones, motionesque multiformes, tum animalibus totis, tum etiam membris eiusmodi tribuantur, diuersa uirtutibus esse ea, ex quibus constant necesse est. ad
 50 alia enim molities, ad alia durities commodior est. & alia intendi, alia flecti debent. itaque partes similes obtinent sibi uires eiusmodi singulatim accommodatas. alia enim mollis, alia dura est, & alia humida, alia siccā, & alia lenta, alia rigida. At uero dissimilares plures, & compositas uires continēt. uis enim alia ad premendum, alia ad mittendū comoda manui est. Quam ob rem partes organicæ, quas officiales & instrumentarias licet appellare, ex ossibus, neruis, carne, cæterisque eiusmodi constant, nō illa ex ijs. causā cuius gratia cur hæc ita se habent, hæc est. sed cum præterea quæratur, quam ob causam hæc ita se habere necesse sit, ratio manifesta est, quod iam præfuit, ut ita se inuicem ex necessitate haberent. dissimilares enim constare ex
 60 similaribus possunt, tum pluribus, tum etiam singulis, ut uiscera nonnulla. constant
 P

enim se^{re} omnia multiformi figura, quæ ex corpore simili condita habentur. At fieri non potest, ut similes ex dissimilibus conficiantur. sic enim pars similis multæ essent dissimiles. his de causis membra animalium, alia sive simplici similitudine constare: alia composita, & dissimilia sunt. Cum autem partes aliarum instrumentarum, alie sensoriarum sint, instrumentarum omnes, ut dictum iam est, dissimiles sunt, sensus autem omnibus contingit per similes, scilicet propterea quod quivis sensus unius generis certi est, singulæque sensoriarum partes singulorum sensibilium generum capaces habentur. afficitur etiam quod potentia est, ab eo quod actu est, ita quod idem sunt genere, unumque illud, & hoc sunt. quam ob rem manum, aut faciem, aut aliam quamvis eiusmodi partem, nullus naturæ interpretis terram, aut aquam, aut ignem esse conatur exponere. partes vero sensorias singulas elementis singulis tribuunt, ut aliam aërem, aliam ignem esse confirmant. Sed cum sensus in partibus simplicibus positus sit, evenitratione optima, ut tactus sedem similem quidem, sed minime simplicem sortiatur, quippe qui maxime vim recipiendi plura genera videatur habere, multasque præ se ferre contrarietates sui obiecti, verbi gratia, caliditatem, frigiditatem, siccitatem, humiditatem. alias etiam generis eiusdem. & quidem caro in quavis earum qualitarum sentiendarum posita est, aut quod carni proportionem respondet, corpusculum omnium partium sensibus accommodatum est. Quine etiam cum fieri non possit, ut animal sit carens sensu: eo quoque efficitur necessarium, ut membra nonnulla similia in animalibus habeantur. vis enim sentiendi sita in his est. Actiones autem per dissimilia administrantur. Sed cum vis sentiendi, vis movendi, vis nutriendi, eodem in membro contineantur, quod alio loco explicatum a nobis est: sit necessarium, ut membrum, quod primum principia eiusmodi teneat, id & simplex eo debeat esse, quia omnium capax sensibile est: & dissimilare eo, quia movens & agens est. quamobrem in genere exanguium, hoc est, experte sanguinis animalium proportionale est. In sanguineo autem, id est compositum sanguinis, cor tale habetur membrum. quippe cum cor, & in partes similes secetur, quemadmodum quodvis ex alijs visceribus: & dissimilare sit, propter suæ figuræ formam. Cætera etiam omnia viscera appellata, secuta hoc sunt. quippe quæ ex eadem materia consent. natura enim eorum omnium sanguinea est, quoniam posita sunt ad meatus venarum, atque intercapedines. igitur perinde quasi sex aquæ profluentis, cætera viscera veluti profusiones sanguinis per venas fluentis consistunt. At vero cor, quia sanguinis initium est, & vim creandi sanguinis primam obtinet, idcirco ex tali materia constare, quale recipit alimentum, ratio est. Sed quam ob causam viscera forma sanguinea sunt, & partim similia, partim dissimilia, dictum iam est.

Partium similiarum aliarum molles & humidæ, alias siccae & solidæ esse: de quibus ordinis similiarum dissimilantia: de quibus calidi & frigidi deceptionibus, eorumque excessu. Caput II



Artium autem similiarum aliarum molles & humidæ sunt: aliarum duræ & solidæ, humidæ vel omnino, vel quandiu in constitutione naturæ manent, sanguis, sanies, adipis, sebum, medulla, genitura, lac ubi haberi solet, caro, & quæ ijs proportionem respondent. non enim omnia animalia partes has obtinent. Sed sunt quæ ad proportionem nonnullarum ex ijs consent. Siccae ac solidæ inter similes sunt, os, spina, nervus, vena, ordo enim similiarum discrepat. quippe qui nomen partim commune toti cum parte servet, ut venæ pars vena recte appellatur: partim non servet, ut in visceribus patet. figura enim diversa est. Primum igitur partibus his, tum humidis, tum siccis, multarum causarum modi tribuuntur, cum aliarum tanquam materia membrorum dissimiliarum sint.

ex ijs enim membra quæq; officia siue instrumentaria constant, offibus, neruis, carnibus, alijs generis eiusdem, quæ partim ad essentiam, partim ad actionem conducunt. aliæ nutritiōe sint, ut humidæ siccis, etenim omnia ex humore sua capiūt alimenta. aliæ ut excrementa earum sint, accidunt, ut sedimentum siccis alimentis, atq; etiam humidi in ijs, quibus uesica data est. Earum autem ipsarum partium discrimina, quibus inter se discrepent, notæ melioris gratia habentur: ut tum aliarum, tum sanguinis ad sanguinē, alius enim tenuior, alius crassior est: & alius syncerior, alius turbulentior. item alius frigidior, alius calidior, tam in eodem animali quàm in diuersis. quantum enim sanguinis parte corporis cōtinetur superiori, his differentijs

10 discrepat cum inferiori. Omnino animalibus, alijs sanguinē dedit natura, alijs uice sanguinis partem eiusmodi aliam. est certe roboris efficacior sanguis, qui crassior & calidior est. Vim autem sentiēdi intelligendiq; obtinet pleniorē, qui tenuior atq; frigidior est. hoc idem discrimen in ijs quoque habetur, quæ sanguini proportione respondent. quam ob rem apes, atque eiusmodi alia animalia ingeniosiora multis carentibus sanguine sunt. necnon inter ea quæ sanguinē habent, ingeniosiora suis contrarijs sunt, quæ sanguinem habēt frigidiorē & tenuiorē. Sed optime constant quæ calidum, tenuem, & syncerum habent: quippe quæ unā & uiribus corporis, & animæ ingenio plurimum ualeāt. quapropter pars etiam superior corporis ea ipsa differētia dissidet cum inferiori, & foemina cum mare, & dextra pars cum

20 sinistra eiusdem corporis. pari modo ceteris quoque tam eiusmodi partibus, quàm dissimilibus statuere differentiam debemus, partim ad officia & essentiam cuiusuis animalis, partim ad melius deterius uē. exempli gratia, inter ea quæ oculos habent, alia duris oculis sunt, alia humidis. & alia carent palpebris, alia habent, ut uisus sit exquisitor. Sanguinem uero haberi, aut quod eandem quàm sanguis naturam obtineat, quàm necesse sit, atque etiam quænam sanguinis sit natura, explicandum suis iam causis est, si prius calidi frigidiq; rationem distinxerimus. Natura enim rerum multarum ad ea ipsa principia refertur. compluresq; ambigunt, quæ nam animalia, membra uē, calida aut frigida sint. etenim nonnullis aequalitas terrestribus esse calidiora placet, argumento, quod naturæ frigiditas calore naturæ eo-

30 rum compensetur. Sanguine etiam destituta, ijs quæ sanguinem obtinent esse calidiora. & foeminas amplius quàm mares calere arbitrantur. Parmenides enim mulieres esse uiris calidiores autor est. quod idem quibusdam etiam alijs placuit, argu- mento copię sanguinis, qua menstrua fiant. Empedocles contrā opinatur. Sanguinem etiam & bilem, alij inter calida enumerāt, alij inter frigida. quod si calidum atq; frigidum tantam recipiunt ambiguitatem & controuersiam, quid de ceteris arbitrari debeamus? Hæc enim omniū quæ sensum patiūtur, apertissima sunt. sed quæstio hæc orta inde uidetur, quod calidū multifariam dicitur. quisq; enim quamuis contraria dicat, tamen aliquid dicere uidetur. Quam ob rem nosse oportet quæadmodum rerum naturalium constitutarū partim calidæ, partim frigidæ, & aliæ siccæ, aliæ humidæ dici debeant. Nam uitæ quoq; & mortis causas hæc habere, atq; etiā somni

40 & uigiliæ, iuuentutis & senectutis, & morbi & sanitatis: nō asperitatis aut lenitatem, non grauitatem aut leuitatem: nihil ferē tale apertū esse uidetur, & recte quidem. Sunt enim hæc, ut alio loco exposuimus, initia elementorum naturalium: calidum dico, frigidum, siccum, humidum. Vtrum igitur simpliciter ratione, an multipliciter calidum dicatur? Sed quodnam officiū rei calidioris sit, aut si plura sint, quot numero sint, declarandum est. Primo igitur modo calidius dicitur id, quod ampliorē inuehit sensum cum tangitur: nec sine dolore. quod quidem fallere interdum uidetur. nam fieri potest, ut corporis habitus causam dolendi afferat, cum sentitur. Ad hæc, calidius quod reiliquabilis liquantius, & rei cremabilis cremantius est. Item si alterū

*calidum
multipliciter*

plus, alterū minus sit, idem quod plus est, hoc altero quod minus, calidius est. Præ-
 terea quod de duobus non citò, sed lente frigefit, id calidius est. & quod citius cale-
 fit, eo quod lentius, natura esse calidiori censemus. perinde quasi alterum sit aduer-
 sum, ut remotius: alterum simile, ut propinquius. Alterum igitur altero calidius
 esse, et si nō pluribus, tamen tot modis dicitur. Qui modi omnes eidem inesse non
 possunt. aqua enim feruens plenius calefacit quàm flamma: sed flamma urit & la-
 quar rem, uri aut liquari idoneū. quod aqua efficere nō potest. Item aqua feruens cali-
 dior est, quàm ignis exiguus, attamen citius magisq̃ refrigescit quàm ignis, quàm
 uis exiguus: quippe qui frigidus nunquam fiat, cum aqua omnis refrigerari possit.
 Ad hæc, aqua feruens calidior sentitur, sed celerius refrigescit & congelascit, quàm
 oleum. Sanguis præterea tactu calidior quàm aqua, aut oleum est, sed celerius ge-
 lascit. Lapis etiam, ferrū, & reliqua generis eiusdem lentius quidem calefiunt quàm
 aqua, sed ubi calefacta fuerint, urere uehementius possunt. Postremo ea, quæ cali-
 da esse diximus, calorem aut externum continent, aut suum. plurimum autem re-
 fert, hoc an illo modo calidum quicquam sit: alterum enim eorum propè est, ut ca-
 lidum per accidens sit, non per se. perinde quasi, si febrienti muscum esse accidit, di-
 xeris muscum esse calidiorē, quàm eum qui calidus sanus est. Sed cum aliud per
 se calidum, aliud per accidēs sit, refrigescit quidem lentius quod per se calidum est,
 sed sæpe fit, ut sensum uehementius calefaciat id quod per accidens calidum est.
 item amplius urit quod per se calidum est, ut flamma, quàm aqua feruens. sed ta-
 ctu amplius calefacit aqua feruens, quæ per accidens calida est. Itaque iudicium
 uirum nam ex duobus calidius sit, non esse simplex apertum est. quando fieri po-
 test, ut hac alterum, illa alterum ratione calidius sit. nonnulla ex ijs ne dici quidem
 simpliciter calida, aut non calida possunt. subiecto enim quod tandem sint, non ca-
 lida sunt, sed per associationem calida sunt: uelut si ferro calido, aut aquæ nomen
 impones. hoc enim modo sanguis calidus est, & quidē patet frigiditatem aliquam
 esse naturam, nō priuationem in ijs, quorum subiectum calidum per affectionem
 siue passionem est. natura etiam ignis tale quid fortasse est. subiectum enim forsis-
 tan est, uel fumus, uel carbo: quorum alterum semper calidum est, quippe cum
 fumus non nisi exhalatio sit. carbo autem extinctus frigidus est. Oleum & teda ef-
 fici frigida possunt. Adusta etiam ferē omnia aliquid habēt caliditatis, ut calx, cinis,
 sedimenta animalium, & inter excrementa fel, eo quod feruore nimio exaruerint,
 relictumq̃ sibi contineant aliquid caliditatis. Teda, & quoduis pingue alio modo
 calidum est, uidelicet quod celeriter in actum ignis mutari potest. calor autem uim
 tum cogendi, tum liquandi habere uidetur. quæ igitur aquæ unius sunt, ea frigore
 coguntur. quæ terræ, igne calida etiam indurantur. frigore celeriter atque irresolubili
 concretu, quæ terram potius præ se ferunt. leuius autem, quæ aquam. Sed de his
 planius alio loco definitum à nobis est, scilicet quænam con crescere apta sint, &
 quibus causis stringantur. Calidum uero calidius, cum multifariam dicatur, non
 eodem modo rebus iungetur omnibus: sed addere debebis, aliud per se esse cali-
 dum, aliud plerumque per accidens, item aliud potentia, aliud actu: & aliud hoc
 modo, quod tactum amplius calefaciat: aliud, quod flammam excitet
 atque igniat. Quod si calidum multiplici ratione dicatur, frigi-
 dum quoq̃ pari ratione sequatur, necesse est, atq̃ de
 calido, frigido, excessuq̃ eorum, ad hunc
 modum de sinisse satis sit.

De sicco & humido disputatio.

Caput III



Equitur ut de sicco, & humido, modo superiorum differamus. nam ea quoque multifariam dici solent, ut alia sicca, aut humida potentia sint, alia actu. Gelu enim, omnemque humorem concretu siccu dicimus actu, & per accidens, cum tamen potentia & per se humidus sit. contra terra, cinis, & reliqua generis eiusdem mixta humori, humida actu, & per accidens redduntur, quanquam per se, atque potentia sicca sunt. at ubi haec separata fuerint, quod aqua refertum est, id & actu & potentia humidum est, quae autem terrae propria sunt, haec omnia sicca sunt. & quidem quod proprie ac simpliciter siccu est, hoc modo maxime intelligitur. altera etiam, humida dico, hac eadem ratione, qua calida & frigida, proprii absolutique nomen recipiant. His ita praefinitis, apertum iam est sanguinem quodammodo calidum esse, uidelicet eo, quale est et sanguini esse, perinde quasi aquam seruentem nomine uno significemus. At uero subiecto, & quod tandem cum sit, sanguis est, non calidus est, & quodammodo per se calidus, quodammodo non per se calidus est. Caliditas enim in eius ratione inest, quae modum albedo in albi hominis ratione. At eo, qua sanguis per affectionem siue passionem est, non per se calidus est. Pari modo de sicco & humido statuendum est, quapropter in eiusmodi rerum natura, partim calida & humida sunt: sed separata congelascunt, & frigida esse videntur, qualis est sanguis. partim calida crassiora sunt, ut bilis: sed separata ab eorum, in quibus habentur natura, contra afficiuntur: quippe quae refrigerentur, atque humescant. sanguis enim siccior redditur. bilis flaua humidior. magis autem, minus uel participari opposita, uel ut rem in se his statuere debemus. explicatum iam est, quoniam modo sanguinis naturae particeps sit caliditatis, humiditatis, aut contrariarum qualitarum. Sed cum omne quod augetur, capiat alimentum necesse sit: alimentum autem omnibus ex humido & sicco suppeditetur, quorum concoctio & mutatio, non nisi per caloris uim agitur, sit ut tam animalia omnia, quam stirpes, & si non alia de causa, tamen ob eam rem principium caloris naturale habeant necesse sit: idque ipsum partibus sit pluribus accommodatum, quemadmodum cibi consuetudini administrationes. Prima enim administratio perspicua est, cum per os, partesque ore contentas perficiatur animalibus, quorum cibis sectionem desideret. sed haec nullius causa est concoctionis, sed facilitatem concoquendi potius praestat. cibi enim illa minutatim diuisio facit, ut calor facilius consociando expediat. At superior & inferior uenter iam cum calore naturali suo concoquendi officio funguntur. sed ut os animalis cibi in consuetum meatum est, atque etiam pars ei annexa, quam gulam appellant, cibum quibus data est animalibus usque ad uentriculum deducit: sic alia quoque adesse principia oportet, quorum opera membra omnia corporis ex uentre, naturaque intestinorum, quasi praesepi pabulum capiant. stirpes enim siue plantae suis radicibus alimentum iam consuetum ex terra hauriunt: quocirca ne excrementum quidem contrahi in stirpibus solet. terra enim caloreque eius, perinde ac uentre uruntur. At animalium genus omne feret, sed aperte quae incedunt, quasi terram intra se continent sinum uentris, ex quo ut ille radicibus, ita haec aliquo intercedente cibum assumere debent, donec finem sequentis concoctionis faciant. cibus enim ab oris officio uentri mandatur. hinc membrum aliud capiat necesse est. & quidem ita natura constituit. Venae enim per totas lactes ad uentrem tendunt usque, exorsae inferius, sed haec ex animalium consuetione, commutatio neque naturali petenda sunt. Cum autem omnis alimentum, omnisque excrementum concipiat, aculium aliquod haberi necesse sit, uenaeque quasi uasa sint sanguinis, patet sanguinem esse animalibus sanguineis ultimum alimentum: ex anguibus uero id esse, quod uice sanguinis habeatur proportionale. quamobrem quoties cibus non inge-

ritur, sanguis deficit: quoties ingeritur, augetur. & si alimēta bona assumuntur, sanguis integer est, si praua, uiosus. Igitur sanguinem alimentum gratia datum esse animalibus sanguine praeditis apertum ex ijs, ceterisque eiusmodi rationibus est. nam ob eam rem sanguis ne tactus quidem sensum mouere potest, sicut nec cetera excrementorum genera. nec uero alimentum sensum mouet, ut caro. haec enim sensum cum tangitur, mouet. non enim sanguis continuus carni, neque cognatus est, sed in corde ac uenis, quasi uasis continetur. Sed quonam modo membra ex sanguine sua capiunt incrementa, atque etiam de alimentum omnino ratione differere, cum de generatione agemus, locisque alijs, aprius est. nunc haec tenus dictum sit, non enim plus hic locus desiderat, quam ut sanguinem esse alimentum gratia, & alimentum membrorum causa exploratum habeatur.

De fibris, & quae animalia ijs careant: deq; metus causa, & saniei natura.

Caput IIII



Vas autem fibras uocant, non omnis continet sanguis. sed sunt qui non habeant, ut ceruarum sanguis, & damarum. quam ob rem id sanguinis genus nunquam spissatur. sanguis enim qui dilutus est, frigidior est: itaque durescere non potest. qui autē terrēus est, nimirum coit, cum humor euaporatur. fibræ autem illæ terræ sunt opificium. Quoniam etiam euenit, ut nonnulla ex ijs animalibus, quæ talem obtinēt sanguinem, sapientiora sint: uerum non sanguinis frigiditate, sed potius tenuitate atq; munditia, quod neutrum in terreno est. habet enim sensum mobiliorem, quorum humor tenuior & syncerior est, hinc etiam nonnulla ex ijs quæ sanguine uacant animalibus, prudentiora nonnullis sanguinem habentibus sunt, ut dictum iam est. uerbi gratia, apes, formicæ, & si quid aliud tale est. timidiora, quibus sanguis dilutus nimis est. metus enim refrigerat. itaq; ea quibus eiusmodi temperamentum in corde habetur, metuēdi affectioni sunt opportunitiora: aqua enim frigore cōgelascit. quam ob rem cetera quæ exanguiā, timidiora sanguineis sunt animalibus, quod simpliciter dixerim, ac mota cessant præ nimio metu, & excrementa emittunt. nonnulla etiam suos colores immutant. Quorum autem sanguis fibris admodum multis, crassisque repletus est, hæc terrena amplius constant natura: & animosa, iracunda, proindeque furibunda sunt. Ira enim calorifica est. solida autem firmiora quoque omnia concalescentia uel hementius quam humida calefaciunt. fibræ uero solidæ terrenæ quoque sunt. itaq; quasi fomenta in sanguine efficiuntur, seruoemque per iram accendunt. ex quo fit, ut tauri & apri animosi, iracundi, furibundi quoque sint. sanguis enim eorum fibris repletior est. & quidem taurorum sanguis omnium celerrime coit & durescit. At si fibras detraheris, sanguis non coegetur. ut enim si ex luto terrenam portionem semoueris, aqua non concreset: ita sanguis fibris detractis incongelabilis manet. fibrarum enim natura terrena est. quod si non eximantur, cogitur ut terra humida frigore. cum enim calor exprimitur, humor una trahitur, atque euaporatur, ut dictum iam est. atque ita concreuit, non à calore siccescens, sed à frigore. At uero quandiu in corpore continetur, humidus est propter calorem animalibus inditum. perfectio naturam sanguinis causam esse, cur permulta animalibus ueniant, tum per mores, tum etiam per sensum ratio est. materia enim totius corporis est. quippe cum alimentum materia sit, sanguis autē ultimum alimentum habeatur. facit igitur, ut plurimum differentia existat, si calidus aut frigidus sit, si tenuis aut crassus, si turbulentus aut nitidus. Sanies pars diluta, siue aquosa sanguinis est, eo quod aut nondum concocta, aut corrupta est, itaq; id uel sanies necessario est, uel sanguinis gratia est.

De seuo,

De seuo, & adipe, eorumq; differentia, & quæ animalia seuum, quæ item adipe
pen habent.

Caput V



Euum & adeps inter se differunt, sanguinis ratione, est enim eorum
utrumque sanguis cōcoctus per bonitatem enutriendi, consistitq; ex
eo, quod in pulpam quidem animalis non absumatur, sed concoctio-
nis alimētisq; bonitate præditum est, indicat id pinguedo eorum, cum
pingue inter humida, cōmune ignis & aëris sit, quamobrem nullum
ex ijs quæ sanguine carent, uel adipem habet, uel seuum : quandoquidem sanguis
deest. Quorum autem sanguis corpulentior est, hæc seuum potius habent, seuum
enim terrenum est, unde fit, ut modo fibrosi sanguinis cogatur, tam ipsum, quam
eiusmodi ius, cum parum aquæ, multum terræ contineat. Quam ob rem quæ non
utrinque dentata, sed cornigera sunt, hæc seui habent, naturam eorū refertam esse
huiusmodi elemento patet, eo quod cornua gerunt, talosq; obtinent, quæ quidem
omnia natura sunt arida & terrena. At uero genus utrinq; dentatum, & cornuum
expers, & multifidum, uice seui adipem habet, quæ nō cogitur, nec siccitate aliqua
frangitur, quoniam eius natura minus terrena est, hæc si mediocriter in animalium
membris habentur, profunt, nec enim sensum impediunt, & ad sanitatem uiresq;
opirulantur : sed si modum excedunt, nocent atque interimunt, nam si corpus to-
tum trāsierit in adipem, aut seuum, peribit, animal enim ea parte est, in qua sensus
habetur. Caro autem, & quod carni proportionetur uim obtinet sentiendi, san-
guis, ut dictum iam est, & sensu caret, & ob eam rem, nec adeps, nec seuum sentit;
sunt enim sanguis concoctus, quod si totum corpus tale efficiatur, nullum præ-
terea sensum habere poterit, hinc & celeriter ea senescunt, quæ ualde pinguerint;
quippe quæ parum sanguinis habeant, utpote cum copia sit absumpta ad pingue-
dinem. Quæ autem parum sanguinis habent, hæc iam inde ad interitū sunt oppor-
tuniora. Interitus enim inopia quædā sanguinis est, quodq; parū est, affici tum à fri-
gore quolibet, tum à calore facile potest. Quinēdā obesa omnia sterilia ea de cau-
sa sunt, quantū enim ex sanguine proficisci ad geniturā, & semen genitale debeat,
hoc in adipem aut seui sumptatur, sanguis enim cum cōcoquitur ad hæc transit,
itaque aut nullū omnino excrementum in ijs ipsis consistit, aut parum. Atq; de san-
guine, sanie, adipe, seuo, quid sint, & ob quas causas habeantur, dictū iam est.

Quid medulla, quibq; animalibus data sit.

Caput VI



Ed medulla etiam natura quædam sanguinis est, non ut quidam uo-
lunt, uis genituræ seminalis, patet hoc in ijs, quæ nuper in lucē pro-
dierint, medulla enim in ossibus quoque eorum sanguinea connec-
tur, utpote cum omnes corporis partes ex sanguine consent, & par-
tū alimentum præstetur à sanguine, sed per incrementum conco-
ctionemq; efficitur, ut quemadmodū cætera membra, sic uiscera quoq; immutentur
colore, per copiam enim sanguinis uiscera etiā cum recentia adhuc sunt, colorem
sibi sanguineum trahunt, sic etiam medulla afficitur, & pinguis in pinguib; ani-
malibus est, atq; axungia similis. At quibus sanguis nō pinguedini, sed seuo similis
per concoctionē euadit, ijs medulla seuo similis est, quamobrem ut cornigeris ani-
malibus, nec utrinq; dentatis, medulla speciem gerit seui : sic utrinq; dentatis atq;
multifidis pinguedinem refert, uerū spinæ dorsī medulla minime talis est, quoniam
continuum hanc esse oportet, porrectamq; per longitudinem spinæ totius, quæ ex
multis uertebratis orbiculatis ossibus iungitur, nam si ex pinguedine aut seuo es-
set, nō æque perpetua esse posset, sed uel fragilis, uel humida esset. Sūt ex animalibus,
quæ nullam commentatione dignam medullam habeant, uidelicet ea, quibus

P 4

ossâ robusta, & solida sunt, ut leonî. eius enim ossâ, quod exiguum admodum, & perobscuram medullam continent, carere omnino medulla videntur. Sed cum ossium naturam inesse in animalibus necesse sit, aut quod ossibus proportionetur, ut in aquatilibus spinam, sit necessariò, ut nonnulla habeant etiam quod pro alimento contineatur, ex quo ossâ consistant. alimentum autem omnibus esse sanguinem dictum iam est. seu osas etiam & pingues esse medullas ratio est. tepor enim, quem ossium complexio facit, sanguinem concoquit. sanguinis autem per se concoctio, seuum & adeps est. quoniam etiam in ijs quæ ossâ spissâ firmâq; habent, non temere partim nulla, partim exigua inest medulla. alimentum enim in ossâ absumitur. Quæ autem non ossâ habent sed spinam, ijs dorsi tantum medulla est. parum enim continent sanguinis suapte natura. & dorsi spina tantummodo caua habetur. quam ob rem in ea medullæ aliquid creari potest. una enim ipsa capax est, solaq; eget copula propter interceptiones. quam ob rem medulla etiam eius partis differt, ut dictum est. quod enim uice fibulæ fungitur, idcirco lenta nervosaq; est, ut intendi possit. Causa quam ob rem medullam habent animalia, quibus data est, declaratum iam est. Quid etiam medulla sit, patet, scilicet alimenti sanguinei, quod in ossâ, spinamq; distribuatur, contentumq; concoctum excrementum.

*quædâ
copula.*

De cerebro & eius natura: deq; capitis fluxionibus, & somni causa.

Caput VII



Roximum serè est, ut de cerebro doceamus. nam cerebrum quoque medullam esse atque originem medullæ, compluribus placuit autoribus: argumento, quod dorsi medullam iunctam cum cerebro cernerent. Sed res contrà se habet, omnino propè dixerim. cerebrum enim partium omnium corporis frigidissimum est, cum medulla calida suapte natura sit. quod eius pinguedine & axungia perspicuum est, idq; facit ut cerebro iungi, cōtinuariq; possit ipsa dorsi medulla. solet enim natura semper emoliri contra cuiusvis exuperantiam auxilium per coniunctionem rei aduersæ, ut excessum alterius altero compenset & moderetur. Sed enim medullam calidam esse pluribus sanè rationibus constat. cerebri autem frigiditas, & tactu percipi potest, & ratione intelligitur, quod omnium maxime humorum corporis sanguine caret, quippe quod nihil sanguinis habeat, squaloreq; oblitum sit, atque horridum. nec uero excrementum est, nec inter partes continuas enumerandum, sed sui generis est, & quidem ratione optima naturam eiusmodi sortitum est. nullam uero cum partibus, quæ uim obtinent sentiendi continuitatem habere, cum intuitu pateat, tum uel maxime inde constat, quod cum tangitur, nullum efficit sensum, quemadmodum nec sanguis, neque excrementum animalium ullum. datum autem hoc animalibus est ad naturæ totius salutem. Quod enim nonnulli statuunt importune animam esse ignem, aut aliquam eiusmodi uim, melius fortasse dixeris animam in quodam eiusmodi corpore cōstare. cuius rei causa est, quod ad exequenda animæ officia, calor omnium maxime administrandi uim obtinet. Cum enim officium animæ sit alere & mouere, hæc ea ipsa facultate potissimum efficiuntur. Igitur animam esse ignem arbitrari simile est, atq; si ferram, aut aëtam, fabrum aut artem fabrilē esse ideo arbitraris, quia opus non nisi iunctis his efficiatur. Sed quā genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est. Cum autem omnia momentum requirant contrarium, quo mediocritatem ac medium assequantur: in hoc enim essentia ratioq; consistit, non in alterutro extremo seorsum posito: idcirco aduersus cordis sedem & calorem, cerebrum natura molita est. Et ea de causa pars ista animalibus iuncta est, naturam obtinens aquæ & terræ communem, atq; ob eam rem cerebrum omnia sanguine prædita habent. ex cæteris nullum serè,

nisi

*ua ratione cerebri
in animalibus natu-
a producit?*

nisi per proportionem, ut polypus. parum enim caloris obtinet omne id genus, propter sanguinis priuationem. Cerebrum igitur calorem feruoremque cordis moderatur, & temperiem affert. Sed ut ea quoque pars modico potatur calore, uenae ad membranam cerebri deueniunt ex utraque uena, maiorem dico, & eam quae aorta uocatur. & ne calor nimius offendant, non paucae amplae, sed frequentes ad tenues uenae ambiunt. nec sanguis copiosus & crassus, sed tenuis, syncerusque subit eodem. Fluxiones etiam ob eam rem ex capite oriuntur in ijs corporibus, quibus cerebrum frigidius est, quam temperamentum modicum postulet. cum enim alimentum per uenas sursum respirat, ubi excrementum ob eius loci uim refrigeratum est, fluxiones pituitae sanieque mouet. quod simile generationi ambrium euenire intelligendum est, quoad magnum conferre cum paruo licet. Cum enim ex terra uapor exhalat, efferturque in sublime a calore, ubi supernum aerem suberie frigidum, consistit: denuo in aquam propter refrigerationem, atque in terram descendit. Sed de his, cum de morborum causis agitur, differere congruum est: uidelicet quoad tractare de his naturalibus scientiae interest. Somnus etiam a cerebro proficiscitur ijs, quae eam obtinent partem animalibus. quae autem carent ijs, proportionale suppetit. cum enim sanguinis alentis effluentia refrigeretur a cerebro, aut etiam ob alias causas similes, caput aggrauatur. & quidem somno sopiti, ea corporis parte solent tentari: atque efficitur, ut calor ad ima cum sanguine subterfugiat, collectaque copia caloris in loco inferiori somnum facit, & facultatem engendi corporis aufert ab ijs animalibus, quae erecta incedere natura uoluit. ceteris caput erigi prohibet. quibus de rebus seorsum docuimus, cum de sensu & somno ageremus. Cerebrum autem esse commune a quae & terrae constat, ex eo quod et accidit. Cum enim coquitur, indurescit atque siccescit, ut humore exacto a calore, terrena portio relinquatur: quemadmodum in leguminum reliquorumque fructuum decoctione. quod enim ex terra magna ex parte constant, hinc exacto humore, quem exiguum sibi admissum continent, dura terrenaque admodum ea quoque relinquuntur. Homo inter omnia animalia plurimum cerebri habet, scilicet proportionem sui corporis. & inter homines, mares plus quam foeminae. cordis enim pulmonisque loco cum calidissimum & sanguine repletissimum homo habet, unde animalium homo unus erectus est. caloris enim natura inualefcens, incrementum de medio agit pro suo imperu. itaque contra multum caliditatis, multum humiditatis, frigiditatisque opponitur. quae quidem copia fit, ut capitis os, quod caluariam nonnulli appellant, sero admodum induretur, cum diu calor euaporetur, quod nulli ex ceteris animalibus sanguine praeditis euenit. iuncturas etiam plurimas in capite homo habet, & mas plures quam foemina, eadem de causa, ut locus spirantior sit, & amplius, in quo plus cerebri habetur. nam si cerebrum uel humer, uel siccet supra modum, suo functioni officio non potest: sed aut non refrigerabit, aut coagulabit. itaque morbos, deliria, mortes afferret. calor enim cordis atque principium consentientissimum est, sen sumque celerrime facit, cum sanguis cerebri ullo pacto mutatur atque afficitur. sed de cognatis animalium humoribus omnibus dictum ferre est. Postgeniti excrementa sunt cibi, id est, uellicae sedimen, atque alui. praeterea genitura, & lac, scilicet in ijs quorum natura haec obtinet. uerum cibi excrementa quibusnam animalibus iuncta sint, & quas ob causas, aptius in consideranda differenda quae alimentum ratione explicetur. de semine autem genitali, & lacte, tractandum est, cum de generatione. alterum enim eorum principium generationis est, alterum generationis gratia habetur.

Somnus a cerebro

Postgeniti, scilicet
et humores.

De carne, seu ijs quæ uice carnis habeantur.

Caput VIII



Vnc de cæteris similaribus partibus docendum est, & primum de carne, in ijs quæ obtinent carnem. in cæteris autem de eo, quod uice carnis proportionem respondeat. hoc enim principium & corpus per se animalium est, quod ratione etiam patet, animal enim eo definimus quod sentium obtinet, primumque eum, qui primus est. Tactum autem primum esse certum est, tactus uero sensorium pars eiusmodi est aut prima, ut pupilla uisus: aut coniuncta, per quam agitur, perinde quasi pupillæ omne diaphanes, hoc est translucidum coniungas. Cæteris igitur sensibus nec tribui hoc poterat, neque operæ precium erat effici à natura. At uero tactui dari necesse fuit, sola enim, aut maxime omnium sensoriorum sedes tangendi corpulenta est. Sensui autem patet cætera omnia eius unius gratia haberi: ossa dico, nervos, cutem, uenas, pilos etiam, & unguium genus, & quicquid eiusmodi iunctum est. natura enim ossium adhibita est, ut sua duritie rem mollem seruaret in ijs, quæ ossa habent. eademque de causa proportionale ossium habetur in ijs, quæ ossibus carent: ut in genere piscium alijs spina, alijs cartilago iuncta est. habent hoc præsidium alia intus, alia foris: ut in genere sanguinis experte, crustata omnia extra sic munita seruantur, uelut cancri, genusque omne locustarum, atque etiam testatorum, ut quæ ostrea appellatur: his enim omnibus caro intus, terrenum autem illud, quod contineat & cõseruet, foris est. nam præter ipsum continendi officium, quoniam eorum natura parum caloris obtinet, cum sanguine careant, ideoque testis ueluti furnulus quidam amplectens conseruat intestinum calorem, & tuetur. Quinetiam testudo & lutariæ genus simili modo se habere uidetur, quamquam diuersum genus ab illis hoc est. Ar uero animalia insecta & mollia contrariam hæc, & modo inter se opposito constant. nihil enim ossis, nihil terreni habere discretum uidetur, quod dignum esset: sed mollia ferè tota, carnosa, & tactulcedentia sunt, ne tamen corpus eorum facile pereat, modo illorum quæ carne lasciuiunt, naturam inter carnem & neruum obtinent. mollis enim, ut caro est: sed intendi potest ut neruus. fillicilis autem caro eorum non in directum, sed in anfractum, ita enim ad uires commodior esse potest. habent etiam quod piscium spinis proportionetur: ut septiæ quod sepium uocant. lolligines quod gladiolum. polypini huiusmodi habent, quod eorum alueus, quem caput appellant, breuior est, illorum procerior, ideoque ut directus inflexusque maneret, natura his adminiculis faciendum censuit, quemadmodum in genere sanguineo, alijs os dedit, alijs spinam, insecta contrariam quam hæc, & sanguine prædita constant, ut modo diximus. quippe quæ nihil habeant duri aut mollis discretum: sed dura toto corpore sint duritie tali, ut osse carnosiora, carne ossaciore terracioraque consistent, ne facile corpus eorum diuidi possit.

De uenis, ossibus, & cartilagine.

Caput IX



Imilis natura est ossibus, & uenis. utraque enim ex uno orsa continua est, & neque os ullum seorsum per se habetur, sed aut pars continui est, aut tangit, atque annectitur, ut natura & tanquam uno, cõtinuoque, & tanquam duobus distinctisque ad flexum uratur. neque uena ulla seorsum per se est, sed omnes pars sunt unius. nam si quod os separatū esset, accideret, ut nec officio fungi posset, cuius gratia natura ossium habetur. quippe quod nec flectendi, neque dirigendi causam ullam præberet, cum non continuum esset, sed interceptum: & ledere proculdubio posset, perinde quasi uel spina, uel spicula carni infixum. uena etiam si qua separata, nec suæ origini continua tenderet, suum sanguinem seruare non posset. Calor enim profluens ab origine facit,

cit, ne sanguis gelet. putrescere etiam sanguis uidetur, qui à suo fonte remotus est. Principium uenarū cor est. ossium, quod spina dorsi uocatur, uidelicet in omnibus ijs, quæ ossa habent. hinc enim cætera ossa oriūtur, & continuantur. spina est enim, quod longitudinem ac rectitudinem contineat animalium. Sed cum corpus inflecti per animalis motum necesse sit, ita constat, ut & una sit propter continuitatem, & multipartita propter uerbrarum distinctionem. hinc semorum brachiorumq; ossa dependent continua, eodemq; arcu adnectuntur, quæ flectendum est. neruis deligantur, extremaq; sibi coherent. alterum cauum, alterum rotundum, aut utrunque cauum, medio talo, quasi clauo complexo, ut flecti extendiq; possint. aliter enim aut nullo pacto, aut non bene motus eiusmodi agi posset. non nulla extremis similibus coniunguntur neruis deligata. Cartilaginosa etiam partes interuntur flexuris, ueluti lectulernium, ne attritu mutuo lædantur. caro circa ossa consistit utinulis modo fibrarum tenuibus adherens, cuius causa ossium genus habetur, ut enim qui ex limo aut alia massa humida animal effingunt, firmo aliquo subdito corpore obducunt, atque affirmant: sic natura ex carnibus animal condidit, carnis igitur partibus, scilicet carnis, ossa omnibus subiacent, aut flectendi gratia, si mouentur: aut conseruandi causa, si immobilia sunt: ut costæ, quæ pectus salutis uiscerum gratia claudunt. Venter omnium ossibus uacat, ne tumori impedito sint, qui per cibum ingestum exurgat necesse est, atque etiam ne in foeminis incrementum partium obstant. Sed enim quæ animal uel intra se, uel foris pariunt, hæc similes robustasq; ossium obtinent uires. multo enim maiora hæc sunt ijs, quæ non pariunt animal: uidelicet proportionem solitæ magnitudinis. nam non usquam complura ex hoc animalium genere crescunt mirū in modum, ut in Africa, locisq; alijs calidis & siccis. magnis autē adminiculo opus est maiori, ualidiori, & firmitiori. atq; inter magna ijs potissimum talis opus est adiuuēto, quæ uiolentiora sunt. quam ob rem mares ossibus durioribus constant, quàm foeminae. & quæ carniuora sunt, quàm quæ alio cibo uescuntur. ijs enim uictus per dimicationem acquiritur. uelut leonis ossa adeo dura sunt, ut ex ijs percussis, ignis quasi ex silice excutiat. delphinus etiam non spinas, sed ossa habet. utiui parum enim est. Sanguinis autem non utiui parus natura aliquantum degenerat, ut uolucris. quamuis enim habeat ossa, tamen imbecilliora. Inter pisces, spinā, qui oua pariunt, habent. Serpentibus etiam natura ossium spinacea est, præterquam magnis. robur enim eorum ualidiora extigit firmamenta, eadem qua & utiui parus ratione. At cartilaginea nomine spinam ex cartilagine habent. motum enim eorū esse molliorem necesse est, itaq; sulcimetige nus non rigidum, sed mollius esse oportuit. Adde quod terrenam omnem materiam ad eorum cutem conficiendam natura absumpserit. pluribus autem locis simul tantundem exuperantiæ dispensare natura non potest. quoniam etiam in utiui parus genere ossa cartilaginosa complura habentur, scilicet in ijs quibus expedit molle mucosumq; esse, quod solidū habeatur ratione carnis obductæ: ut auribus, ac naribus euenisse apertum est. prominentiora enim si rigida sunt, frangi celeriter possunt. Natura uero eadem ossis, & cartilaginis est. quanquam plurius minorisq; ratione interest. quapropter neutrum præcūm recrescere potest. Vacant medulla cartilaginea terrestrium animalium discretum. quod enim in os discretum continetur, id mistum per totum facit, ut cartilago res mollis mucosaq; constituitur. At in cartilagineo genere spina dorsi quamuis cartilaginosa, medullā habet. uicem enim ossis hæc pars tenet in eo genere. Proximas ossibus esse partes ostēdit tactus etiam illas, ungues, ungulas tum solidas, tum bifidas, cornua, rostra auium, quæ omnia prædij gratia adiuncta sunt animalibus. Quæ enim tota ex ijs constant, nominis consortiū tantūmodo habent cum suis partibus, uerbi gratia, ungula tota, & cornu

Aliquid sic reddunt: Quæ enim tota ex ijs consistunt, & nominis consortiū habet cum suis &c. item, &c. &c. data sunt.

totum, ad salutem animalis excogitatum est. Dentes etiam in hoc eodem genere collocandi sunt. qui alijs rem unam tantum expediūt, id est cibi confectionem, alijs non solum ad hoc usui sunt, sed etiam ad pugnandum, ut ijs omnibus, quibus aut ferrati, aut exerti sunt dentes. Terrenam & ualidam esse naturam eorum, quæ modo enumerat, necesse est. uis enim armorum ea est, quam ob rem omnia eiusmodi adminicula quadrupedibus uiuiparis potius adiūcta sunt, quod terraciōra, quàm genus humanū, ea omnia constāt. Sed de ijs atque similibus, cutem dico, uelicam, membranam, pilos, pennas, & quæ ijs proportionētur, & si qua huiusce modi alia sunt, postea unā cum dissimilibus paribus considerandum est, scilicet quænam eorum causa sit, & cuius gratia data sint animalibus. ex officijs enim ea quoque pariter atque illa dignosci necesse est. sed quod partes eorum idem cum totis nomen fortitur, propterea inter similes in hoc loco enumeratae sunt. principium autem & origo eorum omnium os est, & caro. rationem etiam geniuræ & lactis prætersimimus, cum de humidis ac similibus ageremus. Sunt enim hæc loco de generatione coniunctiora, cum alterum eorum initium sit animalium generandorum; alterum alimentum, ubi in lucem prodierint.

De duabus partibus in quibusq; animalibus necessarijs, quæ uiuunt, quæ cibum capiūt, & quæ excrementa emittant, deq; sensu ui, & eorum loco in corpore. Caput X.



Vnc quasi à primis iterum orsi differamus. In omnibus uita præditis & perfectis, partes maxime necessariae duæ sunt: altera qua cibū capiant, altera qua excrementum emittant. non enim fieri potest, ut sine cibo uel feruentur, uel augeantur. Stirpium itaque genus (nam id quoque uiuere tatemur) locum superuacui excrementi nullum habet, cibum enim concotum ex terra haurit: sed uice excrementi semina & fructus effundit. tertia pars in omnibus est media inier eas, quas modo dixi, in qua uitæ principium continetur. Sed stirpium natura, quoniam stabilis est, non ex multis ac uarijs partibus dissimilibus constat: quippe cum ad paucas actiones paucorum instrumentorum usus requiratur. quam ob rem de stirpium, siue plantarum forma seorsum agendū est. Quæ autem unā cum uita sensu etiam prædita sunt, hæc speciem multiformiorem numerosioremq; uarietatem recipiūt. atque inter ea alijs alia magis, & eo amplius, quod nō solum uiuendi, sed etiam bene uiuendi rationem natura eorum obtinuit. quale hominum genus est: quippe quod aut unum ex omnibus animalibus nobis cognitjs diuinitatis particeps sit, aut omnium maxime. itaq; tum ob eam rem, tum etiam quod exteriorum partium eius forma notissima est, primum de homine differendum censemus. iam enim partes etiam naturales hominis unius secundā naturam dispositæ sunt: quandoquidem partem superiorem ad uniuersi supremum erectam obtinet. Solus enim animalium homo erectus incedit. Caput hominis macilentum, carneq; propè omni exutum esse necessarium, ex ijs quæ de cerebro diximus, euenit. nec audiendū sunt, qui si carnosum esset, uiuacius hominum genus futurum censeant. sed ut melius sentiret, carnem ademptam existiment. uim enim sentiēdi sitam in cerebro: sensum autem per partes nimium carnosas nequaquam admitti posse arbitrantur. neutra enim eorum ratio uera est. Sed si cerebrum à carnis copia circūdaretur, contrā efficere, quàm institutū exigeret, cuius gratia adiunctum est animalibus. non enim refrigerare posset, cum ualde ipsūm teperet. Nec sensus ullius causam cerebrum obtinet. quod quidem expers omnino sensus non aliter, quàm quoduis excrementū est. Verū cum intelligere causam, quam ob rem sensus nonnulli in capite habentur, nequeant, quod eam partem cæteris esse peculiariorē animaduertent, ideo sensum cum cerebro coniungendū rationē naturæ.

Sed

Sed enim principium sensuum esse cordis locum definitum iam est, cum de sensu ageremus. & quam ob causam duo, id est tangendi & gustandi sensus, ex corde aperte dependent, unus ex reliquis tribus, id est olfaciendi medium tenet, duo, id est audiendi & uidendi maxime in capite positi sunt, propter sensoriorum naturam: uisusque omnibus in capite est, nam auditus, olfactusque piscium, & reliquorum generis eiusdem, declarant quod dicimus, audiunt enim atque olfaciunt, cum nullum sensorium eorum sensuum in capite habeant manifestum. Visum autem omnibus quibus est datus, apud cerebrum esse optima ratio est, cerebrum enim humidum ac frigidum est, uisus aquae naturam obtinet. haec enim omnium perlucidorum facillime conseruari potest. Sensus etiam exquisitiores per partes quae sanguinem habeant synceriorē absolui necesse est. Sanguinis enim calidioris agitatio officium sentiendi intercipit, atque refringit. his de causis sedes eorum sensuum mandatae sunt capiti, nec uero pars prior tantum capitis carne uacat, sed etiam posterior, quod omnibus capite praeditis, partem hanc erectam maxime constare oportet. nihil enim erigi potest pressum onere. Id autem accideret animali, si caput carne obiectum haberet, quo etiam patet non ideo carnem deesse capiti, ut cerebrum sentiat, pars enim posterior capitis cerebro caret, & tamen carnis experts nihilominus est. Auditum etiam nonnulla animalia situm in capite habent debita ratione, quod enim inane uocatur, plenum aeris est, sensorium autem audiendi aeris esse fatemur. ut igitur ab oculis meatus ad uenas circa cerebrum sparsas tendunt, sic ab auribus meatus in occiput penetrat. uis autem sentiendi nec ulli ex angui data est parti, neque sanguinis propria est, sed cuidam ex his, quae sanguine proueniunt, delegata est. quod circa pars nulla ex anguis eorum quae sanguinem habent, sentire potest. nec ipse sanguis sensu praeditus est. quippe qui nulla pars sit animalium. Cerebrum uero parte priori capitis continent omnia, quibus hoc datum est, quoniam id, quo sentiunt, in parte priori corporis situm est. sensus enim prouenit à corde, quod parte priori commissum est. Sentire etiam partes tantummodo possunt, quae sanguinem obtinent. occiput autem uenis uacuum est, sedes autem sensoriae probe ad hunc modum à natura dispositae sunt. Aures orbem capitis aequis portionibus secant, tenentque medium. auditur enim non modo per directum, uerum etiam undique. Visus parti priori mandatus est. cernitur enim per directum. Motus etiam ante fit. prospiciendum autem est eodem, quomodo motus agitur. Nares inter oculos ratione optima collocatae sunt. Gemina enim sedes quaeque sensoria est propter duplicem corporis partem, scilicet dextram & sinistram, sed hoc in tactu incertum est, propterea quod primum sensorium non caro, non pars eiusmodi aliqua est, sed aliquid intimum. Lingua etsi obscurius, quam oculi, tamen certius, quam tactus geminum gustandi uestigium ostendit. est enim hic etiam sensus quasi tactus quidam: arramen res uel in eo satis constat. fissura enim linguam distinguat perspicuum est. At uero in ceteris sentiendi partibus sensum bipartitum esse latius patet. aures enim geminae, & oculi gemini sunt. Vis etiam narium bipartita est, quae si aliter sita distractaque esset, ut aures, suo fungi officio non posset, nec pars in qua posita est ex instituto administraret. efficitur enim sensus olfaciendi per spirationem, in ijs quae obtinent nares. pars autem spirandi medium tenet, & anteposita est. quapropter nares in medio trium sensuum natura constituit, quasi per lineam fabrilem directas, ad respirationis agitationem. ceteris etiam animalibus, haec eadem sensuum domicilia bene pro sua cuiusque natura condita habentur.

De situ auricularum in quadrupedibus.

Caput XI



Vadripedes enim auriculas habent suspensas, & supra oculos sitas habere videntur. ueruntamen nō ita est, sed conspectum ementuntur, quoniam bestia non erecto, sed prono sunt corpore. Cum igitur plurimā ita incedāt, iuuat, ut & suspensiores sint auriculæ, & crebro moueantur, sic enim melius undiq; strepitus circumactiæ excipient.

De meatibus auditorijs auium.

Caput XII



Ves meatus tantum auditorios habent. quod enim cutis earum durior sit, nec pilis sed pennis integantur, ideo materia carent ex qua auriculæ creentur, quadrupedes etiam ouiparæ & corticatæ eodem modo se habent. eadem enim ratio uel illis conueniet. quinetiam uitulus marinus inter ea quæ animal pariunt, nō auriculas sed cauernas tantum habet ad audiendum, utpote qui manca & læsa sit quadrupes.

Genus hominum, auium, & quadrupedum cōteritos palpebra oculos habere, quō uē modo ipsorum quodq; conuiuat.

Caput XIII



Enus hominum, auium, quadrupedum, tam uiuiparum quā uiulparum oculos uisus custodiendi gratia integunt: sed uarie. quæ enim animal pariunt, geminam habent palpebram, & conuiuere utraque solent. aues iam leuiiores quā grauiiores, & quadrupedes ouiparæ palpebra inferiori conuiuent. niſtantur aues ab angulis membrana obeunte. cuius rei causa est, ut operimētum præsidio sit oculis eorum humidis, qui ideo humidi sunt, ut cernere acutius possint. nam si duri essent, tutius quidem constarent contra ea, quæ extrinsecus occurrerent, atque inciderent, sed cernere acute non possent. itaque eius rei causa cutis prætenuis pupillæ obtrinditur. At uero salutis gratia palpebræ operiūt. Ideoq; omnia conuiuent, & omnium maxime homo. omnia inquam, ut quæ incidunt, prohibere palpebris possint. idq; nō consulo, sed naturæ instinctu agitur. homo uero frequenſius, quoniam cutem tenuissimam habet. palpebra autem cute constat. unde fit, ne aut palpebra, aut præputium uulne re diductum coalescere possit. sunt enim cutes sine carne. Quæ autem inter aues palpebra inferiori conuiuent, & quadrupedes ouiparæ præ durtia cutis caput ambientis, ita conuiuent. uolucris enim grauioribus quod nequeant uoluiare, incrementum pennarum ad cutis crassamentum conuertitur: eademq; palpebra inferiori conuiuent. Columbæ autem & similia utraque. Quadrupedes ouiparæ cortice integuntur, qui pilo durior est. itaque cutis quoque eorum cæteris cutibus durior est. Cutis igitur capitis eorum prædura est, ideoq; palpebram inde habere nequeunt. inferior carnosa est, ut satis tenuitatis tensionisq; habeat. Niſtantur uolucres grauiiores nō palpebra, sed membrana. quod palpebræ motus lentior est, cum celeritate sit opus, quam mēbrana præstare potest. nec nisi ab angulo naribus proximō niſclātur, quod eorum naturam ex uno principio prouenire melius sit. Principium autem in ijs est pars naribus adhaerens. pars etiam prior principium potius quā latius est. at uero quadrupedes quæ oua pariunt, non eodem niſtantur modo: quoniam non lubricum exquisitumq; uisum eas habere necesse est, cum terrestres sint. uolucris certe necessarium est. ijs enim usus cernēdi ex longinquo est. unde fit ut quæ unguibus sunt adunctis, clarissime cernant, cibus enim de sublimi conspiciendus ijs est. & quidem uolare in excelsum omnium maxime auium genus id ob eam rem assolet. Terrestres autem parumq; uolantes aues, ut gallinæ

& lū

& similes, non acie oculorum ualent, nulla enim uictus necessitate coguntur. Pisces, insecta, & crustata, quamuis diuersos habeant oculos, tamen nullum ex ijs palpebram habet, quæ enim crusta integuntur, usu careant palpebræ necesse est, cum nisi celeri cutis officio præstari non possit, sed tamen uice eius tutelæ, duritiæ oculorum hæc omnia muniuntur, quasi per palpebram obductam quandam translucentam cernant, sed cum ob eam duritiæ hebetius contueri necesse sit, moueri oculos insectorum natura uoluit, atque etiam magis crustatorum, ut nonnullorum quadrupedum auriculas, scilicet ea causa, ut darius cernerent, cum se ad lucem conuerterent, atque exciperent splendorem. Piscium oculi lubrici sunt, usus enim cernendi ex longinquo necessarius ijs est, quæ longius moueantur, terrestribus itaque aer transpici facile potest, at piscibus, quoniam aqua ut ad cernendum acutius aduerfatur, sic ad interpellandum uisum non multa offensaacula affert modo aeris, idcirco nec palpebram habent, nihil enim frustra natura agit, & oculis lubricis sunt propter circumfusi humoris crassamentum.

Quæ animalia cilium habeant, quæ uero eodem careant; deq; cauda, & inibi quorundam animalium, & hominis capillo.

Caput XLIII



Cilium habent palpebris adiunctum omnia, quæ obtinent pilos, aues, & quæ cortice integuntur, carent: ut quæ pilos non habeant, de struthione Africæ, causam quam ob rem cilium habeat, postea reddemus. & inter ea quæ pilos habent, homo unus cilium in utraque palpebra obtinet, quadrupedum enim generi pili non parte supina, sed prona potius habentur, homo contra, parte magis supina quam prona, pili enim operimenti gratia adiuncti sunt animalibus, itaque quadrupedibus prona potius egent regimento, priora autem quanquam nobiliora sunt, tamen per corporis totius flexum fouentur ac tepent. At homini, quoniam prior pars compar posteriori est, propter corporis erectionem, idcirco natura parti nobiliori adiumentum censuit adhibendum, semper enim natura rei melioris auctor est, quoad eius fieri potest, quam ob rem quadrupes nulla est, quæ pilos uel in palpebra inferiori habeat, quam nonnullæ habent pilos quosdam sub ea nascentes, uel in alis, uel in pube, ut homo. Sed uice eorum alijs prona totius corporis hirsuta habentur, ut canibus, alijs crista adiuncta est, ut equis, cæterisq; generis eiusdem, alijs iuba, ut leoni mar, Quinetiam caudas prolixiores pilis natura ornauit, alias longis, quibus tenor breuis, ut equis, alias breuibus, quibus tenor longus, ut bubus, atque etiam pro reliqui corporis natura, ubique enim natura quod aliunde dempserit, reddere ad partem aliam solet. Iam quibus corpus admodum pilosum condiderat, caudam ijs dimisnit: quod in urfis perspicuum est. Homo animalium maxime omnium piloso capite est, cuius rei causa, tum ad necessitatem, tum ad præsidij rationem referenda est, necessarium enim propter cerebri humiditatem & commissuras caluæ, nam ubi plurimum humoris calorisq; est, ibidem ortum pilorum esse copiosum necesse est. Adiumentum autem ratio, ut frequentia pili caput operiens defendat à nimio frigore & calore. Cum enim cerebrum hominis proportionem maximum & humidissimum sit, maximam etiam tutelam desiderat, res namq; humidissima quæq; & referuescere & refrigerare maxime idonea est, quæ autem contra se habet, hæc minus affici potest, sed nos ut huc digrederemur, fecit rei cognatio, cum ratione ciliorum redderemus, itaque de reliquis mentionem suo loco & tempore faciemus.

Q 2

Quas ob causas supercilia, & cilia in animalibus natura constituit. Caput XV



Vpercilia uero & cilia adiumenti gratia habentur. supercilia enim ut delabentes humores arceant, uelut imbricamentum, siue grunda humoribus, qui capite emanent paratum. cilia ut contra incidentia in oculos, quasi uallum quoddam protineant. supercilia in compage ossium posita sunt, quomobrem compluribus senescentibus adeo crescunt, ut tendendum sit. Cilia uenularum clausulis summis innituntur. nam ubi cutis finitur, ibidem uenulae etiam desinunt. itaque propter uaporem qui inde crassiusculus prodeat, pilos ijs locis nasci necesse est, nisi quid naturalis opificij ad alium usum impediat.

10

Quomodo in hominibus, ceterisque animalibus nary & labra sint collocata: deq; laborum & narium officio.

Caput XVI



Enforium uero olfaciendi non longe quodammodo euariat cetera quadrupedibus uiuiparis. quibus enim maxillae oblongae exeunt in acutum, ijs nares in rictu appellato continentur modo quo fieri potest. ceteris explanatus ad maxillas constant. At elephanti peculiarem hanc partem praeter ceteris fortitus est animalibus, nam & magnitudine & uiribus habet peculiarem. naris est enim, qua cibum tam siccum, quam humidum ille capiat, orisq; perinde ac manu admoveat. arbores etiam eadem complectendo euellit. denique ea non alio utitur modo, nisi ut manu. Est enim hoc animal sua natura simul terrestre, & palustre. itaq; cum cibum petere ex humore deberet, & tamen spirare necesse haberet, ut terrestre, & compos sanguinis, nec posset praeter nimiam magnitudinem celeriter discedere ex humore ad aerem, modo nonnullorum quae & animal pariunt, & sanguinem habent & spirant, idcirco ut pariter humore atque terra uti posset, necesse fuit. Quale igitur urinatorum nonnulli instrumenti sibi accipiunt, quo quandiu in profundo manent, aerem extrinsecus trahant, talem natura elephanti dedit narem illam praelongam. quam ob rem si quando iter per aquam faciunt, nare emersa respirant. nam, ut modo dixi, promiscuis pro nare elephanibus est. & cum fieri non possit, ut naris ad eiusmodi usum accommodetur, nisi mollis sit, aptaq; ad flectendum. impedimento enim praeter suam longitudinem esset, ad cibum capiendum. quomodo autem de cornibus bouum illorum, qui recessu pascerent solent sua natura. nam illos quod progredi demisso in terram capite nequeant, recedendo in auersum pasci solitos aiunt. cum itaque naris eiusmodi adiuncta sit natura, quae membrum eidem abuti ad plura officia solet, eandem in usum trahit pedum priorum. hos enim uice manuum habet genus quadrupedum digitatum, non solum ponderis causa sustinendi. Elephantes autem non bisulcos, non solidos pedes habent, sed digitatos. sed quoniam corporis magnitudo uasta, pondusq; ingens est, ideo sustinendi tantummodo gratia pedes habent priores, nec ad ullum alium usum utiles propter tarditatem flectendi, atque ineptiam. Narem igitur elephantis habet ut spiret, quomodo & cetera animalia quibus pulmo, eandem praelongam, atque in anfractu flexibilem, propter moram in humore diuturnam, & retardum inde discessum. Cumq; usus pedum priorum defuerit, ea, ut dictum est, parte abutitur natura ad supplendum ministerium, quod pedes praestarent. At aues & serpentes, & quaecunque ex quadrupedibus sanguinis compotes ouiparae sunt, foramina quidem narium ante os habent, sed non ita explanata, ut nares appellari possint, nisi spirandi officio. Iam autem quis nasum aut nares habere dicet? Quod propterea ita accidit, quia pro maxillis habet quod rostrum uocatur. huius autem

rei

rei causa est natura auium, quæ ad hunc modum constat, & bipes enim & uolucris est, itaque leue pondus tum capitis, tum etiam ceruicæ sustinere necesse est, ut petus etiam arcum habere debuit. Rostrum igitur osseum habent, ut commode & cibum capiant, & ad pugnam armentur. Arcum hoc est propter capitis exiguitatem, cumque meatus olfaciendi suo rostro contineant, nares habere non possunt. De cæteris animalibus quæ non spirant, dictum antea est, quam ob causam naribus careant. & alia branchijs, alia fistula, alia præcinctu, ut insecta, odores sentiunt, & omnia nativo spiritu sui corporis quasi mouentur, qui spiritus in omnibus ex natura institutus est, non aduentitius de foris accedit. Naribus laborum natura subiacet ijs, quæ simul & dentes habent & sanguinem. Auius enim, ut dictum est, cibi armamentis gratia rostrum osseum habetur. Coactum enim pro dentibus, & in idem perinde quasi detractis hominis labris superiores inferioresque dentes seorsum confundens, longitudinem utriusque angustam produxeris, tamen istud rostrum auium fuerit, sed cæteris animalibus laborum natura ad salutem, tutelamque dentium adiuncta est: quam ob rem ut quæque exquisitè beneque dentibus prædita sunt, sic eam quoque obtinent partem, homini autem mollia, carnosa, & quæ separari possent, labra adiuncta sunt, tum dentium tuendorum gratia ut cæteris, tum etiam potiori causa, ut bene esset, nam ad usum sermonis ea quoque proficiunt. Etenim ut linguam non similem atque alijs animalibus natura homini dedit, sed idcirco eam, quæ ad duplicem actionem uteretur (quod eam in multis facere diximus, nam & ad percipiendos sapes, & ad formandū sermonem) sic labra tam sermonis, quam tutelæ dentium gratia adhibuit. Sermo enim qui uoce promatur, ex literis constat, quod si lingua talis, & labra humida atque agilia non essent, maxima literarum pars exprimi non posset, quippe cum literæ partim lingua producuntur, partim labris comprimantur. Sed quas & quot numero differentias hæc habeant, ex eruditæ metricæ ratione accipiendum est. has autem partes ilico necesse fuit accedere idoneas, & natura eiusmodi prædita ad usum iam dictum. itaque carne instituta sunt, etiam mollissima, qualis caro hominis est, scilicet quod maxime omnium animalium ualeat sensu tactus.

De lingua, eiusque situ & uarietate in quibusque animalibus.

Caput XVII



Lingua in ore palato subiacet, sed terrestribus ferè omnibus modo similis, cæteris dissimilis, tum eorundem ipsorum, tum terrestrium comparatione. Homo igitur linguam absolutam, mollissimam & latam præcipue habet, ut commoda ad utrumque officium sit: hoc est, & ad sapes percipiendos, & ad literas exprimendas. est enim homo omnium maxime animalium sensu facilis, & lingua quæ mollis est, uim tangendi præcipue obtinet. gustus autem tactus quidam est, ad literarum etiam explanationem, & ad sermonis expressionem, lingua mollis, lata, & absoluta accommodatior est, quippe quæ contrahere, producere, dilatare, denique uarie afformare maxime possit. patet hoc in ijs, quibus non satis absoluta est, blæsi enim, balbi, & torri sunt, quod uisum literarum defectus est, discrimen in latitudine & angustia est, quippe cum amplius angustam contineat, angusta amplam non capit, paruum enim in magno continetur, magnum in paruo haberi non potest, quam ob rem aues quæ literas proferre maxime possunt, lingua sunt latiore, quam cæteræ. Quadrupedes autem quæ & sanguinem habent, & animal pariunt, uocem parum explanare possunt: ut quæ linguam duram, crassam, & minime absolutam habeant, at pleræque auium uocem copiose emittunt, & quamuis latiore habeant, quæ unguibus sunt aduncis, tamen

Q 3

minores uocaliores sunt. ac omnes lingua utuntur etiam ad sui sensus mutam interpretationem. sed alie alijs amplius, ut in nonnullis uel usus docendi mutuis esse uideatur. sed de ijs diximus satis, cum historias animalium scriberemus. Terrestrium autem ouiparorum sanguineorum pars maior linguam habet inutilem ad uocis officium, & adhaerentem & duram. quanquam ad saporum gustatum serpentes & lacerti longam habent, & bifidam. atque ita longam serpentes, ut ex paruo longe protrahi possit. bifida & parte extrema capillamenti tenuitate est, propter suae naturae cupidiam. duplex enim uoluptas ijs capitur, quasi duplicem sensum gustandi habeant. Omnia tam sanguinea quam exanguia habent eam partem, quae sapor sentire potest. nam & quae multitudini uidentur carere ea parte, ut pisces nonnulli, ea quoque parciore quodam obtinent modo, & fere simili, ut fluuiatiles crocodili. Sed hoc latet in plurimis causa quadam iusta. locus enim oris omnium id genus spinosus est. & quoniam aquatile genus breui tempore sentit saporis, hinc fit, ut pro sui usus breuitate linguam parum discretam habeant. Rapim enim summaque celeritate cibus ad uentrem ingeritur, quod immorari saporibus perfruendis nequeant, humore interlabente. itaque nisi os inclinaueris, cerni pars haec discreta non poterit. horret hic locus spinis, quippe qui ex frequenti contactu constitutus sit branchiarum, quarum natura spinosa est. Crocodilis non nihil causae ad eius partis uitiationem affert etiam immobilitas maxillae inferioris. lingua enim inferiori annexitur maxilla, quam illi quasi contra habent superiorem. ceteris enim superior immobilis est. itaque ut ad superiorem non habent, quod cibi aditus tollitur, sic ad inferiorem carent: quod superior quasi translata in locum inferioris est. Accedit ad haec generis uita, quam more piscium agit, cum tamen ipse terrestris sit. itaque uel ob eam rem inexplanatam hanc partem habeat necesse est. Palatum piscium etiam complures carnosum habent, & quidem, inter fluuiatiles nonnulli admodum carnosum, & molle, ut cyprini nomine, adeo ut si parum diligenter aduertas, lingua id esse uideatur. Pisces igitur ob eam quam diximus causam, & si lingua non carent, tamen explanatam non habent. Sed cum cibi gratia sensus saporis adhibitus sit, eumque non quauis parte sua lingua obtineat, sed extrema potissimum, ideo piscibus particula haec tantummodo discreta habetur. cibum autem quanquam animalia omnia capiunt, ut quae uoluptate ex cibo sentiant (cupiditas enim rei suauis est) tamen membrum quod ad sentiendum accommodatum est, non omnibus simile datum est: sed alijs absolutum, alijs adhaerens, uidelicet ijs quibus uocis desuit usus, & alijs durum, alijs molle carnosumque. nam & crustatis, ut locustis marinis, & reliquis generis eiusdem tale quid in ore habetur: atque etiam mollibus, ut sepijs, ut polypis. Insectorum alia membrum hoc intus continent, ut formicae. quemadmodum multa etiam ex testatis. alia foris gerunt uelut aculeum fungosum & cauum, ut eo simul & gustare, & cibum trahere possint. patet hoc in muscarum genere, & apum, & omnium generis eiusdem, atque etiam in nonnullis testatis. purpuris enim tantam obtinet uim hoc membrum, ut testas cochyliorum transigere ualeat, uelut turbinum, quorum testa capiuntur. necnon asili, & tabani eodem spectant. quorum alteri lingua adacta cutem hominum secant, alteri tergora etiam bestiarum elacerant. his igitur animalibus lingua talis natura tributa est, quasi respondens & obuersari nari elephantorum. Naris enim illis adiumento est, & lingua his pro aculeo habetur. Ceteris animalibus omnibus lingua talis, qualem iam exposuimus data est.

De ordine & constitutione dentium, oris, & faciei, eorundemq; in omnibus animan-
tibus diuersitate.

Caput I



PROXIME ab ijs natura dentium est, & oris, quod serie den-
tium continetur, & constat. Sed cum dentium natura commu-
ni quidem officio ad cibum conficiendum adiuncta sit, tamen
generatim seorsum alijs roboris gratia, tum ad inuadendum,
tum etiam ad defendendum, alijs auxilij tantij causa data est.

partim enim ea utraque causa dentes obtinent, ut nec ab alijs
afficiantur, & ipsa afficiant alia, ut quæ ex feris natura carniuora
sunt; partim ea causa tantum, ne male ab alijs afficiantur, ut complura tum sylue-
stris generis, tum etiam urbani. nonnullis cibi conficiendi causa tantum adhibita est
dentium opera. homo uero ad usum communem probe factos obtinet dentes: ui-
delicet primores acutos ut secent, maxillares latos ut molant. discriminat eos utro-
que ij, qui canini appellantur, media inter eos natura conditi. nam & medium pars

tipiceps utriusque extremi est. Et canini ipsi partim acuti sunt, partim lati. quod idem
in cæteris quoque animalibus est, quibus non omnes acuti habentur. sed potissi-
mum locutionis gratia tales, totq; numero dentes homo fortitus est. ad literas enim
exprimendas plurimum cõferunt primi dentes. Nonnulla animalia, quod dictum
iam est, cibi tantum conficiendi gratia dentes obtinent. Quibus autem simul & au-
xilio sunt, & robori dentes, hæc aut exertos habent, ut fuis: aut acutos pectinatim
 sese stipantes, unde serratis ea dentibus esse diximus. Cum enim uires eorum acu-
mini dentiũ commissæ sint, recte qui utiles sint, ad ferocitatem pectinatim cõeunt,
ne occursum contrario atterantur & hebetescant. sed nulli simul & serrati, & exerti
sunt dentes: quoniam natura nihil frustra, nihil superuacanei facere solet. auxi-

lium alijs periclitum, alijs per morsum: nam sues fœminæ mordent, ut quæ careant
dente exerto. cæterum aliquid accepisse in uniuersum conuenit, quod utile sit, tum
ad hæc ipsa, tum etiam ad multa, quæ postea dicemus. partes enim quæ ad inuaden-
dum, aut ad defendendum spectant, quæq; à natura ijs tribuuntur, quæ aut sola,
aut præ cæteris uti possint. & quibus uis utendi præcipua, hæc præcipue armis do-
tata sunt, ut aculeo, calcar, cornu, dente, & si quid eiusmodi aliud sit. cumq; mares
robustiores, magisq; animosi sint, ideo aut solis ijs, aut melius ijs partes eiusmodi
datæ sunt. quas enim in fœminis quoque haberi necesse est, ut quæ cibo accommo-
dentur, eas habent quidem & fœminæ, sed minus quàm mares. quæ autè ad rem
nullam necessariam spectent, ijs carent. quapropter in ceruorum genere cum ma-

ribus cornua sint, fœminis defunt. Vaccarum etiã cornua & taurorum inter se di-
stant. quod idem in pecore etiam cernimus. calcar etiam cum mares habeant, fœ-
minæ magna ex parte non habent. pari modo de reliquis quoque eiusmodi parti-
bus intelligendum est. Pisces omnes serratis dentibus sunt, uno excepto, qui scarus
uocatur. complures etiam dentes in lingua habent, & in palato. cuius rei causa est,
quod cum meris in aqua degant, humorem cum cibo admittant, eumq; expuant
quamprimum necesse est. non enim in molendo com morari possunt, quando hu-
mor in uentre interruptum fit. idcirco omnes acuti, & frequentes undique sunt, ut
delicet ut præ multitudine in minuta secent, quæ attritu subigere nequeant. Ad

undè præterea sunt, quoniam robur ferè totum piscium in dentibus situm est. Natura etiam oris, tum eorum quæ modo dixi, officiorum causa, tum etiam ad spirandum adiuncta animalibus est, scilicet ijs quæ spirant, atq; extrinsecus refrigerantur. natura enim ipsa per se, ut diximus, partibus omnium communibus ad pleraque officia propria abutitur. proinde oris quoque officium omnibus commune cibus conficiendus est, robur nonnullorum peculiare est: sermo aliorum. spirandi etiam usus non communis omnibus est. At uero natura hæc omnia eodem coniecit, adhibita differentia eius partis pro actionis discrimine. sunt enim alia ore compressiori, alia ampliori. quibus enim cibi conficiendi, & spirandi, & loquendi gratia os datum est, ijs compressius est. quibus auxilij gratia, ijs si dentibus sunt serratis, res scissum. Cum enim tota eorum uis in mordendo sit, hiatum oris amplio rem esse necesse est. eo nanque pluribus, & plenius morsum insigunt, quo amplius rescissum os sit. Piscium etiam mordacibus & carniuoris tale os est. non carniuoris in partem se colligit. tale enim os utile ijs est, illud inutile. Auius os, quod rostrum uocatur. hoc enim pro labris & dentibus habent, sed uarie pro usu & auxilio. quæ enim ad uncis unguibus sunt, quoniam carne uiuunt, & nullo fructu uescuntur, rostrum omnia habent aduncum. Tale enim tum ad retinendū, tum uero ad uim inferendam commodius atque aptius est. uis autem in hoc, & in unguibus sita est. unde fit, ut ungues etiam habeant adunciores. Cæterarum auim rostrum utile ad uictum cuiusque est. uerbi gratia, roboris ei generis & coruini, robustum atque prædurum os est: minuti generis lautum ad terræ fructus colligendos, & ad bestiolas capiendas idoneum. Quæ autem herbis uiuunt, quæq; apud paludes uiuant, ut nantes, & palmipedes, partim alio quodammodo rostri commoditatem obtinent, partim latitudine rostri sibi sufficiunt. quippe quæ rostro eiusmodi insidere possint, quale inter quadrupedes etiam suis est. nam is quoque radicum appetens est. Quinetiam aues quæ lato sunt rostro, radicesq; elidunt, & reliquarum uictus similis, nonnullæ ferratum rostri extremum habent. ita enim herbarum caputis quo uiuunt facilius agitur. Sed cæteras capitis partes omnes ferè exposuimus. prosupum autem, id est facies, quod inter caput & collum hominis est, nomen à re ipsa accepisse uidetur. quod enim unus animalium homo erectus est, solus prospicit anteuersus, uocemq; anteuersus mittit.

De cornuum constitutione, & quæ animalia habeant cornus, quæ uero ijs careant.

Caput 11



De cornibus differendum est. hæc enim capiti inniuntur, quocunque in genere esse possunt. carent ijs omnia quæ non uiuipara sint. cornua uel alijs quibusdā inesse dicimus, sed per similitudinem & transpositionem, cum nullum ex ijs cornu officio fungatur. gerūt enim quæ animal pariunt cornua ad uim, aut inferendam, aut depellendam: quod nulli ex cæteris quæ cornua habere dicuntur contingit. nullum enim utitur cornibus, uel ad conuincendum, uel ad defendendum. quæ uirium sunt officia. Quæ igitur pedes multifidos habent, cornu omnia carent. cuius rei causa est, quod cornu auxilij gratia habetur, multifidis autem non desunt alia auxilia. dedit enim natura alijs ungues, alijs dentes pugnaces, alijs partem aliam, qua sese tueri atque defendere possent. At uero bisulcorum pars maior cornua gerit. & solipedum nonnulla ad uim inferendam: quædam etiam ad defendendum. quibus autem cornua natura non dedit, eorum salutis præsidij consuluit alijs, ut pernecitate corporis

poris equis opitulata est, magnitudine camelis. magnitudinis enim exuperantia
 sufficit ad necem arcendam, quod camelis contingit: atque etiam melius elephan-
 tis. Quædam etiam dente exerto armantur in genere bisulco, ut fues. Quibus au-
 tem cornua præ nimio excessu superuacua sunt, ipsi alterum auxilium natura ad-
 habuit, ut ceruis uelocitatem. grandis enim illa & multifida cornuum magnitudo
 potius obest quam prodest. bubalis etiam capreisq; interdum cornua inuicilia sunt.
 nam etsi contra nonnulla resistunt, & cornibus se defendunt, tamen feroces pu-
 gnacesq; belluas fugiunt. Bonasis (nam ipsi quoque pari adunditate cornua refles-
 xa inter se orbem colligunt) excrementi profusionem natura pro auxilio dedit.
 10 hoc enim, cum metuunt, se ruentur. hac eadem profusione alia quoque seruari
 certum est, plura autem auxilia simul, quorum singula satis essent, nulli natura tri-
 buit. cornigerorum pars maxima bisulca est. sed solipes etiam traditur in e gene-
 re, quem alinum Indicum uocant. maxima animalium pars, ut corpus dextro sinis-
 troq; quibus se mouent, distinguitur: sic etiam cornua bina eadem illa de causa ge-
 rit naturæ ingenio. Sed sunt etiam quæ cornu singulari armantur, ut oryx, & quem
 alinum Indicum appellari diximus. oryx bisulcum, alinus ille solipes est. gerunt sa-
 ne medio sui capitis cornu fixum ea quæ unum habent. sic enim maxime pars utraq;
 cornu obinebit, cum medium commune pariter utrique extremo sit. solipes pos-
 tius quam bisulcus esse unicornis recte uideri potest. ungula enim tam solida quam
 20 bisulca eandem naturam habet, quam cornu. itaque eisdem simul & ungulam sin-
 di, & cornu congruum est. filio etiam ungulæ, & cornu ex defectu naturæ eue-
 nit. Itaque cum exuperantiam ungulæ solipedum natura dedisset, recte dempsit
 superne, secitq; unicornis. Recte etiam capiti cornua mādauit. nec, ut Aesopi Mo-
 mus uitio dat, quod taurus non in armis cornua gerat, unde ferire uehementius
 possit, sed capite parte corporis imbecillima. non enim ingenio perspicaci ille Mo-
 mus hæc deprehendit. ut enim si in alia quauis parte cornua haberentur, frustra pon-
 deri essent, nulla in re utilia, multa etiam officia impedirent. sic armis quoque infixa
 se dem omnino ineptam tenerent. non solum enim unde ictus fiant uehementiores
 considerandum est, sed etiam unde remotiores. itaque cum careant manibus, & nec
 30 pedibus imis affixa gerere possint, neque genibus (flexus enim impediretur) capi-
 te gerant necesse est, quemadmodum à natura constitutum est. quineriam ad cæte-
 ras corporis motiones, ita maxime geri sine ullo impedimento possunt. Ceruis dun-
 taxat cornua tota solida, & decidua, tum utilitatis causa, ut onere leuentur, tum ex
 necessitate præ pondere. cæteris aliquatenus caua, & mucrone demum concreta
 sunt, quoniam ad ictus hoc sit commodius. sed ne pars caua debilis sit, quæ cuti an-
 nectitur, solidum quiddam ossibus exortum ingreditur eam, impletq; totam. Sic
 enim sita compactaq;, & ad uim inferendū commodissima, & ad reliquæ uitæ mu-
 nera inoffensissima habentur. Sed cuiusnam gratia natura cornuum sit, & quam
 ob causam alijs data, alijs negata sit, expositum est. Nunc quemadmodum natura
 40 se habente necessaria rebus subiectis necessario natura ratiocinaria alicuius gratia
 abutatur, differendū est. Primo igitur plus corpulenti terreniq; in animalibus gran-
 dioribus inest. cornigerum autem nullum admodū paruū esse nouimus. omni-
 um enim, quæ explorata habemus, minimum caprea est. natura uero contemplan-
 da respectu plurium est. aut enim omni ex parte, aut magna ex parte cōstat, quod
 secundū naturam sit. Os autem omne, & quicquid speciem gerit ossis, terrenum
 est. quam ob rem plurimum id esse propè dixerim in maximis, partis maioris con-
 templatione. Corporis igitur eiusmodi excrementi exuperantia in maioribus ha-
 bita animalibus, natura ad auxilium, & rem abutitur commodam. itaq; quantum
 excrementi eius ad locum superiorem efferatur, alijs in dentes, uel continuos uel

exertos distribuit, alijs in cornua. quam ob rem cornigerorum nullum utrinque dentatum est. superne enim primores dentes non habent. quippe cum natura hinc adimendo addiderit cornibus, & alimentum quod in eos dentes digeratur, in cornuum incrementū absumitur. cur ceruæ cornibus careant, cum dentes similiter habeant, atque mares, causa est, quod eadem sexus utriusque natura, & cornigera est, sed foeminis adempta sunt cornua, quoniam ne maribus quidem utilis sine sed uirium meliorum beneficio, mares minus offenduntur. Cæteris animalibus, quibus hæc materia non in cornua secedit, aut dentium ipsorum magnitudinem communi omnium incrementō natura auxit, aut dentes exertos ueluti cornua ē maxillis produxit. Sed de partibus capitū hæcenus.

19

De collo, gula, & arteria, & earum officio in corpore animalium. Caput III



Ollum capiti subiacet ijs, quæ id habent animalibus. nō enim omnia habent, sed ea tantum, quibus sunt partes illæ, quarum gratia collum conditū est, hoc est guttur, & quæ gula uocatur. Guttur spiritus causa datum est, hoc enim spiritum animalia trahunt, & reddunt, respirando & expirando, quam ob rem quæ carent pulmone, collo etiam carent, ut genus piscium. Gula est qua cibus & potus deuoratur. itaque ea quæ carent collo, gulam hæc manifestam non habent, nec gulam haberi cibi causa necesse est: nihil enim ad cibum parat. & quidem à situ oris continuò uenter esse potest, pulmo non potest. aliquem enim quasi tractum conuallis adesse communem oportet, quo spiritum ad fistulas per arterias digerat bipartitus, atque ita efficere spiritus reciprocationem maxime potest. Cum igitur instrumentum spirationi accommodatum, longitudinem habere necesse sit, gulam inter os & uentrem haberi necesse est. Constat gula ex neruo & carne. ex neruo, ut extendi possit, cum cibus ingeritur: ex carne, ut mollis sit & cedat, nec lædatur asperitate cibi descendentis. Guttur autem, quod & arteria uocatur, corpore constat cartilagineo. non solum enim spirandi causa est, sed etiam uocis. quod autem sonet, leue ac solidum esse oportet. Ante gulam arteria posita est, quanquam impedimento sit, cum cibus ingeritur. Nam si quid uel cibi, uel potus in arteriam dilabatur, strangulationes, tormina, & tussis grauissimæ incitantur. quam ob rem non audiendi sunt, qui hac potū meare dicant. Accidunt enim aperte quæ modo dixi, omnibus, quoties aliquid cibi dilapsum est. Profecto opinionem eorum qui potum hæc admitti existimant, irridentem esse plura ostendunt. meatus enim nullus de pulmone ad uentrem pertinet, sicut ex ore gulam tendere cernimus. quinetiam per uomitum, & nauseam, unde nam humor remeet, incertum non est. ad hæc humorem non continuò colligi in uesicam, sed prius in uentrem certum est. excrementa enim alui tingi uidentur fece uini atrī. uulnere etiam uentris sæpe hoc idem patefactum est. Sed enim stultas opiniones admodum scrutari stultum fortasse est. Arteria uero, quod exterior, ut diximus, posita est, à cibo infestatur. attamen natura ad hoc molita est minorem linguam, siue lingulam, quæ arteriam operiret. non omnia uluipara eam obtinent, sed ea tantum, quibus pulmo & cutis pīlo intertæ, non cortex, non penna operimento est. Corticatis enim pennatisq; guttur uice lingulæ operientis ipsum contrahitur & deducitur: quemadmodum illis operitur aliunde & aperitur, uidelicet spiritui trahendo reddendo uē aperitur, cibo ingerendo operitur, ne quid ilabatur. quod si quid erroris in eo motu committitur, uel decerrante cibo in alietram tramirem, uel respiratione præueniente, tussis, strangulationesq; excitantur ut dictum est. tam uero solerti ingenio morus, & lingulæ & lingulæ adhibitus à natura est, ut cibus neque in ore cum molitur cadat sub dentes, neq; cum per fauces meat,

meat, in arteriam labatur. Carēt animalia quæ modo diximus, lingua, quoniam & carne sicca, & cute cōstant prædura. non enim facile moueri membrum id posset, si ex tali genere carnis cutisq̃ constaret. sed extrema ipsius arteriæ citius comprimerentur, quàm lingua, quam animalia p̃sso prædita habēt ex sua carne. hæc dixisse satis est, quam ob causam animalium alia linguam habeant, alia careant: & quemadmodum natura vīso situs arteriæ remedium linguam emolita adhibuerit. Guttur autem ante gulam necessariò positū est. Cor enim in parte priori, atq̃ in medio situm est: in quo principium uitæ, omnisq̃ motus & sensus esse censemus. etenim partem uersus, quam priorem appellamus, tum sensus, tum etiam motus agitur, hac enim ipsa ratione pars prior, & posterior statuenda est. Pulmo eandem quam cor obtinet sedē, idēq̃ amplectitur. Spiratio tum propter pulmonem, tum propter originem cordi inditam agitur. attrahitur & redditur aer per arteriam. itaque cum in parte priori cor primum collocari necesse sit, arteriam quoq̃ & guttur constitui ante gulam necesse est. hæc enim ad pulmonem & cor tendunt, gula ad uentrem, deniq̃ quod melius & nobilius est, id semper (nisi quid maius impedit) superioris, inferiorisq̃ ratione superius collocatur. prioris. posteriorisq̃ prius, dextrī, sinistrīq̃ dextrum. sed de collo, gula, & de arteria dictum iam est.

De corde, & eius qualitate, quamq̃ ob causam animalibus inuicē fit. Caput IIII

30  Equitur ut de uisceribus doceamus, quæ corū sanē propria sunt, quæ sanguinem habent, nulli enim exanguium animali uiscus ullum est, cum sanguineis omnia sint. Itaque Democritus non recte de his tractasse uidetur, siquidem incerta hæc esse putauit præ exiguitate exanguium animalium. statim enim cum consistunt, quæ sanguinem habent, exiguaq̃ admodum sunt, deprehēdi cor & iecur sine dubio possunt. quippe cum in ouis triduo cubatis, p̃scti iam magnitudine appareāt. necnon in partibus abortitijs perquam exigua cernuntur. ad hæc, ut exteriorum partium non idem usus omnibus est, sed quæq̃ pro uita motuq̃ uario sibi peculiarem receperunt: sic interiorum alia alijs accommodantur. uiscera autem eorum peculiaria sunt, quæ 30 sanguinem habent, quam ob rem unumquodq̃ eorum ex materia sanguinea constat. quod in nuper æditis patet. Sunt enim cruentiora, maioraq̃ ex ratione, quoniam in prima cōcretionē species, copiaq̃ materiæ euidentior est. Cor igitur omnibus sanguine præditis inest, & quam ob causam, dictum & antehac est, & nunc dicemus. Sanguis enim necessariò inest in ijs quæ sanguinea sunt, qui cum humidus sit, conceptaculū sibi habeat necesse est, ideoq̃ uenas natura emolita uidetur. quarum unum esse principium necesse est, ubicunque enim fieri potest, unum esse, quàm plura melius est. cor autem uenarum principium est. ex hoc enim uenæ, & per hoc esse uidentur. natura etiam eius uenosa est, utpote generis societate iunctū cum uenis, quoniam & situs eius sedem obtinet principalem. in medio enim positum 40 est, sed magis superius, quàm inferius. & parti priori immotius quàm posteriori. natura enim rem nobiliorem constituere in locis nobilioribus solet, nisi quid maius impediatur. Cordis hunc esse locum latissime in homine patet. sed in cæteris quoque animalibus pari ratione tenere sibi uult medium corporis necessarii. cuius sanē exitus est, quæ excrementa emittūt. crura autem alijs aliter adiuncta sunt, nec ad uitam necessaria habentur. quam ob rem ijs demptis uita non tollitur, additis etiam nullum sequi interitum certum est. Qui capiti uenarum originem tribuunt, non recte opinantur. plura enim dispersaq̃ principia faciunt, idēq̃ in loco frigido, argumentum, quod frigus hic locus uehementius sentiat: contra cordis locus calore abundat, cumq̃ per cætera uiscera uenæ transigāt, nulla per cor tendit, ut dictum est, itaque

partem & principii uenarum cor esse apertum est, idēq optima ratione. medium enim cordis spissum cauumq corpus est. plenum etiā sanguinis est, quasi hinc uenae oriantur. cauum est, ut contineat sanguinem: spissum, ut principium caloris seruire possit. in hoc enim uiscerum & partium omnium corporis sanguis sine uenis completur. ceterae partes sanguinem uenis habent contentum, idēq recta ratio. ne sanguis enim ex corde ad uenas quoque deriuatur. at uero id cor non aliunde deuenit. id enim origo prima, & fons sanguinis est, aut conceptaculum primum. haec ex confectiōe animalium perspicui possunt, atque etiā ex generatione. Cor enim statim omnium partium primum consistens, sanguinolentum est. motus etiā latitiae ac tristitiae, denique omnium sensuum hinc oriri, eodemq definire uidetur. ¹⁰ Ratione quoque ita esse probatur. principium enim unum esse oportet, ubi cunque fieri potest. aptissimum autem omnium locorum medius est. medium enim unum est & tale, ut undique attingi, uel aequae uel proxime possit. ad haec, cum nec pars alia sanguinea ulla, neque sanguis ipse uim habeat sentiendi, quod primum sanguinem habet, id esse quod sentiat certum est. habeat autē perinde ac uas quod principium est, necesse est. nec ratione tantum ita esse probatur, uerum etiā sensu percipitur. nam in partium prima generatione, statim cor palpitare cernitur, quasi animal sit, ut quod principium sit naturae eorum quae sanguinem habent. argumentum uel inde deduci potest, quod nullum animal sanguinis compos careat corde. principium enim sanguinis habeant, necesse est. iecur etiā omnibus sanguine praeditis inest: sed nemo id censuerit esse principium uel corporis totius, uel sanguinis. situm enim nequaquam obinet principalem. Lienem uero sibi habet aduersum in ijs, quae exquisitis consistunt, nec uero sanguinis conceptaculum modo cordis intra se continet: sed ut reliquae partes sanguinem uenis inclusum habet. ad haec, uena per iecur tendit, nec ulla ex eo prouenit. uenae enim omnes ex corde sua initia trahunt. itaque cum alterutrum istorum principium esse necesse sit, iecur autem non sit, cor sanguinis quoque principium esse necesse est. animal enim sensu desinitur. uis autem sentiendi primo illi tribuitur, quod primum sanguine praeditum est. Tale autem cor est, quippe quod & origo sanguinis sit, & primum sanguinem habeat. Extremum eius turbinatur in mucronem firmissimum. situm in pectore ²⁰ est, & omnino parti priori corporis commissum, ne refrigeretur. omnibus enim pectus minus carnosum, quam tergum est. quam ob rem a tergo perquam tute calor apertus est. Cor ceteris animalibus in medio pectore est. homini tantum paulo uergit ad laeuam, ut eius partis refrigeratione moderetur, & compenset. Omnium enim animalium maxime homo refrigeratam habet partem sinistram. in piscibus etiā cor similem situm tenere, & cur dissimilis uideatur, dictū iam est. solis his cordis mucro ad caput spectat, cum ea pars prior sit. eodē enim agitur motus. Cōpia quod neruorum in corde est, idēq recta ratione. hinc enim motus oriūtur, qui intendendo remittendoq efficiuntur. itaq ministerio tali & robore opus est. Cor autē, ut supra diximus, uelut alterum animal inest ijs, quae corde uitalem originē continent. ³⁰ Cor sine osse est omnium quae nos nouerimus, praeterquam equi, & generis bouum cuiusdam, quibus pra magnitudine quasi adminiculum subditum est. quo modo totum etiā corpus ossibus sustentatur & continetur. Vētriculum triplicem cor magnorum animalium habet, duplicem minorum, unum ad postremū. nullumq est quod sine ullo uentriculo cōstet. & quam ob causam, dictū est. locū enim & conceptaculum quoddam sanguinis primi in corde haberi conuenit. Sanguinem autem primo effici in corde, saepe iam diximus. Sed cum duae uenae sint principales, altera maior, altera minor, aortaq appellata, quae sparsa ramorum serie ceteras minores uenas producat, atq inter se differant, ut posthac exponemus: melius sanē est initia quoq

cor fons. Sentiendi
principium est cor

Vergit cor ad laeuam
in hominibus: quare

Cor motus principium

quoq; earū esse distincta. quod fieri potest, si sanguis diuersus distinctusq; sit. quam ob rem ubi fieri potest sanguinis conceptacula duo habentur. fieri autē id potest in magnis: sunt enim corda eorum ampliora. sed melius tres esse uentriculos, ut unus cōmune principiū sit. medium autem & impar principiū est. itaq; magnitudo amplior subinde desideratur. Vtile sit, ut quæ maxima sint, triplicem uentriculum habeant. dexter plurimū sanguinis, & calidissimū continet: quam ob rem pars corporis dextera calidior. sinister parum, idq; frigidissimū. medius mediocrem, tum copia tum calore, sed puriorem. principiū enim quāmaxime quiescere debet. Tale autem erit, si sanguis purus & mediocris, tum copia, tum calore sit. Quinetiā articulationē

19 quandam rimis, futuris uē capitis similem habere uidentur, quanquā non ita constant, ut quod ex pluribus sit compactum: sed (ut modo dixi) articulationē potius ostendunt. Sunt articulatione corda eorum, quæ sensu melius ualent. in articulatione eorū, quæ sensu hebetiori sunt, ut suum. discrimina cordis, quæ amplitudine, exiguitate, duritia, mollitia existant, uel ad mores pertineant aliquatenus. Quæ enim sensu hebeti sunt, cor habent durum & spissum, quæ autem sensu ualent, mollius. pauca etiam sunt, quibus cor grandius. audentiora, fidentioraq; quibus minus aut mediocre. affectus enim qui accidit ex metu, iam in ijs præest, quoniam calorem proportionē cordis non habeāt, sed parum caloris in magno conceptaculo exolefcat: itaq; sanguis frigidior sit. Cor magnum proportionē, lepori, ceruo, murti,

20 hyenæ, asino, pantheræ, mustelæ, & reliquis ferē omnibus quæ aperte timida sunt, aut propter metum malefica. Simile in uenis atq; in uentriculis cordis euenit. Sunt enim frigidiores, & uenæ ampliores, & uentriculi ampliores. nam ut in paruo & in magno domicilio tantundem ignis non æque calefacit, sed minus in magno: sic in his calor non pariter agit. uas enim tam uena, quā uentriculus est. Item motus alieni calidum quodq; refrigerant. plus autem spiritus in amplioribus est, magisq; ualet. quā ob rem nullum ex ijs, quæ uenis aut uentriculis sunt amplioribus, obesum per carnem, opimumq; est. sed quæ ita pinguescant, aut omnia, aut maxima parte uenis incertis, paruq; uentriculo esse cernuntur. Cor solum uiscerum, atq; omnino partium corporis nullum uitium patitur graue: idq; recta ratione. cum enim

30 nimis principiū corrumpitur, nihil est quod cæteris quæ inde pendeant, præbere auxilium possit. indicium, ut nullum affectū cor patiatur, quod in nulla hostia cor ita affectum uisum adhuc est, ut in cæteris uisceribus cernitur. Renes enim sapienter calculis, & panis, & papulis repleti uidentur: atq; etiam iecur & pulmo, ac potissimū lien. multa etiam alia uitiorū genera euenire in ijs uidemus: sed tamen circa arteriam pulmonis, & qua iecur annectitur uenæ maiori, per exigue ita accidit: idq; ratione recta. hac enim maxime cordi associatur. At uero quæ morbo, ut ijsq; eius modi pereunt animalia, ijs disiectis affectus morbofi in corde conspiciuntur. Sed de corde quale nam sit, & cuius gratia, & quam ob causam iunctum animalibus sit, hæc dixisse satis est.

40 De uenis, & earum loco in corporibus eorum animalium, quæ sanguine prædita sunt.

Caput V



Equitur ut de uenis differamus, uidelicet de maiori, & de aorta. hæc namq; ex corde primæ recipiunt sanguinem: reliquæ earum soboles sunt. igitur sanguinis gratia eas esse dictum iam est. humor enim conceptaculum quisq; desiderat. Venarū autem genus conceptaculū & uas est. itaq; sanguis in ijs, quasi in uase est. sed quā ob rem duæ sunt, & de eadem origine in omnes corporis partes discurrant, explicandum nunc est, causa, ut principiū unum, & ab uno esse melius sit, quod animā sentientem unam

actu habeant omnia. hinc enim pars etiam quæ eam animam primo contineat una
 est, tum potentia, tum actu, in ijs quæ sanguinem habent. At in nonnullis eorum
 quæ sanguine carent, actu duntaxat, quam ob rem caloris quoque originē in eodem
 tantisper esse necesse est. hæc eadem causa est etiam, ut sanguis humidus sit & calidus.
 cum igitur una in parte sit principium sensus & caloris, sanguis etiam ex uno
 suam originem ducit. unitate autem sanguinis sit, ut uenarum etiam capita ex uno
 eodemque oriantur. duæ autem numero sunt, quoniam corpora animalium quæ san-
 guinem habent, & gradiuntur, bipartita sunt. hæc enim omnia parte priori & pos-
 teriori, dextra & sinistra, superiori & inferiori distinguuntur, quanto autē nobilior
 ac principalior pars prior, quàm posterior est, tanto uenâ maior præstantior est al-
 tera, quam aortam uocari diximus. altera enim in priora, altera in posteriora discor-
 rit. & altera in omnibus sanguine præditis habetur aperte, altera in nonnullis aut ob-
 scure, aut incerte. Causa uero ut uenæ in omnes corporis partes digerantur, quod
 sanguis, aut quod uicem sanguinis tenet, totius corporis materia est, quæ in uena,
 aut in uicario uenæ continetur. sed quonam modo, & ex quo animalia nutrian-
 tur, & quomodo ex uentre capiant alimentum, cum de generatione agitur, aprius
 & spectari, & explicari potest. Cum autem partes ex sanguine omnes consistant,
 ut diximus, uenarum riuus in omnes corporis partes ratione recta expanduntur.
 Sanguinē enim findi per omnia, adesseque omnibus oportet, siquidem partes quæque
 ex eo consistunt. & ut in hortis rigandis de una origine, fonteque uno aqua riuus per
 multis diducitur, alijque ab alijs ductus subinde excipiunt quousque humor in omnes
 partes deueniat: atque etiam ut in fabricis per totam fundamentorum descriptionem
 lapides apponuntur, uidelicet ea ratione, quod fata hortorum humoris beneficio nas-
 cantur, fundamenta ex lapidibus condantur: sic natura sanguinē per totum cor-
 pus censuit deriuandum, cum is omnium materia sit. patet hoc in ijs, quæ maxime
 extenuentur, nihil enim nisi uenæ apparent, ut in uicinis, & ficulis, & reliquis ge-
 neris eiusdem frondibus, ijs enim arescentibus, uenæ tantummodo relinquuntur.
 Cuius rei causa est, quod sanguis, & quod sanguini proportionetur, potentia sit cor-
 pus & caro, aut quod ijs proportionem respondeat. Igitur ut in adæquatione sulci al-
 tiores amplioresque durant, minimi autem primi, ac celeriter limo obducto abole-
 scunt, rursusque deducto apparent, sic uenæ amplissimæ durant, minimæ autem pri-
 mæ actu carnes efficiuntur, quanquam potentia nihilominus uenæ sint. quam ob rem
 etsi caro extat, sanguis tamen inducto uulnere undique effluit. Atqui sine uena san-
 guis esse non potest. uena autem nulla manifesta est, quo modo neque riuorum fo-
 ueolæ pateant, priusquam limus eximatur. Procedunt uenæ in minores subinde ex
 amplioribus quousque archiores reddantur, quàm ut sanguinē transmittere possint,
 quam ob rem exitus sanguini nullus patet, quanquam excremento uaporis humidi,
 quem sudorem uocamus, satis pateat. sed ne illi quidem nisi corpore calefacto, &
 uenularum clausulis patefactis. Iam nonnullis accidit, ut cruentum quoddam excre-
 mentum sudarent propter uitiatum corporis habitum, scilicet cum corpus laxum
 fluxuque esset, sanguisque præ cruditate humesceret imbecillitate caloris, qui exiguus
 uenulis inclusus concoquere non posset. omne enim quod aquæ & terræ comune
 est, crassescere cum concoquitur, dictum iam est, alimentum autem & sanguis mi-
 xrum ex ijs est, calor uero concoquere non potest, non modo quia exiguus est, ue-
 rum etiam præ nimia cibis assumpti copia, sit enim exiguus cōparatione tanti cibarii.
 duplex autē exuperantia cibi est, aut enim quantitate, aut qualitate, id est, modo &
 genere. quippe cum cibis non æque concoctu facilis quisque sit, profluit autē sanguis
 potissimum per ampliora uenarum foramina. quæ ob rem e naribus, gingiuis, & sede,
 interdum etiam ex ore profluuiū sanguinis sit sine ullo dolore: non per uim, ut ex
 arteria.

arteria. distat spacio inter se superne uena maior, & aorta. infra mutatis uicibus tendunt, atq; ita continetur corpus. progrediētes enim scindūtur iuxta bifidam crurū partitionē, atq; altera ex parte priori in posteriōrē se porrigit, altera ex posteriori in priorem, eodemq; concurrūt. ut enim ea quæ implexa sunt, continētiōra constant, sic uicibus uenarū mutatis, partes priores corporis cum posterioribus copulantur. Simile etiam a corde locis superioribus sit. sed qui diligentius nosse uelit, quemadmodum uenæ inter se habeant, spectare id tum per dissectionē, tum etiam per commentationē, hoc est, historiam animalium debet, atq; de uenis, & corde hæcenus, de reliquis etiam uisceribus hac eadem uia & ratione considerandum est.

De pulmone & eius formis, quibus item inferitur, quibus non.

Caput VI



Vlmo ideo habetur, quia genus animalium quoddam pedestre est. Calorem enim refrigerari necesse est. quod extrinsecus ea, quæ habēt sanguinem desiderant, sunt enim calidiora. At quæ sanguine carent, uel suo natiuo spiritu satis refrigerari possunt: extrinsecus autem uel aëre, uel aqua refrigerare necesse est, quam ob rem piscium nullus habet pulmōnē, sed pro eo branchias obtinent, ut cum de spiratione ageremus, retulimus. aqua enim refrigerantur, ut aëre quæ spirant, quam ob rem omnia quæ spirant, habent pulmōnē. spirant pedestria omnia, & aquatiliū nonnulla, ut balena & delphinus, atque etiam cete omnia quæ resstant. complura enim natura accipit sunt, tum ex terrestriū, tum ex aquatiliū numero. nam & eorum quæ terra sustentantur, aëremq; arripiunt, quædam in humore maximā temporis partem consumunt propter sui corporis temperamentū. & eorum quæ in humore degunt, nonnulla tantum terrestris naturæ sibi mutuantur, ut nisi interdum spirent, uiuere nequeant. Pulmo igitur spirandi officio delegatus est, qui originē quidem sui motus accipit ex corde: sed sua tum amplitudine, tum inanitate aditum spiritui patefacit. cum enim attollitur influit spiritus, cum contrahitur effluit. Ad cordis palpitacionem pulmōnem spectare male opinatum est. cor enim homini (propēdixerim) animalū uni palpitat, quia homo solus spe rei futuræ, expectacionēq; mouetur. in pluribus etiam cor laxo interuallo distat a pulmone, situmq; superius tenet, ut nihil ad cordis palpitacionem conferat pulmo. Differentia pulmōnis uaria est. alijs enim sanguineus, magnusq; alijs minor, fungosus, exanguis. Quæ uiuipara sunt, maiorē, & copia repletum sanguinis habent propter calorem suæ naturæ ampliorem. Quæ contrā ouipara sunt, exiguum & siccum, sed aptum ampliari, ac extumescere cum inflatur: qualis eorum est, quæ ex terrestribus quadrupedes ouiparæ sunt, ut lacertorū, & testudinū, & cæterorū generis eiusdem. Volucrū etiam natura, quas aues appellamus, eodem pertinet. omniū enim earum pulmo fungosus, & spuma similis est. spuma enim facta diffusaq; ex amplo tumore in exiguū residet, & pulmo earum exiguus, membranæq; similis est. quam ob rem hæc omnia parum siciunt, & parum bibunt. diu etiam aquam demersa tolerant, satis enim ab ipso pulmōnis motu spiritali inanēq; refrigerantur diutius, ut quæ parum caloris habeant. Accedit ad hæc, ut magnitudo corporis eorū prope omniū minor uiuiparis sit. Calor enim est, quod uim obtineat augendi, sanguinis autē copia caloris indicium est. Corpora etiam melius erigit. quam ob rem homo cæteris erectior omnibus est. & uiuipara reliquis quadrupedibus erectiora incedunt. nullum enim uiuiparū uel expes, uel ambulans æque latibula petit. Pulmo igitur spirandi gratia datus omnino est, sed exanguis, talisq; cuiusdam animalium generis causa est. uerum cōmune eorum non mine uacat, nec ut autum genus nomen obtinuit. itaq; ut auem esse ex aliquo est, sic in essentia illorum inest, ut habeant pulmōnem.



Uiscerum quædam simplicia esse uidentur, ut cor, ut pulmo, quædam
 bipartita, ut renes. quædam utro nam modo se habeant, dubiatur. Ie-
 cur enim & lienem ancipiti inter hæc esse specie dixeris. nam & quasi
 simplex, & tanquã pro simplici duo. simili prædita natura esse utru-
 que uidetur. Sunt tamen omnia bipartita. cuius rei causa est corporis
 dispositio, quæ bipartita quidem sit, sed in unum initium coëat, consumeturq. aut
 enim superiore & inferiore, aut priore & posteriore, aut dextra & sinistra parte di-
 stinguitur. quam ob rem cerebrum quoq. omnium bipartitum esse sibi uult, atque
 etiam sensorium unumquodq. eademq. ratione cor uentriculis suis distinguitur. 10
 pulmo uero in ouiparis adeo dirimitur, ut ea binos habere pulmones uideantur.
 Renes bipartitos esse nulli dubium est. de iecore & liene iure ambiges. cuius rei cau-
 sa est, quod in ijs quæ lienem habere necesse est, lien ipse quasi iecur adulteratum
 esse uidetur. in ijs autem quæ lienem habere non necesse est, ut exiguus admodum
 lien ueluti notæ gratia habetur, sic epar bipartitum aperte est, & pars altera ad dex-
 tram, altera quæ minor est, ad sinistram situm tenere expetit. Quinetiam in ouis
 paris quamuis minus, quam in uiuiparis apertum sit, tamen in nonnullis æque diuisi-
 sum patet. ut locis quibusdam lepores bina iecinora habere uidentur, quemadmo-
 dum in genere piscium, tum alij quidam, tum cartilaginei iecur duplicatũ habere
 uidentur. Sed quoniam iecur parte dextra potius situm est, ideo natura lienis ad 20
 hibita est. Itaq. quanquam necessariò quodammodo est, tamen non admodum om-
 nibus animalibus. causa igitur ut uiscerum natura bipartita sit, quemadmodum
 diximus, dextrum sinistrumq. est. utrunq. enim sibi simile exposcit, quomodo ea
 quoq. similem, geminamq. habere naturam expetunt. ut enim illa quamuis gemi-
 na eodem coëunt, sic uiscerum singula, quamuis gemina, nexu eodem continen-
 tur. Sunt uiscerum quædam supra septum, quædam infra. sed omnium usus com-
 munis uenarum gratia est, uidelicet quo uenæ, utpote pensiles sustineri, & copula
 uiscerum stabiliri ad corpus possint. quasi enim anchoræ per partes deductas iaci-
 untur ad corpus. uerbi gratia, de uena maiore ad iecur & lienem deuenitur. etenim 30
 uiscerum eorum natura, quasi clauus corpori eam affigit, scilicet iecur & lien, in la-
 tera corporis uenam maiorem affirmant. ad hæc enim sola rami ab illa mittuntur.
 Renes autem in partem posteriorem eandem continent, quanquam ad renem ut-
 trumq. non modo de uena maiori, sed etiam de aorta pertendit uena. hæc uiscerum
 beneficio institutioni animalium præstantur, atq. etiam iecur & lien iuuant ad cibi
 concoctionē. quod enim sanguinea sunt, calidam habent naturam. Renes ad ex-
 crementum quod in uescam secedit, opitulantur. Sed enim cor & iecur omnibus
 animalibus necessaria sunt. alterum propter caloris originem (locum enim adesse
 aliquem quasi lares, focumq. oportet, quo naturæ fomites, & primordia ignis na-
 tui contineantur & seruentur, eundemq. tutum esse ueluti arcem corporis totius
 necesse est) alterũ iecur dico, cibi concoquendi gratia adest, & quidem nullum san- 40
 guine præditũ ijs duobus carere potest. quam ob rem omnia quibus sanguis, duo
 hæc uiscera habent. Quæ autem spirant, tertium etiam habent, pulmonem. Lien
 per accidens necessarius est, quomodo excrementa tum alui, tum uescæ. ex quo
 fit, ut in nonnullis deficiat magnitudine, ut uolucrum quibusdam, quæ uentricu-
 lum habent feruentiorem, uelut columbo, accipitri, miluo. Quinetiam in ouiparis
 quadrupedibus pari modo hoc percipi potest. habent enim perquam exiguum.
 multis etiam squamatis exiguus, quæ uescica etiam carent, quoniam excrementum
 per carnem laxiorem in pinnas & squamas transeat. lien enim uapores uacantes
 diuertit, & attrahit ex uentriculo, & concoquere eos potest, ut qui sanguineus sit.

quod si plus excrementi sit, parumq; caloris habeat lien, corpus præ alimento immodico languescit. & propter confluuiū huc humoris sæpe accidit, ut lienosis uentres præduri efficiantur. quo modo ijs, qui supra modum mingunt ex diuerticulo humoris. At quibus parum excrementi consiluit, ut auib; atq; piscibus, ijs aut non magnus, aut notæ gratia duntaxat habetur. Quadrupedibus etiam ouiparis lien exiguus, rigidus, & reni similis est, scilicet ob eam rem, quod pulmo eorum fungosus est, parumq; potus desiderant, & quantum excrementi consiterit, in corpus & corticem uertitur, ut auib; in pennas. Sed in ijs quæ uesciam habent, & pulmonē sanguineū, humidus est, tum ob eam quam modo diximus causam, tum quia par-
 10 tis sinistra natura humidior & frigidior est. contrarium enim quodq; ad sibi cognatum ordinem dispositū est, uerbi gratia, dextrum sinistro cōtrarium est, & calidum contrarium frigidum, itaq; modo quem diximus, sociantur. Renes nulla necessitate habentur, sed ut melius & locupletius sit, humoris enim excrementiij gratia, qui consiluit in uesciam, adiuncti sunt ex sua natura, in quibus plus huiusmodi sedi-
 menti fieri solet, ut uescia melius suo munere fungeretur. Sed cum usus eiusdem causa renes atq; uescia habeantur, disserendum nunc de uescia est, prætermittā se-
 quente partium enumeratione, de præcordijs enim nondum docuimus, quæ pars uiscerum rationi coniuncta est.

Quibus animalibus data sit uescia, deq; eius officio, & situ in corpore animantiū. Cap. VIII

20



Uescia non omnibus animalibus data est, sed ijs tantū tribuere uoluissē natura uidetur, quæ pulmonem haberent sanguineū, idq; recta ratione, caloris enim excessu, qui in eo ipso membro cōtinetur, sitibundā hac omnium præcipue animalī sunt, cibiq; indigent, non modo sicci, uerumetiam humidi copiosioris, itaq; excrementū etiam copiosius contrahi necesse est: nec solum tantum, quantum à uentre concoqui excerniq; cum eius excremento possit. ergo huius quoq; excrementi conceptaculū quoddam haberi necesse est. quam ob rem omnia quæ talem habent pulmonē, uesciam obtinent. quæ autem tali carent pulmone, & uel parum bibunt, quoniam fungosum pulmonem habeant, uel omnino potum assument, non potus, sed cibi gratia
 30 ut insecta, & pisces, uel etiam quæ penna, aut squama, aut cortice integuntur, hæc tum propter humoris assumpti exiguitatem, tum quia quantum excrementi contrahitur in ea ipsa absumatur, uescia omnia carēt, excepta testudine inter corticata: in hac enim tantūmodo natura castrata est. Cuius rei causa est, quod marinæ testudines pulmonē habent carnosum, sanguineū, & similem bubulo, terrestres autem proportionē maiorem. superficies etiam, quia obdensa præduraq; modo silicis est, facit ne humor diffiliari euaporariq; possit per carnem laxiorem: ut auib;, serpentibus, cæterisq; operitis cortice euenit. atque ita excrementi copia tanta subsidet, ut eorum natura conceptaculum & uas quoddam capax humoris desideret. uesciam igitur testudo sola inter hæc habet, ea de causa, scilicet marina amplam, terrestrib;
 40 exiguam admodum.

De renibus, & eorum officio, quib; animalibus dati sint. Caput IX



Enum etiam ratio similis est. nullum enim pennatum, nullum squamatum, nullum corticatum, excepta testudine, renes habet. quantū in nonnullis auib; caruncula quædam sint latiusculæ, speciem renum ostendentes, quasi ea caro quæ renibus delegata est, locum non habeat, sed in plura dispersa sit, genus tamen testudinis quā lutariam uocant, & uescia & renibus caret. sit enim propter eius mollitudinem tegminis, ut humor facile diffilietur. lutaria igitur ob eam causam neutrā earum partium habet.

R 3

cæteris animalibus quæ sanguineum (ut dictum est) habent pulmonem, renes omnibus natura tribuerat. quippe quæ simul & ad uenas continendas ijs uteretur, & ad humorem superuacuum excernendum abuteretur. meatus enim de uena maiore ad renes usque perferretur. Cauum in omnibus inest renibus, aut amplius, aut arctius, præterquam in uirulo marino. eius enim renes bubulis similes, omnium firmissimi ac solidissimi sunt. hominum etiam renes bubulis similes sunt. quippe qui tantum quæ compositi ex multis renibus exiguis consunt, neque æquabiles sunt, quomodo renes ouium, cæterarumque quadrupedum habentur. quo fit, ut morbus eorum difficile curari hominibus possit, etiam si nuper ægrotare inciperint. accidit enim ut quasi multis renibus laborent, difficilius remedium adhibeatur, quam si uno infestarentur. Meatus qui ex uena pertendit, non cauum subit renem, sed in eorum corpus absorbitur. quam ob rem in cauis eorum nihil sanguinis continetur, neque concreuit mortuis. Meatus uero de cauis renum exangues duo insignes ad uescicam feruntur, singuli ex singulis. atque etiam alij ex uena aorta ualidi frequentesque eodem deueniunt. quæ ita natura instituit, ut ex uena humoris excrementum ad renes ueniret. in renibus autem sedimen humoribus per corpus renum colatis, in medium conflueret, ubi plurimi cauum continent. quo fit, ut renes omnium maxime uiscerum foedum reddant odorem. tum deinde ex medio per eos meatus in uescicam iam magis magisque tanquam excrementum secerantur atque reijcitur. uescica ipsa ex renibus dependet. tendunt enim in eam, ut dictum est, ualidi meatus. Renes his de causis habentur, & uirtutes, quas diximus, obinent. Omnibus autem quæ renes habent, dexter superior sinistro est. quod enim motus ex parte dextra proueniat, naturaque dextræ proinde ualidior fit, ideo partes omnes mouendi causa uergant ad situm potius superiorem oportet. nam & supercilium dextrum magis attollitur, & arcuatum magis, quam sinistrum habetur. Tangitur in omnibus à iecore dexter, quod elatior est. secur enim parte dextra positum est. pingue plenius renes ambit, quam reliqua uiscera. quod & necessarium fit, cum excrementum per renes transmissum coletur. quantum enim relinquitur sanguinis puri, facile concoqui potest. finis autem probæ concoctionis sanguineæ, adeps & seuum est. Ut enim in com-bustis siccis uelut cinere aliquid ignis relinquitur, sic in concoctis humidis non nihil caloris, qui effecerit, relinquitur. quo fit, ut pingue leue sit, & humoribus resideat, atque fluat. fit non intra ipsos renes, quoniam densum hoc uiscus sit, sed circum renes est, uidelicet aut adeps in ijs, quæ pinguescere adipi solent, aut seuum in ijs, quæ seuo opimantur. quorum differentia alio loco explicata est. necessarium igitur ea de causa pinguescunt, scilicet ex ijs quæ necessario eueniunt animalibus, quæ renes habere debuerunt. Salutis autem causa, ut renum natura calida sit. Cum enim positi loco ultimo sint, teporem desiderant ampliorem. tergum enim carnosum est, ut cor, & re qua partis superioris uiscera protegat. At lumbi carne uacant, ut flecti possint. omnium enim flexus excarnes sunt. itaque uice carnis adipem renes obsepti muniuntur. Quinetiam humorem melius discernunt, & concoquunt sua pinguedine. pingue enim omne calidum est. calor autem concoquit. renes his de causis pingui operiuntur. dexter omnibus minus pinguis, cuius rei causa est, quod natura dextræ partis siccior est & mobilior. motus autem contrarius est: liquat enim pinguedinem & consumit. sed cum cæteris animalibus renes habere pingues proficiat, & plerumque totos obesos habeant, ouibus hoc letale est. quo fit, ut quamquam pingues admodum sint, tamen aliquid desit, & si non utriusque, dextro quidem. causa cur hoc solis, aut maxime ouibus accidat, quod ijs quæ adipem pinguescere solent, pingue humidum est. itaque non æque status interclusi dolorem faciunt, quod causa syderationis est. quam ob rem hominibus etiam qui uisio renum laborant, quamquam

quam pinguescere iuuat, tamen si pingues admodum efficiantur, dolores profecto accidunt letales. Ceteris autem et si seuo pinguescunt, tamen seuum minus densum quam ouibus sit. Copia etiam seui genus ouium longe excedit. omnium enim animalium oues celeri renum obesitate opplentur. itaque humore statim intercluso celeriter praesyderatione intereunt. namque per uenam aortam & maiorem, statim uicium ad cordis sedem transuehitur. meatus enim ex istis uenis ad renes continui pertendunt. sed de pulmone, de corde, de iecore, de liene, & de renibus dictum iam est.

De septo transuerso, siue praecordij, & eius officio.

Caput X

10



20

30

40

Eparantur haec inter se septo transuerso, quod nonnulli praecordia appellunt. determinat hoc a reliquis pulmonem & cor, id autem septum transuersum praecordia in sanguine praeditis, ut modo dixi, uocatur. habent hoc omnia quae sanguinem obtinent aequae ut cor, & iecur. cuius rei causa est, quod ideo habetur, ut sedem cordis a uentre dirimat, uidelicet ut animae sentientis origo inoffensa seruetur, nec facile occupetur exhalatione cibi, & caloris aduentitij copia. haec enim causa natura intercepit praecordiorum, quasi parietis sepius interuentu, distinxitque partem nobiliorem ab ignobiliore, in quibus superioris, inferiorisque ratio posset haberi. superius est enim cuius gratia res liqua sint, quodque melius sit. inferius autem quod eius gratia sit, & conceptaculum cibi necessarium. Annectitur hoc septum siue cinctus costis parte sui carnosiore, ualidioreque. media autem constat membrana exiliore, ita enim & ad robur, & ad praetentum commodius est. contra calorem se efferentem hoc ueluti sobolem esse, argumentum ex istis quae plerumque accidunt, ducitur. ubi enim propter uiciniam attraxerint humorem calidum atque excrementum, continuo mentem sensumque plane perturbant. quam ob rem phrenes appellantur, quasi participes prudentiae sint. atqui nullatenus participes sunt, sed quia propinquae sunt istis quae uim obtinent illam, (cordi enim praetenduntur) hinc mentis mutatione aperiant, quam ob rem tenues parte sui media sunt, non modo de necessitate, quod cum carnosae sint parte sui costis admodum, carnosiores esse necesse sit: uerum etiam ut minus uaporis excipiant. nam si carne pleniores constarent, copiam uaporis & haberent, & traherent. partem hanc calefactam celeriter sensum aperire indicat, uel id quod titillatio euenit. ridet enim celeriter qui titillatur, quia motus celeriter ad eum locum perueniat. qui quamquam leuiter calefaciat, tamen aperit, & mentem mouet praeter uoluntatem. causae autem cur homo animalium unus titilletur, & cutis tenuitas est, & quod solus omnium animalium rideat, est enim titillatio risus per eiusmodi motum partis, quae alam complet. ictu etiam traiecta praecordia in praeteritis risum attulisse proditum est, scilicet calore, quem moueat uulnus, hoc enim uerisimilius credi potest, quam quod de capite referunt, ut abstissimum loqui potuerit. Sunt enim qui hoc dicant, Homerumque testem adhibeant, quasi ob eam rem illud dixerit, Ipseque dum loquitur, miscetur puluere uertex. non enim dum ipse homo, sed dum ipse uertex intelligi uolunt. In terra Caria, res adeo pro uera habita est, ut eum quendam ex incolis egerint. Cum enim Iouis Hoplosmij sacerdos esset occisus, & a quo non constaret, nonnulli sese auduisse retulerunt, capite praeciso dicente saepius, uirum super uiro Cercidas occidit. itaque hominem cui nomen Cercidas in prouincia quaesierunt, compertumque in iudicium duxerunt. sed fieri non potest, ut caput praecisa arteria, & sine motu pulmonis loquatur. nec apud Barbaros qui capita summa cum celeritate abscindunt, tale quid unquam euenisse accepimus. Ad haec, in ceteris

namque per uenam
aortam, statim
uicium ad renes
continui pertendunt.
sed de pulmone,
de corde, de iecore,
de liene, & de renibus
dictum iam est.

Titillatio quid est

ris animalibus cur id non aliquando fiat? risum enim ijs nunquam præcordijs tractis moueri consentaneum est, cum ridendi ui careant. At capite absçiso ne suam uocem aliquando emittant, quidnam prohibeat? Corpus tamen detracto capite progredi quoquã non temere credi potest. nam ea quidem quæ sanguine carent, uel uiuere diutius possunt truncata capite. cuius rei causam alio loco docuimus. Sed cuiusnam gratia singula uiscerum habeantur, explicatum iam est. Extremis autem uenarum interioribus hæc necessariò adiunguntur. uaporem enim prodire, eumq; sanguineu necesse est, ex quo consistente conicrescenteq; uiscerum corpus contrahatur & coagmentetur. quapropter sanguinea hæc sunt omnia, & naturam sibi consimilem, cæteris dissimilem habent.

10

De membranis, & earum officio.

Caput XI



Membranis omnia uiscera induduntur. pro tegmine enim opus est, quo illaesa seruantur, eoq; leuiori. membrana autem talis suapte natura est, quippe quæ & densa sit, ut arcere possit, & carne uacet, ut uaporem nec trahat nec habeat, & tenuis prætendatur, ut leuis sit, & nihil ponderis afferat. Maxime inter membranas & robustissimæ sunt, quæ cor aut cerebrum ambiunt, idq; optima ratione. hæc enim præcipuam tutelam desiderant, tutela enim partibus adhibenda principalibus est, hæc autem principatum maxime uitæ obtinent.

11

Non omnia uiscera omnibus animalibus inesse.

Caput XII



Abest animalium quædam omnem uiscerum numerum, quædam non omnem. quæ sint hæc, & quam ob causam, dictum iam est. & uariè uero hæc habentur, neq; enim cor simile habent ea quæ corde prædita sunt, neq; aliud propè dixerim ullum. Iam enim iecur alijs multitudine est, alijs simplicius in eorum genere quæ sanguinem habent, & uiuipara sunt, sed longe magis piscium iecinora, & quadrupedum, & ouiparorum, tum inter seipsa, tum ab ijs quæ modo diximus, dissident. Auium iecur maxime simile est iecori uiuiparorū. puro enim & sanguineo colore exhilaratur, ut illud. cuius rei causa est, quod auium corpora dissili, euaporariq; optime possint, nec multum habeant excrementi uitioli. quo etiam sit, ut nonnulla ex uiuiparis selle careant. Iecur enim ad temperiem, sanitatemq; corporis multū confert. finis namq; eorum in sanguine potissimum situs est. Iecur autem omnium uiscerum, excepto corde, sanguine refertissimū est. At uero quadrupedum ouiparorū, & piscium iecinora maxima parte pallidiuscula sunt. nonnullorū etiam uiciata omnino, ut corpora quoq; eorundem prauum temperamentū sorduntur, uelut rubetæ, testudinis, & similia. Lienem bisulca inter cornigera habent rotundum, ut capra, ouis, & reliqua omnia, nisi aliqua pro sua magnitudine uictiorem in longitudinem habeant. ut boues. At multisidis prolixus omnibus est, ut homini, cani. Solipedibus autem medium tenet, & promiscuus est. partem enim alteram habet latam, alterā angustam, ut equo, mulo, asino.

12

Differentia uiscerum à carne.

Caput XIII



Differunt uiscera à carne non modo sua corpulentia, uerumetiam eo quod caro fors posita est, uiscera intus continentur. cuius rei causa est, quod naturam cōmunem cum uenis habeant, & partim uenarū gratia sint, partim non sine uenis esse possint. Subest præcordijs uenter, quæ gula desinit, si habetur; si minus, ori adiungitur.

De intestino

De intestino, & uentre, eorumq; officio, & locis concoctionis. Caput XIII



Entrī intestinū annexum est, sed quam ob causam partes has anima-
 lia habeant omnia, nulli dubium est. Cūbū enim & ingestum reci-
 pere, & euaporatū eijcere, neq; eundem locum esse cibi concocti, &
 excrementi necesse est. conceptaculū etiā adesse in quo cūbū mu-
 retur oportet. pars enim alia cūbū ingestum complecti, alia excre-
 mentum, materiāq; superuacua capere debet. quarum actionum ut tempus di-
 uersum est, sic loca etiā diuersa haberi necesse est. Sed de ijs aptius differemus, cum
 de generatione & alimento agetur. nunc de differentia uentris & partium eodem
 10 pertinentiū considerandū est. Ventres enim nec magnitudine neq; specie similes
 inter se sunt. sed quæ in sanguineo genere utrinq; dentata & uiuipara sunt, hæc sim-
 plicem habent uentrem, ut homo, canis, leo, & reliqua quorum pedes in plures di-
 gitos finduntur, & quæ aut solipeda sunt, ut equus, mulus, asinus: aut bisulca qui-
 dem, sed utraq; parte dentata, ut sus. nisi aliqua præ sui corporis magnitudine aut
 difficultate, cibi non ad concoctionē idonei, sed spinosi, & lignei, multiplicem ha-
 beant, ut camelus: quemadmodū cornigera habent: quippe quæ non utraq; parte
 dentata sint, & camelus quidem (quantū cornibus caret) ideo non superne dentata
 est, quod ei magis necessariū est uentrem talem habere, quā dentes priores. cum
 itaq; uentrem similem non utrinq; dentatis habeat, dentes etiā simili modo forti-
 20 tur, utpote parum necessarios. quin etiam cum cūbū dirus spinosusq; sit, & tamen
 linguā esse carnosam necesse sit, natura dentium portione terrena ad palati callum
 atq; duritiā abusa est. Ruminat etiā camelus more cornigerorū, quoniam uen-
 tres similes cornigeris habeat. Habēt hæc singula plures uentres, ut ovis, capra, cer-
 uus, & similia, ut cum officium oris non satis in molendo cibo adhibetur propter
 inopiam dentiū, munus uentriū expleat, dum alius ab alio cūbū recipit, scilicet
 primus in confectum, secundus aliquantulum confectum, tertius plenius, quartus
 perquam plene confectum. ita fit, ut genus hoc animalium receptacula cibi habeat
 plura, quibus nomina hæc aut indita sunt, aut indere licet, uenter, arsinē siue reti-
 culum, omasum, abomasum. Quonam modo hæc se habeant, tum situ, tum etiā
 30 specie, ex historia dissectioneq; animalium petendum est. Hæc eadem causa est, ut
 auiū quoq; genus partem, qua cūbū recipit, uarie habeat. cum enim id oris of-
 ficio, quod cibo conficiendo tribuitur omnino careat, ut quod nullos habeat den-
 tes, & neq; quo dirimat, neq; quo molat cūbū obtineat, idcirco aut ante uentrem
 sinum habent, qui ingluuiēs appellatur, pro oris officio, aut gulam patentiorē, aut
 ante uentrem partem aliquam gulæ ipsius sinuosam, in qua cūbū recentem & in-
 confectum recondant, aut uentris ipsius partem aliquam prominentem, aut etiā
 uentrem ipsum ualidum & carnosum, ut cūbū immolitur diu continere, & con-
 coquere possint. bonis enim uiribus uentris, & calore natura defectum oris repen-
 dit, & compensat. Sunt quæ nihil ex ijs habeant, sed ingluuiē proluxa utantur, sci-
 40 licet ea quibus crura prælonga & læuia sunt, propter cibi humiditatem. causa igitur
 est, quod cūbū ijs omnibus moli & confici facile possit, ut eorū uentres per facilem
 cibi concoctionē humescant. Piscium generi dati sunt dentes, sed ferrati propē dix-
 rim omnes. genus enim quoddam exiguum est, quod non ferratos habeat dentes,
 ut qui scarus uocatur, qui unus & ruminare meritō ob eam rem credit. quæ enim
 non utrinq; dentata cornigera sunt, ruminant. habent omnes acutos, quibus & si
 cūbū secare possunt, tamen male secant, quod diutius immorari nequeant, quam
 ob rem nec planos habēt dentes. non enim fieri potest, ut dederant cūbū. itaq; fru-
 stra haberent. Item stomachum alijs nullum omnino habent, alijs breuem. sed enim
 ad concoctionem iuuandam alijs modo auiū uentriculos habent, & carnosos, ut
 mugilis. Maior autē numerus appendices iuxta uentrem frequentes obtinet, ut in

ijs quasi lacunis cibum conditū macerent, atq; concoquant, sed pisces contrā quā-
 aues eas appendices sitas habent, quippe qui superne habeant ad uentrē; cum aues
 quibus datū hoc est, infrā parte intestini extrema dissument. uiuiparorū etiā nō
 nullis appendices intestinales infrā eadem de causa habentur, genus piscium omne,
 quoniam cibum minus conficere possit, crudaq; egerat, & uorax & gulosum est,
 cætera etiā omnia quibus intestina sunt recta, ciborū auida sunt, cum enim cibum
 celeriter egeratur, proindeq; brevis usus fruendi sit, breui repetāt cibum auida ne-
 cesse est. Quæ utriq; dentata sunt, paruum habere uentrem dictum iam est. differe-
 rentiam autem duplicem ferē omnia recipiunt, alia enim canino similem habent,
 alia suillo, amplior uenter suillus est, flexuosusq;, ut diutius cōcoquat, caninus par-
 uus est, nec multo amplior intestino, laxiusq; intus. A uentre natura intestinorū po-
 sita est in omnibus animalibus, habet & ea differentiam, ut uenter numerosiore,
 alijs enim simplex intestinū, sibiq; simile resoluitur, alijs dissimile. quibusdam enim
 parte qua uentri iungitur, laxius est; qua definit, arctius. Quam ob rem canes uehe-
 menti nūxu, nec sine cruciatu eam partem leuant excremento, sed tamen maiori ani-
 malium numero arctius parte superiori est, laxius inferiori, maiora multiplicabilio-
 raq; sunt intestina cornigerorū. uentris etiā sinus eorum amplior, quod auctiora
 sint, cornigerorū enim propē dixerim omnia ampiora sunt pabuli ratione, ut confi-
 ciant, quod sibi ingerunt incoctum. Quibus autem intestinū non directum, ijs
 omnibus amplius tendit, quā & quod colum uocatur, habent. & cæcum, ac rumi-
 dum quiddam mox arctatur, & complicatur, ab hoc rectum ad exitum usq; excre-
 menti pertendit, quæ quidem pars, quam podicem uocant, alijs pinguis, alijs sine
 pingui est. Quæ omnia natura solers molita est ad congruam cibi confectionē, &
 excrementi usum, & transmissionē. procedenti enim descendentiq; excremento,
 aut subsistenti, ut immuret in animalibus, quæ præ magnitudine aut locorū calore
 uegetiora, cibiq; plenioris indigentiora sint, uia ampliatur, tum, ut uentrem inte-
 stinum angustius excipit, sic à colo, quod laxum intestinū uocatur, & alui amplitu-
 dine rursus semitam angustiorē, clauiculam à flexuosis oribus dictam, subit excre-
 mentum iam penitus euaporatū, ut natura seruetur, nec uniuersim exitus fiat ex-
 crementi. Quæ igitur animalia continētiora esse ad cibi desiderii conuenit, hæc sua
 in aluo laxiores sinus non habent, sed anfractus, orbesq; plures continēt, nec recto
 intestino utuntur, laxitas enim intestini auiditate auget cibi rectitudo accelerat aui-
 ditatem, quam ob rem animalia, quæ uel simplex habent intestinū, uel cōceptacula
 ampla, cibum aut copiosum capiunt, aut celerius repetunt. Sed cum in uentre su-
 periore cibum ingestū recentem esse necesse sit, in imum autē delapsū seculentū,
 euaporatūq;, locum etiā aliquem interpositū esse, in quo immuret, & nec recens
 adhuc, neq; tam exactus in sterco sit, necesse est, itaq; genus id animalū omne ha-
 bet eam partem, quæ ieiuniū uocatur, positā in eo, quod à uentre tenue tendit, in
 testino, hoc enim mediū est inter uentrem superiorē, in quo cibum crudus adhuc sit,
 & inferiorē, in quo iam superuacūū excrementū contineatur, hoc cum in omni-
 bus ita sit, tum in ijs patet, quæ & maiora sint & ieiunarint, ita enim intersitium loci
 utriusq; conspicitur, nam si æderint, mutationi parum temporis suppetit. Sed so-
 minis pars nulla certa superioris intestini ieiuna est, alia enim alijs, ut fors tulerit.
 Maribus autem proxime ante cæcum aluumq; omnibus est.

Quæ coagulum habeant, quæ non, & de eius loco.

Capit. XV



Abent, quod coagulū uocatur, omnia quæ plures continent uentres,
 carent quæ unum habent, excepto lepore, habent quibus hoc datum
 est, non in magno uentre, nec in reticulo, neq; in ultimo, quod aboma-
 lum appellauimus, sed in eo qui inter ultimum & duos primos positus
 est,

est, quod omasum uocatur. habent hæc omnia coagulū propter lactis crassamentū. carent quibus singuli uentres, quod eorū lac tenue sit. quam ob rem cor nigerorū lac spissatur, mutiorū nequaquā. lepori coagulū sit, quoniam herbas succi lactis pascitur, talis enim humor lac in uentriculo infantū stringit, facitq; colostrum. Cur coagulū in omaso multiuentriū consistat, explicatum in problematibus est.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE PARTIBVS ANIMALIVM ET EARVM CAVSIS,

LIBER QVARTVS, INTERPRETE
THEODORO.

*Viscera & uentrem, ceteraq; superius exposita in quadrupedibus ouiparis, & ijs quæ pedibus
carent, eodem modo haberi, at in nonnullis alijs differri. Caput I*



ISCERA, uenter, & reliquæ quas exposuimus partes, modo eodem in quadrupedibus ouiparis, & in ijs quæ pedibus carent, ut serpentibus, habentur. natura enim serpentū cognata ijs est: quippe quæ similis sit lacertæ prælongæ, ac expedit. his uero & piscibus omnia similia sunt, nisi quod pulmo serpentibus datus est, quoniam terra utantur. pisces eo carent, & branchias uice pulmonis fortiuntur. Vesica nec piscibus, neq; eorū ulli quæ modo dixi, adiuncta est, nisi testudini. humor enim ijs in cordem regente, ut auibis in pennas absumitur, cum exiguo potu cōtenta sint, propter exanguem pulmonis naturam. & quidem excrementū alui ijs quoq; omnibus albicat, quem a modum auibis. itaq; ijs quæ uescicam habent, exempla urina, salsugo quædam terrena in uasis subsidet. quantum enim dulce & potulentū sit, in carnem præ sua leuitate absumitur. uiperæ inter serpentes eadem a cæteris sui generis differentia discerpant, qua inter pisces cartilaginea a cæteris sui generis. Nam & cartilaginea, & uiperæ animal ædum in lucem, ubi primum intra se oua pepererint. uentres singulos hæc quoq; omnia habent, ut cætera quæ utrinq; dentata sunt. lienem etiā admodum paruū, ut cætera quæ carent uesica. serpentes propter corporis formam, quæ longa est & angusta, speciem quoq; uiscerum habent prolixiā, & cæteris animalibus dissimilem, ut quam ad sui corporis opificium, quasi formulam effigiatam fortiantur. uentri, lactes, & intestinorū naturā, atq; etiā septum, & cor, omnia animalia sanguine prædita obtinent. Pulmonē atq; arteriam omnia præter pisces, situm etiā arteriæ, gulæq; omnia quibus hæc data sunt, similem tenent propter causas supradictas.

Quam ob causam animalium alia fel habeant, alia non.

Caput II



Etiam habet maior pars animalū, quibus sanguis: idēq; aut in iecore, aut intestinis sepositum, ut quod suam naturā non minus aluo familiarē habeat. hoc ita esse maxime in piscibus constat. Cum enim pisces fel habeant omnes, tum magna ex parte suis intestinis annexum continent. nonnulli etiā toto intestino prætextum, ut amia. Necnon serpentum pars maxima eodem modo habere cernitur. quā ob rem qui fellis naturā sensus alicuius gratia esse opinātur, non recte sentiunt. uolunt enim ideo fel adesse, ut partē animæ sitam in iecore mordendo excitet, laxando exhilaret. Quardā felle omnino carent, ut equus, mulus, asinus, ceruus, dama. camelus non discretum, sed uenulis quibusdā confusum habet, uirulus etiā marinus caret, & inter pisces ma-

rinos delphinus. Sunt & quæ partim habeant, partim non habeant eodem in genere, ut in ures, quod idem homini etiam accidit. aliqui enim fel in iecore habere uidentur, aliqui carent. itaq; de toto genere ambigitur. qui enim alterutrum compere-
rint, idem omnibus tribuunt, quali omnes eodem habeant modo, quo aliqui. hoc
idem ouibus etiam caprisq; euenit. pars enim earum maxima habet fel: & quidem
terrīs quibusdam adeo large, ut exuperantia prodigij loco habeatur, ut in Naxo. sed
alijs quibusdam locis omnino careat, ut apud Calchidem Euboicam parte quadam
agri. Ad hæc, piscium fel (ut dictum est) longe remotū à iecore est. Anaxagoras et-
rore opinari uidetur fel esse morborū causam acutorū. cum enim abundat, aspergi
in pulmonem, & uenas, & costas asseuerat. ijs namq; ferē accidunt ea uitia animalis
bus, quæ felle carent. dissectis etiam id pateret, si ita esset. Ad hæc, copia humoris,
quæ per abscessus decumbit, conferri non potest cum eo, quod ex fellis concepta-
culo aspergatur. Sed enim ut bilis, quæ qualibet alia corporis parte gignitur, excre-
mentum quoddam liquamentūq; est, sic fel iecori adiunctum non rei cuiquam de-
legatur, sed excrementum esse uidetur, quomodo & alui, intestinorūq; sedimen.
Attamen natura cōmode uel excrementis suis interdum abutitur. sed non prop-
tea querere omnia alicuius causa debemus. cum enim aliqua eiusmodi sint, sit, ut
alia complura necessariō causa eorum proueniāt. Quibus igitur iecoris constitutio
salubris est, & sanguinis natura quæ iecur subeat dulcis accedit, hæc aut nullum fel
suo in iecore habent, aut uenulis quibusdā inclusum continent. aut partim habent,
partim non habent. quam ob rem iecinora eorū quæ felle uacant, dulcia sunt, pro-
beq; colorata propē dixerim omnium. particula etiam iecoris quæ felli subdita est
dulcissima est. at uero quæ sanguine minus puro consistunt, hæc excrementū id
quod fel appellamus, semouent. excrementū enim contrarium alimento esse uult,
& amarum dulci. & sanguis integer dulcis est. fel igitur non alicuius gratia, sed pur-
gamentum atq; inutilem esse materiam constat. quam ob rem pulchre à ueteribus
dicitur illis, qui causam, cur diutius uiuatur, fellis uacuitatem esse aiunt: argumento
ex solipedum, ceruorumq; genere deducto. hæc enim & felle uacant, & diu uiuūt.
Quinetiam ea quæ illi non uiderint felle carere, ut delphinus, ut camelus, longæua
sunt. iecoris enim naturā ut opportunā ac necessariā omnibus sanguineis animalis
bus causam pro sua qualitate asserre, uiuendi plus minus uel temporis ratio est. ex-
crementū etiam tale huius uisceris esse, cæterorū autem nullum, ratio exigit. Cordi
enim nullus eiusmodi humor appropinquare potest: quoniam illud affectum nul-
lum patitur uiolentum. cæterorū autem uiscerū nullum necessariū animalibus est,
nisi iecur. absurdum autē sit, nisi ubicunq; pituitam, aut alui sedimen uideris, excre-
mentū id esse putes. pariq; modo de bile fellēue censeas, sed locis discrimen elicere
uelis. At de felle quam ob causam alia habeant, alia non habeant, satis dictum est.

De omento, & eius orbe, & officio.

Caput III



Estat ut de laetibus, & omento differamus. hæc enim hoc in loco, &
cum intestinis continentur. Omentum membrana est aut feuosa, aut
adiposa, scilicet utro modo pinguescere animal solet. Quenam disse-
rentia inter hec sit, dictum iam est. oritur id de medio uentre, tam uni-
uentri, quam multiuentri generi, qua ueluti futura describitur. inest
enim & in uentre, ut in corde futuræ uestigiū quoddam, unde omentum exor-
sum reliquā uentris partem, cunctaq; intestina complectitur in omnibus sanguine
præditis, tum terrestribus, tum aquaticis animalibus. ortus omenti talis necessarius
euenit. cum enim sicca aut humida miscella calefcit, ultimum semper cutis membra-
næ uel speciem recipit. hic autem locus plenus alimenti eiusmodi est. Item propter
membranæ

membranz densitatem quod sanguinei alimēti transmissum, colatumq; est, id pingue esse necesse est. tenuissimum enim hoc est, & calore loci istius concoctum pro carnosa & sanguinea coagmentatione in seuum aut adipem euadere necesse est. Omentum ratione hac gignitur. sed natura eo abutitur ad cibi meliōre concoctionem, ut facilius celeriusq; cibis concoquatur. calor enim uim habet concoquendi. pingue autem calidum est, & omentum pingue est. itaq; de medio uentre oritur, quoniam reliquam uentriculi partem secus insidens fouet, hæc de omento.

De lactibus, & eorum ortu, & quam ob causam animalibus sanguine præditis data sint.

Caput IIII

10



Quod autem lactes uocant, membrana & ipsum est, pertendens continua de intestinorum tenore ad uenam usque maiorem, & aortam, plena uenarum multarum atque frequentium, quæ ab intestinis ad uenam maiorem, aortamq; permeant. Ortum eius similiter atque cæterarum partium necessario esse comperimus. Sed quam ob causam data sit animalibus sanguine præditis, considerandum est. cum enim necesse sit, ut animalia cibum extrinsecus capiant, rursusq; ex hoc alimentū fiat, quod in omnes corporis partes digeratur. quod in exanguibus nomine uacat, in sanguineis sanguis appellatur. ideo aliquid adesse oportet, quo tanquam radice cibis de uentre ad uenas deferatur. Itaque ut stirpes radicibus terræ innixæ cibum inde hauriunt,

20

sic animalibus uenter & intestinorum uires pro terra sint, à quibus capiant alimentum. quam ob rem lactes sunt, uenas sibi inditas habētes quasi radices. Sed cuius rei gratia lactes habeantur, dictum iam est. Quemadmodum autem capiant alimentum, & quoniam pacto per uenas ex alimento ingesto subeat eas partes, quod in uenas digeritur, explicabitur, cum de generatione alimētoq; animalium agemus. Sed enim ut animalia sanguine prædita constant partibus, quæ declaratz adhuc sunt, & quas ob causas, dictum iam est: sequitur quod & reliquum est, ut quæ ad generationē pertinent, quibus fœmina differat à mare, exponamus. Sed quoniam de generatione tractandum est, de ijs quoq; tunc differere, cum de illis tractamus congruum est.

30

Mollia, crustacea, testata, & insectorum genus omnibus supradictis membris carent: de q; ijs, quæ uice eorum funguntur.

Caput V



Væ autem mollia, quæq; crustata uocantur, plurimum ab ijs quæ explicauimus differunt. iam enim omnem uiscerum naturam ea nō habent, nec ulla ex reliquis quæ sanguine carent. quæ duo genera sunt, alterum quod testa contegitur: alterum quod insectum uocatur. sanguinem enim ex quo uiscerum natura cōstat, nullum ex ijs obtinet.

40

quoniam affectus eiusmodi quidam eorū essentiz proprius est. etenim sanguinem alia habere, alia non habere in ratione recipitur, quæ essentiam eorum definiat. nihil etiam ex ijs, quorum gratia uiscera habent animalia sanguine prædita, datum eiusmodi animalibus est. non enim uenas hæc habent, non uescam, non usum spirandi, sed unum quod cordi proportionetur, id habeant necesse est. uis enim animæ sentiendi, uitæq; causa, parte aliqua corporis principium animalibus omnibus est. At uero partes ad uitum pertinentes ea quoq; omnia necessario habent, quamquam uarie, propter loca quibus cibū recipiant. habet mollium genus parte, quod os uocatur, hinos dentes: atque in ore pro lingua carnosum quiddam, quo uoluptatem esculentorum discernat. Crustata etiā pari modo binos dentes habent priores, & carnosum illud quod linguz proportionetur. necnon testata omnia partem eiusmodi habēt eadem causa, qua sanguinea, uidelicet ad cibum sentiendum.

S

Quoniam etiam insecta simili ratione, aut promuscidem habent ore prodeuntem, ut apum, muscarumque genus, ut dictum iam est: aut in ore condiam partem eius modi possident, ut formicæ, & si qua alia sint generis eiusdem. Dentes quædam ex ijs habent, quanquam diuersos, ut apum, muscarumque genus: quædã non habent, quæ cibo utantur humido. Insectorum enim complura non uictus, sed armorum gratia dentes obtinent. Testatorum autem quædam, ut principio diximus, linguam appellatam habent robustam. Conchæ dentibus etiam binis fulciuntur, ut cruitata. Stomachus siue gula ab ore prælonga mollibus est, quam ingluuius excipit, quomodo auiibus, tum uenter cõiungitur, & intestinum uentri annexum, simplex usque ad exitum tẽdit, sepijs igitur & polypis uenter similis tum figura, tum tactu est. At ijs quas lolligines appellamus, bina quidem conceptacula uentris speciem gerunt: sed alterum minus ingluuiem imitatur, & tactu discrepat. quoniam corpus etiam totum carne molliore constat. habet hæc ita eas partes eadem causa, qua a ues. neque enim eorum ullum potest commolere cibum. itaque ingluuius uentri præiacet. Habent etiam præsidij salutisque gratia quod atramentum uocatur, tunica contentum membranea, exitum finemque habens, quæ alui excrementa emittunt, parte quæ fistula uocatur, quæ in supinis posita est, sed cum atramentum hoc mollia habeant omnia, tum præcipue, plurimumque sepia continet. quoties enim metu perterretur, hoc effuso humore aquam insulcant, sibi que nigrorem septum proponunt, & turbulentiam quasi quo se abscondant. habent hoc atramentum lolligines, & polypi supra apud mutum potius positum: sepiæ infra ad aluum. copiosius enim habet, quoniam magis utantur, quod ijs propterea euenit, quia uitam littoralem traducunt, & tamen nihil quo sibi auxilientur aliud habent, quomodo polypi & brachijs sibi sufficiunt, & coloris mutatione, quæ & ipsa accidit ei per metum, ut effusio atramenti. lolligo sola ex ijs gaudet alto, uitamque pelagicam agit. sepia igitur plus continet atramenti, & infra, quoniam copiosius. facilius enim & longius profundere maiori ex copia poterit. sit in hoc genere atramentum, ut in auiibus, quod per excrementum album terrenum subsidat. nam id quoque caret uesica, quantumque terrenum maxime sit, in atramentum seceruitur. & plurimum sepiæ consistit, quoniam plurimum terrenæ materiæ habeat. argumento sepium est, quod tale tantumque sit. hoc enim polypus caret, lolligo cartilaginofum ac tenue gerit. Quam ob causam hoc alia habeant, alia careant, qualeque in utroque habeatur genere, dictum iam est. Sed cum exanguia sint, & ob eam rem refrigerata & pauida, hinc, ut hominum nonnullis per metum funditur aluus, aut excrementum uesicæ profluit, sic ijs accidit quidem necessarium, ut metu perculsa effundantur. Sed natura hoc excremento ad præsidium & tutelam eorum abutitur. Crustata etiam tum locustacea, tum cancri, binos dentes habent primores, & inter dentes carunculam linguæ effigie illam, ut dictum iam est: tum stomachum ori continuo iunctum, exiguum proportionem suorum corporum magnitudinis. hunc excipit uenter, in quo locustæ & cancrorum nonnulli dentes alios habent, quoniam superiores illi secare non satis queant. hinc intestinum simplex usque ad exitum excrementi dirigitur. Quinetiam singula testatorum genera has easdem obtinent partes, sed alia explanatius, alia obscurius: quanquam maiora conspectum earum præbeant euidentiorum. Cochleæ igitur & dentes præduros acutosque habent, ut dictum iam est, & quod interfacet dentibus, carnosum similiter, ut mollia & crustata. promuscidem etiam, ut dictum est, inter aculeum & linguam. Ori autem iungitur quasi ingluuius auium, a qua stomachus est, quem excipit uenter. in quo situm est quod papauer uocatur, mox intestini continuum tenet simplex, originem a papauere illo ducens. in omnibus enim testaceis inest hoc excrementum, quod uel esculentum esse præcipue sentitur. Cætera etiam turbinata, ut

ut purpuræ, buccina, similiter ut cochleæ constant. Sunt testatorum genera plura, alia enim turbinata sunt, ut ea quæ modo dixi, alia biualuia, alia uniuualuia, sed turbinata quoque biualuibz quodammodo assimilantur, quippe quæ omnia operculo quodam cogenito, carni patulæ appposito clauduntur, ut purpuræ, buccina, naticæ, & reliqua generis eiusdem. idque prædij causa, quæ enim testa non protegit, facile offendi posset ab ijs quæ extrinsecus inciderent. Cæterum uniualue genus, quod saxis testa in dorsum data adheret, feruari potest, siquæ alieno sepio quodammodo biualue, ut quæ patellæ uocantur. Biualue se concludendo tuerit, ut pectines, ut mituli, turbinatæ crusta illa prætenut, quæ à fronte integitur, quasi biualue ex uniuualui efficitur. Echinus omnium maxime à natura munitus est: quippe qui testa undique spinis frequentibus circumuallata celetur, quam rem peculiarem hunc in genere testato sortiri diximus. Natura autem crustatorum contrâ, quàm mollium constat. Altera enim carnis mollitiâ extrâ habet: altera intrâ, hinc foris terrenam duritiâ obtinet, quamquam echinus nihil habeat carnis. Igitur cætera quoque testata omnia, ut dictum est, habent & os, & linguæ effigiem, & uentrem, & ostium excrementi, sed interest firu & magnitudine, quæ singula quemadmodum se habeant, ex commentatione, dissectioneque animalium petendum est. quædam enim ratione, quædam cõspectu ipsorum potius declaranda sunt. Echini, & eorum quæ uerubula siue tubera appellauimus, genus, peculiari modo præ cæteris constant testatis. Habent echini dentes quinos, & carunculâ interpositam dentibus illam, quæ in omnibus

supradictis est, cui stomachus iungitur, ab hoc uenter in plura diductus, perinde ac si plures numero uentres hoc animal habeat. Sûnt enim omnes distincti, pleni que uacantis materiæ, ex stomacho uno dependet, in unumque ostium excrementi finiunt, caro, ut dictum est, nulla est circa uentrem: sed quæ oua appellantur numerosiora testæ adherent, membranulis singula obuoluta, & paribus distincta interuallis, nigræ etiam quædam circum ab ore fusim sparguntur, nomine adhuc nullo appellata, sed cum non unum, sed plura genera echinorum sint, omnium partes quidem eas omnes sortiuntur, sed oua appellata, nec omnes cibo idonea, & parua admodum continent, exceptis ijs qui uada incolunt, omnino id ipsum cæteris quoque testatis euenit, caro enim non æque omnium esculenta est, & excrementum, quod papauer

uocatur, quibusdam cibo idoneum, quibusdam non idoneum est. continent hoc turbinata omnia sua clauicula: uniuualuia suo fundo, ut patellæ: biualuia quæ nodo ligantur, quod autem ouum uocatur, latere dextro biualuia habent, altero latere ostium excrementi continent. Sed errore ouum id uocatur, quippe quod tale sit, quale est pingue in sanguineo genere, cum uiget, quam ob rem fieri solet per id tempus anni quo uigent, scilicet uere & autumnio, laborant enim testata omnia per frigus & æstus, atque exuperantiam temporis pati nequeunt, argumento est, quod echinis euenit, habent enim id iam inde ab ortu naturæ, & plenilunij uberior: non quia per id tempus copiosius pascuntur, ut quidam putant, sed quod noctes tepidiores sint propter lucem pleniorum. Calorem enim desiderant, quoniam frigori patent, utpote quæ sanguine careant. ex quo fit, ut æstate potius ubique uigeant, præterquam in Pyrensi Euripo, nam ibi non minus tempore hyberno probantur. Cuius rei causa est, quod tunc uberior pabulentur, cum pisces per id tempus ea loca relinquunt. Habent echini omnes oua eodem numero, atque impari omnes, quia enim, dentes etiam, uentresque totidem. Ratio, quod non ouum est, quod ouum uocatur, ut modo dixi, sed quod bona animalis enutritione alimoniamque proueniat. Fit ostreis quidem in altero tantummodo latere, id quod oui nomine appellatur: idemque est, quod echinos habere dicimus, sed cum testa echini non modo cæterorum ostreorum orbem colligat unum, sed in globum circumagatur, ut non partim talis, partim

non talis formetur, sed usquequaq; similis sit (undiq; enim in se nutibus suis con-
 batur) idcirco ouum quoq; simili modo habeat necesse est. nō enim ambitu, ut cæ-
 tera, dissimili constat echinus. namq; ijs omnibus caput in medio situm est. quam
 quidem corporis partem situm tenere superiorem certum est. Nec uero ouum ha-
 bere continuum potest, quando neq; cætera generis eiusdem sic habent, sed altero
 latere tantum sui orbis. Ergo cum id commune omnium sit, proprium autē illius,
 ut globi speciem gerat, oua numero impari sint, necesse est. nam si pari essent, per
 diametrum disposita haberentur, cum similem hinc atq; inde seruari rationem in-
 terualli conueniat. Sic autem dispositis utroq; latere orbis ouum haberetur, quod
 in cæteris ostreis non est. altero enim latere suæ oræ id habet, & ostrea & pectines. 10
 itaq; terna, aut quina, aut quolibet alio numero impari esse necesse est. At si terna
 essent, diducta inter se laxo admodum interuallo haberētur. si plura quā quina,
 continuum propē ouum redderetur. quorum alterum nō melius est, alterum fieri
 non potest. Quina igitur oua echinos habere necesse est. quam ob causam uenter
 quoq; quinquepartitus est, & dentes totidē habētur. singula enim oua, cum quasi
 corpora quædam animalis sint, modum quoq; uiuendi similem habeāt necesse est.
 hinc enim capitur incrementum. nam si uenter unus tantummodo esset, oua aut
 longe distarent, aut totum alueum occuparent, ut echinus, & difficile moueretur,
 & cibi minus impleretur. Cum autem quinque numero interualla sint, uentrē sin-
 gulis adiunctum quinquepartitum esse necesse est. eademq; de causa dētes etiam 20
 totidem habētur. ita enim natura similem rationem prædictis membris reddiderit.
 Sed quam ob causam oua numero impari, totq; numero echinus habeat, dictū est.
 Cur autem alij parua admodum, alij magna, causa est, quod natura constant alij
 alijs calidiore, calor enim cibum concoquere plenius potest. quam ob rem qui cibo
 inutiles sunt, in ijs excrementi plus est. mobiliiores etiam facit natura caloris ut pa-
 scantur, nec stabiles maneāt. cuius rei indicium est, quod eorum spinis aliquid sem-
 per adhæreat, tanquam crebro moueantur. spinis enim ut pedibus utuntur. Ver-
 tribula autem parum sua natura à plantis differunt, sunt tamen spongij uiuaciora:
 quippe cum spongiæ uires habeāt plantæ. natura enim continue ab inanimatis ad
 animalia transit per ea quæ uiuant quidem, sed non sint animalia, ita ut parum ad 30
 modum differre alterum ab altero uideatur, propter suam propinquitatem. Spon-
 gia igitur, ut dictū est, cum adhærendo tantum uiuere possit, absoluta autem ne-
 queat uiuere, similis plantis omnino est. Quæ autem tubera uocant & pulmones,
 atque etiam plura eiusmodi alia in mari, parum ab ijs differūt sua ipsa absolute.
 uiuunt enim sine ullo sensu, perinde ac plātæ absolutæ. nam & in terrestribus plan-
 tis sunt nonnulla eiusmodi, quæ & uiuant & gignantur, aut in alijs plantis, aut ab-
 soluta, quale etiam est quod modo Parnasus fert, uocatum à quibusdā epipetrum.
 hoc enim diu uiuere potest suspensum. Et ueribulum igitur, & quicquid generis
 eiusdem simile plantæ est, quia adhærendo tantummodo uiuit, sed cum aliquid ha-
 beat carnis, sensum aliquem habere uideri potest. itaque utro nam modo statuen- 40
 dum sit, incertum est. habet hoc animalis genus duo foramina, rimamq; unam, qua
 recipiat humorem cibo accommodatum, & qua rursus emittat quantum humoris
 remaneat, nihil enim excrementi ut cætera crustata hoc se habere ostendit. ex quo
 sit potissimum, ut & hoc, & quicquid simile in animalium genere est, planta in re
 appellari possit. Nec enim planta ulla habet excrementum. præcingi uero per me-
 dium tenui quadam membrana in qua uitæ principatus sit, ratio cōgrua est. Quas
 autem urticas appellant, non testa operiuntur, sed exclusæ omnino sunt ijs, quæ
 in genera diuisimus. anopiti natura hoc genus est, ambigens & plantæ, & animali.
 absolui enim, & escam petere nonnullas, & sentire occurrentia posse, atque etiam
 asperitate

asperitate corporis uti, ad se tuendū animalis est. At uero quod imperfectum sit, & faxis celeriter adhæreat, nec aliquid excrementi emittat manifeste, quanquam os habeat, plantarum generi simile est. Stellarum etiam genus simile est, quippe quod concharum complures aggrediens exugat. Ratio eorum, quæ inter exanguia ab soluta uiuant, ut mollium crustatorumq; eadem atque testatorum est, partes igitur ad cibum accommodatas, quas omnibus inesse necesse est, eo quo explicauimus modo sese habent. Sed habeant certe illud quoque oportet, quod ei parti proportionetur, cui sentiendi principatus in sanguineo genere mandatus est. hoc enim in omnibus animalibus inesse necesse est. Ergo mollibus, id membrana cōiunctur hu midum, per quod gula in uentrem pertēdit, admota potius tergo, mutis id a non nullis uocatur. Crustatis etiam tale quid alterum adiunctum est, quod & ipsum mutis nomine appellatur. humida, corpulētaq; ea pars est. tendit per eam mediam, ut modo diximus, stomachus siue gula. Nam si inter eam & tergum positus esset, distendi æque nō posset cibo ingrediente, propter dorsi duritiem. intestinum a mure natura semouit, extracq; posuit, & atramentum intestino annexuit, ut quamplurimum distaret ab aditu, & pars sordida a nobili, & principe procul haberetur. partem hanc cordi proportionari & situs ipse ostendit, cum idem sit & dulcedo humoris, tanquam concocta, & sanguinea quadam. In crustatis etiam eodem modo sentiendi principatus habetur, sed minus patet. attamen in medio semper quærendum hoc principium est, aut scilicet inter partes, quæ cibum recipiunt, & quæ excrementum emittūt, si fixa degunt: aut inter dextram partem & sinistram, si incessilia sunt. Insectis principij eiusmodi pars, ut antè diximus, inter caput & alueum est, quæ etsi magna ex parte simplex est, tamen nonnullis multiplex est, ut iulis, & similibus prælongis. quo fit, ut præcisa uiuere possint. natura enim partem hanc simplicem, unamq; tantum facere in omnibus uult. itaque ubi potest simplicem facit: ubi non potest, multiplicem. idq; in alijs minus, in alijs magis apertum est. partes autē quæ cibum administrant, non pari ratione datæ omnibus sunt, sed plurimum differunt. quibusdam enim in ore est, quod aculeus appellatur, quasi compositum, & unā linguæ ac labiorum obtinens potestatem, quibus autem aculeus non parte priore habetur, ijs intra dentes tale sensorium continetur, idq; excipit intestinum rectum, simplex ad ostium usque excrementi porrectum. quibusdam hoc reortum in anfractum est. Sunt etiā quæ uentrem ori adiunctum, intestinumq; a uentre reuolutum habeant, ut quæ edaciora maioraq; sunt, conceptaculum cibi obtineant copiosioris. Genus cicadarum peculiarem maxime omnium istorum naturam sortitum est, quippe quod partem eandem in usum tum oris, tum linguæ constitutam aptissime habeat, qua ueluti radice cibum ex humoribus trahat. nempe omne insectorum genus minimo alimento contentum est, & propè sibi ipsa sufficiunt, non tam corporis exiguitate, quàm frigiditate. quod enim calidum est, cibum & desiderat, & concoquit citò. contrā quod frigidum est, cibo carere facile patitur. sed omnium maxime cicadarum genus lesunum est. satis enim ijs alimentum est humor, qui in corpore remanet: sicut animalibus Ponticis, quæ non diutius quàm diem unum uiuere queunt, quanquam illis uita die uno perquam breui temporis spacio describitur. ijs plus temporis datur, tamen id quoque breue est. Sed cum de partibus animalium interioribus dictum iam sit, ad reliquis exteriores redeundum est, incipiendumq; non unde digressi sumus, sed ab ijs ipsis, quæ modo exposui, ut ijs expeditis quæ moram exigunt breuiorem, amplius in genere animalium perfectio, & sanguine prædito immoremur.



Rgo insecta animalia quamquam non partibus numerosis constant, tamen ipsa inter se dissident. quippe quæ cum omnia multos habeant pedes, quoniam contra ariditatem frigiditatemque naturæ eorum numerus exauctus pedum motionem efficiat faciliorem, tamen uarie numerum hunc sortiantur. quæ enim plurimum pro sui corporis longitudine frigent, numero præcipue superant, ut iulorum genus. Quinetiam quod principia plura habeant, hinc & infectiones sunt, & numerus pedum proinde augetur. quibus autem pedes pauciores, hæc uolucres sunt, ut pedum inopia adiuu-
 10 to pennarum compensetur. Ipsarum autem uolucrum quæ pascuis uiuant, & pa-
 buli causa necesse habeant euagari, hæc quadripennes sunt, & corpulentiam habent
 leuiorem, ut apes, & reliqua generis eiusdem, binas utroque sui corporis latere pen-
 nas gerunt. At uero quæ corpore exiguo sunt, bipennes constant, ut genus mu-
 scarum. Quæ autem parua sunt, & uitam stabilem agunt, multis fulciuntur pen-
 nis, ut apes: & crusta pennas obiectas gerunt, uelut galleruæ & cætera id genus
 insecta, scilicet ut pennarum uires integras tueantur. Cum enim stabilia sint, cor-
 rumpi facilius possunt, quam quæ motu citantur agiliori. itaque septo proposito mu-
 niuntur. Quinetiam penna eorum caret & fissura, & caule. non enim penna, sed
 membrana cutis æmula est, quæ præ siccitate necessario absoluitur corpore eorum,
 20 cum carnis portio frigeat, insecta autem sunt, tum ob causas prædictas, tum etiam
 ut sese tuto inflexu seruire possint. conglomerantur enim quæcunque ex ijs pro-
 lixo corpore sunt, quod effici nisi insectis non posset. Quæ autem glomerari ne-
 queant, contrahunt se in incisuras. quod patet, cum tanguntur, uelut ea quæ can-
 thari uocantur. ubi enim metuerint, motu cessant, totoque corpore indurescunt. in-
 secta uero hæc esse necessariū propterea est, quod in eorum essentia inest, ut multa
 principia habeant. eaque ratione sanè plantis assimilantur. ut enim plantæ ipsa quoque
 præcisa uiuere possunt, sed hæc aliquandiu, illæ uel perfici possunt, ac diu ex una
 atque etiam plures numero procreantur. aculeis etiam armantur non nulla insecta
 contra animalia noxia. geritur aculeus alijs parte priore, alijs posteriore. aut enim
 30 ore, aut aluo extrema. nam ut elephantis pars delegata odoribus comoda etiam
 tum ad pugnandum, tum ad cibi usum habetur, sic insectorum quibusdam lingua
 pluribus officijs fungitur. quippe quæ & cibum sentiat, suscipiat, admoveatque, &
 defendat contra aliorum iniurias. Quibus autem non in ore aculeus, hæc dentes
 habent, cibi scilicet aut conficiendi, aut capiendi, ad mouendique gratia, ut formicæ,
 ut apes. At uero quæ aculeo in aluo armata sunt, hæc ut animosa aculeum pro ar-
 mis obtinere, qui intra aluum conditus est, ut in apibus, & uespis, quoniam uolu-
 cres sunt. nam si prætenuis fragilisque aculeus extra pateret, facile corrumpetur.
 Sed si ut in scorpione distaret, onus ira afferret, scorpio profecto quod non uolatu,
 sed gressu se moueat, caudamque sortitus sit, aculeum caudæ adiunctum gerat, uel
 40 inutilem ad pugnam habeat, necesse est. Nulli aculeus in aluo cui pennæ binæ, quod
 enim imbecilla paruaque sunt, ideo binas habent. quippe cum uel a paucioribus ef-
 ferri possint quæ parua sunt, quod idem causæ est etiam cur aculeus parte priore
 geratur. cum enim imbecilla sint, uix parte priore ferire possunt. At uero quæ plu-
 ribus pennis prædita sunt, quia auctiora sunt, merito penas plures obtinere, par-
 teque posteriore ualent. instrumentum autem non idem ad usus dissimiles haberi si
 fieri potest, sed ad defendendum acutissimum, ad gustandum fungosum, & cibi attra-
 hens melius est. Vbi enim licet duobus uti ad duo opera, nec aliud impeditur, nihil
 tale natura facere solet, quale per inopiam ars excusoria obeliscolychnium ex ueru-
 lucernaque

lucernaꝝ cōponit. attamen id si fieri nō potest, eodem ad plura opera abutitur. Pedes priores nonnulla ex ijs longiores ideo habēt, ut quoniā propter oculorum duriciam non exquirit cernant, cruribus ijs longioribus abstergant incidentem molestiam, arque arceant. quod & facere muscas uidemus, & apes, & reliqua generis eiusdem. semper enim prioribus cruribus uallant & protegunt. posteriora medijs longiora sunt, ut ambulēt melius, & arollantur facilius de terra, cum auolare libet. quod planius ea ostendūt quæ saliant, ut locustæ, ut culices. cum enim inflexa rursum connixa extendunt, atollī de terra necesse est. Locustæ nō parte priore, sed posteriorē habent crura illa ad gubernaculorum effigiem condita. suffraginem enim intus flecti necesse est. quod nulli crurum priorum datum est. omnibus his senipedes, ijs etiam, quorum enixu saliant, connumeratis.

De partibus testatorum exterioribus.

Caput VII



Estatorum corpus non multiplex est. cuius rei causa est, quod eorum natura stabilis est. Quæ enim mobilia sunt, hæc plures habent partes necesse est. quoniā actiones eorū sunt, & officia. plura enim desiderant instrumēta ea, quæ plures motiones exercēt. Ad hæc, aut omnia non immobilia sunt, aut parum motus adipiscuntur. uerum natura consulens eorum salutē, duritiæ testæ obduxit. Sunt alia uniuersalia, alia bialuia, alia turbinata, ut dictum iam est. turbinati eū generis, alia in anfractum intorta sunt, ut buccina. alia in globum tantum circumacta, ut echinorum genus, necnon bialuium. alia referantia sunt, ut pectines, & mituli. ab altero enim latere nodo ligantur, quædam utroque latere connexa sunt, ut unguium genus. Habent omnia testata caput infra, plantarum modo. cuius rei causa est, quod cibum de imo capiant, ut plantæ radicibus suis hauriunt. itaq; ijs usu euenit, ut inferiora habeant suprà, superiora infra. membrana obducit, quæ portio potulenta humoris transmissa liquataꝝ cibo assumitur. nullum ex ijs est quod capite careat. Cæteræ corporis partes nomine uocant, præter eam quæ cibum recipit.

De exterioribus partibus crustæ interiorum.

Caput VIII



Rustata omnia ingredi possunt: itaq; pedes complures obtinuerunt. Summa eorū genera quatuor numero sunt, locustæ, gāmari, squillæ, cancri. quæ singula in plures species distinguuntur. quæ nō modo forma, uerū magnitudine etiā multū inter se differant. alia enim magna, alia parua admodū sunt. Genus igitur cancrarū & locustarū similia inter se sunt, eo quod utrunque brachia forcipibus denticulatis habeat. sed hæc non ingrediendi causa habentur, sed ut ijs quasi manibus capiāt & retineāt. quam ob rem contrā quā pedes ea flectere solent. hos enim in cauum, illa in orbem flectunt & circumagūt. sic enim ad cibum capiendum ad mouendumq; cōmodius agitur. Sed interest, quod locustæ caudam habent, cancri nō habent. locustis enim ut nanobus cauda utilis est. natat enim cauda, quasi remo innitēdo. At cancris inutilis est, quoniam uitā agere terrenam, cauernasq; subire soleant. qui tamen ex ijs pelagi sunt, ij pedes habent longe retardiores ad ambulandum. sunt enim cæteris ipsi nantiores, ut maie, & qui heracleotici appellantur. crura ijs breuia, quia parum mouētur. sed salus eorum beneficio crustæ firmioris contingit. itaq; maijs crura tenuiora, heracleoticis breuiora. Cancelli autē, qui perquam exigui in pisciculis reperiuntur, pedes nouissimos latiusculos habent, ut ad nandum utiles sint, quasi pro pinnulis, aut remis pedes haberēt. Squillæ à cancrario genere differūt, eo quod caudā habeāt. à crustario uero, quod forcipe careant, idq; quoniā plures habeant pedes. eō namq; redundantia illa absumitur. pedes obtinēt plures, quod nō magis ad nandū, quā

ad ingrediendū sint suapte natura propēiores, partes supinas & capitis ita habent, ut alteræ ad accipiendā reddendamq̃ aquam branchiarū specie cōditæ sint; alteræ planiores tabellatiorēsq̃ in foeminis crustati generis omnibus, quā in maribus consēt. & interiora uero operculi applicati hirtiora, amplioraq̃ foeminæ cancri habent, quā mares, quoniam oua in ea ædunt nō procul ut pisces, & cætera quæ parere solent. quo enim ampliora sint, eo locum ouis præstare poterunt capaciorē. Locustæ cancriq̃ omnes forcipem dextrū grandiorē, ualentiorēq̃ habent. Parte enim dextra efficaciora suapte natura sunt animalia omnia. reddī autē semper à natura cuiq̃, uel soli, uel præcipue, id quo uti potest: ut dentes, eosq̃ aut exertos, aut serratos, aut cōtinuos, & cornua & calcaria, & reliquas eiusmodi partes, quarū usus 10 ad defendendū aut dimittendū. Gammari soli non certū, sed alterutrum æque, ut fors tulerit, forcipē habent grandiorē, tam mares quā foeminæ. causa autē cur forcipem habeāt, quod ex eo genere sint, quod forcipem habet, cur alterum grandiorē incerte, quod nō integram sui generis naturā tenet, sed ita degenerat, ut quod ad aliud destinari est, eo nō eodem, sed ad gressum utatur. Quisnam situs partium singularū sit, & qua differentia inter se discrepent, & quo mares cum foeminis differant, ex commentatione dissectionēq̃ animalium petendum est.

De partibus exterioribus mollium animalium, & sanguine carentium.

Caput IX



Ollium partes interiores antē, cum cæterorū exposui. nunc exteriorum ordinem persequemur. habent hæc foris aluei corporis indistinctum, & pedes parti priori iunctos circum caput, infra oculos circa os & dentes. sed cum cætera animalia quibus pedes, aut parte priore posteriorēq̃ eos habeant, aut latere, ut ea quæ multis pedibus innituntur, & sanguine carent, hoc unum genus pedes parte, quam priorē in eo capimus, omnes continet. cuius rei causa est, quod pars eius posterior ad priorē adducta est, extremaq̃ cōeunt & confunduntur: quomodo turbinatis inter testata accidit. Genus enim testatum omnino partim crustatis, partim mollibus simile est. quā enim foris terrenam portionem, intus carneam habet, crustatis assimilantur. quā autem forma eiusmodi corporis constat, cum mollibus cōuenit omne quodammodo, sed 30 præcipue quæ ex turbinatis cuniculo in anfractum contorquentur. natura enim eorum utrorūq̃ perinde se habet, quasi quis directā lineā (ut in quadrupedum & hominū genere est) primū extrema lineæ parte superiore os situm intelligat, quā, a: mox stomachū, quā, b: tum uentrem, quā, c. deinde intestinū usq̃ in osium excrementi quā, d. hæc ita in sanguineo genere disposita sunt. & caput, pectusq̃ locum obtinent primum. reliqua eorum ipsorum gratia, aut motus causa à natura adiecta sunt, ut priora posterioraq̃ crura. In crustatis etiam insectisq̃ ordo interiorum eodem modo constare uult, sed officiis exteriorum motionum differt à sanguineo genere. At uero mollia & turbinata inter se quidem proxime constant, sed ijs econuerso, finis enim ad principium flectitur, quasi quis lineam efflectendo adducat, d ad a. Cum enim ita partes interiores ijs collocentur, ambra alueus, qui in polypis tantum caput uocatur, qualis in testato genere turbo est, nec aliud interest, nisi quod alteris molle quod ambit, est: alteris duro tegmine carnem natura complexa est, ut seruentur, cum difficulter moueantur. hinc fit, ut excrementum tam mollibus quā turbinatis meatu ori ulcino emittatur: quanquam mollibus infiræ, turbinatis à latere. hæc de causa pedes mollium ita positi sunt, & contrā quā cæterorum. Sepiæ atque lolligines non similes, ut polypi, modo constant: quoniam uim nandi tantummodo habent, cum polypi uel ingredi possint. habent enim sepiæ & lolligines pedes supra dentes senos exiguos, eorumq̃ nouissimos duos maiores.

reliquos

reliquos autem octonorum duos infra omnium maximos. ut enim quadrupedi-
bus crura posteriora firmiora ualidiora^q sunt, ita ijs quoque maximi qui infra ha-
bentur. his enim onus sustinetur, motus^q potissimum agitur, duo etiam illi nouis-
simi maiores suis medijs sunt, quia illis ministrant, polypus medios quatuor habet
maximos. Omnibus igitur his pedes octoni, sed sepijs & lolliginibus breues, poly-
pis magni, alueu enim corporis sepiæ & lolligines habent magni, polypi paruum,
ita^q quod natura polypis ex corpore dempserat, id in pedum longitudinem addi-
dit, quod sepijs & lolliginibus de pedibus abstulerat, eo corporis magnitudinem
auxit, quam ob rem polypis pedes non solum ad nandum utiles sunt, sed etiam ad
10 ambulandum, sepijs autem & lolliginibus inutiles sunt, parui sunt enim, cum al-
ueum habeant magnum, cum itaque pedes habeant breues atque inutiles, ne aestu
maris tempestate^q exturbentur faxis, ut^q de longinquo admoveant, ideo promus-
cides binas prælongas habet, quibus ueluti anchoris innitantur, se^q stabiliant mo-
do nauigij tempestate urgente, uenientur etiam procul, ori^q longinquo admo-
ueant, Polypi promuscide carent, quoniã pedes ad usum eundem commodos ha-
beant, Quorũ autẽ pedibus acetabula circumacta^q adsunt, hæc uim contextum^q
talem habent, qualem implicamenta illa quibus digitos antiqui medici indere sole-
bant, ita enim fibris implexa sunt, quibus carunculas, cætera^q cedentia trahant,
quippe quæ lapsa prehendant, intenta premant & retineant, cum pars interior to-
20 ta contingat at^q amplectatur. itaq; cum aliud non habeant, quo capere admo-
ueat^q possint, nisi aut pedes aut promuscides, hæc pro manibus obtinet ad uim tum
inferendam, tum propulsandam, at^q etiam ad cætera uitæ munera necessaria, sed
cum cætera omnia geminis acetabulis seriem à capite in extremos usque citros ha-
beant ordinatam, genus unum polypi quoddam simplici inspergitur acetabulo,
cuius rei causa ad longitudinem tenuitatem^q brachij referenda est, cum enim an-
gustum sit, simplicis acetabuli ordinem tantũ capiat necesse est, non igitur ita con-
stant, quia id optimũ, sed quia necesse sit propria substantiæ ratione, Pinnulam hæc
omnia habet circumdantem alueum, quæ cum in cæteris, tum in grandium lolligia-
num genere iuncta, perpetua^q gestatur, minores uero quas lolligines uocant, la-
30 tiorem hanc habent, nec angustam ut polypi & sepiæ, neque circumactam per to-
tum alueu, sed de medio orsam, causa cur eam habeant est, ut nateant, & se dirigant,
ut uolucres cauda pennis condita, pisces penè cartilaginata reguntur, polypis hoc
minimum est, minime^q conspicuum, quoniã paruum habeant alueum, quem sa-
tis suis pedibus dirigere possint, at^q de insectis, de testatis, de mollibus, dictum iam
est, tam de interioribus quàm de exterioribus partibus.

De exterioribus animantium uiuiparorum, sanguine^q prædiorum partibus, & eorum
cum homine in ijs differentia.

Caput X

40 **D**E genere sanguineo uiuiparo denuò differendum est, initio repetito
à reliquis partium earum quæ antè expositæ sunt, quas ubi defini-
mus, cõtinuò de sanguineis ouiparis pari modo dicemus, partes qui-
bus caput animalium cõstat, & ceruix, & collum explicatæ iam sunt,
habent autem caput animalia omnia sanguine prædita, exangulum
nonnullis indiscretũ hoc est, ut cancris, collum omnibus uiuiparis est, ouiparorum
alijs est, alijs deest, Quæ enim pulmonem habent, collum etiam obtinent, Quæ au-
tem spiritum extrinsecus non accipiunt, carent hac parte, Caput cerebri gratia po-
tissimum est, hanc enim partem genus omne sanguineum habeat necesse est, &
quidẽ loco obiecto cordi, ob eas quas exposuimus causas, sed natura sensu etiam
nonnullos in eo collocauit, quoniã sanguis eius membri temperatus modice sit,

sed recta ratio exigit, ut quoniam prudentissimus omnium est, ideo manus receperit. manus enim instrumentum sunt. natura autem, ut homo prudens, ita tribuere solet cuique rem qua uti possit. rectius enim tibia dabitur perito tibix, quam tibiam habenti peritix tibix addetur. rem enim minorem maiori posteriorq; natura addidit, non maiorem nobilioremq; minori. quod si ita melius est, natura autem ex ijs quæ fieri possunt, facere solet quod melius sit, homo nō propter manus prudentissimus est: sed quia prudentissimus omnium animalium est, ideo manus obinet, qui enim prudentissimus est, recte plurimis uti instrumentis potest. manus autem esse uidetur nō unum instrumentum, sed multa. est enim, ut ita loquar, instrumentum ante instrumenta. natura igitur ei qui artes plurimas recipere potest, manum reddidit, quæ ad plura instrumenta utilis est. Qui autem hominem non bene sed deterimine omnium animalium constare aiunt, nudum enim atque inermem creatum referunt, non recte ij sentiunt. cætera enim animalia unum auxilium habent, idq; nullo pacto possunt permutare, sed quasi calceata semper dormire, a omnia agere, nec uestitum unquam deponere pleniorē, neq; arma mutare quæ semel acceperint, necesse est. At homini multa habere auxilia licet, eaq; subinde mutare, arma etiam quæ uelit, & ubi uelit, capere potest. manus enim & unguis est, & ungula, & cornu, & hasta, & ensis, & quoduis aliud genus armo- rum, aut instrumentorum. quippe quæ omnia hæc sit, quoniam omnia & sumere potest, & tenere. cui manus naturæ forma etiam adhibita est congrua, diuisa enim & multifida est: nam in eius diuisione, componendi facultas est. in compositione uis diuidendi esse non posset. uti etiam eadem modo simplicis, modo duplicis, & omnino multifariam licet, quin & flexus digitorum ad capiendum, premendumq; commodissime habent. unus à latere adiunctus est digitus, isq; breuis & crassus, sed non longus, ut enim si manus omnino deesset, potestas capiendi nō fieret: sic nisi digitus hic à latere adesset, non eadem illa facultas probe daretur. hic enim à parte inferiori sursum premit, ut cæteri à superiore deorsum. quod fieri ita oportet, si ualide quasi copula forti colligandum sit. pollet hic plurimum, ut unus multos æquiparet. breuis etiā est, ut robustus sit, & quoniam nullam præstaret commoditatem si longus esset. recte etiam nouissimus digitus paruus est, & medius longus, tanquam remus nauigij medius. quod enim officio capitur, circum per mediū digitum completi possimū necesse est. Sed enim pollex & magnus, qui à latere iunctus est, ideo appellatur, quamuis paruus sit, quia cæteri sine eo inuites ferē sunt. Vngues etiam recte natura molita est. quippe quæ cæteris animalibus eos uel ad usum alium dederit, homini autem operimenti tantū gratia excogitarit. digitos enim extremos integunt & tuentur. flexus brachiorum homini tum ad cibum ad mouendum, tum ad cæteros usus, contra quam quadrupedum generi aguntur. illis nanque introrsus poplites flecti necesse est, ut ad gressum utiles sint. usum enim pedum præstant artus priores, quam illius etiam generis ea quæ digitata sunt, nō modo ad gressum utuntur prioribus cruribus, uerum etiam ad manus officia uti nituntur. quippe quæ & capiant prioribus cruribus & repugnent. quod solipedes posterioribus faciunt. non enim crura eorum priora cubitis manibusq; proportionē respondent, ut nonnullorum ex ijs, quorum pedes in digitos finduntur. ob id pedes priores quinis distinctis digitis habent, posteriores quaternis, ut leones, & canes, atque etiam lupi, & pantheræ. quintus enim eorum quinto, magnoq; manus respondet. Sed quæ parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digitos obtinent, quoniam serpere solent, scilicet ut unguibus numerosioribus apprehendendo facilius obrepāt ad sublimiora. Pectus inter lacertos homini constitutum est, cæteris inter crura priora. latum id esse in homine ratione permittitur, cum nihil laceri adiuncti lateribus impediante,

Vnguiū usus

autem quemadmodum se habeant, & qua differant ratione, semen genitale & gestatio uteri, ex animalium historia commentationeque apertum est: & cum de generatione agemus, dicitur, formas etiam harum partium tales necessarii ad officium propositum esse debere, quales iam sunt, obscurum non est, sed maris instrumentum alterum ab altero differt, pro discrimine corporum, non enim æque nervosa natura omnia constant, augetur etiam & minuitur hoc unum membrum, sine ulla morbi mutatione, horum enim alterum utile ad coitum, alterum ad ceteros corporis usus commodum est, nam si semper simili modo se haberet, impedimento nimium esse constat hoc membrum ex eiusmodi partibus, ut eorum, quæ modo dixi, utrumque possit evenire, 10 partim enim nervum, partim cartilaginem habet, itaque & contrahi potest & extendi: atque etiam status capax est. Sed quadrupes femina omnes in aversum minungunt, quippe quæ genitale non alibi commodius habere possint ad coitum. Mares uero perpauca in aversum mingunt, ut lynx, leo, camelus, lepus. Solipes nullum sic mingit. Hominis partes posteriores, & crura, peculiari modo præ quadrupedibus habentur. Caudam omnia ferè non solum uisipara, sed etiam ouipara habent, nam etsi plerisque magnitudine membrum id caret, tamen aliquid prominet, quod caudam describere possit, homo unus cauda uacat, nates habet, quod nulli quadrupedum datum est, crura etiam homini femore suraque carnulenta sunt, cum cætera animalia omnia non modo uisipara, uerum etiam quæcunque cruribus constat, uacua carne hæc habeant, nervosa enim, ossiculenta, spinosa, rigida, quorum causa una est propè 20 dixerim omnium, quod homo solus animalium erectus est, ut igitur facile sustinere superiora posset, natura corpulentiam parti superiori dempsit, inferiori addidit, itaque nates carnosas fecit, & femora, & suras: sed nates uel ad corporis requiem utiles reddidit, quadrupes enim stare diu infatigatis uiribus possunt, utque quasi iaceant, cum quaternis sulis innituntur. At uero homines non facile erecto corpore stando durant, sed requiem sedileque desiderant, homo igitur nates & crura carnosæ habet, ob eam quam diximus causam, & cauda ob eam rem uacat, alimentum enim quod caudam adit, in hac ipsa absumitur, ususque caudæ necessarius defuit, quoniam nates sua corpulentia satis operiunt. At quadrupes & reliqua animalia e contrario, cum enim 30 forma pomilionis degeneret, parte sui superiore pondus, omnemque corpulentiam sustinent, scilicet demptam parti inferiori, itaque crura habent rigidiora, & natibus uacua, sed ut pars quæ exitum extremo ministrat protegeretur & custodiretur, caudam ipsi natura reddidit, sublato quod ad crura deferret alimento, Similia quod forma ambigua sit, ut & in neutro, & in utroque genere sit constituta, ideo nec caudam habet, neque nates, uidelicet ut bipes cauda uacat, ut quadrupes natibus, Caudarum autem plures differentie sunt, & natura ipsi quoque abutitur, cum non modo ad integendam tuendamque sedem utatur, uerum etiam ad reliqui corporis usum atque utilitatem. Pedes quadrupedum inter se differunt, alij enim solidi, alij bifidi, alij multifidi. solidi sunt eorum quibus præ corporis magnitudine, copiaque terrenæ portionis, pro cornu aut 40 dente, materia ad unguis naturam secesserit, sed enim ex ea copia pro pluribus unguibus unus unguis, scilicet ungula coalescit. Talo etiam ob eam rem carent (quod magna ex parte dixerim) atque etiam quod si talus adesset, crura posteriora difficilius flecterentur, celerius enim & aperiuntur & clauduntur quæ singulis angulis consistunt, inquam quæ pluribus. Talus autem, ut qui clauus est, tanquam alienus artus duobus hisce inseritur, pondus quidem afferens, sed gradum efficiens tutiorem, hinc enim & ea quæ talum habent, non in prioribus, sed posterioribus tantum cruribus eum continent, quoniam leuiores, flexibilioresque esse debent, quæ præcedant, firmiores autem contentioresque esse posteriora congruit: ad repugnandum etiam, inferendumque ictum uehementiorem commodius ita constant, genus autem hoc animalium cruribus ita uti

posterioribus solet. bifulca talum habere certū est: ijs enim posteriora sunt planiora. & quoniā talum habeant, solipeda esse nō possunt, quasi os quod pedi deest, maneat in suffragine. digitatis talus nō est. nam si esset, digitata non essent, sed tantum latitudinis funderetur, quantū talus occuparet. quam ob rem ea quæ talum habent, magna ex parte bifulca sunt. Homini pedes omnīū maximī proportionē magnitudinis meriō. solus enim erectus est. ita qui duo pondus corporis totum susceperunt essent, longitudinem latitudinemq; obtinere debuerūt. digitorum etiā manus magnitudo contrā quā pedis est, ratione. manus enim officium est capere atq; premere. itaq; longos habeat digitos oportet. manus enim parte qua se flectit, comprehendit. pedis autē officium est tute consistere. quod ea parte pedis effici putandū est, 10 quæ infissa est. extremum autē fissum, quā infissum esse melius est. nam si pes totus infissus esset, totus consentiret parie aliqua laborāte: quod fissio in digitos atque accidere nō potest, breues etiā minus offendi lediq; possunt. quam ob rem hominū pedes multibidi & breuidigiti sunt. Vnguiū genus eadē causā pedes, qua manus obtinent, extrema enim operiēda muniēdaq; potissimū sunt propter imbecillitatē, de animalibus sanguineis, uiuiparis, terrestribus serē omnibus dictū iam est.

in quibus quare dicitur
giti mutantur

De partibus animalium ouiparorum, tum quadrupedum, tum expedum: et quam ob
causam sic à natura digestæ sint.

Caput XI



Anguinea uero ouipara partim quadrupeda sunt, partim expeda, 20 quale unum tantūmodo genus serpentū est. causam quam ob rem id pedibus uacet, reddidimus, cum de gressu animalū ageremus. cetera eius forma similī quadrupedibus ouiparis sunt, habent hæc animalia caput, partesq; capitis eisdem de causis, quibus cetera sanguinea genera. Linguam etiā in ore continent omnia, excepto uno crocodilo fluuiatili, hunc enim nō nisi locum tantūmodo linguæ habere putaueris. cuius rei causa est, quod idem & terrestris, & aquatilis quodāmodo est. ergo ut terrestris locum obtineat linguæ, ut aquaticus elinguis sit. pisces enim, ut dictū est, aut nullam habere linguam uidentur, nisi ualde resupinentur: a ut inexplanatam habent. causa est, quod ijs linguæ usus perquam exiguus est: quoniā mandere prægustareq; non possint, sed in 30 deuorādo sensum uoluptatemq; cibi capiāt. lingua enim sensum mouet saporum. esculentorum autē omnium uoluptas in descendendo contingit. dum enim deglutimus, pinguiā sentimus, & falsā, & dulciā, & reliqua generis eiusdem. sensum igitur hunc animalia etiā ouipara habent. & omnium serē condimentorum, esculentorumq; in deuorando gulæ tactione suauitas exiit, & gratia. quam ob rem non qui potionum, saporumq; incontinentes sunt, iidem etiam condimentis ac cibo luxuriant. Sed cum cæteris animalibus sensus quoq; gustandi adiunctus sit, illis quidem aliter quasi unus tributus est. Lacertis ex quadrupedibus ouiparis lingua bifida, ut serpentibus: parteq; extrema pilosa admodum, ut dictū iam est. quin etiam ut 40 tulus marinis lingua bifulca est. quam ob rem hæc animalia omnia tenuia sunt. Serpentes etiā dentibus quadrupedes ouiparæ sunt modo piscium. Senforia autē omnia similī modo, atq; cetera animalia habent. uerbi gratia, nares olfaciendi, oculos uidentis, aures audiendi sensorium. non tamen hæc eminent, quomodo ne auius quidē, sed foramina tantū habent. causæ utriusq; duritia cutis est. aliter enim penna, altera cortice integuntur. cortex loco squamæ & simile est, sed sua natura rigidior atq; durior. quod in testudine atq; serpentibus magnis, & crocodilo fluuiatili palam sic. firmior enim osse euadit, ut qui talem naturā sortiatur. Palpebram superiorem hæc animalia non mouent, ut ne aures quidem: sed inferiore cōiungunt. ea de causa, quam cum de illis ageremus, reddidimus, sed cum auiū nonnullæ ab angulis membrana

brana obeunte nictentur, hæc non nictantur. Sunt enim oculis durioribus, quam aues. causa est, quod illis utpote uolucris acumen cernendi commodius ad uitæ mu-
 nera sit. hæc autē quoniam cauernas subire omnia solent, minus cernendi usum exqui-
 situm requirunt. Sed cum caput in partes duas diuidatur, scilicet superiore & inferio-
 rem maxillam, homo & uiuiparæ quadrupes maxillam sursum, deorsum, atque in
 latera agitāt: pisces uero & aues, & ouiparæ quadrupes sursum, deorsumque tan-
 tum mouent. causa est, quod eiusmodi motus utilis ad mordendū, secundumque est.
 qui autē in latas agitur, ad cibum molendū conficiendumque accommodatur. Quæ
 igitur dentes habet maxillares, ijs motus comode agitur in latas. Quæ autē maxilla-
 10 laribus carēt, ijs nullo pacto utilis motus hic est. quam ob rem sublatus ijs omnibus
 est. nihil enim natura superuacuum facit. Cætera omnia maxillā mouent inferiorem:
 crocodilus fluuiatilis unus superiorē, cuius rei causa est, quod pedes ad capiendum
 retinendumque inutiles habet. parui enim admodū sunt. itaque ad hunc usum natura
 os ei pro pedibus utile cōdidit. Ad retinendum uero, unde ictus inferri uehemen-
 tius potest, inde motus commodius agitur. insertur autem uehementius desuper,
 quam de parte inferiore. ergo cum utriusque, tum capiendi, tum mordendi usus ore
 administraretur, magis autē necessariū retinendi officiū sit, cui nec manus sint, neque pe-
 des idonei, commodius huic est mouere superiorē maxillam, quam inferiorē. Quod
 idem cause est, cur etiā cancri superiorē sui forcipis partē moueant, nō inferiorem.
 habent enim pro manu forcipem. illū itaque utilem ad capiendū, non ad mordendū
 20 forcipem esse oportet. mordendi autē secundiūque officiū dentis est. cancris igitur, cæ-
 terisque quibus licet oculos cibum capere, quoniā in humore nō sunt, oris usus par-
 titus est, ut manibus aut pedibus capiant, ore secent & mordeāt, at crocodilis os in
 utrumque usum utile factum est à natura, cum ita maxillæ moueātur. Collum etiam
 omnia huiusmodi animalia obtinet propter pulmonem. quippe quæ aërem per
 arteriæ fistulam productiorē & accipiant & reddant. collum enim id appellamus,
 quod inter caput & artus, humeros uel interiacet. Serpens inter hæc collum minis-
 me, sed proportionale colli habere uideri potest. siquidē extremis, quæ modo dixi,
 pars hæc describenda est. proprium serpentibus præ cæteris eiusdē generis anima-
 libus est, ut caput uertere in auersum, reliquo quiescente corpore ualeant. cuius rei
 30 causa est, quod modo insectorum structura uolubili constant, ut uertebras cartila-
 ginosas & flexibiles habeant. euenit igitur id serpentibus necessariū hac de causa. ad
 melius uero, ut ita uitare possint, quæ ab auerso noceant. cum enim prælongo sint
 corpore & pedibus careant, inepti sunt ad se conuertendū, tuendumque contra ea,
 quæ à tergo incurrāt, nihil enim utilitatis esset, si caput erigere quidem possent, sed
 circumagere nequērēt. Habent hæc & eam quæ pectori proportionetur, partem.
 mammas nec ea parte, nec uspiam sui corporis continent. Aues etiam mammis ca-
 rent. cuius rei causa est, quod nullū ex ijs habeat lac. mamma enim cōceptaculum,
 & tanquam uas lactis est. nec solū hæc, sed etiā quæcumque nō uiuipara intra se sunt,
 40 lacte uacant, quoniā oua pariunt. in ouo autē lacteus ille cibus ingentisuius ouiparis
 continetur, sed de ijs planius dicetur, cum de generatione agemus. De inflexu cur-
 uarum partium consideratū iam est, cum de communi animalū gressu ageremus.
 Caudam etiā genus id animalū habet, partim prolixiorē, partim breuiorē. cuius rei
 causam ante in uniuersum reddidimus. Omniū uero ouiparorū pedestrū tenuissim-
 us chamaeleo est. quippe quod omnium maxime inopia sanguinis rigeat. causa ad
 mores animæ eius referenda est. præ nimio namque metu multiformis efficitur. merus
 enim refrigeratio per inopiam sanguinis calorisque est. De partibus animalium san-
 guinei generis, tum expedum, tum quadrupedū, aut bipedū, quænam sint extra,
 & qua de causa, dictum serē est.

De partibus auium exterioribus, & earum differentiis, quas ob causas sic à natura posite sint.

Caput XII



Ves autē discrimine inter se discrepāt, eo quod in excessu defectū ue partium, & in pluri minorisq; ratione uersari percipimus. Sūt enim earum alie longo crure, alie breui. linguam etiā alie latiusculam habent, alie angustam. eodemq; modo reliquis partibus differūt. At priuatim inter se paulō ratione partium differunt, quanquam à ceteris forma etiā partium discrepent. pennatum enim genus omnium auium est, idēq; proprium habet ad cetera animalia. cum enim alia pilo, aut squama, aut cortice tegantur, aues penna opertæ sunt, pennamq; habent fissā, nec simili specie, atq; ea, quæ totipenna à pennæ cōtinuitate appello. his enim fissā, illis infissā est penna. & altera excaulis, altera caulata est. quinetiam capite rostri naturā singularem ac propriam præ ceteris gerunt. elephantis enim naris pro manibus est. insectis quibusdā lingua oris officio fungitur: at his uice dentiū manusq;, rostrum osseum datum est. de sensuum locis dictū iam est. Collum auibus quoq; porrectū, eademq; de causa qua ceteris est. hoc alijs breue, alijs longum, & serē pro crurum modo, magna ex parte descriptū est. Quibus enim longa sunt crura, ijs collum longum. contrā, quibus breuia crura, ijs collum breue, præterquam palmipedibus. Collum enim nec breue, cum cruribus longis, nec longū cum breuibus, pastum administrare ex terra potest. carniuoris etiā uolucris longitudo colli incommoda est. imbecille enim, quod prolixum est, ijs autē uictus beneficio uirium cōparatur. quam ob rem nulli collum longum, cui ungues adunci. palmipedes, & quæ diuisis quidem, sed parum diductis digitis sunt, ut quæ eodē genere cum palmipedibus contineantur, collum longius habent. tale enim ad cibum ex humore petendū commodius est. sed crura ijs breuia, ut melius natare possint. Rostra etiā inter se differūt uictus ratione. alijs enim rectum, alijs unicum rostrum est. rectum ijs, quæ cibi capiendi gratia tantum id habēt. unicum carniuoris. Tale enim utile est ad retinendū ijs, quæ raptu uiuant, & cibum ex animalibus petere necesse habeant. quibus autē uictus ratio placida, herbisq; comparanda est, ijs rostrum latum. hoc enim & ad effodiendū pabulum, & ad euellendum, & ad tondendum commodius est. nonnullis longum, ut & col- lum, quoniam cibum ex alto capere soleāt. & quidem bona pars tum earum, tum etiā palmipedum, aut simpliciter, aut parte eadem captura bestiarum quarundam aquatiliū uiuit. itaque fit, ut collo quasi harundine piscatoria, rostro autem ueluti linea & hamo utantur. partes uero pronæ supinæq;, & thorax appellatus quadrupedum, cōfusi in genere auium habētur. alie enim pro branchijs, & prioribus pedibus dependunt, membrum peculiare auium: quam ob rem pro scapulis extrema alarum dorso adherent. Crura ut in homine bina, sed intrō flectenda, ut quadrupedum suffragines, non ut hominis poplites foras. alas autem quas uice m crurum priorum complere modo diximus, in orbem agunt. bipes necessariū est genus auium, inter ea quæ sanguinem habent, atq; etiā aligerum. Cum enim sanguinea quæq; nō pluribus quā quaternis notis moueātur, membra pendentia quaternaria auibus quoq; sunt, ut ceteris gressilibus, & pedestribus, quanquam illis brachia aut crura quaterna. Auibus uice crurum priorū brachiorum uē ala commune datum est membrum: hac enim uolatiles sunt. quæ quidē uolandi uis in auis essentia continetur. itaq; necessariū restat, ut bipedes sint. ita enim notis siue signis quaternis, alis scilicet additis moueātur. Pectus acutum carnosumq; omnibus est, acutum ut melius uolent. lata enim, quia multū aëris propellunt, difficilius mouentur. carnosum, quia quod acutū est, nisi plene opertum sit, imbecillum est. Pectori uenter subiaceret ad osiū usq; excrementi, & suffraginem trudens non aliter, quā in quadrup-

quadrupedum atque hominum genere. igitur inter alas & crura, partes hæ politæ sunt. Umbilicum omnia habent, quæ uel utero uiuiparis additur, uel ouo ouiparis excluditur. sed aubus iam adultis hic delitescit incertusq; est: ut patet per generationem eorum. intestini namq; coalitu umbilicus auium confilii, & nō uenarū pars ulla est, ut in uiuiparo genere. Item auium alia uolaces, alijsq; gradibus atq; ualidis sunt: ut quæ ungues habēt aduncos, & carne uescūtur. uolaces enim tota uita esse necesse est. itaq; pennis abundant, & alarum magnitudine præstant. sed nō modo quæ uncis sunt unguibus, uerum alia quoq; genera uolucrum uolatu superār: uel delict ea, quæ uel pernecitate uolandi sese tueantur, uel loca mutare soleant. Sunt
 10 quæ non uolaces, sed graues sint, quibus uita terrena, & aut fruge uiuunt, aut nant, & apud aquas immorātur. Corpora unguuium exigua sunt, exceptis alijs, quoniam alimenti copia in alas & arma, præsidiumq; absumitur. contra quæ uolaces non sunt, ijs corpora in molem euadunt grandiore, atq; ita efficiunt, ut sint grauiore. Sed grauiū nonnullis præsidio calcar est, quod uice alarum suis cruribus gerunt. eadem uero quæ & calcar habeat, & ungues aduncos, nulla est. causa est, quod natura nihil superuacuum facit. uolaci autē unguui generi calcar ului esse non potest. utile enim tantū in pedestri certamine est. quam ob rem grauium nonnullis adiunctū est, quibus ungues adunci nō solum inutiles, sed etiā nocui essent, cum ad solum hærerent, & contra ingressum infixi reniterentur. quam ob rem uncungues omnes difficulter ambulant, nec in faxis consistūt. natura enim eiusmodi
 20 unguuium contraria in utrunq; est. euenit id per generationē necessariā, cum quod terrenum & procax in corpore est, formam partium commodarū ad pugnam recipiat. itaq; ubi sursum prouerit, rostri duritiā aut magnitudinē facit. ubi deorsum lapsum est, calcaria cruribus ualida effingit, aut pedibus unguuium magnitudinem & robur. Simul autē hæc singula locis diuersis efficere non potest. distracta enim excrementi eius natura inualida redditur. Item alijs crurum longitudinem condidit, alijs pedum interualla complet, digitosq; in palmæ effigiem cōtexit. quo fit necessario, ut aues aptæ ad nandū, aut omnino palmipedes sint, aut discretos quidem habeant digitos, sed singulis annexa latitudine cutis, uel uti spadiculas ductu perpe
 30 tuo gerant. hæc necessariō his de causis ueniunt. Quod autem ad notæ meliores rationem attinet, pedes eiusmodi habēt uitæ quam degunt gratia, ut cum in humore uiuant, nec pennis utātur, pedes ad nandum utiles habeant. ijs enim perinde utuntur, ut remis nautæ, & pinnulis suis pisces. quam ob rem si uel piscium pinnula, uel auium pedibus interiecta cutis destruitur, nare nō poterūt. Sunt in genere auium, quæ longis cruribus innitātur. cuius rei causa est, quod uita earum palustris est. natura enim instrumenta ad officium, nō officium ad instrumenta accommodat. quoniam igitur nantes non sint, ideo nō palmipedes sunt, quod in solo præmolli & lubrico degant: hinc longa ijs crura, & digiti productiores, flexus etiā plures in digitis magna ex parte. sed cum uolaces non sint, & tamen ex eadem materia omnes con
 40 stent, efficitur ut alimentum quod cæteris ad caudam transmittatur, ijs in crura id absumptū reddat eam partē auctiorem. quapropter in uolatu pro cauda ijs utuntur. porrectis enim cruribus in auersum uolant. ita enim fit, ut inter uolandum non impediatur pedū prolixitas, sed iuuat. At quibus crura breuia sunt, hæc ad uentrem contractis cruribus uolant. cum enim nullis earum impedimento sint pedes ita positi, unguibus uel ad raptum habentur expeditiores. Quæ longo sunt collo, si id crassius habent, uolant collo porrecto. si tenue, curuato feruntur. cum enim tenue præ longitudine quatitur, facile frangi potest. Clunis aubus omnibus est, quamquam non clunem, sed femora bina habere propter longitudinem clunis uideantur. quippe cum ad medium usq; uentrem porrigatur. Causa est, quod genus hoc

animalium bipes est, non erectum. nam si modo hominum aut quadrupedum clunem breuem à sede, crurisque deinde directâ strue subditum haberet, omnino stare non posset, homo enim quia erectus est, stare potest. Quadrupedibus crura priora ad corporis pondus sustinendum subdita sunt. At aves nec erectæ sunt, quoniam sua natura in positionem degenerat: neque crura habent priora, quoniam alas uice eorum fortissimè. itaque natura pro ijs clunem longiorem emolita duxit ad medium, corpusque prouum fulciuit: & crura subdidit ea parte, qua pondere æquilibrare, & ambulare æquilibrio possent, & consistere. Sed quam ob causam genus auium bipes non erectum sit, explicatum iam est. cur autem crura carnosa non habeat, eadem causa est, quam de quadrupedum cruribus reddidimus. Sunt autem digiti quaterni 10 æque omnibus, tam multifido, quam palmipedi generi. nam de struthione terræ Africa incolæ postea definiemus, ut bisulcus est, unâ cum reliquis quæ ad auium genus habet contrarijs. Sed cum omnibus quaterni digiti sint, tres parte priore habentur, unus posteriore pro calce, ut tute sit, qui minutus inest in ijs quæ longa habent crura, ut in crece euenit, nec est quod plures habeat digitos. sed cum talis digitorum positio in cæteris sit, in synge una, quam turbinem appellatam dixi, utriusque bini causa est, quod eius corpus minus quam cæterarum propensum est in aduersum. Testes omnibus auibus esse certum est, sed intus lumbis adherent, cuius rei causam in generationis ratione animalium explicabimus. partes auium ita se habent,

De partibus exterioribus piscium, & causis quare sic à natura instituta sint.

20

Caput XIII



Is cium genus mutilatius item ac imperfectius, quam auium, partibus exterioribus est. Non enim crura, non manus, non alas hoc habet. cur ita, causa iam exposita est. sed continuo simplici corpore à capite in caudam usque porrigitur. Cauda uero ipsa non omnibus similis est, sed cum cæteris non euariet, planorum nonnullis spina consistat, & longa est. inciementum enim eius partis ad piscis latitudinem transit, ut in torpedine, pastinacæ, & si quid aliud eiusmodi cartilagineum est. horum igitur cauda spinosa & longa est. quorundam carnosa quidem, sed breuis, eadem causa qua & torpedini. nihil enim refert, breuis carnosaque sit, an longa atque rigidior. contra accidit ranis. 30 quod enim latitudo earum parte priore minus carnosa est, ideo natura quantum corpulentæ priori ademerat, tantum posteriori & caudæ addidit. piscibus nulla membra dependent, quoniam eorum natura natalis est, ratione suæ substantiæ. nihil enim superuacaneum, nihil frustra natura agit. Sed cum sua substantia sanguinem habeant, & tamen nautes non gressiles sint, pinnulas habent ut nantes, pedibus carent ut non pedestres, sed aquatiles. pedum enim additio utilis ad motum qui in pedo, hoc est solo, agatur: unde & nomen inditum pedibus est. Ad hæc, fieri non potest, ut simul & quaternas habeant pinnulas, & pedes, aut aliud eiusmodi membrum, cum sanguinem habeant. Corduli quamuis brachijs præditi, pedes habent, quoniam penna carent. caudam etiam habent laxam & latam. pisces qui non lati sunt modo ratæ aut pastinacæ, quaternas pinnulas habent, binas parte prona, & 40 binas supina. neque est qui habeat plures. sanguine enim careret, binas, quæ parte prona lateribus geruntur, omnes ferè habent. reliquis quæ subditæ sunt, carent nonnulli ex longis & corpulentis, ut anguilla, ut conger, & mugilum genus, quod in lacu Sipharum nascitur, nullæ omnino pinnæ prælongis, & serpentis speciem referentibus, ut murenæ: sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes. modo nanque eodem serpentes natant, quo in sicco repunt. Causa cur id genus piscium pinnis careat, eadem est, qua serpentes pedibus uacent. cuius rei causam explicauimus, cum de incessu & motu animalium ageremus, aut enim male

male mouerentur, aut nullo pacto moueri possent, si quaternas mouendi notas haberent. uix enim mouerentur, siue propinquas inter se haberent, siue remotas propter longius interuallum. sed si plures mouendi notas, sanguinis uacua essent. hæc eadem causa bipennibus quoque piscibus reddenda est. serpentis enim ea quoque faciem referunt, & sui corporis flexu pro duabus pinnis utuntur. unde fit, ut in loco & repere possint, & diutius uiuere. itaq; alteri non pronus, alteri cum pedestris naturæ familiares sint, minus exanimantur. Qui autem binis tantummodo pinnis natant, eas habent quæ parti pronæ adhaerent, nisi latitudo prohibeat, easq; iuxta caput positas gerunt qui habent, quoniam eo loco longitudine careant, qua uice

10 pennarum moueatur. corpus enim eius generis piscium exporrectum in caudam est. Raia & similes pro pinnis extrema sui corporis latitudine natant. Squatina & ranæ pinnas lateribus accommodatas infra gerunt, propter amplitudinem partis superioris. quæ autem parti supinæ commissæ sunt, eas iuxta caput adiunctas habent. nihil enim latitudo impedit, quo minus moueatur. sed pro superis illis has gerunt minores ijs, quæ ad latera applicantur. Torpedo duas iuxta caudam pinnas habet. pro reliquis latitudine utitur, & utroq; sui corporis semicirculo, quasi geminis pinnis natat. de partibus capitis & sensorijs antea dictum est. Piscium autem genus præ cæteris quæ sanguinem habent animalibus propriam sibi branchiarum naturam sortitum est. cur ita, causam cum de spiratione ageremus, reddidimus. Quæ autem branchias habent, aut insectas gerunt, aut detectas, ut genus omne cartilagineum. causa est, quod cartilagineum branchiæ, tum earum tegmenta constant.

20 Genus autem hoc omne cartilagineam habet spinam. motus etiam cartilaginei generis lentus, pigerq; est, quoniam non spina aut neruo corroboratur. contra genus spinatum celeriter fertur. tegmentum autem quod branchias operiat, celeriter moueri oportet, cum branchiarum natura quasi ad spirandi usum piscibus data sit, quam ob rem in spinatis non modo tegmentum, uerumetiam ipsi branchiarum meatus contrahuntur, ut celerius agatur. habent branchias alij multas, alij paucas: & alij duplices, alij simplices. sed nouissimam simplicem magna ex parte. uerum cognitio diligentior ex confectionibus commetationeq; animalium petenda est. causa copiæ & inopiæ branchiarum, caloris cordi in sit copia, aut inopia est. in quibus enim

30 plus inest caloris, hæc celerius moueri oportet & uehementius. geminæ autem branchiæ atq; duplices, talem naturam potius quam simplices paucioresq; obtinent. unde fit, ut nonnulli ex ijs qui branchias habent pauciores, minusq; continentes, diu extra aquam uiuere possint, ut anguilla, & quicunq; serpentis speciem referunt. non enim multum refrigerationis desiderant. Sunt & oris discrimina. alij enim os ante & promptum est. alij infra parte supina, ut delphinis, & cartilagineo generi, quam ob rem hæc nisi cōuersa resupinentur, cibum corripere nequeunt. quod natura non modo salutis gratia cæterorum piscium fecisse uidetur. dum enim sese ista conuertunt, mora intercedit, qua piscis quem insectantur, euadere possit. nam

40 omnia id genus rapina piscium uiuunt. uerumetiam ne nimis suam deuorandi auiditatem explerent. cum enim facilius caperent, breui per immodicam satietatem perirent. quoniam etiam cum rostrum eorum structura tereti, ac tenui sit, facile scindi in oris habitum non potest. Ad hæc differentia existit, quod alij os rescissum, alij subinde in acutius compressum. carne uescientibus rescissum, ut ijs quibus sepectinatim stipat dentium series. ijs enim uires ore continentur. compressum, & ut modo dixi, coarctatum ijs quæ non carne uescantur. Cutis alij squamata (etenim squama præ rigiditate tenuitateq; desistens summa corporis occupat) alij aspera, ut squatinæ, raie, & reliquis generis eiusdem. alij lenis, sed paucissimis. cartilaginea squamis caret, sed aspera cute muniuntur, quoniam spina cartilaginea con-

stant. terrēnam enim portionem natura inde ad cutem transfulit, inq̃ eius asperita-
tem absumpsit. Testes piscium nullus, nec intus nec foris habet. nec serpentes, aut
ex ijs aliquid quæ pedibus carent, partem eam habere compertum est: sed eius
uice meatum excremento, & generationis usui accommodatum habent eundem,
quem cætera quoque ouipara, eademq̃ quadrupeda omnia continent, quoniam
nec uescam habent, neque excrementum humidum secernunt. piscium genus his
à cæteris animalibus differētijs discrepat. Delphini, balenæ, & reliquum cetarium
genus branchijs carent: sed fistulam sui pulmonis causa continent, qua humorem
quem in ore acceperint, respuāt. nam & humorem admitti necesse est, cum cibum
in aqua submersum capiāt, & admissum emitti necesse est. branchiæ igitur ijs quæ
spirant, incommode habentur. causam uero cum de spiratione ageremus, reddi-
dimus. haud enim fieri potest, ut idem & branchias habeat, & spiret. sed enim ijs ad
respuendam aquam fistula data est, quæ ante cerebrum sita est, ne postposita id in-
terciperet à spina. causa uero cur pulmonem hæc habeant, & spirent, quod maio-
ra animalia plus caloris sibi requirunt, ut possint moueri, quapropter pulmo ijs in-
ditus est, plenus caloris sanguinei. sunt hæc quodammodo & terrestria & aquatis-
sima. ut enim aërem terrestrium more trahunt, sic pedibus uacant, & cibum in hu-
more modo aquatiliu capiunt. Vituli etiam marini & uespertiones, quoniam
ambigant, alteri cum aquatilibus & terrestribus, alteri cum uolucris & pedestri-
bus, ideo participes & utrorumq̃ & neutrorum sunt. uituli nanque marini, si ut
aquatiles inspeciantur, pedes habent: si ut pedestres, pinnas. quippe qui pedes po-
steriores pisceos admodum habeant, atque etiam dentes omnes serratos a cutosq̃.
uespertiones etiam pedes ut uolucres habent: sed ut quadrupedes non habent.
cauda etiam tam quadrupedis quam uolucris carent. nam quia uolucres sunt, cau-
da quadrupedis uacāt. quia pedestres, uolucris. quod ijs necessario accidit. habent
enim cuteas pennas. nullum autem uolatile caudam habet, nisi penna scissa uola-
tile sit. Genus enim id caudæ ex penna eiusmodi constat. cauda uero quadrupedis,
generi uolatili adiuncta, uel impedimento eius pennis proculdubio esset.

De struthione Africo, & eius natura, & forma.

Caput XIII



Struthio etiam Africus eodem modo partim auem, partim quadru-
pedem refert. quippe qui non ut quadrupes pennas habeat, ut non
auis sublimis non uolet. nec pennas ad uolandum commodas gerit,
sed pilis similes. Item quasi quadrupes sit, pilos habet palpebræ supe-
rioris, & glaber capite, & parte colli superiore est. itaque cilia habet pi-
losiora, sed quasi auis sit, infra pennis integitur. Bipes etiam tanquam auis, bisulcus
tanquam quadrupes est. nō enim digiros habet, sed ungulam bipartitam. quarum
rerum causa est, quod magnitudine non auis, sed quadrupedis est. magnitudinem
enim auium minimam esse propē dixerim, necesse est. corpus enim molem subli-
mem moueri nequaquam facile est. Sed de partibus animalium quam ob causam
quæq̃ sint, dictum iam est per omnia animalium genera. Quæ cum explicata sint,
sequitur ut de generationibus animalium differamus.

DE PARTIBVS ANIMALIUM ET EARVM
CAVSIS, LIBRI QVARTI FINIS.



ARISTOTELIS DE GE

NERATIONE ANIMALIVM LIBER PRIMVS,
INTERPRETE THEODORO.

10

Vniuersalis generationis partitio.

Caput I



20

VM DE cæteris animalium partibus, tum summam, tum singulatim seorsum de proprijs generis cuiusq; dictum iam sit, quemadmodum, & quæ de causa unumquodq; esset, eam causam dico, cuius gratia quippiam sit. ponimus enim causarum genera quatuor numero: primum cuius gratia, ut finem, secundum, substantiarationem, quæ quasi unum quoddam ferè existimanda sunt. tertium uero, quantumq; materiam, & id unde principium motus, sed cum de cæteris dictum iam sit: ratio enim, & id, cuius gratia, ut finis, idem est: materia

uero animalibus partes sunt totis dissimilares, dissimilariibus similes, ipsæ ea quæ elementa corporum appellantur: restat ut de partibus quæ ad generationem pertinent disseramus, de quibus nihil adhuc definitum est, atq; etiam de causa mouente quanam sit. sed de ea ipsa causa considerare idem quodammodo est, atque de generatione cuiusq; agere. Quam ob rem nostra hæc disputatio in idem ea coniecit, cum & partes, quæ ad generationem accommodantur, ultimas disposuisset, & generationis principium ab ijs proximum collocasset. Animalium alia per coitum foeminae & maris gignuntur, scilicet in quibus generibus sexus uterq; est. non enim
 30 in omnibus, sed in præditis sanguine, paucis quibusdam exceptis, alterum mas, alterum foemina perfectum euadit. exanguium uero quædam marem & foeminam habent, ut sobolem eiusdem generis procreant. alia procreant quidem, sed non sui generis prolem, scilicet quæ non ex coitu animalium prodeunt, sed ex terra putri, aut excrementis. quod autem in uniuersum dixerim, eorum quæ locum mutare solent, aut nando, aut uolando, aut gradiendo, uidelicet prout quodq; actum suo corpore est, nonnulla toto genere suo sexum utrunque obtinent, non modo sanguine prædita, uerumetiam exanguia quædam. nam eorum quoque alijs toto genere sexus uterque est, ut mollibus, ut crustatis: alijs maxima parte, ut generi insectorum. eorum autem ipsorum quæ ex coitu cognatorum animalium gignuntur,
 40 ipsa quoque sibi cognata progenerant. At uero quæ non ex coitu, sed putri materia oriuntur, ea generant quidem, sed genus diuersum quodq; prodijt, nec mas est, neque foemina. Talia sunt nonnulla in genere insectorum, quod iusta euenit ratione. nam si ex coitu eorum, quæ non ex animalibus orta sunt, animalia orirentur, hæc si eiusdem generis essent, primum quoque ortum parentum talem esse oportet. quod recte ita censemus, quando sic euenire in cæteris animalibus patet. sed si dissimilia quidem, sed quæ coire inter se possent, gignerentur, rursus ex ijs alia quædam natura procrearetur, & alia ex ea, idq; in infinitum procederet. At natura in finitum uitare solet. infinitum enim sine caret. natura autem semper finem quaerit. Quæ autem non gressilia sunt, ut testatum animalium genus, & quæ saxis ad-

harentia uiuunt, quoniam natura simili plantis constat. hinc ut in illis, sic in ijs mas deest, & foemina: sed similitudine proportionis nomen sexus accipiunt. habent enim parum eiusmodi differentiae. quodam etenim in stirpium genere, sunt eodem in genere arbores, quae fructum ferant, & quae ipsae quidem non ferant, sed ferentes adiuuant illas ad maturandum, ut inter ficum & caprificum euenit. generationis etiam ratio eadem in stirpibus quoque est, cum aliae semine prodeant, aliae sponte naturae, oriuntur enim à putrescente uel humo, uel parte aliqua plantae. Sunt enim quae ipsa per se nunquam seorsum consistant, sed in alijs arboribus dico, foaleant generari, ut uiscum. sed de stirpibus siue plantis seorsum opere per seipsas dicato agendum est.

Principium generationis esse marem, & foeminam.

Caput II



Vnc de animalium generatione differendū est, prout cuiusque ratio competit, deducenda ex ijs, quae dicta iam sunt. Generationis enim principia, ut retulimus, illa potissimum quis statuerit, marem & foeminam, marem, ut quod motus & generationis originem teneat: foeminam, ut quod materiae, quam rem ita esse potissimum credes, si quemadmodum, undeque semen genitale fiat, intellexeris. Ex hoc enim quae natura oriuntur, consistunt. id autem quemadmodum ex mare ac foemina prodeat, nequaquam latere oportet. quod enim ea pars de foemina mareque secernitur, & in ijs atque ex ijs haec secretio sit, ideo mas & foemina principium conferunt generationis. Marem namque id animal dicimus, quod in alio gignit. foeminā, quod in seipso. quam ob rem in uniuerso quoque naturam terrae, quasi foeminam matremque statuunt, coelum autem & solem & reliqua generis eiusdem, nomine genitoris patrisque appellant. Mas autem & foemina inter se differunt ratione, quod facultas utriusque diuersa est. sensu autem partibus corporis quibusdam discrepant. rationis discrimen ita exultat, ut mas sit quod in altero generare potest, ut dictum est, foemina quod in seipso, & ex quo fit quod generatur, contentum in eo quod generat. Sed quā facultate & munere quodam haec distinguantur, ad omnem autem officij functionem instrumento opus sit, instrumentaque facultatibus partes corporis accommodentur, ad procreationem quoque, & coitum partes aliquas esse accommodatas necesse est, easque inter se diuersas, quibus mas à foemina differat. nam etsi de toto animali mas aut foemina dicitur, tamen non quauis sui parte potentiaque idem mas, aut foemina est, sed certa quadam uirtute siue potentia, & parte. sicut & uim cernendi gradiendique obtinet, ut sensu pater. partes uero eiusmodi sunt foeminae, uteri, & uuluae: maris testes, & coles, in omnibus sanguine praeditis. eorum enim alijs testes, alijs meatus eiusmodi quidam sunt, in genere etiam ex angui discrimen maris & foeminae est, quibus haec sexus contrarias data est. differunt forma inter se partes ad coitum delegatae in sanguineo genere. sed intelligendū sic est, ut principio uel exiguō immutato, multa ex ijs quae à principio sunt, immutari soleant. patet hoc in exectis, quibus parte genitali tantū corrupta, tota serē forma usque eō commutatur, ut aut foemina esse uideantur, aut parum absint, tanquam non qualibet sui corporis parte, aut potentia, animal sit foemina aut mas. constat igitur principium quoddam esse marem ac foeminam. itaque merito fit, ut multa commutentur, cum animal, quae foemina aut mas est, immutatur, quasi principium dimoueatur.

Genitalia

Genitalia membra non eadem omnibus esse animalibus.

Caput III



Estes, & uteri, aut uulvæ, nō pariratione in omnibus sanguine præditis animalibus sunt. iam enim ut primum de testibus dicam, alia omnino testibus carent in eo genere, ut pisces, ut serpentes: meatusq; tantū geminos semini genitali præscriptos obtinent. alia habent quidem testes, sed intus lumbis adhærētes, quā renes continentur: meatusq; ab eorum utroq; foras tendunt, ut in ijs quæ testibus carent, qui in idem coniungantur, quomodo in illis constitutum est, ita aues omnes habent, & quadrupedes, quæ oua pariunt, inter eas quæ aërem accipiunt, pulmonemq; obtinent. his enim omnibus testes lumbis intus adhærēt, meatusq; gemini ab his similiter atque serpentibus tendunt, ut lacerto, testudini, atque omnibus cortice interceptis. Quæ autem animal gignunt, omnia testes in aduerso habēt. sed nonnulla intus ultima conditos aluo, ut delphinus. nec meatus, sed penem pertendentem habet, ut boues, alia foris gerunt, quorum alia pendent, ut homines: alia annexos ad sedem sessiles, ut fues. sed de his diligentius distinctum est in libris, quos de historia animalium scripsimus. Vteri omnium bipartiti sunt, ut testes gemini omnibus maribus habentur. sed alijs iuxta genitale, ut mulieribus, & omnibus quæ animal non solum foras, sed etiam intra se generant, & piscibus qui oua ædunt: alijs iuxta septum transue: sum siue cinctum, ut aibus omnibus, & piscibus qui animal pariunt. Crustatis etiam uulvæ bifidæ sunt, atque etiam molibus. quæ enim oua eorum uocatur prodium habent membranas, quibus continentur. Sed hoc maxime indiseretum est in polytis, ut simplex esse uideatur. cuius rei causa est forma corporis, quæ similis undique est. insectis etiam quibus aliquid magnitudinis, bifidæ sunt, minoribus incertæ propter corporis exiguitatem. partes quas explicandas proposui, ita se habēt,

Quæ ob causam naturæ testiculos animalibus indidit, quæ item animalia citius, & quæ tardius coeant: & quod taurum cum statim à castratione iniisset, impleuerit.

Caput IIIII



E differentia instrumentorum genitalium quæ in maribus sunt, quibus ob causas sint, consideret, accipiat primum necesse est, cuiusnam rei gratia testium constitutio habeatur. ergo si natura rem quamcunque facit, aut quia necessaria est, aut quia melius ita est, hoc etiam membrum ob eorum alterutrum esse debet. sed non necessarium id esse ad generationem patet. omnibus enim quæ generant adiunctum esset, si necessitatis ratio haberetur. nunc uero nec serpentibus testes sunt, neque piscibus. uisi sunt enim cotre, plenosq; seminis genitalis habere suos meatus. restat igitur ut melioris cuiuspiam notæ gratia testes habeantur. Sed enim maximæ animalium parti munus nullum ferè aliud est, nisi quod plantarum semen & fructus. utq; in ratione cibi uoraciora audioraq; sunt, quibus intestinū rectum, sic ea quæ testibus carent, meatusq; tantum habent, aut non carent, sed intus habent, omnia propèfiora celerioraq; ad uenerem sunt. At uero quæ castiora esse conuenit, ijs ut in cibi usu intestino opus est non recto, sic meatus illi reuolutionem anfractusq; habēt, ne libido uehemens, crebraq; citetur. testes autem ad hanc rem emolita natura est. motum enim extremi genitalis stabiliorem faciunt in uiuiparis, ut equis, cæterisq; eiusmodi, atque etiam hominibus, cum replicationem seruent. Sed quemadmodum se habeant, petendum ex animalium historijs est. nullam enim partem meatus testes complet, sed adiecti pendunt, eo modo quo pondera textrices telis annectunt. his enim de tractis meatus intro se retrahūt. quo fit, ne execta possint generare. nam nisi ita retraherētur, possent generare. & iam taurus quidā, cum statim à castratione iniisset,

implevit. quoniā nondum retracti essent meatus. Avium vero & quadrupedum quiparorum testes excrementū recipiunt genitale. itaque tardius ijs, quā piscibus semen prodit. patet hoc in avium genere, cum tempore coitus testes multo habeant grandiores, quā certo tempore coeant. At ubi id tempus praeterierit, a deo exiguios habent, ut incertum fere an habeant sit. cum tamen eo tempore quo coeunt, gerant praegraves. celerius itaque ea coeunt, quā testes intra se continēt. quā enim extra habent, non prius semen emittunt, quā retrahant testes.

Quae animalia membrum ad coitum accommodatum obtineant, & quae non.

Caput V



Instrumentum etiam accommodatum ad coitum quadrupedes obtinent. habere enim id possunt. Aves, & quae pedibus utantur, habere nequeunt. quoniam alteris crura sub media alio posita sunt, alteris nulla sunt crura. natura autem penis hinc pendet, & situm hunc tenet. & quidem ob eam rem evenit, ut in coeundo crura contendantur. nam & instrumentum hoc nervo constat, & crurum natura nervosa est. itaque cum habere id nequeant, testes quoque aut non habere, aut non eo loco habere necesse est. Idem enim situs penis & testium est in ijs, quae habent utrumque. quin etiam ea quorum testes sunt extra, cum penis per motū calefcit, semen genitale proinde collectum emittunt. non parato iam semine contrectant, ut pisces. Omnibus quae animal generant, testes ante habentur, vel intus, vel extra, praeterquam herinaceo. hic enim unus lumbis adherentes continet: ob eandem, quā aves causam. coitum enim herinaceorum celeriter fieri necesse est, cum non more quadrupedū supererant tergis, sed erecti coniungantur propter aculeos. causa quam ob rem testis habent quae membrum hoc obtinent, & cur alia intus, alia extra, declaratum iam est.

Quam ob causam nonnulla animalia membro genitali careant.

Caput VI



Vae autem carent eo membro, non quia melius sit carere, ideo carent: sed tantum quia necessarium, ut dictum est. quoniam celeriter peragatur eorum coitus necesse est. qualis natura piscium & serpentum est. pisces enim incurrentes attingunt, absolunturque ocyssime. nam ut in hominum, & eiusmodi omnium genere semen genitale spiritu retento emitti necesse est, sic in piscibus, mari non in branchiis accepto emittitur. facile autem pereunt, nisi id assidue faciant. itaque non ijs semen tantisper concoquendum est, cum coeunt, ut pedestribus & viviparis, sed tempestatis tempore iam concoctum continent uniuersum, ita, ut ne dum contingunt, conficiant, sed concoctum paratumque emittant. quam ob rem testibus caret, meatusque simplices rectosque habent, qualis particula quaedam circa testes quadrupedum est. replicationis enim meatus pars altera sanguinea est, qua recipitur materia seminis: altera exanguis, qua factum iam semen transit. itaque cum genitura eo devenit, celeriter ea quoque absoluntur. At piscibus talis totus meatus est, qualis in homine. ceterisque eiusmodi animalibus pars replicationis altera est. Serpentes complexu mutuo coeunt. carent testibus & pene, ut dictum iam est. pene, quia cruribus caret. testibus, propter sui corporis longitudinem. meatus modo piscium habent. quod enim eorum natura porrecta in longum est, si praeterea in testes protraherentur, refrigeraretur genitura propter moram longioris itineris. quod ijs quoque accidit, quibus penis immodicus est. sunt enim infecundiores ijs quibus mediocri, propterea quod semen frigidum infecundum est. refrigeratur autem quod longe admodum fertur. sed quam ob causam animalium alia habent testes, alia non habent, declaratum iam est.

Quomodo

Quomodo serpentes coeant.

Caput VII



Oeunt serpentes complexu mutuo, propter ineptam sui corporis formam ad applicandum. cum enim exigua quadam sui parte coniungantur, nequeunt præ nimia prolixitate adaptari, cumq; membris quibus amplectantur careant, pro ijs agilitate corporis utuntur, complexuq; mutuo sese obuoluētes expediunt uenerem, unde fit, ut lentius absolui quam pisces uideantur, non solum meatuum prolixitate, sed etiam ea ipsa, qua utuntur solertia.

De situ uterorum aut uuluarū in quibusq; animalibus.

Caput VIII

10



Es ueris aut uuluis quemadmodum se habeant, ambiges. magna est enim eius partis diuersitas, nam neq; uiuipara omnia habent simili situ, sed cum homines, omneq; genus terreste infra ad genitale habeant, cartilaginea supra continentur iuxta septum, neq; ouipara sibi conueniunt, sed pisces infra ut homines, & quadrupedes uiuiparæ habent, aues & quadrupedes ouiparæ supra, attamen ipsi quoq; situs contrarii non sunt à ratione remoti. iam enim quæ oua pariunt, diuerse pariunt, etenim alia imperfecta emittunt oua, ut pisces, foris enim piscium oua perficiuntur & augentur, cuius rei causa est, quod magna fecunditas est, idq; munus eorū, ut stirpium est, quod si intra se foetū perficerent, pauciora necessario æderent. nunc uero & tot continēt, ut uulua unū esse oū in paruis quidem pisciculis uideatur. Sunt enim hi fecundissimi, ut in cæteris quoq; tum plantis, tum animalibus euenit, quorū natura his proportionetur, in ijs enim magnitudinis incrementū uertitur in seminis copiam. Aues, & quadrupedes ouiparæ oua ædunt perfecta, quæ ut seruari possint, duro iam consistunt, tamē oportet, sunt enim quandiu crescunt molliora, testa autem efficitur calore externo euaporante humorem, itaq; calidum esse locum, in quo id fiat, necesse est, talis autē locus septi transuersi est, quippe qui cibum concoquēdo perficiat. Quod si oua contineri in uulua necesse est, uulua eorum quæ oua ædunt perfecta, sitam esse ad septum necesse est, eorū autem quæ imperfecta, infra, ita enim in promptu erit, & sua uero natura uulua propensior ad situm inferiorē, quā ad superiorē est, nisi quid aliud opus naturæ impedit, infra est enim exitus eius officium.

De generatione uiuiparorū, & eiu inter eos differentia.

Caput IX



uiipara etiam inter se differūt, alia enim non modo foras, uerumetia intra se animal generant, ut homines, ut equi, ut canes, deniq; omnia quæ pilis teguntur, & inter aquatilia delphini, balenæ, & reliqua cetarij generis.

De generatione cartilagineorū, & uiperæ.

Caput X

40



Artilaginea uero, & uiperæ, cū intra se oua generāt, mox animal foras pariunt, perfectū generant ouum, ita enim ex ouo animal gignitur, ex imperfecto nullū, non extrā, hæc pariunt oua, quia natura frigida sunt, non quia calida, ut quidam uolunt.

De generatione mollium animalium.

Caput XI



Vte molli insecta generāt oua, quod enim caloris exigui sunt, ultimi siccare natura eorum non potest. Quia igitur frigida sunt, molle generant, quia molle, non extrā, periret enim propter suam mollietē. Cum autē ex ouo animal gignitur, eodem quo in auius modo parte plurima generatur, descendunt oua in imum, efficiunturq; animalia infra ad genitale, quomodo in ijs sit, quæ iam inde à primo ortu animal generant.

quam ob rem uulua quoq; eorū dissimilis tum uiuiparis, tum ouiparis est, quoniam utriusq; consortiū generis habent. nam & suprà ad septum, & infrà porrectū genus omne cartilagineū habet. sed tam de ea, quàm de ceteris uuluę aut uteri generibus, quemadmodū se habeant, per historias, dissectionesq; animalū indagandum percipiendumq; est. itaq; hoc genus & suprà continet uuluam, quia ouipari perfectiorū ouorū est: & infrà, quia uiuiparū est, atq; particeps utriusq; euadit. At uero ea quę protinus animal generāt, omnia infrà habent, nullo enim naturę opere impediuntur, nec partū geminant. Ad hæc, fieri non potest ut animalia iuxta septum gignantur. fœtum enim pondus & motum habere necesse est. is autē locus cum uitalis sit, hæc pati non potest, difficultatē etiā pariendi ita accidere necesse est propter delationem longiorem. nam & nunc mulieres, si in partu uel oscitando, uel aliqua eiusmodi causā retrahunt, difficilius pariunt. Inanes etiā uteri, aut uuluę sursum adiunctę strangulant. necnon ualidiores esse eas quę animal contineant, necesse est, quam ob rem omnes eę carnosę sunt. Quę autē ad septum iunguntur, membrana constant. tum etiā in ijs ipsis animalibus quę geminant partum, planum hoc idem sit, oua enim suprà, atq; ad latus continent. animalia uero parte infera uuluę gerunt. sed quam ob causam sint contrario uuluas nonnulla animalia habent, & omnino quam ob rem alijs infrà, alijs suprà ad septum continetur, dictum iam est.

Quam ob causam uteros intus animalia habeant, testes uero alia intus, alia extra. Cap. XII 20



Cur autem uteros aut uuluas omnia intus habeant, testes alia extra, alia intus, causa est, quod cum utero cōtineatur quod gignitur, idē custodiam operimentū & concoctionem desideret, hinc uteri aut uuluę omnium intus sunt. locus enim exterior corporis & frigidus est, & offensionī expositus. Testes alijs intus, alijs extra, propterea quod ijs quoq; operimento & uelamine opus est, tum ut seruentur, tum ut semen genitale perspicere possint. haud enim fieri potest ut frigentes & gelidi possint retrahi, atq; emittere geniturā. quam ob rem quibus testes in propatulo sunt, habent operimentū cuteum, quod scortum uocatur. Sed quibus natura cutis prę sua duritiā obstat, ne mollis, cutea, & ad cōplectendum habilis sit, ut ijs quę aut piscea cute, aut cortice reguntur, ijs intus habeantur, necesse est. quapropter delphini, & quęcūq; cetarij generis habent testes, intus continēt: atq; etiā ouiparę quadrupedes corticati generis. cutis etiā auium dura est, ut magnitudini debitę inhabilis sit ad comprehendendū. causam his omnibus designari necesse est, unā cum ijs, quas antea diximus, ex ijs quę per initum & rem uenerē accidunt. hæc eadem causa est, & ut elephantus ac herinaceus testes habeant intus. cutis enim ijs quoq; inepta ad habendā partitulam quę operiat. Situs etiā uterorū contrarius in ijs quę animal intra se gerant, ad ea quę oua ædunt. atq; etiā eius ouipari generis in ijs quę uterum infrà habent, ad ea quę suprà ad septum. uerbi gratia, piscibus ad aues, quadrupedesq; ouiparas, atq; etiā ijs, quę modo utroq; generant, ut oua intra se parant, animal ardant in lucem, quę enim intra se & foris animal generāt, uterum habent in aluo, ut homo, bos, canis, & reliqua generis eiusdē. nam ad fœtum tum salutē, tum incrementum, expedit nihil ponderis insidere uteris.

Meatus excrementi siccī & humidī, in omnibus animalibus esse diuersos. Cap. XIII



Meatūs etiā diuersus ijs omnibus est, quo excrementū siccū, & quo humidū exit. quam ob rem omnia id genus, tam feminę, quàm maris genitale habent, quo excrementū siccū, & quo humidū secernatur, quoq; maribus genitura, feminis partus emittatur. parte priorē superioremq; meatus is continetur. Quę autē pariunt quidem oua, sed

sed imperfecta, ut pisces ouipari, ijs non sub aluo, sed lumbis adhaerens uulua continetur. nec enim incrementū oī impedimento est: quoniam inchoatum prodiens ouum foris perficitur. & meatus idem excrementarius alimenti siccū, & inus est omnibus quæ genitali carent. ouiparis etiam ijs quæ habēt uesicam, ut testudinibus. Generauonis enim causa non excrementi emittendi duplex meatus est: sed quia feminis natura humida est, ideo meatus idem cōmunis cum excremento humidū alimentū habetur. constat hoc ita esse eo, quod cum genitale semen omnia animalia ferant, excrementū tamen humidum illud non omnia reddunt: sed cum & maris seminales meatus, & foeminae uterum firmari nec oberrare oporteat, idēq; aut in parte priorē corporis, aut in posteriore ad prona effici necesse sit, idcirco uiuiparis propter foetum uteris in parte priorē positus est, ouiparis ad lumbos & prona. Quæ autem animal ædunt in lucem, cum intra se oua generant, ijs situs uterq; quoniam utrunq; referunt genus: & eadem tum uiuipara, tum ouipara sunt. partem enim uuluae superiorē in qua oua gignuntur, sub septo ad lumbos & prona habent: inferiorē ad aluum. hac enim iam procreant animal. Meatus idem ijs quoq; siccū alimentū, & coitus est. nulli enim ex ijs genitale pendet, ut antea dictum est. meatus etiam genitales marium, tum eorum quorum proprii sunt, tum uero eorum qui testes habēt, simili modo atq; uuluae ouiparorū habentur. omnibus enim ad prona & spinæ locum adhaerent. non enim uagari, sed stabiles esse oportet, talis autē locus posterior est. is enim est qui continentia præbeat & stabilitatē. Quibus itaq; testes intus continentur, ijs proinus cum meatibus firmantur. nec secus ijs est, quibus extra tum eodem deueniūt, scilicet in locum genitalis, cōmuniq; excipiuntur meatu. similis & delphino meatuum modus est, sed testes sub aluo occulti. sed quemnam situm partes ad generationem accommodatæ, & quas ob causas tenuerint in his generibus, dictum iam est.

Crustacea, mollia, testacea, & insecta animalia, tum inter se, tum cum sanguine in generatione differre.

Caput XIII

Aeteris quæ sanguine uacant animalibus, non idem membrorū ad generationem pertinentiū modus: sed tum inter seipsa, tum etiam cum sanguine dissident. Sunt hæc reliqua genera quatuor numero. unū crustatum, secundum molle, tertium insectum, quartum testatū. An quartū generis ulla coeant, incertū est. plurima tamen non coire aptum est. quemadmodum consistant, postea dicemus. crustata coeunt modo eorum quæ in auersum mingunt. cum alterū supinum, alterū pronū applicauerint caudas. etenim ne parte supina superueniāt, pronam impediunt caudæ præ suarū pinnarū proluxa appendice. habent in hoc genere mares tenues genitales meatus, foeminae uuluas membraneas ad intestinū fissas, hinc atq; inde, in quibus gignitur ouum.

De coitu & generatione mollium animalium.

Caput XV

Mollia ore coeunt, renixu complexuq; mutuo brachiorū, sic enim coniungi necesse est, quoniam natura exitum excrementi in os inflectendo adduxerit, ut antea dictum est, cum de partibus ageremus. habere foeminas omnes in hoc genere membrū uuluale apertum est. Continēt enim ouum primo indiscretū, mox discretū in plura, & parit omnia imperfecta modo ouiparorū piscium. meatus ille interior idem excrementi & uuluae est, tum in ijs, tum etiam in crustatis. est enim quæ semen genitale per meatū emittant, idēq; parte corporis supina, qua putamen distat, & mare illabitur, faciūt. quam ob rem ea parte mas cum foemina copulatur. nam si mas, siue semen, siue membrū, aut aliquā uirtutē, siue uim aliam mittat, ad moueri ad meatū uuluale necesse est.

V 2

crinis uero insertio maris polypi per fistulam, qua piscatores crine coire polypos aiunt, cōplexus gratia sit, non quasi instrumentū id sit utile ad generationē. etenim extra meatum corpusq; est, interdum tergis quoq; mollia copulantur: sed generationis ne gratia, an alia causa, nondum exploratum habetur.

De coitu & generatione insectorum.

Caput XVI



Insectorū aliqua coeunt, atq; ex animalibus eiusdem generis oritur modo eorū quibus est sanguis, ut locustæ, cicadæ, phalangia, uelpæ, formicæ. aliqua coeunt quidem & generant, sed non sui generis ani-
mal, sed uermiculos tantum. neq; ex animalibus procreantur, sed ex
putrescente humido aut sicco, ut pulices, muscæ, scarabæi. quædā nec
ex animalibus nascuntur, neq; coeunt, ut culices, & uermiculi, & plura eiusmodi ge-
nera. inter ea uero quæ coeunt, fœminæ maxima ex parte maiores maribus sunt:
nec meatus ulli seminales in maribus esse uidetur. nullum, parte plurima dixerim,
membrum fœminæ a mare inseritur, sed mari a fœmina sursum de parte inferiore.
quod conspectū in pluribus est. nec de superuētū ambigitur: sed contrā, ut mas fœ-
minæ inserat, uisum in paucis est. neq; adhuc ita exploratū habetur, ut genere pos-
simus distinguere. Hoc idem ferē in piscibus quoq; ouiparis maxima ex parte, & in
quadrupedibus ouiparis est, ut fœminæ maiores sunt maribus, quoniam id cōmo-
dum est ad uterum magna ouorū copā extumescētē. fœminis in eo genere mem-
brum, quod pro uulua habetur, fissum iuxta intestinū, ut cæteris, positū est, in quo
fœtus generatur. patet hoc in locustis, & reliquis, quorum magnitudo aliqua sit, &
natura coitum recipiat. maxima enim pars generis insecti perexigua est. instru-
menta generationi accommodata, de quibus non antea disseruimus, ita se habēt. Si-
miliarium partium semen genitale, & lac reliquimus: de quibus nunc opportune
dicemus. & primum de semine, post in sequentibus de lacte.

Quæ animalia semen emittant, quæ non: & quorundam opinio, qui semen ex unaquaq;
corporis parte provenire affirmant.

Caput XVII



Emen alia aperte emittūt, ut ea quæ sunt natura sanguinea, alia, id est
insecta & mollia, emittant nec ne, incertum est. itaq; considerandum
hoc est, utrum mares omnes semen emittant, an non omnes. & si nō
omnes, cur alij emittant, alij non. Tum etiam utrum fœminæ semen
aliquod conferant ad procreationē, an non, & si non semen, utrum
nec aliud quicquam adhibeant, an quamuis non semen, tamen aliquid conferant.
Ad hæc, quidnam conducant ea quæ semen emittunt suo semine ad generationē,
quærendum est. atq; omnino quæ natura sit seminis, & eorum quæ menstrua uo-
cantur: scilicet in ijs animalibus, quæ id humoris genus emittūt. Omnia ex semine
gigni, semen autē ipsum proficisci a generantibus uidetur. Quam ob rem eiusdem
studij est quæstio, utrum ambo, mas & fœmina emittant: an alter tantū. & utrum
ex toto corpore secernit, an non ex toto. nam si non ex toto, nec ex ambobus qui-
dem parentibus prodire probabile est. quapropter primum de hoc, quemadmodū
se habeat inquirendū est. Sunt enim qui dicant id ex toto corpore provenire. Qui-
bus autem argumentis probent, ut semen ex unaquaq; corporis parte secernatur,
quatuor serē numero sunt. Primum uehementia uoluptatis. magis enim suæ est,
quod idem amplioris sit affectus. amplius autē est, quod omnibus membris, quā
quod paucis accidat. Secundum quod ex mancis manca procreentur. semen enim
ab ea, quæ deest parte, proficisci negant. unde autē non accesserit, id ne procreetur,
accidit. Tertium similitudo parentū: similes enim gignuntur, ut toto corpore toti,
sic particulatim singulis partibus. quod si causa est, ut totum simile sit, quod ex tali
toto

toto semen genitale prodierit, partibus quoque causa similitudinis erit, quod ex una quaque parte aliquid uenerit. Quartum, quod ratio esse uidetur, ut quemadmodum totius aliquid est, ex quo primum generetur: sic partis quoque, cuiusque sit, semen aliquid proprium. fide etiam illa faciunt huic opinioni uerisimilem. non solum enim rebus nature infinis, & natiuis, liberi similes parentibus prodeunt, sed etiam aduentitias atque externas presentant, iam enim cum parentes cicatrices haberent, filij quidam parte eadem sui corporis idem habuerunt. & Chalcedone, cum pater brachio esset compuncto, filius idem retulit: confusa tamen nota, minusque explanata, his ferè rationibus quidam potissimum crediderunt, semen à toto corpore proficisci.

10

*Improbatio in tot, qui dicunt semen ex omnibus corporis partibus provenire,
semenque esse excrementum.*

Caput XVIII



Ed cum scrutamur, & diligentius rem discutimus, contra potius esse uidetur. nec supradicta quatuor illa soluere difficile est. & quedam alia se quuntur impossibilia ex ea ipsa opinione. Primum igitur, similitudo nullum indicium affert, ut semē genitale ex toto corpore secedat, quandoquidem & uoce, & unguibus, & pilis, & motu similes procreantur, ex quibus nihil proveniat. nonnulla etiam nondum habent cum generant, ut canos, aut barbam. maioribus item suis plerumque similes sunt, ex quibus nihil secessit. redditur enim post plura genera similitudo: ut in Helide, quæ cum Aethiops concubuerat, non filiam forma Aethiopis peperit, sed natus ex filia erat Aethiops. In stirpibus etiam eadē ratio est, nam si hoc ita esset, in ijs quoque ab omnibus partibus semen proculdubio proficisceretur. at pleraque partes, aut illæ non habent, aut quisque abscondere potest, aut postgenitas habent, quine etiam ex fructibus nihil secedit: & tamen ij quoque forma eadem proueniunt. ad hæc, utrum ex una quaque similari parte tantum prodit, uerbi gratia, carne, osse, neruo, an etiam ex dissimilariibus, ut facie, & manu. nam si ex illis tantum, similes autem parentibus sunt, partium potius dissimilariū forma, ut faciei, manuū, pedum, quidnam obset, ne illæ quoque similes sint secessu ex toto? Sed alia causa, quando nec in ipsis quidem
 30 similitudo propterea sit, quia ex toto corpore semen genitale secesserit. Sed si ex dissimilariibus tantum, ergo non ex toto & partibus omnibus. at ex similibus magis conueniat, sunt enim priores, & dissimilares ex similibus constant, & ut facie ac manibus similes procreantur, sic & carne & unguibus. At uero si ex utrisque, quisnam modus sit generationis? constant enim partes dissimilares ex similibus, itaque quod ex ijs secedit, ex illis quoque secesserit, atque ipsa compositione, pertin de quasi à nomine scripto quippiam proficiscatur, si à toto, uel à quauis syllaba proficiscitur, quod si à syllabis, ab elementis compositioneque prodierit. itaque si ex igne, & reliquis eiusmodi, carnes ossa uel constant, ex elementis potius fuerint. nam ex compositione quonam pacto possint? Atqui sine ea simile esse nihil poterit. quod
 40 si quid eam postea creat, id causa similitudinis fuerit, non secessio ex toto. Item si partes distinctæ in femine sint, quonam pacto uiuat? sed si coniunctæ, paruum quoddam animal fuerit. genitales etiam partes quonam pacto consistant? non enim simile est quod à mare, & femina secedit. Item si utriusque semen æque ex toto uenit, duo animalia generabuntur. utrumque enim omnia habebit, quamobrem Em pedocles maxime (si ita dicendum est) consentanea huic rationi scripsisse uidetur hoc quidem loco. nam si alibi diuersa, non bene. dicit enim maris ac feminae quasi symbolū esse. totū uero à neutro proficisci. sed discerpta gerunt mas ipse & femina mæbra. cur enim femina non ex seipsa generet, siquidē semē ex toto secedit, & conceptaculum obtinet? Sed ut uidetur, aut non ex toto secedit, aut ita, ut ille ait, nō ex

utroque eadem secedunt, quapropter alterum alterius coitum desiderat, sed impossibile illud quocumque occurrit, nec enim maiora possunt distracta seruari, animataque esse, quomodo Empedocles generat amore, cum dicit: Multaque ponuntur capita abscissa a ceruice, mox enim coalescere coagmentantque ait, quod heri non posse apertum est, quando nec anima vitæque omni uacua seruari possent, neque uelut plura animalia coalescere in unum, & ipsi qui ex toto secedere aiunt, accidunt, ut eodem modo quo ille, dicant, nam ut tum amore in terra, sic ipsi in corpore agitur, non enim fieri potest, ut partes coniungantur, commean-doque eodem deueniant. Tum etiam quoniam pacto dirimantur superiora, inferiora, dextra, sinistra, priora, posteriora: hæc enim omnia carent ratione, item cum partium aliarum facultate, aliarum affectibus distinguantur, uidelicet dissimilares, eo quod efficere aliquid possint, ut lingua, ut manus: similes duritia, mollitia, & reliquis eiusmodi affectionibus (non enim utcumque se habet, sanguis est aut caro) constat ob eam rem fieri non posse, ut quod secesserit, uniuocum sit cum partibus corporis, uerbi gratia, ut sanguis à sanguine, caro à carne proueniat. At si ex diuerso quodam sanguis fiat, non ea causa similitudinis fuerit, quod ex omnibus partibus decesserit: ut aiunt, qui ita opinantur. Satis est enim ex una tantum secedere, quandoquidem non sanguis ex sanguine gignitur, cur enim non omnia uel ex uno gignantur: hæc enim sententia eadem esse uidetur, atque illa Anaxagoræ, ut nullum simile gignatur: nisi quod ille commune id de omnibus asserit, hi uero generationi tantum animalium tribuunt. Ad hæc, quoniam pacto ista augeantur, cum ex toto secesserint? Anaxagoras enim probe ait, carnes ex alimento carni accedere, sed ipsi qui eadem non dicunt, & tamen secedere ex toto pronunciant, quoniam pacto alio accedente maius quicquam efficitur, si quod accesserit, maneat? At si mutari quod accesserit potest, cur non iam inde ab initio semen sit tale, ut gigni ex eo possit sanguis & caro, non ipsum sit sanguis & caro? nec uero dici potest temperatione post augeri, perinde ut uinum aqua adiecta, ita enim principio maxime syncerum meracumque esset unumquodque, nunc uero & caro, & os, & quæuis alia pars, quod dicitur, id postmodum magis est. Seminis autem partem aliamquam dici neruum esse, aut os, longe plus est, quam ut nosser sensus assequi possit, ad hæc si foemina & mas differunt inter se utri ratione, ut Empedocles ait, funditur in puris mas, foemina frigore mixto, mutari uidemus tam uiros quam mulieres, ut quemadmodum ex infecundis fecundi, sic ex habilibus foeminae procreandæ, ad maris procreationem propensi euadant, quasi non sit causa in secedendo ex toto, nec ne, sed in moderatione, immoderatione uel eius quod ex muliere uiroque secedat, aut ob aliquam eiusmodi causam, si hoc inquam ita esse ponamus, constat non propterea esse foeminam, quia ex quodam secesserit, itaque nec partem quidem quam propriam habet mas aut foemina, secessu consistere, siquidem semen idem & mas effici potest & foemina, tanquam non alterutra pars in semine sit. Quid igitur referat, de hac parte ita dicatur, an de cæteris: nam si semen ab utero non prouenit, eadem cæteris quoque partibus ratio seruanda est. Item nonnulla animalia oriuntur ex nullis, uel eiusdem, uel diuersi generis animalibus: ut muscæ, & genera papilionum, ex quibus gignantur quædam animalia, sed non similis naturæ, sed genus quoddam uermiculi, patet igitur non semine quod ex cunctis partibus secesserit, generari quæcumque diuersi generis sunt, nam similia essent, siquidem similitudo indicio esset, quod ex cunctis secesserit, quædam etiam animalia uno coitu plura generant, planitas uero omnino motu eodem, omnem annum fructum asserre certum est, quod fieri non posset, si ex cunctis partibus semen secerneretur, singulas enim & singulis uel coitibus, uel secessibus, fieri secretiones necesse est, nec uero fieri potest, ut in utero diuidatur, iam enim tanquam à planta nouella, aut animali nuper ædificato, non

non semine separaretur. Item quæ auulsione seruitur, semen afferunt, ergo & prius quam auulsa fererentur, ex eadem sui magnitudine fructificasse, non ex tota planta destructum semen tulisse certum est. Omnium uero maximum argumentum in genere insectorum animaduertimus satis, quod etsi non omnium, tamen plurimum foemina per coitum particulam quandam suam inserit in marem. & quidem coitum ita agunt: quod antea dictum est. Subiecta enim in supera indere uidentur, quâquam non omnia, sed plurima ex ijs quæ explorata habemus, itaq; in ijs etiam maribus, qui semē emittunt, non causa generationis est, quod ex tota secesserit, sed alio quodam modo, de quo postea uidebimus. nam si causa esset secessus, ut putat, non ex cunctis secedere partibus censendum esset: sed ab agēte, creatricēq; tantum uirtute, uelut à fabro, non à materia. sed hi simile aiunt, ut si uel à calceis proficisci dicant, filius enim qui patri similis est, simili ferē cultu corporis utitur. Causa autem ut uoluptas rei ueneret uehementior sit, non quod ex toto secesserit, est, sed quia prurigo uehemens accidit, quam ob rem si quis frequenter ea re utitur, minus afficitur uoluptate. Item uoluptas Veneris in fine coitus potissimum est. At si ex toto secereretur, non simul, sed singulis partibus, alijs prius, alijs post exularet. Causa uero quam ob rem ex mancis manca proueniunt, eadem est, & cur filij similes parentibus prodeunt, sed non manca etiam ex mancis gignuntur, ut & dissimiles suis parentibus: quorum causam postea considerabimus, eadem enim questio est. Item si

semen non à foemina emittitur, eadem ratione profectio, nec ex toto secedere pro-

uari potest. & si non ex toto secedit, nihil rationi repugnat, si à foemina quoque non secedere, sed alio quodam modo causam generationis præstari à foemina statuimus, qua de re ut differamus, proximum est, cum semen non ex cunctis secerit partibus apertum iam sit. Initium uero tum eius ipsius propositi, tum etiam sequentis totius disputationis, ut primum de semine quidnam sit, accipiamus. ita enim & officia ipsa, & quæ officijs accidunt, facilius considerare poterimus. Tale autem sua natura semen esse requirit, ut ex eo primo oriuntur ea quæ secundum naturam constituuntur, non quod ex illo (uerbi gratia) homine aliquid sit, quod agat. sit enim aliquid ex hoc, quia semen eius est. Sed cum multifariam aliud ex

alio fiat. alio enim modo, cum ex die noctem fieri dicimus, aut ex puero uirum,

quoniam hoc post hoc, alio cum ex ære statuum, aut ex ligno lectum, & quæcunq; ex materia fieri dicimus, ut ex aliquo, quod insit, & formetur, totum sit, alio cum ex musico immusico, aut ex sano ægrum, & omnino contrarium ex contrario. præterea, ut Epicharmus facit suam exaggerationē, ex calumnijs maledicta, ex maledictis pugna. quæ omnia eò referuntur, unde principium motus, quale id quoq; quod modo diximus, est. pars enim quædam totius discordiæ calumnia est: sed alia quorum extra, quod mouerit, est. ut ars extra suum opus est, & lucerna extra domus incendium. Cum itaque tot modis aliud ex alio fiat, semen in altero de duobus his esse, apertum est. aut enim ex eo ut materia, aut ut ex primo quod mouerit est quod gignitur. non enim ut hoc post hoc, quomodo ex Panatheneis nauigatio: neque ut ex contrario contrarium. gignitur enim contrarium ex contrario, quod corrumpitur: & aliud quippiam subijci oportet, ex quo primo in manēte sit. Igitur in utronam de duobus illis constituendum sit semen, considerandum est. utrum ut materia & patiens: an ut forma & agens: an etiam ut utrumq; unā enim cum ijs fortasse declarabitur, & quoniam pacto ex contrarijs generatio sit omnibus ijs, quæ ex semine oriuntur. nam ea quoque generatio quæ ex contrarijs sit, naturalis est. alia enim ex contrarijs oriuntur, mare dico & foemina. alia ex uno tantum, ut plantæ omnes, & animalium nonnulla, in quibus non distinctus, seorsumq; constitutus est sexus maris & foeminae. Genitura igitur id uocatur, quod à generante proue-

niens causa est, quæ prima obineat principium generationis: uidelicet in ijs, quæ coire natura uoluit. Semen autem est, quod ex ambobus coëuntibus illis originem trahit, quale semen plantarum omnium est, & animalium nonnullorum, in quibus sexus distinctus non est, uelut id quod ex mare ac foemina primum miscetur, quasi conceptus promiscuus quidam, aut animal. hæc enim iam habent quod ex ambobus requiruntur. Semen & fructus inter se differunt, prioris posteriorisq; ratione. fructus enim quod ex alio est: semen ex quo aliud, nam aliis ambo idem sunt. Natura autem prima eius, quod semen uocatur, quænam sit, exponenda latius est. Quodcumq; in corpore accipimus, aut partem esse secundum naturam, uel dissimilem uel similem necesse est: aut præter naturam, ut uel papulam, uel excrementum, uel colliquamentum, uel alimentum, excrementum appello reliquias alimenti. colliquamentum, quod ex incremento secernitur resolutione præter naturam, sed nullam id esse partem uel similem uel dissimilem apertum est, nihil enim ex eo, quæuis similari cõstituitur, ut ex neruo, aut carne. Quoniam etiam cum cæteræ omnes partes separatæ sint, ipsum separatū non est, nec uero præter naturam est, neq; naturæ oblatæ uitium, cum in omnibus insit, & natura ex eo ipso oriatur, alimentum planè res aduētitiæ est. Itaq; aut colliquamentū, aut excrementū esse necesse est, ueteres quidē autores opinari uidētur id esse colliquamentū. quod enim ex toto secedere propter motus calorē dicūt, uim habet colliquamēti, colliquamēta autē præter naturā sunt, nec quicquam secundū naturā oriri potest ex ijs quæ præter naturam sunt, excrementū igitur esse necesse est. At omne excrementum, aut alimentū inutiles est, aut utilis. Inutile dico, à quo nihil præterea naturæ suppedietur: sed quo plus absumitur, eo magis natura uitiatur, utile contrā, sed enim nō tale excrementum id esse cõstat, eo quod ijs qui uel ætate, uel morbo pessime se habent, genus hoc excrementū plurimū inest, semē minime, aut enim nullū omnino, aut non prolificum, propter inutile ac morbidū excrementū permissionē, ergo utilis excrementū pars aliqua semen est, utilissimū autē quod ultimū est, & ex quo iam unūquodq; gignitur membrum, est enim tum prius, tum posterius, primi igitur alimentū excrementū pituita est, & si quid aliud eiusmodi est, pituita enim alimentū utilis excrementū est, cuius rei indicium, quod permittū cum cibo puro alere potest, & labore absumitur, ultimum autem paruum admodū ex plurimo relinquuntur alimento, sed intelligendū perexiguo augeri quotidie animalia & plantas, nam nisi ita esset, additione pluris eadē uel minima modum excederent magnitudinis, igitur contrā quā ueteres putarunt, dicendum est. Cum enim illi quod ex toto secedat, semen esse fateantur, nos quod ad totum suapte natura faciat, semen esse fatebimur. Cumq; illi colliquamentū dicāt, nos excrementum potius esse statuimus, quod enim ultimum accedat, & excrementum ultimū sit, id simile esse probabilius est, perinde ut pictoribus sæpenuero aliq; uid andriceli, id est purpurissi remanet, simile eius quod cõsumperint. Tabescēs autem quodq; & colliquescens corrumpitur & degenerat, argumentum non colliquamentum, sed excrementū potius esse illud est, quod animalia magni incrementi minus fecunda, parua fecundissima sunt, plus enim colliquamēti esse in magnis necesse est, sed minus excrementi, quippe cum in corpus magnum copia absumatur alimenti, itaque parum sit excrementi. Item locus secundum naturam nullus colliquamento datus est, sed fluit quocumque facilius ferri potest. At naturalibus excrementis omnibus locus præscriptus est, uerbigratia, alimentis fici excrementis alius, humidi uesica, utilis uenter, seminalis uterus, genitale, mammae, in ea enim loca se colligunt atque confluunt. Testimonium etiam faciunt ea quæ eueniunt, ut semen, quod diximus, id sit, quæ ideo accidunt, quia talis excrementi natura est, dissolutio enim & imbecillitas manifesta consequitur, ubi uel

minimum

minimū id secesserit, ut quasi corpus eo sine priuetur, qui demum ab a'imento affe-
 ratur, pauci uero quidam & breui tempore per ætatem leuātur, cum id secedit: uis
 delict ubi copia superarit. quomodo alimentū primum, si, ubi modum excellerit
 emittitur, melius corpori cedit, leuat etiam cum secum alia trahit excrementa, non
 enim solum semen est quod exit, sed etiā alie permixtæ facultates cum eo secedunt,
 quæ insalubres sunt. quam ob rem nōnullis improle aliquādo est, quod emittitur,
 quia parum seminis habet. sed enim plurimis & magna ex parte ita accidit, ut ue-
 nere exoluatur, debilitenturq̃, ob eam q̃ am diximus causam. Ad hæc, semen nec
 in prima ætate, neq̃ in senectute, neq̃ in morbis est. carent hoc ægri propter imbe-
 cillitatē. senes, quia non satis eorum natura potest concoquere. pueri propter incre-
 mentū, absuntur enim totum alimentū in corporis desiderium, priusquā aliquid
 excrementi remaneat, quinquennio nanq̃ ferē corpus in homine quidem dimidiū
 capere uidetur omnis magnitudinis, quæ reliquo toto tempore comparatur. mul-
 tis autem & animalibus & plantis euenit differentia in ijs ipsis, tum generi cum ge-
 nere, tum etiam in eodem genere consortibus speciei inter se, ut homini cum homi-
 ne, & uiti cum uite, alia enim multū seminis adunt, alia parum, alia nihil omnino.
 idq̃ non præ imbecillitate, sed contrā nonnullis euenit. absuntur enim in corpus,
 ut hominū nonnullis, qui ubi per habitū corporis bonum carnulenti, aut pinguior-
 es euaserint, minus semen emittunt, minusq̃ rem uenercam expetunt. similis &
 uitibus affectio incidit, quæ nimia alimenti copia luxuriant, & hircire tantisper dis-
 cuntur. nam & hirci pinguescentes minus seminis habent. quam ob rem eos solent
 antè extenuare. & uites hircire ab ea ipsa hircorū affectione dixerūt, uiri etiam mu-
 lieresq̃ pingues minus fecundæ esse, quā non pingues uidentur. quoniam in ue-
 getioribus excrementū concoctum transit in pingue. nam & pinguedo excremen-
 tum est bonitatis substantiæ salubre. sunt quæ nullum afferant semen, ut salix, ut
 populus, itaq̃ alie quoq̃ eius affectionis cause reddi possunt. nam & per imbecil-
 litatem non concoquunt, & per uirium bonitatem absunt, ut dictum est. Simili
 modo fecundissima quoq̃, & fertilissima sunt, alia propter uires, alia propter im-
 becillitatē. multum enim atq̃ inutile excrementū permiscetur, ut uel morbi non-
 nullis contrahatur, cum non bene purgatio cessit, & alij euadunt, alij obeunt mor-
 tem. tabescunt enim eo modo quo per urinæ profusiuū. nam id quoq̃ uitium iam
 aliquibus accidisse certum est. Item meatus idem excrementū & seminis est. quibusq̃
 excrementū amborū tam sicci, quā humidi alimenti, ijs quo humidi eodem semi-
 nis quoq̃ secretio agitur, humidi enim excrementū est. nanq̃ omnium alimentum
 humidum potius est. At uero quibus hoc deest, ijs ea parte, qua cibi siccī sedimentū
 tendit, semen quoq̃ secernitur, addo etiam quod colliquatio & rabes semper mor-
 bosa est. excrementi emissio semper utilis est. seminis secessio in ancipiti uersatur,
 quoniam aliquid alimentū inutile assumit. At si colliquatio esset, semper noceret. quod
 nō facit. Semen igitur excrementū esse alimenti utilis atq̃ ultimum, siue omnia semen
 emit, siue non: in ijs tamen quæ emittunt, ita esse apertum iam est.

Menstrua esse excrementa, omniaq̃ sanguinea ea ipsa emittere.

Caput XXI




Ost hæc cuiusnam alimenti sit excrementū, & de menstribus differen-
 dum est. fiunt enim in nōnullis utiuparis menstribus. nam his declara-
 tis apertū erit, & utrum foemina semen emittat, ut mas, fiatq̃ unum
 ex ambobus seminibus mistum, an nullum semen a foemina secer-
 nantur. & si nullū, utrum aliud quippiam non conferat foemina ad gene-
 rationem, sed locum tantūmodo præbeat. an aliquid conferat. idq̃ quonam pacto,
 & quomodo. Sed enim sanguinem esse ultimum alimentū in sanguinario genere

animaliū: proportionale autem in exanguī, dictum antea est. Verum cum semen quoq; excrementū sit alimentū, eiusq; ultimi, aut sanguis, proportionale uē est, aut ex ijs aliquid, sed cum ex sanguine concocto digestoq; modo quodam pars quæq; gignatur, semen autem concoctum diuersum ā sanguine secernatur (nam in concoctum aut per uim emissum, uidelicet cum ultra modum quis re uenera uitur, cruentū iam aliquibus prodijt) constat semen esse excrementū alimentū sanguinei, quod ultimū in membra digeritur. & quidem uim magnam ob eam rem obtinet. Sanguinis enim synceri salubrisq; secessio resoluerē potest. utq; filij similes parentibus sint, ratio exigit, simile est enim quod ad partes accesserit, ei quod remanet. itaq; semen manus aut faciei, aut totius animalis est manus indefinita, aut facies, aut animal totum indefinitū. & quale quodcunq; illorum est actu tale, semen potentia est, aut corpulentia sua, aut facultate siue uirtute, quā in seipso contineat. Id enim nondum ex ijs quæ exposuimus, patet, utrum seminis corpus causa sit generationis, an habitū aliquem & principij motus genitale obtineat. neq; enim manus, neq; aliud quoduis membrū, sine anima, aut alia facultate est manus, aut quodlibet membrū, sed æquiuoce tantū. Constat etiam colliquationē quoq; seminariā ubi accidit, excrementū esse. quod uitium euenit, cum resoluitur in quod accesserit: quomodo cum protinus decidit quod tectorij operis modo illitum fuerit. Idem enim ultimū excrementum cum primo excremento est. atq; de his ad hunc modum disseruisse satis sit. Sed cum infirmioris plus excrementi, minusq; concoctū fieri, idq; copiam cruenti humoris esse necesse sit, infirmius autem secundum naturā est, quod minus caloris adipiscitur, taleq; foemina sit, ut antea dictum est, hinc secretionē quoq; illam sanguineam foeminae excrementū esse necesse est. Talis autem eiectio est eorum quæ menstrua appellantur. menstrua igitur excrementū esse, & proportionē, ut maribus geniturā, sic foeminis menstrua prouenire, apertum est. Recte autē ita dictū dicant ea quæ in ijs ipsis eueniūt. eadem enim ætate maribus genitura fieri incipit, & scernit: foeminis autem menstrua erumpunt. uox etiam mutatur, & mammae intumescunt. nec non desinente ætate aboletur maribus generandi facultas: foeminis menstruorū confluuiū. Ad hæc, indicium illa faciunt, ut excrementū sit hæc secretio foeminarū, quod non mariscæ, non profluuiū ē naribus sanguinis, non uarices, nō tale quid mulieribus magna ex parte accidere solet, quādiū menstrua profluūt. & si quid tale accidit, deteriores fiunt purgationes, quasi hæc materia menstrua consumpta in ea fuerit, minus etiam uenosa sunt foeminae, quā mares: & lautiores leuioresq; sunt, quoniam excrementū quod eō tendat, confluere in menstrua solet, hanc eadem causam esse putandū, & ut corpora minora sint foeminarū, quā marium in uluiparo genere. in hoc enim uno menstrua profluūt, & omnium apertissime in muliere, plurimū namq; menstrui excrementi mulier emittit, ex quo sit, ut euidētissime palleat. & obscuriores habeat uenas, & corpore planē ad marem deficiat. Sed cum menstrua sint quod foeminis fiat perinde ut maribus genitura, nec fieri possit ut duæ simul secretionēs seminales agātur, ideo semen ā foemina nō conferri ad generationē apertū est. nam si semen esset, menstrua nō essent, nunc ideo illud deest, quia hæc sunt. Sed menstrua esse excrementū, ut semē, explicatū iam est. Testimonio autē eodem accipi possunt aliqua ex ijs, quæ animalibus accidunt, pinguis enim minus seminis habent, quā macilenta, ut antea dictū est, cuius rei causa est, quod & pinguedo excrementū, ut semen, & sanguis cōcoctus est, quāq; non eodem modo, quo semen. itaq; ratione optima sit, ut cum materia superuacua consumpta in pinguedinē sit, deficiat genitura. generis etiā exanguis mollia, & crustata optima sunt, cum uero gerunt, quod enim sanguine carēt, nec pinguedo in ijs consistit, hinc proportionale pinguedinis scernit in seminale excrementū. Indicio autē est non

est non tale semen à foemina emitti, quale à mare, nec amborum mistura generari, ut aliqui uolunt, quod sexpenumero iocemina concipiât sine ea, quæ per coitum sit, uoluptate. rursusq; cum ea ipsa uoluptate, pariq; concursu profusionis utriusq; nihil magis concipitur, nisi menstruorū humor sit modice temperatus. quam ob rem nec nullis omnino uicibus menstruorū foemina generat, necq; cum effluit magna ex parte: sed à purgatione, uis enim quæ in maris genitura continetur, aut caret alimeto et materia, ex qua instituat animal: aut nimia copia semen cum humore eluitur. sed ubi effluerint satis, quod remanet, cōsistit. Quæ autem nullis menstruorū uicibus concipiunt, aut interea dum agitantur, & effluunt, non possunt, earum alteris

10 causa est, quod tantū humoris continent, quantum prolificis remanet à purgatione, quandoq; non ita superat, ut effluere possit: alteris, quod à purgatione os uteri cōprimatur. Cum igitur multum quidem effluxit, sed adhuc effluit, tamen non tantū ut semen elabatur, tunc concipiunt. nec uero absurdum quicq; si à conceptu item effluunt menstrua. nam uel post aliquādiu prodeunt, quandoq; parce: nec semper, sed id morbidū est. quā ob rem paucis, & raro accidit. Quæ autē magna ex parte sunt, ea maxime secundū naturā sunt. à foemina igitur conferri ad generationē materiā, quæ in menstruorū constitutione sit: menstrua autē ipsa esse excrementū, apertum iam est.

Contra eos qui credunt foemina, ut maris semen genitale emittere, argumento quod pari ferē uoluptate afficiantur. Caput XX

10  **Q**uod autem semen conferri à foemina per coitum nonnulli existimant, propterea quod interdum simili uoluptate afficiatur, ut mas, simulq; aliquod humoris secernat, id nō humor seminalis est, sed loci proprius. uteri enim excretio est, quæ alijs euenit, alijs non. euenit (quod plurimum dixerim) ijs quæ nitidæ foeminaresq; sunt, non euenit ijs, quæ fusæ atq; ulragines. copia uero quibus euenit non pro seminis emissionē interdū est, sed multo excedit. tum etiam ciborum diuersa ratio plurimum facit, ut plus minus uel elus humoris excernat. ut quædam acris saporis augent planē excernendi modum. uoluptas autem quæ per coitum sentitur, non solum semine exeunte accidit, sed etiam spiritu, ex quo consistente semen emittitur. quod patet tum in adolescentulis, qui nondum emittere queunt, propeq; ætate sunt: tum in uiris genitura ex pertibus. uoluptas enim ijs omnibus scalpendo excitatur. & quorū deprauata est generatio, alius interdum soluitur, propterea quod excrementū eō secedit, quod cōcoquit atq; effici semen non possit. forma etiam similis mulieris & adolescentuli est. & mulier quasi mas in seminis est. impotentia enim quadam foemina est, eo quod semen ex ultimo alimento concipere nequeat. quod alimentū aut sanguis est, aut sanguinis proportionale in ijs quæ sanguine carent propter naturæ frigiditatem. ut igitur in alio profluuium accidit cruditate, sic in uenis, tum cætera profluuiā sanguinis, tum menstrua ueniunt. nam ea quoq; sanguinis profluuiū sunt. sed

40 illa morbo citiatur, hoc naturale est. itaq; generationem ex eo ratione optima fieri, apertum est. Sunt enim menstrua semen non purū, sed indigens cōfectionis, quo modo in fructuum generatione adhuc imperfecta, inest quidem alimentū, sed confectionē ad puritatem desiderat. quamobrē ut menstrua genitura admista generant, sic alimentū in fructibus gignendis mistum alimento syncero alit. Indicio etiam est semen non emitti à foemina, quod cum per coitum seminis uoluptas cōtrectatione loci eiusdē atq; maribus ueniat, tamen humor ille non hāc emittit. Item non omnibus foeminis id excernitur, sed sanguineis tantum. ijsq; non omnibus, sed quibus uterus non ad septum transuersum est, nec partus ex ouo. Ad hæc, ijs quæ non sanguinem, sed proportionale sanguinis habent, non emittitur ille humor. ut enim

in alijs sanguis, sic in his alla inest miscella, causa autem ne aut his, aut supradictis sanguineis fiat purgatio, siccitas corporis est, quæ parum excrementi relinquit, quantumque satis duntaxat ad generationem sit, non ut etiam aliquid foras mittatur. At vero quæ uiuipara sunt sine oui partione, ut homo, & quadrupedum, quæ suffraganea intus flectunt (hæc enim omnia animal procreant sine ouo) ijs omnibus ea purgatio fit, nisi quid lesum per generationem sit, ut mula, tamen nullis tam purgationes redundant, quam homini. sed quemadmodum cuique animali hæc eueniant, in libris de historijs animalium scriptum est. plurima ex omnibus animalibus purgatio mulieribus fit. maribus etiam plurimum emittitur seminis, magnitudinis ratione. cuius rei causa est constitutio corporis, quæ humida & calida est. plurimum enim excrementi fieri in eiusmodi corpore necesse est. caret etiam partibus ijs, in quas uertitur excrementum in cæteris animalibus, non enim pilorum copiam gerunt per corpus, non ossium, aut cornuum, aut dentium excretiones. indicium semen esse in menstruis, quod simul, ut antè dixi, maribus semen fieri incipit, & foeminis menstrua innotescunt eadem ætate, tanquam simul ea loca distendantur, quæ utrumque recipiant excrementum. Cumque tempus distendendi instat, loca intumescunt à spiritu, quod marium testes apertius ostendunt, quantumque & mammae. sed foeminarum mammae potius indicant, cum enim bino digito extolluntur, tunc plurimis incipiunt menstrua. igitur in quibus uita prædictis sexus maris ac foeminae distinctus non est, in ijs semen uelut conceptus iam est, conceptum appello primam ex mare ac foemina misuram. quam ob rem ex uno semine unum gignitur corpus. uerbi gratia, ex uno tritici grano unus fundus, ut ex uno ouo unum animal, geminum enim ouum, duo est oua. At in quibus generibus mas & foemina distinguitur, in ijs plura animalia ex eodem semine gigni possunt, quasi natura differat, semen in plantarum & animalium genere indicium est, quod uno intuitu plura gignuntur in ijs quæ plura quam unum possunt generare, quo argumento constat etiam non omni ex parte corporis generatur provenire, neque enim distincta statim inde ex eadem parte discernentur, neque postquam simul ad uterum deuenissent, ibi distinguerentur, sed euenit porro quod ex recta ratione est, ut cum mas formam & principium motus præbeat, foemina corpus atque materiam (quemadmodum in lactis coëctione corpus lac ipsum est, succus aut coagulum principium spissandi cogendi que obtinet) sic quod à mare in foemina distinguitur intelligi debeat, cur in plura paucioræue partiatur, aut singulare instituat, alia ratio est, sed quia non differat forma quod diuiditur, si modo se habeat modice ad materiam, ut neque minus sit, ut concoquere densareque nequeat, neque amplius ut exicare possit, sit ob eam rem ut plura generentur. Cæterum ex eo quod primum constitit, ex uno iam unum tantum procreatur, sed genitura à foemina non conserri ad generandum, tamen aliquid conserri, idque esse menstruorum constitutionem, aut proportionale in genere exangulum, tum ex supradictis, tum etiam ratione uniuersalique indagatione constat, esse enim quod generet, & ex quo generet, necesse est, idque quauis unum, forma quidem differre, & rationis diuersitate oportet. At uero in ijs, quæ distinctas eas potentias obtinent, corpus etiam & naturam diuersam esse agentis & patientis. Quod si mas est ut mouens & agens, foemina qua foemina, ut patiens, sequitur ut ad maris genituram foemina non genitura, sed materiam conferat, quod & fieri ita uidetur, natura enim menstruorum pro prima materia est. Atque de his ita docuisse satis sit. Apertum unum cum ijs est, de quo differendum deinceps sit, quemadmodum scilicet ad generationem mas conferat, & quonam pacto semen maris causa eius quod gignitur sit, utrum ut insitum, & protinus inde pars corporis gignendi mistum cum materia foeminae, an semen nihil commune cum corpore habeat, sed motus, utique in eo contenta sit quæ comuniceet, hæc est enim quæ agat, quod autem consistat & formam recipiat,

recipiat, reliquum excrementi foeminae est, atq; ut ratione, sic effectis quoq; proba-
ri uidetur. nam cum in uniuersum animo cōplectimur, non ita effici unum ex pa-
tiente agenteq; uidet, ut quod agit, in eo quod efficii insit: nec omnino ex eo quod
mouet, & quod mouetur quicquā constituit. At foemina quidem ex foemina, pa-
tiens est: mas, qua mas, agens, & unde mouendi principium est, itaq; si extrema u-
triusq; sumantur, qua alterum agens & mouens, alterum patiens & quod mouea-
tur sit, nō ex ijs unū quod gignitur est, sed ita ut ex fabro et ligno lectus, aut ex cera
& forma globus est. Pater igitur nihil fecerit à maris semine esse necesse. neque si
quid accedit, idcirco ex eo, ut insito esse, quod gigni, sed ut ex eo quod mouerit, &
10 forma, utq; à medicina qui sanatus est, facta etiam rationi cōsentiant. hinc enim ma-
res nonnulli per coitum nec membrū quidem ullum in foeminam indere uidentur,
sed contrā foemina in marem, ut in quibusdam insectis fit. quod enim in ijs, quae in-
dunt, efficitur femine in foemina, idem in mare ipso uapor uirtusq; efficit, foemina
admouente suam particulā quae seminis capax est. unde sit ut genus id animalium
diu coeat, absolutumq; breui generet. coniuncta igitur manent quousque consti-
tuant perinde ut genitura constituit. sed abiuncta cito adunt conceptum, quoniam
& imperfectum quod pariunt est. quippe quae uermiculum omnia id genus pro-
generent. maximo sanē indicio est, quod aubus & piscibus ouiparis euenit, semen,
nec omni ex parte corporis uenire, neq; tale quid emitti à mare, quod insit in eo,
20 quod geniturum est: sed uirtute tantum cōtenta in genitura uiuificari, ut modo dixi-
mus de insectis, quorum foemina transigit in marem. Nam siue accidit ut auis hype-
nemia, id est subuentanea, oua ferat, si postea coit nondum mutato ouo ex luteo in
album, foecunda ex subuentancijs redduntur, siue concepta ex coitu, si adhuc luteis,
cum alio mare coiuuit, simile eius, quo cum postea coiuuit, provenit omne genus pul-
lorum. quapropter nonnulli ex ijs, qui ut gallinae generose procreentur, operam
dant, ita mutatis admixtarijs faciunt, tanquā non misceatur, constitutioneq; subeat
semen, neq; omni ex parte uenerit, ex ambobus enim uenisset. itaq; bis partes eas-
dem haberet, sed sua facultate semen maris materiā cōtentā in foemina, & cibum
qualitate quadam afficiat. id enim efficere potest, ubi secundum praecenerit tepefa-
30 ciendo, & cōcoquendo. cibus enim ab ouo absorbitur, quandiu crescit. Hoc idem
in generatione quoq; ouiparorum piscium euenit. ubi enim foemina oua adiderit,
mas semen aspergit. & quaecunq; attingit, foecunda efficiuntur. quae non attingit, re-
manent infaecunda, quasi non ad quantitatem mas conferat, sed ad qualitatem. patet
igitur ex ijs, nec omni ex parte semen secedere, neq; foeminā ita ut marem cōferre
ad generationē, sed marem principii motus, foeminam materiā praestare. hac enim
causa, nec per se ipsa foemina generat. principii enim & id qd moueat discernatq;
desiderat. Sed nonnullis, ut aubus aliquatenus natura gignere potest. Aues enim
constituit quidem oua, sed imperfecta, quae subuentanea uocantur, & ortus eius
quod generatur, in foemina agitur. nec in marem semen emittit aut mas, aut foemi-
40 na, sed ambo in foeminā conferunt, quod suum utriq; sit. quoniam in foemina ma-
teria est, ex qua constat quod creatur, ac protinus partim haberi paratā materiā
necesse est, ex qua primus cōceptus consistat: partim subinde accedere, qua nutria-
tur & crescat. itaq; partū in foemina cōtineri necesse est. nam & faber adest ligno &
figulus limo. deniq; omnis actio & motio ultima iuxta materiā est, ut aedificatio in
ijs quae aedificantur. hinc etiam quemadmodū mas conferat ad generationē accepe-
ris. nec enim mas omnis semen emittit, & quibus emittitur maribus nulla pars fo-
tus hoc est. sicut nec à fabro quicquā secedit ad lignorū materiā, neq; pars ulla ar-
tis fabrilis in eo quod efficitur, est: sed forma & species ab illo per motum in materiā
existit, atq; anima in qua forma & scientia est, mouet manus, aut aliud membrum

An maris seme
pariter cu
miherris, cōc
corporeū sub
cōstituat i

similitudine

motu certæ qualitatæ uel diuerso, à quibus efficitur diuersum, uel eodem à quibus idem. manus autē instrumenta quæ materiam mouent. Ita natura etiā maris semen emittentis utitur eo semine quali instrumento, & actu habente motum: ut in operibus artium instrumenta mouentur. in illis enim quodammodo motus artis est. Quæ igitur semen emittunt, hoc modo ad generationē conferunt. Quæ autem non emittunt, sed fœmina particulam sui quandam inserit in marem, hæc simile facere uidentur, quasi quis materiam ad opificem afferat. nam ob imbecillitatē eorum marium nihil per aliud natura efficere potest: sed uix assidente ipsa motus ualent, & similis fingenti, non fabricanti est. quippe quæ non per aliud attingens, sed ipsa suis membris rem condat instituendam. Sexus igitur maris ac fœminæ distinctus in genere omnium animalium gressum est. & quæque diuersa sunt animalia mas & fœmina, tamen specie idem sunt. uerbi gratia, homo utrunque. At in plantis facultates istæ miscentur, nec mas à fœmina separatur. quam ob rem ex se ipsæ progenerant, nec generituras emittunt, sed conceptū, quod semen uocatur, afferunt. idē Empedocles bene retulit suo carmine: Deinde etiā ouiparo genus arborē tulit ortu. Ouum enim conceptus est, & animal ex parte eius creatur. reliquū alimentū est. animalis seminis etiā aliqua ex parte consistit quod oritur. reliquū alimentum germini radicis primæ est. hoc idem quodammodo in ijs quoque euenit animalibus, quæ sexu distinguuntur. cum enim uniuntur & generant, inseparata redduntur ut plantæ. idē natura eorum nititur, ut unum fiat, quod cum coeunt, & coniunguntur, conspiciuntur unum effici animal ex ambobus. atque ea quæ semen non emittunt, diu complexa funguntur Venere, dum conceptum constituunt: ut insecta, quæ solent coire, alia tandiu exsunt, donec partem aduentitiam quandam mittant, quæ conceptū constituat spacio temporis longiore, quā in sanguineo genere agatur. hæc enim parte quadam diei coheret. generitura intra plures dies constituit, mox ubi eam emisserunt partem, absoluuntur. profectō animalia tanquā plantæ diuise esse uidentur, perinde quasi illas quoque postquā semen attulere dissoluas, & separes in sexum insitum maris ac fœminæ. Atque hæc omnia recte ita à natura condita sunt. plantarum enim substantiæ nō aliud munus, nulla actio nisi generatio seminis est. quod cum maris ac fœminæ coitu efficiatur, miscuit ea natura, indiscernitque sexum maris & fœminæ plantarum generi tribuit. Sed de his alibi disputatū à nobis est. At animalis munus non solum generare, quod cōmune omnium uiuentium est, sed etiā cognitionis alicuius particeps unūquodque est, aliud maioris, aliud minoris, aliud minimæ. sensum etenim habent. sensus autē cognitio quædā est. cuius siue nobilis, siue ignobilis nota plurimū referet ad hominis ne prudentiā, an ad genus inanimatū consideretur: nam ad prudentiam nihil esse uidebitur, tactum gustumque tantum adipsæ. At ad sensus uacuitatem summū id esse putabitur. Charum enim censueris compositionem eius esse cognitionis, nec emortuū expertemque essentia omnis iacere. sensu autem animalia differunt ab ijs quæ tantum uiuunt. sed cum uiuat etiā quod animal est, necesse sit, cum fungi uiuentis munere opus est, tunc coeunt & miscentur, & quasi plantæ efficiuntur ut dictum est. Caterum genus animalium testa instructum, quoniā inter animalia & plantas ambiguū est, ut in ambobus constitutū generibus, munere neutrius fungitur. nam ut planta sexu maris & fœminæ caret, nec in altero generat. ut autē animal, nullum ex se fructū afferit modo plantæ: sed consistunt & generantur ex terrena & humida quadam concretionē. sed de eorum generatione postea differemus.

*Quid sit causa, ut principium generationis cuiusq; mouens primum,
& procreans. Caput 1*



MAREM ac foeminam esse principia generationis, & quatenam
eorum essentiae uis atque ratio esset, dictum iam est. Sed quam
ob rem gignatur, & sit alterum mas, alterum foemina, ut necessa-
rio, & quonam primo mouente, & quali materia id efficiatur,
procedendo explicare conabimur. At uero quod ad melioris
rationem & causam, cuius gratia pertinet, coelitus principium
ducitur. Cum enim rerum aliae sint sempiternae, summeq; di-
uinae, aliae quae possint & esse, & non esse: pulchrum autem diuinumq; illud causa
semper sua natura melioris conditionis in rebus contingentibus: sit quod uero sem-
piternum non est, id & esse, & particeps tum deterioris conditionis, tum melioris esse
possit: cumq; anima sit corpore melior, animatumq; inanimato praestet propter ani-
mam: & esse, quam non esse, & uiuere, quam non uiuere melius sit: efficitur his de
causis, ut generatio sit animalium. Cum enim natura eius generis sempiterna esse
non possit, quo modo fieri potest, eo sempiternum quod gignitur, est. numero igitur
non potest. substantia enim rerum in singularibus est. quae si talia essent, semper-
na essent. specie uero potest. itaq; genus hominum semper, & bestiarum, & plantarum
est. Sed cum principium sit eorum mas atq; foemina, sit ut generationis gratia sit mas
& foemina in rerum natura. Cumq; sua natura melior, magisque diuina causa sit ea,
quae prima mouet, cui ratio inest, & forma, quam materia: cumq; melius etiam sit
separari a deteriori quod melius est, ideo in quibuscumq; fieri potest, & quoad eius
fieri potest, mas a foemina separatur. melius enim, magisque diuinum est principium
motus quod per generationem mas obtinet. foemina enim materia est, sed coit, & un-
gitur ad generationis officium mas cum foemina, id enim commune ambobus est. Qua
igitur ratione sexu maris ac foeminae participant, uiuunt, quae ob rem plantae quoq;
uitae particeps sunt. quae autem sensus adest, genus animalium est. Quorum incessabilibus
ferè omnibus mas a foemina separatur, ob eas quas modo reddidimus causas. eorumq;
alia, ut dictum est, semen emittunt: alia non emittunt cum coeunt, cuius rei causa est, qd
quae nobiliora sunt, eadem sua natura magnitudinem sibi postulant, quod non nisi ca-
lore animali fieri potest. Quod enim maius est, id a facultate ampliore moueri ne-
cesse est. mouere autem calor potest. quam ob rem in uniuersum propè dixerim, ma-
iora quae sanguinem habent, quam ea quae non habent: & incedentia, quam sta-
bilia, maiora, quae semen genitale propter calorem ac magnitudinem emittunt. de
mare & foemina quam ob causam sint, dictum iam est. Animalium uero alia persi-
ciunt partem, forasq; mittunt sibi simile: ut ea quae animal adunt in lucem, alia non
dum explanatum, suamq; formam adeptum pariunt. quorum sanguinea ouum pa-
riunt, ex angula uermem. Inter ouum & uermem hoc interest, ouum est cuius ex
parte animal gignitur, reliquus cibus et quod gignitur, est. uermis ex quo toto ani-
mal gignitur. Eorum autem quae perfectum sibi simile adunt in lucem, atq; uiuipara
sunt, alia statim intra se animal gignunt, ut homo, equus, bos, & ex marinis delphi-
nus, & reliqua generis eiusdem. alia ubi primum intra se ouum genuerint, mox ani-
mal adunt foras: ut quae cartilaginea appellatur. Oviparorum alia ouum adunt per-
fectum, ut aues, & quae quadrupedes ouum pariunt, ut lacertae, & testudines: aut
quae pedibus carent, ut serpentum pars plurima. oua enim eorum postquam pro-
dierunt, nullum in super capiunt incrementum, alia imperfectum adunt, ut pisces,

& crustata, & mollia nomine. namque eorum oua ædita augentur. Omnia quæ aut animal pariunt, aut ouum, sanguinem habent. & quæ sanguinē habent, aut animal pariunt, aut ouum; nisi omnino improla sint. Exanguium insecta uermiculum pariunt, quæ aut ex coitu generantur, aut ipsa coeunt. Sunt enim nonnulla insecta, quæ sponte naturæ gignantur: sed sexum maris ac foeminae habeant, coniuncti quoque procreent aliquid. quod tamen generant, imperfectum est, causam antea reddidi. Magna permutatio generibus euenit. nec enim bipedes omnes uel animal pariunt uel ouum. aues enim ouum, homo animal parit, neque quadrupes omnes, aut ouis pariunt, aut animal. equus enim & bos, & aliæ plurimæ animal pariunt. cæteræ, crocodili, & aliæ complures ouum. nec uero in habendis pedibus, nec ne, ratio partus continetur. nam expeditum aliæ animal pariunt, ut uiperæ & cartilagineæ. aliæ ouis, ut piscium genus, ac cæteræ serpentes. pedes habentium multæ & ouum, & animal pariunt, ut quadrupes, quas modo enumerauimus. nec non intra se pariunt, tum pedata, ut homo: tum expedita, ut balenæ, delphini. sic igitur diuidi non potest, nec discriminis eius causam habet instrumentum ullum in se delegatum. Sed enim ea pariunt animal, quæ natura perfectiore sunt, & principium syncerius obtinent. nullum enim intra se gignit animal, nisi quod aërem recipit & spirat. perfectiora autem sunt, quæ natura calidiora & humidiora, nec terrena constant. Caloris uero naturalis ratio, pulmone describitur sanguinis compote. quæ enim pulmonem habent, omnino calidiora sunt ijs quæ non habent. & inter ea superant, quæ non fungosum, aut retorridum, & parum sanguinis continentē habent pulmonem, sed sanguinolentum & mollem. utque animal res perfecta, uermis autē & ouum imperfecta est, sic perfectum nasci solet à perfectiore. Quæ autem calidiora quidem sunt propter pulmonem, sed natura constant siccore, aut quæ frigidiora quidem, sed humidiora sunt, eorum altera ouum ædunt perfectum: altera intra se, & ouum & animal pariunt. Nam & aues, & cortice intacta calore suo perficiunt, sed præ siccitate ouum pariunt. cartilaginea cum minus ijs calida, magis humida sint, utroque participant, quippe quæ & ouum & animal intra se pariunt: ouum, quia frigida sunt: animal, quia humida. humor enim uiuificus est, siccitas longe à uita remota est. sed cum non penna, non cortice, non squama tegantur, quæ indicia sunt naturæ sicce atque terrena, idcirco molle generant ouum. ut enim ipsis, sic eorum ouis nulla satis insidet siccitas, atque ob eam rem intra se pariunt oua. nam si ouum foras prodiret, facile periret, carens putamine quod protegat, duriorē, frigida sicciora quoque pariunt quidem ouum, sed imperfectum, crusta etiam duriuscula opertum, propter naturam terrenam sui generis, utque imperfectum exiens possit seruari tutela operimenti testacei. Pisces itaque cum squamati sint, & genus crustarum, ut terrena constitutum natura, oua putamine duriorē generant. Sed mollium genus, ut ipsum natura corporis lenta est, sic oua, quæ imperfecta ædere solet, tuetur & seruatur, plurimum enim lentoris sua cum foetura emittunt. Insecta omnia uermiculum pariunt, eademque omnia sanguine carent. unde fit, ut quæ extra uermiculū pariunt, sanguine uacent, quamvis exanguia non omnia uermem pariant. commutant enim inter se uices insecta, & quæ ouum pariunt imperfectum: ut pisces squamati, & crustata, & mollia. horum enim oua uermem imitantur: quippe quæ foris incrementum recipiant. illorum uermiculi tempore procedente in speciem ouis transeunt. quod quemadmodum fiat, postea explicabimus. Nunc prius intelligendum quam bene, miroque deinceps ordine natura reddit generationem. perfectiora enim calidiora quoque animalia prolem reddunt perfectam qualitate. nam quantitate nullum omnino animal perfecte progenerat. omnia enim posteaquam nata sunt incrementum recipiunt, & generant quoque ea ipsa animalia intra se statim, cætera ab ijs proxima loco secundo constituta, non statim perfecta intra se generant.

generant. cum enim prius intra se ouum pepererint, mox animal addunt in lucem. Alia non perfectū animal generant, sed ouum, idē perfectum. quæ autem ipsi frigidiora conitant natura, generant quidē ouum, sed non perfectum, uerum quod foris perficiatur, ut genus piscium, squamata, & crustata, & mollia. Quintū genus quod frigidissimū est, ne ouum quidem ex sese parere potest. sed hæc affectio foris euenit ei, ut dictum est. Insecta enim primo uermiculum parunt, qui addito tempore speciem accipit oui. Aurelia enim appellata oui obtinet facultatē, tum ex eo animal nascitur, tertia mutatione finem recipiens generationis. Sunt igitur quæ non semine genitali procreantur, ut antea dictum est. Sanguinea tamen omnia semine procreantur, uidelicet ea quæ per cotum oriuntur, emissā à mare in foeminā genitura: quæ ingesta animalia constituuntur, suamq; formam recipiūt, aut intra ipsa animalia quæ solent animal generare, aut in ouo, aut in semine, & eiusmodi alia secretionē, de quibus quæstio longe dubia oritur, quonā pacto ex semine generetur aut planta, aut animal. quod enim gignitur, & ex aliquo, & ab aliquo, & aliquid gigni necesse est. ex quo gignitur materia est, quam nonnulla secum habent primam acceptam ex foemina: uerbi gratia ea, quæ non forma animalis nascuntur, sed uermiculi, aut oui, quædam diu ex foemina capiunt, quoniam lactent: ut ea quæ non modo foras, uerum etiam intus forma animalis gignantur. Talis, id ex quo oriuntur, materia est. sed hoc loco non ex quo oriuntur querimus, sed à quo partes corporis generentur. aut enim extrinsecus aliquid, aut in genitura & semine insitū agit. idē aut pars aliqua animæ, aut anima, aut habens animam est. sed ab aliquo extrinsecus agente effici quæq; aut uiscera, aut alia membra, remotū à ratione uidetur. fieri enim non potest, ut moueat quod non tægit, & quicquā ab eo quod nō moueat, afficiatur. igitur in ipso conceptu aliquid iam inest, quod aut pars eius sit, aut seorsum contineatur. Sed aliud quicquā esse abiunctum, irrationabile est. etenim generato iam animali, corrumpatur ne illud, an maneat. At nihil inesse uidetur, quod non totius pars sit, aut plantæ, aut animalis. Quinetiā corrumpi, postquā uel omnes, uel aliquot partes efficit, absurdum est. Quid enim efficiat reliquas: nam si illud posteaquā effecerat, cor interijci, cor autem ipsum partem aliam efficit, eiusdem rationis est, ut uel omnia intereant, uel omnia seruentur. ergo seruari necesse est. pars igitur eius est id, quod protinus in semine inest. sed si nihil animæ est, quod non aliqua in parte sit corporis, ut animata quoq; pars aliqua protinus sit, cōsequitur. sed cætera quonam pacto efficiantur? Aut enim simul omnes partes generantur: uerbi gratia, cor, pulmo, iecur, oculus, & reliqua omnia. aut ordine deinceps, ut in his carminibus, quæ ad Orphedū autorem referuntur. Similiter enim, ut retis implexum, constitui animal ibi scribitur. Sed enim nō simul omnia effici, uel sensu percipi potest, cum partes aliæ iam inesse, aliæ nondum adesse cernantur. nec dici potest eas præ sua exiguitate latere. pulmo enim qui amplioris, quàm cor magnitudinis est, posterior corde in primo ortu conspicitur. Sed cum aliud prius, aliud posterius fiat, utrum alterum efficiat alterum, & sit propter proximū, an potius hoc post hoc fiat: uerbi causa, nō cor iam ortū efficit iecur, idē aliud quippā, sed hoc post hoc, ut postquam puer factus est, uir efficitur, non à puero agente uir efficitur. Cuius rei ratio illa est, quod ab eo quod actu est, id quod potentia est, efficitur, tum in naturæ, tum in artis operibus. itaq; speciem & formam esse in illo oportere: uerbi gratia, in corde formam iecinoris: quanquā aliàs quoq; illa opinio absurda & cōmentitia est. Quinetiā ut in semine protinus pars aliqua animalis, aut plantæ facta contineatur, siue quæ cæteras efficere possit, siue quæ non possit, impossibile est, quando ex semine & genitura omnia generantur. ab eo enim qui semen fecerit, creatum id proculdubio est, siquidem protinus inest. At uero semen prius fiat oportet, idē officium generantis est. nulla igitur pars con-

dita ineffe potest. ergo quod agit, nullam in se habet partem. at ne extra quidem,
 alterutrum autem sit, necesse est. Hæc igitur soluere cōsūdum est. fortasse enim ali-
 quid ex ijs quæ diximus, non simplex est, ut ab extero nihil effici posse. nam & est
 ut possit, & est ut non possit. sed semē, an id, à quo semen, dicamus, nihilo refert: scilicet
 licet qua motum, quem illud mouebat, semen in seipsum continet. fieri autem po-
 test, ut hoc ab hoc moueatur, & hoc ab hoc, sitq; perinde quasi admirabilia illa spon-
 tina. partes enim habent uim modo quodam, eam cum quiescunt, quarū primam
 ubi extrinsecus aliquid mouerit, statim proxima actū efficitur. ut igitur in spontinis
 illis quodammodo illud mouet, quod nihil nunc tangit, sed antē teugit: sic id à quo
 semen, aut quod semen effecit, mouet, cum aliquid tetigerit, quāquam non adhuc
 tangit. & motus qui inest, quodam efficit modo, ut ædificatio, ædes. igitur aliquid
 esse quod efficiat, sed non ita, ut hoc quicquam, nec perfectum ineffe primū agens,
 apertum iam est. quemadmodum autem unumquodq; fiat, accipiendum hinc est
 hoc initio: Omnia quæcunque aut natura aut arte efficiuntur, ab eo quod actū est,
 fiunt, ex eo quod potentia tale est. Semen igitur tale est, motumq; habet, & princi-
 pium tale, ut motu peracto pars existat quæque, eademq; sit animata. non est enim
 facies, nisi animam habeat, neque caro, sed corrupta æqui uoce dicitur facies, aut ca-
 ro, perinde quasi lapidea, aut lignea facta sit. simul autem partes similes, & instru-
 mentales, siue officiales efficiuntur. & quemadmodum non securim, non aliud in-
 strumentum dixerimus factum esse ab igne solo, sic non pedem, non manum, eo-
 demq; modo ne carnem quidem. nam eius quoque aliquid officium est. dura igitur
 tur, mollia, lenta, rigida, & quicunque alij affectus partibus insunt animatis, à cali-
 ditate, frigidityte ue effici possunt. At ratio, quæ iam caro, aut os est, non potest sed
 à motu proficiscente efficitur ab eo, quod genuit, quodq; actū est id, quod poten-
 tia est id, ex quo gignitur. quomodo in ijs quoque agitur, quæ arte efficiuntur. ser-
 rum enim durum aut molle efficitur calore uel frigore. at uero ensis à motu instru-
 mentorum, qui artis obtinet rationem. Ars enim principium, formaq; eius, quod
 efficitur est, sed in alio. Motus autem naturæ in ipso est, ab altera proiectus natu-
 ra, quæ actū obtinet formam. Sed habeat ne semen animam, nec ne, ratio eadem
 atque de partibus reddenda est. nec enim anima ulla esse potest in alio, nisi in eo
 cuius est. neque pars ulla esse potest, quod particeps animæ non est, nisi æqui uo-
 ce, ut mortui oculus. semen igitur & habere animam, & esse potentia palam est.
 Propius autem & remotius idem à seipso potentia esse potest: ut Geometra dor-
 miens remotius quàm uigilans est. is que remotius, quàm qui tam contemplatur.
 Sed enim huius nulla pars causa est generationis, sed quod primum extrinsecus
 mouit, id causa est. nihil enim seipsum generat, sed postquam generatum est, se-
 ipsum iam auget, quam ob rem non simul omnes partes generantur, sed una pri-
 mum, eamque primum oriri necesse est, quæ principium augendi contineat. siue
 enim planta siue animal est, æque omnibus inest, quod uim habeat uegetandi, siue
 nutriendi, id autem est quod tale alterum generet quale ipsum est. hoc enim cu-
 iusque perfecti, tum animalis, tum stirpis secundum naturam officium est. necessi-
 tatis autem ratio est, quod cum aliquid ortum est, augeri idem necesse est. Generat
 igitur quod est uniuocū, ut homo hominem: sed per seipsum augetur. ergo ipsum,
 cum aliquid sit, auget. quod si unum quid, idq; primum sit, id primum generari ne-
 cesse est. itaque si cor primum in nonnullis oritur animalibus, aut cordis propor-
 tionale in ijs quæ corde carent, ex corde principium illud est, in ijs quæ cor habent,
 cæteris ex proportionali. exposui tam ad ea quæ antē quærebantur, quid causa sit,
 ut principium generationis cuiusque mouens primum, & procreans.

De feminis natura, & quid sit, & quam ob causam non congelascit.

Caput II



E feminis natura dubitauerit quispiam, semen enim prodit de anima li crassum & album, mox refrigeratum, humidum ad aquæ speciem redditur, colorem etiam accipit aquæ. Absurdum igitur id putaueris, aqua enim non crassescit calore, id autem intrinsecus è loco calido proficiscitur crassum, refrigeratumq; humescit. Atqui omnia a quosda crescunt frigore, semen uero positum in gelu ius diu non cõcrescit, sed humescit, quasi à contrario crassum constiterit. Sed neq; à calore crassari ratio probabilis est, quæ enim plus terræ continet, ea consistunt, crassanturq; per coctionem, ut lac, igitur refrigeratum solidescere debuit, at nihilo solidius fit, sed totum modo aquæ liquescit, hoc igitur dubium est, nam si aqua est, cum aqua non uideatur posse à calore crassari, hoc tamen ex corpore calido crassum & calidum exit. Sed si ex terra constat, aut si mistum terræ & aquæ est, non totum resolui in humorem & aquam debuit. An non omnia, quæ accidunt, diximus: non solum enim quod ex aqua & terra humidum constat crassatur, sed etiam quod ex aqua & spiritu, ut spuma, crassior albaq; existit, & quo ampullæ pauciores incertioresq; sunt, eo & albior & rigidior factus conspicitur, quod idem in oleo quoque fit, crassescit enim mistum cum spiritu. Quam ob rem crassius redditur quod albescit, cum humor in eo cõtensus disceratur spiritus continet, pingue enim nec terræ est neque aquæ, sed spiritus, ex quo fit, ut per summa aquæ fluitet, aer enim contentus in eo uelut in uase effert, per summaq; sustinet, & causam leuitatis præbet, quinetiam frigore & gelu crassescit oleum, non congelascit, calor enim facit ne gelu cogatur, aer nanque calidus & in- congelabilis est, sed quoniam à frigore is quoque consistit & densatur, hinc oleum crassius redditur. His de causis semen quoque exit quidem intrinsecus spissum, & album calore interiore, multum spiritus calidi cõtinens: sed egressum ubi calor euauit, & aer refrigeratur, humidum nigrumq; euadit, remanet enim aqua, & si quid paruum terræ portionis continetur, ut in pituita, sic in semine cum siccescit, Semen igitur commune est spiritus & aquæ, spiritus autem aer calidus est, quam ob rem natura humidum est, quoniam ex aqua constat. Crescias Cnidius planè mentitur ea quæ de semine elephanti scribit, ait enim usque adeo durari siccescens, ut elestro, id est succino simile efficiatur: quod nunquam fit, magis enim alterum altero semen esse terrenum necesse est, & præcipue tale eorum est, quorum in corpore multum materie terrene habetur. Crassum autem, albumq; est spiritus missione.

40 Semen enim omnium album est. Herodotus uera non scribit, cum nigram esse Aethiopum genituram dicat, quasi necesse sit omnia nigra esse eorum, quibus nigra est cutis, atqui dentes eorum albos esse cernere potuit, causa ut album sit semen quod genitura spuma est, spuma autem alba est, & maxime quæ ex paucissimis partibus conficit, ut cerni ampullæ nequeant, quod in oleo quoque, & aqua euenit, cum miscentur, & concutiuntur, ut ante diximus. Nec uero homines antiquos latuisse uidetur naturam feminis esse spumofam, deam enim, quæ rei ueneræ præest, ab ea ipsa facultate nominarunt. Causa propositæ quæstionis explicata tam est, Congelascere autem semen non posse ob eam rem apertum iam est, aer enim incongelabilis est.

A quosda amnia
cõcrescunt frigore

a.
n.
Euxus, factum,
umor.

μελιθόλαινα,
Galena, id est
uena plumbi, sicut
ut plumbago.

oleu non congelascit

crassum et album
semen spiritus missione

causa ut album
sit semen

ἀνθρώπου
Veneris unde
dicta.

Vitū in his animalibus, quæ semē in foeminā mittūt, insit aliqua cōstitutio cōceptus parti. Cap. III



Aduerte animalium
ordine cōcepti
l. 69

Equitur, ut & dubitemus & dicamus, si in ijs quæ semē emittūt in foeminā, nulla pars cōstituēdi cōceptus sit, quod subierit, quoniam ueritatur corpulētia eius, quādo ipsum facultate quā in se cōtinet, agit. definien-
dum igitur prius est, utrū quod in foemina cōstituitur, accipiat aliquid
ab eo quod subierit, an nihil accipiat. Atq; etiā de anima, qua animal
dicitur (est aut animal parte animæ sensuali) utrū in semine & cōceptu inest, an nō,
& unde. cōceptū enim inanimatū esse nemo statuerit uita omnibus modis priuatū:
quippe cum nihilominus semina, & cōceptus animalū uiuant, quā stirpes, & ali
quādiu prolifica sunt. ergo animā in ijs haberi uegetalē palā est, sed quā ob rem eam
primū haberi necesse sit, ex ijs quæ alibi de anima differunt, apertū est. Sensualē
etiā qua animal est, tēpore procedēte recipi, & rationalē qua homo, certū est, non
enim simul & animal sit & homo; nec animal & equus, eademq; in cæteris animalib;
bus ratio est. finis enim postea contingit. propriū autē est finis cuiusq; generationis,
quam ob rem de mēte etiā quonā tēpore, & quomodo, & unde eam recipiāt, quæ
principiū id participant, plurimū dubitatur. Sed enicēdū pro uiribus, & quoad fieri
potest, accepisse operæ precū est. Animam igitur uegetalem in seminibus, cōcepti-
bus scilicet nōdum separatīs, haberi potentia statuenđū est, non actū, priusquam eo
modo, quo cōceptus, qui iam separātur, cibum trahāt, & officio eius animæ fungan-
tur. principiū enim hæc omnia uitā stirpis uiuere uidentur. de anima quoq; sensuali
pari modo dicendū est, atq; etiam de intellectuālī, omnes enim potētia prius haberi
quā actū, necesse est. sed aut omnes cōtingere, cum antē non fuerint, necesse est,
aut omnes cum antē fuerint, aut partim cum antē nō fuerint, partim cum antē fue-
rint: & cōtingere aut in materia non subeuntes semen maris, aut eo quidē inde ue-
nientes, sed in mare aut omnes extrinsecus cōtingere, aut nullam, aut partim extrin-
secus, partim non extrinsecus. cæterum omnes antē esse impossibile rationibus his
esse ostēditur. Quorum enim principiorū actio est corporalis, hæc sine corpore in-
esse nō posse certū est. uerbi gratia, ambulare sine pedibus. itaq; extrinsecus ea ue-
nire impossibile est. nec enim ipsa per se accedere possunt, cum inseparabilia sint:
neq; cum corpore. semē enim excrementū alimēti mutati est. Restat igitur ut mens
sola extrinsecus accedat, eaq; sola diuina sit. nihil enim cum etus actione cōmunicat
actio corporalis. Sed enim omnis animæ, siue uirtus, siue potētia corpus aliud par-
ticipare uidetur, idq; magis diuinū, quā ea quæ elemēta appellātur. uerum prout
nobilitate ignobilitate ue animæ inter se differūt, ita & natura eius corporis differt.
Inest enim in semine omnium, quod facit, ut secūda sint semina, uidelicet quod ca-
lor uocatur. idq; non ignis, nō talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spu-
mosūq; corpore cōtinetur, & natura quæ in eo spiritu est proportionē respondens
elemēto stellarum. quā ob rem ignis nullum animal generat, neq; cōstitui quic-
quam densis, uel humidis, uel siccis uidetur. at uero solis calor & animalū, non mo-
do qui semine cōtinetur, uerum etiam si quid excrementi sit, quanquam diuersum
a natura, tamen id quoq; principium habet uitale. cæterum calorem in animalibus
contentum, nec ignem esse, neq; ab igne originem ducere apertum ex his est. cor-
pus autē genituræ in quo semen animalis principij contentū unā prouenit, partim
separabile a corpore, in quibus diuina pars comprehenditur, qualis est, quæ mens
appellatur: partim inseparabile, hoc in quā genituræ semen dissoluitur, uersumq; in
spiritum euanescit, cum naturā humidā aquosamq; habeat. quā ob rem an sem-
per id foras exeat quærendū non est. neq; an pars ulla sit formæ cōstitutæ, quomo-
do nec de succo, a quo lac cogitur, quari tale quid conuenit. nam si quoq; mutati, &
nulla pars cōstitutæ magnitudinis est. De anima quæadmodū conceptus & genitu-
ra habeant

ra habeant eam, & quemadmodū non habeant, definitum iam est. potētia enim habent, actu non habēt. Semen autē cum excrementum sit, eodemq; moueatur motu, quo augetur corpus digestionē ultimi alimentī, ubi uterum subiit, constituit & mouet excrementū fœminæ eodē motu quo ipsum mouetur. nam illud quoq; excrementū est, habetq; omnes partes potētia, actu nullam. habet enim eas partes potentia, quibus differt fœmina a mare. nam ut ex læsis interdū læsa, interdū non læsa gignuntur, sic ex fœmina partim fœmina, aliās non fœmina, sed mas generatur. fœmina enim quasi mas læsus est. & menstruū semen sunt, quoniam non purum. Vnū enim illud nō habēt, originē & principiū animæ. quam ob rem quibus animā
 10 libus ova subuēiticia gignūtur, partes quidē utrorūq; obtinet ouū institutū: sed principio caret, quapropter animatū nō est. id enim a maris semine affertur, quod principū ubi fœminæ excrementū receperit, cōceptus sit. humidis uero corpulentis cum incalēscit, obducitur, ut in pulre refrigerata crustula. Corpora autē omnia coherēt & continentur lentore, quē in dies tamq; adactis corporibus natura accipit neruū, quæ partes animalū cōtinet. in alijs neruo, in alijs eo, quod neruo proportionetur. cutis etiā formæ eiusdē est, & uena, & mēbrana, & omne eiusmodi genus. differunt hæc enim inter se maioris minorisq; ratione, & omnino excessu defectu ue.

Quenam sint generationis causæ, & quemadmodum partes quæq; constituantur
 in animalibus. Caput IIII



20 Nimalia uero quorum natura imperfectior est, conceptū, cum perfectus iam est, sed nodum animal perfectum, foras mittunt. quod quæ ob causas ita fiat, antē diximus. perfectum autē est animal, cum conceptus iam aut mas, aut fœmina est, scilicet in quibus sexus hæc differentia habetur. Sunt enim quæ nec marem neq; fœminā generent, uide-
 licet quæ & ipsa non ex fœmina mareq;, & coitu animalū procreantur. sed de eorū generatione postea dicemus. Quæ autem animal intra se generant, scilicet naturæ perfectæ animalia quousq; animal pariant, forasq; emittant, gerunt intra se innexū quod gignit. At uero quæ foras animal pariunt, cum intra se prius ouum genuerint, eorū nonnullis ouum iam perfectum absoluitur, ut eorum quæ foras parit, ouum, atq; ita animal ex ouo intra fœminā nascitur. alijs cum alimentū in ouo contentum absumptū iam est, repletur ab utero & perficitur: atq; ob eam rem ouū utero non abiungitur. hæc cartilagineorū piscium differentia est, de quibus post seorsum per se differemus. Nunc a primis incipiendū est. prima autem sunt quæ perfectæ. eiusmodi autem sunt quæ animal generant. eorumq; primum homo est. decessio igitur seminis omnīū non aliter quam cæterorum excrementorū fieri solet. fertur enim unumquodq; suum in locum, non uim spiritu inferente, non alia eiusmodi causa cogente, ut quidam a testibus trahi modo cucurbitarum medicinalium per uim spiritus opinantur, quasi fieri possit, ut nisi uis inferatur, aliō tendat excrementum alimentī, aut humidī, aut sicci, quoniā retento spiritu ita uniuerso excernatur.
 40 At id commune omnium est, quæ mouere uoluimus. uires enim retento spiritu augentur. nam & sine ea ui excrementa per somnum exeunt, si meatus laxi pleniq; excrementi sunt. simile ab ijs dicitur, ut si quis plantarum semina dixerit quotannis a spiritu secerni, eō ubi fructum afferre solent. Sed enim causa eius rei, ut diximus, est, quod excrementis partes capaces descriptæ a natura habentur omnibus, tum inuisibilibus illis sicco & humido, tum sanguini quæ uenæ uocantur, fœminæ itaque uenis duabus, maiore, atque aorta filis superne uenarum multitudo tenuium in uterum definit, quibus alimento expletis, natura que præ sua frigiditate facultatis concoquendi indiga transfunditur in uterum, propter uenarum tenuitatem,

cum prae sua angustia nequeant exuperantiam continere. Itaque affectus hic uelut
 marilicæ, aut alia profusio sanguinis euenit. Cæterum menstrua nullo circui-
 to describuntur. tendunt tamen moueri de crescente mense, idque ratione recta, sunt
 enim corpora animalium frigidiore, cum euenit, ut continens aer talis efficiatur.
 mensium autem coitus frigidi sunt propter lunæ defectum. itaque fit, ut fines men-
 sium quam media, sint frigidiore. igitur postquam excrementum mutatum in san-
 guinem est, menstrua moueri tendunt eo, quem modo dixi, circui-
 tu. at si concoctum non est, paulatim aliquid subinde secernitur. quam ob rem quæ alba uocantur, par-
 uis adhuc & puellis proueniunt. Seruat corpora integra uterque excrementorum
 hic secessus, cum modice sit, utpote cum ab excrementis uindictentur. quæ causæ
 corporibus sunt, ut ægrotent. Sed si uel non sit, uel immodice sit, damnum euenit.
 aut enim morbi oriuntur, aut corpus emarcescit & extenuatur. quam ob rem & ea
 alba cum frequenter mouentur, & superant, incrementum auferunt puellarum.
 Fit igitur necessarium excrementum hoc ob eas quas diximus causas. Cum enim na-
 tura concoquere nequeat, excrementum fiat necesse est, non solum alimēti inutiles,
 sed etiam in uenis, & per tenuissimas uenas exundando superet. sed melioris notæ,
 finisq; gratia natura eo abutitur in hunc locum, scilicet generationis causa, ut quale
 erat futurum, tale alterum oriatur. iam enim tale potētia est, quale est corpus, cuius
 secretio est. foemina igitur omnibus excrementum fiat, necesse est. sed sanguineis am-
 plius, eorumque mulieribus plurimum. uerum cæteris quoque aliquid colligi in uulua-
 rium locum necesse est. causam quam ob rem sanguineis amplius, eorumque homi-
 ni plurimum, ante exposui. sed cur in foeminis omnibus excrementum hoc inest, in ma-
 ribus non omnibus inest: quædam enim non emittunt genituram, sed ut quæ emit-
 tunt motu suæ genituræ creât, quod instituitur ex materia cōtenta in foemina: sic ea
 motu suo interno in ea parte cōtento, unde semē secernitur, idem faciunt, & consti-
 tuunt. pars ea locus septi transuersi est in omnibus id habentibus. principium enim na-
 turæ cor, proportionale uel est. Causa in qua cur omnibus maribus nō sit excremen-
 tum genitale, cum omnibus foeminis sit, quod animal corpus est animatum, ad quod
 institutum foemina semper materiam præbet, mas uim creandi, hanc enim eorū utriusque
 facultatem tribuimus: idque est, quo alterū mas, alterū foemina sit. itaque corpus & ma-
 gnitudine præberi a foemina necesse est. a mari nihil tale necessarium desiderari. nec
 enim instrumenta in ijs, quæ efficiuntur, inesse: neque ipsum efficiens necesse est. corpus
 igitur ex foemina est, anima ex mare. substantia enim corporis alicuius anima est. &
 ideo quæ nō unigena cōeunt (quod ea faciūt, quorū tēpus par, & uteri gestatio pro-
 xima, & corporis magnitudo non multo discrepans) hæc primos partus similes sibi
 addūt cōmuni generis utriusque specie. quales ex uulpe & cane generantur, aut ex per-
 dice & gallinaceo. sed tēpore procedēte diuersi ex diuersis proueniētes, demum for-
 ma foeminæ instituti euadūt. quomodo semina peregrina ad postremum pro terræ
 natura reddunt. hæc enim materiam corpusque seminibus præstat. quō ob rem pars foe-
 minarū ea quæ semē recipit, nō meatus, traiectionis quidam est, sed uteris amplior.
 mares qui semē emittūt, meatus ad id emittendū habēt exangues. excrementum autē
 quoduis simul & suo in loco est, & excrementum efficitur: nec prius ullum, nisi uis ma-
 gna cogit, & cōtra naturā diuertitur. sed quā ob causam excrementa animalium genita-
 lia secernuntur, declaratū iam est. cū autē semē de mare accessit in foeminæ uterū, par-
 tem purissimā excrementi cōstituit. Plurimum enim in mēstruis quoque humoris inu-
 lis cōtinetur, ut in maris genitura, quod humidissimū est, tum eadē emissionē, tum
 in diuersis. prior enim emissio minus fecunda quā posterior est. minus enim calo-
 ris animalis cōtinet propter cruditatē. At uero quod concoctū est, crassum & corpus
 lentius est. Quibus autem uel mulieribus, uel cæterorū animalium foeminis nihil

foras emittitur, quoniam non multū excrementi inutilis continetur, ijs tantūdem, quod colligitur, in utero est, quantum ijs quæ foras emittunt, remanet, quod maris facultas constituit, aut in semine decedente contenta, aut marem subeunte particula fœminæ, quæ proportionē respondeat uuluis, ut in quibusdam insectis fieri cernitur. humorem autem qui à fœminis cum uoluptate emittitur, nihil ad cōceptum conferre dictum est ante. sed potissimum inde uideri potest, quod ut maribus, sic & fœminis accidat noctu per quietem, quod pollutionem appellant, uerum hoc nullum indicium est. nam & adulescentibus idem euenit, qui etsi emissuri aliquando sunt, tamen nondum emittunt, & ijs qui uel emittunt, uel emissuri sunt, inloecundum. Res ita se habet, ut sine maris emissione concipi impossibile sit, atque etiam sine menstruorum excremento, quod aut redundans effluat foras, aut intus satis sit. At sine ea uoluptate, quæ fœminis per coitum euenire solet, concipitur, si locus turgēt, & uulua descendit propius, ueruntamen magna ex parte sic accidit, ut cum profusione fœminæ agatur, quoniam os uteri se comprimat, cum profunditur, in qua quidem profusione uoluptas & mari & fœminæ cōtingere solet. semen etiam maris melius ita dirigitur & iuuatur, profusio autem non intus fit; ut quidam uolunt, os enim uteri angustum est: sed antè, quò fœmina mittit uaporem illum nonnullarum recremētum. eodem enim mas etiam mittit quod suderit. & aut ibidem manet semen emissum, aut intrò ab utero trahitur, si calidus est, & modice temperatus. Cuius rei indicium, quod locus qui modo maderat, resiccatus mox sentiatur. Animalibus etiam quorum præcordijs uulua iungitur, ut auibus, & piscibus, qui animal pariunt, ne semen illuc trahatur, sed profusum deueniat ipsum, impossibile est. Trahit genituram hic locus suo calore, menstruorum etiam decessio, & consuetum fomitem in ea parte caloris parat, itaque ut uasa non illita, calido diluta humore, aquam in se trahunt ore inuerso, ita attrahitur. nec audiendi sunt qui partibus accommodatis ad coitum officialibus id fieri opinantur. nullo enim pacto sic fieri potest. contrà etiam euenit ijs, qui semen à muliere quoque mitti aiunt. Accidit enim ut postquam foras emiserunt, retrahant intrò, siquidem quod emissum est, misceri debet cum maris genitura. quod ita fieri superuacaneum est. At uero natura nullam rem superuacaneam facit. cum autem excrementum fœminæ in utero constiterit à maris genitura, quæ simile facit, ut lactis coagulum. coagulum enim lac est continens calorem uitalem, qui partes similes ducit eodem, & unit, atque constituit. & genitura ita se habet ad menstruorum naturam. eadem enim natura lactis & menstruorum est. itaque coactis iam partibus corpulentus humor excernitur, obducunturque circum parte resiccescente terrena membranæ, tum necessario, tum etiam alicuius gratia, nam & calefcentis frigefcentis ue rei extrema siccescere necesse est, & animal non in humido, sed seorsum contineri oportet. uocantur ea quibus obuolutus est foetus partim membranæ, aliæ secundæ, quæ maioris minoris ue ratione differunt. hæc pari modo in omnibus tam ouiparis quam uiuiparis habentur. sed enim cum conceptus institutus est, facit simile ijs, quæ seruntur. principium enim primum semina quoque intra se continent. quod potentia primo contentum, ubi secretū mox est, germen mittit & radicē, qua alimentū assumitur, incrementū enim desideratur, sic in cōceptu quodammodo cū partem corporis omnes potentia insint, principii maxime pròprum habetur. quam ob rem cor primū actū fecernitur. quod non modo sensu ita fieri constat, uerum etiam ratione. Cum enim quod gignitur de ambobus abiunctū iam est, seipsum gerere, gubernare, & dispensare debet, perinde quasi filius à patre emancipatus, seorsumque collocatus, itaque principium haberi oportet, à quo etiā post odo membrorū describatur, & quæ cunctæ ad ab soluēdum animal pertinent, disponantur, nam si extrinsecus aliquando aderit,

secundæ
branc. v. f. i. a.
secunda

& pōst inesse incipiet, non solum dubitaueris, & quoniam tempore accedat quæ
 fieris, sed etiam cum pars quæuis distinguitur, id primū subflare necesse est, ex quo
 & incrementū & motus cæteris partibus cōtingat. quam ob rem quæ ita, ut Demo-
 critus, aiunt exteriora primum animalis discerni, tum interiora, quasi lapideum aut
 ligneum animal condant, non recte dicunt. res enim talis nullum principiū habet,
 at animalia omnia habent, atq; intra se continēt. quapropter cor primum distinctū
 in omnibus inspicitur animalibus quæ sanguinem habent. id enim principium est
 & similariū & dissimilariū partium, iam enim principium id accepisse animalis,
 constitutūq; fœtus decet, cum alimentū desiderat. quod enim iam animal est, auge-
 tur. alimentū autem ultimum animalis sanguis est, aut quod sanguini proportio-
 netur, quorū uasa & conceptacula uenæ sunt. quam ob rem uenarum quoq; prin-
 cipium cor est, patet hoc ex historijs & dissectionibus animalium. sed cum potentia
 quidem animal sit, sed imperfectū, aliunde accipiat alimentū necesse est. quam ob
 rem utero, & parente, ut terra planta utitur ad cibum hauriendum, donec perficia-
 tur, & iam sit animal potentia gressile. quocirca ex corde primum uenas illas duas
 natura descripsit, de quibus uenulæ dependent in uterū, ex quibus, qui umbilicus
 uocatur, constat. Vmbilicus enim uena in alijs simplex, in alijs multiplex est, quam
 uenam putamen cuticulare ambit, quod umbilicus uocatur, quoniam uenarū im-
 becillitas tutelam operimentūq; desideret. uenæ autem quasi radices contingunt
 ad uterum, per quas alimentū haurit fœtus. eius enim rei gratia animal in utero ma-
 net, non, ut Democritus ait, ut membra formentur secundum membra parentis.
 apertū hoc in ouiparis est. Nam illa in ouis distinguūtur separata à uulua parentis.
 Sed dubitaueris, cum primum cor oriatur sanguine præditū, sanguis autem sit ali-
 mentū quod extrinsecus uenit, undenam primum alimentū subierit? an id uerum
 non dicitur, alimentum omne esse extrinsecus? sed protinus ut in plantarū semini-
 bu sine sit aliquid tale primum, quod lacteum uocatur: sic in animalū materia excre-
 mentum constitutionis alimentū est. Incrementū igitur fœtui per umbilicum con-
 tingit, eodem quo plantis modo per radices. atq; etiā animalibus ipsis, ubi absoluti
 iam sunt, ex eo quod continetur alimento idem accedit, de quibus pōst suo loco di-
 cendum est. Distinctio autem partium non, ut quidam opinantur, propterea sit,
 quia simile suapte natura ad simile feratur. nam præter alias multas, quas ratio ista
 habet, difficultates, accidet, ut quæuis pars similis seorsum creetur. uerbigratia,
 ossa per se, & nerui, & carnes, si quis eam causam approbet. Sed quoniam excremen-
 tum fœminæ potentia tale est, quale natura animal est, partesq; potentia insunt,
 actu nulla inest, ideo pars quæq; existit. Quoniam etiam agens & patiens, cum se
 inuicem tetigerunt, quendam in modum alterum agens, alterum patiens est, mo-
 dum hunc ita intelligi uolo ut conditionibus, sic, ubi, quando describatur. ita enim
 continuò alterum agit, alterum patitur. materā igitur fœmina præbet, principium
 motionis mas, & quemadmodum quæ ab arte efficiūtur, per instrumenta efficiun-
 tur, sed uerius dixerim per motum eorum qui artis operatio est: ars autem forma
 eorum, quæ efficiūtur, est in alio: sic à facultate siue uirtute animæ uegetalis agitur,
 ut quæ in animalibus ipsis & plantis postea ex alimento uis eadem efficit incremen-
 tum, utendo caliditate & frigiditate, quasi instrumentis (motus enim in ijs consistit,
 & ratione aliqua unum quodq; efficitur) sic etiam principio constituit id, quod natu-
 ra efficitur, eadem enim materia est ex qua augetur, & ex qua cōstituitur primum.
 Itaq; facultas quoq; agens eadem quæ principio est, sed maior. quod si hæc uegeta-
 lis anima est, eadem quæ generet quoq; est, idq; natura cuiusq; est insita, & in plan-
 tis & in animalibus omnibus. cæteræ animæ partes alijs insunt, alijs desunt anima-
 libus, sed cum in plantarum genere nullo discerniculo sexus mas distinguitur à fœ-
 mina,

mina, in animalibus, quāquam non omnibus, distinguitur. & mas ob eam rem desiderat foeminam. At qui quæsierit quispiā, qua de causa foemina desideret marem, nec ex se ipsa generet: quandoquidem animam habet eandem, & materia excrementum foeminæ est. sed causæ illud est, quod animal sensu differat à planta. nec fieri potest ut uel facies, uel manus, uel caro, uel alia pars sit, nisi anima sensuualis insit, aut actu, aut potentia: & aut aliquatenus, aut simpliciter. erit enim ut mortuus, aut pars mortui. quod si mas est efficiens talis animæ, impossibile est ut foemina ex se ipsa animal generet, ubi mas à foemina separatur. eo enim, quod diximus, mas definitur, qua mas est ratione. Quæstionem uero propositam ratione non carere, patet in ijs auiibus, quæ oua subuentanea pariunt, cum foemina aliquatenus possit generare, quod & ipsum recipit quæstionem. Quoniam modo oua eorum dicuntur uiuere: nec enim ita ut oua secunda possunt. sic enim actu animatum ex ijs efficeretur. neque ita se habent ista ut lignum, aut lapis. quippe quæ corruptione aliqua pereant, ut quæ uitam quodammodo antè participarent. Constat igitur hæc aliamquam habere potētia animam. sed quam? istam ultimam prorsus habeant animam necesse est, quæ uegetabilis est. hæc enim æque in omnibus tam animalibus quā in plantis inest. Sed cur partes & animal non efficiantur? Quia sensualem animam habere ea oportet. non enim animalium partes ita sunt, ut plantarum. quam ob rem maris societate opus est. mas enim à foemina separatus in ijs est, & quidem sic usu euenit. Subuentanea enim illa foecunda redduntur, si mas coluit tempore quodam, sed de eorum causa positi. Si quod autem genus est quod foemina sit, & marem distinctum non habeat, id ex seipso animal generare potest. Quod etsi nondum fide digna exploratum habemus, tamen facit ut in genere piscium dubitetur. eorum enim quos rubros siue rubelliones uocant, mas nullus adhuc uisus est, sed foeminæ omnes sætu plenæ reperiuntur. Verum de his nondum compertum habemus, quod fidem faciat satis. quod autem nec mas, neque foemina sit, in genere quoque piscium est, ut anguilla, & genus mugilum quoddam in fluuijs lurulentis. At uero in quibus sexus maris & foeminæ distinctus habetur, fieri non potest ut foemina ipsa per se generet perfecte. ita enim mas frustra esset. quam ob rem in ijs mas semper perficit generationem. hic enim sensualem dat animam, aut per se, aut per genitorem. sed cum partes omnes potentia in materia insint, cum principium motionis affuit, perinde ut in spōtīs illis miraculis, quod subinde sequitur, excitatur, & quod nonnulli naturales autores exponere uolunt, cum dicant simile ferri ad simile: dicendum partes moueri non mutantur locum, sed manentes, & alterascentes mollitie, duritie, colore, & reliquis partium similiarum differentijs factæ iam actu, quæ antè erant potentia. sit autem primo principium, quod in sanguineo genere cor est: in cæteris proportionale, ut sæpius dictum est. idē effici primū non modo sensu percipitur, sed etiam quod per obitum uitæ hic ultimum deficit. euenit namque in omnibus, ut quod ultimum sit, id primū deficiat. & quod primū, id ultimum, quasi natura decutionem reducere agat, & à calce ad carceres, unde proruit, redeat. Est enim generatio ex non ente in ens. corruptio contrā ex ente in non ens. Gignuntur post principium, ut dictum est, interiora, prius quā exteriora, sed prius maiora quā minora uisuntur, quāuis nonnulla prius non oriuntur. primum superiorem præcordijs formantur, eademque magnitudine præstant. nam inferiora & minora sunt & minus discreta, idē in omnibus quæ parte superiore inferioreque distinguuntur, exceptis insectis. Quæ enim ex ijs uermiculi nascuntur. parte inferiore amplius crescunt, superiore iam inde à primo ortu minora sunt. Gressilium mollibus solis nullum discrimen est superioris & inferioris. quod autem de parte superiore diximus priusquam inferiore constitui, idem in plantarum etiam genere euenit.

semina enim prius mittunt radicem quam ramos. Distinguuntur animalium partes spiritu, sed non aut parētis, aut suo, ut quidam naturæ interpretes uoluere, hoc enim in genere auium & piscium, & inferiorum palam sit, quæ partim se iunctia à parente nascuntur ex ovo, in quo formantur, & explanantur: partim non spirant omnino, & tamen aut ovo aut uermiculo enascuntur, alia quamquam spirant, & in utero capiunt explanationē, tamen non prius spirare incipiunt, quam pulmo perficiatur. Articulatur & hic, & omnes priores partes antequam animal spiret. Item quadrupedum quæ multifida sunt, ut canis, leo, lupus, uulpes, lupus ceruarius, omnia cæcos generant: post palpebræ dehiscunt. Itaque consistit in cæteris quoque omnibus, ut quantitatē, sic qualitatem potentia ante substantem effici, actū post ab eisdem causis, à quibus distinguitur quantitas, & duo ex uno effici. spiritum uero inesse, quoniam humidus & calidus est, cum alterum agat, alterum patiatur. Iam antiquorum nonnulli naturæ interpretum, quæ postquam efficeretur pars, tentarunt quidem exponere, sed parum uisuperiti earum quæ accidunt rerum. partium enim aliarum priores alijs sunt: quod in cæteris etiam rebus. Prius autē multiplex iam est. id enim cuius causa, & quod eius causa, differunt. & alterum generatione, aliarum essentia prius est. quin & quod eius causa duplicem recipit differentiationem. aut enim est unde motus: aut quo utatur id, cuius causa. uerbi gratia, genitale & instrumentale rei generatæ. horum enim alterum, id est generans & agens præesse oportet, ut quod doceat priusquam quod discat. sed tibias post cum qui tibias discat. frustra enim aderunt tibie ijs, qui uis nesciant tibijs. Cum itaq; tria hæc sint, primum finis, quem esse id dicimus, cuius causa, secundum quod eius causa, scilicet principium generans & mouens. efficiens enim & generans qua talia sunt, ad id pertinet quod efficitur, & generatur. Tertium uile & quo finis utatur. primum eam partem habere necesse est, in qua principium motus continetur. hæc enim protinus pars finis prima & potissima est. tum post eam totum & finem. tertium uero & ultimum partes ijs accommodatas instrumentales ad usus nonnullos. Itaq; si quid tale est, quod in animalibus inesse necesse sit, quod totius naturæ principium & finem contineat, id effici primum necesse est. qua enim mouens primum oriri, qua pars finis est, cum toto oriri debet. itaq; instrumentalium partium, quæ sua natura genitales sunt, eas semper esse priores oportebit. alterius enim causa sunt tanquam principium. At uero quæ tales ex ijs, quæ alterius gratia constant, non sunt, eas esse posteriores congruit. quam ob rem utramque partes priores sint, quæ alterius causa, an cuius causa ipse sint, distinguere non facile potest. incidit enim ut partes mouentes priores sint generatione quam finis, mouentes autem ab instrumentalibus distinguere non facile est. Atque ipsa uia rationeque, quid post quod fiat, querendum est. finis enim quorundam posterior est, quorundam prior. quam ob rem ea pars, quæ principium condinet, prima existit: mox tota superior moles, quapropter caput & oculi ætius maxime inter initia apparent. inferiora ab umbilico, crura dico, exigua cernuntur. Partis enim superioris gratia inferior est. Et neque pars finis, neque genitilis est eius. necessitatem etiam cur ita sit, non bene reddunt, qui quod semper ita sit, dicunt, id est principium in his existimant, ut Democritus Abderitanus opinatur, quod sempiternum & infinitum principium nullum est. causa autem cur ita, principium est, & infinitum, quod sempiternum est. Itaque interrogare de eiusmodi rebus cur ita est, querere, inquit, principium infiniti. Atque ipsa ratione, qua censeant non esse querendum, nullius rei sempiternæ demonstratio esse poterit. & tamen esse complurium uidetur, quarum aliarum semper sunt, aliarum semper sunt. nam & triangula figura duobus rectis æquales semper habet, & diametrum incommensurabilem esse cum constituta sempiternum est, attamen causa eorum aliqua & demonstratio est. Igitur non omnium

omnium rerum principium querendum esse recte dicitur: at rerum quæ semper aut sunt, aut fiunt, nullum principium esse querendum non bene asseritur. sed ea duntaxat principia non recipiunt examen eiusmodi, quæ rerum sempiternorum sunt. principij enim alia cognitio, non demonstratio est. principium vero in rebus immobilibus quidditas est. In rebus autem quæ fiunt, iam plura habentur principia, sed modo diuerso, nec omnia modo eodem, quorum principiorum unum numero est, unde motus. quam ob rem omnia quæ sanguinem habent animalia cor primum possident, ut inter initia nostræ disputationis dictum est. In cæteris primum gignitur, quod proportionale sit cordis. uenæ ex corde tendunt diductæ modo riuorum, qui in parietibus proficiscētes ab eodem fonte pinguntur. partes enim coniunctæ ijs sunt, utpote quæ ex ijs coagmententur atq; consistant. Ortus similium frigore, calore ue agitur: consistunt, coquunturq; alia frigido, alia calido. quarum rerum differētias alibi exposuimus, antè scilicet, quæ humore, igneq; res solubiles, quæ humore irresolubiles, igneq; illiquabiles sint. per uenas igitur & meculos quosque alimentum refudans, quemadmodum aqua per crudiusculam sutem, in carnem, aut carnis proportionale convertitur frigore consistens. ex quo fit, ut caro ab igne resoluatur. Sed quæ terrena admodum oriūtur, parum humoris caloriscq; adepta, hæc dum refrigerant, humore cum calore euaporatè duram terrenamq; formam capiunt, ut ungues, cornua, ungulæ, rostra. quam ob rem igne hæc mollescit. Sed humore nonnulla liquefunt, ut ouorum putamina. Nervi & ossa calore interiore conficiuntur siccificante humore. quam ob rem ossa resoluta ab igne non possunt: quomodo testa indissolubilis est. quasi enim in fornace excocta à calore generatio- nis ita cōstat. hic autem calor nec ex quolibet carnem, aut os facit, neq; quolibet modo aut tempore, sed ex materia apta, & ut apte, & cum apte effici potest. neq; enim quod effici potest, efficitur à mouente quod actui careat. neque quod actum obtinet, efficere ex quolibet poterit. sicut nec faber arcem, nisi ex ligno facere potest, neq; arca effici ex lignis potest sine suo artifice. Inest hic calor in extremō seminali, tam tam talemq; habens motionem & actionem, quanta modice ad quamuis corporis partem accommodatur. Quod si uel deficit, uel excedit, rem quæ sit, aut deteriorem efficit, aut læsam, & mancā, similiter ut in ijs agitur, quæ fors igne coquuntur ad cibum, aut ad alium usum. sed in ijs motum caloris nos moderamur, in illis natura gignentis accommodat. In ijs autem quæ sponte oriuntur causæ est, motus temporis, & calor. frigus priuatio caloris est. uritur his ambobus natura uim habentibus necessariò, ut alterum hoc, alterum illud faciat. sed in ijs quæ alicuius gratia gignuntur accidit, ut alterum frige faciat, alterum calefaciat, atq; ita pars quæq; qualitate certa efficiatur, ut caro mollis partim necessariò talis exinde facta, partim alicuius gratia. neruus siccus & ductilis, os siccū & fragile, cutis carne siccificante efficitur: quomodo in potentis crustula, quam uetulam uocant. nec solum propter extremum generatio eius euenit, sed etiam quod lentitudo resideat, cum euaporari nō possit. uerum in cæteris lentum id squalidum est. itaq; fit ut extrema exanguium animalium testa crusta ue consent. at in sanguineo genere lenrum hoc pinguis est. & quidem quæ natura non terrena admodum sunt, eorum pingue sub otis operā mento colligitur, quasi cutis ex eiusmodi lentitate consistat. pingue enim habet alia quid lentitatis. sed hæc omnia, ut diximus, partim necessariò, partim non necessariò, sed alicuius gratia effici asserendum est. primum igitur moles superior per generationem distinguitur: inferior tempore procedente recipit incrementum in sanguineo genere. omnia uero lineamentis primum describuntur, deinde colores recipiunt, & molliem, & duritiem, quasi pictoris officio fungatur natura cum condit & creat. pictor enim ubi lineis primum descripserit animantem, mox uario illinit eo

neq; utroq; sua
tis, uas fictile.

Vt quum et
similium generatio

cutis generatio

lore, ac perficit, cum itaq; principium sensuum totiusq; animalis in corde continetur, hoc ob eam rem primum gignitur, mox ob eius calorem frigiditas supra, ubi definunt uenæ, respondens cordis calori constituit cerebrum, itaque caput à corde continuo generatur, & magnitudine cæteris præstat. Principio enim cerebrum multum & humidum est, sed recipit dubitationem quod oculis animalium euenit, principio enim maximi uisuntur, & in pedestri, & in natatili, & in uolatili genere. ultimi uero omnium partium perficiuntur. Interim enim confidunt, causa autem est, quod oculorum sensorium positum quidem est, ut cætera sensoria apud meatum, sed cum sensorium tangendi gustandiq; protinus sit aut corpus, aut aliquid proprium corporis animalium, olfaciendi uero audiendiq; meatus contingant aërem externum pleni spiritus natiui, ortiq; à corde tendant, ac desinant ad uenulas cerebro adiunctas, oculus solus proprium corpus præ cæteris habet sensorijs, quod humidum & frigidum est: nec ante contentum eo in loco potentia ut cæteræ partes, tum deinde actu existens, sed à cerebri humore secernitur pars purissima per meatus, qui ab oculis ipsis tendere ad membranam cerebri uisuntur, cuius rei argumentum, quod nec alia pars humida & frigida est in capite præter cerebrum, & oculus frigidus atque humidus est, itaque necessario locus hic magnitudinem primum capit, post cōsidit, nam & in cerebro eodem euenit modo, ut primum præ humidum, multumq; sit, mox humore efflato concoctiq; corporatur magis, subsiditq; & cerebrum & magnitudo oculorum. principio igitur caput præ grande propter cerebrum, oculi grandes propter humorem in ipsis contentum apparent. ultimi uero perficiuntur, quoniam cerebrum quoque uix consistat. serò enim à frigiditate humiditateq; uendicatur in omnibus quidem, sed præcipue in homine, nam & sicut put inter ossa ultimum confirmatur. Iam enim cum partus in lucem uenit, molle hoc infantis os est, causa ut hoc maxime hominibus accidat, quoniam cerebrum humidissimum & maximum omnium animalium homines habeant, cuius rei causa est, quod calorem etiam cordis purissimum obtinet, quod temperamentum intellectus planè significat, homo enim omnium animalium prudentissimus est. Pueri etiam longo tempore nequeunt continere caput, præ pondere cerebri, nec secus partes, quas mouere oportet, principium enim mouendi serò superioribus donatur, & ad postremum ijs, quorum motus non iungitur cum principio, ut cruribus. Palpebra etiam talis pars est, sed cum natura nihil superuacaneum, nihil frustra facere soleat, constat nec prius, neque posterius, quam usus exigat, ab ea effici quicquam, sic enim quod factum est, frustra aut superuacaneum fuerit, itaq; palpebras simul & distingui, & posse moueri necesse est. Serò igitur oculi animalium perficiuntur propter copiam humoris cōcoquendi in cerebro. Vltimia autem, quod mouendi facultas, nisi increuerit, nequeat mouere eas partes, quæ tam remotæ à principio refrigeratæq; sunt, dedarant hoc idem palpebræ sua natura, cum enim uel quantalibet grauitate caput tentatur, aut ex somno, aut temulentia, aut alia eiusmodi causa, palpebras attollere non possumus, quanquam leui pondere aggrauentur, sed de oculis iam dictum est, quemadmodum oriantur, & quam ob causam ultimi articulentur, & abfoluantur. Cæterarum partium unaquaq; ex alimento gignitur, nobilissima quæq; & potissimi principij particeps ex concocto syncerissimo, primoq; alimento, reliquæ necessariæ, ac illarum graui instituendæ, ex deteriore, & reliquis excrementisq;. Perinde enim natura atque paterfamilias prudens nihil amittere solet, ex quo facere aliquid commodi possit, dispensatur autem in cura rei familiaris ita, ut cibus optimus detur liberis, deterior seruis, uilissimus socijs animalibus, ut igitur incremento tam addito mens aduena facit hæc, sic in ortu ipso natura ex materia syncerissima carnem cæterorum sensoriorum corpora conficit,

ex recte

οὐκ ἐκ τῆς
κοῦφου, quasi
coquantur.

mentis ossa, neruos, pilos, ungues, ungulas, & reliqua generis eiusdem constituit. Quam ob rem hæc ultima efficiuntur, cum iam suppetit extremum naturæ. ossa igitur in prima partium cōstitutione gignuntur ex seminali excremento. cumq; ani-
mal augetur, hæc incrementum ex alimento capiunt naturali, quo partes principa-
les augentur. eius tamen ipsius alimentum sunt, & reliquæ, & excrementa. sit enim
in quouis primum & secundum. alimentiq; ratio duplex est, altera nutriendi, alte-
ra augendi. nutriendi est, quod esse præbeat & toti & partibus. augens, quod accessi-
onem ad magnitudinem faciat. de quibus postea differendum latius est. Nervi
etiam eo modo, quo ossa instituuntur, & ex eodem, uidelicet ex seminali excremen-
to, & nutritio. sed ungues, pili, cornua, rostra auium, & calcaria, & si quid eiusmodi aliud est, ex cibo gignuntur aduentitio & auctiuo, quem tum à foemina, tum de
foris sibi acquirunt. quam ob rem ossa quodam tenus capiunt incrementum. omni-
bus enim animalibus exitus magnitudinis est. itaque ossa quoq; certo augendi ter-
mino describuntur. nam si hæc semper augerentur, animalia quoque in quibus os,
aut ossis proportionale est, augerentur, quādiu uiuerent. magnitudinis animalium
meta & terminus his describitur. sed quam ob causam non semper capiant incre-
mentum, postea declarandum est. pili autem, & eorum cognata omnia, quādiu in-
sunt, tandiu augentur: & magis cum corpora aut ægrotant, aut senescunt, atq; de-
crepescunt, quoniam plus excrementi tantisper remanet, cum minus in partes præci-
pias consumatur propter senium aut morbum. nam ubi id quoq; ob ætatem defe-
cerit, pili quoque deficiunt. at ossa contrā. decrepescunt enim cum corpore & mem-
bris. defunctis etiam pili augentur, sed nasci nequeunt. De dentibus dubitaueris,
sunt enim eiusdem naturæ, cuius ossa: gignunturq; ex ossibus, ut ungues, pili, cor-
nua, & similia ex cute. quo fit ut ipsa colorem pariter cum cute immutent. alba enim
& nigra, & uario modo diuersa pro colore cutis redduntur. At dentes nihil tale res-
ciunt. ossibus enim annumerantur in ijs animalibus, quæ ossa habent, & dentes.
accrepescunt soli omnium ossium tota uita, quod patet in ijs dentibus, qui murum
tactum declinant. causa incrementi est, quoad pertinet ad id cuius gratia, ut fungi
officio possint. breui enim tempore attritu consumerentur, nisi subinde repararen-
tur, quando uel nunc senescentibus non nullis edacibus dente non magno prædi-
tis admodum perterrunt. plus enim in dies adimitur quā additur. quam ob rem
bene id quoque ad rem quæ accidit emolita natura est. quippe quæ in senectutem
uitæq; exitum defectum dentium proferat, & pro uitæ spacio præscripserit modum.
Sed si decies, millies, aut deciescentis annis uita seruaretur, & prægrandes primos
oriri oporteret, & sepius renasci. Quamuis enim assidue reciperent incrementum,
tamen detriti plusquam accrescerent, inutiles demum ad cibum conficiendum eua-
derent. Sed cuiusnam gratia capiant incrementum, dictum iam est. Accidit autem,
ut neque eandem naturam, quā cætera ossa dentes habeant. cætera enim in pri-
ma cōstitutione omnia gignuntur, neque est quod post oriatur: at dentes post ena-
scuntur. quam ob rem cum deciderint, denuo possunt oriri. tangunt enim ossa, non
continuantur. ex eo tamen gignuntur alimento, quod in ossa administratur. quæ
propter eandem, quā ossa habent naturam, & tunc, cum illa iam suum numerum
receperunt, sed cum cætera animalia dentibus, aut dentium proportionali prædita
enascantur, nisi quid præter naturam accidit (perfectiora enim, quā homo gene-
ratione absoluantur) homo dentibus carens uenit in lucem, nisi quid præter natu-
ram intercesserit. sed quam ob causam dentes alij decidunt, alij non, post explicabi-
mus. Quod autem eiusmodi partes excremento constituuntur, ea causa homo in-
obsepto, & nudissimo omnium animalium corpore est, & ungues minimos pro
magnitudine habet, minimum nanque in eo est excrementum terrenum. cum enim

excrementum quoddam sit, quod inconcoctum remaneat, tum quod terrenum in corporibus est, omnium maxime est inconcoctum, quemadmodum partes quæque constituantur, & quænam causa generationis sit, declaratum iam est.

Quomodo factus in utero animalium augescatur.

Capitulum V



Vgentur foetus, qui forma animalis nascuntur, per umbilicū annexum, ut ante diximus. Cum enim vis quoque nutriendi in animalibus insit, umbilicū statim quasi radicem agunt in uterum. umbilicum uenæ contentæ in putamine complent. plures in maioribus animalibus, ut boue, cæterisque generis eiusdem, binæ in mediocribus, singulae in minimis, hoc sanguineum haununt alimentum, uterum enim exitus est uenarum multarum. Animalia igitur non utrinque dentata omnia, & dentatorum utrinque, quorum uterus uenam non singularem habet pertinentem grandem, sed pro una plures frequentes cōtinet, hæc in utero habent quæ acetabula appellantur, in quæ umbilicus deuenit atque adhæret. Tenduntur enim uenæ umbilicales undique laterum, fissæque sparguntur usquequaque per uterum, & quæ desinunt, hæc illa acetabula existunt curuamine suo coniuncta cum utero, cauo autem ad foetum conuersa. Secundæ uero & membranæ inier foetum & uterum positæ sunt. Acetabula foetu accrescente proficiscentem ad exitum minora subinde redduntur, demumque obliterantur, cum perfectus iam est. in ea enim ueluti mammæ reponitur à natura foetui alimentum sanguineum, quod dum colligitur, & paulatim ex multis confistit, quasi pustula & inflammatio corpus acetabulorum existit. itaque quandiu foetus sit minor, nec multum cibi assumere possit, conspicua maioraque sunt: sed aucto iam foetu confidunt & exolescunt. Minuta & utrinque dentata animalia magna ex parte acetabulis uteri carent. tendit umbilicus in ijs in uenam singularem, quæ per uterum maiuscula fertur. Cumque eiusmodi animalia alia unum, alia plura pariant, quo modo unum, eodem plura habentur. Sed hæc, & dissectionum exemplis, & historiarum commentarijs inspicienda explorandaque sunt. hærent enim & continentur animalia ex umbilico, qui ex uena dependet per æquilibrium directum ad uenam quasi aqueductum fluentem. foetus membranis & secundis obuolutus continetur. Qui infantes alii in utero aiunt sugentes carunculam quandam, non recte dicunt. Idem enim & cæteris animalibus eueniret, quod tamen nusquam uidemus, atqui facile per dissectiones uideretur, si esset. Omnes etiam foetus, tum uolucres, tum aquatiles, & pedestres pari modo membranæ tenues ambiunt, separantes ab utero & humoribus admissis. sed nec in ijs ipsis tale quicquam inesse uidemus, neque fieri potest, ut per eorum aliquod alimentum hauriant. Iam quæ ouo nascuntur, omnia incrementum foris recipere abiuncta ab utero apertum est. itaque non recte aiunt, qui ita dicunt, ut Democritus. Coeunt animalia generis eiusdem secundum naturam, sed ea etiam quorum genus diuersum quidem, sed natura non multum distat, si modo par magnitudo sit, & tempora æquent graviditatis. raro id fit, sed tamen fieri & in canibus, & in uulpibus, & in lupis certum est. canes etiam Indici ex bellua quadam simili, & cane generantur, necnon in aubus salacioribus idem fieri uisum est, ut perdicibus, & gallinis. Quinetiam aduicorum accipitres specie diuersi coire inter se putantur. idemque in nonnullis alijs aubus euenire animaduersum est. In marinis nihil adhuc exploratum habemus dignum memoratu. qui tamen rhinobati appellantur, maxime gigni creduntur ex squatina & raia. Ad hæc, quod de Africa in prouerbio est, semper aliquid noui Africam afferre, propterea dicitur, quod diuersa etiam genera coeant, nam ob aquarum penuriam terra illius,

κετυλιδόνες
acetabula.

lius, uel alienigena libidine copulantur, cum in loca paucissima rigua cōgregentur, sed cum cætera sic orta, rursus ipsa inter se coëant, generareq; possint, genus unum mulorum sterile est: quippe quod neque secum, neque cum alijs iunctum generet. Quæstio igitur in uniuersum, quam ob causam sterilis, aut mas aut femina sit: sunt enim steriles & mulieres & uiri. atque etiam in cæterorum animalium genere, ut equorum, ut ouium, sunt quæ nullam faciant prolem. sed mulorum genus totum sterile est. Cause uero sterilitatis in cæteris animalibus plures sunt. nam & à primo ortu naturæ locis ad coitum cōmodis, oblatiis, steriles & mulieres & uiri redduntur, ut alteræ non pubescant, alteri non barbescant, sed spadones quidam sint, alijs in
 10 processu ætatis idem accidit affectus, aut propter corporis nutritionē pleniorē, mulieribus enim pinguioribus factis, uiris corpore melius habito excrementum seminale in corpus absumitur. itaque sit ut illis menstrua desint, his genitura. aut ex morbo, uiris humidum frigidumq; emittitur semen: mulieribus purgationes utantur, plenæq; excrementorum morbosicorum redduntur. Multis etiam tum uiris, tum mulieribus, hoc idem accidit malum, oblatiis partibus, & locis accommodatis ad Venerem. quæ uitia partim curabilia sunt, partim incurabilia, sed maxime steriles tunc perseverant, cum primo naturæ ortu tales consisterunt. gignuntur enim & mulieres uiragines, & uiri foeminares: alteris menstrua desunt, alteris semen ex
 20 le frigidumq; est. Quam ob rem ratione recta experimento in aqua probatur sterilitas feminis. quod enim tenuē ac frigidum est, citò diffusum per summa innatat. quod fecundum est, in imum descendit. calidum enim quod concoctum est, concoctum autem est, quod spissum crassumq; est. mulierum probatio sufficit, ut odores subeuntes uterum esserantur ad locum spirandi, & afficiant halitum. atque etiam illit, ut colores oculis positi saluam persiciant oris. nam nisi hæc ita fiant, meatus corporis per quos excrementum decedit, confusos, obseptos, & obcaca-
 30 tos esse significatur. sedes enim oculorum maxime omnium locorum capitis seminalis est. quod patet cum sola ipsa per coitum uenereum manifeste immutetur, & usu immodico rei ueneræ oculi aperte langueant & subsedeant. causa est, quod natura genituræ similis cerebro est. aquosa enim materia eius est, calorq; aduentitius. purgationes autem seminales à septo ueniunt. principium enim naturæ hinc est. itaque sit, ut motus à genitali ad pectus deueniant, hinc odores per spirationem sensum efficiunt. hominibus igitur cæterisq; generibus, ut antè retulimus, particu-
 latim hæc læsio obuenit.

Contra Empedocles & Democriti sententiam, qui non recte senserunt quam ob causam muli sint steriles. Caput VI



40 T genus mulorum totum sterile est. cuius rei causa non bene ab Empedocle & Democrito redditur. obscure Empedocles, planius Democritus scribit. sed neuter bene. asserunt enim demonstrationem æque de omnibus, quæ præter suam cognationem coëant. Democritus meatus mulorum corruptos in uteris dicit, quoniam non ex cognatis principium eorum consistit. sed id cum alijs etiam animalibus accidar, tamen nihilominus possunt generare. atqui si id causæ esset sterilitatis, cætera quoque sterilia esse deberent, quæ ita coëunt. Empedocles misturam seminum causatur, quæ densa ex molli utraque genitura consistat. caua enim & densa coaptari uicissim, fierique ex ijs, durum ex mollibus, ut si æs stanno misceatur. sed nec in stanno & ære causam recte assignat. dixi de his in problematis. neque principia ex rebus ullo modo cognitis accipit. caua enim & solida coaptata uicissim, quoniam modo faciunt missionem, aut uini & aquæ, aut alius cuiuspiam: hoc enim supra hominis captum dicitur, nam quemadmodum caua uini & aquæ debeant

accipi, præter sensum omnino est. Item cum ita sit, ut & equi ex equis gignantur, & asini ex asinis, & mulus ex equo & asino, alterutro mare, aut foemina, cur ex his tam densum consistat, ut sterile sit, quod prodierit ex equo autem foemina & mare, aut asino foemina & mare sterile non proveniat. Atqui molle & maris equi & foeminæ semen est. coit autem equus cum asino, tum mare, tum foemina pro differētia sui sexus. ideoq; gigni ex ijs sterile ait, quia unum ex ambobus seminibus molibus conficiatur. ergo & quod ex equo mare ac foemina gignitur, sterile esse debet, nam si alterum misceretur solum, liceret dicere alterum causam esse sterilitatis, ut dissimile geniturae asini. Nunc uero quali illius semini, tali & cognati miscetur. ad hæc demonstratio æque de ambobus, tam mare quam foemina recte affertur. 10 Sed interest, quod mas septēnis duntaxat generat, ut aiunt, foemina impolis omnino est, idq; propterea, quia perducere ad finem quod cōceperit, nequeat. nam concepiſſe quidē iam mulam constat, sed fortasse uerisimilior ijs demonstratio logica illa uidebitur. logicam appello, quia quo uniuersalior, eo remotior à proprijs principijs est. si ex mare ac foemina speciei eiusdē, prolis speciei eiusdē gigni solet, aut mas aut foemina, ut ex cane mare & foemina canis, aut mas aut foemina: ex diuersis etiā speciebus diuersum specie proveniat, necesse est. uerbi gratia, si canis diuersum est à leone, ex cane mare, & leone foemina diuersum proveniet, & ex leone mare & cane foemina diuersum. Cum itaque mulus mas & foemina sine speciei differentia gignatur, ex equo & asino, quæ diuersa specie sunt, impossibile est, ut aliquid ex mulis gignatur. nec enim diuersum specie provenire potest, quādo ex mare ac foemina speciei eiusdē, idem specie generatur, neq; idem, hoc est mulus, gignitur enim mulus ex equo & asino, quæ diuersa specie sunt. ex diuersis autem specie diuersum animal gigni positum est. sed enim hæc ratio admodū uniuersalis inanisq; est. rationes enim quæ non ex proprijs ducuntur principijs, inanes sunt, & rerum esse uidentur, cum longe aberrēt. sunt profecto geometricæ rationes, quæ ex principijs geometricis afferuntur, idemq; in cæteris est intelligendū. uidentur tamen eiusmodi rationes, quāuis inanes, aliquid esse, nam & inane siue uacuum illud aliquid esse uidetur, cum tamē nihil omnino sit. nec uerum est, quod cōcluditur. multa enim ex ijs, quæ non eadem specie progeniuntur, foetifera prodeunt, ut antè exposui. hoc igitur modo, 15 nec de cæteris rebus, neq; de naturalibus indagandū est. Sed ex ijs quæ in genere, tum equorum, tum asinorum insunt, considerando potius acceptis causam, primum enim utrunq; eorum singularē parit inter cognata animalia plura numero. tum foeminæ non semper concipere possunt. & quidem equi interposito tempore admittuntur, quoniam ferre continue nequeant. sed equa mensura uos non est: imò minimum inter quadrupedes emittere solet. asina conceptus in continentis est. generaturam urique iniectam emingit. quam ob rem uerbis eam sectantes cogunt ne id faciat. Ad hæc frigidum animal asinus est. quam ob rem locis frigidis gigni non potest, utpote sua natura impatiens frigoris, uelut apud Scythas, & eorum finitimos. nec uero apud Gallos qui supra Hispaniam colunt, genus id animalis est. nam ea quoque provincia frigida est. hinc admissarios etiam non ut equæ, sic asinæ æquinoctio admouent: sed æstiuo solstitio, ut tempore calido pulli nascantur. eodem enim tempore parit, quo coierit. Annum uterum fert & asina, & equa. Cum igitur natura sit frigidum animal, ut dictum est, semen quoque genitale eius frigidum esse necesse est. Cuius rei indicium, quod si equus superuenerit asinam, quam inierit asinus, non peruertet asini initum: sed si asinus superuenerit equam, quam equus inierit, peruertet, propter seminis sui frigiditatem. Cum igitur inter seipsa iunguntur, seruetur semen propter alterius calorem. calidius est enim quod ab equo secernitur. nam asini & materia & genitura frigida est, equi calidior est. cum

autem

Logica demonstratio,

autem mistum uel calidum cum frigido, uel frigidum cum calido est, euenit ut conceptus ex ijs seruetur, eaq; uicissim ex seipso fecunda sint. At uero quod ex ijs prodijt, non insuper fecundum, sed infecundum ad perfectam foetificationem est. Omnino cum utrunque aptum, propensumq; sit ad sterilitatem (sunt enim in asino tum ea quae diximus, tum etiam, ut nisi à prima dētum mutatione generare incipiat, nunquam possit generet, sed sterilis omnino perduret) ita in exiguo continetur generandi uis corporis asinini, facillimeq; labitur ad sterilitatem. Equus etiam simili modo idoneus est ad sterilitatem, tātōq; deest ut sterilis sit, quanto, ut quod ex ipsis prodierit semen frigidius reddatur. quod tunc efficitur, cum asini excremento miscetur. asinus quoq; parum deest quin sui generis initu sterile generet. Itaque cum accesserit quod praeter naturam est, si ante uix unum partu naturae legitimum poterat generare, iam quod peregrinum ex ijs prodijt sterilius, nihil deerit, ut sterile sit, sed necessariò sterile erit. euenit etiam ut corpora mulorum magna efficiantur, quoniam menstruorum decessus ad corporis incrementum uertatur. Cumq; par tus eorum annuus sit, non modo concipiat, sed etiam enutriet mula opus est. quod fieri non potest sine menstruuis. mulis autem menstrua defunt, sed quantum inutile est, cum excremento uelice abigitur. Vnde sit, nè muli genitale foeminarum, sed ipsum excrementum olfaciant. reliquum in corporis incrementum & magnitudinem uertitur. Itaque concipere quidē aliquando mula potest. quod iam factum est, sed enutrire atque in finem perducere non potest. mas generare interdum potest, quoniam & calidioris naturae quam foemina mas est, & nihil corporis per coitum confert ad generationem. quod autem facit, ginnus est. quod mulus oblaesus est. nam ex equo & asino, ginni proueniunt, cum conceptus in utero aegrotauit. est enim ginnus idem quod metachœrum in porcis: quod enim ibi laesum deprauatumq; in utero est metachœrū uocatur, quasi aporcellum dixeris. idq; cuilibet porco accidere potest. pygmaeorum etiam, id est nanorum, pomilionū, & pusillorum generatio similis est: nam eorum quoq; membra & magnitudines uariantur in utero, & sunt uelut aporcella, & ginni, haecenus de mulorum sterilitate.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBER TERTIVS, INTERP. THEODORO.

De generatione animalium sanguineorum, & ouiparorum, deq; ovis subnutantibus & cetorum ororum natura, & quam ob causam alia unicolora sunt, alia

bicolora.

Caput I



DE MULORVM sterilitate dictum iam est, atque etiam de ijs, quae animal & foras & intra se pariunt. In sanguineo autem ouiparo genere partim similis generatio ut in pedestribus est, idemq; de omnibus aliquid accipi potest: partim differētia, tum inter ipsa, tum ad pedestria existit. Oriuntur omnia coitu mare in foeminam emittente semen genitale. sed aues ouum ædunt perfectum, crusta intectum dura, nisi morbo laedatur. atque omnia alium oua bicolora sunt. pisciū cartilaginei, ut saepius dixi, cum intra se oua pepererint, animal excludūt, ouo in alium uteri locum ex alio translato, molle hoc ouum est, & unicolor. unus ex ijs animal non parit, qui rana uocatur, cuius causam possi exponam, ceteri pisces qui oua pariunt, ouum unicolor ædunt, quod imperfectum est, quippe quod extra capiat incrementum eadem causa, qua & quod

intus perficitur. De uteris qua inter se differentia discrepent, & quas ob causas ita
 sit, declaratum est antè. Viui parorum enim alia supra, iuxta cinctum uterum cond-
 nent: alia infra iuxta genitale. supra cartilaginea habent: infra quæ animal & intra
 se, & foras generant, ut homo, equus, & reliqua generis eiusdem, ouiparorū etiā
 alia infra, ut pisces, qui ova pariunt: alia supra, ut aues, consistunt uel sponte conce-
 ptus in autum genere, quos subuentaneos, & Zephirios à Fauonio quidam appel-
 lant, qui profectio in ijs sunt aubus quæ non uolaces sunt, ut uncæ, sed multiparæ,
 quoniam excremento ipse abundant, unci in alas & pennas id uertitur, corpusq;
 exiguum siccum & calidum habetur, decessus autem menstruorū, & genitura ex-
 crementum sunt, cum igitur & pennarum natura, & seminis, excremento gigna- 10
 tur, nequit natura large utroq; uersus profundere. hæc eadem causa est, & ut aues
 uncæ nec salaces sint nec multiparæ, sed graues uolacesq;. quarū corpus grādiuscu-
 lum, ut columba & similes: aut graues non uolaces, quarum corpus grande, ut gal-
 lina, coitu superent & partu. grauibus enim non uolacibus, ut gallinis, perdicibus,
 & reliquis id genus multum eius excrementi sit. quapropter mares eorum salaces
 sunt, & foeminae multum materiae suggerunt, & quidem pariunt, ex his alie com- 15
 plura, alie sæpe. complura gallina, perdix, struthio Libycus. sæpe autem columba-
 rium genus, sed non multa. quippe quod medium sit inter aduncum genus, & gra-
 ue, uolax enim ut aduncum est, corpulētum ut graue. itaq; quoniam uolax est, ex-
 crementumq; eò transit, pauca parit. sed sæpe corporis magnitudine, & uentris ca- 20
 lore, & facultate concoquendi maxima, atq; etiā quod cibum facile sibi acquirit,
 adunca enim difficulter id faciunt. Paruæ etiā aues salaces, præfecundæq; sunt,
 quomodo interdum plantæ minores sunt fertiliores, quod enim in cremēto corpo-
 ris deest, in excrementum seminale exundat. quam ob rem gallinæ hadrianæ mul-
 ta admodū pariunt. sit enim propter corporis exiguitatem, ut alimentum ad partio-
 nem sumptetur. uulgares etiā gallinæ fecundiores sunt generosis. corpora enim
 alteris humidiora, alteris grādiora & sicciora. animus generosus in eiusmodi corpo-
 ribus potius consistit. quin & tenuitas ac imbecillitas crurium facit, ut eorum natura 25
 & salacior sit, & fecundior: quomodo & hominibus euenit. alimētum enim quod
 crura subiret, in seminale excrementum transfertur, quod quod enim inde natura 30
 adimit, hic adiicit. nam unguis aues pede sunt firmiore, & crute crassiore, cau-
 sa uictus, itaq; omnibus his de causis, neq; salaces sunt, neq; præfecundæ. Tinnu-
 culus potissimū in eo genere fecundissimus est, qui solus ferè aduncarum & bibit.
 humor autem & natiuus & aduentitius seminalis cum calore indito est. sed ne ipse
 quidem multa admodum parit, uerum cum plurimum quatuor. Cuculus parum
 generat, quanquam aduncus non est, quia naturæ frigida est. quod ipsius pauore
 iudicatur. Seminale autem animal calidum esse & humidū oportet. pauidam esse
 hanc auem apertum est, cum ab omnibus aubus fugetur, & in alienis pariat nidis.
 Columbarium genus bina magna ex parte parere solet. nec enim uniparum est, 40
 cum nulla auis pariat unum, excepto cuculo, qui & ipse duo interdum parit. nec
 multa parit, sed sæpe bina aut terna cum plurimum, sed bina magna ex parte. sunt
 enim hi numeri inter unum & multa, cibum in semen conueri in ijs quæ abun-
 de fecificant, pluribus declaratur euentis, arborum enim multæ cum admodum
 copiose tulerint, exarescunt fructificatione, nisi corpori alimentum remanserit.
 Annis etiā idem euenit, ut leguminibus, ut frumentis, & reliquis huiuscemo-
 di. cibum enim omnem in semen consumunt. quippe cum genus id fertile ad-
 modum sit, necnon gallinarum nonnullæ cum adeo ualde peperissent, ut etiam
 his die pepererint, mox à tanto partu interire. Hyperinæ enim, id est effoe-
 tæ, & aues & plantæ sunt, quod uirtutis nimia excrementi secessio est, ut exhaui-
 stæ effoe-

stæ effœtæq; dicantur, quæ ita afficiuntur. hæc eadem affectio causæ lætæ etiam est, ut sterilesat. primum enim quinq; aut sex parit catulos, tum anno secundo quatuor, mox tres, deinde pari modo per annos singulos minus uno, postremo nullum, cum & excrementum omne consumptum iam sit, & ætate desinent semen una defecerit. Quibusnam aibus subuentanei partus consistant, & quæ præfecunda, parum ut fecunda, quasq; ob causas, dictum iam est. sunt subuentanea oua, ut antè retulimus, quoniam materia seminalis in fœmina est, nec menstruum decessio fit aibus, ut uiuiparis sanguine præditis. in ijs enim omnibus fit, alijs magis, alijs minus, alijs quantum rem indicet. Piscibus etiam ut aibus menstrua nulla prodeunt. quam ob rem ijs quoq; cōceptus consistit sine coitu, ut aibus, sed minus aperte. frigidior enim natura piscium est. decessio igitur menstruum quæ uiuiparis fit, eadem consistit in aibus per debita excrementi tempora. & quia locus septo propinquus calidus est, magnitudine iuxta perficiuntur. sed ad generationem imperfecta, tum hæc, tum illa piscium sunt, nisi semen maris accedat. cuius rei causam antè exposui. Volacibus subuentanea non gignuntur, scilicet eadem causa, qua multa nec ab ijs ipsis generantur. unguibus enim parum excrementi inest, & marem desiderant ad excrementi commodonem. gigniuntur subuentanea oua plura numero, quàm quæ fecunda sunt, sed minora, ob unam eandemq; causam. quod enim imperfecta sunt, minus augentur: quod minus augetur, plura numero existunt. minus etiam suauia sunt, quoniam minus concocta. concoctū enim in quouis genere dulcius est. sed oua auium aut piscium non perficiad generationem sine mare, satis exploratum habemus. An in piscibus quoq; fiat conceptus sine mare, non æque apertum est. sed potissimum in fluuiatili genere, rubellionibus id accidere visum est. etenim nonnulli statim habere oua videntur, ut de his in historijs scripsimus. Omnino in auium genere, ne ea quidē oua quæ per coitum oriuntur, possunt magna ex parte augeri, nisi coitus auis continuetur. cuius rei causa est, quod ut in mulieribus coitu maris detrahitur mensium excrementum (trahit enim humorem uterus tepefactus, & meatus aperiuntur) sic in aibus euenit, dum paulatim menstruum excrementum accedit, quod foras decedere non potest, quoniam

10 niam parum est, & superne ad cinctum continetur, sed in uterum ipsum collabatur. Hoc enim ouum augetur sicut fœtus uiuiparorum, eo quod per umbilicū affluit. nam cum semel aues coierūt, omnia serè oua semper habere perseverant, sed parua admodū. quam ob rem de subuentaneis dicere non solent oriri sponte, sed reliquias esse prægressi coitus: quod falsum est. satis enim conspectū est in nouella, tum gallina, tum anserē, gigni sine coitu. tum etiam perdices fœminæ, & quæ nondum coierint, & quæ coierint, quarum usus in aucupijs, cum olfaciunt marem, uocemq; eius audiunt, alteræ implentur, alteræ statim pariunt, cuius affectionis causa est eadem quæ in homine & quadrupede. nam si fortè eorū corpora accensa libidine turgent ad coitum, alia cum primū uiderunt, alia cum leuiter tetigerūt, semen emittūt.

40 est hoc auium genus sua natura libidinosum, ut leui egeat motu cum turget, citòq; secernat, ut in ijs quæ non coierint, subuentanea consistant: in ijs quæ coierint, oua breuiaugeantur, & perficiantur. Aues ex ijs quæ ouum pariunt foras, perfectū hoc ædunt, pisces imperfectum. quod extra recipit incrementum, ut antè diximus. causa est, quod genus piscium fecundum admodū est. Itaq; fieri non potest, ut multa in tus finem recipiant: quapropter foras deponunt. idq; agitur citò, quod uterus eorū piscium, qui ouum pariunt, foras iuxta genitale positus est. Sunt auium oua bicolora, piscium unicolora omnium. coloris causam uideris ex facultate partis candidæ atque luteæ. secernitur enim à sanguine quod eò uenit. nullum enim exanguie animal ouum generat. sanguinem autem materiam esse corporum, dictum

oua subuentanea

Aduerte calore e
necessariū eū ad
subuentaneos ouos
productionē: tū
que ex subuentaneis
similibz causis g
ueluti sentit h
x. de animalibz

iam simplex est. pars igitur eius quæ calida est, propius ad formam in membris institutis accedit, quæ autem terrosior est, corporis institutionem præbet, & remotior est. quam ob rem in bicoloribus ovis animal initium suæ generationis à candido sumit. Initium enim animale in candido est, cibum à luteo capit. calidioribus itaq; animalibus seorsum ista habentur distincta, ex quo principium ortus, & ex quo augmentum, atq; alterum candidum, alterum luteum est: & plus candidi syncerius semper est, quam lutei & terreni. At minus calidis & humidioribus contra, plus lutei, idq; humidius est. quod in palustribus accidit avibus. Cum enim illæ sua natura humidiores sint, tum frigidiore terrenis avibus constant. Itaq; ova earum multum eius, quod vitellum vocatur, habent, minusq; luteum. quoniam candidum minus ab eo separatur. Quæ iam sua natura frigida inter ovipara sunt, ea longe humidiora constant. quale genus piscium est. nec candidum habent distinctum, quia exiguum hoc est, & frigida terre nature qualitas copia impedit. quam ob rem omnia piscium ova unicolora sunt, atq; ad lutea candida, ad candida lutea esse dixeris. avium uel subventanea ova colorem eum duplicem obtinent. habent enim ex quo utrumque sit, & unde principium, & unde cibum. sed hæc imperfecta sunt, & maris indiga. fiunt enim fecunda, si quo tempore ineuntur à mare. nec uero sexus cause coloris duplicis est, ut candidum à mare, luteum à femina sit, sed ambo à femina proficiuntur. uerum alterum frigidum, alterum calidum est. in quibus multum caloris est, distinguuntur: in quibus parum, distinguui non possunt. & ob eam rem conceptus eorum sunt unicolores, ut dictum est. semen autem maris constituit tantum: ideo primum exiguum, albusq; conceptus avium cernitur: mox tempore procedente luteus totus, cum iam plus sanguinis admiscetur: postremo secedente calore pars candida circum infilit, quasi humore aque feruente quoquo uersus. candida enim pars out sua natura humida est, calore mæ animale intra se continet, quam ob rem circum ipsa discernitur lutea, & terrena intus manet. & si plura ova coniecta in patinam, aut tale aliquod uas coquis igne, ita, ne motus caloris citior sit, quam ouorum distinctio, idem in uniuersis ovis, quod in singulis euenit, ut lutea cuncta in medio confluantur, candida cititer ambiant. sed quam ob causam alia unicolora, alia bicolora sunt ova, dictum iam est.

De ortu eorum, quæ perfectis ovis seras generantur, tum avium, tum quadrupedum ouum crudi a intellectu parientium.

Caput II



Ecernitur in ovo principium genitale maris ea parte, qua ouum utero adheret, sitq; proinde dissimile, quod bicolor est: nec planè rotundum, sed altera parte acutius; quoniam partem eam differre oportet, in qua principium illud continetur. quam ob rem durius ea ipsa parte est ouum, quam inferiore. principium enim operiendum custodiendumq; est. exit etiam pars oui acuta post. quod enim adheret, id exire postea conuenit. adheret autem ea parte, qua principium continetur. & principii ipsam in parte acuta est. Idem in plantarum etiam seminibus modus est. principium enim seminis adheret, aut ramo, aut putamini, aut pulpæ: ut in legumine patet. quæ enim bivaluis fabarum strues, & cæterorum id genus coniungitur, hæc principium seminis adheret. Sed quare de incremento ouorum, quoniam modo ex utero ueniat, animalia enim per umbilicum capiunt cibum: ova autem quorū cum non modo uermium, ipsa per se recipiant incrementum. At si quid est, quo adherent, id quoniam trahat perfectiorum ouorū nihil enim tale exit cum ouo, ut umbilicus cum animalibus enim trahit ambig. testa perfectio iam ouo efficitur. recte igitur hoc ita queritur. Sed latet primo membranam mollem id esse, quod postremo testa efficitur, perfectio

perfecto enim ovo, durum ac rigidum euadit ita modice, ut exeat adhuc molle, dolore enim moueret, nisi ita exiret. egressum itatim refrigerari duratur, euaporato humore quamprimum, qui exiguus inest, reliqua quoque portio terrena. Huius itaque membranae particula quaedam umbilicaris parte acuta principio continetur, tenditque paruis adhuc ueluti fistula, quod in electijs inchoatis ouis patet. nam si auis madefacta, aut alia causa inalgescens eiecit, cruentus adhuc cernitur coceptus, habensque sibi annexam appendiculam umbilicarem, quae ouo amplius incrementi obtenditur latius, atque minuitur, perfectoque mucro exitum complet. membrana interior sub hoc umbilico est, quae uitellum albumenque ab eo determinet, ubi iam ad consummationem uentum est, ouum absoluitur totum, & umbilicus ratione non insuper apparet. extremum enim ultimum eius est. Partus ouorum contra atque animalium euenit. animal enim uersum in caput, sursumque principium nascitur, at ouum quasi in pedes conuersum exit. cuius rei causa quod diximus est, quod ouum ea parte qua principium continetur adharet. Generatio autem ex ouo ita euenit, ut incubante, & concoquente aue, animal ex parte oui fecernatur: augeatur ex reliqua parte & conficiatur. natura enim simul & materiam animalis in ouo reponit, & satis cibum ad incrementum. Cum enim auis intra se perficere nequeat, cibum unde parit in ouo, nam ijs quae forma animalis nascuntur, cibum in alia corporis parte paratur, quod lac uocatur, uidelicet in mammis. At a uibus hoc idem in ouo natura constituit, sed contra, quam homines putant, & Alcmaeon Crotoniatis ait, non enim albumen oui lac est, sed uitellum. hoc enim pullis pro cibo est. illi albumen pro cibo esse existimant, propter coloris affinitatem. Oritur pullus incubante aue, ut dictum est. sed si aut tempus sit bene temperatum, aut locus, in quo oua manent, tepidus, concoquuntur & autem oua, & quadrupedum ouiparorum sine parentis incubitu. haec enim omnia in terra pariunt, concoquunturque oua tempore terrae, nam si quae quadrupedes ouiparae frequentantes fouent quae adiderint oua, custodire gratia potius id faciunt. gignitur uero eodem modo oua quadrupedum, quo autem. crusta enim dura intacta, & bicolora sunt, & iuxta ductum consiliunt, ut autem: & reliqua eadem tum intus, tum extra eueniunt. Itaque omnium causae eadem consideratione continentur. sed quadrupedum oua ut ualidiora tempore concoquuntur, autem imbecilliora sunt. atque ob eam rem parentem desiderant. Tum etiam natura attendere uidetur, ut sensum prouidum, curamque diligentem erga prolem parentes habeant. sed in genere deteriore hoc facit quousque pariant: in alijs quibusdam etiam donec perficiant. Prudentioribus uero plus curae madata, ut etiam enutrient. postremo ijs quae prudentia iam maxime praedita sunt, consuetudo, amor, & charitas in prolem etiam adultam seruator, ut homini, & quadrupedum nonnullis. a uibus cura donec pariant, & enutrient. quam ob rem & ab incubitu laborant in parte enutrienda. a partu uero deterius afficiuntur, quasi priuatae aliquo sibi nato gestamine. Perficitur animal in ouo celerius diebus tepidis, tempore enim iuuat. tur. nam concoctio est calor quidam. terra enim suo calore concoquit, & quae incubant, hoc idem faciunt. adhibent enim suum calorem, deprauantur etiam oua, & fiunt, quae urina appellantur, tempore porius calido, idque ratione. ut enim uina temporibus calidis coalescunt fece subuersa, hoc enim causae est, ut deprauetur, sic oua pereunt uitello corrupto. id enim in utrisque terrena portio est, quam ob rem & uinum obturbatur fece permixta, & ouum uitello diffuso. multiparis igitur hoc accidit merito, cum non facile omnibus calor conueniens reddi possit, sed alijs deficiat, alijs superet, & quasi putrefaciendo obturbet. Vn cingibus etiam quibus parum fecundis, nihilominus tamen idem euenit. saepe enim uel alterum ex duobus uisum sit, sed tertium semper ferre. Cum enim calida sua natura sint, faciunt, ut quasi

Autem generatio

*Antiquum interpret habet
Quam ob rem
feminae quae
non incubant,
a partu deterius
afficiuntur.*

ferueat supra modum humor ouorum. Iam enim naturam quoque contrariam luteum & candidum habent. luteum namque gelu duratur & coit, calore contra humefcit, quapropter cum uel in terra, uel per incubitum concoquitur, humefcit, atque ita pro cibo animalibus nascentibus est. Nec uero cum ignitur assaturque, durefcit, quoniam natura terrena est ut cera. Ideoque cum plus iusto calefcunt, nati ex recreamento humido sunt, saniescunt, reddunturque urina. At candidu gelu non coctefcit, sed magis humefcit. causam ante reddidi. ignitum solidefcit. quam ob rem cum ad generationem animalium concoquitur, crassescit. ex hoc enim confutit animal. luteum autem pro cibo est, & membris subinde institutendis incrementum hinc admistratur. quocirca luteum & candidum membranarum inter se distinguuntur, quasi naturam habeant diuersam. Sed quemadmodum haec inter se habeant, tum initio generationis, tum consistentibus animalibus, atque etiam de membranarum & umbilicis diligentius ex ijs quae per historiam scripsimus, considerandum annotandumque est. Ad id autem quod impraesentiarum tractamus, tantum aperuisse satis est. Principio corde constituto, & uena maiore ab eo distincta, umbilici duo de uena eadem per tendunt. alter ad membranam, quae luteum continet. alter ad membranam, cui secundarum species est, qua animal obuolurum continetur, quae circa testem membranam est. Altero igitur umbilico cibum ex luteo assumit. efficitur luteum copiosius, quippe quod calefcens reddatur humidius. cibum enim quoniam corpulentus est, humidu esse oportet, qualis plantae suppedatur. uiuunt autem principio, & quae in ouis, & quae in animalibus gignuntur uita plantae. adhaerendo enim capiti primum & incrementum & alimentum. alter umbilicus ad secundas tendit. ita enim in ijs quae ouo nascuntur animalibus, pullum uti luteo existimandum, ut foetus uiuiparis sua parente utitur, quoad intra parentem continetur. Cum enim non intra parentem nutrantur, quae ouo proueniunt, partem eius accipiunt aliquam, habentque secum in cibo. Membrana uero exteriore nouissima sanguinolenta haec perinde, ut illa utero, utuntur. simul autem & luteum & secundas testa ouii complectitur uteri proportionem, perinde quasi quid unum obductu amplectatur foetum, parentemque totam. quod ita est, quoniam foetus esse in utero, & cum parente necesse est. Itaque in uiuiparis uterus in parente est. in ouiparis e diuerso fit, quasi dixeris parentem esse in utero. luteum est enim cibus, qui a parente praestatur. causa est, quod foetus nutritio non intra parentem est. Crescentibus umbilicus primum confidet, qui secundis adiungitur. hac enim pullum excludi conuenit. reliquum lutei, & umbilicus ad luteum pertinens post collabitur. cibum enim habeat statim oportet, quod exclusum est. nec enim a parente nutritur, & per seipsum statim capere cibum non potest, quapropter luteum subito cum umbilico, & caro adnascitur. Talis ortus eorum est, quae ex ouis perfectis foris generantur, tum in auibus, tum in quadrupedibus, quae ouum crusta iniectum dura pariunt. Sed haec euidentiora in auctoribus sunt animalibus. nam in minoribus obscura praesentia sua exiguitate habentur.

De ijs animalibus quae perfectum ouum intra se pariunt, foras autem animal. quamque ob causam piscium oua mollia sint contra, quam auium.

Caput III

40



Enus etiam piscium ouiparum est, cuius ea, quae infra continent uterum, imperfectum parit ouum, causa quam ante reddidimus. Quae autem cartilaginea nuncupantur, perfectum intra se ouum pariunt, mox animal foras addit, uno excepto, quam ranam uocant. haec enim una foras ouum perfectum parit. causa natura corporis est. caput enim longe grandius reliquo corpore habet, idque aculeatum, ualdeque asperum. quam ob rem nec postea suos catulos intra se recipit, neque principio animal parit. Capitulum enim

enim magnitudo & asperitas, ut aditum, sic exitum impedit. Et cum cartilagineorū ouum cute molli operatur, quod enim frigidiora quā aues sint, nequeūt partem circūdantem indurare, ideo ouum unum in anarū solidum, durumq; est, ut foris seruetur, ceterorum humida sunt natura, & molli, operiūtur enim intus corpore suæ parentis. ortus ex ovo idem ranis, quæ extra perficiūtur, & ijs quæ intus, sed eorū, atq; auium ortus partim similis, partim diuersus est. primū enim altero carent umbilico, qui ad secundas pertinet, quæ sub testa ambiente politæ sunt. cuius rei causa est, quod testa illam circūdantem non habet, cum nihilo his utilis esse possit. parens enim ipsa integrit & seruat. Testa in ouis ædēdis tutela est cōtra detrimēta, quæ deso-
 10 ris ueniūt. Tum generatio ijs quoq; ex oui parte extrema est, sed nō qua utero adhærent. aues enim ex cacumine oriūtur, qua ouum adhæret. causa est, quod auium ouum separatur ab utero. At eorū quanquā non omniū, tamen plurimorū ouum perfectum utero adhæret. Cumq; animal extremo in nascitur, ouum cōsumitur totum, quomodo in auib; ceterisq; quorū omniū absoluitur, demūq; utero umbilicus iam perfectorū adhæret. similis modus eorū etiā est, quorū oua utero absoluitur. nōnullis enim eorū ouū perabsoluitur cum perfectū est. Quares igitur, cur ita differat auiū & pisciū generatiōes. causa est, quod auiū oua luteū a cādido separatū cōtinēt, pisciū unicolora sunt, miscēturq; in ijs ista usquequaq; & cōfundūtur. itaq; nihil prohibet, quo minus ecōtrario principiū habeant genitale. non solū enim par-
 20 te sui adhærente tale est, sed etiā altera obiecta. Alimentū uero ex utero meatibus tra-
 here quibuscūq; eo ipso principio facile est. apertū hoc est in ijs ouis, quæ nō absoluitur. nam in nōnullis cartilagineis ouum non absoluitur utero, sed inharēs descēdit ad animalis generatiōē, in quibus animal perfectum habet suum umbilicū ex utero, cōsumpto iam ouo. cōstat igitur uel ante meatus oui eodē tendere. fit hoc in mu-
 30 scelorū genere laxi cognomine, ut dictum est. Ortus pisciū his rebus, & his de cau-
 sis differt ad auium. cætera eodem ueniunt modo. alterum enim umbilicum habet similiter, ut aues ad luteum, sic pisces ad totum ouum. non est enim huius pars alte-
 ra lutea, altera candida, sed totum est unicolor, atq; ex eo aluntur, consumptioq; pa-
 30 ri modo subsidet, & caro circū adnascitur. Talis eorum generatio est, quæ intra
 se ouum perfectum, foras animal parit.

Quam ob causam piscium oua foras suscipiunt incrementum.

Cepit IIII



Æteri pisces maxime in parte foras parit oua, omnesq; imperfecta, præterquā rana, cuius causam iam reddidimus. eorum etiā qui im-
 perfectū pariunt ouum, causa declarata est. Ortus uero eorum quoq; ouo proueniēs, eodem agitur modo, quo cartilagineorū, quæ intra se
 40 pariunt, sed incrementū celere, atq; ex paruis: & ultimum oui durius
 est. incrementū oui simile uermibus est. animalia enim quæ uermem pariūt, primo
 exigui ædunt, quod per se augetur sine ullo annexu. causa similis, ut in farina suba-
 cta humore. fit enim massa ex parua magna, parte solidiore humescēte, humida spi-
 40 rascēte, quod in animalibus natura caloris animalis facit, in massa calor permittit hu-
 moris. Augētur igitur oua necessariōe causa: habet enim excrementū massale, sed
 rei melioris gratia. quoniā fieri nō potest, ut totū suū incrementū recipiāt, propter
 summā eorū animalis fecunditatē. hinc enim & parua admodū excernūtur, & ce-
 leriter augētur: parua, quod uterus angustior sit, quā ut tantā ouorū copiā possit
 capere celeriter, ne dum per generatiōē mora in augendo protrahitur, genus pe-
 reat, quando uel nunc magna pars æditi partus interit. quam ob rem genus pisciū
 præfecundum est. rependitur enim, & cōpensatur a natura interitus multitudine.
 sunt quorum uterus dehiscit, & dirumpatur, ut quæ acus uocatur, præ magnitū-
 50

dine ouorum. hæc enim pro multis maiusculos habet conceptus. quod enim natura numero ademerat, id magnitudini addidit. oua piscium foris augeri, & quam ob causam, dictum iam est.

De ortu cartilagineorum piscium, eosq; qui pisces omnes esse feminas putant,
non recte sentire. Caput V



Ed ouum eos etiam pisces parere indicium est, quod utiuiuari quoque pisces ut cartilaginei, primum oua inter se pariunt. Totum enim piscium genus ouiparum esse certum est. finem tamen nullum recipit ouum eorum piscium, qui sexu maris & feminæ distinguuntur, & per coitum generant, nisi mas suum semen aspergat. Sunt qui omnes pisces feminas esse opinentur, exceptis cartilagineis: sed non recte. putant enim eos qui mares habiti sunt, differre a suis feminis modo plantarum, in quibus altera fructificet, altera non, ut olea & oleaster, ficus & caprificus. sic pisces differre inter se uolunt, præter cartilagineos. de ijs enim non ambigunt, quanquam similis ratio partium seminalium in maribus omnibus, tum cartilaginei, tum ouipari generis est, & semine genitale utriusque suo tempore emitti uidetur. uulvas etiam feminæ habent. Atqui non modo ouiparos, sed etiam ceteros uulvas habere oporteret, quauis diuersas, ut mulæ habent in genere ueterinorum, si genus totum sexu feminino esset, nec nisi sterilitate nonnullorum dissideret. nunc uero partim conceptacula habent seminis genitalis, partim uulvas, atque in omnibus, excepto rubro & hiatali, hoc discrimen est, ut aut conceptacula seminis prolifici habeant, aut uulvas. difficultas autem, qua ita opinari mouetur, solui facile potest, cum rem, quæ accidit, audis. nullum enim ex ijs quæ coeunt tam multa parere posse autem, idem recte. quæ enim ex se generant perfectum, uel animal, uel ouum, hæc non ita parit multa, ut pisces qui oua parit, nam innumera quædam eorum multitudo ouorum est. sed illud non uidetur, quam diuersa piscium oua, ab autem sint. aues enim, & quadrupedum ouiparæ, & si qua cartilaginea enumeranda sunt in hoc genere, perfectum generant ouum, & quod ædum non recipiat incrementum. at pisces imperfecta parit oua, quæ foris incrementum iustum recipiunt. eodemque modo mollia & crustata, quæ quidem & coire plane cernuntur, quoniam eorum coitus diuturnior est. alterum etiam eorum marem esse, alterum uulvæ habere certum est. absurdum præterea est, nisi in omnibus generibus uis hæc habeatur, quo modo in utriusque est, alterum mas, alterum femina. causa uero ignorantie eorum qui ita censent, quod differentia, quæ multæ ac uariæ in animalium coitu generationeque sunt, non omnes pateant, sed paucarum quarundam intuitu, idem in omnibus esse oportere arbitretur. quæ ob rem & qui conceptus fieri aiunt captu seminis genitalis, quod a feminis piscibus deuoretur, rem, de qua uerba faciunt, non tenent. Tempore enim eodem mares semine genitale, feminæ oua habent, & quo femina propius ad parium accedit, eo copiosius & humidius redditur semine genitale in mare. & ut incrementum seminis in mare, ouum in femina eodem tempore euenit, sic effusio. nec enim feminæ uniuersum, sed paulatim parit: neque mares semine suum uniuersum emittunt. Atque hæc omnia ratione, ita usu eueniunt. ut enim in autem genere sunt, quæ sine coitu oua concipiunt, quanquam pauca & raro, sed per coitum magna ex parte implentur: sic in piscibus euenit, sed minus. Aque tamen utroque in genere infœcunda sunt, quæ sponte constituerunt, nisi mas suum asperserit semine, uidelicet in quibus mas quoque est. Auius igitur quoniam oua perfecta exest, id fiat, cum intus adhuc sunt, necesse est. at piscibus quoniam imperfecta omnia oua æduntur, quanquam non intus per coitum consistit ouum, tamen si extra aspersum est, seruari potest: atque in hoc usum consumitur semine marium genitale. quapropter una cum ouis feminarum subsidet, atque minuitur. aspergunt enim mares sequendo in ijs, quæ subinde æduntur, ouis. ergo in piscibus quoque sexus discrimen maris ac feminæ est, omnesque coeunt, nisi sexus alicui generi sit in discrimen. &

tus, & sine maris genitura nihil ex ijs potest generari. facit enim celeritas coitus piscium, ut eius opinionis auctores decipiuntur. Ita enim celeritate rem uenerem peragunt, ut etiam piscatores complures lateant, nemo enim eorum aliquid tale cognitionis gratia obseruat. ueruntamen coitus uisus est, eodem enim modo quo delphini, pisces etiam coeunt, ammouendo supina per lapsum, quibus impedimento cauda est. sed delphinorum multatio diuturnior est: piscium uero huiusmodi celerissima est. Itaque cum eam non cernat, capti siue uoratu seminis, & ouorum, quem exploratū habet, mouentur uel piscatores, ut stultā illam & uulgare rationē de cōceptione piscium asserant, quam & fabulator Herodotus scribit, quasi seminis deuoratu pisces impleantur, nec uident id fieri non posse. meatus enim qui per os intro tendit, in uentriculum fertur, non in uulua. quod uentriculum subierit, alimentū id effici necesse est. concoquitur enim. Vuluae autem plenae ouorum cernuntur, quae unde quæso subierint?

Contra eos, qui coruos & ibin ore coire, mustelam autem ore parere, hyenam duplex genitale habere, trochum uero seipsum inire opinati sunt. Caput VI



Imilis error in generatione quoque auiū euenit. Sunt enim qui coruos & ibin ore coire opinentur: inter quadrupedes etiam mustelam ore parere. Hæc enim & Anaxagoras, & alij quidā naturales auctores scribit simpliciter ualde, & inconsiderate, qui in auiū genere ratiocinatione illa falluntur, quod raro coruorum coitus cernatur, rostrorum cōiunctio sæpenumero, quæ omnibus id genus auiibus solita est. quod in monedulis, quas mansuescimus, planū est. genus etiam columbinū hoc idem facit. Verū hæc, quoniā coire quoque uiuuntur, ea fama caruerūt. coruinū genus libidinofum non est, quippe quod parū fecundū sit. coire tamē id quoque uiuuntur est. sed enim non cogitasse, quæ admodū semen ad uulua deueniat per uentriculum, qui semper quod ingestū est, concoquat, ut patet in cibo perficiendo, absurdum omnino est. uuluas autē id quoque auiū genus, & oua habere cernitur iuxta septū. Mustelam etiam modo ceterarū quadrupedū uulua habere certū est. ex qua quoniam pacto foetus ad deueniat: sed quia mustela paruos admodum parit, ut & cætera didipedes, de quibus postea dicemus, & sæpe catulos suos ore susceptos trāsfert, sect, ut ita opinaretur. Quinetiā de trocho, & hyæna stulte, magnocō errore narratur. hyænam enim cōplures aiunt, trochū Herodotus Heracleota scribit duplex genitale habere, maris ac feminae, & trochum seipsum inire. hyænam inire & iniri annis alternis. sed uisa est hyæna mas, & altera femina, sui discrimine genitalis. locis enim nonnullis penuria huius cōspicius non est. utrum hyænae tam mares quā feminae habet sub cauda lineā quam similem genitali feminino. quæ quidem nota quamuis cōmunis sit, tamen in maribus potius cernitur, quia mares quā feminae magis capiuntur. Itaque qui rem parum diligenter considerant, in hanc aberrant opinionem. sed de his satis.

Quare cartilaginei pisces mares semen spargere non uiuuntur, nec feminae suos conceptus. Caput VII



Episcium generatione quæres, quam ob causam cartilagineorum, nec feminae suos cōceptus, neque mares suum semē spargere uiuuntur, cum generis non uiuipari, & feminae oua, & mares semē spargere soleant, causa uero est, quod genus cartilagineū semine minime abundat. uuluas etiam feminae ad septum positas continent. æque enim mares a maribus, & feminae a feminis differunt. sunt enim cartilaginei minus copiosi genitura. At uero mas uiuipari generis, ut femina oua præ multitudine reponit, sic ipse spargit. plus enim seminis habet, quā satis ad coitū sit. tendit enim natura potius absumere semē id ad augēda oua reposita, quā ad primā cōstitutionē. nam ut & ante,

& modo diximus, oua auium intus perficiuntur, piscium extra. similis enim quodammodo generatio atque in uermiparis est, quanquam imperfectiorem adunt cōceptum, quæ uermem pariunt, sed utriusque tam auium quam piscium ouis perfectionem mas adhibet. uerū auium intus, cum intus perficiantur: piscium extra, cum hæc imperfecta addatur, nam aliās idem utriusque cōtingit. Auium igitur subuētanea fecunda redduntur, & quæ cōcepta maris diuersi coitu sunt, naturā, in eum qui post coierit, mutant, propria etiā quæ incrementō carent, cum coitus intermissus est, celeriter accrescunt, cum repetitur coitus: non tamē quouis tēpore, sed si prius, quam albumē secerni incipiat. At pisciū ouis nihil tale præscriptū est. sed ut seruētur, quamprimū mares aspergūt. cuius rei causa est, quod hæc bicolora non sunt. hinc enim tempus his tale statū non est. At in auū genere ratione sic euenit, cum enim luteū & candidum distincta inter se sunt, principū iam habetur, quod proficiscitur à mare. Istuc enim mas cōfert. Subuētanea igitur recipiunt generationē quoad fieri potest. per se cinasque ad animalis usque fecunditatem impossibile est. sensibus enim opus est. At uegetalem animæ uirtutē obtinēt & fœminæ, & omnia quæ uiuūt, ut sapius dictū est. quā ob rem hoc ouū ut plantæ cōceptus perfectus est, ut animalis imperfectus. Quod si mas in eorum genere deesset, idem sanē fieret, quod in pisciū genere, si tale genus in ijs est, quod sine mare progeneret. Dixi de his antē nondū exploratum haberi satis. nunc uero in omni auium genere, alterum mas, alterum fœmina est. itaque fit, ut qua planta est, perficiat quod non mutetur à coitu, qua non planta, non perficiat, nec aliud quicquam proueniat ex eo quod genuit. neque enim ut plantæ simpliciter, neque ut animalis per coitum prouentus est. Quæ autem oua coitu concepta, discretā iam sunt in albuminis portionem, hæc pro eo qui primum coiuerit, mare euadunt, iam enim utrunque principium obtinent.

De partu mollium animantium, & ortu locustarum.

Caput VIII



Ollium etiam partus similis est, ut sepiæ, exterorumque id genus, atque etiam crustatorum, ut locustæ, & reliquorum generis eiusdem. pariunt enim ea quoque per coitum. & quidem sæpe mas coniunctus cum fœmina uisus est. Quam ob rem hinc etiam historice nequaquam dicere illi uidentur, qui pisces omnes fœminas esse autumant, nec per coitum parere, hæc enim oriri per coitum arbitrari, illa non, mirum est. aut si hæc ita parere illos latuit, indicium imperitiæ est. diutius hæc, quam cætera coeunt more insectorum, ratione. sunt enim exanguia, & ob eam rem frigida natura. sepijs & locustis gemina apparent. quoniam uulua earum ita articulata est, ut bifida ceratur. At polyporum ouum simplex est. causa est forma eorum uteri, quæ specie rotunda conglobataque est. filio enim eius iam repleti incerta est. Locustarum etiam uulua bifurcis est. conceptum hæc quoque omnia imperfectum eadem de causa adunt, locustacei generis fœminæ apud se partum exponunt. quam ob rem ampliores ipsæ, quam mares habent tabellas, ut oua seruentur. mollia foris reponunt, fœminis huius generis mares aspergunt, quo modo ouis mares in genere piscium redduntur que oua eorum glutino coherentia ad speciem uuæ. At locustaceis tale quid fieri nec uisum est, neque ratione exigitur. conceptus enim eorum sub fœmina continetur, & crusta intectus est. Incrementum tam eorum quam mollium oua foris recipiunt, sicut piscium. adhæret ouo sepiæ nascens, parte sui priore. hæc enim tantum potest adhærere, cum hæc una partem posteriorem & priorem eodem habeat. Quænam sit dispositio sit eius cum oritur, petendum ex historijs est. de ortu cæterorum animalium, tum pedestrium, tum uolatilium, tum etiam natatiliū diximus.

De tripli

De triplici insectorum generatione.

Caput IX



E insectis atq; crustatis hoc loco dicendum est, uia & ratione qua cœ-
pimus, at primum de insectis, hæc partim coitu, partim sponte oriri di-
ctum iam est. item uermiculum ea parere, & quam ob causam ita pa-
riunt, genus hoc enim omne ferè uermiculum quodammodo parere
uidentur, conceptus enim qui imperfectior est, talis est. In omnibus au-
tem uel ijs, quæ perfectum pariunt ouum, cœceptus primus indiscretus adhuc re-
cipit incrementum: qualis natura etiam uermis est, mox alia conceptum suum ouo
perfecto ædunt, alia imperfecto, quod extra perficiatur, ut sarpe de piscibus dictum
10 Quæ uero intra se pariunt animal, ijs quodammodo possit primum conceptu ouis
forme quiddam efficiatur, humor enim in mēbrana tenui continetur, perinde quasi
oui testam detraxeris, quam ob rem deprauationes conceptuū, quæ per id rēporis
accidit, fluxus uocāt. Sed insecta & uermē generant, quæ uim obtinēt generandi,
& quæ non per coitū, sed spōte naturæ oriūtur, ex tali origine cōsistunt. nam & eru-
cas genus esse uermis censendū est, & fœtū araneorū, quanquā propter figuræ or-
biculatā specē similia ouo, tum eorū nonnulla, tum alia cōplura primordia esse ui-
deātur. uerū non figura, nec mollitie, aut duritie ouum definiendum est. Sunt enim
cœceptus nōn ullorū durī, quāuis ouo diuersi, sed quod totum muretur, nec ex par-
te eius animal gignatur, id uermis est, omne autē hoc uermiculi genus, ubi suæ ma-
gnitudinis sinē receperit, quasi ouum efficitur. indurescit enim putamen eorum, &
20 tantisper immota reddūtur, quod in uermiculis apum & uesparū, atq; etiā in erucis
apertū est. Cuius rei causa est, quod natura præ sua imperfectione quasi maturans
anrē, quā tempelstiuū sit ouum, pariat, tanquā hic uermis ad incrementū oui mol-
lis adhuc pergat, hoc eodē modo in cæteris quoq; euenit omnibus, quæ non coitu
oriūtur, uel in lanis, uel alijs huiuscemodi, atq; etiā in aquis. Omnia enim post uer-
mis naturam motu cessant, & putamine obarescūt. mox rupto putamine exit, uelut
ex ouo animal, tertia perfectum generatione, idq; pēnatum magna ex parte. Ra-
tione illud etiam euenit, quod iure multi admirentur. Erucæ enim cum primo ca-
pianr uocum, mox non capiūt, sed motu cessant, quæ per id tempus aureliæ a non-
30 nullis uocātur. uesparum etiam uermiculis & apum idem accidit, pōst deinde quæ
nymphæ appellantur, proueniūt, quæ nihil huiuscemodi habeant. Quorum enim
natura adepta suum finem, non insuper accrescit, sed anrē augetur & alitur donec
distinguat, & fiat ouum perfectum, uermium autem alij hoc intra se habent un-
de excrementum ipsis nutriendis accedat, ut uermes apum, & uesparum: alij de so-
ris capiunt, ut erucæ, & cæterorum nōnulli uermium. Sed quam ob rem triplicem
generationem hæc sortiantur, & qua de causa ex motis immota reddantur, expli-
catum iam est. Oriuntur eorum alia per coitum more auium & uiuiparorum, & pi-
scium partis plurimæ: alia sponte modo nonnullarum plantarum.

De generatione, & ortu apum.

Caput X



40 Pum generatio magnā recipit ambiguitatē & quæstionē. cum enim
in genere pisciū talis quædā sit generatio non nullorū, ut sine coitu ge-
nerent, hoc idem in apibus etiā euenire uidetur, quoad sensus ratioq;
apparēs ad moneat, aut enim aliunde portare fœtum eas necesse est,
ut quidam uolunt, eumq; uel sponte nascentē, uel ab aliquo animali
æditum: aut ipsas generare: aut partim portare, partim generare. nam id quoq; alia
qui dicūt, fucorumq; fœtū tantum portari opinātur. Item generare eas aut per coitū,
aut sine coitu, & per coitum generare, aut singula genera per se, aut quodli-
bet unū cætera, aut aliud cum alio iunctū. uerbi gratia, apes ex apibus cœuntibus
inter se gigni, fucos ex fucis, reges ex regibus, aut cætera omnia ex uno, ut ex ijs, qui

reges ac duces uocantur, aut ex fucis & apibus. sunt enim qui fucos mares esse, apes
 feminas arbitrentur. alij contrā, apes mares esse, fucos feminas opinantur. Quæ
 omnia impossibilia sunt ratiocināt, partim ex ijs quæ apibus priuatim eueniāt, par
 tim ex ijs quæ cū cæteris sint animalibus cōmuniora. Nā si non ipsæ parit, sed aliū
 de portante scitur, oriū apes oportet etiā sine ulla opera apū, scilicet eo loco de quo
 semē portetur. cur enim trās lato femine oriatur manēte suo loco nō oriatur? prius
 sus oriū nihilominus cōuenit, siue spōte in floribus semen id nascitur, siue ab aliquo
 ædiur animali, quancūq; non apes, sed illud animal gigni oportebit, quod semē gene
 ret. ad hæc, mel portari ab apibus rationis est: cibus est enim, at scētū alieni genā de
 ferre absurde credideris. nam, cuius rei gratia quæso? quādo omnis labor qui prolis
 causa suscipitur, in ea, quæ propria esse uidetur, prole uersatur. nec uero apes fœmi
 nas esse, fucos mares ratio patitur. arma enim ad pugnā uiresq; exercēdas nulli fœ
 minæ à natura tribuuntur. Sunt autē fuci inermes. carent enim aculeo. Apes omnes
 a culeo armantur. nec cōtrā dici ratione probabili potest apes esse mares, fucos fœmi
 nas. mas enim nullus solet in prole elaborare, quod apes faciūt omnino, cum fœtus
 fucorū gigni uideatur, etiā cum nullus est fucus. apū autē nō gigni sine regibus. &
 quidē ob eam rem scētū fucorū tantū portari aliqui putāt. Cōstat nō per coitū gigni
 uel ex alterutro genere scētū cōeunte, uel ex apibus & fucis. portari etiā scētū fucorū
 tantū cum impossibile sit, ob ea quæ modo diximus, tum ratio aspernat, ut in
 genere toto earū talis affectio nō eueniat. Quinetiā fieri nō potest, ut ipsæ apes par
 tim mares, partim fœminæ sint. In omnibus enim generibus mas à fœmina differt.
 generaret etiā se ipsæ. At nullus earū cernitur fœtus, nisi duces assint, ut aiūt. Cōmu
 ne aut argumentū tam ad agēdā uiciissim generationē, q̄ ad eam quā fuci efficiāt, &
 siue seorsum, siue permiscue agi dicitur, quod nullū eorū coire unquā uisum est. At
 sæpenumero eueniret, ut coitus cerneretur, si alterū mas, alterū fœmina in ijs esset.
 Reliquū est, ut si per coitū oriatur, reges cōeuntes inter se generēt. at fuci oriū uisun
 tur, etiā cū nulli sunt duces, quorū fœtū nec portare, neq; parere apes suo coitu pos
 sunt. Relinquitur itaq; ut quod in piscibus euenire uidemus, apes sine coitu fucos
 generēt, & fœminæ sint, quæ generāt ratione: sed habeāt intra se ut plantæ sexū ma
 ris & fœminæ. quā ob rem ijs datū est instrumētū ad pugnā. nec fœmina appellādū
 est, in quo mas distinctus nō est. quod si in fucis id euenire uidetur, ortusq; eorū exi
 stit sine coitu, iam & apibus & regibus eādē seruari rationē necesse est, ut sine coitu
 procreetur. Cæterū si sine regibus gigni fœtus apū uideretur, apes etiā sine coitu ex
 se generari necesse esset. sed cū hoc negēt, qui in eorū animalū cura uersantur, relin
 quitur, ut reges & se generēt & apes. itaq; cū singulari quadā peculiariq; natura ge
 nus sit apū, ortus quoq; earū peculiaris meritō esse percipitur. nā ut apes sine coitu
 generēt, minus propriū est, cū idē uel in alijs eueniat animalibus, ne idē procreēt ge
 nus, propriū est. rubri enim generāt rubros, & hiarulæ hiarulas. causa est, quod ipsæ
 generantur, nō ut muscæ, & reliqua id genus animalia, sed ex diuerso, tamē cognato
 genere prodeūt. ex ducibus enim oriūtur. quam ob rem proportio quodāmodo in
 eorū generatiōe seruatur. duces enim magnitudie fucis, aculeo apibus similes sunt.
 Apes igitur aculeo regibus assimilantur: fuci magnitudine, aliquid enim discriminis
 inesse necesse est, nisi semp genus ex quouis idē gigni necesse sit. qđ impossibile est.
 ita enim genus totū duces essent. Apes itaq; uiribus, & partēdi facultate similes duc
 ibus sunt: fuci magnitudine æmulantur. quod si aculeū quoq; haberēt, duces utiq;
 essent. sed nunc id ipsum ex propōita quæstione restat, & solutū iam est. quæ enim
 superius dicta sunt, totā hanc soluit quæstionē. duces enim idē similes sunt generi
 utriq;. quæ enim aculeū gerūt, apibus: quæ magnitudine præstāt, fucis assimilantur.
 Sed duces etiā ipsos ex aliquo gigni necesse est. itaq; cū nec ex apibus, neq; ex fucis
 creentur,

creentur, ipsos se etiam generare necesse est. Cellulæ eorū nouissimæ cōstruuntur, nec multæ numero, itaq; euenit ut duces generent & seipsos, & aliud genus, quod apum est. Apes aliud generēt, id est fucos. ipsi uero fuci nō insuper generēt, sed hoc ipsi priuētur. Cum enim semper quod secundū naturā est, ordinem habeat, ideo si eos ea quoq; facultate priuari ut aliud generēt, necesse est. & quidē ita hoc euenire uidemus. ipsi enim generātur, nihil uero aliud generāt, sed in ternario numero finē generatio recipit. atq; adeo bene institutū est à natura, ut semper hæc genera seruētur, & nullū deficiat, quanquā non omnia generēt. Ratione illud etiā euenit, ut annis prosperis copia mellis proueniat, & fucorū: imbribus uero crebris fœtus omni-
 10 no superet. humor enim facit plus excrementi in corporibus ducū. Anni uero tēpores facit hoc idē in apibus. cum enim corpore sint minore, tēperniē magis desiderāt. Recte etiā reges intus manēt immunes omni negotio necessārio, quasi natū ad sobolis procreationē, magnitudine item præstāt, quasi ad proleē generandā corpus eorum sit institutū. cōuenit & fucos ociosos inertesq; esse, cū nulla habeāt arma, quibus de cibo possint dimicare. cūq; pigritia tarditatēq; corporis degenerēt, apes mediū inter reges & fucos tenēt. ita enim utiles ad negocia, officiosæq; operariæ esse possunt, utq; & filios alāt, & parētes. quin & sequi suos reges, ut faciūt, cōsentaneū est rationi, quæ generationē apū à regibus proficisci statuimus. nā si tale quid esset, ratione carerēt ea quæ agitur in earum imperio, atq; etiā regibus cōcedere nihil la-
 20 boris suscipere, ut parētib; fucos uero castigare ut filios. iustis enim filij castigantur, & quorū negociū nullum est. Apes aut multas à ducibus ipsis paucis generari, simile uidetur leonū generationi: qui cum primū quinq; numero genuerint, mox pauciores generāt, postremoq; unum, tum deinde nullum. nam & apū duces primum multitudinē generāt, mox sese paucos, atq; illarū fœtum minorē, suum uero auctiorē, quod enim eorū numero natura ademerat, id magnitudinī addidit. Generatio apum ita se habere uidetur, tum ratione, tum etiā ijs, quæ in earū genere euenire uisuntur. nō tamē satis adhuc explorata quæ eueniāt, habemus, quod si quādo satis cognita habebūtur, tūc sensui magis erit, quā rationi credēdum. Rationi etiā fides adhibenda est. si quæ demonstrātur, cōueniunt cum ijs quæ sensui percipiuntur, re-
 30 bus. Apes sine coitu generare argumēto illud etiā est, quod fœtus exiguus admodū in cellulis faul cernitur, cum insecta quæ per coitum oriūtur, coeant diu, parāt breui, magnitudine ad speciem uermis. Quod ad generationē cognatorum ijs animālū pertinet, ut crabronū, uesp̄arūq; similis quodāmodo ratio est: sed defuit his locuples naturæ dotatio merito. nihil enim, ut apum genus, habēt diuinitatis. generant quippe matrices uocata, primosq; fauos cōsuntunt. generatione uero coeundo inter se fungūtur. uisus est enim sæpe eorum coitus. sed quoniam differētijs hæc genera aut inter se dissidēāt, aut cum apibus, petendum est ex ijs quæ per historias explicauimus. Atq; de generatione insectorum omnium dictum iam est.

De generatione & ortu testatorum animalium, quomodoq; nonnulla plantarum generationi contigua sint: deq; testatorum incremento. Caput XI



40 Equitur ut de testatis disseramus. Generatio eorū quoq; partim similis, partim dissimilis cæteris est, idēq; euenit ratione. quippe cum animalium cōparatione plantis, plantarum animalibus assimilantur, ita, ut semine gigni quodāmodo uelut animalia uideātur: at alio modo non semine, & tum sponte, tum ex se: aut alia sponte, alia ex se oriri. Sed quoniam naturā proportionē plantis respōdentem hoc genus habeat, hinc testatiū inter, aut nullum in terra gignitur, aut paruum: quale genus limacum est, & si quid eiusmodi aliud sit, sed rarum. at in mari, similisq; humore multa & uaria gignitur. Genus plantarū contrā, mari locisq; huiusmodi parū, & nullum ferē in terra

autem hæc omnia oriuntur. habēt enim naturam proportionālē atq; diffinītiā. sed quāto uitalius humidū quā siccū, & aqua quā terra est, tanto natura testatorū, quā plantarū uiuacior est. nam aliās eō quidē spectāt, ut sicut plāræ ad terrā, sic testatara ad humorem se habeāt, quasi plāræ ostrea terrena, ostrea plantæ aquatiles sint. hinc etiā fit, ut multisot miora sint, quæ in humore gignūtur, quā quæ in terra. humor enim naturā habet ad effingendum afformādumq; habiliorē, quā terra: nec multo minus corpulentā eam, quæ potissimum in mari habētur. humor enim potius lentus dulcis quidē, alumnusq; est. Sed tum minus corpulentus, tum frigidus est. quā ob rem quæ sanguine carēt, nec natura calida sunt, ea nasci in lacu non possunt: minus etiā in falsis aquis, quæ sint potulēiores, gignūtur, ut testata, ut mollia, ut crustata. hæc enim omnia sanguine uacāt, & natura frigida sunt. sed stagnis marinis & iuxta amniū ostia gigni solent. quærūt enim unā teporē & alimentū. mare autem humidū multoq; corpulentius aqua potulenta est, atq; etiā sua natura calidum est, ut particeps omniū partium sit, uidelicet humoris, aëris, terræ. itaq; omnia adipiscuntur, quæ singulis his locis gignuntur. plantas enim terræ incolas quīpiā esse ita tuerit, aquæ aquatilis animalium genus, aëris pedestre. sed quod magis, minus ue, & remotius, aut propius res constet, magna mirāq; differentiā existit. Quartum genus non his locis quærēdum est, quanquam aliquid esse exigit ordine ignis. id enim quartū corpus enumeratur. uerum ignis semper formā non propriam habere uideretur, sed in alio corpore. aut enim aër, aut sumus, aut terra esse uidetur quod ignis tum est. sed enim genus hoc apud lunam quærēdum est, hæc enim quartam illam distantiam adipisci uidetur. sed de his aliās. Natura testati generis consistit, partim sponte, partim aliqua ab ipsīs emissā facultate: quanquam sæpenumero ea quoque spontina oriuntur constitutione. Sed generationes plantarū accepisse hoc loco congruit. oriuntur enim earum alix semine, alix auulsione. nonnullæ etiam sobole, ut cape. hoc igitur tertio modo miruli gignuntur. quippe qui minores subinde iuxta principium adnascūtur. buccina & purpuræ, & quæ sauaræ dicuntur, quasi a feminali natura humores quosdam mucosos emittunt. semen uero nullum esse eorum purandū est, sed quo diximus modo, plantis assimilantur. quā ob rem largæ eorū copia prouenit, cum primū constiterit aliquid, hæc enim omnia uel sponte ut oriuntur, euenit, itaq; ratione tunc magis, cum origo præcesserit, consistunt. aliquid enim excrementi singulis proficisci credendum meritō est ab eo principio, cui soboles quæq; adnascitur. Sed cum similem habeant facultatē cibis, excrementumq; cibi, fauantū substantiā similem esse cōstitutioni primæ cōsentaneū est. quāpropter excremento hoc gigni probabile est. Quæ autem uel sobolem nullam procreāt, uel non fauant, eorum omniū ortus spōtinus est. omnia uero quæ hoc modo cōsistunt, aut in terra, aut in aqua cum putredine gigni uisuntur, & imbre admissō. cum enim dulce in principio constituendū fecernitur, quod superest, talem accipit formam. nihil autem gignitur putrescens, sed concoctū. putredo uero & putridū excrementum rei concoctæ est. nihil enim ex toto efficitur, quomodo neq; in ijs, quæ ab arte cōduntur. Nam nisi ita esset, facere non requiretur. sed quātum inuile est, id aut a natura, aut ab arte detrahitur. Generantur autem in terra humoreq; animalia & plantæ, quoniam humor in terra, spiritus in humore, calor animalis in uniuerso inest, ita ut quodāmodo plena sint animæ omnia. Quā ob rem cōsistunt celeriter, cum calor ille cōprehensus siue exceptus est. cōprehenditur autē, & humoribus corporis incalefēntibus efficitur uel ut bulla spumosa. sed differentia nobilioris ignobilioris ue generis constituendi in comprehensione principij animalis est. huius autem rei causam, & loca habent, & corpus quod comprehenditur. In mari uero multum portionis terrenæ est, quocirca ex tali cōcretionē natura testati generis oriuntur, ita ut

ita ut pars terrena circiter dureſcat, cogaturq; eodē modo quo oſſa, & cornua (ſunt enim hæc illiquabilia igne) corpus intus cōtineatur, quod uitam obtinet. unum ex his genus colliclearum coire perſpectum eſt, ſed an ortus earum per coitum ſit, nec ne, nōdum exploratum ſatis habetur. Sed enim quæret quiſpiam recte, quidnam in his ſit, quod ſecundū materiale principium conſiſtat. nam in ſeminis excrementum quoddam animalis hoc eſt, quod principii genitale à mare profeſtum mouēs potentia tale, quale id eſt, de quo uenit, animal efficit. At in his, quidnam hoc eſſe dicendum ſit, & unde, & quod principii genitale ſecundū marem? Ponēdum igitur in animalibus generantibus calorem in animali contentū, ſecernendo ex cibo ingeſto, & concoquendo facere excrementum, quod conceptus principii ſit. hæc ſecus in plantis, niſi quod in ijs & quibuſdā animalibus, nihilo maris principium deſideratur. habēt enim hoc intra ſe multum, at plurimorū animalium excrementū illo principio eget, alimentū autem alijs aqua, alijs terra, alijs quod ex ijs conſiſt. Itaq; quod calor in animalibus cōtētus ex alimento efficit, hoc tēporis calor in aëre ambiente contentus, ex mari aut terra cōcernit concoquens, atq; conſtituit. Quod autē comprehenditur exceptum in ſpiritu animali, id conceptū facit, motumq; imponit. Conſtitutio igitur plantarū quæ ſponte oriūtur, ſimilis eſt. quadā enim ex parte contrahitur, & alterū eius partis principii genitale, alterum alimentū ſit primum ijs, quæ oriuntur. At uero animalia quadam uerme naſcūtur, tum exanguia, quæ non ab animalibus gignuntur, tum etiā ſanguinea, ut mugilum genus quoddā, & aliorū fluuatiilium piſcium. ad hæc, anguillarū genus. hæc enim omnia quāuis naturā partium ſanguineā habeant, tamen ſanguinea ſunt, & cor obtinēt. quod principii ſanguinariū corporis eſt. Quæ autē inteſtina terræ uocātur, uermis habēt naturam, in quibus corpus anguillarū conſiſtit. quam ob rem de prima hominū atq; quadrupedum generatione, ſi quando primū terrigenæ oriebātur, ut aliqui dicunt, non temere exiſtimaueris altero de duobus his modo oriri. aut enim ex uerme conſtituto primum, aut ex ouo. quippe cum aut intra ſe habeāt cibum ad incrementum neceſſe ſit, qui quidem conceptus uermis eſt: aut aliunde accipere, idq; aut ex parente, aut ex parte cōceptus. itaq; ſi alterum fieri non poteſt, ut affluat ex terra, quomodo ceteris animalibus ex parente, relinquitur neceſſariū, ut ex parte conceptus accipiantur. talem autem generationē eſſe ex ouo aut uerme fatemur. ergo ſi initium ullum generationis omniū animalium fuit, alterutrū de his fuiſſe probabile eſſe apertum eſt. ſed minus rationis eſt, ut ex ouo prodierint. nullius enim generationem animalem talem uidemus, ſed alterā tum ſanguineorū quæ diximus: tum exanguis, quæ ſunt inſectorū nonnulla, & ea quæ teſta operiūtur, de quibus agitur. non enim ex parte aliqua oriūtur, ut ea, quæ ouo naſcūtur. Incrementū etiā ſimiliter, ut uermes, capeſſunt. uermes enim augētur in partem ſuperiorē, & qua principium cōſtitnetur. alimentū enim ſuperius ab inferioribus miniſtratur. atq; id quidem cōmune cum ijs, quæ ex ouo proueniūt, habetur: ſed illa totā materiā abſumunt. In ijs uero quæ ex uerme gignūtur, cum ex cōſtitutione in parte inferiore contenta pars ſuperior creuerit, mox ex reliquo alimento inferior articulatur. cuius rei cauſa eſt, quod cibus poſtea quoq; in parte ſepto ſubiecta cōſiſtitur omnibus. incrementū autē hoc modo fieri uermium apertum in apibus, cæterisq; ſimilibus eſt. principio enim partem inferiorē magnam, ſuperiorē habent minorem. Idem augelcēdi modus in teſtatis etiā eſt. Quod & ipſum cōſtat in genere turbinato, ſcilicet inſectibus eius, qui ſubinde accreſcentes plures efficiuntur in partem priorem, quod caput uocatur. diſci ferē quemadmodū generatio, tum eorum, tum cæterorum ſponte orientium agitur. omne autem genus teſtatū ſponte inſtitui apertū hinc eſt, quod nauigijs putreſcente ſece ſpumofa adnaſcuntur, & locis multis, ubi niſi tale a derat antē, poſt per

inopiam humoris factio cœno ostreae prouenerit. ut apud Rhodum insulam, cum classis applicuisset, & sicilia proiecta essent in mare, tempore post cœno obducto testis ostreae in ijs reperiebantur. nihil autem partis genitalis emitti ab ijs argumentum est, quod cum Chij quidem ex Pyrrha Lesbi insulae ostreas uiuas portassent, & in loca quaedam maris reciproci ætus & luto similia dimississent, plures nihilo fuere temporis spacio, quanquam incremento corporis plurimum profecerunt. Quæ autem oua appellantur, nihil ad generationem conferunt, sed indicio sunt nutritionis melloris, quale in sanguine pingue est. quam ob rem sapore per id tempus præstant, ciboque laudantur: argumento, quod & pinnae & buccina, & purpureæ continent quidem semper ouum illud uocatum, sed altius maius, aliàs minus. sunt etiam quæ non semper, sed uere id habeant. mox enim tempore procedente minui-
tur, demumque totum aboletur, ut pectines, mituli, ostreae. Tempus hoc enim prodest eorum corporibus, alijs nihil tale aperte uenit, ut callis. Sed singula eorum, & quibusnam oriantur locis, petere ex historia debes.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBER QVARTVS, INTERP. THEODORO.

Democritum, Empedoclem, & nonnullos alios non recte de maris & semina
generatione sensisse.

Caput I



DE GENERATIONE animalium omnium, tum uniuersum, tum singulatim dictum iam est. Sed cum in eorum perfectissimis mas & foemina distincte habeantur, easque facultates omnium animalium & plantarum esse principia fateamur, quamquam in alijs discretas, in alijs indiscretas, differendum hic est primo de eorum ipsorum generatione. imperfectis enim adhuc suo in genere distinguitur sexus maris & foeminae. Sed utrum prius etiam, quam hæc differentia sensu nostro percipi possit, alterum mas, alterum foemina sit, discrimine facto in utero, an post, ambigitur. Alij enim protinus in seminibus hanc esse contrarietatem aiunt, ut Anaxagoras, & alij naturales autores, etenim semen gigni ex mare, foeminam autem locum præbere, marem à parte dextra, foeminam sinistra proficisci: & utri latere dextro marem contineri, foeminam sinistro. Alij uero id ascribunt, ut Empedocles. Quæ enim uterum subierint calidum, hæc effici mares arbitratur: quæ frigidum, foeminas. caliditatis uero frigiditatis uel causam esse confluuium menstruorum, quod frigidius uel calidius sit, & aut antiquius, aut recentius. Democritus Abderites differentiam maris ac foeminae fieri quidem in matre ait, sed non caliditate frigiditate uel, alterum effici marem, alterum foeminam: sed utrius tandem semen euicerit, quod ab ea prodijisset parte, qua mas & foemina inter se differunt. hoc enim Empedocles profecto negligenter opinatus est, ut caliditate frigiditateque tantum differre hæc inter se existimaret, cum partes ipsas genitales, & uterum magnam habere differentiam cerneret. nam si postea, quam formata sunt animalia, alterum partibus foeminae omnibus, alterum maris constitutum, mox in utero tanquam fornace ponantur, quod uterum habet, in calido, quod non habet, in frigido: erit foemina quod utero caret, mas quod uterum habet. quæ res impossibilis est, itaque eatenus quidem melius à Democrito dicitur. Quærit enim ille differentiam huius generationis, & reddere conatur: sed an bene, nec ne, id aliò pertinet. tum etiam si caliditas & frigiditas causæ sint, ut partes hæc diffi-

hæc differant, hoc explicare debuerunt, qui ita uolunt, hoc enim serè est docere de generatione maris ac fœminæ. his enim partibus planè differunt. nec parum nego cū est, causam generationis earum partium ab illo principio ducere, cum necesse sit ita sequi, ut si animal refrigeratur, pars efficiatur ea, quam uterum appellamus: si calefcit, non hæc efficiatur. eodemq; modo de ijs partibus quæ ad coitum accommo-
 10 dantur. nam eæ differunt inter se, ut antè expolitum est. Ad hæc, sæpè numero eue-
 nit, ut eadem in parte uteri gemini mas & fœmina generètur, idq; satis inspeximus in dissectionibus animalium uiuiparorum, tum pedestrium, tum etiam piscium. Quæ si non ille conspexerat, merito errabat, cum eam afferret causam. sed si cum
 hæc explorata habuisset, ita sensit, absurdum sanè est quod insuper putari causam
 uteri esse caliditatem aut frigiditatem. ambo enim semper aut mares aut fœmina effi-
 15 cèrètur, quod non ita euenire uidemus. Item cum partes eius quod gignitur, discer-
 ptas esse fateatur (partim enim in mare, partim in fœmina esse putat, ideoq; alterū
 coire cum altero concupiscere) magnitudinem earum quoque partium esse diui-
 sam, uelleq; coniungi necesse est, non refrigeratione calefactione uè ita institui. sed
 seminis huiusmodi causæ complura fortasse obijci possunt. modus enim hic causæ
 figmento similis est omnino. cæterum si ratio seminis ita se habet, ut explicatum à
 nobis est, & neque ex omni corporis parte decedit, neque materiam ullam ijs, quæ
 gignitur, præbet, quod proficiscitur à mare, tam & ei, & Democrito, & si quis alius
 20 ita censet, occurrèdum simili modo est, nec enim discerptum esse potest seminis cor-
 pus, ut partim in fœmina sit partim in mare, ut Empedocles censet, cum dicat: Sed
 discerpta gerunt, mas ipse, & fœmina membra: neque totum ipsum ex utroq; dece-
 dens, quia pars aliqua partem aliam uicerit, ideo efficiitur mas aut fœmina, quan-
 quam omnino melius partis exuperantia fœminam aut marem effici dixerit, quam
 per incuriam calori aut frigori tantum causam tribuat. sed cur formam etiam geni-
 talis diuersam esse unà eueniat, causa reddenda est, ut hæc semper uicissim conse-
 quantur. nam si quoniam iuxta sunt, ita sit, reliquæ etiam quæque partes consequi
 debuerunt. sunt enim inter eas quæ superant, aliæ alijs propinquæ. itaque simul &
 fœmina esset & matri simile, aut mas & simile patri. absurdū etiam tantum eas effi-
 30 partes oportere, nec totum corpus mutari existimare, & præcipue, primòq; uenas,
 quibus ueluti descriptione deductis, corpus adiacet carniū, quas suam recipere
 qualitatē propter uterum, nulla probabili ratione dici potest: sed potius uterum
 propter eas suam recipere qualitatē ratio est. quanquam enim utrumque sangui-
 nis conceptaculum est, tamen uenæ sunt prius. principiū autem mouens prius esse
 semper, & causam generationis aliqua sui qualitate necesse est. Accidit igitur diffe-
 rentia earum partium inter se fœminæ & mari. nec id esse principium, neque cau-
 sam esse hanc arbitrandum, sed aliam, etiam si nullum semen uel à mare, uel à fœmi-
 na decedit, sed quolibet modo consistit, quod gignitur. Quinetiam contra eos, qui
 marem à dextra, fœminā à læua parte proficisci aiunt, eadem ratio sufficit, quæ con-
 40 tra Empedoclem & Democritum. siue enim nulla materia à mare affertur, siue alia
 qua affertur, ut uolunt, nihil dicunt qui ita censent. necnon Empedoclis sententiæ
 pari ratione occurrèdum est, qui marem à fœmina distinguit caliditate uteri, & fri-
 giditate. quod illi etiam faciunt, qui dextris sinistrisq; rationem describunt, quan-
 quam uideant marem & fœminam inter se differre, & parte & toto. sed cur sinistris
 corpus uteri adiungatur, dextris nequaquam? nam si foetus eo uenerit, nec eam
 ipsam habuerit partem, fœmina erit sine utero, & mas erit cum utero, si ita fors tula-
 rit. Item, ut antè retulimus, & fœmina parte uteri dextra contineri uisa est, & mas
 læua, & ambo eadem in parte, idq; non semel sed sæpius, quam aut mas in dextra,
 aut fœmina in læua, nec minus ambo in dextra gignuntur, atq; etiam cum gemini,

mas & foemina gestarentur, marem in laeva, foeminam in dextra contineri perspectum est. Proxime quia aliqui persuasi dicunt teste praeligato dextro aut sinistro euenire per coitum, ut mas aut foemina generetur. sic enim & Leophanes dicebat. tum etiam ex ceteris alterum testem hoc idem accidere quiddam aiunt non vere: sed rem coniectantur futuram ex consentaneis, atque anticipant, quasi ita sit, priusquam ita fieri videant. ignorant etiam nihil ad generationem maris aut foeminae conferri ab ijs partibus, cuius rei indicium, quod multa animalia & ipsa mares ac foeminae sunt, & generant partim foeminas, partim mares, cum tamen testes non habeant: uelut ea quae pedibus carent. uerbi gratia, genus piscium, & serpentum. causam uero maris & foeminae caliditatem frigiditatem ue arbitrari, secernique de dextris aut de sinistris, non sine ulla ratione dici potest. Sunt enim partes corporis dextrae calidiores sinistris, & semen concoctum calidius est, quale id, quod spissum est, fecundius autem quod spissius est. sed ualde a longe tangitur causa, cum ita assertur. Accedendum autem semper ad rei causas primas, quoad maxime fieri potest, propius, de corpore igitur toto, & de partibus, quid quaque sit, & qua de causa, iam ante explicatum alibi est. Sed cum mas & foemina potentia quadam & impotentia de finiantur (quod enim potest concoquere, & constituere, & secernere semen, atque principium obinet formae, id mas est. Principium autem non hoc dico, ex quo, ut materia, tale gignitur, quale quod generat, est: sed id quod primum moueat, siue in seipso, siue in altero possit hoc facere. quod autem recipit, nec potest constituere & secernere, id foemina est. Item si omnis concoctio calore efficitur, mares quam foeminas esse calidiores necesse est. ob frigiditatem enim & impotentiam foemina sanguine abundat quibusdam sui corporis locis, idque indicium facit quodam aliqui afferunt causam, cum foeminam esse mare calidiorum opinentur, ob menstruum emulsionem. sanguis enim calidus est, & quod plus sanguinis habet, hoc calidius est. putant autem hunc affectum mo-
 ueri abundantia sanguinis & caloris, quasi aequae quoduis sanguis esse possit, modo humidum sit, & colore cruentum: nec ita eueniat, ut minus sanguinis, & syncerius fiat in corpore alimentum melioris & habitus. sed illi perinde ac excrementum alui, quod pluris sit, hoc indicium esse naturae calidioris magis, quam quod minus, existimant. Atqui contra omnino est. ut enim in fructibus conficiendis ex copia primi alimentum parum secernitur, quod utile sit, demumque nulla pars remanet respectu copiae primae: sic in corpore animalis, postquam partes per successionem alimentum conficiendum receperunt, ad postremum parum admodum remanet ex toto alimentum, quod in alijs sanguis, in alijs proportionale sanguinis est. Sed cum alterum potest, alterum non potest secernere excrementum syncerum, omnisque facultas instrumentum aliquod sibi accommodatum habet, & quae melius, & quae deterius idem efficiat: foemina autem & mas, cum multisaria uerba haec, posse, & non posse, dicuntur, modo praedicto sibi opponantur, instrumentum ob eam rem tum foeminae, tum mari tribui necesse est. itaque alteri uterus, alteri coles datus est. Natura autem simul & facultate cuius dat, & instrumentum, sic enim melius est, quam ob rem singula loca una cum singulis excrementis & facultatibus sibi accommodatis instituuntur. atque ut nec uisus sine oculis, necq; oculus sine uisu perficitur, sic & alius & uelica simul atque excrementa fieri possunt, conditur. Sed cum idem sit ex quo generentur, & augeantur, idque sit alimentum, pars corporis quaeque ex tali materia, talique excremento qualis est capax consistet, & fiet. Gignitur item ex contrario quodammodo unumquodque, ut nos censemus. Ad haec, tertium illud sumendum est, ut quoniam omnis delatio in contrarium est, quod non ab eo superatur, a quo conditur, siue creatur, id in contrarium mutari necesse sit. his ita subiectis apertius fortasse iam fuerit, qua de causa alterum mas, alterum foemina fiat. Cum enim principium non superat, neque concoquere potest
 propter

ut prius,
 coles.

quae, delatio.
 quae, corruptio.

propter caloris inopiam, neq; ducit in suam formam, sed tantisper superatur, mutari in contrarium necesse est. contrariū autem maris foemina est, uidelicet quia alterum mas, alterū foemina est. Et cum facultatis siue uirtutis differentia habeat, instrumentum quoq; habet auersum. itaq; in tale mutatur. parte autē aliqua opportuna mutata, constitutio tota animalis multo discrepat forma. licet hoc perspicere in spadonibus, qui una parte truncati tam a pristina forma discedū, parumq; a foemina specie distant, cuius rei causa est, quod partes nonnullae principia sunt. principio autem mutato, multa ex ijs quae sequuntur, commutari & dimoueri necesse est. quod si mas principium quoddam & causa est, masq; est qua aliquid potest, foemina uero qua non potest, potentiae autē & impotentiae ratio sic describenda est, ut facultas aut assit aut desit concoquendi ultimi alimenti, quod in sanguineis sanguis appellatur, in exangulibus proportionale, eiusq; causa in principio & parte quae originē naturalis caloris continet, sita est, cor profectō in sanguineis constituit, & aut marem aut foeminam fieri quod gignitur necesse est. in ceteris uero generibus mas & foemina est, quod proportionale cordis habeat. origo & causa foeminae & maris haec, & in hoc est. Foemina autem & mas iam est, cum partes etiā habent quibus foemina differat a mare. non enim quauis parte mas aut foemina est, quomodo nec uolens nec audiens. sed repetendo dicimus, item semen excrementū esse ultimum alimentū positum est. ultimum autē id intelligi uolo, quod in unamquamq; partem feratur. quam ob rem quod generatū est, simile ei quod generauit, est. Nihil enim refert ab unaquaq; parte profisciscatur, an ad unamquamq; accedat. sed rectius ita. Maris autē semen differt, quod principium in se continet tale, quo moueat, & alimentum in animali ultimum concoquat: foeminae semen materiam tantū praebet, quoties igitur semen superat maris, ad se ducit. cum superatum est, in contrarium demutatur, hoc est, in corruptionem. contrarium autē maris foemina est. foemina cruditate frigiditateq; sanguinei alimenti describitur, natura uero excrementū cuiq; dat conceptaculum. semen autē excrementū est, quod in calidioribus atq; maribus sanguinei generis contractius est. quapropter membra capientia eius excrementi meatus in maribus sunt. at foeminis praecruditate copia reddidat sanguinea. inconceptus enim incoctusq; sanguis est. itaq; conceptaculum eius haberi necesse est, idq; dissimile esse, & amplius. quocirca natura uteri talis est, qua parte foemina differt a mare. Expofui causam quam ob rem alterū mas, alterū foemina generetur.

Indicia, quibus maris a foeminae generatione generatio discernatur.

Caput II



Ndicia uero faciunt res, quae accidunt. nouella enim, & senescentes aetas magis, quam florens foeminas generat. in altera enim calor nondum perfectus est, in altera deficit. humidiora etiam, effoeminationaq; corpora foeminam potius gignūt. & semina humida magis, quam spissa hoc idem faciunt. haec enim omnia eueniunt caloris inopia naturalis. Flatibus item aquilonijs magis, quam austrinis mares gignuntur. fit etiam ut excrementis eiusmodi corpora abundent. plus autē excrementi concoctu difficilius est. quam ob rem maribus semen, mulieribus menstrua decedūt humidiora. Tum etiam ut menstrua secundū naturam mēsisbus decrescētib; potius fiant, eadem de causa accidit. tempus enim hoc mēsis frigidius est, & humidius, propter lunae decrementum, defectionemq;. Sol enim per totū annum hyemem, atq; aestatem facit: at luna per mensem id agit. quod ita fit, non accessu discessuq; lunae, sed alterū incremente luce, alterum decrescēte. Necnon pastores aiunt interesse ad maris ac foeminae peccoris foeturam, nō solum si ita accidit, ut initus aquilonijs, austrinis uel flatibus fiat, sed etiam si, cum pecus coit, spectat ad aquilonem aut austrū. Ita minime interdum

*Quo tempore mens-
strua potissimum acci-
dant.*

momento causa datur caliditatis aut frigiditatis. hæc uero causam complent generationis. Dissident omnino inter se mas & femina, ob eas quas diximus causas, ad maris aut feminae generationem. sed moderatione, quæ intercedat, opus est. nam omnia quæ uel natura uel arte efficiuntur, ratione aliqua sunt. Calor autem si ualde superat, exiccat humorem: si multum deficit, non cõcernit. sed medij ratione ad rem condendam seruari requiritur. alioquin, ut in ijs quæ igne coquuntur, plus ignis deurit, minus non coquit, ac euenit utrinque, ne quod agitur periciatur: sic in coitu maris & feminae moderatione opus est. hinc multis tum maribus, tum foeminis euenit, ut cõiuncti inter se nequeant generare, disiuncti queant: & aut minoribus natu, aut maioribus hæc contrarietates existant, æque in generatione, sterilitateq; 10 & maris foeminaeq; procreatione. Quin & inter terras & aquas interest eisdem de causis. qualitatẽ enim quandã potissimũ recipit & alimentũ, & dispositio corporis ex temperamẽto aëris cõtinẽtis, & ubi ingrediẽtis: sed præcipue ex alimonia aquæ, huius enim usus plurimus est, atq; in omnibus aqua alimento est, etiã sicca. Quam ob rem aquæ crudæ & frigida, aut sterilitatem, aut partum foemineum faciunt.

Cause ob quas nati, uel parentibus, uel alijs sint aut similes, aut dissimiles. Caput III

Eadem causæ sunt, & ut alij parentibus similes generentur, alij dissimiles, & alij patri, alij matri, tum corpore toto, tum uero partibus singulis, & parentibus magis, quàm maioribus suis, & ijs potius, quàm 20 quibuslibet, ac mares potius patri, foemina matri, alij nulli consanguineo similes, sed tamen homini similes, alij ne homini quidem, sed iam monstro. Qui enim suis paribus similis nõ est, monstrum quodammodo est. discessit enim in eo quodammodo natura ex proprio genere, corpitq; degenerare. sed initium primũ degenerandi est foeminam generari, non marem. uerum hoc necessarium est naturæ. Genus enim seruari oportet eorum, quæ femina & mare distinguntur. Sed cum fieri possit, ne aliquando semen superet maris, aut ob ætatem iuuentem, senilem ue, aut ob aliam eiusmodi causam, foeminã ob eam rem gigni 30 necesse est, at monstrum gigni non necesse est, scilicet ad causam cuius gratia, & finem, quanquam per accidens necesse est. nam principium hinc sumatur oportet, 40 quoties enim excrementũ seminale bene concoctum in menstruis est, motus maris agit pro sua forma. nihil enim refert genitura dicatur, an motus, id quod partem corporis unamquandq; augeat. nec interest augentem mortũ, an principio insuruentem placeat appellare. eadem namq; ratio motus est, itaq; si superat, faciet marem non foeminam, & similem ei qui generat, non matri. sed si non superat, pro ea qua non superarit facultate, defectum faciet. facultatem autẽ hoc modo inelligi uolo. quod generat non solum mas est, sed etiam talis mas, ut Coriscus, aut Socrates. nec modo Coriscus est, uerum etiã homo. ad hunc modum, alia propius, alia remotius insunt in eo quod generat, uidelicet, quæ genitale est, non per accidens. uerbi gratia, si grammaticus aut ulcinus cuiusquam, qui generat, est. Valẽt autẽ semper in generando magis, quod proprium & particulare est. Coriscus enim & homo, & animal 40 mal est: sed propius à proprio distat homo, quàm animal, generat autem & quod particulare est, & quod genus est: sed magis quod particulare. hoc enim substantia est. Quod enim gignitur, & si quale quid est, tamen hoc quicquam est, idq; substantia est. quam ob rem ex facultatibus insunt in seminibus eiusmodi omniũ motus, maiorum etiã propria in nepotum semine insunt potentia: sed propinquius semper quod particulare est. particulare Coriscum dico, & Socratem, sed cum omne quod mutatur nõ in quodlibet, uerum in sibi oppositum transeat, ideo & quod in generatione nõ superatur, transeat in oppositum necesse est, pro ea facultate qua non

Femina unde generetur?



non potest esse animal

non superarit, quod generat, moueatq̃. quod si qua est mas, nō potuit, scēmina gl
gnitur. sed si qua est Coniscus aut Socrates, non patri, sed matri simile gignitur. ut
enim omnino patri, mater opponitur, sic singulis generantibus singulæ generant
res opponuntur: similisq̃ modo in sequentibus facultatibus agitur, semper enim in
sequentem & proximum maiorum potius transitur, tam in patre, quā in matre.
Insunt autem motus alij actū, alij potentia. actū insunt motus eius qui generat, &
uniuersaliū, ut hominis, ut animalis. potētia insunt motus scēminæ, & maiorum
tam in patre, quā in matre. mutatur igitur transigens in opposita. motus autem
qui creant, soluantur in propinquos. uerbi gratia, motus eius qui generat si solu
10 tur, primum differentia minima in motū patris transibit, mox in aui, atq̃ deinceps
ad hunc modum in ceteros similes. In scēminis quoq̃ transitus fit. motus enim con
cipientis in motum soluitur matris: si non in eum, in auiæ: eodemq̃ modo in supe
riores. sed potissimum ita natura fert, ut qua mas, & qua pater est, simul & superet,
& superetur. parum enim discriminis est, itaque ut simul utrunq̃ eueniat, nequa
quam difficile est. Socrates enim uir talis quis est. quam ob rem mares magna ex
parte similes patri existunt, scēminæ matri, simul enim in utrunq̃ discenditur. oppo
nitur autem scēmina matri, mater patri: discensusq̃ in opposita fit. sed si motus qui
a mare est, superarit, qui uero a Socrate est, non superarit: aut hic superarit, ille nō,
ita euenit, ut mares similes matri, scēminæ similes patri generentur. Item si motus
soluantur, & qua mas est seruetur, Socratis autem soluitur in patris, mas erit auo
30 similis, aut alicui ceterorum superiorum maiorum, prout solutio tetenderit. Sed si
qua est mas superetur, scēmina erit similis potissimum matri, si autē & hic soluitur
motus, matri assimilabitur matris, aut alicui superiorum pariarum. Item modus
partū quoq̃ est. sæpe enim alix patri similes, alix matri, alix maiorū alicui similes
constituuntur. insunt enim & partium motus, alij actū, alij potentia, ut sæpius di
ximus. omnino subijciēda sunt tria illa, unum quod modo dixi, motus inesse, alios
potētia, alios actū, alterum, degenerare in oppositum, quod superatur. tertū, tran
sire in motum proximū id, quod soluitur. & si minus soluitur, in propinquum: si
magis, in remotiorem discedere. demumq̃ ita confundi, ut nemini suorum similes
30 prodeat, sed cōmune tantū relinquatur, ut homo sit. cuius rei causa est, quod com
mune particularia consequitur omnia. homo enim uniuersale est: Socrates pater,
& quæcūq̃ est mater, particulare est. causa ut motus soluantur est, quod omne
agens patitur etiam a patiente. ut quod secat, hebetatur ab eo quod secatur: quod
calefacit, refrigeratur a calefcente. deniq̃ quodcūq̃ mouet, excepto primo, mutū
mouetur aliquo motu. uerbi gratia, quod pellit, pellitur quodammodo: quod pre
mit, reprimitur. Interdum etiam ita fit, ut quod agit magis patiatur, quā agat, &
refrigere quod calefacit, calefcat quod frigefacit, cum aut nihil fecerit, aut minus
quā ipsum affectum est. dixi de his, cum de ratione agendi patiendiq̃ docerem:
uidelicet quibus in rebus inesset agere & pati. Degenerat autem quod patitur nec
40 superatur, aut defectu facultatis eius quod coquit & mouet, aut copia frigiditatisq̃
eius, quod concoquitur & distinguitur. Cum enim partim superet, partim non su
peret, facit multiforme quod constituitur: ut athletarum nonnullis per usum cibi
nimium accidit. Cum enim per copiam pastus natura nequeat superare, ut propor
tione augeat, formamq̃ seruet eandem, diuersæ efficiuntur partes, & adeo interdū,
ut nihilo ferē similes primis euadant. proximum huic est morbus quem satyrā ap
pellamus. etenim in eo præ abundantia fluxionis, aut flatu strudi in partes faciei
decumbentis, facies animalis diuersi & satyri apparet. Sed quam ob causam mares
& scēminæ generētur, & alij parētibus similes, scēminæ scēminis, mares maribus,
alij ē diuerso, scēminæ patri, mares matri, deniq̃ alij maioribus suis similes, alij suo

rum nemini similes existāt, idēq; tum corpore toto, tum partibus singulis, de ijs inquam omnibus dictum iam est. Sententiæ autē aliorum etiam naturæ interpretum sunt de ijs rebus, scilicet quam ob rem similes parentibus generētur. Afferunt illi duplicem modum rationis, nonnulli enim ita cēsent, ut ab utrovis plus feminis uenerit, ei similis magis generetur, æque totū totum, & parti pars, quasi ex unaquaq; parte semen decedat: sed si par de utroq; uenerit, similis neutri procreetur, quod si falsum est, nec omni ex parte decedit, cōstat nec similitudinis & dissimilitudinis causam id esse, quod referūt. Tum etiā quemadmodū simul & scēmina sit & patri similis, aut mas & similis matri, non facile explanare possunt. Quenim, ut Empedocles aut Democritus, causam de mare & scēmina reddunt, impossibilia modo alio dicūt, sed qui quod plus minus ue ā mare, aut ā scēmina secesserit, alterum marem, alterum scēminam gigni causantur, ij nequeunt explicare quemadmodū scēmina patri similis, mas similis matri reddat. simul enim plus de utroq; uenire impossibile est. Ad hæc, cur similes maioribus suis magna ex parte, remotisq; generētur, cum nihil feminis ab illis secesserit, nihil profectio isti quod bene tueantur habēt. sed qui reliquum similitudinis modum afferunt, ij tum cætera, tum uero hoc melius dicūt. Sum enim qui semen genitale dicant quamuis unum, tamen ueluti omnifariam quandam esse multorum seminum missionem. Itaq; ut si quis multa saporum genera in eodem humore miscuerit, moxq; inde sumat, possitq; sumere semper non tantū eundem ex unoquoq; sed modo huius, modo illius plus, aliās etiam ex hoc sumat, ex illo nihil sumat: sic in semine genitale esse, cum ex multis acuarijs missum sit, ā quocunq; enim gignente accesserit plurimum, ei similem forma generari, sed hæc ratio nec plana est, & passim ficticia est. uult hæc non actū, sed potentia inesse, quam omnifariam feminis commissionem appellat, & quidem ita dici melius est, illo enim modo impossibile est, hoc possibile est. Verum qui ita causam reddunt, nullo modo rationem afferre de omnibus facile poterunt, cur scēmina, cur mas gignatur. quam ob rem sæpenūmero scēmina patri similis, mas matri proueniat. atque etiā de maiorum similitudine. ad hæc, qua de causa interdum homo quidem, sed nulli suorum similis generetur, aliās usqueadeo procedendo degeneret, ut deum ne homo quidem, sed animal tantū aliquod existat, quæ monstra dicuntur. Proximū enim ab ijs, quæ iam explicauius, est, ut causas de monstribus reddamus. ad extremū enim, cum motus soluantur, & materia non superetur, remanet quod maxime est uniuersale, id est animal. iam puerum ortum capite arietis, aut bouis referunt, idēq; in cæteris membrum nominant animalis diuersi. uitulum capite pueri, & ouem capite bouis natam asseuerant. Quæ omnia accidunt quidem causis supradictis, sed nihil ex ijs quæ nominant, est, quamuis similitudo quædam generatur. quod euenit etiam non in monstrum peruersis, quam ob rem sæpenūmero per occasionem nonnulli deformes assimulantur, aut capræ ignem efflant, aut arietis peculeo. phyllognomon quidam omnes ad duorum aut trium animalium formas redigebat, & dicendo plerunq; persuadebat. Sed enim impossibile esse, ut tale monstrum gignatur, id est alterum in altero animal, tempora ipsa grauiditatis declarat, quæ plurimum discrepant in homine & cane, & in oue & boue, nasci autem nullum nisi suo tempore potest. partim igitur hoc modo dicuntur monstra, partim quod forma prodeant multimembri, scilicet multis pedibus, aut multis capitibus. sed profectio rationes monstrorum, & oblatæform animalium propinquæ, & similes inter se quodammodo sunt, monstrum enim oblatæform quædam est.

Quas ob causas monstrosa animalia generentur, & quare alij unifer, alij paucifer, alij multiplex sit partu.

Capit IIII

Demon

Alij petuleo, sed antiquus interpretes habet porco præconizanti.



Emocritus uero mōstra fieri ea causa scribit, quod duo subeūt semina, alterum antē, alterū postea: quæ cum in uero cōfundantur, euenit, ut membra coalescāt atq; dissideāt. A uibus uero quoniā coitus agit ur crebro, idcirco semper & oua, & colorē euariare autumat. Sed si ita sit, ut ex uno semine, eodemq; coitu plura generentur, quod patet, præstat non circūire uia omīssa breui & facili. ijs enim tum maxime id accidere necesse est, cum semina nō distinguūtur, sed simul subeūt. quod si semini maris causa tribuēda est, hoc modo dicendū sit. Sed enim ex toto potius causam in materia, cōstituēdisq; conceptus esse censendū est. quam ob rem mōstra eiusmodi raro admodū fiunt in ijs, quæ singulos pariūt. sed crebrius in ijs, quorū partus est numerosus, & præcipue in auiū genere, earumq; potissimū in gallinis. ijs enim partus numerosus, non modo quod sæpe pariant, ut columbæ, uerumetiā quod multos simul conceptus intra se continent, & temporibus omnibus cōeunt. hinc gemina etiā pariūt plura, coherēt enim cōceptus, quoniā in propinquo alter alteri est, quomodo interdū fructus arborū complures, quod si uitella distinguūtur mēbrana, gemini pulli discreti sine ulla superuacua parte generātur, sed si uitella continuātur, nec ulla interiecta membrana determinant, pulli ex ijs mōstrifici prodeūt, corpore & capite uno, cruribus quaternis, alis toridē, quoniā superiora ex albumine generētur, & prius (ut tellū enim cibo ijs est) pars autē inferior postea instituitur, quanq; cibus idem, indiseretisq; suppeditat. iam serpens etiā biceps uisus est, uidelicet eadē de causa. nā id quoq; genus oua parit, & multa numero. sed rarius in eo mōstri institutio euenit, propter ueteri formā, porrecta enim in uersum copia ouorū cōtinetur pro ueteri longitudine. nec uero in genere apum aut uesparū, tale quid accidit. Cellulis enim discretis partus earum cōtinetur. At in gallinis ecōtrario fit. Vnde apertū est causam euentorū huiusmodi in materia esse putare oportere. ut enim in ijs, quæ plura pariunt, magis: sic in ijs quæ pauciora, minus id accidit. quocirca homini minus, singularem enim perfectumq; parit. nā & homini locis, quibus mulieres perfectundæ sunt, magis id euenit, ut in terra Aegypto. capris uero & ouibus magis, ut fœcundioribus accidit. atq; etiā magis muluifidis, multipara enim id genus aiala sunt, nec partum perficiūt, ut canis. cæcos enim magna eorū pars solet parere. quod quam ob causam accidit, & quam ob rem pariant multos, postea explicabimus. sed enim hæc propēstiora iam sunt suapte natura ad monstrificā partitionē, quando nō similes sibi generāt, sed imperfectos. nam & monstrum quid dissimile est. quam ob rem ijs quorū talis natura est, facilius casus hic obuenit. in ijs enim potissimū, & quæ metachœra appellātur, cōsistunt. quæ aliquatenus labe monstrifica sunt affecta. nam deesse, aut superesse quicq;, monstrosum est. monstrosum est enim res præter naturā. sed præter eā, quæ magna ex parte sit. nā præter eam quæ semper & necessaria nō est, nihil sit. uerū in rebus ijs quæ magna quidē ex parte ita sunt, sed aliter etiā possunt fieri, euenit, quod præter naturā cōsistat. nā & inter eas ipsas, quibus accedit quidē præter hunc ordinē, sed nuncq; quolibet modo, minus monstrum esse uidetur. quoniā quod præter naturā sit, idem etiā secundū naturā quodāmodo est, cum naturā materie, natura formæ nō superat. quā ob rem nec ea mōstri nomine appellātur, neq; ubi fieri aliquid solet, ut in fructibus. Vitis enim quardā est, quæ aliqui capneum uocāt, quæ cum uuā albā soleat ferre, si nigrā tulit, monstrū id esse non putant, quoniā sæpissime id facere ea soleat. causa est, quod sua natura inter albam & nigrā est. Itaq; nō longe disceditur, nec præter naturā ferē. non enim in albā naturam transiit. At in ijs quæ pariūt plura, tum ea ipsa eueniūt, tum uero copia partus impedit alter alterius perfectionē, & causam genitālē. de partu numeroso, paucifero, & singulari, atq; etiā de ijs partibus, quæ aut supersunt aut desunt, quæ

τράγωναι,
capra hircina

stio existeret potest. Gignuntur enim interdū alia pluribus, quā iustū sit digitis: alia uno tantū. eodemq; modo in ceteris partibus, aut excedūt, aut deficiūt. nonnulla etiā duplici genitali, altero maris, altero foeminae nascūtur. & in genere quidē hominum, sed maxime in caprarū. gignūtur enim quas uocāt hircinas, propterea quod simul genitale habent & maris, & foeminae. Iam & cornu gerēs in crure capra conspicitur. Partibus etiā internis mutationes detrimentaq; accidunt, ut uel careāt aliis quibus, uel habeant minuta, & laesa, uel plura numero, uel nō suis posita locis. Sed corde carēs nullū unq; animal ortū est: quanq; liene carēs, & duplicē habēs lienem, & altero uia cōis rene, uisum est. lecore etiā carēs toto nullū notatū est: quanq; quod non totū haberet, iam patuit. haec autē in perfectis uiuisq; reperiūtur. felle item priuata prodierūt, cū sua natura habere deberēt. alia contrā plura habuerūt. Iam locis etiā permutatis iecur latere sinistro, lien dextro contineri uisum est. haec, ut modo dixi, in animalibus iam perfectis explorata sunt, in nascētibz aut uarie perturbatur. Quae si parū de sua natura discedūt, uiuere solent: si plus, uiuere nequeūt, uidelicet cum quod praeter naturam est, partibus uiuēdi principalibus accidet. modus uero considerādi de his est, utrū eandē causam putare oporteat partus singularis, & partium defectus: itemq; partus numerosi, & partū excessus, an nō eandē. Primū igitur quod alia pariāt multa, alia unū, merito quispiā miretur. Quae enim maxima inter aīalia sunt, ea singulos pariūt: ut elephas, camelus, equus, & reliquae solipedes. quae partim maiora ceteris sūt, partim longe magnitudine superāt. Canis uero & lupus & reliqua multifida oīa serē pariūt multa: atq; etiā parua eiusdē generis, ut mures, bisulca pauca generāt, praeterq; fues, haec enim inter multipara est enūmerāda. Ratio enim probabilis est, ut maiora aīalia plura generare. plusq; afferre seminis possint. Sed certe id ipsum quod admirari facit, causa est, ne admiremur, facit em̄ eorū magnitudo, ne multa pariāt. cibus enim in ijs absumit in corporis incrementū. minoribus uero natura demēdo de magnitudine, augeat in excremento seminali exuperantiā. Item plus seminis genitalis esse, quod maioris est aīalis, minus autē quod minoris, necesse est. At multa effici parua in eodē possunt, multa magna effici difficile est. mediocribz uero magnitudinis mediū à natura datū est. Sed quam ob rem animantium alia maiora sunt, alia minora, alia mediocria, causam antē reddidimus. Sunt autē alia unipara, alia paucipara, alia multipara. & magna ex parte unipara sunt quae solipeda, paucipara quae bisulca, multipara quae multifida. cuius rei causa est, quod magna ex parte magnitudines corporis ijs differētis distinguunt. tamen non ita in omnibus est, magnitudo enim & paruitudo corporis causam habent partus amplioris, & parioris, non solipedis aut multifidi, aut bisulci generis ratio. cuius rei testimoniu est, quod elephas animalium maximū, idemq; multifidus est, camelus bisulcus est, quod maximū inter reliqua est. nec solū in pedestriū genere, sed etiā in uolatilū, & nantiū magna parū foecūda sunt, parua uero perquam foecūda eadē de causa. plantae etiā non quae maximae sunt plurimū afferūt fructus. diximus quā ob rem alia parere multa, alia pauca sua natura assolent. Sed huius quāstionis illud maxime quis miret in ijs quae pariūt multa, quod plerūq; uno initu animalia id genus impleri cernit. Semen autē maris, siue ad materiā confert, se adhibēs partē conceptus, & miscens cum semine foeminae, siue nō eo modo, sed ut nos cēsemus, cogit, conditq; materiā contentam in utero, foeminaleq; foeminae excrementū, ut succus lactis humorē spissat, cur tandem nō unū efficit animal incrementi maioris: ut succus in lacte non certa quantitate ad cogendū describitur, sed quo plus lactis plus succi subierit, eo plus colostri concreuit. semen igitur trahi à locis uteri, atq; ob eam rem multa generari pro numero locorū & acetabulorū, quae unū non sunt, opinari nihil rationis est. saepe em̄ eodē in loco uteri gemini consistūt. in genere etiā multiparo, cum plenius foetū uterus fuerit, deinceps alius ab alio iacere cernitur. quod

quod ex diffecctionibus patet, sed ut perficiendi cuiusq; animalis certa est magnitudo, tum ad maius, tū uero ad minus, quē terminū nō supragrediūtur, ut uel maior, uel minor euadant, sed in medio magnitudinis spacio excessum defectum uel inter se capiūt, atq; ita homo alius alio auctior est, & ceterorū quoduis animalis: sic materia seminalis, ex qua consistunt, nō indefinita est, nec in plus, nec in minus, ut ex quālibet possint generari. Quæ igitur animalia ea, quam diximus, causa plus excrementi fecerūt, q̄ satis sit ad unius animalis originē, ijs fieri nō potest, ut ex eo toto unū gignat animal. sed tot numero gigni necesse est, quot magnitudinib; debitis præscripta sunt. nec uero maris semē, aut facultas cōtenta in maris semine plus
10 quicq; aut minus cōstituit, quā a natura sancitū est. eodēq; modo, si plus seminis mas emisserit, aut facultates plures in semine diuidendo cōtentas, nihilo maius efficiet, quāuis plurimū accesserit: imō contrariū aget. exciccado enim corrumpet, neq; enim ignis quo plus fuerit, eo magis calefaciet aquā: sed certus caloris terminus est, ultra quē si ignē augeas, nihilo reddes aquā calidiorē, sed facies ut magis euaporet, de mumq; deleat & excicetur. Cū igitur hæc moderationē certā inter se requirant, scilicet excrementū fœminæ & maris, qui semē emitāt, multipara animalia statim emittūt quod sibi cōueniat, uidelicet mas quod diuisum possit cōstituere plures: fœmina tantū ut plura cōstitui possint, lactis autē illud exemplū simile nō est, seminis enim calor non modo efficit quantum, sed etiā quale quid. at fœci & coaguli calor
20 quantū duntaxat cōstituit. Causa igitur ut plures cōceptus cōtrahātur, nec unum continuū ex cūctis cōsumetur in multiparis animalibus, hæc est, quod nō ex quan-
30 toliter cōceptus inchoetur, sed si aut parum, aut multū admodū sit, gigni non poterit. præscripta enim certaq; est uirtus, & patētis, & agentis, simili modo in uniparis magnisq; animalibus, nō multa ex multo excremento consiliūt, cum in ijs etiam ex certo quanto certū quantū, quod cōsistit, sit. plus igitur materiæ talis nō mittit ea, quam prædiximus, causa. quam autē mittit, talis per naturā est, ex qua unus tantū conceptus generet, quod si aliquādo plus accesserit, tunc gemini nascūtur, ex quo sit, ut hæc portēta potius iudicentur, quonā præter solitū, & quod magna ex parte agatur prouenit. Homo cū omnibus generibus ambigit, nam & uniparū, & pauciparū, & multiparū interdū est. sed maxime sua natura uniparū est. humore profecto caloreq; corporis multiparū est. seminis enim natura humida & calida est. sed suæ magnitudinis ratione pauciparū, atq; uniparū est. hinc tempus etiā uteri seren-
40 di enorme unū hoc animal sortitū est. cæteris enim unū est tēpus, homini uero plura sunt. quippe cum & septimo mēse, & decimo nascatur: atq; etiā inter septimū & decimū poliis, qui enim mēse octauo nascūtur, et si minus, tamen uiuere possunt, cuius rei causa accipi ex ijs, quæ modo explicauimus, potest. dixi de his in problematibus, atq; de his rebus ita disseruisse, statuisseq; satis sit. Partū aut superuacuarū præter naturā eadem causa est, quæ geminorū generationis. iam enim in cōceptu causa accidit, uidelicet si plus materiæ consistit, quā pro ipsius natura partis sit. sic
40 enim accidit, ut uel pars maior, quā iustū sit efficiatur. uerbi gratia, digitus, aut manus, aut pes, aut aliud ex cæteris postremis aut mēbris: uel fœlo cōceptu plures reddantur, quomodo in fluuijs uertigines geminātur. sit enim ibi, ut humor qui fertur, & profluēs mouetur, si in aliquid offenderit, secetur, & ex una in duas euadat cōstitutiones, quæ eundē habeāt motū, hoc eodē modo in cōceptibus euenit, adnascunt partes illæ uacantes maxime quidē propinquæ, sed aliquādo etiā remotæ propter conceptus motionē, quāq; præcipue, quod materiæ exuperantia ibi redditur, quō tandem decubuit. formā uero unde superfuit, inde recipit. Quibus autē gemina habere genitalia accidit, alterū maris, alterū fœminæ, ijs semper alterū ratū, alterū irritū redditur, cum per alimentū subinde delitescat, quonā præter naturā est,

φύμας.
abscissus.

agnatum est enim modo abscissus. nam & abscissus assumunt aliquid nutrimentū, quamuis post geniti sint, & præter naturā. Sed si quod creat, omnino aut superat, aut superatur, similia oriuntur duo, ac si partim superavit, partim superatum est, alterum foemina, alterum mas generatur. nihil enim interest de partibus, an de toto dicamus, uidelicet quam ob causam alterū mas, alterum foemina gignatur. ubi autem partes eiusmodi defunt, ut postrema aliqua, aut alia quævis membra, eandem causam esse putandum, quam, si omnino quod gignitur, abortū patiatur. abortus autē conceptum euenire complures certū est. differunt agnationes à partu multiplici quomodo exposui, monstra uero cum ijs dissident, eo quod pluribus coalescant. sed nonnulla hoc etiā modo ueniūt, si in parte maiore, & præcipua quadam peruersum est. ut si qua gemino liene, aut pluribus renibus oriuntur, tum etiā locis partium commutatis, monstrū dicimus. quod diuersione motuū, translationeque materię accidit. Vnum ne an plura sit per coagmētationem, quod monstrificum prodit animal, iudicandū est principij ratione. uerbi gratia, si cor pars eiusmodi est, quod unum cor habet, unum animal est: quod duo, id duo est animalia, quæ sibi coaluerūt propter conceptuū coniunctionē. partes uero superuacuas agnationes esse declaratum iam est. accidit etiā sæpe, ut pluribus ex ijs, quæ ante oblata non uidentur, animalibus iam perfectis meatus aut adducti concorporarentur, aut diuenterentur. iam foeminis nonnullis os uteri compressum, concorporatumque ab ineunte ætate ad tempus usque menstruorum perseverauit, mox urgentibus menstruis, doloreque infestitate, alijs sponte disruptum est, alijs dissectum à medicis. nonnulla interierunt, cum aut per uim disrumpetur, aut disrumpi nō possent. pueris etiam quibusdam genitales postremum, & meatus qua excrementum uesciæ transiit, non eodem tetenderunt, sed infra meatus ille transiegit. quam ob rem demissis clunibus mingunt, qui testibus paulō in partem superiorem retractis, uidentur à longe sumi, & maris habere genitale, & foeminae. meatus etiā alimēti siccū coaliuit aliquibus bestiis, scilicet ouibus, & quibusdam alijs. nam & uacram fuisse Pirinthe accepimus, cui cibi excrementum extenuatum per uescicam transmittebatur, dissectusque anus denuō propere coalescebat, nec refecando euincere uitium poterant. de partu multiplici & paucifero, ac de agnatione partium aut defectu, atque etiam de monstrifico partu dictum iam est.

Quam ob rem animalium alia superfoetant, alia non: & quæ superfoetant interdū foetus emittunt, interdū non: & alia libidinosi in eo genere sunt, alia non. Caput V



Animalium uero alia nunquam superfoetāt, alia superfoetant. quorum quædam enutrire suos conceptus semper possunt, quædā interdum possunt, interdū nequeunt. Causa ne superfoetent est, quod singula pariūt. solipedes enim, & quæ ijs auctiores sunt animātes, nunquam superfoetāt. facit enim earū magnitudo, ut excrementū omne in conceptum absumatur. quippe cum in ijs omnibus, corporis sit magnitudo. quæ autē magno corpore sunt, eorū foetus quoque magni pro sui generis magnitudine insistantur. ex quo fit, ut elephantorū foetus magnitudine uituli gestetur, multipara ideo superfoetant, quoniam plures conceptus superfoetatus quidam, alter alteri sunt. Quæ autē ex his magnitudine prædita sunt, ut homo, si alter coitus proxime ab altero accessit, enutrire quod superfoetatum est possunt. Iam enim id euenisse uisum est. cuius rei causa id quod diximus est. eodem enim coitu plus seminis mittitur, quod partium multiplicare cōceptum potest, si alterum post alterum accedit. sed si iam aucto conceptu coitus adhibetur, superfoetari quidem potest, sed raro: quoniam uterus magna ex parte ad partum usque se compriuat. Si tamen alia quando accidit ut superfoetetur (iam enim id euenisse constat) pernici non potest.

sed

sed conceptus abiguntur similes ijs, quos abortus uocamus. ut enim in uniparo genere omne excrementū absumitur in id quod præcesserit, ob corporis magnitudinem, sic in ijs fieri solet. sed in illis statim, in his cum iam foetus accreuerit. tunc enim similem uniparis conditionē recipiūt, pari ratione sola animalū mulier, & equa grauida coitū patiuntur. homo enim sua natura præfecundū animal est. aliquid etiā in utero, tum spaciū, tum excrementū superest, quanquā non tantū, ut uel alterū possit alere. mulier itaq; ob eam causam coitū recipit. equa autē soliditate suæ naturæ, & quod aliquid spaciū in utero superest, ut dictū est, amplius quidē, quā ut ab uno ocuperetur, sed archius quā ut alterum perfectē possit superferari. libidinosa natura est equa ob eundē affectū, quo solida omnia Veneris sunt appetētiōra, illa enim ita se habēt, quia carent purgatione, quæ perinde est sœminis, ut coitus maribus. equa enim mēstrua minime emittit. omniū autē uiuiparorū sœminæ solidæ sunt libidinosiores, quoniā simili modo se habēt, atq; mares, qui semē genitale collectū nō excernunt. sœminis enim purgatio menstruorū seminis exitus est, cum mēstrua non nisi semē sint inconcoctū, ut antē diximus. quā ob rem mulieres quæ incōtinentes ad rem uenerē sunt, libidine cessant, cum sæpius generarint. iam enim seminale excrementū, quod libidinē accēdebat, emissum facit, ne præterea cōcumbēdi auiditas stimulet. In genere autū sœminæ minus quā mares Venerē appetūt, quoniā uterum cōtinent iuxta septū. mares cōtrā salaciores sunt, quoniā testes intus habēt re tractos. Itaq; sit, ut quæ ex ijs sua natura abundāt semine, coitū semper desiderēt. sœminæ igitur huius generis propēsiōres ad coitū sunt uteri descensu: mares testium re tractu. Diximus quā ob causam alia nullo pacto superferāt, alia superferāt quādem, sed cōceptus interdū enutriūt, interdū non, & quā ob rem alia libidinosa, alia non libidinosa in eo genere sunt. Sunt autē nonnulla superferatā, quæ longo etiā interposito tēpore cōcundi possint enutrire conceptū, quē superferarint: uidelicet ea, quorum genus semine genitali abundat, & corporis magnitudine caret, & multa generat. Cum enim multiparū sit, uterū habet ampliōrē. cum semine abundet, multum purgationis excrementū emittit, cum corporis magnitudine careat, maioreq; portione purgatio superet quā cōceptus desideret nutrimentū, possunt uel possunt constitui animalia, eadēq; enutriti, ac perfici. utri etiā eorū non se cōprimunt, quoniā excrementum purgationis superest. quod mulieribus quoq; euenit. sit enim nōnullis grauidis purgatio, & interdū quæ ad finē usq; perseueret. sed ijs præter naturam hoc euenit. quā ob rem foetus afficitur detrimento. at eiusmodi animalibus per naturā sic agitur. Ita enim corpus eorū principio constitutū est, quāle corpus leporum est. hoc enim animal superferat. quippe quod nec magnū sit, & plura generet. multissidū enim est. tale autem quoduis plura generat. semine etiā abundat, quod eius hirsutie significatur. copia enim pilī exuperat. nam hoc unū pilos & sub pedibus habet, & intra genas. pilī autē abundantia & hirsuties, copiam indicat excrementi. Quā ob rem homines pilosi libidinosiores, & seminis copiosiores sunt quā laeues. 40 lepus igitur sæpenumero foetus alios imperfectos gestat, alios perfectos iam ædit.

Quare uiuiparorum alia perfectum, alia imperfectum animal pariunt.

Capitulum VII



uiuiparorum alia imperfectum animal pariunt, alia perfectum. solipedes & bisulcæ perfectum: multissidæ complures imperfectum. cuius rei causa est, quod solipedes singulos pariunt: bisulcæ aut singulos, aut binos magna ex parte. enutrire autem quæ pauca gignuntur, facile possunt. multissidæ, quæ pariunt imperfecta, omnes multiparæ sunt. quo sit, ut partum adhuc recentem alere possint, auctum iam, ad præsumē magnitudinem nequeant: sed cum corpus ad nutriendum non sufficiat.

partum emittant, ut ea quæ uermem pariunt, quædam enim ex ijs catulos inarticu-
 latos propemodum pariunt, ut uulpes, ursa, leæna, & alia non pulla, sed omnia ferè
 cæcos, ut ea quæ modo dixi, atque etiam canis, lupa, lupus ceruarius. sola inter mul-
 tipara sus parit perfectos, eaq; una euariat. generat enim multos more multifidi ge-
 neris, cum & bifulcum, & solipes sit. Sunt enim loci quibusdam suis solida ungu-
 la, partu igitur numerosa est, quoniam alimētum quod in corporis magnitudinem
 absumeretur, in excrementum seminale decedit. Id enim ut solipes magnitudine
 caret. quin & potius quasi ambigēs cum natura solipedum bifulcum est, hac igitur
 causa & unum parit, & duos, & quod plurimum, multos. enutrit uero usque in fi-
 nem, quæ peperit, propter sui corporis alimoniam probam. habet enim ut solum
 pingue suis stirpibus: sic scrofa filijs alimētum copiosum & cōmodum. Aues etiam
 nonnullæ imperfectos & cæcos pariunt pullos, uidelicet quæ cum paræ corpore
 sint, multos progeniunt, ut cornix, pica, passer, hirundo, & paucipari generis, quæ
 copiam alimenti parere unā cum prole non solent, ut palumbes, turtur, columba.
 quam ob rem si quis hirundinum nouellarum adhuc oculos præpungat, rursus
 incolumes redduntur. Cum enim fiunt, non facti iam corrumpuntur. itaq; denuò
 oriuntur, ac pullulant. Omnino hæc præueniunt generationē perfectā ob alen-
 di inopiam. generant uero imperfectos, quoniam perfectionem præueniūt. quod
 in pueris etiam patet, qui mense septimo nascuntur. Sæpe enim nonnulli eorū præ
 sua imperfectione, ne meatus quidē integros adhuc habēt, ut aurium, aut narium;
 sed post accrescentes recipiunt, multiq; ex ijs uitæ compotes euadunt. Mares po-
 tius quàm fœminæ oblæsi in genere hominum nascuntur, cum in cæteris animalibus
 nihil potius mares, quàm fœminæ ita proueniant, cuius rei causa est, quod in
 hominibus longe mas à fœmina differt calore naturæ. quo fit, ut mobiliiores sint ma-
 res in utero quàm fœminæ. motu autem ipso franguntur, cum recens quoduis fac-
 le præ sua imbecillitate frangi possit. hæc eadem causa est, ne fœminæ similiter atq;
 mares perficiantur in genere hominū. quippe cum & intra parentem fœmina tem-
 pore longiore conficiatur, quàm mas: & ubi in lucem uenerint, celerius fœminæ
 quàm mares perficiantur. nam & pubes, & uigor, & senectus fœminis prius uenit
 quàm maribus. sunt enim fœminæ sua natura debiliores, frigidioresq;. & sexū fœ-
 mineum quasi læsionem naturalem, & detrimentū esse putandum est. Intus igitur
 tarde præ sua frigiditate discernuntur. hæc etenim discretio concoctio est. calor au-
 tem concoquit, & quod calidius, id concoctū facilius est. sed foris propter suam de-
 bilitatem citò ad ætatis florem, senectutemq; perueniunt. etenim omnia minora,
 ut in artis operibus, sic in naturæ citius ad finem deueniunt. eadem causa est, ut qui
 gemini mas & fœmina in genere hominum proueniunt, minus seruētur, cum in cæ-
 teris animalibus nihil referet. hominibus enim hic concursus præter naturam est,
 cum non pari tempore mas & fœmina discernātur. sed aut marem contrahi, aut fœ-
 minam præuenire necesse sit, at in cæteris id non præter naturam est. In ferendo
 etiam utero homines cum cæteris animalibus dissident. cum enim cætera plurimum
 temporis ualeant corpore, cum uterum ferunt, mulieres magna ex parte agere de-
 gunt. cuius rei causa aliqua uel ad uitam referri potest. Cum enim mulieres uitam
 ociosam & sellulariam quandam degant, plus contrahunt sibi excrementū. nam quibus
 genibus solitum est, ut mulieres labores suscipiant, ijs nec uterus tam difficul-
 ter gestatur, & partus facilis est. deniq; quibus suis locis mulieres, quæ laborare con-
 sueuerunt, facilius pariunt. labor enim excrementa consumit, quæ in mulieribus
 ociosis augentur. Cumq; parturigo laboriosa sit, labor & exercitatio actæ uitæ facit,
 ut spiritum possint retinere: in qua re partus facilitas conciliatur. Afferunt igitur ea
 quoque, ut modo dixi, aliquid causæ ad eius affectionis differentiam, qua mulieres
 cæteris

Ut partus facilis
 fiat.

cæteris animalibus in ferendo utero discrepant, sed maxime causa est, quod cum cæteris aut exigua purgatio, aut nulla manifesta fiat, mulieri plurima euenit, quæ cum per uteri gestationem deficiat, infestat atq; perturbat, quippe cum etiam non grauidis, nisi purgationes fiant, ægritudines accidunt. principio potius cum concipiunt perturbari solent magna ex parte, conceptus enim purgationem impedit, & præ sua exiguitate absumere copiam excrementi inter initia non potest: quanquam post, ubi iam plenius assumere cœperit, leuat. at in cæteris animalibus, quoniam parum excrementi est, modice ad foetus incrementum accommodatur. Cumq; excrementa, quæ nutritionem impediunt, absumantur, ualent felicius.

10 Nec secus aquatile genus, aut uolatile afficitur. Iam uero accrescente foetu, quibus non æque proba alio contingit, causa est, quod foetus incrementum plus excrementi alimenti desideret. paucis quibusdam mulieribus euenit, ut prægnautes melius ualeant corpore, uidelicet ijs quarum in corpore exigua continentur excrementa, quæ absumi possint cum alimento quod foetui administratur.

Quam ob causam mola in utero mulierum generetur, & quare potius in muliere, quam in cæteris animalibus. Caput VII



Eo quod mola uocatur uidendum est, accidit hoc uitium mulieribus nonnullis grauidis, quanquam raro, pariunt enim quod molam uocant. Iam accidit enim mulieri cuidam, ut cum concubisset & se concepisset putasset, primum uentris moles augetur, & reliqua ex ratione uenirent. Sed cum tempus pariendi iam esset, nec pareret, neque moles minueretur, sed annos tres aut quatuor ita perseueraret, quoad dysenteria, id est, difficultati intestinorum implicata, eoque modo periclitata, demum pepererit carnem, quam molam uocant. Quin & tota uita edurat hoc uitium, ut & consenescat & commoriatur. Quæ autem prodierit, adeo obdurefcit, ut uix ferro transigi possit. causam huius affectus dixi in problematibus. Afficitur enim conceptus eodem modo, quo ea quæ inquinari dicimus, cum elixantur, nec per calorem ut quidam uolunt, sed potius propter caloris debilitatem, natura enim de uita

30 certare uidetur, nec posse perficere, finemq; apponere generationi, quam ob rem aut tota uita, aut longo tempore durat, quod inchoatū est. nec enim ut perfectam, nec ut alienam omnino habet naturam, causa nanque duritiæ cruditas est, quippe cum inquinatio quoque cruditas quædam sit. Sed quaeritur cur cæteris animalibus idem non accidat, nisi quid admodum lateat, causam uero esse putandum, quod mulier una omnium animalium affectionibus uteri obnoxia est, & mensuris abundat, nec potest ea concoquere. Cum igitur ex humore concoctu dissimili conceptus consistit, tunc gignitur quod mola uocatur, idq; in mulieribus merito, aut solis, aut maxime.

Quæ animalia lac habeant, & quem ob causam à natura datum sit.

Caput VIII



Ac autem sit ijs foeminis, quæ animal intra se generant, quod utile partus tempore est, natura enim id alimēti gratia externi animalibus parauit, ut nec deesset tempore debito, neque ultra id tempus superesset, quod ita planè euenire uidemus, nisi quid præter naturam acciderit. Sed cæteris animalibus, quoniam tempus simplex ferēdi uteri, partusq; datum est, lactis concoctio ad hoc tempus solet accedere. hominibus uero quoniam plura sunt tempora, primo adesse necesse est, quam ob rem lac mulierum, cum ante septimum mensem inutile sit, utile iam septimo redditur mense. Causa etiam necessitatis propria, concoctio lactis temporibus ultimis habetur. prin-

Bb

cipio enim decessio huiusmodi excrementi absumitur in foetus generationem.
 Omnibus autem alimento est, quod dulcissimum & coctissimum sit. Itaque sublata
 hac facultate, reliquum falsum, maleque sapidum esse necesse est. Sed cum foetus ma-
 gis, magisque perficiatur, plus excrementi superest. minus enim absumitur, idque dul-
 cis est, cum non aequè detrahatur, quod bene concoctum sit. non enim in super
 ad foetus informationem consumitur, sed ad incrementum mediocre, quasi iam
 foetus conflet ad prius finem suum. est enim & conceptus perfectio. quam ob rem
 exit, permutatque generationē, ut qui iam sua receperit, nec præterea accipit quod
 suum non est. quo tempore lac utile datur. Colligitur hoc parte superiore corpo-
 ris, & mammis, propter ordinem primæ, originalisque constitutionis. præcipua enim
 pars animalis quæ supra septum est. inferior uero ad cibum, & excrementum ac-
 commodata est, ut gressile animalium genus habens intra se alimentum suppetias lo-
 ca permutet. hinc feminale quoque excrementum secernitur ob eam, quam inter
 initia disputationis nostræ reddidimus causam. est enim naturæ sanguineæ, tum
 excrementum maris, tum menstrua femineæ. sanguinis autem & uenarum prin-
 cipium cor est, quod in ea ipsa parte superiore positum est. quapropter hic primum
 excrementi talis mutationem innotescere necesse est. ex quo fit, ut & uoces, tum
 marium, tum foeminarum immutentur, cum semen ferre incipiunt (hinc enim uox
 suam originem trahit, alteratur uero cum id, quod moueat, alteretur) & mammae
 subleuentur etiam maribus planè, sed foeminis amplius. quod enim parte inferiore
 multum excernitur, ideo locus mammarum inanis, fungosusque foeminis sit. eodemque
 modo ipsæ eueniunt animalibus, quibus mammae infra habentur. Igitur & uox, & mam-
 mæ in cæteris quoque animalibus documentum evidens præbent homini usum
 habenti generis cuiusque. sed plurimum in genere hominum interest. Cuius rei cau-
 sa est, quod excrementum plurimum, & mulieribus præ cæteris foeminis, & uiris
 præ cæteris maribus est pro magnitudine, alteris menstruorum, alteris geniturae.
 Itaque cum hoc foeminae excrementum non à foetu hauritur, & tamen ne foras
 profusur prohibetur, colligitur in loca inania, quæcumque eisdem meatibus adhærēt,
 necesse est. Talis autem locus mammarum in omnibus est utraque de causa, scilicet noræ
 melioris gratia ita conditus, atque etiā necessarîo hinc iam consilium, & alimentum conco-
 ctum animalibus redditur. Concoctionis autem causam non solum quam modo dixi-
 mus accipere licet, sed contrariā etiā. nam & ut foetus maiusculus iam factus plus
 assumat cibi, minusque ob eam rem per id tempus supersit, ratio probabilis est. quod
 autem minus est, cōcoqui celerius potest. Sed lactis naturam eandem esse. quam excre-
 menti, ex quo unumquodque generetur, apertum est. nam quod antè diximus, eadem
 materia est quæ alit, & ex qua generationē natura constituit, eaque sanguineus hu-
 mor in sanguinē habentibus est. lac enim sanguis cōcoctus est, non corruptus. Empe-
 docles uero aut non recte putauit, aut non bene usus uerbo translatio est, cum di-
 xerit: Octauo decimo mensis pus exiit albi. putredo enim cōcoctioni contrarium
 est. Pus autem putredo quædam est, lac uero res est concocta prorsus, nec lactibus
 sunt purgationes secundum naturam, neque lactantes concipiunt. & si conceperit, lac
 extinguitur. quoniam eadem lactis, & menstruorum natura est. natura autem non
 tam large profunderè potest, ut anceps sit. sed si alterutram in partē secernitur, in
 alteram desit necesse est, nisi quid acciderit uiolentum, & præter id, quod solum
 magna ex parte est. Temporibus etiam bene præscripta est generatio animalium.
 cum enim præ magnitudine non satis præterea foetui est alimentum, quod per um-
 bilicum ministratur, lac ad alendum utile succedit. Cumque per umbilicum alimen-
 tum non subeat, comprimunt sese uenæ illæ circum quas tunica est, quæ umbilicus
 uocatur, atque ob eam rem tunc exitus opportune foetus consequitur.

Quam

Quam ob causam partus nonnullis animalibus in caput uersus fiat.

Caput IX



Artus autem pronis in caput conuersis fit per naturam animalibus omnibus, propterea quod partem ab umbilico maiorem habeant, quam inferiorem, maiora autem plus ponderis continent. itaque ueluti in statera dependentes eo uergunt, quo trahuntur.

De tempore ferendi uteri, & quare non omne animal possit esse diuturnius.

Caput X



Teri autem ferendi tempora certa, cuius animalium sunt magna quidem ex parte pro uicis spatio. uiuaciorum enim generationes quoque diuturniores esse necesse est, non tamen id causae est, sed magna ex parte sic euenit, maiora enim perfectioraque sanguinei generis animalia plus temporis uiuunt, sed non omnia maiora sunt uiuaciora. homo enim plus temporis, quam quoduis animal uiuit, excepto elephante, quod quidem usu adhuc fide digno nouerimus, quanquam homo minoris est incrementi, quam ueterina, & alia multa. Causa ne quoduis animal possit diu uiuere, est, quod pro aere ambiente temperatur, atque etiam ob alios naturales casus, de quibus mox dicam. Tempora ferendi uteri pro magnitudine animalium, quae generantur, descripta sunt, haud enim tempore breui constitutiones perfici magnas, uel animalium, uel quorumuis aliorum ferre facile est. Quam ob rem equi, & quae ijs cognata sunt animalia, quanquam minus temporis uiuunt, tamen diutius uterum ferunt: alia enim annum, alia quod plurimum menses denos grauida exigunt, hac eadem de causa elephantorum etiam uterus diutinus est: biennio namque gestatur, propter exuperantiam magnitudinis. Ratione autem optima tempora omnium & grauiditarum, & generationum, & utarum dimensionem circuitibus sibi exposcunt recipere. circuitum appello diem, noctem, mensem, annum, & tempora, quae ijs describuntur, atque etiam lunae traiectiones. sunt enim lunae circuitus complementa, & silentia, & interpositorum temporum sectiones. ita enim coit cum sole, mensis namque communis amborum circuitus est, luna autem principium est propter solis societatem, receptumque lucis: fit enim quasi alter sol minor, quam ob rem conducit ad omnes generationes, perfectionesque. calores enim & refrigerationes cum moderatione quadam generationes, sine moderatione corruptiones efficiunt. terminum autem tum principij, tum finis qualitatum earum motus horum syderum obinet, ut enim & mare, & omnem humorum naturam subsistere, mutari uel pro flatuum motu, & quiete uidemus, aerem uero & flatum pro solis, lunaeque circuitu affici: sic ea, quae ex ijs aut in ijs oriuntur, sequi necesse est. Nam ut rerum minus principalium circuitus sequatur, magis principalium rerum circuitum ratio est. Vitam enim quandam & ortum, & interitum, uel flatuum esse fateor. Conuersionis uero eorum syderum alia fortasse principia sunt, natura igitur ita sibi uult, ut eorum numeris generationes & obitus numeret, sed exquisitae id facere nequit, propter materiae indefinitionem, & quod multa principia incidunt quae generationes destinatas secundum naturam, & corruptiones saepe impediant, atque ita causa sint earum, quae ueniant praeter naturam. Sed de alimento intrinsecus ministrando animalium, atque de generatione in lucem agenda, & seorsum de singulis, & summam de omnibus dictum iam est.

Hic enim ad solem commutatur

DE GENERAT. ANIMALIUM LIBRI

QVARTI FINIS.

Bb

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBER QVIN- TVS, INTERP. THEODORO.

*De discrimine oculorum in animantibus, & eorundem differentia, & quid sit
somnia, quid item uigilia.*

Caput I.



De affectionibus, quibus animalium partes differant inter se, dis-
tendum nunc est. affectiones partium dico cæcitatem oculo-
rum, aut nigredinē, uocis acumen, aut grauitatē, & coloris, aut
corporis, & pilorū, aut pennarū discrimen, quorū alia totis ge-
neribus insunt, alia utcūq; fors tulit habentur. quod maxime
in hominibus accidit, mutationes etiā per ætatem aliarū omni-
bus æque animalibus ueniūt, aliarū contra: ut in uocis, colorisq;
pilorū ratione uidere licet. Cum enim cætera nō canescant, manifeste in senectute,
homo maxime omnium ita afficitur. & alia statim ab ortu naturæ consequuntur, alia
progrediente ætate, & senescentibus accidunt. de his igitur, cæterisq; huiusmodi
omnibus non eundē præterea modum causæ esse putandum. quæ enim non sint
opera uel naturæ communia, uel generum singulorū propria, horum nullum ali-
cuius gratia, aut est, aut sit. Oculus enim alicuius gratia est. sed cæcus non alicuius
gratia est, nisi hæc affectio sit propria generis. nec uero ad rationem substantiæ perti-
net in nōnullis, sed ut quæ necessariō fiant, ad materiam, & principium, quod mo-
uerit, causæ eorum referendæ sunt. etenim, ut initio disputationis nostræ dictū est,
nō quia tale quid gignitur, quodq; ideo tale quid est, scilicet in ijs, quæ statuta, defi-
nita & certa naturæ sunt opera: sed potius quia tale est, idcirco tale & gignitur. sub
stantiā enim generatio sequitur, & substantiæ gratia est, non ipsa generationem. Ve-
teres tamen naturæ inter pretes contrā esse putarunt. cuius erroris causa fuit, quod
causas plures esse non uiderent, sed materiæ tantū, & motus causam, eamq; indefi-
nite cognoscerent. Rationis uero, & finis causam non considerarent. sed enim ali-
cuius gratia unumquodq; est. gignitur autē iam ob eam causam, & reliquas, quæ
in ratione cuiusq; continētur, quæ uel alicuius gratia est, uel cuius gratia aliud est.
Quæ uero nō eiusmodi sunt, uidelicet quorū generatio est, eorum iam causa quæ
renda in motu, generationeq; est, utpote cum discrimen constitutione recipiant.
oculus enim necessariō habebit, tale enim animal subiectū est. Sed talem oculum
necessariō quidē, sed non tali necessitate. Verum alio modo, scilicet quoniā talem,
aut talē rem suapte natura agere, pati ue potest. his ita definitis, de rebus quæ deinceps
eueniant, differamus. Principio pueri cum nati fuerint, dormire omnium ma-
xime imperfectorum animalium solent, quoniā intra parentē cum primum sentire
coeperint, tempus dormiēdo totum fere consumunt. Sed quaeritur de prima gene-
ratione, utrum uigilia præcedat, an somnus. quod enim proficiscente ætate magis
expergisci uisuntur, contrarium, id est, somnum principio generationis inesse pro-
babile est. Tum etiā transitio de nō esse in esse per medium fieri solet. somnus autē
talis sua natura esse uidetur, ut uiuendi, & nō uiuendi interitimum sit, & neque
omnino sit, qui dormit, neq; non sit. Viuit enim potissimum uigilia propter sen-
sum, sed si animal habere sensum necesse est, & tunc primū est animal cum primū
contingit sensus, primam illam dispositionē non somnum, sed similem somno esse
putandum, qualis plantarum est. etenim ita accidit, ut per id tempus uita plantæ
animalia uiuāt. At plantis somnum inesse impossibile est. nullus enim somnus in-
expergiscibilis est. Affectio autē illa plantarū, quæ somni est proportionalis, inex-
pergiscibilis est. necesse etiā est animalia dormire partem maximā temporis, quo-
niam incrementum & pondus locis superioribus impositū est. Causam autē dor-
miendi

miēdi talē esse alibi exposuimus. Verū tamen expēgilci in utero etiā uident, quod
 tum in dissectionibus, tū in prole ouipari generis patet: mox obdormiscunt statim,
 rursusq; delabūtur. quam ob rem egressa quoq; in lucē, bonā temporis partē dor-
 miendo traducūt. Cum pueri uigilant, nō ridēt. cum dormiunt, ridēt. interdum
 etiā lachrymant. Accidit enim dormiētibus etiā animalibus sensus, nō modo, quā
 somnia uocātur, sed etiā prāter somnia, ut ijs, qui dormiētes resurgunt, & quidem
 plerūq; agunt sine somnio. sunt enim qui dormiētes resurgāt & ambulent, uiden-
 tes eo modo, quo qui uigilāt. ijs enim sensus accidentiū contingit, quanquam non
 uigilantibus: tamen nō ut omnium. Infantes uero propter consuetudinem quasi
 10 nescij uigilādi, sentire, uiuereq; in dormiēdo uidētur. Tempore autē procedente,
 incrementūq; transiente in partem inferiorē expēgilcuntur, iam magis & partem
 maiore temporis ita degūt, sed initio plus, quā cātera animalia somno dediti ui-
 uunt. Imperfectissimi enim omniū perfectiorū partium nascūtur, & incremento
 partis superioris exuperant. oculi omnium puerorū statim ā partu cāsiuſculi sunt,
 post uero immutātur in eam naturā, quā futura est. quod in cāteris animalibus nō
 euenit manifeste. cuius rei causa est, quod cāteris animalibus oculi in suo cuiusq;
 genere unicolores potius sunt, ut boum nigri, ouium omniū aquini, aliorū rufi
 toto genere, aut cāsi, nōnullorū caprini, ut caprarij generis. At hominū oculos uā-
 rios, uersicoloresq; esse euenit. nā alij cāsi, alij flauidi, alij nigri, alij caprini, quam
 20 ob rem cāterorū, ut nulli suo in genere dissident inter se, sic nulli ā se ipsi differunt.
 quippe qui nō plus, quā unū colorē habeant sua natura. Equus maxime omniū
 cāterorum animalū uersicolor est. aliqui enim cāsi altero oculo nascuntur, quod
 nulli ex cāteris bestiis euenit manifeste. quanq; homines nonnulli altero oculo di-
 uerso gignantur. ergo ut cātera animalia nūli mutationis, uel recens nata, uel aeta-
 te prouectiora recipiant, pueris autē id eueniat, satis causae hoc esse existimandum,
 quod cāterorū ea pars unicolor, hominis uersicolor est. sed ut cāsiū potius, quā
 alium habeāt colorē, causa est, quod partes nuper natorū imbecilliores sunt. cāsie-
 tas autē imbecillitas est. Sed in uniuersum de oculorū discrimine quærendū, accipi-
 endumq; est, quam ob causam alij cāsi, alij flauidi, alij caprini, alij nigri, sed cāsi
 30 opinari plus ignis habere, ut Empedocles ait, nigros autē plus aquae, quā ignis,
 atq; ob eam rem cāsi interdiu acute cernere nō posse, scilicet ob aquae inopiam:
 nigros noctu deficere ob ignis inopiam non bene est. siquidem uisus non igni, sed
 aquae tribuendus in omnibus est. causam etiā colorū, uel alio modo reddere possu-
 mus. sed si ita est, ut antē dixi, cum de sensibus agerem. atq; etiam prius cum de ani-
 ma, ut aquae propria pars hāc sensoria sit, non aeris, aut ignis, cur ita hanc esse cau-
 sam eorū putandū est, quod alij plus humidi habēt, alij minus, quā motus com-
 petens requirat, alij modicū: itaq; qui multū humoris continēt, nigri sunt, quoniā
 humoris copia transpici satis non potest. cāsi qui parū habent humoris, ut in mari
 etiā cernitur, etenim quantū eius satis transpicitur, cāsiū apparet: quantum mi-
 40 nus, aequinum: quantum prae gurgite alto nō praeſinitur, id opacat, & nigrum, aut
 coeruleum sentitur. qui autē inter eos sunt, eo iam differūt, quod magis minus ue-
 ita cōstitierint. eandem causam esse putandū, & ut cāsi acute interdiu cernere ne-
 queant, nigri noctu. cāsi enim prae sui humoris exiguitate mouentur magis ā lu-
 ce, & rebus uisibilibus, scilicet qua humidi, quāq; perlucidi sunt, quanq; motio eius
 partis uisio est, qua perlucida, nō qua humida est. Nigri uero ob humoris copiam
 minus mouētur. lux enim nocturna exilis est, & simul quiuis humor per noctem
 moueri difficilior potest. conuenit autē eum qua perlucidū, necnon moueri, neq;
 magis moueri, quā congruum sit. leuior enim motus expellitur ā uehemētiore,
 quam ob rem, qui aut suū conspectū ā calore ualidiore transfulerint, aut de sole

colorū uarietās

in opacum se contulerint, nō cernunt, motio enim quæ iam uehemens inest, impedit eam quæ extrinsecus accidit, deniq; uisus siue ualidus, siue inualidus, nequit res splendidas cernere, quoniā eius humor ultra modum afficitur, & mouetur. Aegritudines etiam oculorum, utrorumq; indictum faciunt. Glaucoma enim cæsijs potius accidit, lusciofitas nigris, est autē glaucoma siccitas potius oculorum, itaque senescentibus magis euenit, nam oculi quoq; ut reliquum corpus senectute siccescunt, lusciofitas uero humoris copia est, quapropter minoribus natu potius accidit, cerebrum enim eorū humidius est. Visus autē optimus est, qui inter multum & parum humoris moderatus constat, hic enim nec per exiguitatem turbatur, ut colorum motiones impediatur, neq; per nimietatem præbet mouendi difficultatem, sed non modo ea quæ diximus, causam habēt, ut obtuse, acute uel cernatur, uerum natura etiam cutis, quæ pupillæ uocatur obtenditur, translucidā enim esse eam requirit. Talem autē esse quæ tenuis, alba, & leuis sit, necesse est. Tenuis igitur est, ut motus, qui extraneus ueniat, recto tramite feratur, leuis, ne rugis obumbret, senes enim ob eam rem acute non cernunt, nam, ut cæterarum partium cutis, sic oculorum quoq; senescentibus obrugatur, & crassior redditur, alba autē esse debet, quoniā nigrum translucidū esse non potest, hoc enim ipsum est nigrum, quod non translucet, unde fit, ne lateræ possint lucere, si ex tali cute confectæ sunt. Per senectutem igitur & morbos acute cernere ob eas causas nequeunt. Pueri uero paucitate humoris cæsijs principio sunt, sed altero oculo cæsijs præcipue homines, atq; equi gignuntur eadem de causa, quæ & homo solus canescit, & equus inter cætera animalia unus euidentius albescit pilo per senectutem, canities enim debilitas quædam humoris sui in cerebro, & cruditas est, quod idem cæfetas quoq; est. Vis enim eadem est humoris admodum tenuis, quæ pauci, & admodum crassi, quæ multi. Cum igitur natura æque conficere nequit, aut utroq; concocto humore, aut non utroq; concocto, sed altero concocto, altero non, tunc euenit, ut cæsijs altero oculo reddantur, quam ob rem autē alia acute cernāt, alia non, duplex ratio est: acumen enim cernendi bifariam ferē dicitur. Audiendi etiam, olfaciendiq; ratio similis est, dicitur enim acute cernere, aut quod procul cernere potest, aut quod differentias rerum quæ cernuntur, quam maxime sentiat, quæ quidem simul nullis eisdem contingunt. Idem enim manu admota, aut per fistulam, quanq; nihilo magis colorum differentias indicet, tamen longius cernet, & quidem ex foueis, puteisq; interdum stellas cōspiciunt, itaq; si quod animal multum quidem prominentiæ adiunctum oculis habet, sed humorem pupillæ non purum, neq; modicum conueniēter extraneo motui, neq; summam cutem prætenuem obtrinet, id ut exquisitè colorum differentias nō percipiet, sic procul cernere poterit, quomodo etiā cominus magis, quam quæ humorem quidem illum sincerum, operimentumq; eius prætenuē habeant, sed supercilio, quod promineat oculis, careant omnino, causa enim cernendi tam acute, ut differentia percipiatur, in ipso oculo est, nam ut in ueste mundissima uel minima macula perspicua est, sic in puro, sinceroq; oculo, uel parua morio patet, sensumq; afficit. At, ut procul cernatur, motusq; à longinquis uisionibus deueniat, causæ istæ est oculorum, quæ enim oculis prominentibus sunt, procul cernere nequeunt. Quæ contra intus in cauo oculos habent positis, longe aspicere possunt, quoniā motus in uastum nō dissipatur, sed recto tramite meat, nihil enim interest an uisus exitu cerni dicatur, ut quidam aiunt, nam nisi ante oculos quicq; sit, dissipari uisum, atq; ita minorem rebus occurrere, quæ cernuntur, necesse est, minusq; procul uidere, quam si motu à rebus, quæ uidentur, proficiscente cernatur, similem enim motui effudit uisionem necesse est. Ita igitur potissimum res cernerentur longinquæ, si illico ab oculo ueluti fistula quædam porrecta ad rem usque cernendā

nendam cōtinuaretur. sic enim nulla ex parte dissolueretur motus, qui à re uisibilī proficisceretur. Sed cum ita nō sit, quo amplius porrigitur, eo lōgius cernatur necesse est. Causæ discriminis oculorum hæc sunt.

De auditorijs sensibus, & olfactu, eorumq; ratione.

Caput II



A dem uero audiendi, olfaciendiq; ratio est. aut enim ita exquisitè audiunt, & olfaciunt, ut quammaximè differētias omnes subiectarum sensibilibus rerum sentiant; aut ita, ut procul audiant, aut odorentur. ut igitur bene differentie iudicentur, causæ sensorium est, quomodo

10 Meatus enim sensoriorum omnium, ut dixi, cum de sensibus agerem, tendunt ad cor, aut ad cordis proportionale, si corde carent. Itaq; meatus audiendi, quoniā sensorium hoc aëris est, quā spiritus natiuus in alijs pulsus, in alijs spirationem facit, hac desinit. quapropter uerba ediscunt, ut quod audieris reddere ore possis. qualis enim motus subiecit per sensorium, talis quasi ab una, eademq; effugit motus per uocem agitur, ut quod audieris, idem dicas. Oscitantes etiam, aut spiritū reddētes, accipientes uē, minus audiunt, quoniā extremum sensorij auditus ad partē spiritalem terminetur, & quatatur, moueaturq; unā cum instrumento spiritali, quoties illud spiritū mouet. mo uetur enim cum mouet. necnon temporibus anni, tempus
20 ramētisq; humidis idem accidit, ut aures impleri spiritus uideātur, quoniā uicinæ sint origini loci spiritalis. Iudiciū igitur exquilitum differentiarū tum soni, tum odoris, in sinceritate sensorij, summæq; membranæ positū est. ita enim omnes motus manifesti, ut in uisu, in his etiā ueniunt, quoniā & procul sentire, aut nō sentire, similiter atq; in ratione uidēdi accidit. Quæ enim ante suas sensorias partes productiores, ueluti aqueductus possident, hæc procul sentire possunt. quam ob rem quorum nares porrectæ sunt longius, ut catellorum laconicorū, hæc ualeat olfactu. Ita enim motus nō interpellatur, sed à longe directi sensorij subeunt integri. quomodo in ijs, qui manu admota fronti lōgius cernunt. Auriculæ etiā longæ, imbricatæq; amplius, quasi grundis, intusq; anfractu lōgiore intortæ (quales nōnullarū
30 quadrupedum sunt) melius administrant, quippe quæ motum eminus excipientes ad sensoriū reddant. homo pro magnitudine minime serē omniū animalū procul sentire potest, cum tamen differentiarū sensu maxime omniū ualeat. cuius rei causa est, quod sensoriū syncerum, minimeq; terrenū, corpulētum uē obtinet. cutem etiā tenuissimā præ cæteris animalibus homo suapte natura pro magnitudine habet. Vitulus marinus nimirū recte à natura cōstitutus est. Cum enim quadrupes ouiparū sit, auribus caret, meatusq; tantū habet, quibus audiat. causa est, quod uisū hic in humore traducit. Pars autē auris addita meatibus est, ut motus à longe delatus aëris feruaretur. itaq; nihilo utiles ei auriculæ essent, imō uero offenderet, cum intra se copiam reciperent humoris. De uisu, auditu, olfactuq; dictum iam est.

40

De pilorū in animalibus uarietate, & quæ pilorum loco sint.

Caput III



Illi discrepant, & inter se in hominum genere per ætates, & cum cæteris animalibus, quæ habent pilos. habent autē quæ intra se animal generant serē omnia. Iam & aculeos, qui à nonnullis uice pilorū geruntur, genus esse pilorum existimandum est, ut herinaceorū aculeos, & si quid eiusmodi aliud in genere uiuiparo est. differentie uero pilorum existunt duritie, mollitie, longitudine, breuitate, rectitudine, crispitudine, multitudine, paucitate. ad hæc, coloribus, ut albedine, nigredine, eorumq; medijs. sed nonnullas earum differentiarum per ætates quoq; recipiunt, uidelicet cum mi-

Bb 4

nora natu, aut maiora sunt. quod præcipue in homine palam fit. pilosior enim ætate prouectus redditur homo, & parte priore capitis nonnulli caluescunt. pueri quidē, mulieresq; non caluescunt. Viri autē procedente ætate calui euadunt. necnon capite homines senescentes canescunt. quod nulli ferē ex cæteris animalibus accidit manifeste, quamuis equus euidentius quàm cætera ita afficiatur. Caluescunt homines parte capitis priore. Canescunt primo temporibus. sed nemo uel temporibus, uel occipite caluescit. Quibus autē animalium pili non sunt, sed pilorum proportionale, ut auib; pennæ, piscibus squamæ, ijs etiā nonnulli ex ijs affectibus ueniūt ratione eadem. sed cuiusnam rei causa genus pilorum datum animalibus à natura est, diximus antè, cum causas partiū redderemus. Nunc præsentis operis, atq; officij est, ut quibusnā præcedētibus rebus, & quas ob necessitates hæc eueniūt, explis-¹⁹ cemus. Causa crassitudinis, tenuitatisq; pili, cutis potissimū est. alijs enim cutis crassa, alijs tenuis, & alijs rara, alijs densa est. tum differētia humoris inditi cōsors causæ est. Alijs enim pinguis, alijs aquosa est. omnino cutis naturam terrenam esse statuimus. Cum enim per summa sit, humore euaporante solida, terrenam redditur. Pili autē, proportionalesq; pilorum nō ex carne, sed ex cute oriuntur, cum humor in ijs euaporetur, atq; exhalet. quam ob rem crassi ex crassa, tenues ex tenui cute proueniunt. quod si cutis rarior, & crassior sit, crassi gignētur propter copiam por-²⁰ tionis terrenæ, & meatuum laxitatem. sed ipsi crassior est, tenuiores exeunt propter meatuum angustiam. Item si uapor aquosus inest breui resiccescens, facit ne pili ca-²¹ piant magnitudinem. At si pinguis est, contrā euenit, non enim facile exiccare potest, quod pingue est. quam ob rem in totā animalia quorum cutis crassior est, pilo sunt crassiore, quamuis nō quæ cute maxime ita constāt, magis ita habeant pilum, propter eas, quas modo diximus causas, ut generi suum præbubus & elephantis, & multis alijs usu euenit. nam & si cutem crassiore boues, elephantis, & pleraq; alia habent, quàm fues, tamen pilo tenuiore teguntur. Eadem causa est cur hominum capilli crassissimi sint. capitis enim cutis crassissima est, & humoris plurimum cōtinet. rara etiā admodū est. quinetiā ut pili longiores breuiiores uel sint, causa est, quod humor qui euaporetur, nō facile exiccare potest. causa uero ne facile exicce-²² tur duplex est, scilicet quāritate & qualitate. nam si humor aut multus, aut pinguis est, nō facile exiccare potest. ideoq; hominum capilli longissimi sunt. cerebrū enim quod humidū, & frigidū est, largam humoris copiam præbet. simplex autē, crispus uel oritur pilus exhalatione pilorum. Nam si fumosa est præ sua caliditate & siccitate, crispū efficit pilū. Inflectitur enim, quoniā duplici delatione feratur, terrenū enim deorsum, calidum sursum fertur: cumq; præ sua imbecillitate inflecti facile possit, intorquetur. quod pili crispitudo est. Aut igitur ita causa reddenda est, aut quoniā parum humoris, multū aut portionis terrenæ inest, efficitur, ut pili resiccati ab aëre ambiente cōtrahantur. Inflectitur enim quod rectū est, si euaporat, & cōtrahitur, atq; cōuellitur pilus, quemadmodū cum igne aduritur, utpote cum crispitudo con-²³ uulsio sit ob humoris inopiam ab aëris continētis calore. Indiciū rei est, quod & du-²⁴ riores sunt pili crispī, quàm recti. durū enim quod siccum est, simplici autē pilo sunt, quæ humore abundant. fluit enim humor in ijs, nō stillat. quocirca Scythæ incolæ Ponti, & Thraces pilo sunt promisso, & simplici. nam & ipsi humidi sunt, & aëre ambiēs eos, humidus est. Aethiopes cōtrā, qui loca incolūt calida crispo sunt pilo, sicci est enim & cerebrū eorū, & cœlum ambiēs. Sed sunt quæ quamuis cutem ha-²⁵ beant crassiore, tamen tenuiori sint pilo, ea uidelicet causa, quam antè exposui, quo enim meatus tenuiores sunt, eo pilos enasci tenuiores necesse est, quapropter ouis generi tales sunt pili. uellus enim multitudo pilorū est. Sunt etiā, quæ mollem quidē habeant pilum, sed minus tenuē, ut lepores contrā quàm oues. leporū enim pilus

pilus per summa cutis enascitur, quam ob rem longitudine caret, & simile accidit, ut in ijs, quæ lino decerpuntur, quæ quamuis mollia sint, tamen nullam longitudinem habent, nec implexum ullum recipiunt. Oves frigidi tractus contra quam homines afficiuntur. Scythæ enim molli sunt pilo, et oves Sauromaticæ duro, causa eadem, quæ in omnibus feris est. frigus enim indurat propterea quod cogendo excicat. cum enim calor eximitur, humor una evaporatur. Itaque non solum pilus, sed etiam cutis terrena, duraque euadit, causa in feris uita agrestis est, in cicuribus autem his loci frigiditas, indicium uel echini pelagici faciunt, quorum usus contra urinæ stillicidia est. quippe qui frigiditate maris præalti, in quo degunt (sexaginta enim, atque
10 etiam amplius passuum gurgite oriuntur) ipsi quidem exigui sint, sed aculeos grandes, durosque gerant. caula magnitudinis est, quod incrementum corporis diuersum eo est. cum enim parum caloris obtineant, neque concoquere possint, multum ob eam rem habent excrementi. aculei autem, & pili, & reliqua generis eiusdem excremento nascuntur. duri uero & rigidi modo penè lapidis constant propter frigus, & gelu. eodemque modo cætera, quæ terra gignit, duriora, & terrosiora, lapidosioraque gignuntur locis aquilonijs, quam austrinis, & uento expositis, quam concauis, & quietis. frigent enim omnia magis, humorque evaporatur. Indurat igitur tum calor, tum frigus. nanque euenit, ut ab utrisque humor euaporetur, scilicet à calore per se, à frigore per accidens. una enim cum calore humor abstrahitur, nullus enim hu
20 mor sine calore est. sed frigus non modo indurat, sed densat etiam, calor uero laxat, rarioraque facit. Eadem causa est, ut natu grandibus duriores & pili, & pennæ, & squamæ reddantur. cutes enim duriores, crassioresque efficiuntur senescente ætate. resiccantur enim. & quidem senectus ipsa, ut nomen significat, terrena est, quoniam sine calore est, & cum calore humor defluit. Calui omnium maxime animalium homines aperte efficiunt. quod genus affectionis generale quodammodo est. nam & plantarum alie semper frondent, alie frondem amittunt. Et aues, quæ certo tempore se abduunt, & latent, pennas amittunt. qualis affectus caluitium in hominibus est, quibus accidit, ut caluescant. Cum enim paulatim & frondes, & pennæ, & pili defluant, ubi uniuersim hic affectus euenierit, uocabula accipit hæc, caluescere, des
30 frondescere, depennescere. Causa autem huius affectus inopia humoris calidi est, qualis præcipue est humor pinguis. quocirca platur, quæ pingues sunt, fronde per tota uiuent. sed de his alijs. sunt enim ijs uel alie causæ huius comites affectionis. Euenit hoc platur hyberno tempore. mutatio enim hæc potior, quam ætas earum est. A animalibus etiam, quæ latent, idem tempus iacturæ est. sunt enim minus, quam homines natura humida, atque calida. homines autem suis ætatibus hyemem, æstatemque agunt. quam ob rem nemo ante, quam coire incipiat, caluescit, sed à uenereo coitu potius id euenit, scilicet ijs, qui sua natura sint eo propensiores. Cum enim cerebrum frigidissimum omnium corporis partium sit, tum re ueneræ usus refrigerat. caloris nanque
40 sinceri, naturalisque secretio est. itaque cerebrum sentit meritò prius, quæ enim imbecilla, uitiosaque sunt, causa parua, exiguaque momento immutatur. Quapropter si quis cogitet, ut & ipsum cerebrum parum calidum est, magisque talem esse obductam cutem necesse est, atque etiam magis naturam pilorum, uidelicet quanto plus ipsa caloris origine distet, recte id ita euenire existimabit, ut qui semen serant, ea ipsa ætate caluescant, quæ semen emittant. eadem causa est, & ut priore capitis parte caluescant, & ut hominibus solis omnium animalium id eueniat. quod enim parte priore cerebrum continetur, hinc ea parte caluescimus, quod autem homo maximum, humidissimumque cerebrum habet, hinc solus animalium ita afficitur. mulieres non caluent, quoniam natura earum similis puerorum naturæ est. utraque enim sterilis feminalis excrementi est. spadones etiam non caluescunt, quoniam in foeminam mutantur, & pilos,

qui postea gignuntur, aut nō producūt, aut amittunt, si fortē habent, praterquam pubem, quam mulieres etiā habent, cum ceteris illis careāt. oblatio enim hæc, mutatio de mare in foeminam est, causa uero, ut quæ latent, rursus pennas recipiant, quæq; frondem a miserint, denuō frondescant, caluis autē nunquam redeat pilus, quod anni tempora illis mutationem corporis magis afferūt, itaq; pro temporum mutatione uicilitudo gignēdi, amittēdiq; sequitur, ut animalia pennas, pilos uē, plantæ frondes aut dimittant, aut recipiant. At uero hominibus per ætatem euenit, uer, ætas, autumnus, hyems. Itaq; cum ipsæ ætates non permūtētur, sit, ne affectus, qui ob eas accidunt, permūtentur. quanquam similis causa est, ac de ceteris pilorum affectionibus diximus ferē.

Quem ob causam homines canescant.

Caput IIII

10



Olorum autem causa ceteris quidem animalibus cutis natura est, ut unicolora sint, & uaria, sed hominibus nihil cause cutis affert, nisi ad canitiem, uidelicet eam, quæ morbo, non quæ senio accidat, nam eo uitio corporis, quod uiriligo uocatur, pili efficiuntur albi, sed si albi sunt pili, cutem albedo non sequitur, cuius rei causa est, quod pili ē cute exeunt, itaq; si cutis agrotat, extenuataq; est, pilus quoq; aegrescit, ægritudo autē pili canities est. ætatis uero illa canities inopia, & exilitate calorē contrahitur. Omnis enim ætas labitur in frigiditatē, cum iam corpus inclinatur, & senescit. senectus enim frigida est, & sicca, de alimento autē, quod quacūq; partem corporis subeat, ita intelligendum est, ut calore proprio concoquatur, qui cum agere nequeat, deprauetur alio, & aut repletio sequatur, aut ægritudo, sed de eiusmodi causa postea differemus, cum de incremento, & alimento age mus. Quibus igitur hominibus natura pilorum parum calida est, plusq; humoris subit, calor proprius nequit cōcoquere: atq; ita humor putrescit, calore aëris ambicū. sit enim putredo quæq; a calore, sed non suo, natiuoq; ut alio loco exposui. putredo autē & aquæ, & terræ, & quorumuis eiusmodi corporū fieri potest, quam ob rem terrenam etiam uaporis putredinē nouimus, quæ situs uocatur. etenim situs caries uaporis terreni est. Itaq; in pilis quoq; alimentum tale, cum non concoquitur, putrescit, atq; ita efficitur ea, quæ canities appellatur: quæ alba propterea est, quod & situs unus cariorum ferē albus est: cuius rei causa est, quod multum aëris continet. Omnis enim uapor terrenus uim habet aëris crassioris. situs enim quasi respondēs pruinæ existimatur. nam si uapor se efferens cōcrescit, pruina sit. sin putrescit, situs. quapropter utraq; per summa hærent. uapor enim per summa est, & recte a poetis in comœdijs transfertur conuicio in canitiem, cum senectutis situm, pruinam nominant: alterū enim genere idem est, uapor nanq; utrunq; est. alterū, id est situs, specie idem est. putredo enim utrunq; est. hoc ita esse indicium est, quod pleriq; per ægritudinem pili canuerint, mox ualentudini restituti nigruerint. causa est, quod per ægritudinem, ut totū corpus inopia calorē naturalis laborat, sic partes etiā minimæ eadē participant labe. multum autē excrementi consistit in partibus corporis, quam ob rem in pilis etiā cruditas est, quod canitiem faciat, post uero cum conualuerint, & uires receperint, denuō mutantur, & quasi iuuenes ex senibus redduntur, affectionesq; proinde mutantur. recte etiā dixeris morbum esse aduentitiam senectutem. Senectutem autē esse morbum naturālē. itaq; morbi nonnulli idem faciunt, quod senectus. tempora autem primō canescunt, quod occipit uacat humore, cum non contineat cerebrum. incipit uero habet multū humoris, quod autē multum est, difficile id putrescit. At in temporum pilis, nec tam parum humoris est, ut concoqui possit, nec tam multū, ut putrescere nequeat. Cum enim is locus medius inter utroq; sit, extra utrunq; affectū esse potest, causa canitiei humanæ dicta iam est.

Quam

Quid situr?

10

49

Quam ob causam nonnulla animalia pilis, aut ijs, quæ pilorum vice fungantur, immutantur.

Caput V



Aeteris autē animalibus, ne per eam ætatem hoc idem manifeste eueniat, causa est eadem, quam de caluitio diximus. Parum enim cerebrū idēq; minus humidum habent, ut calor ad concoquendum sufficiat. Equis maxime omnium, quæ nouerimus animalium, canities innotescit: quod os, in quo cerebrū tenuius, quàm cætera pro magnitudine habeant, argumentum est, quod ictus in eo loco periculosus est. unde illud Homerū. Et quàm setæ hærent capiti, letaleq; uulnus præcipue sit equis. Cum igitur præ te-
 10 nitate ossis affluat humor, & per ætatem calor deficiat, pilī illi canescūt. Rusti etiā celerius, quā nigri canescunt. nam & ruffitas, quasi imbecillitas pilī est. Imbecilla autem quæq; celerius senescunt. Grues senescentes effici nigriores aiunt, cuius affectus causa esse potest, quod pennarū natura earum albicet, plusq; humoris senescentibus ijs constituitur in pennis, quàm ut facilius putredini pateat. Canitiem autem effici putredine quadam, nec esse, ut quidam putant, ariditatem, indicium est, quod pilī, qui uel pileo, uel alio tegmine operiūtur, celerius canescūt. Flatus enim putredinem prohibent. operimentum autem flatum arcer. lūuat etiam olei aquæ misti perunctio, aqua enim refrigerat, oleum uero ne celeriter exiccetur, prohibet, aqua enim facile resiccatur. Canitiem autē non esse ariditatem, nec pilū, ut herbam
 20 exiccatum albescere, indicium est, quod pilī nonnulli canis ilico oriuntur, at nullum oritur aridum. multi etiā suo extremo albescunt in ultimis enim, ac tenuissimis color minimus habetur. cæteris animalibus, quibus pilī albi gignitur, natura, nō affectus uidetur euenit. Causa autē colorum in cæteris cutis est. Alborum enim alba est cutis, nigrorū nigra. uariorū, permistorumq; partim alba, partim nigra esse conspiciuntur. At in homine cutis nulla causa est. Qui enim sunt albi, admodū nigros habent capillos. causa est, quod homo omnium maxime tenuem cutem habet, pro magnitudine itaq; nihil ad pilorum mutationem cutis ualet, imò præ sua imbecillitate ipsa mutatur, & uel à sole, uel à flatu redditur nigrior, nec pilī ullo pacto cum ea mutantur. at uero in cæteris cutis uim loci præ sua crassitudine obtinet. itaq; sit, ut pilī pro
 30 tute immutentur, cutis autē ipsa nihil à flatu, aut sole afficiatur.

De coloribus animantium.

Caput VI



Animalium uero alia unicolora sunt (appello unicolora, quorū genus totum unū habet colorē, quomodo leones fului sunt omnes, idēq; in auiibus, & piscibus, & reliquis animalibus omnibus intelligi uolo) alia uersicolora sunt. Sed toticolora ea dico, quorū corpus totum quidē eundem habet colorem, sed nō omnium eundem, ut bos totus albus est, aut totus est niger. Alia uaria sunt, idēq; dupliciter: aut enim genere, ut panthera, ut pavo, & piscium nonnulli, ut quæ thrasie uocantur. aut non genere
 40 toto, sed parte, ut boues, ut capræ interdum uariæ generantur. in auium etiā genere columbæ, & alia pleraq;. Transseunt uero toticolora multo magis, quàm unicolora, tum in colorē sui generis simplicem, ut ex albis nigra, & ex nigris alba redantur: tum uero in mistum ex ijs, quoniā in totius generis natura inest, ne unum habeat colorē, hinc enim facile utroq; uersus mouetur, ut uicissim mutetur, & uariū efficiatur, unicolora contrā. nunquam enim mutantur, nisi per affectum, idēq; raro. iam enim perdix uisa est alba, & coruus, & passer, & ursa. Accidunt hæc cum in generatione peruertuntur: facile enim moueri, deprauariq; potest, quod parū est. tale autē quod gignitur, est. Principiū enim ijs quæ gignuntur, in paruo consistit. Aquis etiā immutantur ea potius, quæ sua natura toticolora, genere autem

versicolora sunt. calidæ enim aquæ pilum faciunt albū, frigidæ nigrum: quomodo plantis etiā euenit. causa est, quod calida plus aëris habet, quàm aquæ. Aër autem perlucens, albedinem facit, quemadmodū spumam quoq; effici certū est. Vt igitur cutes per affectū albæ differūt ab ijs, quæ tales natura sunt: sic pilī inter se differūt, quī morbo, aut ætate, quicūq; natura albuerint, scilicet eo quod causa est diuersa. alteri enim calore naturali, alteri alieno albi efficiuntur. albedinem uero omnibus aër uaporosus præbet inclusus. quam ob rem quæ unicolora non sunt, uenire omnia plenius albēt. calidiora etiā, suauioraq; sunt omnia alba ferē eadem de causa. concoctione enim dulce efficitur: concoctio autem calore. eadem causa unicoloribus quoq; sed aut nigris, aut albis reddēda est. caliditas enim, atq; frigiditas causam habent naturæ cutis, & pilorum. membrū enim unumquodq; suum habet calorem, Quinetiam linguæ simplicium ac uariorum inter se differunt, atq; etiā ipsorum simplicium, sed uersicolorum, ut alborum, & nigrorum. causa uero est, quod antē dixi, quod uariorū cutes uariæ sunt, alborū albæ, nigrorum nigræ, linguam autem perinde, ac partem aliquam esse exteriorem putandum, qualis manus, aut pes est, quanquam ore operatur. Itaq; cum uariorū cutis non sit unicolor, cutis quoq; linguam ambiens ea ipsa causa est. Mutant colores auium nonnullæ, atq; etiā quædrupedum syluestrium aliquæ per tempora anni. cuius rei causa est, quod ut homines per ætate mutantur, sic illa per tempora. plus enim discrimen hoc in ijs potest, quàm mutatio ætatis. uaria etiā magis sunt, quæ uario magis cibo uescuntur, quod parte plurima dixerim, idq; recta ratione, ut apes unicolores sunt magis quàm crabrones, aut uespæ. nam si cibi causæ sint mutationis, meritō ciborum uarietas facit, ut magis euarient motus, & alimenti excrementa, ex quibus & pilī, & pennæ, & cutes gignuntur. Ac de coloribus & pilis satis definitum sit ad hunc modum.

De uoce animalium, & eius mutatione.

Caput VII



De uoce, cum animalium alia uocis grauioris sint, alia acutioris, alia firmæ, ac in utranq; exuperantiā modice cōstantis: cumq; etiā alia magnam uocem, alia paruam reddant, & leuiter, aut asperitate, flexibilitateq; aut rigiditate discrepent, considerandum quas ob causas hæc singula habeantur. Igitur acuminis, grauitatisq; causam eandem esse arbitrandum, quam mutationis, cum minora, maioraq; natu mutantur. Cætera enim omnia cum natu minora sunt, uocem mittunt acutiores. uituli autem bubuli grauiorē, quod idem maribus etiā, & foeminis eius generis euenit. Cum enim in cæteris generibus foemina uocem mittat, quàm mas acutiorē (quod maxime in homine patet. hanc enim facultatē natura hominī potissimum tribuit, quoniam oratione solus animalū homo utitur, orationis autē materia uox est) cum inquam cæteræ foeminae acutius sonent, contrā in bubus est. Vacca enim grauius, quàm tauri sonāt. sed cuiusnam gratia, uocē animalia habet, & quid uox sit, & omnino tauri sonus, & strepitus, partim in ijs, quæ de sensu, partim in ijs, quæ de anima deseruiamus, explicatū dicitur. Cum autē graue in tarditate motus consistat, acutū uero in uelocitate, utrū quod moueat, an quod moueatur, causa sit tardī, aut uelocis, quærendum est. quidam enim, quod multū est, tarde moueri, quod parum, uelociter id moueri aiunt: eamq; esse causam, ut alia uocē grauem emittant, alia acutā, quod recte aliquatenus dicitur, sed nō recte in totū. genere enim recte dici uidetur, graue in magnitudine quadam esse eius, quod mouetur. nam si hoc ita esset, paruam, eandemq; grauem emittere uocem nō facile liceret: nec magnā, & eandē acutam. Videtur etiā grauitas uocis naturæ generosioris esse. necnon in modulatu grauis modulus præstantior incitatio est. perfectū enim in superiātia cōsistit. Grauitas aut superantia

perantia quædam est. Sed cum acutum & graue in uoce diuersa sint à magnitudine uocis, & paruitate (est enim & acuta magna, & parua grauis) simili modo medius eorum tenor ambigit, quoniam alio definienda sit magnitudo uocis, & paruitas, nisi multitudinem eius quod mouetur, & paucitatem quod si definitione illa statuumendum sit acutum & graue, accidet, ut eadē sint grauis, magnæq; uocis, & acutæ, paruaq; uocalia. sed enim causa est, quod magnū, & paruum, & multum, & paucum, non eodem accipiuntur modo, sed altera simpliciter, altera respectu quodam. magnitudo enim sunt, eo quod multum simpliciter est, quod mouetur: paruuioca, eo quod parum: grauiuoca autem, & acutiuoca, eo quod respectu inter se habito differē-
 10 tiam hanc recipiunt. Nam si quod mouetur, superat vires eius quod mouet, tarde quod fertur ferri necesse est: si superatur, uelociter. Itaq; quod ualet, interdum multum pro uiribus mouens, tardum efficit motum: interdum uelocem, si superat. eademq; ratione, quod debile est si plus mouet, quam vires patiuntur, tardum efficit motum: si parum præ sua imbecillitate, uelocem. Causæ contrarietatum hæc sunt, ne aut omnia minora natu uocem mittant acutam, aut maiora grauem, necq; mares & foeminae æque omnes aut graui, aut acutam. Ad hæc, ut & ægri acutum sonent, & qui bene ualent, atq; etiam ut senescentes uocem mittant acutiorem, quanquam senilis ætas contraria iuuenili est, plurima tamen parte minora natu, & foeminae acuta
 20 te sunt uocis, cum præ sua imbecillitate parum aeris moueant, fertur enim uelociter, quod parum est, uelocitas autem acumen in uoce est. Vituli & uaccae partem quam mouet, non habent ualidam, alteri propter ætatem, alteræ propter foeminae sexus naturam. cum tamen moueant, multum graue sonat. Graue est enim, quod grauius mouetur, multumq; aeris tarde fertur, multū autem ea mouent, cum cætera parum moueant, quia uas, per quod primum spiritus fertur, amplum in ijs est, multumq; aeris mouere cogitur, cæteris angustius, ac parcius est. ætate autem procedente, vires ea pars recipit, quæ in unoquoq; moueat. Itaq; in contrarium mutatur, ut quæ uocem acutam mittebant, grauiorem, quam prius mittant: quæ autem grauem, acutiorem, quam ob rem tauri acutius sonant, quam uituli, & uaccae. Vi-
 30 res autem omniū nerui continentur. quapropter cum ætate florent, robustiora sunt, minus enim compacta, neruataq; sunt, quæ minora natu adhuc sunt. Item recentiorum nerui nondum intenduntur, senescentium iam laxantur: quam ob rem ad motum quoq; sunt imbecilliora. sed potissimum tauri neruosi sunt, & eorum cor ita constat, itaq; contentiorem eam obtinent partem, qua spiritum mouent, quasi fiduculam inrentam. talem cordis bubuli esse naturam significatur, uel eo offe, quod in nonnullis gignitur: ossa enim naturam neruorum requirunt. Execla omnia in foemina mutantur. & quoniam vires neruosa in suo originali principio laxantur, similem foeminis mittunt uocem. laxatio uero similis sit, ut si quis fides intendens adhibuerit pondus, quod annexum reddat contentiores, quomodo textrices faciunt, quæ cum stamina distulerint, annectunt quas leuas uocant. ita enim natura quoq; testium an-
 40 nexa meatibus seminalibus depedit, qui meatus ex uena tendunt, cuius origo ex corde est, iuxta ipsum principium, quod uocē moueat, quam ob rem meatibus seminalibus immutatis, ad eam qua semen excernere possunt ætatē, pars illa quoq; una cum ijs immutatur, qua immutata, uox etiā mutatur, maxime scilicet maribus, sed foeminis etiam idem accidet, quanquam obscurius: quod quidam hircire appellant, cum uox mittitur inaequalis. post uero restituitur in sequentis ætatis grauitatem, aut acumen. Sublati igitur testibus, tentio quoq; meatuum laxatur, quomodo in fiducula & stamine sublato potest. laxatis his, principium, quod moueat uocem, eadē ratione laxatur. Causa hæc est, quam ob rem execla mutantur in foeminā, rum uoce, tum etiam reliqua forma: quoniam ita accidet, ut principium laxetur, ex quo intentio

corporis est, non ut quidam existimant, quod testes ipsi copula sunt multorum principiorum, sed parvæ mutationes causam afferunt magnarum mutationum non solum ratione, sed cum evenit, ut principium unum cum ijs ipsis mutetur. principia enim quamvis magnitudine parva sint, tamen facultate sunt magna. hoc est enim principium esse, ut ipsum quidem causa sit multorum, sed ipsius nulla sit superior causa. Caliditas etiam, aut frigiditas loci confert eodem, ut natura tale constituat animal, quod aut grauem, aut acutam vocem emittat. Spiritus enim calidus crassitudine sua gravitatem efficit vocis: frigidus præ sua tenuitate contrarium facit: quod vel in hijs patet, qui enim calidiores utuntur spiritu, & talem emittunt, qualem siticines, & lamentantes, grauiorem sonum inspirant tibijs. asperioris autem vocis, instrumentum molle causa est, ut rigide durum. molle enim parcius dispensari potest, & varium fieri, durum non potest. & molle quidem tam magnam, quam parvam reddere vocem potest, & proinde tum grauem, tum acutam. facile enim spiritum dispensat, ipsumque de facili magnū, parvumque fit, quod autē durum est, indispensabile est. De voce igitur, quæ non ante differuimus, cum de sensu aut de anima ageremus, huc habere modum.

Quare dentes à natura constituti sunt, & cur partim decidunt, denuoq; nascantur,
partim autem non.

Capitulum VIII



DE DENTIBUS non rei unius, aut eiusdem gratia animalia eos habere omnia, sed alia ad cibum, alia ad vocis orationem, dictum antea est, sed cur priores gignantur primo, maxillares post, & hi non decidunt, illi decidunt, ac denuo nascantur, hanc rationem disputationi de generatione congnatam esse putandum est. Differuit igitur de his & Democritus, sed non bene. Non enim omnibus consideratis, causam reddidit uniuersim. At enim decidere, quoniam properant, & ante tempus oriuntur. nam ad ætatem penè florentem enasci per naturam debere, causam autem ut ante tempus gignantur, usui tribuit lactis, & sus lactet, qui tamen dentes non amittit. & quæ dentes habet serratos, omnia lactent, quanquam nonnulla eorum non amittunt nisi caninos, ut leones, hoc igitur ille errauit, exponens uniuersim, cum id non animaduertisset, quod in omnibus eueniret. At agere ita oportet, qui enim differit uniuersim, ac de omnibus dicat, necesse est. Sed cum naturam ita subiiciamus, scilicet ratione ducta ex ijs, quæ cernimus, ut neq; deficiat, neq; frustra agat quicquid in singulis quoad eius fieri potest, quæ autē cibū assumere debent post lactis usum, instrumenta habeant necesse sit ad cibum conficiendum: si ita eueniret, ut ille dicit, ad pubertatem, natura profectō deficeret agēdo rem, quā facere posset, atq; opus naturæ fieret præter naturā. Vio-
lentum enim præter naturā est. Generationē autem dentium euenire uiolenter asse-
uerat, sed hoc uerū non esse apertū ex his, alijsq; huiusmodi rationibus est. Oriun-
tur autem prius ij, quam lati, quod & officium eorū prius est. Secatur enim prius, quam molitur, quod comeditur. sunt autē illi molendi officio delegati, hi uero secādi,
tum etiā quod res minor, et si simul inchoatur, tamen celerius solet perfici, q̃ maior,
Minores autē primores, quam maxillares sunt. necnon maxillæ os à latere latum,
in ore angustum est. Itaque ex ampliore plus alimenti affluere necesse est, ex arctio-
re minus. lactis autem usus ipse nihil confert, quanquam lactis calor faciat ut den-
tes ij oriātur, indicium est, quod & ipsorum lactentium infantes qui calidiores utun-
tur lacte, ocyus dentiuunt. calor enim uim obtinet augēdi. Decidunt qui prodierint
primi,

primi, tum notæ melioris gratia, tum necessariò, melioris ratione inquam, quod citò hebetescit quod acutum est. Itaque alteros succedere in officium oportet. lati autem non hebetantur: sed tempore duntaxat attriti leuigantur, necessariò uero decidunt, quod maxillarium radices in lata nituntur maxilla, & ualido osse continentur: primorum autem in tenui, unde fit, ut infirmi & mobiles sint. nascuntur autem denuò, quod in osse adhuc nascēte oriuntur, & cum tempus adhuc est ad dentium generationem idoneum, cuius rei indicium est, quod maxillares diu oriuntur. Vltimi enim uicesimo anno exeunt, nonnullis etiam senescentibus omnino prodierunt, qui loco ultimo habentur: quoniam multum alimenti in amplitudine ossis continentur. At uero prior pars ossis præ sua tenuitate citò perficitur, nec excrementum in eo fit, sed in debitum incrementum absumitur alimentum. Democritus uero missa ratione, cuius causa agatur, omnia referēda censet ad ea quibus natura utitur, quæ talia quidem sunt, sed alicuius causa, & notæ melioris gratia sumuntur. Itaque nihil prohibet, quo minus ita dentes fiant, & decidant: sed non propterea, sed propter finem, hæc autem ipsa causæ sunt, ut mouentia, & instrumenta, & materia. Nam & spiritus magna ex parte agere consentaneum, ut instrumento est. ut enim nonnulla artium instrumenta utilia sunt ad plura, uerbi gratia in excusoria malleus, & incus: sic in rebus à natura institutis spiritus uarium exhibet usum. simile dici uidetur, cum causas necessariò esse dicunt: ut, si quis propter cultellum tātummodo aquam exisse ijs qui intercute laborant, non etiam propter sanitatem, cuius causa secuit cultellus, existimet. Sed de dentibus cur partim decidant, ac denuò nascantur, partim non: & omnino quam ob causam fiant, dictum est, dixi etiam de cæteris mēbrorum affectibus, qui non alicuius causa, sed necessariò ueniant, & quam ob causam, uel delictum cam cui motum tribuimus.

LIBRORVM DE GENERAT. ANIMAL. FINIS.



ARISTOTELIS

DE COMMUNI ANIMALIUM GRESSV, LIBER,
INTERP. PETRO ALCYONIO.



DE PARTIBVS quæ usui animalibus sunt ad motionem per locum ciendam differendum, cur quæque talis habeatur, & cuius rei causa ipsæ ipsi affixa sit. De differentijs item habebitur oratio, quæ explicentur inter partes unius eiusdemque animalis, & inter partes cæterorum animalium, quæ specie inter se differant. Sed initio ea proponamus de quibus uerba facienda sint. Primum igitur eorum est, quot minimum signis animalia sese moueant: mox quam ob causam sanguine prædicta quaternis, illo uacua pluribus agantur signis. & generatim, cur alia nullis sulcantur pedibus, alia bipeda, alia quadrupeda, alia etiam multipeda sint, & quam ob rem omnia paribus subnitantur pedibus. de ijs lo

loquor quæ pedibus insident, & omnino quibus moueantur signis, ut paribus instruatur pedibus. Iam uero quid causa sit, quare homo, & aues bipedes, pisces pedibus nudati formantur, atque etiam homo, & aues, quanquam bipedi habitu finguntur, tamen flexus cruribus aduersos agant. Siquidem homo in ambitum crus inflectit, aues in cauum. Idem etiam homo sibi ipsi ium crura, tum brachia contraria detorquet. nam brachia in cauum, genua in ambitum contrahit. item quadrupeda, eademque uiuipara contra quam homo faciat, crura inflectunt. atque etiam illa contrarium sibi ipsi nauant morum. genua enim in ambitus conuexa, sustagines in caua adducunt. Præterea de quadrupedum genere, quæ non utero à uiuiparis æduntur, sed quæ ouo excluduntur, crurum inflexus præcipue obliquat, & in latus detorquent. Item 10 quam ob causam omnibus quadrupedibus motus per transversum cietur. Causæ igitur horum omnium, & cæterorum, quæ naturam cum his ipsis cognatâ habeant, exponendæ sunt. Hæc uero sic fieri solere, quamuis in cõmentarijs qui naturam animalium complectuntur, testatum reliquimus, tamen nunc differendum est, cur ita de illis statuatur. Ac disputatio quidem hæc, ab eo initio repetenda uidetur, quod ad res naturæ, uia, & ratione demonstrandas usurpare cõsueuimus. atque interim proponemus quæ hoc se habent modo in omnibus naturæ operibus. illorum autem unum est, naturam nihil frustra moliri: imò semper id machinari, & efficere, quod optimum sit de ijs, quæ pertinere possint ad statum cuiusque generis animalium. & res quidem se habent per naturam ob potiorē rationem, quam ipsa natura eximā 20 fecerit. Iam uero quæ, & quales magnitudinis dimensiones, & quibus attribuantur, proponere cõuenit. Hæc quidem lex enumerantur, sed tria paria consciuntur. unum quod summum, & infimum: alterum quod antè, & post: tertium quod dextrum, & sinistrum contineat. Præterea initia motionū, quæ per locum obeuntur, esse tum pulsū, tum tractū. itaque hi per se aguntur. ex accidenti autem id quod agitur, ab alio mouetur. nam idem ab eodem moueri non uidetur. imò id quod ab aliquo agitur, pulsū agitur externo. His præscriptis ac explicatis, trademus quæ proxima habeantur. Animalium igitur, quæ per locum se mouent, alia in summa toto corpore id præstant, ut proficientia: alia per partes, ut ingredientia omnia. Sed in utroque motionis genere ipsum mobile, re, quam subditam habet, se sustinet 30 tans semper mutatur. Quapropter si eiusmodi res celerius subtrahatur, quam id, quod in eo se moturum est incubare, innitiq; possit, aut si nullus omnino cõtrarius detur conatus, profectio nihil in eodē seipsum mouere poterit. Nam id, quod proficiat, cum superiore parte in seipsum innitatur, & in pedum stratum inhæreat, saltum agit. & eo quidem magis, quod partes mutuum in flexuris tensum habent, atque omnino tale est id, quod comprimit, præ eo, quod comprimitur. Quinque igitur 40 halteribus utraque manu comprehensū maiorem & concitatiorem saltum ædunt, quam non cõprehensū. & qui currunt obquatiendis manibus celerius currunt, quoniam in ea diuagatione, & explicatione tum in manus, tum in brachialia inniuntur. At uero id, quod motu exercetur, semper ex duarum ad minimum partium usu, quæ instrumentariæ sint, mouetur, ut quasi altera comprimat, altera cõprimatur. nam id, quod quiescit, cõprimatur, quia pondus sustinet, cum id, quod effertur, una cum eo, quod sustinet pōdus, prorsum impellatur. & ob eam rem quæ instrumentarijs partibus caret, ad hunc modū sese mouere non queunt, propterea quod distincta partium agentū & patibilium descriptione uacant. Sed cum sex dimensiones cõstituantur, quibus animalia suapte natura distingui possint, summum & infimū, antè & post, dextrum & sinistrū, pars summa & infima omnibus, quæ uiam adipiscuntur, tribuitur. quandoquidē non solum animalia, uerumetiam stirpes in utranq; excutunt, quāquam non solum munere, sed planè etiam pōsitione, & sic

ἡ ζωὴ αὐτῶν, id est quinque uoces. quid autem su pentastichū, uide apud Festum Pompei. Halteribus, id est lapidibus saltatorijs, ut habet antiquus interpretes.

situ inter se differat, si ad tellurem, & celum respectum habeas. Summa enim pars omnibus uita praeclata est, per quam cibum recipitur, & accessio adiungitur, infima autem, ad quam postremo accedit, ac partim initium quoddam, partum exitus patet, summa tamen pars initiū est. At qui pars infima potius, ac nobilior initium in istis uideri poterit, praeteritum cum non eodem situ partes summæ, & infimæ in illis quo in animalibus disponantur. Sed quāquam similitudine uniuersi idem minime respondeat, munere tamē quo funguntur, idem omnino respondet. radices enim stirpibus pro summa parte sunt, cum succus ijs, quæ ex terra oriuntur, inde dispēsetur, & illum ipsum radicibus perinde trahant, ut animalia ipsius oris hiant. itaq; ante & 10 ponē non modo adscribitur ijs, quæ uiuunt, uerum etiā ijs, quæ animalia sunt, quādo hæc omnia sensu uigere intelliguntur, & illius opera ante a ponē disiungitur, propterea quod unde origo sensus ducitur, & quō dimanat, hæc ipsa ut priora, opposita ut posteriora signantur. Sed animabus ijs, quæ nō modo sensus participes sunt, sed per locū etiā per seipsas moueri queunt, dextrum & sinistrū ita assignatur, ut paulō ante diximus, hoc est utrunq; disculsum, ac munere descriptū, quod obituræ sunt, non situ. itaq; dextrum cuiq; est, unde primordia motus per locum natura ipsi corpori trahantur. sinistrum, quod oppositū est, & ad illud consequendū suapte natura propēsum est: etiamsi hoc ipsum de animalibus alia distinctus, quā alia indi- 20 cent. nam ratio dextrī, & sinistrī proposita magis declaratur in ijs, quæ instrumentales obtinent partes, ut alas, ut pedes, & alia id genus instrumenta, per locum sese agitant, quæ etiā non his partibus, sed suo ipsorū corpore interapedines indicia progrediuntur: ut de pedum expertibus nōnulla, quales serpentes, eruce, & præterea quæ terræ intestina appellant, id quod de dextro, & sinistro scriptū reliquimus, sibi euenire demonstrant. quāquā res non ita nota pateat & illustris. Motionis item originem trahit a dextra parte argumēto sunt omnes, qui sinistra solent onera baiulare, ita enim gerulus soluto motore ac disūcto facile moueri potest. Quapropter sinistra se sustinentes facilius unctos superfiliunt utres, quandoquidē dextra mouere, sinistra moueri apta est. ob eamq; rem onera non parti mouenti, sed mobili imponi debent. Quod si mouēti, & loco ei imponatur, unde motus proficiscitur, impulsus 10 uel nullus omnino, uel difficilior agetur, & grauior. Pedum etiā proiectiones in cursu indicio sunt motus initia a dextra ducta parte. siquidē omnes sinistram proiciunt, atq; stantes, & in sublime erecti eandem magis proiectisse uidētur, nisi fortuito aliter cōtigerit. nec enim parte porrecta, sed cōtracta motus ille nauatur. Dextra etiā desensio sit. ac propterea dextræ partes omnibus eadē affirmantur, unde enim primū oritur motus, idem uniuersis est, atq; etiā secundū naturam in eodem loco situm, positionemq; obtinet suam. Dextrum autē est, unde primū motus emanat. quam ob rem turbinata ē genere eorum, quæ ad saxa natiuis restis adhærescunt, omni ex parte dextra sunt. in anfractum enim, aut clauiculam non uoluuntur, sed in aduersum progrediuntur omnia, ut purpuræ, ut buccinæ. itaq; cum omnia a dextris moueantur, & illa in seipsa globo circumagantur, dexteras omnes partes æque descri- 40 ptas habeāt necesse est. At homines præter cætera animalia sinistra distinctam obtinent, & agilem, quoniam maxime omnium ipsi secundū naturam fingantur. Dextra autem pars & abiuncta potior est sinistra. idcirco dextræ partes in hominibus maxime tales sunt, quæ quidē cum disiunctæ sint, ratione optima leuæ rigidiusculæ subeunt, & ab iisdem ipsis abiunctæ maxime pendent. Reliqua etiā initia per naturā descripta, & abiuncta in hominibus potissimū disponuntur. summam dico, & priorē partem. sed in quibus summa pars a priore distrahitur, ut in hominibus & aubus, hæc bipeda formatur. Ad bina autem de quaternis reddēda signa, alteris alæ, alteris manus, & brachia adiunguntur, cum quæ ad idem priorē, & summā agant partem,

quadrupeda, multipeda, & pedibus nudata uiuant. Siquidem nomine pedis appello partem, qua in terrestribus animalibus nota exprimitur, quotiescunque per locum se mouent. uidetur enim pedes à pedo, hoc est solo nominati. Nec uero desunt quæ partem tum priorem, tum posteriorem in idem omnino detorqueant, ut mollia, & quæ ex testatis turbinis specie formata existunt, de quibus alio loco supra differuimus. Sed cum loca tripartito distinguantur, in summum, infimum, & medium: bipeda summum ita obtinent, ut ædixæ parti ipsius uniuersi respondeat, multipeda, & pedibus cassâ mediæ, stirpes infimæ. Cuius quidem rei causam afferimus, quod stirpes ipsi terræ immutabili hæsu affiguntur. At summa pars præ cibo est. Stirpibus è terra uictus petitur. Quadrupeda autem, & multipeda, & nullis pedibus subnisa 10 ideo summum locum in medio tenent, quod celsa, atque erecta fabricatione priuentur. Bipeda eum summæ parti respondentem habent, quoniam erecta in sublimem se attollunt, imprimisque homo qui secundum naturam celsus, ac erectus constituitur. Quare cõsentaneum est ab his ipsis partibus initia duci, præsertim cum initium nobilius sit. summum autem infimo, prius posteriori, dextrum sinistro nobilius habetur. Sed bene est permutato etiã ordine idem probare. Nam quia initia his partibus redduntur, idcirco hæc oppositis nobiliora sunt. motionem à dextra oriutis quæ tradidimus, planum fecimus.

SED quoniam necesse est cuiuscunque corporis cõtinui, cuius altera pars mouetur & altera quiescit (id intelligi quod totum moueri potest, altera parte quiescente, quæ 20 tenus utraq; contrarijs motibus impellitur) commune quiddam esse, quo illæ inter se ductu perpetuo cõmittantur, atque eo loci principium statui motionis, & pariter quietis utriusque partis, cõstat, per quæcunque dicta repugnantiæ genera, proprius utrarumque aduersarum partium motus agitur, omnia hæc unum commune habere principium, per quod partes, quas diximus cõnectantur, partes in quâ dextras, & laeuas, summas & infimas, priores & posteriores. Itaque in eo, quod sibi ipsi motum affert, nulla eiusmodi summæ, infimæque partis distincta descriptio est, tum quod motus naturalis à nullo retrouersum cieatur, tum etiã quod mobile nullo modo distinguitur in mutatione quæ utroque uersum fiat. At dextræ & sinistræ, summæ & infimæ partis notatur distinctio. Quæcunque igitur animalia instrumentarijs usæ partibus progre 30 diuntur, partis prioris & posterioris discrimine illas discretas non habet, cum reliquæ ambæ signentur, & primum discrimen dextrum, & sinistrum separans non desideretur, propterea quod discrimen statim in binis necessario, in quaternis uero præcipue notatur. Cum igitur summum & infimum, dextrum & sinistrum in eadem, cõmuniq; origine inter se connectantur (eam designo, quæ princeps motionis est) oportet in singulis, quæ per locum à quouis horum motum cient, præscriptâ quodam modo, & definitâ esse omnium propositorum motuum causam. idque interualis ex principijs expositis, quæ in hisce partibus situ tum cõtrario, tum eodem disponantur. atque illa est, cui cõmune quoque principium mandatur, unde animali motus uel dextrorsum, uel 40 sinistrorsum, & pariter uel sursum, uel deorsum agatur. item quodcunque similiter hoc retineat oportet, ut quoduis principium quod in partibus, quas commemorauimus, inest. Cõstat igitur motionem per locum aut solum, aut maxime ijs animalibus obiri, quæ uel binis, uel quaternis notis per locum moueantur, ut, cum id tale fere san guinem obtinere possimul eueniat, perspicuum sit nullum sanguine præditum animal pluribus, quàm quaternis notis posse motu citari. atque si tali notarum numero dumtaxat motum nauare suapte natura aptum est, illud necessario sanguine cõstare. Quæ etiã ipsis animalibus eueniunt, ea cõprobant quæ demonstrauimus. De sanguine enim præditis nullum in plures dissectum partes, ut ita loquar, protrahere uisum potest, quod particeps esse nequeat motus per locum, quem iam ante exquebatur, cum

cum totius integritate cōtinuum, & minime diductum esset. Contrā de exanguē ac multipedū genere quædam habentur quæ præfecta singulis partibus diu uiuere possint, & non dissimilem ei motum agere, quem antè, quàm id paterētur conficiebant, ut quæ cētipedes uocātur, & reliquæ insecti generis animātes, etiam si prælongæ formētur, quippe cum harū omniū posterior etiā pars in idem, quod prior, gressum tentat. causa inde ductur, cur dissectæ uiuāt, quod perinde quæcūq; illarū constituta est, ut res cōtinua, quæ multis ex animalibus coaleuerit. Hoc autem quam ob rem ita habeat, ex ijs, quæ paulò ante disputauimus, cōstat. Etenim quæ per naturā potissimū constituitur, ad suos ipsorū motus ciendos binis, aut quaternis notis apta sunt. quod idem in ijs probatur, quæ ex sanguinē adeptis, pedibus carēt. Hæ enim quaternis impelluntur signis, per quæ motū cieāt, quia maxima ē parte flexuosum geminātes impulsū procedunt. dextrū enim & læuum, prius & posterius in latitudine exprimitur, hoc est in utroq; flexuoso impulsu. In parte quidē capiti proxima prior nota, dextrum & sinistrū declaratur: sed in parte quæ in caudā definit, posteriores designātur notæ. attamen binis moueri signis uidentur parte tum priore, tum posteriore in reptationem sese distēdentes. Huiusce rei causam breuitas corporis, quæ in hoc animalium genere perlatum consumitur, præbet, cum in illis planè, ut in quadrupedibus dextra dux motus sit, & per posteriora compensatio fiat. Longitudo autē flexuosos illos impulsus facit, ut enim proceroli homines cernui, & oblitipi incedūt, & dextro humero in priorē partem uergente, sinistra coxa in posteriorem magis reclinat, & mediū tum cauatur, tum incuruatur: ita serpētes per summam telluris sese curuantes & flectentes, reptare intelligēda sunt. Atq; documento illo constat eas similiter moueri, ac quadrupeda, nam cauum, & de uexū uicissim transfertur. cum enim læua pars priorum dux sit, cauum ē cōtrario redditur, propterea quod dextrum introrsum denuò subit. atq; dextri prioris nota sit in A, sinistri in B, posterior sinistrum in C, dextrū in D. Ad hunc certe modū ex terrestribus serpētes, ex aquanilibus anguillæ, congris, murenæ, & reliquæ serpentis faciem referentia ludunt. Sed tamen in aquatilibus aliquot habētur, quæ nihil talē habent, quales pinnulæ sunt, ut murenæ, quippe quæ perinde in mari agitantur, ut serpētes in terra & mari. serpētes enim eodem narrant modo, quo in sicco reptant. Neq; uero de his quibus pinnulæ duntaxat binæ applicentur, ut congris, ut anguillis, ut mugilibus, qui in lacu Sipharum nascitur: ob eamq; rem, quæ uitam in terra agere consueuerunt, ut anguillæ, minus flexuoso corporum impulsu in humore, atq; in terra exæquant notas. Causa cur serpētes nullis pedibus innitantur, ea reddi potest, quod natura nihil frustra machinatur: imò uero in omnibus quæ fieri possint, semper ad optimum respiciat, & priuati cuiusq; rei statum, & id ipsum, quod in omnibus quid res sit dicunt, conseruet. Accedit, quod antè etiam proposuimus, de animalibus ijs, quæ sanguine fouentur, nullum pluribus, quàm quaternis signis posse motum nauare. Per hæc igitur planum factum est, nullum inter ea sanguine prædita, quæ per longitudinem ueri commensus expertia sunt præ alia corporis natura, ut serpētes, pedibus augeri posse, hæc enim plures, quàm quater nos pedes habere non queunt. sin minus, sanguinis expertes forent. Quod si binos, aut quaternos salto subditos haberēt, omnino serē immobilia iacerent, adeò necesse esset motum illorum tardum, & ad nulla uitæ cōmoda aptum esse. Omnia quæ pedibus augentur, illos ipsos pares necessariò tenēt. quæ enim per saltum sese per locū mouēt, nullum pedum ministeriū ad eiusmodi motionem desiderant. At quæ saltu utuntur, & gressus insuper indigent, cum illis saltus satis non sit, certum est alteris eorū melius esse, alteris facultatem omnē eripi ingrediēdi. Quam ob rem cuiq; animali necesse est paribus instrui pedibus, cum enim talis motus per partes, non in summa

roto corpore fiat, qualis saluus est, alteris quidē partibus necesse est quiescere per agitationē pedum, alteris uero impelli, & oppositis illarū utrunq; præstari, cum à mobili parte ad quiescentē traducitur pondus. idcirco nullum aut ex trium pedum usu, aut ex unius tantummodo ingredi potest. hoc enim nullo fulcitur firmamēto, quo corporis pondus sustineatur, illud autem labore aggrauatur per alterū oppositū firmamentū, quapropter necesse est idipsum collabi, cum uires ad motum sic agendū intenderit. Pluribus uero pedibus constantia, ut centipedes, possunt uel imparibus pedibus ingressum corporis sustinere, ut nunc etiam uidentur, si pedum detrimentum illæ afficiantur, propterea quod mutilatio pedum cōtraria serie annexorum, reliquæ frequentia pedum, qui utrinq; protenduntur, quasi medetur. & eo quidē magis, quod alijs non gressus, sed quasi tractus partis decurtata sit. Attamē nemini dubium, quin hæc etiam ipsæ commodius se mouerent, si paribus corroborarentur pedibus, nulliusq; defectum perpetuerentur, quàm si pedibus cōtraria serie sibi respondentibus sustinerētur, ita enim possent cum eorum pondere magis adæquare, nec tanquam lance æqua in alteram partem magis præponderare, si firmamentis contraria serie sibi respondentibus fulcirentur, & alteram sedem à pedibus ē diuerso subditis uacant non haberent. id autem quod ingreditur uicissim ab utraque parte procedit, nam ita in pristinum situm sit restitutio.

EXPOSVI animantibus omnibus pedes pares subdi, atq; etiā causa, cur ita fieret, explicata est. Verū ex ijs quæ edisseremus patebit, neq; flexionē, neq; natatū, neq; directionē ullam agi posse, nisi quid ociosum iaceat, nam flexio nihil aliud est, quàm mutatio, quæ ex directio uel in orbē, uel in angulum agatur. directio, quæ ex alterutro eorū in directū procurrat. At necesse est in omni eiusmodi mutationis genere flexionem, aut directionē ad unum procumbere signum: & eo quidē magis, quod nisi nodus flecteretur, nec gressus, nec uolatus, nec natatus fieri posset. cum enim pedibus aucta utroq; obuersorū crurum ordine uicissim & consistant, & pondus gestent, necesse habent altero progrediēte alterius nodum flectere, propterea quod superiora, & inferiora corporis mēbra cōtrario ordine formata magnitudinis paria respondent. atq; etiā subditi ponderi pars tanquam perpēdiculum ad terram demissum erecta cōsistere debet: quādoquidē in progressionē diuarcatur, & extenditur, & tum magnitudinē ociosam, tum id, quod mediū interiectū est, ferre potest. Sed cum superiora, & inferiora mēbra æqualia sint, necesse est ociosam partem nodum flectere, uel in genu, uel in parte, quæ unā flectatur, ut si de animalibus quæ ambulant, aliquod genu careat. Ex eo nimirū documentū capitur, rem ita se habere. etenim si quis per terrā ambulans ad parietē adhærescat, profectio linea, quæ designatur, non recta, sed obtorta erit, quia partis flectentis linea breuior euadit, cum quæ consistit, & effertur, porrectior ducatur. Verū tamen accidit motum præstari, etiam si nullus cruris inflexus agatur, quemadmodum pusiones serpente uidemus. Quinetiā elephāti ita se mouere diuturna hominū fama celebratur. quæ tamē falsō cōfirmata est, cum id genus animalium inflexu uel in scopulis operitis, uel in cluni cō adducto sese moueāt. At nullū erectū, & stans cōtinentur, & tūto incedere potest, quia perinde se mouebit, ut palæstrita, qui per puluerem in genua subsidentes procurrunt. Magna enim pars superne aggrauat. ideo par est maiora adhiberi crura. quod si hæc dentur, nodus etiam inflectatur necesse erit. Sed cum erectum consistat, si pars, quæ prorsum mobilis est, rigida sit, uel cōstitutum extra perpēdiculum cōcideret, uel non progredietur. si enim altero crure erecto, alterum progreditur, maius erit cum æquale omnino sit: quandoquidem hoc ipsum tum crus quiescēs, tum nodum, qui subintenditur, gestare poterit. Ergo per id tempus, cum alter pedum progreditur, necesse est quiescentem inflecti, & simul quia hic inflectat, necesse est alterum

alterum extendi, superiora enim & inferiora corporis membra æquis lateribus tri-
 quetram efficiunt figuram: & caput in infimum magis deprimitur, cum perpēdicu-
 lum eum attigerit locum, cuius est basis. De pedibus uacuis alia quasi undantia, siue
 fluctuantia procedunt: idq̃ dupliciter accidit. quædam enim flexuosis impulsibus
 per terram obreprant, ut serpētes. quædam ultro progressum molitiūtur, ut erucæ.
 Fluctuario porro ipsa flexuosus est impulsus. Alia uoluationibus utuntur, ut quæ
 terræ intestina uocantur, & hirudines. Siquidem hæc præcedēte parte progrediun-
 tur, & reliquum corporis ad eandē ipsam cōducunt, atq̃ ita certis abiuncta sedibus
 uagantur. Ex his perspicue intelligi licet animalia fluctuantia nullo modo posse mo-
 10 tum exercere, nisi flexuosus impulsus, idemq̃ duplex simplici maior sit, per impul-
 sum enim illum flexuosum eundem que extentum nunquam progredierentur, si
 æqualis esset. At ut nos statuimus, extentus omnino superat, & parte ociosa reli-
 quum animalis conducitur. Sed tamen in quocunq̃ superiorum mutationū gene-
 re id quod mouetur, nunc extentum rectā progreditur, nunc unā inflexum cum
 præcedentibus paribus dirigitur: cum sublequentibus autem unā inflectitur. Sa-
 lientia omnia in terra flectuntur. quo etiā modo quæ uolant, & quæ natant, sa-
 liunt. altera enim per productas & contractas alas uolant, altera per pinnulas agita-
 tas natant: quorum alijs quaternæ, alijs binæ ingenerantur, ut longiore corporis ha-
 bitu formati: quales anguillæ sunt, quia motum qui superest, loco binarum pinnu-
 20 larum reliquo corporis impulsu, eodemq̃ flexuoso, ut præcepimus, conficiunt. Pis-
 scium de genere planorum, alij loco binarum pinnularum ampla corporis latitudi-
 ne utuntur, alij binis pinnulis id præstant, cum qui plāni omnino sunt, ut rata, ipsas
 pinnulas, & extremis corporis rotundationibus sese dirigētes & flectentes natant.
 Sed in dubium forasse, & contentionem uenire poterit, quoniam modo aues qua-
 ternis sese moueant notis, utrum uolantes an ambulantes: præsertim cum expo-
 suerimus quæ sanguen obtinent, omnia quaternis moueri signis. At hoc dictum
 non est, imo non pluribus eadem moueri affirmauimus. Quinetiam si illarum crura
 utraq̃ de coxa truncentur, nullo pacto uolare poterunt. nec contrā, si alæ ex sco-
 ptulis opertis eximantur, facultatem ambulandi ullam habere poterunt, cum ne
 30 homo quidem incedere possit, nisi humerorū motus adiuet. per inflexionem au-
 tem & intentionem omnia mouentur, ut docuimus. Nam in rem aliquandiu sub-
 iectam, & quasi sensim cedentem progrediuntur. Quapropter, nisi beneficio alte-
 rius partis flexura adducatur, quā unde primum ortus profluat, integrā pinnam
 habentibus pinnæ, a uibus alæ, cæteris, ut piscibus, pars necessaria est, quæ propor-
 tionem cum superiorum animalium paribus tueatur. in quibusdam tamen, ut in
 serpentibus, principium flexuræ signatur ex spiris, & corporis inuolucris. Vropy-
 gium perinde uolucris ad dirigendos uolatus affigitur, ut nauigijs gubernacu-
 la: atq̃ etiā illud, quā parte cum cute coalescit, flectant necesse est. & ob eam rem
 quæ pinnam integram, aut discretam habent, uropygium ad eiusmodi usum in-
 40 prum habet, ut pauones, ut gallinacæ. & omnino quæ uolacra non sunt, directum
 cursum conficere nequeunt. Siquidem integram habentia pinnam, ut rem sim-
 plici ratione complectar, uropygio carent: quod idem causæ est, quare tanquam
 nauigium remone priuatum, agitentur, & quocunq̃ fors tulerit, allicant & im-
 pingant. Idem quoque sentiendum est de ijs quæ pinnā in uaginam inclusa in-
 struuntur, ut de scarabeis, de gallerucis, & de ijs, quæ alis nudis, & nulla omnino
 crusta munitis prædita sunt, ut de apibus, de uelsis. Atqui nonnulla etiā ad uo-
 latum minus propensa uropygium suis commodis parum aptum receperunt, ut
 porphyrones, ut fulicæ, uel potius ardeolæ, ut ad nandum aptæ aues, imò uero
 hæc loco uropygij pedes protendendo uolant, & ad uolatum dirigendum crurum

utuntur ministerio. Volatus earum, quibus integræ alæ explicantur, defes, & imbecillus est: quia alarum naturam ex proportionem ad gravitatem corporis non habent, imò corpus plenius est, & alæ parvæ, ac imbecilles adiunguntur. & non aliter hæ volatu utuntur, quam si navim onerariam remis agere coneris, atq; etiam alarum imbecillitas, & ea quidem à primo naturæ ortu contracta, non nihil ad eiusmodi tarditatem probandam pertinet. inter aues pauoni uropygium aliquado propter magnitudinem nulli u sui est: aliquando nihil opis utilitatisq; affert, quoniam deciduum est. & aues quidem pinnarum naturam aduersam habent, ijs, quibus integræ adhuc bentur alæ, imprimisq; eæ, quæ celeri volatu uitam agunt, quales uncungues, his enim ipsis volatus perniciositas ad uitæ officia præsidio est. Membra item corporis reliqua proprie illarum motioni conformantur: caput enim paruum omnibus impossibile, collum non admodum succi plenum, crassumq; subest, pectus tum ualidum, tum acutum propendet, acutum, ut contentius uiam sibi parare possit, quasi rostra ta nauigij prora, quod speciem lembi præbeat, ualidum, ob circumnascens carnem copiam, ut aërem occurrentem ac incidentem queat propulsare, idq; facile, nec uiribus fatigatis, quæ à tergo partes adiunguntur, leues sunt, in arcumq; coeunt, ut melius eas subsequi possint, quæ à fronte præceduntur. quippe cum liberiores ex latitudine non trahant aërem. Hæc ita. Et planum quidem iam fecimus, animal, quod erectum ingressurum est, bipès necessariò esse, atq; etiam superiores corporis partes leuiore habere, & inferiores grauiore subdi, quia hoc duntaxat modo suam ipsius molem facile sustinere potest. Quapropter cum animalium omnium unus homo celsus, atq; erectus fingatur, crura superioribus partibus respondentia proportionem maxima, & firmissima omnium quæ pedibus insident, habet. Hoc autem ipsum ea planè res declarat, quæ pulsionibus euenire solet. siquidè hi erecti incedere non queunt, propterea quod in pomilionis habitum delabuntur omnes, & summas partes auctiores robustioresq; in finis tenent, sed procedente ætate ad infirmas accessio adiungitur, donec ad iustam perueniant magnitudinem, atque tum in uestigio stare, & incelsum erectum peragere queunt. Aues cum leues gignantur, bipedes sunt, quoniam pondus illis ex auerso accubat, non aliter, ac equis, quos ex ære fingunt prioribus cruribus sursum uersus elatis. Illud potissimum causæ est, quam ob rem bipeda erigere se ac stare possint, quod clunem femori similem habent, & talem, tantumq; ut duo femora tenere uideatur: alterum in crure ab ipso inflexu productum, alterum ad hanc partem directæ formatione à sede proëctum, quod planè non femur, sed clunis est. & eo quidem magis, quod aues bipedi habitu non procrearentur, nisi tantus afformaretur. femur enim, & reliquum crus directum à coxa quæ admodum breuis est, produceretur, ut in hominibus sit, & quæ drupedibus. propterea illarum corpus ualde prominens pateret. At cum porrectior ducatur, usq; ad medium uentrem ita pertinet, ut crura eo modo suffulta molem totius corporis gestare possint. Ex his compertum est, nulla ratione cōtingere posse, ut aues perinde ac homines erectæ sint. obtegentium enim pinnarum congeries utilis est ijs, quæ corpus eo modo coagmetatum habet, quo nunc spectatur. Quod si erectum attolleretur, inutilis omnino esset: quales Cupidinis imagines uidemus, quas aligeras pingunt. & simul superiore ex disputatione patet, nec hominem nec si quid aliud tali sit habitu, pinnigerum esse posse: non solum quod sanguinem habens pluribus notis, quam quaternis se moueret, uerum etiam quia talis pinnarum congeries iisdem ipsis nulli usui foret, cum per naturam se mouerent. At natura nihil præter suam ipsius normam fingit, & molitur.

INVLVM animal quod sanguine constat, & pedibus innititur, progredi potest, nisi nodus aut in cruribus, aut in scaptulis opertis, & in clunibus inflectatur, aut proba

te probatum est, atque etiam liquet nodum minime inflecti, nisi quid interquiescat: & homines, auesq̃, tametsi bipedes formantur, tamen cōtrarium agere inflexum. Item quadrupeda tum sibiipsis, tum homini contraria in cruribus flectendis esse. hōminum enim brachia cauantur, poplites incuruuntur. Quadrupeda, quæ tamen uiuipara sint, genua in curuum, suffragines in cauum contrahunt. atq̃ id ipsum aues etiam præstāt. Causa ea reddi potest, quod natura nihil frustra machinatur, quemadmodum supra demonstrauius, sed semper in ijs, quæ fieri possint, ad id respicit, quod potius sit, & melius. Cum igitur omnium, quibus mutatio per locum natura efficitur, crus consistens pondus gerat, cumq̃ in aduersum motus obeatur, conuenit præcedentem pedem situ perleuem esse: & cum gressus cōtinue intendatur, in eo iterum pōdus medium teneri, constat necessum esse, quia crus inflectitur, de integro ipsum rectum explicari, idq̃ progressu pede quiescente. Et certe accidit ut altera pars quiescat, & altera progrediatur, & simul animal procedendi facultatem habet per crus nimirum præcedens, quod ante se inflexum agat, cum retrorsum minime agi possit. ita enim crus extendetur projecto corpore, altero autem modo retracto. Iam uero si retrorsum nodus inflectatur, situs pedis per duas motiones, easdemq̃ cōtrarias reddetur, altera ante, altera retro facta. siquidē necesse est quoties cruris flexio adiuuatur, toties extremā femoris partem retro produci, & tibiam à nodo deductam pedem in aduersum promouere. Quod si nodus in aduersum inflectatur, ingressus quem proposuimus fiet, motionibus tamen non ita contrarijs, ut una in aduersum agatur. Itaque homo cum bipes sit, cumq̃ secundum naturam ipsis cruribus per locum moueatur ob eam, quam explicauimus, causam, poplites in aduersum, brachia in cauum contrahit. Nec reclamation ratio. si enim contrā adducerentur, inutilia partim ad utriusque manus usum, partim ad cibum capiendum pēderent. Sed uiuipari generis quadrupeda, cum priora crura sui gressus præcedentia habeant, cumq̃ eadem uicissim prioris corporis parte transferantur, necesse habēt illa in ambitum eadem ipsa causa agere, qua homines, in hōnem conueniunt. Proinde quadrupeda illo etiam quo supra exposuimus modo, in aduersum inflectunt: quandoquidem nodo ita inflexo, pedes quasi ad libramentum diu suspendere queunt. Quod si aliter inflecterent, breuifanē tempore eos ē terra suspensos haberent, quia totum semur, & nodus, à quo tibia ducitur, cum progressu fieret, ad uentrem contraheretur. Ac posteriorum quidem crurum suspensio si pedes in aduersum inflecterentur, æque fieret, ac priorum: breuissq̃ illa foret elatio, idq̃ per ipsorum crurum defatigationem, cum utriusque cruris tibia & nodus ad unum, eundemq̃ uentris locum procumberet. At si in aduersum flectantur, quemadmodum nunc fieri uidemus, nullo impedimēto in gressu, qui eiusmodi motu conficitur, distinebitur. Huc accedit, quod uel necessarium uel melius est crura sic inflecti ijs, quæ ex illorum genere mammas nouis foetibus præbent, & id genus munera exequuntur. curuatis enim introrsum cruribus, magnū negotium sibi exhiberi sentient, cum sobolem quæ subruatur, fouerent. At uero quatuor pares inflectendi modi constituitur, siquidem necesse est genua, & suffragines uel in cauum contrahi, ut in quibus A A, uel in cōtrarium, hoc est in curuū, ut in quibus B B, uel ordine permutato, nec ad eadem ipsa, sed genua in curuum C suffragines in cauum, ut in quibus C, uel contrā, hoc est, ut curua mutuō se respiciant, & caua extra propellantur, qualia sunt in quibus D. Itaq̃ nullum animal quod aut bipes, aut quadrupes sit, in ea flectit, in quibus A aut B inest: cum in C quadrupeda curuent, & inter quadrupeda nullum, excepto elephante, in D adducat. Homo brachia, & crura habet, atq̃ illa in cauum, hæc in curuum contrahit. Omnino semper lacerti, & crura in hominibus contrarios uicissim inflexus agunt, gibber enim cauatur,

brachiale incuruatur, atque iterum humerus in curuum conductur. Nec secus fit in cruribus. femur enim cauatur, genu incuruascit, cum pes è diuerso in cauum nitatur. Inferiora etiam contrà, quàm superiora se mouent, quoniam origo è contrariò se habet. Nam humerus curuatur, femur cauatur, gibber etiam in cauum, genu in curuum, pes contrà in cauum deflectitur. Ratio inflexus crurum talis est, & quidem ob eas causas, quas iam reddidimus.

POSTERIORA quidem crura cum prioribus in motu per transuersum continentur. Nam post dextrum prioris partis latus sinistrum posterioris impellitur, mox sinistrum prioris, motus dextri posterioris excipit. Ac huiusce quidem rei causam ponimus, quod si posteriora simul & priora mouerentur, ingressus ipse distrahetur & præceps esset: non aliter, atque si à posterioribus connexa traherentur. Præterea non ingressus, sed saltus id tale habendum esset, arduum porro, & difficile est saltu continentem agere motum. Argumēto quidem sunt equi ita se mouentes, qui citò lassescunt & itigationem sentiunt, eos intelligi, quos pompæ gratia sessores sustinere solent, nec progredi sinere, itaque sine prioribus & posterioribus cruribus, ob ea, quæ exposuimus, nullum præstant motum. Quod si utriusque dextris primum ille præstaretur, nimirum firmamenta nulla subderentur, ipsæque animalia collaberentur. Ergo si necesse est uel horum modorum utriusque, uel per transuersum motionem agi, & neuro superiorum modorum fiat, per transuersum motio agatur, necesse est. Nam ut scripsimus, cum ita moueantur, neque sine firmamentis esse, neque collabi possunt. Quapropter equi & alia eiusdem generis animalia per transuersum progressum consistunt: nec dextris, aut sinistris utriusque cruribus simul sustentantur. Eodemque modo gradiuntur quæ plures, quàm quaternos tenent pedes. nam semper in quaternis proximis, posteriora per transuersum ad priora attripiuntur. Declarant hoc, quæ lento gradu motum cient, ut cancri. hi enim ita se mouent: quia de eorum genere sunt, quæ multis fulciantur pedibus, siquidē per transuersum semper eò se mouent, quò gressum dirigunt suum. quod etiam animalium genus præter cætera proprium & sui generis motum agit: quòd quidem omnium unum in priorem non mouetur partem, sed in latus. Cum autem prior pars in oculis distincta esset, natura oculis ita affixit, ut cruscula sequerentur, in priorem enim partem illorum motus tendit. ob eamque rem cancri etiam quodam modo in priorem partem sese uidentur mouere.

AUES RITU quadrupedum inflexus crurum agunt. natura enim illarum quodam modo quadrupedum similis est, propterea quod alæ priorum crurum loco annectuntur, ideo perinde illas inflectunt, ut quadrupeda genua. Iam uero cum in ambulatione ipsæ naturalis motus origo ab alis trahatur, uolatus enim proprius auium est motus, ideo si ipsæ eadem alæ eximantur, nullum auium genus nec consistere, nec procedere poterit. Præterea cum bipedes quidem fingantur, sed non erectæ, cumque priores corporis partes exutas, leuesque teneant, uel ad necessitatem, uel ad commodioris uitæ rationem pertinet illas, quo stare possint, femur ita subditum habere: tale inquam, ut in posteriorem deflectatur partem. Enim uero si oportebat rem hoc modo habere, necessitas etiam cogebat auium suffragines in cauum trudi, quo etiam modo quadrupedum suffragines adducuntur, & quidem ob eandem ipsam causam quam probauimus in motu eorum quadrupedum, quæ ex animalis procreatione partum formant suum. Omnino aues, & de uolueribus integram pinnam adeptæ, & in humore natantia, & quæcunque ipsæ instrumentis, quibus superiora, prædita in humore se mouent, facile declarant commodis suis melius consuli, si quas diximus partes à latere annexas habeant, quales nunc habere spectantur. In auib, & integra pinna instructis, ita res habet, quæ eadem in piscibus

bus quoque ostēditur, siquidem auibz alæ, aquatilibz pinnulæ: integram pinnam habentibus membranulæ siccæ à latere adhærent, quandoquidem ita eorum alia firmissime, & celerrime aërem, alia humorem distrahentia sese mouere poterunt, eoq; etiam magis, quod corporis partem in auersum, & in aduersum inclinantes, rem lubricam & cedentem insequentur, cum alia in humore, alia in aëre sese impellant. At uero ex cauernas subeuntibus quadrupeda, eademq; ouipara, ut crocodili, lacertæ, stelliones, mures aquatiles, & reliqua testudinum genera, omnia à latere crura adiuncta & summam terram obradentia habent, eademq; in obliquum detorquent, quoniam ita formata usui sunt ad commodius subeundum, & ad ouorū rum incubatum, atque custodiam peragendam. Cum igitur extrorsum pateant, necesse est ut femoribus contrahendis, & sub se condendis toto corpore in sublime sese efferant, quod quidem corpus cum ita se moueat, fieri non potest, ut crura aliter inflectantur, quam extrorsum. Etiam quidem ante probauimus genus exanagæ animalium eorum, quæ pedibus corroborantur, multipes esse, nec ullum quas drupes haberi, ideo necessitas præscribit, ut cruscula omnia præterquam extrema à latere affigantur, & simul constet eadem ipsa tum sursum uersum flecti, tum subtorta retro uergere, siquidem media horum omniū cruscula & præcedant, & subsequantur necesse est. Quod si in illis ipsis hoc seruatur, oportet in priorem & posteriorem partem inflexum agi, in priorem inquam partem, quia præcedunt: in posteriorem, quia subsequuntur. Et quoniam necesse est utrumque accidere, propterea uergunt, & in latus flectunt, exceptis tamen ultimis, quippe quæ ut magis apta sunt, inflectantur, alia quidem ut subsequentia, sed alia ut præcedentia. Item propter cruscula, quæ frequentiora sunt, hoc etiam modo inflectunt. Siquidem in gressu minus ita sibi impedimento sunt, minusq; offendunt. Natura uergendi his ipsis attribuitur, quod uel omnia, uel plurima cauernas subeant, hoc enim modo agentia efferre se non queunt. Cancri multipedum omnium maxime sui generis natura constant, nec aliter in priorem partem gressum tentant, atq; paulò ante docuimus, soli etiam multis pedibus, qui præcedant fulciuntur, quod efficit partim obducta durities, partim ratio utēdi, quæ quidem non ad natatum, sed ad ipsum planè gressum adaptatur, dum enim uiuunt, terra sustinentur. Flexus igitur cunctorū multipedū æque in latus deflectuntur, ac quadrupedum in latibula se recipientium. Talia enū merantur lacertæ, crocodili, stelliones, & cætera quadrupeda, quæ oua ædunt. Huiusce quidem rei causa hinc oritur, quod alia in prole duntaxat suscipienda abdita umbracula ingrediuntur, alia toto uitæ cursu. Artus cæterorum propter molitudinem in latus obliquantur. Locustæ cum generi crustato annumerentur, pedibus non gressus, sed natatus causa subnituntur. Cancroꝝ autem inflexus in latus detorquetur. Cruscula etiam cute, uel potius crusta aspera, & in morem silicis prædura obducta cause sunt, cur non uergant, ut ouipara quadrupeda, & sanguine cassa, & multipeda: cum neque nandi studioli sint, neque in cauernulis se condant, in terra enim uiuunt, & facie rotunda formantur, & uropygio carent, quo tamen locustæ præditæ sunt, quandoquidem ad natatum usui est, illi autem à natatione abhorrent. Quinetiam soli omnium latus parti posteræ simile habent, quoniam frequentibus pedibus, iisdemq; duobus regantur. Cuius rei causa est, quod nec ante se flectant, nec uergant, uergendi causa paulò ante exposita est, quæ sanè ad crustæ duritiem, solidamq; naturam refertur, quapropter omnes præcedant, & in latus deflectantur necessum est, in latus inquam, quoniam inflexus in latus curuatur. Quod si omnibus pedibus id præstaretur, quiescentes motum nauantibus impedimento forent.

PISCES qui passeris siue rhombi effigiem repræsentant, eo modo natant,
D d

quo cōdites, alteroq; oculo capiti incedunt, quia natura illorum transuersa, distorta est. Aues pa. mipedes remigatione pedum natant. & bipedes gignuntur, propterea quod extrinsecus aërem attripiunt, & spirant: palmipedes, quoniam uitam in humore, fluidisq; locis degunt. cum enim tales subnectantur, loco pinnularum utiles sunt. Cruscus ille item subnituntur, non parti quidem mediæ subditis, ut reliquæ aues, sed magis ad posteriorem partem adherentibus. cum enim breuib; illæ sint prædixæ cruribus, eadem ipsa posteriori adiuncta parti ad natatum accommodant. Cruribus autem breuib; sunt, quia natura quod longitudinē crurū dempsit, id totum ad pedes addidit, & pro longitudine cruribus crassitudinem, pedibus latitudinem tribuit, quandoquidem inter natandum crassi, & habitiores magis usui sunt, quā longi ad propulsandum humorem. At enim ab ratione non abhorret, ut uolucris pedes habeant, pisces careant, alteris enim uita in sicco agitur, cum fieri non possit, ut semper sublimes ferantur: ob eamq; rem pedes habeant, necesse est. alteris uero in humore uita est, & aquam non aërem exceptant. itaque pinnulæ ad nandum utiles sunt, pedes inutiles. Quod si pinnulis & pedibus instruerentur, in numero eorum reponerentur, quæ sanguine defecta rigerent. Aues quodammodo similiter atq; pisces se habent, illis alæ duæ superne dependent, his pinnulæ duæ parte prona, illis pedes resupinæ parti subduntur, his pinnulæ adherent resupina etiam parte, & iuxta pronam maximā ex parte. illæ uropygij gubernaculo reguntur, hi caudæ. De ijs autem animalibus, quibus silicea testa præsidio est, controuersa res est, plenaq; dissensionis, ecquis illorum sit motus, & si careant parte dextra, & sinistra, unde moueantur: & eo quidem magis, quod uidentur moueri. An uniuersum hoc genus, ut mancum, & deprauatum statuere debemus, & æque motum illorum effici, ac si ea cruribus mutilaueris, quæ pedes habent, ut uitulum marinum, & uespertilionē. hæc enim peruersæ quadrupeda sunt. At quæ eiusmodi testæ munimento defenduntur, quanquam se moueant, præter naturam tamen id præstāt, siquidem illorū motus uagus, & solutus non est. Quod si ut fixa, & ad terram adherentia spectentur, sede uaga sunt: si gressu utentia, fixa, & statua haberi debent. Ad cancos etiam dextra pars uitiose adiungitur, cum omnino adiungatur: forficulus denticulatus indicto est, qui dexter magnitudine, & uicrior propendet, quippe cum dextra pars à sinistra distingui exigat. Partes animalium cum alix, tum quæ ad gressum, & ad omnem per locum motionem aptantur, sic se habent, quæ omnia cum præscripta iam explicataq; sint, proximum est, ut ad disputandum de anima aggrediamur.

LIBRI DE COMMUNI ANIMALIUM
GRESSV FINIS.



ARISTOTELIS

DE COMMUNI ANIMALIUM MOTIONE, LIBER,
INTERP. PETRO ALCYONIO.

DE ANIMALIUM motione quæcunque per singula genera illis attribuantur, & quæ discrimina, causæq; eorum, quæ sigillatim iisdem ipsis accidere solent, alibi de omnibus disputatum est. Nunc autem communis omnino explicanda causa, cur quocunque motionis genere agitentur, alia enim uolatu, alia natatu, alia gressu, alia per alios eiusdem generis modos impelluntur. At uero iam antè præfinitū reliquimus id principium aliarum motionum esse, quod sibi ipsi motum affert, idemq; immotū præesse, primariumq; mouens necessariò ab omni motu, & agitatione uacuum esse. quod quidem commodum actum est, cum de motu disputabamus sempiterno, utrum ille esset, nec ne: & si esset, ecquis esset. Et hoc quidem ipsum non modo ratione communi proponere conuenit, sed in ipsis etiam rebus singulis, & sensibilibus, quorum gratia cōmunes quærimus rationes, quas quidem singulis rebus accommodari oportere iudicamus, nam uel in his ipsis constat fieri non posse, ut quicquam ad motum excitetur, nisi etiam aliquid ocietur & per quietem agat. Ac primum quidem in animalibus id comper tum est. Nam si membrum aliquod motum nauat, oportet etiam aliquid ocari, ob eam quæ rem copulæ, & nodi animalibus affiguntur, quoniam cardinis loco nodis utuntur, totiusq; partis integritas, quæ insertū flectit nodum modo una & duplex, modo recta, & flexibilis redditur, quippe quæ per ipsum nodum in mutationem ducatur potentia, & actu. Si quidem partis quæ flectitur & adducitur alia nota motu fertur, alia in nodis quiescit. ut si dimeuentis lineæ A & D quiescat, B moueatur, & A C acquirantur. Sed hoc in exemplo cardo omni ratione uidetur impartibilis, atque motum in seipsis, ut inquitunt, tacita cogitatione architectantur, quandoquidem res mathematicæ nullo motus genere impelluntur. At quæ copulis continentur, potentia & actu partim simplicia consistunt, partim distrahuntur. cum tamen initium, quoad initium est, quiescat, dum membrum quod cohæret, motum expedit. uerbi gratia, dum brachiū mouetur, gibber quiescit. dum lacerti motum agunt, humeri, dum tibia, genu, dum totum crus, coxendix. Certum igitur est cuiq; etiam parti opus esse in seipsa aliquid retinere, unde partis motæ initium proficiscatur, & cui innisa eadem illa in summa, & per partes moueatur: imò quies omnis interna ad id præstandum minus idonea est, nisi extrinsecus aliquid simpliciter adhibeatur, quod & quiescat, & omni uacet motu. Ac operæ prædium quidem erit accuratius æstimare sententiam, quam supra attulimus, propterea quod contemplationis genus eiusmodi attingit, quod non solum animalia cōprehendit, sed ipsius etiam uniuersi motum, & interitum. Si quidem ut intus quicquam condi debet, si ad motum animal exiturum est: ita extra potius aliquid statuendum est, in quo insitens moueatur. Nam si tanquam strato semper cesserit, ut muribus euenit, quotiescunque

per terram, aut arenam gradiuntur, nullos habebit progressus, nec gressus perage-
 tur, nisi terra habitu rigenti consistat: nec uolatus, aut natus concluditur, nisi uel
 aer, uel mare obnix relucetur. Atque id necessario aliud ab eo esse debet, quod
 motu exercetur, totumq; a toto. atque id, quod proprie omnis motus expers est, in
 nullam eius partem receptum est, quod motum obit. sin minus, idem motu desilet
 cuius rei testimonio esse potest id, quod in controuersia uersatur & cōtentione. cur
 si quis extra nauigium remo, aut alio instrumento malum propellat, nauigium nul-
 lo negocio moturus est. contrā si in eodem sit nauigio, & idipsum conetur, nullam
 mouendi facultatem habebit, nec sitirus, aut aquilones extra nauigium spirent. si
 modo casus ferat, ut quis eo modo uentum reddat, quo pictores facere uidemus, 10
 qui ex eodem nauigio uentum mitti pingunt. Nam siue leniter flatus spirat, siue ita
 uehementer, ut maxima uenti uis ingruat, siue aliud sit, quod projiciatur, uel impel-
 latur, necesse est primum, ut qui impellit, in sua aliqua parte quiescente insitens id
 præstet. Dein hanc ipsam partem, uel id cui pars adiungitur, quiescere externæ rei
 innisum. At qui nauigium impellere uolebat, cum ipse in nauigio esset, ad ipsumq;
 adhereret, optima ratione nauigij mouendi autor esse non poterat, quia necessitas
 præscribebat, ut id quiesceret, cuius innisu se sustinebat: cum tamen qui extrinse-
 cus ei uel impellendo, uel trahendo intentus erat, motus autor esse poterat, quoniam
 terra nulla nauigij pars habetur. Sed quæres, an si quid uniuersum agitât cœlum
 tantæq; molis gubernacula sustinet, omnis motus expers esse debeat, nec ulla cœli 20
 pars sit, nec in cœlo cōdatur. Nam siue idem ipsum cum mouetur, cœlum circum-
 agit, necesse est uolubilitatem eiusmodi cōficiat rem immotam attingens, quæ quæ-
 dem autoris motus nulla pars sit, atque si mouens immotum continuū est, nulla id
 dem pars fuerit eius, quod motu tenetur, & agitatione. Quinetiam qui memoris
 literisq; hæc mandant, illud scite tradunt, per globi conuersionem nullam omnis
 no partem quietem fouere, quandoquidem necesse esset, uel totum quiescere, uel
 factio partium diuortio illius distrahi continuum. Sed cum arbitrantur uertices nul-
 la præditos magnitudine quandam uersandi cœli habere facultatem, & extrema,
 & puncta inducunt, falsæ sententiæ se autores probant. Nam fieri non potest, ut
 quicquam ad huiusmodi uerticum naturam pertineat, & motus unus a duabus re- 30
 bus agatur, sed illi duos constituunt uertices. Ex hoc disceptationum genere addu-
 ci poteris, ut existimes aliquid omnino ita statui oportere ad uniuersam naturam,
 ut terra ad animantes habetur, & quæ per easdem ipsas animantes motus cōficiunt
 suos. At qui fabulose comminiscuntur Atlantem in terra pedes fixos habere, uidentur
 ex suo ipsorum commento fabulam finxisse perinde, ac ille dimetiens linea sit,
 & circum uertices cœlum torqueat, hoc autem ipsum recta euenit ratione, quoniam
 terra per quietem consistit perpetuam. Veruntamen huiusce sententiæ ad stipula-
 tores necessario confirmare debent eos ipsos uertices nullam uniuersi partem esse.
 Addo illud etiam, quod robur, motorisq; nisus ad rem quiescentem æqualiter re-
 spondere debet. Nam roboris & facultatis magnitudo est, qua sic id, quod quiescit, 40
 potest quiescere, ut id quod mouet, potest mouere. atque necessario quædam pro-
 portio, ut contrariæ motionis, ita quietis animo concipitur, motusq; aut facultates
 per exuperantiam uincuntur. Quapropter siue Atlas, siue mouens quid aliud sit
 ex ijs, quæ intra contineantur, nihilo minus oportet quietem reluctari, quam terra
 obtinet, aut terra de medio, suoq; ipsius loco diuelleretur. Ut enim impellens im-
 pellit: sic impulsus impelletur, atque adeo per tantundem roboris. Sed primum
 quiescens hoc est Atlas motum parit, idcirco robur maius, & uehementius erit,
 quam æqualis, & quieti par sit. Eodemq; modo se habebit robur eius, quod tam-
 etsi mouetur, tamen ipse non mouet, atque oportebit tantum facultatis superesse
 terræ

in quiescendo, quantum uniuerso cœlo, illiusq; motori, Quod si hoc fieri nequit, nulla itidem facultas suppetit, qua cœlum ab aliqua eiusmodi re intus condita motus incitationem nanciscatur. Sed tamen quæstio existit de partium cœlestium conuersionibus, quam ut instituat iam disputationis propriam, & cognatam æsumare poteris. nam si quis motionis ui terræ quietem excellerit, certum est illum e medio eam diuulsurum. nec minus constat robur, à quo ipsa uis proficiscitur, in infinitum non excursurum, cum neque terra infinita sit, ac propterea ne ipsa quidem terræ grauitas eiusmodi fuerit. Sed cum id, quod fieri non possit, multipliciter dicatur, propterea quod non eodem modo asserimus fieri non posse, ut uox à nobis cernatur, quo ea sunt, quæ in luna cōsistunt, cum alterum ex necessitate sit, alterū quamuis suapte natura aspectu pateat, id tamen nunquam cernitur. Cœlum uero immortale, & nequaquam dissolubile ex necessitate arbitramur. At si hæc recipiatur ratio, non ex necessitate id putabitur; siquidem motus maior suapte natura esse, atque contingere potest, eum dico à quo terra quiescit, & eum à quo ignis, & summum corpus uoluitur. Itaque si in rebus facultates uehementiores ijs, quas cœlum & terra obtinent, reperiuntur, cœlum & terra dissipabuntur à uehementiore facultate, quàm ea sit, quam utrunque obtinet. Sin tales non sint, possint tamen esse (in finitum enim haud incidit, quia nullum corpus in infinitum dimanat) profectò contingere poterit cœlum dissolui. Quid enim impedimenti interuenit, quo minus id consequatur? siquidem non potest non esse, at non posse non esse minime est, nisi contrarium sit necessarium. De huiusmodi ambiguitate alia instituetur oratio.

S E D utrum extra id, quod mouetur, quicquam collocandum est immotum, & quiescens, quod nulla eius pars sit, an secus? Et si hoc dederimus, an necesse est in uniuerso ita se rem habere: fortè enim per absurdum uideri poterit, si circumuectionis origo intus habeatur. Quapropter istam probantibus sententiam Homerus rectè cecinisse uideri potest:

Sed neque supremum in terram deducere cœlo

Vestra fouem uis ulla queat, non dēq; deæq;

Annisi quamquam, at libramini simul omnes.

10 Nam id, quod agitatione, & motu uacuum est, à nemine moueri potest. Vnde si ex principio pendet immoto, quæ olim proposita est controuersia, * explicabitur. utrum contingat cœli coagmentationem dissipari nec ne. Sed enim huiusmodi immotum principium non modo in animalibus condendum est, uerumetiam in ijs, quæ per locum motu duntur, ea designo, quæcunque seipsa moueant. Siquidem alia pars debet moueri, alia quiescere, cui id, quod mouetur, innisum motum persistit, ut si illud sit pars, quæ mouetur. Nam altera innititur, altera quiescit, inanima tamen in cōtentionem uenire possunt, utrum hæc quoq; necessariò in seipsis omnia principium quiescendi, & mouendi habeant, & in aliqua re extra quiescente insistant, an id fieri nequeat, ut ignis, ut terra, ut aliud quod anima orbatum sit. Inanimis quidem haud contingit, ut & quiescens res sit, sed in ipsis planè animalibus, à quibus inanima motum nanciscuntur. inanima enim omnia pulsū agitantur exter-
no. atque principium omnium, quæ ita agitantur, est, ut illa seipsa moueant. Et hæc quidem omnia, quæ de animantibus & inanimis dicere habuimus, necessariò probant illa & in seipsis, & extrà rem quiescētē habere, qua se sustentent, & firmant. At uero incertum est an quicquam superius sit, quod primum mouet. & omnino de huiusmodi initio alia suscipienda oratio. Animalia, quæ motu aguntur omnia externæ parti incubantia id præstant cum spirant, & expirant, nihil enim interest magnum proijcias pondus, an paruum. quod quidem faciunt qui despuunt, qui gussunt, qui spirant, & qui expirant. Sed in controuersiam quoq; trahitur, utrum

in animalī duntaxat cum per locum mouetur, quippīa debeat quiescere, an etiā cum ex se alterascit, & auctum recipit. De prima formatione, & interitu, longe alia afferenda est præceptio. si enim primus motus generationis, & interitus is est, quē exposuimus, hæc ipsa profectō causa explicabitur aliarū omnium motionū. & eo quidem magis, quod ut primus ille motus causa in uniuerso, sic in animalī, postq̃ absolutum est, statuitur: quapropter auctōnis etiā & alterationis, si modo idem sibi ipsi causa esse poterit. Quod si motus per locum alios non præcesserit, necesse non est aliquid statui quiescens in ijs, quæ ex se tum in alterationem incidunt, tum partium auctōnem recipiunt. Prima quidem auctōnis & alterationis genera alia ab re, & per alias inducuntur, cum tamen fieri non possit, ut idem sibi ipsi genera-
tionis, & interitus causa sit. motor enim rem mobilē, effector opificiū præcurrere debet. nihil autem seipso prius, & antiquius est. De anima, utrum illa moueatur nec ne: & si moueatur, quomodo id cōingat, proximē in ijs libris disputauimus, quibus naturā illius cōplexi sumus. Sed cum in anima omnia ab alijs motu cīant, (de primo autē eodemq̃ perpetuo mobili, qua ratione motu incitetur, & quo pa-
cto princeps motor agitur, in principis philosophiæ cōmentarijs disputauimus) reliquū est, ut explicemus, quo modo anima motū corpori afferat, & quodnam initium statuendum sit motionis animalī. Siquidem animata causam afferunt motui aliorū, præterq̃ ipsius uniuersi conuersioni, modō illa mutuos non præsent motus, quoniā inter se colliduntur. Quapropter omnes eorū motiones exitū habent,
animatorū enim sunt, quandoquidē animalia omnia alicuius rei causa & mouent, & mouentur: ita ut hoc ipsum constituat exitus cuiusq̃ motionis. At uidemus cogitationem, uisum, uoluntatem, selectionem, cupiditatem animalibus motū afferre. Hæc autē omnia ad mentem referuntur, & appetitiōnē. uisum enim, & sensus eandem, quam mens, obtinent sedem, cum omnia iudicandi & statuendi facultatē habeant. attamen eo discriminū genere separantur, quæ alio tradidimus loco. Voluntas, ira, cupiditas appetitiōni redduntur. Selectio cōmunis est cogitationis, & appetitiōnis. quapropter id etiā quod seligi potest, tale erit. cum non omne rationale seligi queat, sed rerū agendarū finis est: idcirco is, qui ita mouet, cōmodi & boni rationem obtinet. imō non omnis honestus est. nam quoad gratia huius, alius
est, & quoad finis est rerū, quæ rei alterius gratia sunt, eatenus mouet. Bonū quoq̃ ementū boni locum tenet, atq̃ iucundū tale etiā est, quandoquidē illud ementū bonū est. Constat igitur mobile perpetuū, partim simili modo à primo agitari motore, ut singula animalia ab re appetibili, partim alio modo. Ergo perpetuū obtinet motum, cum animalium impulsus exitu terminetur, & fine. id enim quod perpetuū est, pulchrum habetur: & quod re uera est, & prius, bonū statuitur. nec modo est, modo non est: ac omnino diuinius atq̃ nobilius est, quā ut quicquam aliud prius se habeat. Et certe primū immotū mouet, sed animal appetitū mouet: quæ ipsa etiā si moueatur, non tamen per locum mouetur. Ex his compertū est, idq̃ optima ratione, impulsus eorum, quæ oriuntur, ultimum eorum esse, quæ
prodeunt. animal enim motu agit, & ingreditur, uel appetitiōne, uel optiōne: alteratione tamen aliqua facta per sensum, aut uisum.

Quæ intelligit, quodam modo in actionē nunc incumbit, nunc non incumbit: & mouetur, nunc non mouetur. eodem sanē modo de rebus statuendū uidetur, quæ immotæ cogitatione cōprehendunt, & ratiocinatione colliguntur. Verum in his cōtemplatio finis est. nam ut duas homo percepit propositiones, cōclusionem excogitauit, eandemq̃ cōposuit. sed in ijs quæ geruntur, duabus à propositionibus conclusio ducitur, quæ eadem actio est. ut cum nouerit cuiq̃ hominī inceden-
dum

dum esse, & ipse homo primo quoque tempore incedit. Item si nulli incedendum sit homini, & ipse homo confestim quiescit. & hoc utrumque efficit, nisi ab aliquo uel prohibeatur, uel ad aliud cogatur. Commoda res cōficienda: ædes cōmodæ, & des primo quoque tempore architectatur. integumentum indigeo, id cuius indigeo, mihi cōficiendū: tunica indigeo, tunica cōficienda est. ita conclusio, quæ est, tunica cōficienda, actio & functio erit. Quinetiam sumpto initio à re, quæ principium operis est, agit. ut si tunica fuerit, necesse est principium antegressum esse, unumquodque aliud consequitur, & statim alterum cōficitur. Ex his probatur uolumus conclusionē esse notionem. Propositiones, quæ actionem afferunt, ex duplici genere cōnectuntur, rei cōmodæ, & eius, quæ fieri possit. ut qui disputant, & interrogant. hi enim comperitiorem omittunt propositionem, alteram uero proponunt, ut cogitatio quæ præest, nihil consideret. ita in rebus quæ geruntur accidit. ut si commodum sit homini incedere, certe non immoratur in agnoscendo se hominem esse. Quæcunque igitur alia, nulla ratiocinatione duce, agimus, celeriter agimus. nam postquam actionem, quæ cuius rei gratia notatur, suscepit uel sensu, uel uisu, uel mente, quæ primum actione, cuius desiderio flagrabat, fungitur, propterea quod loco interrogationis, uel notionis, munus appetitionis præstat. Cupiditas mihi dicitur ebibendum esse: tum uel sensus, uel uisum, uel mens subdit hocce potulentum esse: confestim illud hauritur. ita animalia impetum capiunt uel ad motum uel ad actionem. Et cum appetitio præcipua causa motus sit, eademque excitetur uel per sensum, uel per uisum, & notionem: & qui agunt, partim cupiditate, aut ira, partim appetitione, aut uoluntate concitantur: accidit, ut alia faciant, alia agant, non aliter quam ea opera quæ non alieno impulsu, sed sua sponte agitari uiuantur paruo excitato motu, laxis rotis, seque mutuò trudentibus. & quadrigæ, quæ ab auriga agitæ statim mouentur, & rursus in orbem uersantur, quoniam inæqualibus utuntur rotis: minor enim quasi cardo euadit, ut in cylindris sit: ita moueri animalia confirmamus. quippe quæ hisce instrumentis ornentur, & machinationibus instruuntur, hoc est neruorum, ossiumque natura, quandoquidem ossa, tanquam ligna & ferrum sunt: nerui tanquam rotæ, quibus laxatis & remissis motus agitur.

Veruntamen in operibus, quæ sua sponte mouentur, & in quadrigis, nulla suboritur alteratio, etiam si in orbem idem uertat. Cōtrā in animali idem tum ampliari, tum diminui, & faciem corporis uariare potest, partibus ex calore augescens, & iterum sese adstringentibus ob frigus, idemque alterationem contrahentibus. Visus, sensus, & consignatæ in animo notionēs cōmouent. sensus enim cum alterationes quædam sint, confestim inducuntur. Visum, & notio rerum agendarum uim obtinent. etenim species uel caloris, uel frigoris, & rei uel iucundæ, uel formidabilis mente percepta quodam modo talis agnoscitur, qualis res quæque est. idcirco notione solum affecti tum horrore, tum metu percussi uidemur. atque hæc omnia perturbationes, alterationesque haberi debent. Partium corporis, quæ per alterationem uariantur, alie augescunt, alie decrescunt. Nec uero dubium est, quin parua admodum initio facta mutatione, in corpore multiplices & longinquo uarietates suboriantur, ut cum per temonem paululum tralatum longe diuersa prorsus sitio uisitur. idem quoque effici uel per calorem, uel per frigus, uel per rem eiusdem generis aliam. Nam quoties in cor alteratio inducitur (etiam si in exigua eiusdem uisceris parte, quæ sensu minus pateat alteratio excitetur) toties multiplices corporis facies annotantur, e rubore, pallore, horrore, tremore, & rebus eiusmodi contrarijs. Ergo initium motionis quemadmodum præcepimus, res cōsecranda, & declinanda est, in ijs tamen, quæ geri, administrarique possint. Calor autem & frigus necessarii earum notionem, atque uisum cōsecrantur, quia res tristifica cuitari,

iucunda affectari solet. utrunqtamen tenuibus in rebus, id ualde obscurum est. tristitia enim iucunda est res ferè omnes cum frigore, aut calore occurrit. quod quidem ex animorum nostrorū perturbationibus colligitur. Etenim audacia, pavor, concubitus, & alij in corpore iuborientes motus tristitia, iucundi uel sunt partim in certis membris, partim in toto corpore. id est cum calore, aut frigore. At memoria, & spes ex usu eiusmodi motuum, quasi spectrorum nunc magis, nunc minus causæ eorum ipsorū sunt. Ratio igitur exigit, ut tam interiores partes formentur, quam partium instrumentariarum initia commutentur, ex concretis mollia & soluta, ex mollibus & solutis concreta. & mollia uicissim, & dura. Quæ cum ita commutentur, & uis quoque agendi, & patiendi ea natura prædita sit, quam sæpe indicauimus, cum accidit aliud patibile, aliud agens esse, & nihil ex ijs desideretur, quæ ad formam, & quid res sit pertineant, primo quoque tempore aliud agit, aliud patitur, ob eamque rem simul, ut ita dixerim, homo intelligit incedendum esse, & incedit, nisi fortè aliud impedimento sit. Instrumentariæ quidem partes congrue affectiones præparant, appetitio affectiones, appetitionem uisum. hoc autem uel ex sensu, uel ex notione efficitur. simulque & celeriter ipsa res euenit, quoniam principium agendi, & patiendi inter ea refertur, quæ mutuam habeant naturam.

PRINCEPS animalium motor necessariò in aliquo initio situs esse debet. Quin etiam exposuimus copulam ipsam alterius partis initium esse, alterius exitum, propterea efficitur, ut natura eiusmodi copula modo tanquam re singulari, modo tanquam duplici utatur, cum enim ex uno loco in alium motus agitur, necessitas cogit, ut extrema altera nota quiescat, altera moueatur. quandoquidem paulò ante probauimus id quod motum parit, in re quiescente se sustinere. Itaque extrema brachij pars mouetur, & non mouet, cum tamen gibberis inflexu pars, hoc est manus moueatur, quæ sanè cum toto brachio agitur. atque etiam necessariò aliquid constitutum est, quod facultate quidem singulare signum habeatur, sed actu duplex. idcirco si animal brachium esset, in gibbere profectò mouentis animæ originè locandam existimaremus. Et certe ut brachium ad gibberem se habet, ita contingit inanimata quedam, quorū de genere est bacillum, se ad manum habere, ut si bacillum moueat, perspicuū sit animam in neutro extremo consistere, neque in extrema rei mortæ parte, hoc est manu, neque in altero principio, hoc est bacillo. Hoc enim præ manu summam, tum infimam obtinet partem, ut hac saltem causa, nisi principii animæ mouens in bacillo cōdatur, neque in manu fuerit. nam summa ipsius manus pars ita ad brachiale comparatur, ut hæc pars ad gibberem, propterea quod nihil differunt partes, quæ coaluerint ab ijs, quæ non eiusmodi sunt. quippe cum ipsum bacillum ut pars separabilis euadit. Itaque necesse est illius sedem nulla origine contineri, quæ alterius sit finis. neque si aliud cum eo magis continens sit, ut principium extremæ bacilli partis in manu, huius in brachiale. Quod si in manu id non sit, nimirum in parte habebitur superiore. atque etiam gibbere quiescente tota inferior pars, quæ tamen continens sit, mouetur. Sed cum similiter cor ad membra tam dextra, quam sinistra se habeat, & per partes contraria membra ita agantur, ut neque ex perpetua quiete sinistra partis dextra moueatur, neque e contrario fiat, cum exordium à superiore ambarum partium loco semper ducatur, necesse est medio pectoris, hoc est cordi ipsam animæ mouentis originem reddi, quandoquidem ambarum extremorum medium est ultimum. Et hoc ipsum æque comparatur ad motiones superiorum, & inferiorum partium, ut ad lacertorum, & crurum, quorum origo est spina capitis, in ijs tamen, quibus illa dorsum perrepat, quod quidem omni etiam ratione probatur. sentientem enim facultatem hic locari oportere censemus, ita ut hoc loco, quo principium continetur, sensus opera alteratione affecto & immu-

tato partes proximæ adiuuent extentæ & contractæ. atque ita necessariò uel propter hanc ipsam causam motus animalibus agitur. Media sanè corporis pars, quæ quidem cor est, & in eo diffusi spiritus, quanquam una est, actu tamen plura reddatur necesse est, propterea quod lacerti & crura per partes motum nanciscuntur ab initio, & alteris quiescentibus, altera mouentur. exempli gratia, in A, B, C, ipsum B mouetur, mouet autem A, certe aliquid debet quiescere, si aliud mouendum est, aliud moturum. A igitur, quod unum potestate est, duo erit. itaque necesse est non punctum, sed quandam esse magnitudinem. Verum contingit C, per partes cum B moueri, ut necesse sit utrunque originis genus partium quæ in A impelluntur, 10 motum agere. Oportet igitur præter hæc principia aliud quicquam mouens esse, quod nullum subeat motum, innitantur extrema, & principia membrorum eorum quæ uicissim in A mouentur, ut si qui sint, qui ex dorsi innisus crura moueant. Enim uero id, quod utraque mouet, necessariò est. hoc nimirum anima erit, quæ quidem licet ab hac magnitudine sit diuersa, tamen in ea collocatur. sed è ratione, quæ probat motionis causam, appetitio est medium, quod mobile * mouet. In animatis planè corporibus, aliquod eiusmodi corpus inesse debet. Ergo id quod mouetur, nec mouere potest, alienas uires pati ualeat. Mouens item necessariò quadam facultate, & uigore niti debet, eoq; magis, quod animalia omnia partim natiuum hunc spiritum habent, partim eo uigent. atq; alio præcepimus loco quænam ratio salutis eiusmodi spiritus sit. At enim uidetur ille ipse spiritus æque ad uitalem originem se habere, ut nota in copulis expressa, quæ impellit & impellitur ad rem omnino immobilem. sed quando principium alijs in corde locatur, alijs in eo, quod cordi proportionem redditur, ideo natiuus quoque spiritus in eodem uidetur sedem tenere, aliaq; omnino instituenda oratio, utrum eiusmodi spiritus idem sit, an semper diuersus efficiatur. Idem de reliquis etiam partibus decernendum est, quippe cum appositæ ad uim mouendi, uigorisq; afferendi se habeant. Motionum opera sunt pulsus, & tractus. idcirco instrumentum & augescat, & corripatur par est. talis autem spiritus natura: nam in immensum contrahitur. atq; etiam coactrix & eandem ob causam impultrix est, & ad ignea grauitatem, ad contraria leuitatem obtinet. Enim uero id, 30 quod motionem per locum, non per alterationem allaturum est, debet uel grauitatem, uel leuitatem habere, quãdoquidem naturalia corpora per exuperantiam inter se primas tenent. Leue in infimum deprimitur à grauiori domitum, graue ad summum cõtendit ab leuiori expugnatum. Qua parte, quæ tamen moueatur, anima moueret, & quam ob causam tradidimus.

ANIMAL sanè ita cõstitutum esse iudicare debemus, ut ciuitatem legibus bene instructam, & temperatam, in hac enim postquam administrationis ratio semel instituta est, nihil oportet absentem principem rebus singulis, quæ gerantur, interesse. imò uero quisq; officijs fungitur suis ut mandatu est, & aliud post aliud ex consuetudine administratur, & instituto. In animalibus hoc ipsum tum per naturam efficiatur, tum quod singula, quæ ita constituentur, ad munera sua exequenda probe affecta sunt. Quodcirca opus non est in quoq; membro animam inesse, sed cum in certo principio consistat, & reliqua membra, quod illi adiungantur, uiuunt, atque officia per naturam obeunt sua. Expofuimus quemadmodum animalia uoluntarijs sese mouerent motionibus, & quas ob causas. Atqui non desunt quædam partes, quæ inuitis etiã motionibus agerentur, cum plurimæ non uoluntarijs agitentur. Motiones inuitas intelligo, quales cordis, & mēbri genitalis, quia sæpenumero ex occurſu rei illa sese mouet, quanquam mens nihil interea decernat, & statuat. Non uoluntarijs designo, quales somnum, uigiliam, spirationem, & reliquas eiusdem generis, quandoquidem nulli horum simpliciter aut uisum, aut appetitio præest,

Sed cum necesse sit animalia naturali quadam uariari alteratione, ideo* necesse est per occursum rei illa commoueri. Partium quæ alterationem contrahunt, aliæ augentur, aliæ diminuuntur. propterea non ex motu, & commutatione innatæ mutationes mutuò se sequuntur, & continentur. Naturales uero motionum causæ & partium prædictarum inuiti impulsus excitantur, ut alteratio inciderit. Siquidem notio, & uisum, ut supra docuimus, agentes pariunt affectiones, quia rerum agentium imagines effingunt, & afferunt. Inter omnes autem partes, cor & genitalis potissimum id perspicue agunt, quia utrumque membrum, tanquam abiunctum est animal. A huiusce quidem rei causam asserimus humorem, qui in utroque uitalis continetur. In corde quam ob rem id fiat, causa patet, quia sensuum principatus ei deferitur. In genitali membro, quoniam tale signum est. ex eodem enim ipso uis genitalis seminis quasi animal quoddam promittitur. Optima igitur ratione motiunculæ à partibus ad initium, & ab initio ad partes contendunt, atque ita se mutuò petunt. Siquidem A, initium intelligi debet, propterea motiunculæ pro ratione singulorum elementorum, quæ adscripsimus, ad initium perueniunt, & ab initio, quod mouetur, & commutatur, quandoquidem potestate B, initium multa est, ad B. & C, ad C. B autem & C, ad B & C. à B, ad C, non potest itur, sed à B, ad A, ut ad initium pergitur: ab A, uero ad C, ut ab initio. Præterea in iisdem percipiendis aliquando motus suboritur, quæ præter rationem partes occupat, aliquando non suboritur. Causa inde ducitur, quod paribilis materia modo non subleuat¹⁰ nitur, modo non tanta, aut talis substernitur, ut motum nauare possit.

De partibus per singula animalium genera, & de anima disputauimus. item causas sensus, & sensilium, memoriæ & reminiscentiæ, somni & uigiliæ, communisq; animæ motum¹⁵ nis reddidimus. Reliquum est ut ortus persequamur.

LIBRI DE COMMUNI ANIMALIUM
MOTV, FINIS.

A bdomen, uel fumen, seu imus uēter, τὸ πύλον	κρόσσος.	aquila,	ὁ ἀετὴρ.
abomatum, τὸ ἄνυστον.	albumē oui, τὸ λευκὸν ὄνυ.	aquila fulua, ὁ μελανοπτερος.	
abortiones, οἱ ἰκτυομαί.	alcyon, ἡ ἀλκυόν.	aquila morphna, ὁ μορφνός.	
abortus, ἡ ἀμβλυσις.	alofa piscis, ἡ θελισσα.	Theodorus ait παυῖα δια	
acari, τὰ ἀκαρεῖ, candidū aīal, quod in lignis nascitur.	aluco, ὁ ἑλκος.	ci posse.	
accipenser, ὁ ἰσάψ.	aluus, utriculus, sinus, uen	aquila marina auis, ὁ	
accipiter, ὁ ἰέραξ.	ter, ἡ κοιλία.	ἀλιαιπτερος.	
accipiter fringillarius, ὁ ασι	aluus, ἡ κοιλία καὶ στω.	aquila aquatica, ὁ ἀντὶς ἐτιῶ.	
ζιας ἰέραξ.	ambidexter, ὁ ἀμ. ἀμ.	aquilæ species, quæ ueræ,	
accipiter palumbarius, ὁ	ἀνίας, ὁ ἐργονόμος. alibi brēthθ.	& germanæ dicuntur, οἱ	
φασσάφονος.	anas, ἡ νῆψ.	γνήσιοι ἀπὸ τοῦ.	
accipiter pernix dictus, ὁ	anataria aquila, quæ & plan	aquila leporaria, λεγομένη φόνος	
πύρρος ἰέραξ.	ca morphna, seu παυια,	αντος.	
accipiter stellaris, ὁ ἀστερίας	angina, ἡ πνεύμων.	araneus, ὁ ἀράχνης.	
ἰέραξ.	angulus oculi, ὁ κανθός.	archanus, uel archanus pis	
acheræ, οἱ ἄχρηται, cicadae	anguilla, ἡ ἰχθυόνη.	scis, ὁ ἀρχαῖος.	
rum species, arguas alibi	animal, τὸ ζῶον.	arcus piscis, ἡ βελόνη.	
Theodorus interpretat.	anser, ὁ χίμν.	ardeola, ὁ ὀρθοδίδος.	
achilleæ spōgiæ, οἱ ἄχιλλαιοι	antennæ, pars scilicet in tas	arenidum, seu arenulentū,	
σπῶγχοι.	lis superior, αἱ κροῖαι.	τὸ ψαθυρόν.	
acia insectum, τὸ πελιδνόν.	antiæ, τὸ περιώμιον.	argatilis, ἡ ἀκαυθάλις, quæ	
aculeati fuci, οἱ ἀκροῦντες ἀκροῦ	anthias, ὁ ἀνθίας, facer piscis,	& spinus, siue ligninus	
aculeus, τὸ ἀκύντρον. (nos.	græce quoq; ἰσθὸς ἄχνης.	auis.	
acus piscis, ἡ βελόνη.	anus, uel podex, ὁ ἄρχος.	aries, ὁ κροῖος.	
adeps, axungia, ἡ πεμυλῆ.	aorta uena, ἡ ἀορτή.	arista, uel aristula piscis, ἡ	
adminicula rami in ceruo	aper piscis achelofluuij pe	ἀσπίς.	
rū cornib, qui imi pēdent	cularis, & aper syluestris	arteria, ἡ ἀρτηρία.	
ante frontē, οἱ ἀμωτῆρες.	ὁ κῆπος.	articulus, ὁ κύνδινος.	
adrianæ gallinæ, ὁ ἀδριανικὸς	apes apedis auicula, ἡ ἀπὸ τοῦ	ascalaphus auis, ὁ ἀσκά	
ἀλκυονεΐδης.	ἀποδίδος.	λαφος.	
ægithus, ὁ αἰγίθος.	apex, crista, ὁ λόφος.	ascaris, ἡ ἀσκαρίς, lumbrici	
æquamētū, uel discriminē ca	aphareus pinula, sub thyn	species. tipulam alibi in	
pillorū, τὸ λύνσυμα τῶν ἰχθύων	ni uentre, ὁ ἀφάρδος.	interpretatur.	
ætalo accipitris spēs, ὁ αἰστέ	apis, ἡ μελισσά.	asellus piscis, ὁ ὄνος.	
ætolius auis, ὁ αἰτωλός. (λαμ	apū rex, βασιλεὺς τῆς μελισσῆς.	asilus, ὁ αἰσπός.	
agnationes, αἱ ἀγναφύσεις.	aplua, ἡ ἀφύνη.	asinus, & asina, ὁ κύν ἡ ὄνος.	
ala, ἡ πτερύγη, καὶ ἡ μαχαίρα.	aplytias, ἡ ἀπλυσις, spōgiæ	asinus Indicus, ὄνος ἰνδικός.	
alauda, ἡ κόρνος κροῖον. quæ	genus, illotariam Theo	asio, auis nocturna, ὁ ἀσάψ.	
αὐτῆς galerita dicif, græco	dorus interpretatur.	aspis serpens, ἡ ἀσπίς.	
noīe proprio carere uide	apria, quæ scrophis excidif	attagena auis, ὁ ἀττήνη.	
tur. λόφος enim ἔχοντες	cum castratur. ἡ κερπία.	attendo neruus, ὁ ἐπίπυμος.	
Aristoteles uocat.	apria, ἡ κερπία, uirus suum,	atherina piscis, ἡ ἀθηρίνη.	
alba, τὰ λευκὰ.	q̄le equorū hippomanes.	airamentum, ὁ θέλος. alibi	
alba auis ex ardeolarum ge	appēdix, ἡ ἀπεφύαξ καὶ ἡ φούξ.	thalis.	
nere, ὁ λευκός.	aquaticulus, τὸ ἐπίπυμον.	atricapilla auis, μελαγχρῶ	
albardeola auis, ὁ λευ	aquatile, τὸ ὄνυδρον.	ευρος.	
		auditus, ἡ ἀκοή.	

auis rex auicula, ὁ πρίστυς.
alibi senatorē interpretat̃
auiculā scilicet, quæ eadē
cum Trochilo.

avis, ἡ ὄρνις.
aurata, ὁ χρυσοφόρος.
aurelia, ἡ χρυσαλὶς.
auriuc̃tis auis, ὁ χρυσομύτις.
auris, τὸ οὖς.
auxuma, ἡ αὐξίς. idē quod
scordula.

B Alana, ἡ φάλανα.
balerus piscis, ὁ βάλωρος.
barba, seu mētū, τὸ γένιον.
bilis flaua, ἡ χοληλευθός.
bilis atra, ἡ χολημέλαινα.
bilis, fel, ἡ χολή.
bisulca, τὰ δισυχελά.
blatta, ἡ περασποκρυίς.
bolitæna polytipi species, ἡ
βολιτæνα.

bombyx, ὁ βομβύλιος. insecti
genus.

bonafius, qui & monapios
fera est, ὁ δονάσιος.
bosca auis, ἡ βόσκα.

bos, & uacca, ὁ βὺς ἢ βός.
bos aquatilis, ὁ βός.

brachium, ὁ βραχίον.
brachia citri, αἱ πλεκτάναι.

branchiæ, τὰ βραγχία.
brenthus, ἡ βρενθός.

brissus echinorum species,
ὁ βριστός.

brucus, ὁ ἀπὶ λαβός.
bubalus, ἡ βουβαλὶς.

bubo, ὁ βούβω.
buccina, species testa inte-

ctorum, ὁ κήρυξ.
buteo, accipitris gen^o, trior

cha etiam a testiculorum
numero, ὁ τριόρχος.

C Accabare, perdicum
uox, κκακκβίζον.

calcar, siue aculeus, τὸ
πυλκτρον.

calcarigera, τὰ πλάκτοφόρα.
calidris auis, ὁ καλιδρις.

calua, τὸ κρουίον.
caluaria, τὸ βριγμα.

caluæ pars serrata, ἡ βραχίς.
caluitium, ἡ φαιλαρότης.

calx, ἡ πῆρρα.
camelus, ἡ κάμηλος.

cancer, ὁ καρκίνος.
cancellus, τὸ περκίνιον.

candidū, siue albugo oculi,
τὸ λευκόν.

candidi, οἱ λευκοί.
caniculæ pisces, τὰ σπύλια.

canicipites, οἱ κωστοπτεροί.
canis, ὁ κύς ἢ κύων.

canire, σκυλάειν.
cantharus scarabeus, ὁ κίων.

capella auis, ἡ αἰξ. (βαρ^{ος}).
capillus, pillus, uillus, ἡ βριξίς.

capito, piscis e mugilum ge-
nere, mugilem etiam alit̃

bi interpretat̃, ὁ κίφαλος.
capra, ἡ αἰξ, ὁ σαρκαός.

capriceps auis, ὁ αἰγοκέ-
φαλος.

caprimulgus auis, ὁ αἰγώ-
caprite, τρυγίσα. (θρίλας).

caput, ἡ κεφαλή.
carduelus, ἡ θρανπίς.

caro, ἡ σάρξ.
carulus auis, ὁ κήρυκος.

cartilago, ὁ χόνδρος.
cartilaginea, τὰ σκληρά.

caseus, ὁ τυρός.
catarrhacta auis, ὁ κα-

ταρράκτις.
cataraetes auis, ὁ κατε-

ρίκτις.
catellus, τὸ σκυλάκιον.

catulus, ὁ σκύνιον.
catus, ἡ γαλή.

catus syluest. ἡ γαλήνη.
cauda, τὸ ὀσπύνιον, ἡ κερκίς.

caulis in pennis, ὁ κευλός.
caulium, τὸ κευλίον.

cebus, ὁ βούβω.
ceciliæ serpentes, αἱ τυ-

φλίνας ὄφεις.
cella apum, ὁ πυλκτρος.

centipes, & marina quoc^o,
ui terrestris, qui & cen-

tipeda, ἡ σκολόπενδρα.
cerago siue ceres, ἡ κερειθός.

cerebrum, ὁ ἐγκέφαλος.
cerebellum, ὁ ἐπιγυκαλός.

cernua piscis, ὁ ὀρφός.
ceruus piscis, ἡ σμαρίς.

certhia auis, ὁ κερθίος.
ceruleus auis, ὁ κύνιος.

cerui, cum primum eis cor-
nua prodire incipiunt, αἱ

παθηλαίαι.
ceruus, ὁ κύνις ἢ ἐλαφός.

ceruix uulue pars, ὁ ὀρφόρος.
ceruix uellix, ὁ κευλός.

ceruix, ἡ ἐκρυμνίς.
cetus cete, τὸ κάτος.

chalcis auis, ἡ χελκίς.
Homerus meminit.

chalcida animal, lacerti fer-
me species, ἡ χελκίς.

chama e testa itectis, ἡ χήμα.
chamaeleon, ὁ χαμαιλιον.

chronus, ὁ χρόνις, χρομὶς
etiam καὶ χρομὶς.

chrysalis, ἡ χρυσάλις. Theo-
dorus interpretat̃ aureliā.

cicada sitæ mutæ alibi, τὰ
τυλινόνια.

cicada, ὁ τυλινός.
cicatrix, ἡ ὀλθ.

cicindela, ἡ πυγολαμπίς.
ciconia mōtana aquilæ spe-

cies, ὁ ὀραπιλαργός.
cicum, ὁ τυκτικωργός.

cilia, palpebra, αἱ βλε-

cimex, ἡ κόρις. (φαρίδα).
cina momus auis in Arabia

ὁ κινάμομος.
cinchus auis, ὁ κύνχλος.

cinctus, τὸ διαζωμα.
circus accipiter, ὁ κύρτος.

citrus insectū, ὁ βίτριον.
clauicula humerus, ἡ κλίσ.

clerus, uermiculus insectis
apum alucara, qui & py-

rausta, ἡ κλίσκος.
coagulum, ἡ πυκνίς.

cocalia species e testa itectis,
τὰ κοκάλια.

cochlea, turbo, ὁ σπείρης.
cochlea

cochlea, ὁ κόχλος.
coitus, ἡ ὄχησις.
cholago, ἡ χολάσις.
colaris avis, ὁ κολαρίσις.
coles, ὁ κολήσις.
colliquamentum, quod ex
incremēto fecerunt re-
soluēte pręter naturā, τὸ
συνήγμα.
colostia, αἱ τροφαλίσθες.
colota avis, ἡ κολοτά.
colum, ὁ ἰδιόμορ, τὸ πῶλον.
collum, ὁ τραχήλος, ὁ ἀντήμι.
columba, ἡ πτερυγία.
columella, ἡ κώνη.
colluria avis, ὁ κολυρίσις.
commotis excrementum
quoddam cerę, ἡ μέστις.
conger, ὁ κόγγρος.
confidium in augurū dīci
plina, ἡ συνήθεια.
conuulsio, ὁ σπασμός.
copula, amentum, τὸ ἄμμα.
cor, ἡ καρδία.
cordula, alibi cordulum.
copiscis, ὁ κόρδινος.
cornix, ἡ κερύντις.
cornu, τὸ κέρας.
cornua partes in uulua, τὰ
κέρατα.
cortex, ἡ φελίς.
coruus, ὁ κόρως.
colli, σκώληκες ἐκ τῶν δίνων
δραμῶν, ita Theodorus in-
terpretatur eos, quos pi-
ci martij uenantur.
costa, ἡ πλωδία.
coturnix, ἡ ἄρτυξ.
coxa, nates, clunis, canis in-
talis, pars tali scilicet, τὸ
ἰσχίον.
coxa uel acetabulum, ἡ κῶ-
τυλιδία.
ctabro, ὁ ἀνθρίσις, ἡ ἀνθρίσις.
crangines genus squillę,
αἱ κράγγες.
crex avis, ἡ κρέξ.
crista, τὸ κάλλιον.
ctocodilus, ὁ κροκόδειλος.
cristata, quibus crista pro

tegmine est, τὰ μελαπύ-
τρακα.
crustula polentis obducta
uetula, ἡ χρεύς.
cubitus, ὁ πῆχυς, ἡ ἀγκύρα.
cuculus piscis, ὁ κύκλυς.
cuculus
avis, ὁ κύκλυς.
cucurrit gallinacei gene-
ris est, ὁ κικυρίζων.
culex qui mulio dicitur, ὁ
κνίψ.
culex, mulio, ἡ ἱμπίς.
culex, ὁ κωνίψ.
culicilega avis, ὁ κνιπολόγος.
cūculus lepus, ὁ δεισύνος.
cursor piscis, ὁ δρομέας.
curuca, ἡ ἱπλιάς, alibi ἡ ὑπο-
λάς.
cutis, τὸ δέρμα.
cutē pro pennis habenna,
τὰ δερμόπτερα.
cynchramus avis, ὁ κύν-
χραμος.
cynocephali, οἱ κυνοκέφαλοι
cyprius piscis, ὁ κυπρίσις.
cypsellus auricula, quę ca-
dem cum apodibus est,
ὁ κυψέλλος.

D

Dama, ἡ πρόβα.
Dasquyllus piscis, ὁ
δάσκυλλος.
delatio, ἡ φερέ.
delphin, ὁ δελφίς.
dens, ὁ ὀδόντος.
dentes asini ex quibus æ-
tas dignoscitur, οἱ γνῶμα-
τες, gnomones.
dentes maxillares, οἱ ὀδόν-
τες γνάθιοι.
dētibus serratis animalia,
τὰ κερκχιρόδοντα.
dentes qui gemini dicun-
tur, οἱ κραιτύρις.
dentes canini, οἱ κυνοδόντες.
dēnibus exertis animalia,
τὰ χαυλιόδοντα.
dētes exertī, οἱ χαυλιόδοντες.
dētati utrinque, ὁ ἀμφόδων.
dentex, ὁ συνόδων ὁ συνή

γρίς.
depes, ὁ κακώποψ.
diarium, τὸ ἰσθμειον.
digitus, ὁ δάκτυλος.
dissidium in augurū dīci
plina, ἡ ἀνείθεια.
dissimulare, τὸ ἀπομοιασιεῖν.
dodrās mensura, ἡ πωλασά.
dorsum, ὁ νῶτος.
draco serpens, ὁ δράκων.
draco piscis, ὁ δράκων.
dygnis animal, quod &
chalcidē appellant, ἡ δυν-
γρίς.

E

Echinus aquatilis,
ὁ ἐχίνος.
effluxio, ἡ ἐκρυσσις.
eiecticia oua, τὰ ἐκβόλι-
μα ὠά.
Eledona, polypī species,
ἡ ἐλεδὼν.
eleginus piscis, ὁ ἐλινγίνος.
elephas, ὁ ἐλεφας.
encraulus, ὁ ἐγκραυλος.
eripetrum, ὁ ἐριπίτρυς.
epiulus papilio, qui luceta-
narum luminibus aduo-
lat, ὁ ἐπιόλος.
epitragæ pisces, οἱ ἐπιτρα-
γίαι.
ephemerū diarium, τὸ ἰσθ-
μειον.
eques formica, ὁ ἱππομήν-
της.
ephemerū diarium, τὸ ἰσθ-
μειον.
eques formica, ὁ ἱππομήν-
της.
equus, equa, ὁ κῶν ἡ ἵππος.
equus fluuiatilis, ἱππος
ποτάμιος.
equicetus, ὁ ἱπποκέφαλος.
equire, ἱππομανῆς.
equimulgi, ὁ ἱππομόλις.
equifelis, ὁ ἱπποφύρας.
enica piscis spuria, ἡ χελώνη.
enithaca, ἡ ἐνιθάκη.
eruca, ἡ κερκχίς.
eruum, ὁ ἐρεβος.
etelis piscis, ἡ ἐτελίς.
excaule, ὁ ἀκαυλιον.
excremēta, τὰ περιττώματα
τὸ ἀπυον.
expes,

Facies, τὸ πρόσωπον.
falcula, seu riparia, ἡ
ὁρμητὶς.

fauago purpurarum, ἡ μὲν
λακέρια.

fauare, κενεῖσθαι.

fauces gutturis, ὁ φάρυγξ.

fauus, τὸ κερίον.

fel, bilis, ἡ χολή.

felis, ὁ αἰλουρος.

femen, femur, ὁ μηρὸς.

fiber, ὁ κάπρος.

fibra, ἡ ἵψ, καὶ ὁ ἵος.

fibula ossis nomē, ἡ τρήνη.

ficarius culex, ὁ ψέξ.

ficedula auis, ἡ συκαλίς.

fidicula piscis, ὁ κιδάρης.

filipes, τὸ χιτῶν περὶ καὶ τὸ
ὑπόπερ.

florus auis, ὁ κῦδ.

flos ætatis, ἡ ἀκμή.

fluctiones, τὰ ῥέματα.

fluta, spargus, ἡ ῥύαξ.

fluiale, τὸ ποταμίον.

fluxio, ἡ ἐκροσις.

foemina, τὸ θῆλυ.

foetus, partus, τὸ ἐμβρυον.

forcipaiū pedis forceps un
gula, ἡ χυλὴ.

formago, ἡ τρυφαλίς.

formica, ὁ μύρμηξ.

fringilla auis, ἡ αἰζὴ.

fringillarius accipiter, ὁ
αἰκίτης ἱέραξ.

fringillago pari species, ὁ
αἰκίτης αἰγιδάλος.

frons, τὸ μέτωπον.

frugilega auis, ὁ αὐτομο-
λόγος.

fuca parua, piscis, τὸ φυνίον.

fuca piscis, ἡ φυνίς.

fuci, qui inter apes degūt,
οἱ κωφίωτες.

fulica, ὁ κίπρος.

fullo, insectum quoddam;
ὁ κέρκρος.

fullo piscis, ὁ ψύλλος.

fur apis species, ὁ φάρ.

fulaneī piscēs, quod fulmī

retibus captantur, ē quis
bus thunni, passerēs, &
alij, οἱ χύδοι ἰχθύες.
fusus agrestis, ἡ ἀρκατυλίς.

G Alades, concharum
species, αἱ γαλάδες.

galena, ἡ μορίβλασσα.

galgulus, ὁ κολίος. alibi ὁ κί-
λίος. alibi ὁ κολίος.

gallina, ἡ ἀλκυωνίς.

gallinaccus, ὁ ἀλκυωνίς.

gallinago auis, ὁ σκολόπαξ.

alibi σκολόπαξ.

gammari, οἱ ἀσπκοί.

gauia auis, ὁ λάρος.

gena, ἡ γνάθος.

genitura, ἡ γονή.

genu, τὸ γόνυ.

germanæ aquilæ, οἱ γηρῆες.

gibbæ genus squillæ, αἱ
κύφαες.

giber, τὸ ὀλεκτραν.

gingiua, τὸ οὐλον.

ginnus innus, ὁ γιννός.

gladius piscis, ὁ ξιφίς.

gladiolus, qui loliginum
corpore continet, τὸ ξίφος.

glan, qui et hyena ὁ γλαυκός.

glans penis extrema pars,
ὁ βάλανος.

glans ē testaceo genere a-
quatile animal, ὁ βάλανος.

glaucus piscis, ὁ γλαυκός.

glites, αἱ ἑλαιοί.

gobio, ὁ κωβίος.

gobionaria, ἡ κωβίτης.

gula, ὁ στόμαχος. καὶ ὁ οἶσος φάρυγξ.

gurgulio, ὁ γαρρυκαίον.

gustus, ἡ γούσις.

guttur, ὁ λάρυγξ.

graculus piscis, ὁ κερκίνος.

graculus ē monedularum
genere auis. ὁ κερκίς.

gregale, τὸ ἀγλαίον.

grellile, τὸ πορδύπνον.

grus, ὁ γέρωνος.

H Aleculæ, τὰ μακρίδια.
halco mæna, ἡ μαινίς.
halcedon, ἡ ἀλκυωνίς.
halofachneffos maris, ἡ
ἀλυσάχνη.

hamix, αἱ ἁμίαι.

harpa auis, ἡ ἄρπη.

heledon a polypi species,
ἡ ἑλεδών.

hemina dimidium, τὸ ἡ-
μισυ.

herinacei, οἱ ἑρῖνοι χερσαῖοι.

hiatula, ἡ χένη.

hinoulus, ὁ κιδάρης.

hippardium, τὸ ἵππαρδιον.

hippeus cacti genus, eques,
ὁ ἵππος.

hippomanes, τὸ ἵππομανε.

hircinæ capræ, quæ genita
le habent maris, & iocemī-
næ, αἱ τρέχουσιν αἰγίς.

hircus spongiæ genus, ὁ
τρεῖς.

hircus ὁ τρεῖς, ita etiā appel-
lantur mænæ, siue haleces

mares cum foetu impleri
foemina incipit.

hirsuties, ἡ ἀσπύτης.

hirundo marina, & terre-
stris, ἡ χυλιδίον.

homo, ὁ καὶ ἡ ἀνθρωπότης, τὸ
ἄνθρωπον.

hordeaceo morbus equo-
rum, ὁ κελίς.

humerus, ὁ ὤμος.

humeralis neruus, ὁ ὤμος.

hyæna, ἡ ὕαινα.

hyperina, id est effœta pro-
pter nimium partum, ὁ
καὶ ἡ ὑπέρητος.

hypochondrium seu sub-
cartilagineum, τὸ ὑπο-
χόνδριον.

hystrix, ὁ ὕσρις.

I Bis auis, ἡ βίς.

Ichneumon, uespæ spe-
cies, & quadrupes ani-
mal

maſ,	ὁ ἄνδρ μου.	lana,	τὸ ἔργον.	mamma,	ὁ μαστός.
iecur,	τὸ ἥπαρ.	latax,	ὁ λάταξ.	mandibula,	ἡ γνάθος.
iecorinus piſcis,	ὁ ἡπαρὶς.	latera,	τὰ πλάγια.	manus,	ἡ χεὶρ.
iecoraria uena,	ἡ ἡπαρτίτις.	leena,	ἡ λισσένα.	mantichoras,	ὁ μαντιχώρας.
ieiunum inter inteſtina,	ἡ νηστεία.	lendes,	οἱ κνίσιδες.	marinum,	τὸ θαλάττιον.
ientaculum,	τὸ ἀνράτισμα.	lentor,	ἡ γλυκρότης.	marini piſces,	οἱ μαρίνοι.
ignaria auis,	ἡ πυρραλία.	leo,	ὁ λέων.	maſice,	αἱ ἀμφορόειδες.
ileus morbus inteſtini in e-		lepus,	ὁ λαγός.	matrix,	ἡ μήτρα.
quis,	ὁ ἀλῖος.	leporaria aquila,	ὁ λαγωφό-	matrices i ueſparū genere,	
iliacus ex turdorū genere,	ἡ ἰλιάς.	nos αἰτὸς.	ros αἰτὸς.	sunt ueluti duces, αἱ μῆτραι.	
ilia,	οἱ λαγόνες.	leuiraia piſcis,	ὁ λευράτης.	matrix auis,	ἡ ὀρνυχομήτρα.
improlis, inſeminis, ὁ ἀγονος.	ὁς.	leuis muſtelus,	ὁ λῆος γαλι-	maxilla,	ἡ σιαγών.
inceſſus,	ἡ πορεία.	libella piſcis,	ἡ βύλαινα.	maxillares dētes,	οἱ γόμφιοι
incubitus,	ὁ ἐπαισμός.	libyus, alibi lædus, ὁ λιβνός.		medulla,	ὁ μνῆλος.
ingluuius,	ὁ πρὸ λυδοῦς.	lien,	ὁ σπλῆν.	meleagris auis,	ἡ μελισσάχρῖς.
ingreſſio,	ἡ διέδοσις.	limaria uena,	ἡ σπληνίτις.	membras, adis,	ἡ ἀρσῆς.
inguen,	ὁ βυβών.	ligula,	ἡ ὑδὶ γλωττίς.	membra,	τὰ μέλη.
innus,	ὁ γίννος.	ligurinus auis, ſiue ſpinus,		membranis ſiccis uolātia,	
inſecta,	τὰ ὄντμα.	limaces umbilici, οἱ κελύαι.		τὰ πηλιδά.	
internodium in digitis,	ἡ φάλαγξ.	limoſa, limaria,	ἡ πηλαιμία.	membranæ, quibus foetus	
inteſtinum,	τὸ ὄντορον.	lingua,	ἡ γλῶττις.	inuoluitur,	οἱ ὑμνῆς.
iuba,	ἡ χυάτη.	lingulaca auis,	ἡ γλωττίς.	mēbrana cerebri cuſtos,	ἡ
iugale offis nomē, αἱ κλῖσιδες.		lituus piſcis,	ὁ θῖς.	membrana, ὁ ὑμν.	(μῆνις).
iugulum,	ἡ σφαγίς.	liuia colūbæ ſpecies à liuo-		membrana,	ὁ ὑμν.
iugulares uenæ, αἱ σφαγίτι-		re dicta,	ἡ πηλαιμία.	menſis, id eſt menſtrua pur-	
de,		locuſta,	ὁ κέρκεβος.	gatio,	τὸ κατὰ μῆνον.
iulia piſcis,	ἡ ἰυλία.	loligo,	ἡ λολίγος.	menſtrua,	τὰ κατὰ μῆνον.
iulus,	ὁ ἰυλος.	lolij,	οἱ τυνθοί.	mentum, barba, τὸ γένειον.	
iumentū ueterinū,	τὰ λέ-	lumbi, ἡ ὀσφύς, καὶ αἱ ψοιᾶ.		mergus,	ἡ αἰδύα.
φρον.		lupus piſcis,	ὁ λάβραξ.	merops auis, apiaſtrum uo-	
lunco auis,	ὁ χοϊνικλος.	lupus animal,	ὁ λύκος.	catur,	ὁ μέροψ.
alibi	ὁ χοϊνίαν.	lupus auis,	ὁ λύκος.	merula, & auis & piſcis,	ὁ
iouenca, ἡ νιότης, ut αλεκτο-		lupus ex inſectis,	ὁ λύκος.	ποτήνφος.	
είδων αἱ νιότης, gallinæ		lupus ceruarius,	ὁ περὶ ἄγρου.	metachœrum leſus ſuis foe-	
iouencae, nouella alibi.		luſcinia,	ἡ αἰδύα.	tus, poſthumū, alibi apor-	
		lutaria.	αἱ ἀμμόνιδες.	cellum,	τὸ μετὰ χοῖρον.
		lutea auis luteus, ὁ χλωρόν.		miluus,	ὁ ἰκτινός.
		luteola auis lutea,	ἡ χλωρό.	mingentia ex auerſo,	τὰ
		lutra,	ἡ ὄντορις.	ἐπιδιπρωτικά καὶ τὰ ἐμπροσθὶ	
		lynx,	ἡ λύνξ.	ρηκτα.	
		lyra piſcis,	ἡ λυρά.	miſcella, miſtio, ἡ σύνκμις.	
				mitulus eſt i tectis,	ὁ μῦς.
				mola,	ἡ μύλη.
				moles,	ὁ ὄγκος.
				molliia,	τὰ μαλακία.
				molliceps auis,	ὁ μαλακίον.
					κρεπόν.
				monedula auis,	ὁ κολοίος.
				monedula piſcis,	ἡ κελύα.
					Ec 2

L Abeo piſcis eſt mugilū genere, ὁ χέλιον, alibi χαλῶν.

labrum, τὸ χεῖλος.

lac, τὸ γάλα.

lacertus piſcis, ὁ σαύρο.

lacertus, ὁ σαύρος.

lacerta, ὁ σαύρα.

lacſes, τὸ μισοντίειον.

lacuſtre, τὸ πελμακίον.

lamia piſcis eſt cartilaginea

ia, ἡ λαμία.

M Aia cancrorū gene-
ris, αἱ μύλαι.
malida aſinorum quidam
morbus, ἡ μάλις.
malleolus, τὸ σφυρόν.
malleolū piſcis, ὁ σφυραίν.

monstrum, τὸ τέρας.
 monstifringilla avis, ὁ ἐρ-
 σωίτης.
 mormur piscis, ὁ μόρμυρος.
 musco piscis ē mugilum ge-
 nere, ὁ μύζωμ, alibi
 μύζωμ.
 mugil, ὁ κισσολύς.
 mulio,
 mulus, ὁ ἡμίονος, ὁ ὄρδύς.
 mulus piscis, ἡ ἐρίγλα.
 multifidus, πολυποσίδης.
 muræna, ἡ μύρανα.
 murices, αἱ ἀκρίβειαι.
 murinus piscis, ὁ μύρινος.
 murus piscis, ὁ μύρος. mas
 in murænis.
 mus aquatilis, uel testudo
 lutaria, ὁ ἑμύς, ἢ ὁ ἑμύς.
 mus terrestris & aquatilis,
 ὁ μύς.
 mus ponticus, μύς πον-
 τικὸς ὁ.
 musca, ἡ μύα.
 musculus piscis, ὁ μυσι-
 κούτης.
 mustax, ἡ ὑπὸ πτε-
 μου.
 mustellus spinax, ὁ ἀκρενθί-
 ας γαλιός.
 mustellus nebris, ὁ γαλιός.
 mustella, ἡ γαλιή. (μελέα).
 mutis, ἡ μυντις, quæ et mύς
 καὶ, id est papauer appel-
 latur.

N

Naris promusculis eti-
 am in elephante, ὁ
 μυκτῆρ.
 natus, ἡ βίς.
 natatio, ἡ δύσις.
 natatilis, τὸ δύσινον.
 nates, ὁ γλοτίς.
 natex, ἡ πρεΐτης.
 natrix, ὁ ὕβριος.
 nauta polypti spēs ὁ ναυτίλος.
 necydalis, ὁ νεκυδά-
 λος insectum inualidum
 Theodorus interpretať.
 nepos ex filio, ὁ ἐπίδης.
 neruus, τὸ νῆρον.

nigrū, quod pupillā ambit
 τὸ μέλας.
 nidus, τὸ θέα.
 nodus, ἡ γλαύξ.
 nodus, siue articulus,
 ὁ ὀδὸς, siue articulus,
 nota, τὸ σημεῖον. (δύλλο).
 nympha, ἡ νύμφη.

O
 Occiput, τὸ ἰνίον.
 Ocrea, τὸ ἀντικνήμιον.
 oculus, ὁ ὀφθαλμός.
 oculata, piscis, ὁ μελαίνυρος.
 officiales, seu instrumen-
 tales partes, τὰ οργανικὰ
 μέρη.
 olfactus, ἡ ὀσφρευσις.
 ololygo, ὁ ὀλολυγῶν, uox ra-
 narum,
 olor, ὁ κύκνος.
 omasum in uētre propē re-
 ticulum, ὁ ἐχίνος.
 omentum, τὸ ἐπίπλοον.
 orchylus avis, ὁ ὄρχυλος.
 orcyne piscis, ὁ ὄρχυς.
 orfodagna ἡ ὀρφοδάκη, quā
 ait interpretari posse mor-
 dellam.
 oryx, ὁ ὄρυξ.
 os ossis, τὸ ὀστέον.
 osoris, τὸ σόμα.
 ossifraga, ἡ φάμα.
 ossile polypti species, ἡ ὀ-
 σσίλη.
 ostrea, τὰ λιμνίστρα.
 ostrea conchæ, τὰ ὄστρεα.
 otus ab aumbus, quasi auri-
 tus, avis est, ὁ ὠτός.
 ouipera, τὰ ὠπετα.
 ouis, τὸ πρόβατον.
 ouum, τὸ ὠόν.
 Oua electicia, τὰ ὠαία.
 λιμα.
 P
 Pagrus piscis, ὁ φάχρος.
 pagurus, ὁ παγῦρος.
 palatum, ἡ ὑψίμα, ἢ ὁ ὄρε-
 νός.
 palma uola, τὸ θρία.
 palma mensura, ἡ αἰθιαμή.
 palmipes, τὸ σταγανίπιον.

palumbarius accipiter,
 ὁ φαβάτυπος ἱέραξ.
 palpebrae, αἱ βλεφαρίδες, &
 cilia.
 palpebra, τὸ βλεφαρον.
 palumbes, ὁ φάβος.
 palumbes, ὁ φάβος.
 palumbes, ὁ φάβος.
 palustre, τὸ λιμναῖον.
 pancreum à carnis multi-
 tudine, τὸ πάγκρεον.
 panthera, ἡ πάνθηρ.
 papauer piscis, ὁ μύρα.
 papauerculū excrementū,
 quod primū à pueris emit-
 titur, τὸ μωκόνιον.
 papilla, ἡ θηλή.
 papilio, ἡ ψύχα.
 pardalus avis, ὁ πέρδαλος.
 pardalianches, τὸ πέρδαλι-
 αγγίς.
 partes, τὰ μέρη.
 partus, τὸ ἑμβρυον, ὁ τὸ κύημα.
 parus avis, ὁ ἐργιθάλος.
 parus monticola, ὁ αἰγυθάλος.
 parturigo, ἡ ὠδὴ.
 passer aves, τὰ σποδία.
 passer piscis, ἡ ψήλη.
 passer, ὁ σποδός.
 pastinaca piscis, ὁ ἱραγῶν.
 pastinaca bestiola uerticilis
 le similis, ὁ σαρκίλιος.
 patella, ἡ λαπά.
 patella fera, quæ etiā θαλάσσι-
 ας οὖς, id est marina auris
 appellat, ἡ λαπαία.
 pauo, ὁ παῦς.
 peccus, ὁ θύρας, ἢ τὸ σῆμα.
 peccunculus, peccien, ὁ κῆτος.
 pedestre, τὸ πεζόν.
 pediculus, ὁ φθῆρ.
 piscis etiā eodem nomine,
 pediculus ferus, ὁ φθῆρ ἄμμος.
 pella ardeolæ species, ὁ
 πέλλος.
 penelops avis, ἡ πενελόπ.
 penis genitale, τὸ αἰδοίον.
 penna, τὸ πτερόν.
 pennarū loco quibus cutis

est, τὰ δερμόπτερα.
 perca accipiter, ὁ πέρκος
 ἰέραξ.
 perca piscis, ἡ πέρικη.
 percnopterus aquilæ speci-
 es, ὁ περνοπτερος.
 perdix, ὁ πέρδιξ.
 perne, seu culicis, ἡ κωλῶνις
 pes, ὁ πός.
 pes, crus, τὸ σκέλος.
 phalangium, τὸ φαλέγγιον.
 phalanx animal, ὁ φάλαγξ.
 phalaris auis, ἡ φαλκίς.
 phaleria, ἡ φαλκίς.
 phanger piscis, ὁ φαγγίς.
 phasianus, ὁ φασιανός.
 phocaena, ἡ φώκαινα.
 phoix, seu phoicis, ὁ φώξ.
 pholis piscis, ἡ φωλῖς.
 phoxinus piscis, ὁ φοξίνος.
 phuca piscis, ἡ φυκίς.
 phuca parua, τὸ φυκίδιον.
 pica, ἡ κίψα.
 picare, κίψαι.
 picatus cereus in alueari-
 bus, ὁ ποσόνικρος.
 picus martius, ὁ δριμυτολάτης.
 pilare malum, quod mulie-
 res inuadit, si pilum in po-
 culo hauserint, ὁ τριχάς.
 piña species testa intestorū
 pinnæ, τὰ πτερόγνια. ἡ πέννα.
 pinnula sub thynni utere.
 pinnother, ὁ πιννοθήρ.
 piphex auis, ὁ πίψηξ.
 pipso auis, ἡ πίψηξ.
 piscis, ὁ ἰχθύς.
 piscatrix raia piscis, ὁ ἑλίας.
 pituita, τὸ φλέγμα. (Βάπτει.
 planipes, τὸ εὐαπόσωτον.
 plateæ aues, οἱ πτελικαί.
 podagra, ἡ ποδάγρα.
 podex, ὁ πρωκτός.
 podex anus, ὁ ἀχός.
 polluere, semen per som-
 nū emittere, ἢ εἰς ὀνειρώτῃν.
 polypus, ὁ πολύπους.
 pompilus, quem et ὠμν πο-
 λυπόου polypi uocant,
 ὁ πομπίλος.

poples, ὁ ἰγνός, ἢ ἰγνός.
 porphirio auis, ὁ πορφύρεος.
 portæ in iecinore, αἱ πυλῆαι.
 præcordia et cinctus, αἱ φλι-
 præcordia, αἱ φρενές. (Βίς.
 præputium, ἡ ἀκροποδιά.
 primadæ, αἱ πριμαδῆαι.
 pristes piscis, ὁ πρίστης.
 pronum, τὸ πρηνές.
 prophetus cruentus qui-
 dam humor, qui inter du-
 as mēbranas continetur,
 cum foetus in utero forma
 ri incipit, ὁ προφύρεος.
 psittace auis indica, ἡ ψιτ-
 τάκη.
 ptynx auis, quā eandē cū
 chalcide esse qdā credunt
 pubes, ἡ βύς. (ὁ πτύγξ.
 pudenda, τὰ αἰδοῖα.
 pulla, seu fuluia aquila, ὁ
 μελαινκίτης.
 pulcher piscis, ὁ κελαι-
 ννμος.
 pulex, ἡ ψύλλα, ἢ ψύλλος. uis
 dei est, araneæ species esse.
 pulicaria herba, ἡ κόρυς.
 pullium, quod equa ante
 pullum emittit, τὸ πώλιον.
 pulmo, ὁ πνύμων.
 pulmo aquatilis, ὁ πνύμων.
 pumiliones, οἱ πούες.
 pupilla, ἡ κόρη.
 purpurissum, τὸ αὐθροάκλον.
 purpuræ, αἱ πορφύραι.
 pus, ὁ πούος.
 putamen, τὸ κέλυφος.
 putamen non tamen puto
 proprium id græcè esse, ἡ
 προβολή.
 pygargus aquilæ species.
 Theodorus posse ait albi-
 cillam interpretari, ὁ πύ-
 γαργός. uocatur & ὁ μέρο-
 φόνος, quod Theodorus
 transfert hinnulariam.
 pyrausta uermiculus infe-
 stans apum aluearia, qui
 & clerus, ὁ πυρανός.
 est & paruū animal, quod

uolans in lucernam, ut in
 gnē attingat, adunī. Hinc
 proverbiū, πυρανός μύρος.
 in eos qui sibi mortem as-
 ciscunt.

R

Rabies, ἡ λύψα.
 raia mas, ὁ βάπτος.
 raia scemina, ἡ βάτις.
 rana, ὁ βάτραχος.
 raucedo, ὁ βράγχος.
 redius, ὁ πρῶτον.
 regulus auis, ὁ βασιλλίς.
 remora, ἡ ἰχθυίς.
 renes, οἱ νεφροί.
 ren, ὁ νεφρός.
 reptio, ἡ ἰσχυρία.
 reptile, τὸ ἰσχυρίον.
 relimatum, τὸ ἀνώσιμον.
 reticulum, uel arsin cum,
 κικρύφαλος.
 rex apum, ὁ βασιλεύς τῶν
 μελιτῶν.
 ricinus scedum animal ca-
 nibus infestū, ὁ κυνοκενός.
 ricu, quod est adunco, τὸ
 ἐπίγρυνον.
 rictus, rostrum, τὸ ῥύγχος.
 riparia, ἡ ῥίπια.
 rostrum, τὸ ῥύγχος.
 rubellio, uel rubellus piscis
 ὁ ἐρυθροκός, ὁ ἐρυθροκός alibi.
 rubetarius accipiter, ὁ φρενο-
 λόχος ἰέραξ.
 rubetra, ἡ βατίς.
 rubeta, ἡ φρουία.
 rubicilla auis rubecula, ὁ
 πυρρόβαλος.
 rubri, οἱ ἐρυθροί.
 ruminalis piscis, ὁ μέρως.
 rupex auis, alibi hiaticulæ
 uocat, ὁ χερσολίος.
 rquicilla, ὁ φοινισσός.
 S

Sacer piscis, ὁ αὐθίας, qui
 Setia anthias, græce quo-
 que ἰπὸς ἰχθύος. qui & αὐτο-
 πίας dicitur.
 sacer serpens, ἡ ἰσχυρία.
 salamandra, ἡ σελαιμένη βατράχια.

salitium, ἡ ἀναφαλαντίσσι.	semen genitale, ὁ βορέος, καὶ γὰρ, καὶ τὸ ἀντρίμα.	squatina, ἡ ῥίνα.
salpa, ἡ σάλπη.	seminaria uena, ἡ σωματις.	squatula, ὁ ῥινόβατος, rhinobatus.
salus auis, ὁ ἀγίως, agithus nōn unquā. alibi, ἀγίοσος.	semitalus, ὁ ἡμισυράγματος.	squilla squillus, ὁ καρὶς.
sandaraca, genus cibarii a pū duricie cere proximum, ἡ σανδράκα.	sempaliones aues, οἱ αἰσποῦται.	squilla parua, τὸ καρὶδιον.
sanguis, τὸ αἷμα.	sensoria, τὰ αἰδιδυμένα.	stabilis, et fellularia, ἡ ἰδρύα.
sanguinea, τὰ ῥυάμα.	sensuū sedes, τὰ αἰδιδυμένα.	stellatus piscis, ex mustello rum genere, stellaris alibi, ὁ ἀστειάς.
sanies, ὁ ῥυός.	sepiā, ἡ σήπια.	stellaris auis cognomento piger, ex ardeolarū genere, ὁ ἀστειάς.
sapardis piscis, ἡ σάπιδις.	sepium, τὸ σήπιον.	stellaris accipiter, ὁ ἀστειάς.
sarda piscis, ὁ ῥυάσις.	sepiū transuersum, siue cinctus, διαζώμα.	stella aquatilis, ὁ ἀστὴρ.
sarda, ὁ ῥυάσις.	septum, praecinctus, τὸ ὑπὸ ζώμα.	stellio, ὁ ἀσκαλαβοῦτας.
sardae, αἱ ῥυάσις.	serpens, ὁ ὄφις.	stercus, ἡ κοπρος.
sardinæ, αἱ ῥυάσις.	serpens marina, ὁ ὄφις θαλάσιος.	sterilitas, ἡ ἀτεκνία.
sargus, ὁ σάργος.	serum, ὁ ἑρρός.	sternutamentū, ὁ στήαρμός.
sargus, piscis ē mugilū genere, ὁ σάργος.	setauræ iuuenca, quædā in Epiro, quæ et pythica, αἱ ἀποταύροι.	struma, τὸ πρῶρον.
sargini pisces, οἱ σάργινοι.	seuum, τὸ εἶμα.	struthio libyca, ὁ στροθὶς ῥυάδιον.
satheriū animal, τὸ σεδήριον.	silpha insectum, ἡ σίλφη.	sturnus auis, ὁ ψάρος, καὶ ἡ κήλη.
satyrias morbus, ἡ σατυρία.	silurus, ἡ γληνίς.	subaquila aquila species, ὁ ὑπαικτός.
satyriū animal, σατυρίον.	siluia auis, quæ rubecula alibi interpretat, ὁ ἱριόκακος.	habent tamē co-dices quos uidimus, non ὑπαιντες, sed γυναικτες quæ si uulturinā aquilā dicas.
schadon apū soboles, ὁ σχάδων.	simia porcaria, ὁ χοιροπίθι-κος.	subare, καὶ πρῖνον.
scapulæ, αἱ ὁμοπλαῖται.	simia, ὁ πίθηκος.	subnatale, ἡ ὑπογλατίς.
scarabæus, ὁ κάρδαρος.	similare, τὸ ὁμοιομερές.	subuentaneū, τὸ ὑπενήμιον.
scarabæus taurus, insectū, ὁ κάρδαρος.	sin ciput caluaria, τὸ βράγμα.	subuteo accipiter, ὁ ὑπὸ πτερό καὶ ἱρᾶς.
scarabæus pilularius, ἡ κάρθαρις.	siren insectum est quoddā, σαρῖν.	lues cicures, οἱ ἡμεροὶ ὕα.
scarabæus piscis, ὁ κάρδαρος.	sitta auis, ἡ σίτη.	suffrago, poples, nodus, ἡ καμπή.
scarabæus gallertuca, ἡ μελλολόδων.	solida ungula, ἡ ὀπλή.	summi armī, ἡ ἀκρωμία.
scarus, ὁ σκῆρος.	solipes, τὸ μόνιχρον.	supera, τὸ ὑπερον.
scombrus piscis, ὁ σκόμβρος.	sorices, οἱ ἀρσάροι μιντε.	supercilium, ἡ ὀφρὺς.
scordula piscis, ἡ σκωρδούλη.	spargus, ἡ ῥυάσις.	supinum, τὸ ὑπὸ πτερον.
scordula, ἡ αἰφίς.	spatagus echinorū species, ὁ σπάταγος.	sura, ἡ γαστροκνημία.
scorpius piscis, ὁ σκωρπίος.	spina, ἡ ἀκανθα, ἡ ῥάχis.	sus, ὁ υς.
scorpio piscis femina, ἡ σκωρπίς.	spinax mustellus, ὁ ἀκανθίσκος γαλιός.	sutura pars caluæ serrata, ἡ ῥαφίς, καὶ ῥαφή.
scortum, ὁ ῥυός.	spinus siue ligurinus auis, ἡ ἀκανθίς, siue ἀκανθίλις, alibi argatilis.	syderatio morbus, ὁ σφακ-λισμός.
scortum pellicula, quæ testes continet, ἡ ὀρχίς.	spongia, ὁ σπόγγος.	
secundæ, τὸ ὑτέρον.	spuma piscis, ὁ ἀφρός.	
secundæ, quibus scetus in uoluitur, τὰ ῥυάσις.	squamā, ἡ λυγία.	
sedimenta alui, τὰ ὑποσέματα, τὰ ὑποκίλας.		
sellularia, ἡ ἰδρύα.		

T Abanus, ὁ μέλας.

tactus, ἡ ἀφῆ.
talpa, ὁ ἀσφάλει.
talus, ὁ ἀσφάλειος.
tarda auis, ἡ αἰτῆς.
tempora, οἱ κρότφοι.
tendo netuus, ὁ τένων.
teredinariū, ubi scilicet tere
dines foeti edunt, τὸ τενε
δρῆσιον.

teredo eruca, quæ alueari-
bus apum innasciē, ἡ περι-
δῶν, καὶ τινθροδῶν.

terrestre, τὸ χερσαῖον.
terre intestina, unde angui-
læ oriuntur, τὰ γῆς ῥῆτρα.
testa quibus pro tegmine
est, τὰ ὀστρακοειδεα.

testis, ὁ ὄρχης.
testudo, ἡ χελώνη.

testudo lutaria, ἡ ὠμυς, alibi
teritx auis, ἡ τίτειξ, (ζιμύς.

tetragometra cicadæ matrix
ex qua orit, ἡ τετράγωνα ῥῆτρα

thorax, ὁ θώραξ.

thos, uel sup^o cetuarit, ὁ θως.

thunna, ἡ θωννίς.

thunus, ὁ θωννός.

thunnarius, ὁ θωννοκόπος.

thymum herba, τὸ θύμιν.

tibia, ἡ κνήμη.

tillo piscis, ὁ τίλλος.

tinea, uel lumbricus, ὁ ἔλμιν.

tinea, ὁ σῆς.

tinnunculus, ἡ πιγχιρίς.

titillatio, ὁ γαργαλισμός.

titillor, γαργαλίζω με.

tosus, ὁ τσίρθ.

tonfille, τὸ περὶ δάμνον.

torpedo, ἡ τρεκε.

torpennia, τὰ ὀλὸπῆτρα.

tractile, τὸ αἰσθητόν.

triorcha accipitris gen^a a te-
sticularū nūero, ὁ τριόρχης.

triflo, uel ut alibi, triflo, ἡ
φάκκισα.

trochilus, ὁ τροχίλος.

trochus, ὁ τρεχός.

trynga auis, ὁ τρυγαν.

tuberi camelī dorso, ὁ ὕβος.

turbo, iynx, torquilla, ὁ ἰνξ.

turbo cochlea, ὁ σφῆμβος.
turbatus, ὁ σφῆμβός τις.
turdus auis, & turdus pi-
scis, ἡ κίχλη.
turtur auis, ὁ τρυγαν.
tympan^o auis, ὁ τύμπανος.
tyrānus auicula, ὁ τύραννος.

V

Vacca, & bos, ἡ βός.
uaginipēnia, τὰ καλὴ

πῆρα.

uariā auis, ἡ ποικιλίς.

uariātes, αἱ ἐξία.

uarix, ἡ ἐξία.

ubera, τὸ οὐδερ οὐδερτα.

uelia auis, ἡ ἑλιά.

uena, ἡ φλέψ.

uenula, τὸ φλεβίον.

ueneres in talis, pars scilicet
licet tali, τὰ κῶλα, etiā ma-
nus, et pedes κῶλα dicunt

uentet, alius, ἡ κασῆρ.

uermiformis ὁ σκαλινκυστός.

uermipara, τὰ σκαλινκυστός.

uermis, ὁ σκαλινξ.

uertex, ἡ κρυφή.

uertebra, ὁ σφῆδύλος.

uertibula, calli, tubeta, τὰ ὀ-
λοθῶμα καὶ τὸ πῆμα.

uerticilla, insecti species, ἡ
σφῆδύλη, alibi uerticill^o.

uerruca, neuus, papula, τὸ
uespa, ὁ σφῆξ. (φύμα.

uespeta, & uesparia, τὰ
σφακία.

uespæ, quæ operariæ sunt,
οἱ ἐργάται.

uespennilio, ἡ νυκτορίς.

uelfica, ἡ κυρίς.

uelfula, ἡ γρῆς.

uinago, ἡ οἰνίς.

uipera, ἡ ἔχιν καὶ ἔχιδνα.

uirago, ἡ ἀρῆστος ῥητῆς.

uirgula, radioli oris nonul-
lorum pisciū, τὰ ραβδία.

uiri foeminares, οἱ αὐθῆς.

thalukoi.

uideo auis, ὁ χλωρίων.

uiscum, τὸ ἑξός.

uiscus, τὸ ἀσπῆγρον.

uiscera, τὰ ἀσπῆγρον.
uifus supercilium interpre-
tatur, ὁ ἑψίς.

uitellus, τὸ ἀκρόγρον ὠθ.

uitellus, ὁ λίανθρ.

uififlora auis, ἡ οἰσάνθη.

uifiligo, ἡ λόνκα.

uifita piscis, ἡ ταινία.

uifulus marinus, ἡ φάκκ.

uifueria, mustela scilicet ru-
stica, ἡ ἑκτίς.

uifiparum, τὸ ζωσπῆρον.

uifula, ὁ αἰγῆλις, αἰγῆλιος.

uifilicis, ὁ ὀμφαλός.

uifbra piscis, ἡ σκίαντα.

uifcūguia, quibus unguet
adunci, τὰ γαμψόνυχια.

ungula solida, ἡ ὀσλή.

ungula, seu digitus, seu un-
guis ē testa itectis, ἡ ὀπλή.

unguis, ὁ ἑνυξ.

unguiculi, τὰ ὀνύχια.

uoca piscis, ἡ βῶκα.

uola planta pedis, ὁ παρσός.

uolatio, ἡ ἥσις.

uolax, τὸ ἥστικόν.

uolucra, τὸ ἥσινόν.

urupa, ὁ ἑποψ.

urax auis ex tetrigū genere
ἡ οὐραξ.

uripatrix auis, ἡ κολυμβίς.

uripū ouis, τὸ οὐρενον ὠόν.

urfa piscis, ἡ ἀρῆτος arcus.

urfa, ἡ ἀρῆτος.

urtica marina, ἡ ἀκαλύφα.

ufus, ἡ χλῆσις.

uterus, ἡ ἀλφίς. unde, ἀλφ-
φοί, uterini fratres.

uua, ἡ πεφυλή.

uulpanfer auis ἡ χυκαλώπηξ.

uulpecula, ἡ ἀλώπηξ.


uulpes marina, ἡ ἀλώπηξ.

uultur, ὁ αἰγυπίος.

uulua uterus, ἡ οὐτῆς.

Xylophthorū uermis a cor-
rūpendis lignis ita appel-
latus. Theodorus ligniper-
di interpretari posse ait. ὁ
ξύλοφθορός.

FINIS.



THEOPHRASTI PHILOSOPHI CLARISSIMI,

De historia plantarum, Libri VIII.
Et Decimi principium,
De causis, siue generatione plantarum, Libri VI.

THEODORO GAZA INTERPRETE.

Cum eorum omnium quæ his Theophras-
ti libris continentur, indice.



EX VOLATERRANO.

Theophrastus ex Ereſſo Leſbi ciuitate fuit, Ariſtorelis & diſcipulus, & ſcho-
læ ſucceſſor. Euphraſtus, deinde Theophraſtus uocatus, ob oris & eloquentiæ
ſuauiatē: cum antea Tyrtamus appellaretur. Habuit diſcipulos ad duo milia: fu-
itq; in honore apud Caſſandrum Anipari. Opera eius, quanta nullius alterius,
à Diogene commemorantur. Inter que ſunt libri ſex Epitomes in Ariſtotelem de
animalibus. Extant hodie tantum de plantis, conuerſi à Gaza: de lapidi-
bus & metallis: de ſudore, Metaphyſica parui tractatus. Exceſſit
admodum ſenex. Ex Suida, Diogene, Strabone, Cice-
ro dulcem eum appellat.

EORVM QVAE

IN HISCE THEOPHRA-
sti libris continentur, index copiosissimus. Prior numerus paginam, ad
ter verò versum usque ad deci-
mam sequentē designat.



Bies pag. 56. ver. 1
& 71. 20. & 166. 1.
Abietis ad plurima
usus. 71. 30.
Abies maximi u-

lus. 75. 30.
Abies decuminata mori. 67. 30
& 129. 30.

Abies ablatis quibusdam parti-
bus moritur. 16. 10.

Abies apta manibus. 75. 1.

Abies quomodo nascatur. 31. 1. &
49. 1. & 69. 40.

Abietis germinatio. 37. 20.

Abies squamosa. 34. 10.

Abies coli non uult. 10. 10.

Abies quare fissilis sit. 11. 30.

Abies ubi non nascatur. 32. 30.

Abies uenit obnoxia. 35. 40.

Abies montis propria arbor. 32. 10.

Abies ualida propter nodos. 15. 1.

Abies pondus sustinet. 74. 20.

Abies umbratis locis gaudet.
48. 40.

Abietis una radix tantum. 12. 10.

Abietis nodus. 73. 20.

Abies Macedonia. 15. 30.

Abietis & pini differentia. 69. 20.

Abietis succus. 111. 40.

Abietis materies quando colora-
tor sit. 68. 40.

Abietis materies incorrupta. 73. 1.

Abies quē locū desideret. 160. 10.

Abietis lachryma. 244. 40.

Abietis fructus. 248. 10.

Ablaqueationis uiniū usus. 64. 40

Ablaqueationes quid sibi uelint.
221. 10.

Abrotoni odor. 248. 40.

Abrotonum quomodo germi-
net. 85. 20.

Abrotonum quomodo nascatur.
13. 30.

Abrotonum. 78. 30. & 198. 1.

Abfinthium. 54. 30. & 95. 40. &
175. 10. & 234. 30.

Abfinthiū pecora pascunt. 135. 30.

Acanum. 78. 40.

Acarna. 82. 1. & 10.

Accipiter mutatur. 25. 20.

Accipiter trisulcigerus. 218. 1.

Acer quando cadatur. 68. 40.

Acer spissa. 71. 20.

Acer aliud nomen in monte, ali-
ud habet in plano. 32. 10.

Aceris utilitas. 75. 40.

Aceris genera. 40. 20.

Acerbus sapor. 231. 20.

Acerbi fructus primo. 236. 40.

Acessina amnis habet robustos ha-
rundines. 62. 40.

Aceri usus. 125. 20.

Acetum quo pacto fiat. 238. 30.

Acharnica regna. 47. 20.

Aconitum unde dictum. 124. 10.

Aconitum ubi optimum nasci-
tur. 124. 1.

Aconiti descriptio. 124. 10.

Aconiti ueneno nihil resistit.
124. 20.

Aconiti habere capitale. 124. 30.

Acri sapor. 231. 30.

Acria calida. 152. 1.

Acria sapor siccitatis est. 242. 30.

Acria cur quibusdam adferantur.
255. 10.

Aculatorum differentia. 78. 40.

Acutus iuncus. 69. 1.

Acutus sapor. 234. 30.

Acutus sapor humiditatis est.
242. 30.

Acuta spina semper uirer. 15. 40.

Acuta ex acerbus ueniunt. 236. 20.

Acyllum uocat ilicis fructū. 45. 30.

Adiantū folium. 99. 10.

Adonidis horti. 85. 20.

Adramyza quid gignat. 114. 20.

Adria nō habet pitarum. 55. 30.

Acanica materies. 70. 20.

Aegre meliora medicamenta fe-
runt. 128. 20.

Aeger utrum moriatur quomo-
do sciri possit. 121. 10.

Aegis quem usum præbeat. 19. 10.

Aegidem pinus gignit. 18. 30.

Aegyptus fecunda. 34. 40. &
120. 20.

Aegyptium triticum. 104. 10.

Aegyptium frumentum purum.
105. 1.

Aegypti arbores. 49. 30.

Aegyptiorum cibus. 59. 10.

Aegyptus infinitas habet plan-
tias. 58. 10.

Aegyptus fert coctilia. 206. 10.

Aegyptus medicamentis plena.
122. 40.

Aegyptus apta arboribus. 153. 20.

Aemi montis quercus. 161. 40.

Aepisyngis ager. 205. 1.

Aequorum species. 46. 40.

Aër multum ad plantas immu-
tandas ualet. 21. 40.

Aër omnibus pestilens. 235. 30.

Aëris bonitas. 160. 30.

Aër humo permixtus. 183. 40.

Aër arboribus commodus. 155. 1.

Aëris inaequalitates. 195. 30.

Aër nutrit plantas. 156. 10.

Aëris uina. 194. 1.

Aër etiam alit. 159. 30.

Aëris clementia facit ad maturi-
tatem. 205. 20.

Aër qui facilius geletur. 226. 30.

Aëris bonitas ad succum facit.
216. 10.

Aër qualis optimus. 180. 20.

Aër circūfusus spectatūs. 195. 10.

Aësculus. 18. 1.

Aestate qui uenti boni. 154. 40.

Aestate enī sicca germinat. 141. 20.

Aestatis tempus. 141. 1.

Aestus fructus adurunt. 222. 20.

Aestus quid noceat plantis. 227. 10.

Aestus quibus noceat. 223. 20.

Aestus uehemētor officit saporī.
252. 1.

Aethiopiae imbres. 177. 10.

Africa. 195. 10.

Africum triticum. 104. 10.

Ager optimus. 180. 30.

Ager bene agitur. 175. 10.

Ager ferens coctilia. 206. 10.

Ager pluuus plus stercore defi-
derat. 183. 40.

Agitatorium. 54. 30.

Agnetio in abiete. 16. 10.

Agnina lingua. 96. 40.

Agricolatio. 168. 20.

Agricolatio quid molia. 145. 10.
& 175. 10.

Agricolae quē cōsideranda. 191. 20

Agricoltura opera. 171. 10.

Agricoltura cur inuenta. 143. 30.

Agri finis. 195. 10.

Agri quibus rebus steriles fiant.
227. 10.

Agri natura cognoscenda. 170. 40.
& 179. 30.

Agri quidam nullum cultum de-
siderant. 192. 1.

Agrosum differentie. 205. 10.

Agresium odor. 256. 1.

Agrigenzinum frumentum. 105. 1.

Alba infirmiora sunt nigris.
199. 40.

Albucum. 98. 1.

Albuci folium. 97. 40.

Alexias medicus. 124. 40.

INDEX.

Algarum genera.	35.40.	Amygdala quo pacto seruetur.	330.40.	Aphaca ingustabilis.	97.10.
Alica diuturna.	110.30.	Amygdalæ vires.	169.1.	Aphaca quomodo floreat.	96.30.
Alimenti minus habent uetera.	91.10.	Amygdala qualis primo.	177.30.	Apharca nunquā nō uiret.	11.40.
Alimenta ut se habeant.	214.40.	Amygdalæ flos.	161.1.	Apharca quando maturat fructū.	11.40.
Alimenta diminuentia.	211.10.	Amygdalas adultas Thasi inocu-	lant.	Apharcæ germinatio.	11.30. &
Alimentum quomodo coquatur.	190.10.		196.10.	Aphica quando floreat.	94.10.
Allium.	88.10.	Amygdalæ non durant.	197.30.	Aphytæ uitis.	183.30.
Allium quomodo feratur.	88.30.	Amygdalis quale solum cōgruū.	170.40.	Apium quomodo crescat.	171.30.
& 91.1. & 131.40.				Apium figuram mutat.	217.30.
Alliū habet plura genera.	90.40.	Amygdala amara cur fiat.	219.40.	Apium quo pacto transferendū.	217.30.
Allium Cyprium.	91.1. & 91.30.	Amygdalæ radix.	12.10.	Apium quo pacto colatur.	216.40.
Alliorum sapor.	244.30.	Amygdala qua ratione reddatur	ferulis.	Apium quando exeat.	197.40.
Allij semen.	91.10.		130.10.	Apium quomodo feratur.	90.30.
Allij radix.	91.10.	Amygdalæ cinis.	77.30.	& 217.40.	
Alnus quando germinet.	33.30.	Amygdalis quibus auxilietur.	168.10.	Apj odor.	248.30.
Alni radices.	11.40.	Amygdala fata provenit.	21.30.	Apj radix.	12.30. & 89.30. & 244.1.
Alum purgans remediū.	121.30.	Amygdalæ succus.	111.40.	Apium difficile nascitur.	87.30.
Amara cultū non admittit.	177.10.	Amygdala perdit ante maturita-	tem fructum.	Apj genera.	91.30.
Amara plerique odorata sunt.	240.40.		129.30.	Apj quomodo crispū fiat.	21.30.
Amarago quando floreat.	97.30.	Amygdalis nuces similes.	33.30.	Apium perpetuū uiret.	16.1.
Amaracum recens.	131.30.	Anaxagoras de seminibus.	30.40.	Apium quando feratur.	87.30.
Amarus succus.	19.10.	& 131.30.		Apicis in locis quales arbores.	49.30.
Amarus sapor.	231.30.	Anchusa ab radice tantum foli-	ata.	Aque inter cunim remediū.	93.30.
Ambustus apti medicamen.	117.30.		95.1.	Aqua quando de herbis.	91.30.
Amentum in arboribus.	14.40.	Anchusæ radix.	95.30.	Aquam que olera magis desidē-	rant.
Amerina ad iussu arboris magni-	tudinem peruenit.	Androcides quomodo inuenit	medicinā contra uinum.	91.30.	
	9.30.	Andronon de arboribus.	28.30.	Aqua deficientes loci.	51.10.
Amerinæ flos.	20.30.	Androthēnes de Tylo insula.	138.40.	Aquarum que optimæ.	91.30.
Anomum.	116.40.	Andryala.	94.1.	Aqua quibus proficit.	106.10.
Amphitergum solum.	194.30.	Anethū.	87.10. & 116.40. & 140.30.	Aqua uinibus opus est.	187.30.
Amplexicaulia.	94.40.	Anethū quando erumpit.	87.30.	Aque nitrosæ.	233.1.
Ampulla herba.	95.10.	Anethi radix.	89.30.	Aque putide.	233.1.
Amputationes.	175.40.	Anethi semen.	90.10.	Aqua quomodo noceat arbori-	bus.
Amygdala.	166.10. & 128.40.	Annus facit ad odore flori.	86.30.		217.30.
Amygdalarū humor gummosus.	211.40.	Annus fructificat, nō tellus.	195.10.	Aquarum mistura utilis.	159.30.
Amygdalæ fructus sine folijs.	214.30.	& 107.30. & 195.10.		Aqua leprosos faciens.	159.30.
Amygdala alijs damnosa.	184.30.	Animalium differentia quod ad	cibum attinet.	Aqua que celerius.	126.10.
Amygdalæ sterilesunt propter	copiosum alimentum.	246.30.		Aqua adferens sterilitatem.	117.1.
	147.1.	Animal an oleat.	212.30.	Aqua seruēs quibus utilis.	190.30.
Amygdala qua ratione dulcis ex	amara fiat.	Animalium natura.	252.30.	Aque salis oleribus quibusdam	prodest.
	129.10. & 147.1.	Animalium partus.	196.40.		190.30.
Amygdala quale solum postu-	let.	Animalia quomodo creant.	119.30.	Aqua deteriores fructus facit.	182.40.
	180.10.	Animalium generatio.	132.30. &	Aque utilitas in rigando.	182.30.
Amygdalæ mutatio.	24.10. &	194.1.		Aquam quandam grauidas mu-	lieres facere.
169.40. & 190.10.		Animalium depassio quid noceat	plantis.		217.1.
Amygdalæ lachryma.	244.40.	Animo uesicarij adnotit.	127.10.	Aqua mutat plantas.	168.10.
Amygdala quomodo crescat.	190.30.	Ancho caprū put ganrur.	48.30.	Aque dulcis præstantia.	119.30.
	181.30.	Antenæ medulla.	71.40.	Aqua seruēs quare perfundantur	frumenta.
Amygdalæ dulces quomodo fiāt.		Anthedon mespili species.	42.1.		210.40.
Amygdalas quomodo quidam	emendunt.	Anthemi flores.	99.10.	Aque salis non bene nutriunt	plantas.
	121.1. (190.30.)	Anthriscū ad glorij utile.	127.30.		118.30.
Amygdala quomodo colenda.		Apargia.	95.1.	Aque copij amittit arbores.	133.30.
Amygdala facile amittit fructus	suos.	Apes oppugnant anctos.	235.1.	Aque sapor & odor.	235.30.
	161.40.	Aphaca.	94.1. & 100.30.	Aque afficiunt sideribus.	174.10.

Aquarum

INDEX,

- Aquarū terrestriū discrimen. 158.1
 Aqua nitroſa plantis inutilis. 158.1
 Aquæ alumen ſapientes inuitiles plantis. 158.2
 Aqua per ſe inſipida. 235.2
 Aquæ frigida. 159.12
 Aquantia. 151.30
 Aquanilium radix. 244.20
 Aquanilibus breuior uita quā in terrenis. 69.30
 Aquatiles plantæ. 55.30
 Aquilonis ſtatu fructus decidunt. 29.30
 Aquilonem ſpectans materies omnis præſtantior, quā quæ naſcitur ad meridem. 15.40
 Aquilonem uerſus optimæ arboris ſunt. 49.30
 Aquilo uetus amicus arboribus. 154.20
 Aquilonis craſſant ſemina. 208.10
 Aquilonis imbres uniſes. 157.1
 Aquilonis imbribus ualidiores redduntur arbores. 153.20
 Aquiloni frigus mediocre quare ſeminibus inle. 194.40
 Aquilonis noxæ in plantis. 178.10
 Arabia quid ſeruat. 54.20. & 114.20
 Arachnidæ radix. 11.40
 Arachnium morbus oleariū. 66.1
 Aracus ubi naſcitur. 108.10
 Arare bene ſummum eſt. 192.10
 Arandi tempora. 98.20. & 105.1
 Arariis puſillis qui utantur. 192.10
 Arborum ariditas. 222.30
 Arbor ſemina. 171.20
 Arbores alternis annis fructificantes. 149.20
 Arborū fructiferarum discrimen. 145.30
 Arborum curæ. 175.40
 Arbores quælibet ſibi accommodandum ſtercus poſtulant. 183.2
 Arbores quibus cauſis eruginem ſentiant. 222.10
 Arbores nō poſſunt ſtercorationem frequentem ferre. 183.2
 Arbores quomodo nutiunt. 196.1
 Arbores omnes ablagueantur. 182.20
 Arbores utrum ſint prægnantes. 140.30
 Arborum fructus quomodo mutantur. 162.20
 Arbor proſtrata. 215.30
 Arbores quomodo areſcant. 189.1
 Arbores inoculate. 168.30
 Arbores in radicibus morde diſiderant. 190.2
 Arbores in mari. 158.10
 Arborum flores minores odoratiores ſunt. 248.1
 Arbores pereunt ob corticem detractum. 229.10
 Arbores quando potiſſimum laborent. 219.40
 Arbor in Aegypto centefimo fructificat anno. 147.1
 Arbores q̄ pacto intereant. 165.30 & 220.40
 Arbores quando ſerantur. 176.30
 Arborum morbi uiolenti. 227.20
 Arbores quando criſpari incipiunt. 243.40
 Arbores ſuis quiſq̄ locis gaudere. 159.40
 Arborum ſemina quare degenerant. 197.2
 Arborum ſemen. 196.20
 Arborum gelatio unde fiat. 225.20
 Arborum lachrymæ. 244.40
 Arboribus ſolum commodum. 147.10. & 156.10. & 157.20.
 Arbores quales oporteat habere ſtatu. 154.40
 Arbores quæ excelſiores. 161.30
 Arborū fructus cuiuſdem generis, aliſi ſerotini, aliſi præcoces. 147.30
 Arbores quæ diutius uiuūt. 164.30
 Arbor nulla ſine nodo. 142.10
 Arbores quæ nodofiores. 14.30
 Arbores frigida. 71.30
 Arborum longitudo. 76.20
 Arbores odorata. 54.20
 Arbores auctu faciles. 35.10
 Arbores quæ facile terebrentur. 74.40
 Arborum ſemina quæ celerius pereant. 197.10
 Arbores quæ & ubi folia nō amittant. 10.1
 Arbores quæ ſpiſſiores. 72.20
 Arbores quæ ex ſemine creſcunt, degenerant. 23.10
 Arbores annoſæ ad carbones inniles. 77.10
 Arbores quæ præſtiores, in montibus, an in plano. 31.10
 Arborum humor uariuſ. 192.20
 Arborum uarietatis cauſa. 10.1
 Arborum generationes multiplas. 32.2
 Arborum mutatio. 24.20
 Arbor ob ademptam partē nunquam fructificat. 25.20
 Arbor ingens circa Memphim. 51.20
 Arbores in quam cœli partem ſpectent uidendum. 26.1
 Arbores uenti exurunt. 66.20
 Arbores ad Aquilonē ſpectantes. 49.10
 Arbores uariæ fructus ferūt. 7.10. & 21.2
 Arbores quæ in mari, quæq̄ in terra naſcuntur. 10.30
 Arbores crebre ſunt. 25.30
 Arbores quæ uidentur ſteriles nō ſunt. 30.20
 Arbor quid ſit. 9.20
 Arbores lanigera. 57.30
 Arbores qua ratione urbanæ aut ſylueſtres reddantur. 10.2
 Arbores urbanæ quid diſferant à ſylueſtribus. 31.20
 Arbores in apricis locis, an in locis opacis naſcanti intereſt. 49.20
 Arboribus quando folia decidunt. 16.10
 Arbores magnæ in mari ætuoſo. 57.10
 Arborum morbi qui. 65.2
 Arbores ſemper uirentes. 15.40
 Arbores ſerotina retinēt fructus. 29.20
 Arborum ſemen unde potiſſimum petendum. 178.10
 Arborum ætas quæ melior. 69.20
 Arborū naturæ diſcrimina. 71.10
 Arboribus prodeſt algor. 65.10. & 155.2
 Arbores miræ in India. 53.10
 Arbores præſiæ. 64.10
 Arbores amittentes fructum antequā coquant. 29.10
 Arbor mira in Arabia. 73.10
 Arboribus quomodo cortices deſtrahantur. 67.20
 Arbores ne ſinditur quid proſit. 74.10
 Arbores quomodo fructifera reddantur. 29.2
 Arborum flores pleriq̄ candidi. 95.20
 Arborum fructus cur degenerēt. 147.30
 Arbor quæ facile germinet. 72.10
 Arbores præcoces. 146.10
 Arbores quomodo uarios ferant fructus. 7.10. & 21.1. & 148.40. & 216.1

INDEX.

Arbores quæ uulnere percant.	218.40
Arbor an pereat medulla detracta.	219.30
Arbores quæ folia uertant.	16.30
Arborum quæ congelauerint germinationem uelocè efficit.	223.30
Arborum formatio.	181.1
Arbores quâdo purgandæ.	181.40
Arbores ubi meli ⁹ fructificet.	180.1
Arboribus noxi inferenda.	173.20
Arbores fertiliores.	166.10
Arbores detruncatæ.	195.10
Arbutusculæ miræ marinæ.	57.1
Arbutus optimos carbones facit.	57.1
Arctici arbores quomodo pereant.	223.30
Arctici materies.	70.20
Arctidia herbis constat.	123.10
Arctidia quid ferat.	54.30
Arc ⁹ celestis loca odorata reddit.	156.1
Arenosum solum.	156.1
Auream quid auferat.	93.30
Argilla dulcis est.	235.10
Argilla.	191.30
Argilaceum solum quibus commodum.	156.10
Ari solum.	97.40
Ari radix.	13.1. & 95.30
Aria.	72.20
Aria facit bonos carbones.	77.1
Aria quando cadatur.	68.40
Aria regio quid ferat.	14.1
Aria difficilis in opere.	73.10
Anisophil ⁹ pharmacopola.	126.10
Arbus quomodo feratur.	58.20
Ars naturæ imitatrix.	171.10
Arns opera in agricultura.	24.10
Articulatio uinum.	221.1
Aruentia olera.	91.20
Ascalonæ cepæ.	91.30
Ascium an radix.	11.20
Asia quæ peculiariter producat.	52.10
Asia grande frumentum.	104.40
Aspalathus.	116.40
Aspalax qualè habeat radicem.	13.30
Asparagus.	17.20
Astirium triticum.	104.10
Astula regia.	97.20
Astulæ regis semen.	98.1
Astulæ regis caulis.	98.1
Atheniensis ager plurimum fert hordei.	108.1
Atragena facit ignaria.	77.40
Atriser iuncus.	65.1
Atriplex quando exeat.	87.10
Atriplici qualis radix.	89.10
Atriplex sano.	87.20
Atriplicis semen.	91.10
Artice ferulitas.	103.30
Auellana altis habet radices.	15.40
Avena terram extenuat.	109.10
Auenam in hordeo nasci.	105.20
Avena multis tunicis à natura operata.	103.40
Auenæ peculiaris proprietas.	111.2
Avena quopactio generet.	199.40
Avena quomodo seruetur.	110.20
Auenæ delendæ ratio.	199.40
Avena tritico inimica.	228.10
Auerisferum genus.	215.10
Aues quo pacto mutantur.	218.40
Aues sibi remediâcoperiunt.	234.40
Aula uinum ficit.	63.30
Aule campus.	116.30
Aurelia.	86.1
Aurelia ex cruce.	218.40
Aurelia flos.	127.30
Auro arbores necat.	68.10. & 228.10
Aurum remedium.	110.40
Auster ⁹ fapor humidus plus habet.	110.40
Austerus fapor.	111.30
Austrini imbres.	153.20
Austrino tempore melius feri.	178.1
Austrino statu cruce nascunt.	66.1
Autumnus quale tempus.	141.1. & 176.30
Autumnalis putatio.	186.10
Autumno arbores rectè ferunt.	176.30
Auulsiōne prouenientia.	88.20. & 190.20.

B

Babiloniz forcidinas.	107.10
Balsamū ubi pueniat.	116.1
Balsami incisura.	112.20
Balsami arboris magnitudo.	116.1
Balsamū fructus.	116.1
Balsamum q̄ pacto colligat.	116.1
Balsami odor.	116.10
Balsamum ad nos non afferitur syncerum.	116.10
Balsami uirgæ.	116.10
Balsamū quomodo uendat.	116.20
Baroni hortus quales palmas habeat.	27.30
Beta.	94.10
Beta syluestris.	82.10
Beta quāam magna fiat.	9.30
Betæ feminis peculiare.	88.1
Betæ genera plura.	90.40. & 91.10
Betæ semen.	90.10. & 91.10
Betæ sano.	87.10
Beta aqua salsa gaudet.	118.20
Betæ radix.	12.40. & 89.10. & 244.1
Betæ quedam quando erumpit.	87.20. & 172.10. & 198.1
Betula.	49.10

Bibinella.	96.40
Bidentis cultura.	192.10
Bifera quæ sint.	141.40
Blechri ramuli.	135.10
Bleti semen.	90.10
Bliti radix.	89.20
Bliti sano.	87.20
Boëdrias.	65.10
Boronum cucumeris genus.	91.20
Boronum genus radices.	90.40
Boronum frumentum.	203.30
Boum sterus.	228.40
Brassica semper uiret.	16.1
Brassica temulenti ⁹ appulsa.	68.20
Brassica syluestris.	93.20
Brassicæ genera.	90.40. & 91.10
Brassica syluestri ad alium purgandum utuntur.	91.10
Brassica utem offendit.	68.10
Brassica quando feratur.	87.10
Brassicæ erumpit tempus.	87.20
Brassicæ cruce innascuntur.	92.40
Brassicæ odor.	173.30
Brassica quo pacto curetur.	191.10
Brassica quomodo oriat.	88.20. & 131.30.
Brassica aqua salsa gaudet.	118.20
Brassicæ salugo nō nocet.	242.10
Brassica mutata.	197.40
Brassicis eruum interserit.	184.10
Brutum animal an persequatur odorem.	225.1
Bryorem quam uocent.	110.10
Bryum.	36.2
Bulbus cur diu duret.	131.20
Bulbi generant.	199.40
Bulbus quomodo exeat.	98.20
Bulbus quomodo feratur.	88.20
Bulborum genera.	96.40
Bulbacea.	88.30
Bulbina.	99.1
Bulbosa.	99.1
Buprestis germinatio.	94.20
Butomi caulis.	11.30
Butomi folia.	17.10
Buxus asininus.	82.1
Buxus quare grauis.	11.30
Buxus qualè locū desideret.	155.1

C

Chachrys diuturna est.	110.20
Chachryū iungitur apio.	216.40
Calamus.	116.40
Calamus odoratus.	118.20
Calami odorati odor.	116.30
Calamus odoratus ubi nascatur.	116.30
Calcidici agri locus.	59.3
Calida quæ ferri acie hebetet.	151.1
Calida	

Calida quæ sint. 144. 30. & 198. 10	Carcinatio. 159. 30	Centifolia rose. 84. 1
Calidum quod nam sit quo pasto furi possit. 151. 1	Cardamomum. 116. 40	Cennina. 19. 30
Caligo flores exurit. 160. 30	Carduus. 82. 1. & 96. 10	Cepæ genera. 91. 30
Caliginis oculorum remedium. 95. 30	Carduus quomodo floreat. 99. 30	Ceparum color. 91. 40
Calor in solo. 157. 30	Carduus pinea. 82. 40	Cepæ diligit aquam. 92. 30
Calor causa agens saporis est. 157. 40	Cardui peculiare. 82. 30	Cepæ radix. 13. 1. & 92. 10
Calor feruat frondes. 151. 1	Caryæ pironum genus. 142. 1	Cepæ quomodo feratur. 88. 20. & 91. 40. & 131. 40
Caloris differentia. 210. 30	Carica qualis sit. 119. 1	Cepæ ferunt iuxta plantas. 155. 10
Calor in plantis. 150. 30	Caricæ natura. 119. 1	Ceparum sapor. 144. 30
Calores amantes arbores. 155. 1	Caro in plantis quæ sit. 9. 1	Cephalus fluuius. 216. 1
Calor modicus requiritur ad uentia. 151. 30	Carpæ in oleis. 159. 10	Cephissi ostium. 62. 10
Camariam quid uocent. 107. 10	Carpinus spissus. 71. 20	Ceran quam uocent. 123. 30
Canarie germinano. 94. 30	Carpinus quando cõdatur. 68. 40	Cerasti descriptio. 42. 40
Cæthyridias trincũ. 104. et 10. 193. 1	Carpini usus. 75. 40	Cerasti fructus. 42. 20
Cancer contra culices. 19. 40	Cassia. 14. 20. & 79. 10	Cerasti lachryma. 111. 40
Candralia. 97. 10	Cassia genera. 79. 20	Cerasti cortex detrahitur. 67. 10
Canis calidus. 151. 30	Cassia ubi producat. 114. 30	Cerasta. 65. 30
Canes inæqualiter fœtus ferunt. 147. 30	Cassia frutex. 115. 30	Cerastum in olea fieri, & in fico parere. 222. 20
Caninæ sentis fructus. 117. 40	Cassia cortex. 115. 40	Cerdones ex piro syluestri tabulas faciunt. 73. 30
Caniculæ marinæ. 16. 40	Cassia descriptio. 115. 40	Cerinthus. 86. 10
Canirubus. 47. 10	Cassa radix qñ effodienda. 118. 1	Ceronia. 30. 1
Cantharus in trinico. 109. 30	Cassanea plurima ubi. 55. 1	Cerrus roboris genus. 17. 10
Cantharus rosis perimuntur. 155. 1	Cassanea an floreat. 31. 10	Cerui uiperas edunt. 203. 10
Capilli ueneris solum in aqua non madescit. 99. 10	Cassanea montis propria. 32. 10	Chalbanum. 116. 30
Capillus semper uret. 96. 30	Cassanea quando germinet. 33. 30	Chironia usus. 119. 40
Capilli desuents remediũ. 99. 10	Cassanea syluestris. 31. 40	Chironia panax. 119. 10
Capiti aptum remedium. 121. 40	Cauda uulpina. 96. 40	Chytri pelicanæ partes. 62. 1
Capparis. 81. 30. & 175. 30	Caudex fundamentum arborũ. 64. 20.	Cibi differentia quæ faciũt. 203. 20
Capparis syluestris. 31. 30	Caudex quid sit. 7. 30	Cibus non omnibus idem. 203. 10
Caprarum solertia. 123. 40	Caudice præcisio quid quibus conringat. 36. 1	Cibi ratio alia hominibus, alia alijs animalibus. 109. 20
Caprifici succus. 144. 30	Caudices crispiores. 143. 10	Cicer. 100. 10 & 30. & 197. 30. & 210. 30
Caprificus non facili putrefcit. 120. 10	Caudices qñ germinant. 159. 10	Cicer quomodo grandescat. 15. 10
Caprificandi ratio. 162. 10. & 40	Caulias. 112. 30	Cicer a flore quandiu perficiatur. 103. 10
Caprificus generat. 199. 30	Caulis. 7. 20. & 198. 30	Ciceri aqua nocet. 106. 10 (102. 10)
Caprificus quæ ferat. 121. 1	Caulium differentia. 98. 1	Ciceris propria. 106. 40
Caprificus cur adferat ficis. 162. 10	Cause rerum cognoscendæ. 176. 10	Ciceris radix. 101. 30
Caprificus grossi cur delabatur. 121. 20	Cedrina. 148. 10	Ciceris flos. 102. 1
Caprificus nequit perficere fructus. 163. 30	Cedrus sudat. 215. 10	Ciceris caulis. 109. 10
Caprificus quid germinet. 31. 30	Cedrus diurnæ naturæ. 72. 20	Ciceris morbi. 109. 30
Caprificus morbus minimè obnoxia. 65. 20	Cedri usus in nauibus. 75. 1	Cicer nullũ animal gignit. 110. 10
Caprifici fumus. 77. 30	Cedri species. 42. 10	Cicer arctinum. 105. 10
Caprifico longior uita quàm fico. 65. 40	Cedri materies. 78. 10	Cicer columbinum. 105. 10
Caprificatio quare inuenta. 19. 30	Cedri fructus. 42. 40	Ciceris differentia. 105. 10
Caprifici meliores. 19. 30	Cedri in syria præstiosissimi. 76. 30	Cicera. 210. 30
Caprificus flexibilis. 74. 30	Cedro similis taxus. 39. 40	Ciceri uermes innascuntur. 194. 1
Caprinus acris genus. 40. 30	Celastrus coli. prius nõ uult. 19. 10	Cicer saluginis nonnihil habet. 202. 30. & 141. 1
Caprinum fercus. 28. 40	Celastrus summis locis & algenibus prouenit. 49. 10	Ciceri in flore nocet iher. 195. 40
Carbones ad quas res utiles. 77. 20	Celastrus tarde maturat fructũ. 49. 10	Cicer quo pacto intereat. 210. 20
Carbones quomodo fiant. 77. 20	Celastrus usus. 76. 1 (31. 40)	Cicer quomodè feratur. 209. 40
Carbones optimi qui. 77. 1	Celidemus de plantarum morbis. 121. 1	Cicer quomodo feratur. 218. 10
	Celtis. 27. 20. & 51. 30	Cicet perit imbre. 104. 1. & 108. 10
	Celtis ubi plurima gignitur. 31. 30	Cicet agrum emacrat. 120. 30
	Celtim habere medullam. 74. 1	
	Centaurium ubi forciundũ. 32. 40	

I N D E X.

Ciceri aptum solum.	195.1	Comitialis morbi remediū.	110.1	Crada.	17.10. & 211.30
Cicerule uermes innascentur.	194.10	Comythes.	61.10	Cradicatio quid sit.	65.10
Cicerule caulis.	101.10	Conchis uita opera canceri feruat.	172.30	Crana in Arcadia habet excellentes abietes.	48.40
Cichoracea.	97.1	Conferarum semina.	148.10	Crambus uuarum qualis.	211.30
Cichorea quando floreat.	96.20	Consecratrix.	116.40	Crenides.	126.40
Cicuta ubi optima.	123.10	Consecratrix quales foliū.	97.40	Crepis.	95.1
Cicuta ualidior quæ in frigidis locis est.	124.40	Consecratrix ubi optima nascat.	117.1	Crescencia celeriter.	135.30
Cicute succus.	117.30	Constitutionis interuallum.	135.40	Creta quæ præstantiora ferat.	124.1
Cicute usus.	124.40	Corchorus.	94.10	Creta dictatum propriū.	123.30
Cinamomum.	14.20	Coria alba quibus inficitur.	47.10	Creta cupressum habet.	49.10
Cinamomi frutex.	115.30	Coriannum prouentu cōtumax.	87.30	Creta insula algam fert optimā.	124.1
Cinamomum ubi crescit.	114.10	Coriannū quando exeat.	197.40	Creta quid gignat.	54.40
Cinamomi partes & bonitas.	115.30	Corianni semen.	97.10	Cretensis cepæ.	91.40
Cinamomi cortex.	115.30	Corianni radix.	89.30	Crispa ligna quare fiant.	242.30
Cinamomi colligendi fabula.	115.40	Corinthū genus radicis.	90.40	Crocum.	116.40
Cinis utilis additus radicib.	218.1	Corinthi agri quibusdam locis caprificatio nulla est.	29.20	Croci odor.	248.40. & 555.1
Cinis fico additur.	189.10	Cornus qualis.	41.20	Croci descriptio.	84.40
Cineris usus.	355.10	Cornus quando fructificet.	33.30	Croci satio.	85.1
Cinerē roboris nitrosum esse.	37.1	Cornus ualidissima est.	75.1	Croci radix.	12.40. & 85.1
Circe ubi habitauerit.	76.40	Cornus quando germinet.	31.20	Croci folium.	97.40
Circum promontorium.	76.40	Cornus ingustabilem fructum gignit.	34.1	Croci flos.	86.10
Cimbæna quid gignat.	114.20	Corni fructus.	175.20	Croton arbor qualia habeat folia.	16.30. & 170.10
Clauicula edere genus.	47.30	Cornum nimis multum alimentum suscipit.	184.10	Cucumer quomodo floreat.	90.1
Clauus in olea.	65.10	Cornu quæ attingit. incoctilia fieri.	207.40	Cucumis qua ratione formam accipiat.	90.30
Cleodemi de plantis & animalibus opinio.	30.40	Cornu in pectore.	219.1	Cucumis quando feratur.	87.20
Cleonæum genus radicis.	90.40	Cornicularium papauer.	121.20	Cucumeris flos.	20.40
Clidemus de semine.	194.30	Coronaria.	198.10	Cucumeris semen.	39.10. & 87.40
Clidemi opinio de germinatione.	137.1	Coronariæ herbæ.	248.20	Cucumeris radix.	89.40
Cnecum.	78.40. & 82.1	Coronaria quo potissimum modo intereant.	230.30.	Cucumeris genera plura.	90.40
Cnici flores.	20.30	Coronarum genus.	191.1	Cucumeris an sint diuersæ species.	91.20
Cnicum.	240.30	Coronariæ plantæ.	78.30. & 81.40	Cucumis.	137.1. & 173.10. & 198.1
Cnici semen.	230.40	Corruda.	78.40. & 81.40	Cucumis non durat.	165.10
Cnidie cepæ.	91.30	Corruptio quomodo fiat.	238.30	Cucumeris syluestris radix ad quæ utilis.	118.40
Cnipis bestiolæ.	29.40	Corruptiones duplices.	219.10	Cucumeris semina quo pacto ferenda.	217.30
Coccycis genus.	172.30	Corficæ arbores.	76.20	Cucumeres pusillam habent racem.	245.10
Coctile quid sit.	206.1	Corfium loti radix.	59.20	Cucumeres.	168.20
Coctilia legumina.	108.40	Cortex ex quibus constet.	9.10	Cucumerum amaripudo.	242.1
Coctilia cur semina fiant.	205.40	Cortex quando facile arboribus demi possit.	68.30	Cucumeres quomodo nutiantur.	189.10
Coctionem impediencia.	146.20	Corticis cerasi.	42.40	Cucumeres qua ratione colantur.	161.20
Coctionis ratio.	161.10	Corticis definitio.	9.1	Cucurbita.	161.20
Codrosia quincia quid ferat.	54.10	Corticis uarietas.	11.20	Cucurbita quidlo prodeat.	87.10
Cœli status ad fructus multum ualet.	149.30	Corticum squamæ unde.	34.10	Cucurbita quomodo floreat.	20.30
Cœli obseruatio in plantis serenidis.	178.10	Corticis durities alimentum inhibet.	228.20	Cucurbitæ radix.	89.40. & 245.10
Cœlum mutat plantas.	168.10. & 188.20	Corticis detractio quid faciat.	229.10	Cucurbitæ semen.	90.40. & 93.10
Colendum quando sit.	188.20	Corticum similitudo facit ad infusions.	131.20	Cucurbitæ satio.	87.20
Colorum quor genera.	233.40	Costus.	116.40		
Coluber quomodo mutet.	25.20	Corunnix herba.	96.40		
Colutæ ubi nascatur.	46.1				
Colytra arbor.	46.10				
Colytra qualis.	44.10				
Comacum.	116.40				

I N D E X.

Cucurbitæ an sint plura genera.
91.10
Culices in quibusdam arboribus
nascuntur. 66.10
Culices ficarij unde. 29.30
Cultra celerius fenescunt. 165.1
Cultra tardius germinant. 142.40
Culturam quædam plantæ non
admittunt. 174.40
Cultura quid efficiat. 9.20. & 31.30
& 107.40. & 165.1. & 190.1
Cultura potest immutare plâtas.
168.1
Cultura & alimentũ quid in plan
tis possit. 23.40
Cultura multum potest. 15.30
Cultura quibus necessaria sit, qui
bus perniciosa. 10.10
Culturæ communia. 28.10
Cuminum qua superstitioe fe
ratur. 118.10
Cuminum fertile. 209.30
Cumini radix. 166.40
Cunila. 175.30
Cupressus. 166.1. & 137.40
Cupressus procera. 18.1
Cupressus qualis in fructificatio.
199.10
Cupressi semen. 132.40 & 148.10
Cupressi fructus. 146.30
Cupressi in Cræta insula. 31.1 &
110.1
Cupressi statua. 215.10
Cupressi odor. 245.20
Cupressi difficulter crescit. 135.40
Cupressus q̃modo generetur. 33.2
Cupressus semper uret. 15.40
Cupressus in Cyrenensi agro pro
uenit. 51.30
Cupressum calida loca magis ha
bent. 54.40
Cupressi folia. 17.1
Cupressus diuturna. 72.30
Cupressus ubi excubet. 31.2
Cupressus recusatissimum. 28.20
Cupressus in frigidissimis locis.
49.10
Cupressina materies. 72.30
Curculionem quæ creent. 210.1
Cyce palmarum genus. 28.1
Cypria ficus. 30.1
Cyrena producit odoratissimas
rosas. 84.30
Cyrena maximam buxum ha
bet. 45.1
Cyrenenses. 81.2
Cyrensi arbores necat. 68.10
Cynisi medulla. 71.10
Cytora buxo abundat. 15.1

D

Decuminationes. 175.40
& 129.30
Decuminationis quæ sit. 187.1
Decuminationis quas necat arbo
res. 67.30
Decuminationis quando tempe
stiva. 188.40
Decuminationis ratio. 229.30
Definitiones probandæ. 9.30
Democriti opinio de arboribus.
165.40
Democriti de saporibus sententia.
Densum solum. 157.30 (331.20
Dicæ fructus. 248.10
Dicami usus. 123.40
Dicami probatio. 123.40
Dicami seruandi ratio. 123.40
Dicamum falsum. 123.40
Dicamũ p̃priũ esse Crætæ. 123.30
Diminutionis ratio. 229.30
Diminutione qd percat. 229.40
Dioegenis de plâtis sententia. 10.40
Dipias spina. 56.30
Dolantia ligna. 74.10
Draconias triticum. 192.40
Dracontuli radix. 97.30. & 128.1
Dulcia celerius putrescunt. 220.10
Dulcia raro bene olent. 248.10
Dulcia breviori tempore matsu
rescunt. 146.10
Dulcissima noctu effodienda. 118.1
Dulcis sapor. 231.20
Dulcis sapor aptissimus. 235.30
Dulcis aquæ usus. 159.20
Dulcis sapor siccitatis esse ponus
quàm humiditatis. 242.30
Dulces quædam radices ueneno sũt.
95.40
Dulce principium. 237.20

E

Ebenus. 72.30
Ebenus grauius. 11.30
Ebeni lignum. 128.1
Ebeni medulla. 17.10
Ebrus amnis. 226.30
Edera. 79.10 & 160.10 & 173.10
Edera uiuax est. 13.30
Edera arbores necat. 228.10
Edera nocet plantis. 216.20
Edera uia in cornibus. 171.20
Edera calida. 71.30
Edera ab alijs uiuit. 48.1
Ederæ folia. 16.30
Edera cupit frigus. 155.1
Edera ciliicia. 48.1
Edera in Asia non nascitur. 52.30
Ederæ genera. 79.30

Ederæ species. 47.20
Elaterium unde fit. 123.20
Elaterium medicamen. 118.40
Elaterium diuturnum. 122.20
Elementorum natura. 168.20
Elementales partes plantarũ. 8.2
Eleuani ager. 10.1
Elium. 78.30
Elium semine prouenit. 85.1
Elpenoris tumulus. 76.40
Empedoclis dictum. 124.30
Empedocles de animalib. 150.40
Ensis radix. 97.30
Ensi herba quale folium. 97.40
Endusicum. 94.10
Epimenidis scillæ. 97.10
Epimelum. 94.30
Equapium. 93.10 & 123.20
Equapij humor. 112.1
Equapij radix. 89.30 & 144.2
Equapium lachryma feritur & na
scitur. 22.40 & 112.10 & 132.1
Equapium perpetuũ uret. 16.2
Equestri radice sũs extinguitur.
Eringium. 78.40 (121.30.
Errancum papauer. 121.20
Eruanga. 108.20
Eruca celeritè nascitur. 87.20
Eruca ex tineæ. 25.30
Eruca breuius rigatur aqua falsa.
158.20
Eruca gignit aureliam. 218.40
Eruca quomodo nascantur & in
terant. 194.1. & 222.2
Eruca semen. 95.10
Eruca sanus. 87.10
Eruca oleis nocent. 66.1
Eruca radix. 89.30
Erugo quid sit. 193.40
Erugo segetum. 191.30.
Erugo frumenta magis infestat.
108.40
Eruginis causa. 193.30
Erugine qui agri potissimum in
festantur. 196.1
Eruia caulis. 103.10
Eruum durat diu. 110.10
Eruum quando ferendum. 25.10
& 100.30. & 204.10
Eruum inter radices ferere. 173.10
Eru caulis. 103.10
Eru flos. 103.2
Erysimum. 166.30 & 146.30
Eteochritum hordeum. 191.30
Etruria faceret medicamentis. 122.40
Eubœa quid ferat. 55.10
Euboia tepida. 224.40
Euboica materies. 70.30
Eudemus medicamentarius. 125.20

INDEX.

Euentari quid uocent quidam.
109.40.
Euonymus arbor 48.10.
Euphrates fructum fabæ similem
mirè producit. 59.10.
Europa ex odoratis parum pro-
ducit. 116.48.
Europa quid ferat. 55.10.

F

Faba. 58.30. & 100.10.
Fabæ satio. 100.30. & 167.10.
& 195.40. & 201.10.
Faba quādiu floreat. 90.1. & 103.1
Faba quomodo pereat. 108.10.
Fabæ infirmitas. 106.40. & 166.40
Fabarum discrimen. 106.40.
Faba sterilis flore. 104.1.
Fabæ in coctione differūt. 105.40
Faba stercore æ putat agrū. 109.1.
Faba costibilib. 108.40.
Fabæ midam creant. 110.1.
Faba nigra ex candidis. 107.1.
Faba quomodo seruandæ. 107.1.
Faba eruginem sentit. 109.1.
Faba cur tarde crescat. 102.10.
Faba apud Appolloniā Ionij ma-
ris non corroditur. 110.20.
Faba florens aquam desiderat.
106.10.
Fabæ ubi durēt. 197.30. & 210.30.
Faba caulis. 103.10.
Fabæ folium. 103.1.
Faba quando exeat. 100.40.
Faba ubi uelit feri. 106.40. & 195.1
Fabæ radix. 167.10.
Fabarum putamina. 117.30.
Fabeta quomodo fiant. 58.40.
Fagus in aqua durat. 72.30.
Fagi fructus. 37.10.
Fagus quando germinet. 33.30.
Fagus Troix. 64.1.
Falcatio uinum. 187.
Farina uisitur Aegyptij ad sacra.
102.20.
Fauoni præstant uenti. 154.30.
Febri-fuga. 54.30.
Febri-fuga effodienda quomodo
sit. 118.10.
Fel terræ. 95.40. & 175.10. & 214.30
Fel terræ quandiu duret. 123.10.
Ferrum quam materiam magis
credere ualeat. 73.30.
Fertilitas unde. 175.30. & 179.10.
Fertiliora quæ sint. 109.30.
Ferulacea quæ. 80.1.
Fex pellium. 227.30.
Ficus. 46.10.
Ficus Cypria. 10.1.

Ficus Indix. 53.1. & 164.10.
Ficus quid ferat. 36.30.
Ficus fruncofa. 223.40.
Ficus in Aegypto. 147.1.
Ficus exposita frigori cur sit.
224.20.
Ficus obnoxia uermibus. 220.30.
Ficus quomodo perurganda.
181.1.
Ficus non caprificata. 169.20.
Ficus superstant. 169.30.
Ficus uini molesta. 184.30.
Ficus ualida. 74.20.
Ficus iuxta scillam sanus Ocyus
crescit. 26.10.
Ficus reddit deteriorem fructum
rigatione. 28.20.
Ficus quomodo crescat. 130.20.
Ficus quomodo inserat. 154.10.
Ficus facile augetur. 155.40.
Ficus cur serotina. 146.1.
Fici locus competens. 16.20.
Ficus ubi sentiat morbum. 220.40.
Fici odor. 245.30.
Fici accommodatū solum. 180.10.
Ficus quomodo reddatur fertilis.
19.10. & 147.10.
Fici amputatio. 221.1.
Ficus ex crada prouenit. 22.10.
Ficus raro corpore. 71.20.
Ficus qualem amet locū. 179.40.
Ficus multa sustinet. 228.49.
Ficus incrementum. 164.20.
Ficus facile amittit fructū. 161.40.
Fici cur arena inspergant. 169.1.
Ficorum genus. 223.1.
Fici quomodo meliores sūt. 168.10.
Fici cito senescunt. 164.40.
Ficus ex nouellis affert fructum.
12.1. (221.30.)
Fici fructus uermiculos sentit.
Ficus quomodo pullulare queat.
129.40.
Fico cinis additur. 189.20.
Fico quid sit peculiare. 149.40.
Fici radix cur obliqua. 12.30.
Ficorum succus. 144.30.
Ficum serendi ratio. 26.10.
Ficuum succus quomodo expri-
matur. 242.30.
Fici succū hyems crassat. 177.30.
Ficus aprissima ad ignem accipi-
endum. 77.40.
Ficus quando germinet. 33.30.
Ficus à ficu differt. 204.30.
Fici natura. 211.40.
Fici fumus. 77.30.
Fici quid auxilietur. 168.30.
Fici amplex in ponto. 54.40.

Ficu in caprificū mutari. 14.10.
Fici in Aegypto bonæ frugis non
sunt. 155.40.
Fictradi. 14.10.
Ficus quæ habeat succū. 226.40.
Ficus præcipue infestatur uen-
tis. 66.30.
Fici Indix radix. 14.10.
Fico scabie accidit. 221.1.
Ficus brevis uixit. 64.1.
Ficorum peculiares morbi. 65.30.
Ficulneum uallum. 211.30.
Fidicula ad destillationes urinæ
facit. 99.10.
Fidicula quando erumpat. 128.1.
Fidicula radix. 122.30.
Figuræ saporum iuxta Democri-
tum. 221.1.
Figurarum ratio. 221.40.
Filiæ ad quæ utilis. 126.30.
Filius radix. 128.20.
Filici sterco ratio inimica. 107.40.
Fimus idem non omnibus con-
uenit. 28.40.
Fimus hominis a cærimis. 128.40.
Fimus adiuuat fruges. 107.40.
Fimium herbe desiderant. 83.10.
Fimū quæ magis desiderat. 92.20.
Fimium stipulariū laudant. 92.20.
Fimi genera. 28.40.
Fimi usus. 92.20.
Fimium riuus misceri. 27.1.
Fissiles cepæ. 91.30.
Fissilia ligna. 74.10.
Fissularia harundo. 62.10.
Flamma floris species. 84.1.
Flatus in ponto quo pacto no-
ceant. 224.40.
Flatus calidiores & frigidiores iu-
xta nocent arboribus. 113.30.
Flos lappe. 99.20.
Flos loti in Euphrate. 171.40.
Flos frumenni. 96.40. & 230.40.
Flores quidam distantes odora-
tiores. 251.30.
Flores æstiu. 86.10.
Flores plantis aliis odoratis qua-
re non odorati sint. 249.30.
Florum differentia. 95.20.
Flores tritici & hordei. 101.40.
Flores leguminum. 102.1.
Florum genera. 20.1.
Flores cur comprimantur. 174.1.
Flores non odorati qui sint. 242.1.
Florum uarietas. 90.1.
Florum usus. 84.1.
Florum folia. 18.1.
Florum odor. 19.40.
Flores

INDEX

- Flores arborum. 11.1.
 Flores odorati. 147.30.
 Floris generatio. 149.30.
 Florum fipor. 149.40.
 Flores herbarum. 95.30.
 Flores gerennum spicam. 103.30.
 Flores lanugini quibus. 103.30.
 Florentia particulatim plura. 104.10.
 Florenibus ferè omnibus imber nocet. 66.1. & 111.1.
 Fluida medicamentum. 47.10.
 Fluidarum species. 47.10.
 Fluuiantes plantæ. 38.1. & 19.30.
 Formisq; facilius augecūt. 115.40.
 Formisficam herbam quam uocent. 116.30.
 Forminicornus. 41.30.
 Fomiculum. 80.20. & 140.30.
 Fomiculi semen. 90.10.
 Fornigraei odor. 149.11.
 Fornumgræcum limodoro interi mitur. 118.10.
 Folia quando decidunt. 16.10.
 Folia ex quibus consistunt. 18.1.
 Foliorum figura. 17.10.
 Foliorum discrimen. 97.40.
 Folia parte prona supinalq; inter se distant. 16.30.
 Folia quæ nunquã amittūt. 118.30.
 Folia in arboribus subspis similia sunt. 16.30.
 Foliorum differentia. 17.1.
 Folia fici & uitis. 18.40.
 Folium abietis. 39.10.
 Folia niliæ. 174.1.
 Folia olerum. 17.30.
 Foliorum fapor. 145.40.
 Folia uertentes arbores. 16.30.
 Foliorum alimentum. 16.40.
 Foliorum muratio. 170.10.
 Fomites optimi. 77.40.
 Fontes rigando boni. 17.40.
 Foffiones. 176.1.
 Foffio quibus proficit locis. 184.1.
 Foffio quid efficiat. 188.10. & 111.10.
 Foffio omnibus arboribus prodest. 18.40. & 183.40.
 Fraus herba ab radice tantum foliata. 95.1.
 Fraxinus. 118.1.
 Fraxinus qualem radicē habeat. 11.40.
 Fraxinus quando cõdatur. 68.40.
 Fraxinus humida. 71.1.
 Fraxini genera. 40.40.
 Fraxinus bubula. 18.10.
 Fraxinus facilius auctu. 11.10.
 Premium. 95.1.
 Premiu quando floreat. 116.40.
 Premij genus. 86.1.
 Frigidæ in rigatione ufus. 119.1.
 Frigida quæ fiat. 144.30.
 Frigiditas. 110.30.
 Frigus prodest crescētib; 113.10.
 Frigus exiccat. 186.30.
 Frigus quid noceat. 113.10.
 Frigus arboribus prodest. 65.10.
 Frigus perdit & fapores & odores. 115.40.
 Frigori quæ nam loca magis expofita. 113.40.
 Frigora cultus terræ defiderat. 119.10.
 Frigoris incommoda. 111.30.
 Frigora fatis uilia. 191.30.
 Frondes arborum. 145.30.
 Frondiflora. 95.1.
 Fructus ex caudice. 49.40.
 Fructus ex quibus consistunt. 18.1.
 Fructuum bonitas & prauitas unde. 16.20.
 Fructuum differentia. 141.30.
 Fructuum iactura. 113.30.
 Fructuum impedimentū. 144.10.
 Fructus faporem plantæ monftrant. 117.1.
 Fructuum concoctio quibus rebus perficiatur. 160.40.
 Fructuum maturitas. 141.30.
 Fructuum copie indicium fi in cæcumine ferunt. 111.30.
 Fructus quomodo uirides feruunt. 117.10.
 Fructus omnis primo ficc. 116.30.
 Fructus rigati meliores. 119.1.
 Fructum integere folijs. 189.10.
 Fructus quid iit. 8.10.
 Fructus qui bene oleant. 148.10.
 Fructibus quæ noceant. 65.40.
 Fructus quomodo corrumpant. 118.40.
 Fructum largū ferentes arbores. 148.30.
 Fructu maturitas diuerfa. 113.10.
 Fructum affidue habentes. 14.1.
 Fructu mutatio. 14.10. & 190.10. & 113.30.
 Fructum odor. 111.10.
 Fructus in arboribus diuerfis locis nascuntur. 7.10.
 Fructificant omnia. 111.30.
 Fructificatio uiribus detrahit. 164.30.
 Fructificationis caufe. 167.10.
 Fruges quibus locis ciffime perficiantur. 101.30.
 Frugum differentia. 101.10.
 Fruges qualem terram cupiant. 116.40.
 Frugibus optimum folum. 117.30.
 Fruges quid poffimum lartas faciat. 107.30.
 Fruges quæ degenerent. 197.1.
 Fruges quido demetendq;. 108.10.
 Frumentago. 101.40.
 Frumentaceorum caulis. 103.10.
 Frumentaceis aqua quando obfir. 106.10. & 10.
 Frumentacea ualidiora. 103.30.
 Frumentorum morbi. 109.30.
 Frumenta unde radicem, unde germen fundant. 101.30.
 Frumentis folum commodum. 147.10. & 116.10. & 191.30.
 Frumētarius qualis ager fit. 195.1.
 Frumentum in Piffiois firmiffimum. 104.40.
 Frumentorum incrementū. 115.30.
 Frumentum ante herbam debet nafci. 191.30.
 Frumenti radices. 147.30. & 101.10.
 Frumenta in flore imbres non ferunt. 104.1.
 Frumenta quomodo pereant. 110.30.
 Frumenta cur exhauriant terrā. 101.30.
 Frumenta quæ ualida. 103.30.
 Frumentum grande. 104.40.
 Frumentorū cōmoda fatio. 105.30.
 Frumenta breuiori tempore florent. 103.40.
 Frumenta conuenientiora homini quā legumina. 101.1.
 Frumenta quali folio consistunt. 103.1.
 Frumenta qui depafcant. 107.30.
 Frumenta quomodo renafcūt. 107.30.
 Frumenta primū infipida. 117.10.
 Frumentum quod celerius deficiat. 110.30.
 Frumentis feruandis aptus locus. 110.30.
 Frumentum peruicillari debet. 110.30.
 Frumentum demeffum cōponendum in metas. 108.30.
 Frumenta quomodo augeantur. 145.40.
 Frumenti genera. 100.10.
 Frumenta quæ pura proueniant. 105.1.
 Frumentacea etiam funt uaria in coctiōne. 108.30.

INDEX.

Frumenti alimentum.	101.1
Frumentorum radix.	101.30
Frumentorum semen.	196.20
Frutex quid sit.	9.20
Frunces quomodo fructū ferant.	21.10
Frutices semper uirentes.	16.1
Fumus acerbus.	77.30
Fumosa quæ sint.	77.30
Fungus caret radice.	12.30
Fungi è robore.	16.40
Fungi pediculus.	11.30
Fungi mirabiles.	16.40
Fusus agrestis.	81.1

G

Galla quando gignat.	14.10
Gallam fert robur.	16.20
Gallinæ multo partu intereunt.	165.10
Gardæ cepæ.	91.30
Gelano unde fiat.	226.10
Gelidium quando potissimum nocet.	225.1
Geminalis.	100.30
Geminalent an uiridem comedit animalia.	107.1
Gemma in uite.	15.10
Gemma hyeme periclitant.	188.10
Germen quomodo ex radice erumpat.	130.40
Germine nouello fructificantes.	149.1
Germine annotino fructificantes.	148.40
Germinali tempus.	87.40. & 136.30
Germinalia sponte.	132.30
Germinalia celerius.	198.40
Germinalia primum.	35.20
Germinalia optima.	149.40
Germinalia quid sit.	119.1
Germinalia in arcturo.	34.30
Germinalia plantarum.	6.30
Generatio plantarum.	6.30
Gethium quale semen habeat.	91.10
Gethium difficile germinat.	198.10
Gethium diligit aquam.	92.30
Gethium quando feratur.	87.20
Gethium quando satū prodcat.	87.30
Gethii radix.	13.30
Gith flores.	20.30
Glabranio.	120.40
Glacies quæ nocentissima.	131.10
Gladiolus.	116.40
Gladioli odor.	244.30
Gladioli caulis.	11.30

Gladioli folia.	17.10
Gladioli radix.	244.1
Gladiolus ubi nascatur.	18.1
Glans in mari nascens.	16.10
Glans qua ratione feruel.	130.40
Glandis sapor.	161.10
Glandes munite sunt.	148.10
Glandes tardè maturæ quare fiūt.	146.30
Gongri in arboribus.	13.10
Græca lingua copiosior quàm latina.	4.1
Græcia quas arbores gignat.	11.30
Græci coloni quando ferant.	101.1
Graminum radix.	12.40. & 144.1
Granata qd meliora faciat.	168.1
Grando unde sit.	119.10
Granum cridum.	117.40

H

Hæmodorum.	108.16
Hæmus sciat tamarice.	55.10
Harundo.	150.40
Harundo geniculata.	11.20
Harundo istularia.	62.20
Harundinis folia.	17.10
Harundo perpetuo uiret.	16.1
Harundo ubi nascatur.	18.1
Harundo quibus occasionibus crescat.	61.20
Harundinis genera.	61.10
Harundo cretica siue sagittaria.	62.30
Harundo quomodo nascat.	131.40
Harundo armamentaria.	61.30
Harundinis in Aegypti paludibus nata.	244.10
Harundines quando cadendæ.	61.40
Harundinis præparatio.	61.40
Harundo facile coit uulnerata.	219.10
Harundo adusta melius refurgit.	62.40
Harundo nialis.	60.10
Haridini radix.	13.40. & 244.10
Harundinaceum folium.	97.40
Hebenus cuius regionis uernacula.	33.30
Helenium.	178.10
Helenium odoratum.	84.1
Helenii flores.	247.1
Helson mons.	119.10
Helleborus in Arcadia nascitur.	113.10
Hellebori utilitas.	118.10
Helleborus melior nascens in Oëtamonte.	147.10

Hellebori fructus.	121.30
Helleborus ætæus.	119.20
Helleborum quomodo effodiat.	118.1 & 10
Helleboro quidam sine noxa uidentur.	115.1
Helleborus parnassius.	119.30
Helleborus ætolicus.	119.30
Hellebori radix.	117.40
Helleborus quandiu utilis.	121.20
Hellebori genera.	119.10
Helleborinæ semen.	119.20
Helleborus ponnicus.	119.20
Helleborus eleancus.	119.10
Helleborus massalioticus.	119.10
Hellica.	43.40
Heraclini dictum.	2.30
Herba quid sit.	9.20
Herbæ quomodo nascantur.	22.40
Herbæ quæ cura maiore egeant.	88.10
Herbæ sanigeræ.	98.40
Herbas quas uocent.	128.40
Herbæ quæ celerius quæ tardius nascantur.	87.30
Herbarum uires.	117.10
Herbariorum superfluo.	117.40
Herculeæ spina.	54.1
Herculana.	123.20
Hercus finis.	16.40
Hercum ciuitas.	115.10
Hesperidi herbæ in nocte melior odor, quàm in die.	231.30
Hibiscus.	123.20
Hibisci radix.	125.40
Hibiscum quale sit.	125.40
Hippodæ plantis.	10.1
Hippophaës.	123.20
Hircabula.	94.10
Hircispina.	112.1
Hircispina ubi nascatur largè.	123.30
Hircispina succus.	117.10
Hirculata uires quomodo coctendæ.	147.10
Hirundinaria.	99.10
Homo urbana species est.	10.20
Hominis olfactus deterius.	235.10. & 235.40
Hominis finis optimus.	28.40
Hominis macilentum qualem desideret cibum.	116.40
Hordeum è radicibus enascitur.	201.40
Hordei quomodo pereat.	208.10
Hordeo quod sit aprum solum.	109.30. & 109.1. & 192.30. & 40
Hordei satio.	201.10. & 204.20
Hordeum achilles.	191.30
Hordeum	

INDEX

Hordeum trimestre & bimestre. 201.1. & 204.20
 Hordeum quale alimentum potest. 191.40
 Hordeum crago magis infestat. 208.40
 Hordeum plantis uitium inter. feritur. 184.10
 Hordeum degenerat. 197.10
 Hordeum maturē feritur. 100.10
 Hordeū ubi rectius feratur. 106.1
 Hordeū q̄modo seruandū. 110.10
 Hordeum syluestre. 53.40
 Hordeum quibus rebus disferat a mitico. 103.40
 Hordeum ab hordeo quid disferat. 104.1
 Hordeum Indicum. 104.1
 Hordeū quot diebus a flore perficiatur. 102.10
 Hordeū mutatur in lolū. 106.30
 Hordeum flantibus quando percat. 109.40
 Hordeū quādo metendū. 110.10
 Hordeum mutatur sanone. 25.1
 Hordeum optime prouenit Athenis. 108.1
 Hordeū quando erumpat. 100.30
 Hordei radix. 12.30. & 101.30
 Hordei in triticū immutatio. 24.1
 Hordei usus ad conficiendum potum. 242.40
 Humicaulia. 94.40. & 173.10
 Humida quæ sint. 77.30
 Humida loca deteriorem materiam producant. 70.20
 Humirubus. 47.10
 Humor & calor inest omnibus plantis. 8.30
 Humores quid in animalibus & in plantis nominib. carent. 8.30
 Humorum differentia. 244.40
 Humorum sapores. 233.20
 Humor in omnibus. 18.10
 Humor saporis materia. 237.30
 Humor fecundus. 133.10
 Humor quid fir. 8.30
 Hyacinthus. 86.1
 Hybernus locis quid potius ferat. 106.1
 Hyberni imbres tempestiui arboribus profunt. 151.40
 Hyems tempestiua prodest. 219.20
 Hyemes posteriores nocent arboribus. 153.30
 Hyems quæ optima. 152.40
 Hyeme quid crescat. 140.1
 Hyemes tempestiue non nocent arboribus. 65.1

Hyems ad fructificationem multum ualet. 151.40
 Hyeme deteriores omnes plantis. 55.40
 Hyems quibus noceat. 177.10
 Hyeme qui uenit meliores. 154.40
 Hyemis commoda. 195.20
 Hyphear. 48.10. & 171.1

I

I
 Idæa. 60.10
 Ida quas nō habeat plūras. 55.1
 Idæa spelunca. 31.30
 Idæa pinus. 113.10
 Idæa peculiares arbores. 46.10
 Idem roboris genera quomodo distinguunt. 17.40
 Ignaria unde. 77.40
 Ilex qualis. 45.10
 Ilicis fructus. 45.10
 Ilex monis propria. 12.10
 Ilex difficilis moritur. 67.20
 Ilex quid asserat. 36.20
 Ilex quo tempore perficiat suum fructum. 33.40
 Ilex habet altam radicem. 15.30
 Ilicem habere medullam. 74.1
 Ilicis commoditas. 75.40
 Imber post sationem prodest. 105.40
 Imbres nocturni. 159.10
 Imbres aquilonij. 159.10
 Imbres quid faciant. 132.10
 Imbres quare fecunditatem afferant. 31.1
 Imbres optimi. 154.20
 Imbres nocent frumentis. 106.20
 Imbres ministrant arboribus alimentum. 152.40
 Imbres tempestiui arboribus profunt. 151.40
 Imbrium copiam quæ desideret. 192.30
 Imbres grossis ficulū nocent. 105.10
 Imbres post uergilias. 194.30
 Impes uermiculus quādo percat. 110.1
 Incoctile quid sit. 206.1
 Incoctilia cur quedam. 205.40
 Incrementa uaria plantarū. 35.20
 Inculta prius germinant. 142.40
 India quas plūras producat. 54.20
 India montuosa quid ferat. 54.1
 Indiæ imbres. 177.20
 Indica regio qd ferat. 53.1. & 123.1
 Inoculano. 133.10
 Inoculanoni aqua nocet. 133.40
 Inoculata arbores. 168.30
 Insania quo pacto induci possit. 130.10

Insaniam inducens herba. 99.40
 Insecta oleum odiant. 235.20
 Insino quæ sit. 133.10
 Insino nis disciplina. 134.1
 Infitionis ratio. 216.10
 Interpretis officium. 1.1
 Interpretandi studium. 2.30
 Inrubum. 94.1
 Inrubi germinatio. 94.20
 Inrubi usus. 97.1
 Inruborum genus. 153.30
 Inruris. 94.10
 Inruris cultu deterior efficitur. 175.20
 Inturis aculeum iuxta folium habet. 83.10
 Iouis flos. 78.10. & 84.1
 Iouis flos semine feritur. 85.1
 Iouis flos æstiuus est. 86.10
 Ipes uermes in uicibus uocitari. 194.10
 Iphyum. 86.10. & 98.30
 Iphyum quomodo feratur. 85.1
 Ipnium. 60.10
 Iris. 240.30
 Iris ubi melior. 255.1
 Iridis radix. 14.10. & 244.20
 Iridis odor. 248.30
 Italia materiam ad naues gignit. 55.10
 Italiae tellus uidetur reculare plantarum. 55.20
 Italiae incolis caprificidii usus nullus est. 29.20
 Iubam quæ gerant. 105.20
 Iuglans quonodo frangat. 74.20
 Iuglandis usus. 75.40
 Iulus quid. 35.1
 Iumentorum sterqus. 28.40
 Iuncus. 38.1. & 116.40. & 150.10
 Iuncus odoratus ubi nascat. 116.10
 Iunci genera. 65.1
 Iunci lapidei. 57.1
 Iuncorum radix. 244.20
 Iuniperi materies. 75.20
 Iuniperus quomodo fructificet. 139.1
 Iuniperi succus. 111.40
 Iuniperus qualem radicem habet. 35.40
 Iuniperum quo pacto tractare cōueniat. 190.40
 Iuniperus ad quæ apta. 75.40
 Iuniperi binæ. 33.10
 Iuniperus an floreat. 33.10
 Iuniperus quomodo nascat. 49.1
 Iuniperus tarde perficit fructum. 33.40

L

L Ac quomodo corrumpatur. 118.40
 Lac purgans. 123.10
 Lac bubulum. 123.10
 Lacte femina macerata. 118.10
 Lacteus fucus. 216.40
 Lactis sapor. 214.1
 Lactis ubertatem faciens. 120.40
 Lactifluatio quomodo fiat. 117.30
 Lacera quam facile crescat. 35.10
 Lachryma gignit. 22.40
 Lachrymæ quam germinatione præbeant. 121.1
 Lachrymarum cura. 244.40
 Lachrymarum odor. 244.40
 Laconia plena herbus. 113.10
 Laconica harundo. 62.30
 Laconica ficus. 112.10
 Laconicæ cucumeris genus. 91.20
 Laconicus ager. 54.30. & 177.30
 Laconicus ager medicamentis fictus. 123.20
 Laconica lactuca. 91.10
 Lactaria. 123.10
 Lactariæ caulis. 117.20
 Lactariæ species. 120.10
 Lactucarum genera. 90.40. & 91.10
 Lactuca candida dulcior. 91.10
 Lactucis porricidæ innascuntur. 91.40
 Lactuca quam cito erupat. 87.20
 Lactuce caulis. 88.40. & 117.10
 Lactuca sylvestris. 91.30
 Lactucæ sylvestris succus. 91.30
 Lactucæ radix translatæ. 89.40
 Lactuce semen. 90.10
 Lactuca tonsa. 169.30
 Lactucæ latitudo mira. 91.20
 Lactuce satio. 87.10
 Lactucæ radix. 89.40
 Lanæ gerentes herbe. 98.40
 Lanæ arborum. 57.30
 Lapago. 81.10
 Lapis ex fungo. 56.40
 Lapis qualis arboribus bonus. 179.30
 Lapides. 231.10
 Lapides cur subiciantur. 178.1
 Lapides non ubique ex agris colligendi. 192.10
 Lappa. 94.40. & 108.20
 Lappa lentis inimica. 218.10
 Lappa quod notabile habeat. 99.20
 Lappa caulis lactuca. 91.10
 Lactis odor. 244.20
 Larix quomodo proveniat. 21.1
 Larix cacumine ablato sterilesat. 61.40

Larix decacuminatione perit. 219.30
 Larix quando cadatur. 68.40
 Laricis fructus. 146.20
 Laricis humor. 111.40
 Lasei. 54.30. & 175.30
 Lasei quo pacto in Africa ortum. 121.20
 Laseis fucus. 112.1
 Laseis folium. 246.1
 Laseipitium ubi optime proveniat. 51.20
 Laseipitij semen. 90.1
 Laseipinum quomodo nascatur. 81.10
 Laseipitij radix. 13.40. & 81.1
 Laseipitij lachryma qualis gustu. 112.10
 Laseipitij causa. 31.10
 Laseipitij descriptio. 80.30
 Laseipitij preparatio. 144.40
 Larifolia. 37.10
 Latina in qua re præter grecorum linguæ. 4.10
 Lannus ager. 76.30
 Latinus ager plenus medicamentis. 122.40
 Lauri fructus. 248.10
 Laurus semper uret. 15.40
 Laurus vitæ offendit. 68.10
 Laurus quid ferat. 96.20
 Lauri satio. 26.10
 Laurus ad quæ utilis. 76.1
 Laurus putrescit magis quam uermiculatur. 220.10
 Laurus quomodo crescat. 130.30
 Laurus difficulter augetur. 135.40
 Lauri proprietates. 46.20
 Laurus ubi duret. 54.40
 Laurus seritur sub pinum. 184.20
 Laurus quando germinet. 32.20
 Laurus marina. 56.40
 Laurus alexandrina. 46.20
 Laurus in platano. 171.30
 Laurus facile perit. 165.20
 Laurus rari corporis. 71.20
 Lauri odor. 173.30
 Lauri generatio. 21.20
 Lauriformia. 56.30
 Lectirotaria. 40.20
 Legumina. 100.10. & 197.30
 Legumina quando metantur. 110.20. & 208.10
 Legumina incofabilia. 108.40
 Legumina quali folio consent. 105.1
 Leguminum satio. 201.10
 Legumina cibo difficiliora sunt homini. 201.1

Legumina cur celeriter germinant. 202.1
 Legumina minus terram exhauriunt. 202.10
 Legumina varie in coctione se habent. 105.40
 Legumina quomodo radicem & germen fundant. 201.30
 Legumina quomodo pereunt. 230.20
 Legumina candida. 105.10
 Leguminum caulis. 105.10
 Legumina fecunda. 105.30
 Legumina quoradices habeant. 101.30
 Leguminum radices. 12.30. & 201.20
 Legumina quæ serant. 105.1. & 30
 Leguminibus floribus quibus imber proficit. 195.40
 Legumina ubi ferenda. 192.10
 Legumina quando exest. 100.40
 Leguminum differentia. 105.10
 Legumina quomodo florent. 204.1
 Legumina diutius florēt. 205.40
 Legumina cur fecundiora sint. 106.30. & 202.20
 Legumina quæ cui conveniant solo. 195.1
 Legumina quæ eruginē sentiant. 209.1
 Legumina quomodo coctilia fiunt. 25.10
 Legumina frigus non possunt perferre. 204.20
 Leguminibus qua via alimentum dispenseretur. 202.1
 Leguminibus aqua nihil officit. 106.10
 Lemna. 60.10
 Lens. 100.30. & 240.30
 Lens coctibilis. 108.40
 Lens ferulis. 103.30
 Lentem quomodo possis grandæ facere. 25.10
 Lentis semen quomodo serendum. 218.1
 Lentis caulis. 105.10
 Lentis succus. 111.40
 Lenticis inserta minus vermiculacionem sentiunt. 220.20
 Lenticis inserta meliora efficiuntur. 218.1
 Leophanes commendat nigrum solum. 157.40
 Leporum uestigia quando ponissimum oleant. 235.40
 Leporæ remedium. 221.10
 Leprosos efficiens aqua. 159.30
 Leucomphalia ficus. 212.20
 Liber

I N D E X.

- Liber pater unde. 51.30
 Lienis remedium. 119.40. & 116.30
 Lignum à carne in plantas quid
 differt. 9.1
 Lignum ex quibus conficit. 9.10
 Ligna sponte germen emittentia.
 215.1
 Ligusticum. 116.40
 Lilium quando nascatur. 81.40
 Lilij odor. 147.10
 Liliorum differentia. 84.10
 Liliorum variatio. 84.10
 Lilij ex lachryma germinatio.
 131.1
 Liliorum caules. 135.10
 Lilium quomodo nascatur. 131.40
 Lilij quomodo ferenda. 84.40
 Lilij sua lachryma feritur. 112.10
 Lilij quomodo proveniat. 112.40
 Limodorum. 218.10
 Limonium. 86.1
 Linum mutatur in lolium. 170.1.
 & 199.10
 Lini odor. 247.30
 Litholassia genus radices. 90.40
 Liparæ peculiaris colorea. 46.1
 Lippitudinem curans. 110.40
 Liquato succorum. 117.10
 Liquor quid. 8.10
 Lirium. 98.10. & 131.10. & 137.10
 Lirium quando nascatur. 86.1
 Lirij idem quod narcissus. 84.40
 Lisubia acris. 77.30
 Loci natura ad producendas plan-
 tas plurimum valet. 21.40
 Loca mutantur. 170.20
 Locis singulis sua est proprietas.
 46.40
 Loca convenientia plantis. 48.40
 Locorum seu ad fructus quid fa-
 ciat. 109.30
 Locorum discrimina. 31.1. & 177.10
 Locorum natura quid valeat. 11.10.
 & 16.10. & 84.10. & 108.1
 Locorum ratio habenda. 105.40
 Locorum discrimina ad fructus.
 105.30
 Lolium aquam amat. 170.1
 Lolium quale. 106.30
 Lolij unde fiat. 106.40. & 108.10
 Lolium inimicum hordeo. 218.10
 Lolij in tritico mutatur. 199.40
 Lolium ex tritico. 197.10
 Lotus. 159.1. & 95.1. & 99.10. &
 116.40
 Loti semen. 200.40
 Loti generatio. 199.40
 Lotophagorum celtis. 51.40
 Lucernula. 86.10
 Lucinas quas vocet augures. 115.10
 Lumbrici quibus gennbus à na-
 tura sint. 128.30
 Lunæ calor. 191.40. & 109.10
 Lunæ ratio habenda in cædendis
 arboribus. 69.10
 Lupinum. 197.10. & 30
 Lupinum diurnum. 110.10
 Lupinum quædo metatur. 110.30.
 & 108.10
 Lupinij coli nō uult. 10.20. & 31.30
 Lupiniradicij mira natura. 14.10
 Lupinum infecundum quomo-
 do reddatur. 175.10
 Lupini satio. 100.10. & 101.10
 Lupinum uiride nullum animal
 mandit. 107.1
 Lupinum quale desideret solum.
 101.30
 Lupinum ualidum. 171.1
 Lupini proprietas. 111.1
 Lupinij optimè reponit. 109.40
 Lun in arboribus usus. 179.1
 Lycia quid ferat. 54.40
- M
- Macedonia quas plenas hz
 beat. 55.1
 Macedonia quomodo obnoxia
 sit frigori. 114.10
 Macedones quomodo distinguat
 roboris species. 18.1
 Macedones quomodo picem exu-
 rant. 114.1
 Macedonum plerique quomodo in-
 terierint. 104.40
 Macedonica materies. 70.10
 Madoniam quam appellat. 111.30
 Magydatis. 81.10
 Magydatis radix. 11.40
 Malio* ex qua materia fiat. 76.10
 Mala syluestria. 161.10
 Mali odor. 183.10
 Mala que suauissimè oleant. 190.1
 Malus à malo differt. 104.30
 Malus quomodo crescat. 11.10.
 & 190.30
 Malus medica quomodo ferat. 51.40
 Malus ne ulceribus lædatur. 176.1
 Mali medulla. 71.40
 Mali nodi. 15.1
 Mali breui putrescunt. 210.10
 Mali quim dense ferenda. 26.30
 Malus in plano melior. 31.30
 Mali terræ radix. 95.30
 Mali medicij que regio ferat. 51.30
 Malus perdit ante maturitatem fru-
 ctum. 19.10
 Malum terræ. 111.40
- Mali terræ usus. 118.10
 Malus quantum alijs noceat. 184.40
 Malus multa ferre potest. 115.40
 Malus medica qualis. 51.40
 & 147.40
 Mali uita. 64.1
 Mali fructus quos fenniat mor-
 bos. 211.30
 Malus uerna. 165.30. & 190.10
 Malus plagis debilitatur. 182.10
 Malos uermiculari. 165.10. & 110.1
 Malum odores suscipit. 155.40
 Mali terræ quandiu duret. 112.10
 Malus raro corpore. 71.10
 Mali radices. 11.10
 Malorum semina. 148.10. & 196.10
 Malorum fructus terra obruit.
 116.20
 Mali medicæ flos. 10.40
 Mali cur non cõgescant. 114.10
 Mamali quid producat. 114.10
 Malinathalla. 59.10
 Maloperfica. 137.40
 Malua coqui uult. 94.10
 Malua syluestris. 123.10
 Malux folia. 174.10
 Malua quanta euadat. 9.10
 Mandragora. 80.10
 Mandragoræ uis. 114.10
 Mandragoræ solum. 118.10
 Mandragoræ radix. 118.10
 Mandragora quomodo edificet
 da. 118.10
 Mare quid gignat. 158.10
 Mare bellus refertur. 16.40
 Mare rubrum. 16.10
 Mare etiam profert plantas. 15.10
 Maris aqua mista. 131.1
 Maris odor unde fit. 115.1
 Marina loca festinãtiora ad fru-
 ctuum maturitatem sunt. 103.1
 Maritica herba. 116.10
 Marina à terrenis quomodo disse-
 rant. 57.10
 Marina arbores. 10.10
 Mariscus iuncus. 69.1
 Maritimum granum. 120.10
 Marubij genera. 79.40
 Mastepum. 80.30
 Marcia quando cædenda. 14.10.
 & 68.30
 Materia in mari enit nascit. 55.30
 Materies in opere facilis. 71.10
 Materies optima ex arboribus ui-
 gentis ætatis. 69.10
 Materies staria uariarum regio-
 num. 70.10
 Materies optima ad Aquilonem.
 70.10

INDEX.

Matrix in plantis. 9.1
 Marurationis causa. 160.40
 Maturitas frugum. 101.20
 Medicus quid cognoscat. 176.10
 Medendi ars quid faciat. 176.30
 Media pronuncia quæ peculiari-
 ter ferat. 51.30
 Media excelsa regio. 110.40
 Medica tonsa. 169.30
 Medica urina & stercore perit.
 107.40
 Medica vis quæ fit. 175.20
 Medicamentum ossium. 47.10
 Medicamenta quo pacto uim a-
 muerant. 125.20
 Medicamenta ex uarijs. 117.10
 Medicamentibus scelerentes regio-
 nes. 54.30
 Medulla sicca. 71.40
 Medulla in putando obfusca.
 187.20
 Medullæ habet omnis materies.
 Medulla uinum. 187.10 (71.30)
 Medullæ quid faciunt ad fructus.
 187.30
 Medulla in plantis. 9.1
 Medulla denata in moriatur ar-
 bor. 86.1. & 129.20
 Medullæ uarietas. 51.40
 Medulla quibus sit membranis fi-
 milis. 12.1
 Megarenfis ager. 29.20
 Megarenfes quomodo cucum-
 res trahunt. 189.20
 Melampodium. 119.30
 Melampyrum frumentum. 105.1
 Melas annis. 62.10. & 116.1
 Melfrugum. 99.30
 Melfi agri fecunditas. 101.30
 Melle macerata femina. 218.10
 Mellis prouentus. 79.30
 Mellis humor è robore. 16.40
 Melothrum. 79.10
 Memphus peculiarem materiam
 habet. 51.10
 Menefior de plantis. 146.1. &
 190.40
 Menfiflora. 60.10
 Menstruorum remedium. 91.40.
 & 118.30
 Menta an habeat semen. 85.10
 Menta ex fifymbrio. 218.30
 Mentæ odor. 148.20
 Mentastrum. 94.10
 Merides quid ferat. 54.20
 Meridiem quæ arbores fpectare
 debeant. 181.40
 Meridionalibus regionibus quæ
 nascantur. 114.10

Mespila. 161.10
 Mespilus syluestris. 45.10
 Mespili odor. 148.10
 Mespili quor genera. 42.1
 Metalla. 131.10
 Metere tæpeftiue ad fructus quid
 faciat. 110.20
 Midam fabæ creant. 310.1
 Milium. 100.10. & 107.1. & 197.30
 Milium quor diebus maturi fiat.
 102.20
 Milij radix. 166.40
 Milij caulis. 101.10
 Milium ferax. 103.30
 Milium fecundum. 166.30
 Milium bene reponitur. 209.40
 Milij fano. 209.20
 Millipedæ bestiolæ. 56.10
 Mifum quid uocent. 192.10
 Mnaſium. 88.10
 Moly ubi nascatur. 132.20
 Montapium. 93.10
 Montana scabra. 41.10
 Mons alius reſertus myrrhæ ar-
 boribus. 114.20
 Montes ad olentiâ qd faciunt. 86.30
 Monnum propriæ arbores. 12.10
 Montes quales fruges proferant.
 108.1
 Montes pleni arboribus. 31.40
 Montes alnifumi uenena ferunt.
 Monitulum. 44.40 (147.30)
 Morbus quid fit. 219.10
 Morbi duplices. 219.10
 Morus Aegyptia. 49.30
 Morus Aegyptia quomodo fru-
 ctum ferat. 7.10
 Morus calida. 71.30
 Moro Aegyptiæ fructus ex caudi
 ce proſilire ſolet. 21.10
 Morus celeriter fructum ſuum
 conficit. 145.30
 Mori ſapor. 216.30
 Mori flexibilitas. 74.30
 Mori germinatio. 146.1
 Mori uſus ad nauet. 75.10
 Mori fructus. 166.20
 Motus cauſa. 8.30
 Mulæ herbæ folium. 126.30
 Mulierum proſumua curſus. 58.30
 Muralis herba. 79.10
 Muraleum. 94.10
 Muſci fertilis laurus. 165.30
 Mutano quid faciat. 178.30
 Mutatio quor modis fiat. 218.10
 Muſilano uinum. 189.10
 Myrica folia. 17.11
 Myrrha. 54.20
 Myrrha ubi creſcat. 114.20

Myrrhæ arbor quantæ. 114.20
 Myrrhæ arboris folium. 114.10
 Myrrhæ uſus. 116.40
 Myrrhæ præparatio. 144.40
 Myrrha quomodo probet. 112.20
 Myrrha quomodo emat. 114.40
 Myrrha qua ratione colligatur.
 114.30
 Myrrham ſub cane incidi. 112.20
 Myrrhæ arbores. 114.20
 Myrrhæ arbores meliores. 115.1
 Myrrhæ arbores cuiuſmodi ſolo
 gaudeant. 115.10
 Myrtaria. 120.20
 Myrtus muſſo macerata melius
 redolet. 251.30
 Myrtus qua ratione melioreſcat.
 190.10
 Myrtus purgatione diligit. 18.30
 Myrti odorare. 86.30
 Myrtus celeritè uritur frigore.
 225.20
 Myrti plaga regenda. 179.1
 Myrtus ubi melior reddat. 167.30
 Myrti corticè detrahendū. 121.1
 Myrtus quale ſtercus addat. 182.10
 & 190.1
 Myrti ſano. 26.20
 Myrti amant umbras. 180.30
 Myrtus in fruncem tranſit. 9.30
 Myrtus ualde diſſima. 18.40
 Myrtus qualis ſit. 160.20
 Myrti flor. 20.30
 Myrti fructus. 161.2
 Myrti generatio. 22.30
 Myrtus ubi cōmodius ſeratur. 54.40
 Myrti ſapor. 218.10
 Myrti celeris interitus. 165.40
 Myrti odor. 148.20
 Myrtus quomodo putanda. 121.1

N

Narcifſus. 84.40
 Narcifſus quomodo ſera-
 tur. 84.40
 Narcifſus quando naſcat. 86.1
 Narcifſi ſlos. 93.20
 Narcifſi folium. 97.40
 Nardus. 116.40
 Narta. 116.40
 Naſturnū quid erumpat. 87.20
 Naſturni ſemen. 93.10
 Naſturnū quando ſeratur. 87.10
 Natura in quibus inueſtiganda.
 144.40
 Naualis materies. 75.10
 Naualem materiem quæ regio-
 nes ſerant. 51.10
 Nebulae ſoribus nocent. 160.20
 Nepa

Nepa. 78. 40. & 81. 40. & 137. 10
 Nepae radix. 132. 10
 Nerum. 116. 40
 Nervus in plâis. 8. 30. 40. & 11. 30
 Nesbus fluuius. 30. 40
 Nicodori magistratu quid euen-
 rit. 148. 30
 Nigella quomodo foliata fit. 95. 1
 Nigrum solum. 157. 40
 Nilus habet platanum. 58. 10
 Nitrum cuius saporis fit. 231. 30
 Nitro macerata semina costibilo
 ra sunt. 228. 10
 Nix quid sit. 226. 1
 Nix Idæis montibus nunquam
 deest. 49. 10
 Nix iuuat ad excoquendum. 103
 30.
 Niuis utilitas. 153. 1. & 195. 1
 Niuem non gelare. 225. 40
 Nix hybernus noualibus prodest.
 198. 10
 Nodi in arboribus quomodo te-
 gantur. 70. 40
 Nodorum discrimen. 15. 1
 Nodorum in arboribus uarietas.
 14. 40
 Nodosæ quare sint plantæ. 70. 30
 Nomina rebus quomodo impo-
 nenda. 2. 40
 Nouale hybernū melius uerno.
 106. 1
 Noualium cura. 192. 10
 Nucleorum alimentum. 144. 30
 Nux auellana. 44. 20. & 197. 20
 Nux auellana an floreat. 33. 10
 Nucis auellanae fructus. 44. 30
 Nucis auellanae iulus. 35. 1
 Nuces auellanae quomodo fructu
 feræ. 9. 30. & 167. 20
 Nux Euboica. 72. 30
 Nux Euboica quale solum deſide-
 ret. 180. 10
 Nux iuglans. 31. 40. & 197. 20
 Nux iuglans montis propria. 31. 10
 Nucibus qui locus conueniat.
 26. 20
 Nucum sapor quo pacto expri-
 matur. 242. 30
 Nuces uetustæ plus olei reddunt.
 238. 10
 Nuces durant. 148. 10
 Nymphaeæ radix. 121. 30

O

O Besitate pereit animalia.
 223. 1
 Ocimum tonsum. 169. 30
 Ocimum quomodo ferat. 191. 30

Ocimum siccum. 198. 1
 Ocimum fecundissimū. 90. 20
 Ocimū in serpyllum mutat. 218. 30
 Ocimū sub canis ortum pallescit.
 92. 1
 Ocimum diu florēt. 90. 1
 Ocimū q̄ ratioe transferat. 88. 20
 Ocimo aquam administrant me-
 ridie. 92. 30
 Ocimi radix. 11. 40. & 89. 20
 Ocimum quale. 117. 1
 Ocimi semen. 90. 10. & 95. 10
 Ocimū quando prodeat. 197. 40
 Ocimi satus. 87. 20
 Octæ repetæ in arbore. 70. 40
 Oculus caninus. 96. 40
 Odorata calida. 151. 1
 Odoratiores sunt fructus agre-
 stes. 250. 1
 Odoratiora quibus locis proue-
 niant. 248. 20
 Odoratiores ubi plantæ efficien-
 tur. 169. 40
 Odoratissima quæ sint. 251. 40
 Odor in floribus. 19. 40
 Odoris uarietas in plantis. 19. 20
 Odorē creat crematio. 252. 20
 Odorata quare incēsa sint. 252. 20
 Odorata plerq̄ amara sunt. 240.
 Odoratæ plantæ ubi habe-
 antur. 54. 20
 Odorata animalia, ut plantæ, nō
 sunt. 252. 30
 Odores imbre impediunt. 256. 20
 Odores siccitas facit. 252. 10
 Odor cuius humoris fit. 248. 20
 Odor permissione fit. 233. 1
 Odor quid sit. 231. 10
 Odor uestigiorum leporū. 255. 40
 Odoribus quid aduerset. 255. 40
 Odores tempore mutantur. 251. 30
 Odor in fructibus. 252. 10
 Odorum species. 240. 30
 Odor melior redditur tempera-
 tus. 251. 30
 Odores frigore deteriores red-
 duntur. 251. 40
 Odoris immutatio. 169. 40
 Odoris melioris quæ sint. 256. 10
 Odoris ratio in qua re uersetur.
 250. 20
 Odorem quod suscipiat, quale o-
 porteat esse. 255. 40
 Odores oleo seruantur. 255. 30
 Odorem quæ siccā possimū su-
 scipiant. 255. 40
 Odores unde oriantur. 255. 1
 Odoris sedes in plantis uaria.
 242. 40

Odis duritia. 249. 10
 Odoris dulcedo. 249. 10
 Odores q̄modo æstu iuueniur
 & offendantur. 252. 2
 Odorum potestas unde fit. 251. 2
 Odorum & saporum cōiunctio.
 240. 10
 Oenantha inter flores numerat.
 85. 1
 Oenantha sepe florēt. 142. 10
 Oenanthes odorator est. 248. 30
 Oenothera qualis. 127. 20
 Oenotheræ radix hilares facit.
 127. 20
 Oēta quid gignat. 54. 30
 Olea diuturna. 64. 30
 Olea & myrtus amice. 184. 20
 Olea uertit sua folia. 171. 40
 Olea fert multa. 228. 40
 Olea in Cyrenensi agro bene pro-
 dit. 51. 20
 Olea Athenis. 64. 8
 Olea fragilis. 149. 20
 Olea facile rumpitur. 74. 20
 Oleam post arcturum non plus
 olei facere. 239. 8
 Olea quomodo proueniat. 22. 10
 Oleæ locus aptus. 26. 20
 Olea molesta uiti. 184. 30
 Oleæ semen. 196. 20. & 197. 20. &
 230. 40
 Oleæ imperigo accidit. 221. 8
 Oleæ morbi. 65. 10
 Oleæ medulla. 73. 30
 Olea uicet perpetuo. 15. 4
 Oleæ radices. 12. 10
 Olea frigori obnoxia. 155. 30
 Oleæ satus proprius. 26. 20
 Oleæ præciue meliores reddunt.
 67. 30
 Olea præcipue exigit ablaqueatio-
 nem. 182. 20
 Olea amissis folijs fructificauit.
 Olea marina. 56. 40 (24. 30)
 Oleæ commodum steruus. 183. 20
 Olea aptissima ad ignem. 77. 40
 Oleæ quid apud Tarentum acci-
 dat. 160. 30
 Olea quare fragilis. 11. 30
 Olea uertit folia. 16. 30
 Olea spissa. 71. 20
 Olea puranem amat. 28. 30
 Olea imprimis infestat uentis. 66.
 Oleæ plagæ tegendæ. 179. 1 (30)
 Olea difficilis auctu. 155. 40
 Oleæ serēda ratio. 26. 10. & 130. 20
 Olea simū & riganonē amat. 28.
 Oleæ ne ulcera nocēt. 176. 1 (30)
 Oleæ crescendæ tempus. 191. 40

Olex flos. 30.30
 Olex quā partē cōli spectare de-
 beant. 181.40
 Olex circa Tarentum male deſto
 reſcunt. 66.1
 Olearum genus Aegyptiū. 240.1
 Olearū genera multa ſunt. 240.1
 Olex nocet hyems. 177.10
 Olex ſtarna ſudare poteſt. 215.10
 Olex ſuccus. 229.1
 Olearum uermes. 194.10
 Olex germen. 149.1
 Olex quo pacto arachniū inna-
 ſcant. 221.40
 Olex ligna facile germināt. 211.30
 Oleū nouelle perēt ex fertilitate.
 222.40
 Oleū florēt imber nocet. 66.1
 Olex quomodo ſe habeat in fru-
 ſtificando & germinādo. 149.30
 Olex etiā ſeniores imbes tēpeſti-
 Olex fructus. 221.30 (ſil. 154.10)
 Olex cur noceat frigus. 214.20
 Olex cortex nō detrahend⁹. 132.1
 Oleis quid apud Miletū accidat.
 222.1
 Oleis aptū ſolum. 156.20 & 180.1
 Oleagnus. 60.20
 Oleagnum. 211.30
 Oleaginea materies. 78.10
 Oleaginea ligna germē emittūt.
 Oleaginorū folia. 16.40 (215.1)
 Oleaster ualde laborat frigore.
 Oleaster ſpina. 71.20 (214.20)
 Oleaster Megaris in foro. 70.40
 Oleaster ad quē utilis. 76.10
 Oleaster reredinē nō ſentit. 72.30
 Oleaster Olympiæ. 64.1
 Oleastro longior quā oleū uitā.
 61.40
 Olēna ex quibus efficiat. 250.40
 Olēū multū caloris requirit. 155.40
 Oleum ex ſpina. 51.10
 Oleum omnia necat. 68.10
 Olei penuria copioſe unde. 148.
 Olēū ex phaulis. 239.10 (90)
 Oleum ex albis oliuis. 239.10
 Olei copia. 239.30
 Olēū quare noceat plūris. 228.10
 Oleo odores ſeruantur. 255.20
 Olfactus hominis deterrimus.
 252.40
 Oliua in locis gelidis ſapore ca-
 ret. 259.40
 Oliuæ riguæ deterius fundūt ole-
 um. 239.30
 Oliuæ. 148.20
 Oliuæ quomodo intereāt. 154.1
 Oliuæ ſapor. 236.20

Olera. 169.30
 Oleriarbores. 9.40
 Olera rigata meliora. 159.1
 Olera quæ humoribus ſaliſis iuuēt.
 Olerū radix. 11.30 et 66.40 (158.20)
 Olerū ſemina nullas beſtiolas gi-
 gunt. 210.1
 Olera quomodo fructificēt. 21.40
 Olera quæ uocemus. 94.1
 Olera in arboris figuram mutan-
 tur. 9.40
 Olera ſunt fertilia. 209.40
 Olera quæ pacto pereant. 230.30
 Olera quædā culicē gignūt. 66.20
 Olerum cultura. 191.10
 Olerum radices quomodo magnæ
 ſiant. 216.30
 Olera quale ſolum uelint. 156.40
 Olera urbana. 87.10
 Olera quæ nulla habeant genera.
 90.30
 Olerū ſemina. 154.40. & 245.40
 Olera quædā amant aquā ſaliām.
 190.20
 Olera aquationē deſiderāt. 183.10
 Olerum genus. 191.1
 Olerum folia. 145.40
 Olympus Myſius nucē habet plu-
 rimam. 55.1
 Olympus laurum habet. 54.40
 Olympias uentus. 66.20
 Ononis. 79.1
 Ononis aculeū habet penes foliū
 81.10
 Ononis quomodo extirpāda. 81.30
 Orbes in ligno qui ſiāt. 70.30
 Orchomenius laeſus. 60.10
 Ordeago. 101.40
 Origanum. 79.10
 Origanū quomodo ſeratur. 58.20
 Origanū difficile germinat. 198.
 Origanū quādo erūpat. 87.30 (10)
 Origanum ſemper uiuet. 16.1
 Origanū ſpecies. 79.30
 Orientalibus regionibus quæ
 proueniant. 114.10
 Oris ſuaue olēū qd faciat. 51.40
 Oriza. 55.40
 Orobancha. 228.10
 Oſtry qualis. 39.40
 Ouis pingueſcit coluteꝝ fructus.
 46.1
 Oua animalium. 200.20
 Ouis ſemina ſimilia. 154.30
 Ouium fimus. 28.40

P

PAdus arbor gaudet umbro-
 ſis. 49.1

Paliurus in aqua. 61.20
 Paliurus in arbore trāſit. 9.30
 Paliurus qualis. 51.40
 Paliurus. 51.20
 Paliuri diſcrimina. 46.40
 Palma. 166.1
 Palma Deli. 64.1
 Palma ubi præcellat. 155.40
 Palma ſterileſcit cacumine ablato
 Palma amat calorē. 155.1 (65.40)
 Palma apud Babylonē. 22.1
 Palma ſterileſcit amittit fructus. 161.
 Palma ubi ſorcidior. 35.40 (40)
 Palmę in coſtę ſtriguliſtes. 54.20
 Palma qua cura retineat fructus.
 29.40. & 161.40
 Palma uidei nullā habere medul-
 lamarū genera. 27.20 (ſil. 12.1)
 Palmæ generatio. 149.2
 Palma quale ſolum amet. 26.40
 Palma diſciliſ auctu. 135.40
 Palmę quādo trāſit edæ. 27.20
 Palma marina. 16.20
 Palmę durabiles. 134.20. & 27.1
 Palma leuiſ. 71.40
 Palmarum ſarus. 26.30
 Palma ualida. 74.20
 Palma uirgis præcreatur. 101.1
 Palma quomodo emoriatur. 130.10
 Palmæ ſemen. 197.20. & 230.40
 Palmę qualia loca amēt. 189.30
 Palmis acerbitas ineſt. 190.20
 Palma ſemina fructū retinere nō
 poteſt. 190.20
 Palmæ ubi naſcantur. 53.40
 Palmis ſal pdeſt. 158.20. & 189.20
 Palma uulnerata perit. 228.30
 Palma decacuminata moritur.
 67.30. & 219.30
 Palmę ubi magnę proueniunt.
 52.20
 Palma in Creta. 28.10
 Palma quibus modis naſcantur.
 139.40
 Palma ubi ſterileſcat. 24.1
 Palma uiuet ſemper. 15.40
 Palmæ fructus. 21.20. & 27.30
 Palmarum flores. 20.40
 Palma refrigerari cupit. 189.40
 Palma qualē aērē cupiat. 189.40
 Palma ſumofa. 77.30
 Palmæ folia. 17.10
 Palma alta. 181.1
 Palmes creſcāt à palmite. 187.30
 Palmes. 211.30
 Palmites qui boni. 178.20
 Palmitum longitudo. 186.40
 Palmutæ nucleus. 148.10
 Paludapium. 91.20

Paluſtre

Palūstres arbores. 10.30
 Palustris faba. 18.40
 Palustres plantæ. 18.1
 Palustria loca non utilia ferunt. 206.20
 Palustribus locis quæ gaudeant. 48.40
 Palustribus locis fossio prodest. 184.2
 Panax herculana. 119.40
 Panacis genera. 219.40
 Panacis utilis. 118.30
 Panaces multæ. 120.10
 Panacem effodientes quid faciāt. 118.10
 Panacea. 121.20
 Pandius mente alienatus. 121.40
 Panicum. 100.10. & 107.1
 Panicum quod diebus maturum fiat. 102.20
 Paniculū quare optime reponitur. 209.40
 Panici satio. 209.20
 Panici caulis. 201.10
 Panici radix. 166.40
 Panis ex palmis. 28.10
 Papauer. 166.30
 Papaueris caput. 117.20
 Papauer fertilissimum. 109.40
 Papaueris semen. 18.20
 Papaueris sylvestris genera plura. 121.10
 Papiliones. 218.40
 Papilio ex cruce. 25.30
 Pappū lanuginē in quibus uocēt. 82.40. & 90.10
 Papyrus. 58.10
 Pardalis an oleat. 172.30
 Pardalis olere. 237.10
 Parnasus mons quid ferat. 54.30. & 123.10
 Parnasica materies. 70.20
 Parnasia abies. 15.30
 Partus mulierum iuuant folia diētari. 123.40
 Pastinaca ubi laudatiss. 127.40
 Pastinaca ubi præstantior. 123.30
 Pastinaca in Arcadia. 123.10
 Pastinum quid uocent. 192.20
 Pediculus quid. 8.10
 Pelecania habet multas harundines. 62.1
 Pelium montem Thessaliæ medicamina ferre. 121.10
 Pellium feces. 190.2
 Pepo quomodo floreat. 90.2
 Pepo cuiusmodi radicem habeat. 89.40.
 Perdicium quali sit radice, & cur

ita uocetur. 13.30
 Peregrinanonis studium. 267.40
 Perfectio quid sit. 199.2
 Perianthinorum uicis. 124.10
 Perissus. 120.10
 Persea arbor. 30.10
 Persica Aegyptia ubi melius proveniat. 155.30
 Persicam, quam uocant, mālum quæ ferat regio. 52.40
 Persica quomodo feratur. 52.40. & 53.1
 Persica qualis arbor. 52.40
 Persicū pomū uō mādatur. 52.40
 Persica arboris pomum & foliū odoratissima. 52.40
 Persicum pomū inter uctiles positum, eas inoffensas conseruat. 52.40.
 Persicum pomū cōtra mortiferū potum ualeat. 52.40
 Persica arbor fert poma omnibus horis. 52.40
 Persicum pomum suauem haliū reddit. 52.40
 Persica in Aegypto & locis proximis fructificat. 32.40
 Persica nō ubiq; fructificat. 32.40
 Persis quæ peculiariter ferat. 52.40
 Persis Carmiæ cōtermina. 57.10
 Pes gallinaceus. 94.10
 Persulens lues quomodo inuadat. 224.30
 Petina. 94.40
 Petra Cappadociæ locus. 110.30
 Petrea ubi nascatur. 123.20
 Peucedanum. 123.20
 Peucedani radix. 127.40
 Peucedanum quinque aut sex annis durat. 222.10
 Phalacras. 46.30
 Phalangium. 109.30
 Phacon leguminis genus. 53.40
 Phellodrys. 45.20
 Philira perpetuū uiret. 15.40
 Philosophi est romina rebus imponere. 3.10
 Philycæ. 74.30
 Philycæ quando germinet. 33.30
 Philycæ utilitas. 76.2
 Phleus altero solo cōdinat. 79.1. & 81.30
 Phleum ubi nascatur. 60.10
 Phleum iuxta solum aculeum gerit. 81.10
 Phocis uitis. 169.20
 Phocenses quando ferant. 101.1
 Phrygium. 86.10
 Pica glandes reponit. 172.20

Picea. 38.10. & 54.40
 Picea quando cædenda. 69.20
 Picea regeminar. 38.40
 Picea an floreat. 33.10
 Picea decuminata morit. 67.30
 Piceæ lachryma. 114.40
 Picea pediculifera. 196.10
 Picea ad naues apta. 75.10
 Piceæ fructus. 146.20
 Piericus olympus. 55.1
 Pieslangensis agri triticum. 203.30
 Pilulas comatas robur gignit. 36.20.
 Pinastrum mōtis propria arbor. 32.10
 Pinastrum ubi excellentissimum est. 48.40
 Pinaster culturam recusat. 10.10
 Pineæ. 82.10
 Pinguedo quo pacto fiat. 242.10
 Pinguedine pereunt & plantæ & animalia. 242.20
 Pinguedinis causæ. 240.2
 Pinguis saporis figura. 232.10
 Pinguis calida. 152.1
 Pinus feruari potest teda detracta. 228.30
 Pini humor. 111.40
 Pinus conifera. 116.10
 Pinus plurimi usus. 69.20
 Pini & abietis discrimen. 69.20
 Pinus fructificat & redificat. 113.10
 Pinus syluesteris. 31.40
 Pini semina. 148.10
 Pini radix. 12.10. & 25.40. et 142.10
 Pinus qualem locū quærat. 160.10
 Pinorum species. 38.10
 Pinus quid ferat. 36.20
 Pinus difficilis auctu. 135.40
 Pinus apta nauibus. 77.1
 Pinus pondus sustinet. 74.20
 Pinus præcisa arescit. 36.1
 Pinus præcisaibilis. 74.30
 Pinus quomodo nascatur. 23.1
 Pinus radice tedom ingerit. 113.1
 Pinus gignit ægidem. 38.30
 Pinus nulli inimica. 184.20
 Pinus frigus cupit. 155.1
 Pinus alta. 18.1
 Pinus marina. 113.10
 Pinus in tedom uersa moritur. 243.20
 Pinus sine medulla uiuere nō potest. 229.20
 Pini fructus. 248.10
 Pini quando cædantur. 68.40
 Pinus ulcere non perit. 67.40
 Pinus decuminata morit. 67.30
 Pinus an floreat. 11.19

I N D E X.

Pinus calida.	172.1	Plantago q̄modo floreat.	96.20	Plantarum succi.	144.1
Pinum Syria non fert.	114.10	Plantago.	95.1	Plantarum omnium communis	
Pini nodus.	73.20	Plantarum humor.	111.30	mors.	68.1
Pinum strangulati aiunt obefitate & pinguetudine.	213.1	Plantis cultura aliquando nocet.		Plantarum diuifio in fuas partes	
Pini odor.	248.10			difficilis.	6.10
Pini lachryma.	244.40	Plantarum pernicies quæ ab alijs		Plantarum partes aliæ crispiores	
Pini quo pacto corrūpantur.	213.1	uenit.	227.1	alijs quare ſint.	243.30.
Pinus uentis obnoxia.	35.40	Plantæ quæ uidentur fructu & ſe		Plantarū partes primæ.	7.20
Piperis genera.	127.40	mine carere.	85.10	Plantæ in ſuo uigore odorantiſſi	
Piper rotundum.	127.40	Plantæ ſunt quæ nuſquam quàm		ma.	251.40
Piper longum.	127.40	in mari uiuere poſſunt.	158.10	Plantas oleum necat.	68.10
Piræi agri aqua.	159.30	Plantarū morbi interni.	219.20	Plantæ nouellæ inualidæ.	68.10.
Pirum ſcindi.	229.10	Plantarū morbi externi.	219.20	& 351.40	
Pirastro lōgius uita q̄ piro.	63.40	Plantæ cur oleant.	221.30	Plantæ marinæ.	57.1
Pirus quomodo proueniat.	12.20	Plantis ineſt omnis ſapor, præter		Plitæ uetuftæ odoratiores.	251.40
Piri ſylueſtris ſapor.	161.10	ſaliſus.	241.1	Plantis ſata facilius germinant.	
Piri cur amittant fructus.	162.1	Plantæ omnes quando pulcher		155.20	
Pirus à piro differt.	204.30	rimæ.	6.20	Plantarum partium ambiguitas.	
Pirus quomodo creſcat.	110.30	Plantæ ex negligentiâ meliores		6.10	
Pirus obnoxia uermibus.	220.10	redduntur.	169.40	Plantæ ubi poſſiſſimum uires ha	
Piri ſylueſtris cur tardè maturita		Plantæ recreſcentes.	64.10	beant.	245.10
tis ſint.	146.30	Plantarum ſpecies.	9.20	Plantarū hitoriz diuiſio.	6.1
Pirus quando germinet.	33.20	Plantæ cognatæ inter ſe.	171.40	Plantæ enerves.	11.20
Pirus reſiſtit frigori.	214.30	Plantæ uariæ uaria animalia cre		Plantæ quàm crebrè ſerēdæ.	26.20
Pirorum ſemina.	148.10	ant.	110.1	Plantarum craſſitudo.	185.40
Pirus in Phocidæ.	169.1	Plantæ quæ longiores, quæq̄ hu		Plantæ ſolo pingui offenduntur.	
Pirus qualis ſit.	119.2	miliores ſint.	11.10	156.40	
Pirus in plano melior.	32.10	Plantæ cornice differant.	11.10	Plantæ uenofæ.	246.40
Pirus ſylueſtris facilius germinat.		Plantarū prima genera.	152.30	Plantarū internæ & externæ par	
143.1		Plantæ quærit ſibi accommodatū		tes.	6.40
Pirus ne ulceribus laboret.	176.1	locum.	49.20	Plantæ comparandæ animalibus	
Pirus quibus locis gaudeat.	41.10	Plantis nō addēdū ſtercus quod		6.40.	
Piri cortex.	9.10	uis.	227.40	Plantarum partium differentiæ in	
Piri ſylueſtris locis feruidis non		Plantarū uires mirabiles.	54.20	quibus ſint.	7.8
naſcitur.	155.30	Plantarū ſumma differētiâ.	55.20	Plantæ nouellæ leue ſtercus po	
Pirus plagis infirmantur.	182.10	Plantæ frugiferæ in ſolo ſibi con		ſulant.	181.30
Pirorum ſapor.	216.30	ueniente.	26.30	Plantæ nouellæ.	146.40
Pirum quomodo reddat frugife		Plantarum medulla.	11.40	Plantarum interualla.	18.20
ra.	20.10	Plantæ ſatiæ molliorem aërem		Plantæ res uariæ.	7.30
Pirus longioris uitæ.	166.10	quantunt.	155.20	Plantæ animalium depaſitione in	
Pirorū genus Caræ.	242.1	Plantarum aliæ culturam exigūt,		feſtantur.	230.1
Pirus quando maturat fructum.		quædam recuſant.	10.10	Plantis partes quæ ſint.	6.20
33.40		Plantis aquatilibus breuior uita		Plantæ in ſolo tenui ſitæ, odore	
Piri ſylueſtris materies.	73.30	quàm terreſtribus.	63.30	meliori ſunt.	251.40
Piri ſemen.	196.20	Plantarum differētiæ ex formis.		Plantarum partes maximæ.	7.20
Piſcium generatio.	165.40	10.20		Plantæ aliæ aliud ſolum poſtulat.	
Piſces in mari quales ſint.	241.10	Plantis nouellis exinio ſunt faba		170.40	
Piſum.	100.10.30. & 103.1	rum putamina.	227.30	Plantæ quomodo ſerendæ.	25.40
Piſum fragiliſſimum.	209.10	Plitæ à quo loco accipiendæ.	178.30	& 174.40.	
Piſo uermes innaſcuntur.	194.1	Plantarum differētiâ ex locis.		Plantæ ſapor mutatur.	236.20
Pix aſſiccat.	228.20	10.30		Plantarum radices quibus mor	
Pix quare noceat nouellis plantis.		Plantas quo pacto frigore pere		bis obnoxia.	220.20
228.10		ant.	223.40	Plantæ nouellæ non tangendæ.	
Pix.	18.20	Plantarum morbi.	219.10	180.40	
Pix optima.	113.1	Plitæ ſaporē iſdicat fructus.	227.1	Plantæ ſerendæ quales eſſe debe	
Pix quid copioſa reddat.	111.3	Plantarum omnes differētiæ bre		ant.	178.20
Picis incrementum.	113.10	uiter enumeratæ.	21.30	Plantæ aquis propinquæ, minus	
Pix qua ratione uratur.	119.30	Plantarū generatio.	6.30. & 22.1.	durant.	64.10
		& 10.40. & 129.1. & 196.10		Plantæ uniũs partes eſſe uariũ	

I N D E X.

facultatum. 146.40
Plantarum partes ex quibus con-
stent. 7.40
Plantæ quādo amputandæ. 181.1
Plantæ quādam partes quotan-
tis amittunt. 6.30
Plantæ quæ eligendæ. 16.1
Plantarum genus quale defide-
ret alimentum. 159.30
Plantæ uarijs locis odorem con-
tinent. 141.40
Plantis satis qua ratione contine-
antur humor. 178.1
Plantarum agrestium morbi nul-
li traduntur. 119.30
Platanus. 55.10. & 71.30. & 118.30
Platanus ex semine. 30.30
Platanus in Lycio. 14.1
Platanus in Andandro. 115.30
Platanus Delphica. 64.1
Platanus in agro Cortinēsi. 16.10
Platanus tolerat securim. 67.40
Platanus i Caphtis Arcadiæ. 64.1
Platanus auctu facilis. 35.10
Platanus in Creta. 15.40
Platanus palustris. 10.30
Platanus radices. 11.10
Platanus quid exigit. 30.10
Platanus usus. 75.30
Plato de Sapontibus. 131.30
Plurij errores. 3.10
Pluit nunquā in quadam Africæ
parte. 52.1
Pluviz rare. 56.30
Plysiæ spongiæ. 56.30
Polium perpetuò floret. 96.30
Polium culices gignit. 159.40
Polium ad quæ utile. 127.30
Polij folia. 17.1
Pollicaria. 96.10
Polypodium. 171.30
Pomi persici utilitas. 51.40
Poma punica quòd seruent. 98.10
Poma coronæa qualem habeant
odorem. 148.40
Pomis locus quis sit aptus. 16.10
Pontus. 195.10
Pontus quid gignat. 14.30
Ponica materies. 70.10
Ponticū frumentū purū. 106.1
Ponticū triticum. 104.10. & 101.30
Populus. 44.1
Populus uertit folia. 16.30
Populus quomodo feratur. 30.10
Populus auctu facilis. 35.10
Populus alba reuixit. 68.1
Populus nigra. 14.1
Populum quidam sterile putant.
11.30.

Populus facile crescit. 119.40
Populus alba quo pacto mutet.
170.1. & 199.30. & 118.40.
Porcellia. 94.1. & 97.10
Porrum satum quando excut. 87.
20. & 197.40
Porrum tonsum. 169.30
Porrum quomodo feratur. 87.10
& 90.10. & 117.40
Porri retonsum melius fit. 191.10
Porri semen. 93.10
Porri caput. 88.30
Porris porricidæ innascunt. 19.40
Portulaca. 198.1
Portulaca qualis. 137.1
Portulaca quādo erumpat. 87.30
Portulacæ satus. 87.30
Portulacæ radix. 89.40
Portulaca. 67.10
Portulaca qualis arbor. 45.40
Portulaca quando maturet fructū
33.40
Portulaca ulret semper. 15.40
Portulaca quando germinet. 33.30
Portulacæ usus. 75.40
Precari in colligendis herbis non
absurdum. 118.10
Principiorum natura. 117.30
Probatia amnis. 61.1
Propontis quid ferat. 55.1
Pruinam nocere noualib*. 191.10
Pruiua gelare potest. 125.40
Pruiua quid sit. 116.1
Prunus. 45.40
Prun* quales habeat radices. 35.30
Prunus qmmodo nascatur. 110.40
Prunus arbor. 51.10
Pruni flos. 10.30
Pruni succus. 111.40
Pruni semen. 196.30
Pruni sano. 16.30
Pruina uel uinum morbus. 61.30
Pugio herba. 86.1. & 98.10
Pulicaria. 79.10
Pulicariæ species. 80.1
Pulices quibus innascuntur. 91.40
Pulpa prius quā semen gigni-
tur. 150.1
Pulpa propter homines. 148.1
Pulper tempus. 148.1
Pulparum concoctio. 141.30
Pulueris utilitas. 18.40. & 169.1
Pulueris excitatio. 189.10
Puluis qmmodo possit alere. 189.30
Puluis calidus. 110.10
Pumicis uis mira. 115.30
Punica infirma. 169.30
Punica multa sustinet. 118.40
Punica quibus gaudet. 14.10

Punica quomodo durior efficiat.
tur. 119.40
Punicam ferendi modus. 16.10
Punicæ flos. 10.40. & 142.40
Punicæ qua ratione curētur. 111.1
Punica quāsi alijs noceat. 184.40
Punica ex uirga crescit. 11.10
Punica aquam diligit. 18.30
Punica qualis. 160.30. & 113.30
Punica breuis uirga. 64.1
Punicæ facile putrescunt. 110.10
Punica flores amittit. 161.40
Punicæ radices. 11.10
Punica uinbras amat. 150.30
Punicæ dulcescunt suillo stercore
181.30.
Punicis quale sterco addat. 190.1
Punica ubi meliores fiant. 167.30
Punica auctu facilis. 115.40
Punicis quid eueniat. 113.1
Punica Aegypti. 116.30
Punica nō bene provenit semine.
116.1
Punica quomodo puranda. 181.1
Punicis frigus non nocet. 114.30
Punica rigationes & simū amat.
118.30
Punica quo pacto inferat. 114.10
Punicarum fructus terra obruti.
116.30
Punica etiā seniores imbres tem-
pestiui. 114.10
Purgari omnia qugrunt. 113.30
Purgans alium radix. 111.10
Purgationes. 175.40
Purgationis tempus. 181.40
Putandi tempus. 186.30. & 188.1
Putatio locis apranda. 187.10
Putatio quid qugrēdū est. 187.40
Putationis utilitas. 181.10
Putationis modus. 187.10
Putationis intempestiue damna.
186.30
Put ei altissimi. 51.10
Pyrrheus mons. 19.1
Pyrrheni propria suber arbor.
45.40

Qercus. 166.1. & 166.10
Quercus in agro Thurio.
16.10
Quercus q loco erecta fiat. 161.40
Quercus aliquando producit fru-
ctum. 171.30
Quercus apta ad carinas. 75.10
Quercus quando germinet. 31.30
Quinquefolia radix. 111.1
Quinquepetæ radix. 111.1

INDEX.

R Adicatio. 65.10
 Radicano qñ fiat. 177.10
 Radicatio quid sit. 65.10
 Radicis fucus purus & translu-
 cidus. 113.30
 Radicidium. 117.30
 Radix faciens infamiam. 234.30
 Radix quo amplior, hoc commo-
 dior. 183.30
 Radix unistirpium. 89.30
 Radix sylvestris breuior. 89.10
 Radix quando fiat. 101.30
 Radix plura habet genera. 90.40
 Radix immutat plantas. 168.20
 Radix quomodo seruetur. 89.1
 Radix frumentorum. 201.30
 Radix cardui cibi loco esse potest
 83.30
 Radix herculanæ. 130.1
 Radix mortifera. 133.1
 Radix uingi cibo idania. 13.30
 Radix thuæ ad preciosa opera co-
 scienda apta. 13.30
 Radix thuæ crispæ. 72.10
 Radix in plantis cuius usus. 7.20
 Radicis semen. 90.10
 Radice sata facilius crescit. 135.20
 Radices quomodo ampliores red-
 dantur. 13.20
 Radices quibus grandes. 13.30
 Radices qua ratione pereant.
 128.20
 Radicum colores. 131.40
 Radices medicæ. 97.40
 Radice singulari quæ nitantur.
 229.40
 Radicum breuitas & longitudo.
 180.30
 Radicularum sapor. 244.30
 Radices dulces. 131.40
 Radices leguminum. 101.30
 Radice quæ proueniant. 131.20
 Radices altæ altum producant
 germen. 177.30
 Radices à pappionibus eruo uen-
 dicantur. 171.10
 Radiculæ satio. 87.10
 Radicibus quæ bestiolæ innascan-
 tur. 91.40
 Radicis morbus. 230.30
 Radices papyri. 18.10
 Radicibus uulneratis arbores ce-
 gressunt. 183.10
 Radicibus distant plantæ. 13.10
 Radices quomodo augeantur. 177
 10. & 181.30. & 217.40
 Radicum diuersitas. 89.30
 Radicis summarij resectio. 221.10

Radices suauiores. 90.40
 Radicibus aliquando nocet aqua.
 127.40
 Radices quomodo germinet.
 119.10
 Radices supremæ amputandæ.
 183.20
 Radices ubi crescunt feliciter. 156.1
 Radices rigatæ meliores. 159.1
 Radices in arboribus. 168.30
 Radices quædam quare tam bene
 oleant. 243.1
 Radices uentre sunt plantarum.
 241.10
 Radices cautè putandæ. 183.30
 Radices dulces quædam necant.
 234.30
 Radices caudicem non attingen-
 tes. 14.20
 Radices cibo idoneæ. 95.40. &
 244.1. & 246.10
 Radicum altitudinis modus &
 causa. 14.1
 Radicum uires. 117.10. & 247.1
 Radices plus nocent quàm um-
 bra. 184.20
 Radices prius quàm partes super
 quæ augetur. 14.1
 Radices capitatorum. 89.30
 Radices uirides non olent sicut
 ficæ. 244.20
 Radicis differentiæ. 91.20. & 97.20.
 & 111.30. & 114.1
 Radices habent medullas. 13.20
 Radice quæ plantæ careant. 13.30
 Radices quidò decreuant. 14.10
 Radices lactuosæ. 117.10
 Radices paribus superioribus ra-
 riores. 13.10
 Radices quæ durabiles, & quæ
 non. 133.20
 Radices etiã mutantur. 64.20
 Radices olerum. 12.30
 Radices carnosæ. 12.30
 Radices expetendæ. 54.30
 Radicibus pulces pereunt. 93.1
 Radicum succus. 14.10
 Radices odoratæ. 14.10
 Rami in se habent principia uitæ
 lia. 140.20
 Rami in plantis. 7.30
 Ramis arbores fieri. 23.20
 Ramorum ordines. 7.10
 Rapa quando sata semen ocyus
 reddat. 88.10
 Rapa non potest durare. 131.20
 Rapa sylvestris. 91.30
 Rapæ genera. 91.1
 Rapa quo pacto ampla efficiat-
 tur. 217.40.
 Rapæ per hyemem seruandæ ra-
 tio. 89.10
 Rapa quando seratur. 87.10
 Rapa gaudet frigore. 91.1
 Raparum radix. 11.40. & 95.30
 Raphanus quomodo germinet.
 216.40
 Raphanorū radix. 12.40. & 89.30
 Raphani quomodo dulces, fi-
 ant. 91.1
 Raphanorum folia. 90.40
 Raphani radix quomodo ma-
 gna fiat. 216.30
 Raphani radix non est durabilis.
 131.20
 Rapo semen in siliqua est. 90.10
 Resicortex. 37.10
 Regiones quo ad fructum diffe-
 runt. 230.20
 Regionum discrimina. 205.1
 Resina quomodo parida. 112.20
 Resina quando paranda. 244.40
 Resina quæ optima est. 112.40
 Rhamnus. 137.30
 Rhamnorum species. 46.40
 Rhodus quid ferat. 54.40
 Rhodiorū insula Chalcia. 102.30
 Rhutrum. 81.10
 Rhynchadica materies. 70.20
 Rigandi tempus. 92.30
 Rigationis usus. 181.30
 Robur quomodo duret. 72.30
 Robur quidò credi debeat. 68.40
 Robur difficilis in opere. 73.20
 Robur quid ferat. 136.20
 Robur facit bonos carbones. 77.1
 Robur culicem gignit. 66.20
 Robur squamoia. 34.10
 Robur difficilius moritur. 67.10
 Roboris genera. 37.10
 Roboris medulla. 71.10
 Roboris usus. 37.30. & 77.40
 Roboris arboris ortus. 23.1
 Roboris cortex. 9.10
 Roboris grauitatis causa. 11.40
 Rorationis causa. 232.20
 Roris marini genera. 120.30
 Roris marini natura. 119.1
 Rosa falfugine egrotat. 241.30
 Rosas adurere prodest. 191.1
 Rosa quomodo pueniat. 22.40
 Rose odoratæ ubi nascant. 84.20
 Rose semen. 84.10
 Rosa qua ratione ferenda. 84.20
 Rosa quomodo florè melius profe-
 rat. 84.20
 Rosa sapius transferenda. 84.20
 Rosæ sylvestres. 84.30

I N D E X.

Rosarum differentie. 84. 10
 Rosæ cōseruātū odorē. 149. 10
 Rosæ odor. 243. 1. & 313. 1
 Rosæ atas. 86. 20
 Rosæ aurum nō erumpūt. 142. 1
 Rosarum ligna. 74. 10
 Rubeia. 79. 10
 Rubia qualis. 122. 1
 Rubiæ radix. 95. 10. & 111. 40
 Rubigo. 109. 10
 Rubiginem quæ fruges maxime
 fennant. 109. 10
 Rubus in aquis. 61. 20
 Rubus semper uiret. 16. 1
 Rubi genera. 47. 10
 Rubi fructus. 146. 40
 Rumex. 94. 10. & 175. 30
 Rumex sylvestris. 91. 20
 Rumicis sementis. 87. 10
 Rumici qualis radix. 89. 10
 Runcario adhibenda. 192. 10
 Rus à rure differt. 110. 20
 Ruta quomodo nascatur. 88. 20
 Ruta non quatit simū. 92. 20
 Ruræ cinis additur. 189. 20
 Ruta semper uiret. 16. 1
 Rutæ odor. 288. 21
 Rutæ satus. 88. 30
 Ruta salsa aqua recte rigat. 158. 20
 Ruta quomodo orianur. 130. 30
 Ruta in fico melior reddit. 2180
 Ruta qua ratione curetur. 191. 1
 Ruta utatur utiperæ comesto al-
 lio 214. 40

S

Saba quid ferat. 114. 20
 Sabiei inf se iuste uiuunt. 114.
 Sagittaria harundo. 62. 10 (40)
 Sal quid faciat. 242. 10
 Sal palmis prodest. 118. 20. & 189.
 Salus usus apud Babylonios. (20)
 non steroris. 189. 40
 Salix 43. 30. & 64. 10
 Salix tolerat securim. 67. 40
 Salix lenta. 71. 30
 Salix ficca levis. 51. 30
 Salix palustris. 10. 30
 Salix in Philippis. 67. 40. & 113. 30
 Salix frugiperda. 30. 20. & 61. 40
 Salix quid postulet. 30. 10
 Salix frugifera. 30. 20
 Salix facile pullulat. 129. 40
 Salicis usus. 76. 1
 Salicorniux roboris genus. 37. 10
 Salisilago quibus cōducatur. 138. 30
 Salisilago punitis est ciceri. 242. 30
 Salisilago qui ueniat in plātas. 243.
 30
 Salsugo quādo acri* agat. 242. 10

Salsugine quomodo urantur. 189. 30
 Salsugo quid faciat. 202. 30
 Salsus sapor. 231. 30. & 234. 30
 Salsus sapor solus non est in plan-
 tis. 241. 1
 Salsum nō potest generare. 241. 10
 Saluia. 79. 10
 Sambucus. 71. 20. & 41. 20
 Sambucus facile crescit. 129. 40
 Sambucus quādo germinet. 31. 30
 Sambuci uita. 64. 10
 Sambuci fructus. 43. 30
 Samothraciæ cepæ. 91. 30
 Sampuci odor. 248. 40
 Sanguinē sistent. 16. 40. & 123. 10
 Santucū. 78. 10. & 83. 30. & 86. 10.
 Sapor quid sit. 39. 10 (& 116. 40)
 Saporis generandi duplex ratio. 337. 10
 Sapor dulcis accomodatissimus. 235. 30
 Saporis ratio in qua re uerfetur. 230. 10
 Saporis sedes i plāris uaria. 242. 40
 Saporū et odorū cōmunio. 240. 10
 Saporum species plures sunt. 235.
 10. & 240. 20
 Sapores gelu peiores fiunt. 232. 1
 Saporum mutationes. 238. 10
 Sapores calor operatur. 237. 40
 Saporis melioris quæ sint. 236. 10
 Saporib* immodicus calor officit
 Sapor nō omnib* idē. 231. 10 (232. 1
 Saporem permissione fieri. 233. 1
 Sapores humorum. 233. 20
 Saporū materia humor. 237. 30
 Saporū genera. 231. 20. & 233. 40
 Saporum generatio. 236. 10
 Saporum differentie. 91. 40
 Sarculano quibus proffit. 28. 40
 Sari. 58. 10
 Saria unde. 58. 20
 Sarmenis luxuriantib* uires quæ
 Sarrino. 208. 10 (do colēda. 188. 20)
 Sarrino adhibenda. 192. 10
 Satanea mespili genus. 42. 1
 Sano uerna melior. 177. 10
 Saniones tempestiuæ. 105. 30
 Saniones tempora. 185. 40
 Sano fera & matura. 101. 1
 Saturia. 79. 10. & 173. 20
 Satureiæ semē melius uetus. 88. 1
 Saturia difficile germinat. 198. 10
 Satureiæ semen. 79. 30. & 93. 10
 Satureiæ tempus serendē. 87. 20
 Scabies ficorum. 65. 20
 Scabies qua re tollatur. 118. 40
 Scabies fico accidit. 220. 1
 Scabiei causa. 65. 20

Scabiei in plātis generatio. 221. 20
 Scalia. 83. 1
 Scammonia. 54. 30
 Scammonia humor in radice. 112. 8
 Scammonia radix. 118. 20
 Scammonia usus. 128. 10
 Scandix. 94. 30
 Scilla. 97. 20
 Scilla cur diu duret. 131. 20
 Scilla suspēsa germen emittit. 215.
 Scillæ inserta meliora fiūt. 218. 1 (10)
 Scillæ uiuacitas. 98. 10
 Scillæ quicquid adseritur felicius
 Scillæ foliū. 97. 40 (crescit. 26. 10)
 Scillæ flos. 98. 20
 Scillæ usus. 98. 10. & 179. 8
 Scillæ radix. 11. 1. & 92. 10. et 743.
 Scissima. 39. 20 (10)
 Scissima arbor. 4. 10
 Scissima quales radices habeat. 18. 40
 Scissimæ cēdendē tempus. 68. 40
 Scissima ad quæ instrumēta apta.
 Scissima humida. 75. 1 (71. 40)
 Scissimæ usus. 71. 10
 Scissima in aqua durat. 72. 10
 Scolopendræ quæ herba gaudet.
 Scorpio radix. 126. 1 (97. 30)
 Scorpiōis ictui unlis radix. 122. 10
 Scorpionū ictu serpētes moriūt.
 Scrobes quō faciēda. 25. 40 (103. 10)
 Scrobes uitium. 186. 8
 Scrobes aq debēt impleri. 179. 10
 Scrobibus quid inqēdiū. 179. 10
 Scrobes quādo fieri oporteat. 177.
 Scrobes nō statim replēt. 177. 40 (40)
 Scythaliū cucumeris genus. 91. 20
 Scythæ finis diu tolerat. 122. 30
 Scago. 258. 30
 Selenusium triticum. 192. 40
 Semē exhaustit terram. 109. 10
 Semen lacsum. 199. 20
 Semen anniculum optimū. 110. 30
 Semen uim habet & agendi & pæ-
 niendi. 196. 30
 Semē quādiu durare possit. 91. 10
 Semen uariē cōtinetur. 103. 20
 Semen quod sit pēstissimū. 198. 20
 Semē feruētiū sterile redditur.
 Semine quæ nascāl. 129. 10 (111. 8
 Semē unde accipiendū. 178. 30
 Semen quō uertendū sit. 178. 30
 Semen primum est. 129. 10
 Seminis causē. 143. 40
 Semē arborū quarūdā. 132. 40
 Semen quando terræ committenda
 dum sit. 176. 30
 Semē quali solo committendū. 194. 30

I N D E X.

Semē mutatur in auenā. 199.10
 Semē q̄modo in arboribus pullu
 let. 121.40
 Semē in quali solo feliciter erūpat
 192.10
 Seminis ubi plus, ubi minus iaci-
 endum. 105.40
 Semen rapæ quale bonum, qua-
 leq̄ malum sit. 91.1
 Semen post pulpam crescit. 190.1
 Semini genitali accommodata.
 126.30
 Semen animalīū. 114.40. & 164.10
 Seminis mutatio. 167.30. & 195.
 40. & 200.1
 Seminis recitudo qd faciat. 178.30
 Semen annuum quando mure-
 tur. 116.30
 Semina q̄modo muretur. 167.30.
 & 207.10
 Semen in omnibus. 18.10
 Semina quibus includantur. 18.
 Semina uaria. 19.30 (30
 Semen quibusdam occultū. 30.10
 Semina omnia in se alimentū con-
 tinent. 114.30
 Semina non pariter perfici. 205.30
 Semina in terra diu iacētia. 200.40
 Semina unde petenda. 178.10
 Semina peregrina quomodo ran-
 seant ad uernacula. 108.1
 Semina quo tempore meliora.
 200.30
 Semina optima eligenda. 195.30
 Seminum ætatis ratio habenda.
 90.10
 Semina melle macerata. 218.10
 Seminum differentie. 90.1. & 98.1
 Semina deponi debent. 91.40
 Semina præparari debent. 90.30
 Semina quæ firmiora. 91.10
 Seminum ætas. 87.40
 Semina idonea. 191.30
 Seminum magnitudo. 166.30
 Seminis alimentum. 144.30. &
 200.30
 Semina mutantur cultura. 16.10
 Seminum diuersitas. 203.30
 Semina quæ diuissimè maneant.
 230.40
 Semina quæ costūliora euadant.
 118.10
 Semina arborū q̄modo seruntur.
 Seminum uires. 196.10 (230.40
 Semina crassant statim. 208.10
 Semina olerum nullas bestiolas
 creant. 210.1
 Seminum concoctio. 141.30
 Seminum nullus terminus. 148.1

Seminum corruptiones. 230.30
 Semina diu duranda. 230.30
 Semina q̄ pacto aduehiuntur. 131.30
 Semina qua ratione à natura mu-
 nita sint. 135.1
 Seminum uiria. 109.30
 Semina quædam firma. 205.30
 Semina etiam infirma durare pos-
 sunt. 172.10
 Seminis infirmitas. 136.10
 Seminum morbi. 195.40
 Semina quæ durent, quæ non.
 114.30
 Semina uitium qualia esse opor-
 teat. 185.30
 Semine sata difficilius germināt.
 Semences hortensiu. 37.10 (135.30
 Semensis pessima. 194.30
 Semperuius natura. 99.30
 Semperuius folia. 17.1
 Senecio diu floret. 94.30
 Senecio. 94.1
 Senecta cōmunis corruptio. 15.30
 Senecta causæ. 8.30
 Septentrionis plantæ. 14.30
 Septentrionalis pars montiū præ-
 stantiores arbores habet. 49.30
 Serere quando conueniat. 194.30
 Serere quæ conueniat solūtm.
 194.30
 Serēdi tempus. 100.30. & 191.40
 Serendo locorum differentie ob-
 seruandæ. 177.30
 Serronia lente pariunt. 195.30
 Serpentiū ictus curans. 111.40
 Serpentiū moriui utilis aurelia.
 Serpentes minuti. 14.10 (177.30
 Serpentes ictu scorpionum inte-
 reunt. 103.10
 Serpyllū. 78.30. & 131.30. & 173.10
 Serpyllum purgandum. 191.1
 Serpylli tota natura odorata. 84.1
 Serpylli flores. 143.1
 Serpyllum ex ocimo. 218.30
 Serpylli odor. 149.10. & 156.10
 Serpyllū an habeat semen. 85.10
 Serpyllo quæ loca serant. 85.30
 Sertulæ campanæ odor. 248.30
 Sefamum. 100.10. & 197.30
 Sefamum quomodo discernatur.
 103.10
 Sefamum quor diebus maturum
 fiat. 101.30
 Sefama. 146.30
 Sefama terram exhaurit. 109.40
 Sefama optime reponitur. 209.30
 Sefamæ sario. 209.30
 Sefamam uiridem nullum ani-
 malenandit. 107.1

Sefamæ caulis. 105.10
 Sefamæ genus candidum. 105.10
 Sefeli. 123.10
 Setanice cepæ. 91.30
 Sicilia frumenti perferitilis. 106.30
 Siciliæ pars secunda. 102.30
 Sicilia recusat nimium culci. 106.1
 Siccitas odores parit. 232.10
 Siccitas quid faciat. 246.10
 Siccum solum. 157.30
 Sicula beta. 91.10
 Siculum frumentum ualidum.
 205.30
 Siculum triticum. 104.10
 Siculum frumentum puri. 105.1
 Sida. 60.30
 Silago ab radice tantum folia.
 95.1
 Siligo. 109.30
 Siligo multis tunicis includitur.
 105.40
 Siliqua. 30.1. & 103.10
 Siliqua quomodo fructum ferat.
 21.10
 Siliquam quæ gerant. 103.30
 Simulacra ex quibus fiant. 72.10
 Sinapi quando seratur. 87.10
 Sinapi habet durabile semē. 91.10
 Sinapi quale semen. 90.10
 Sinapi quando erumpere soleat.
 87.30
 Silymbriū odoris mentæ. 170.30
 Silymbriū nepitæ simile. 170.30
 Silymbriū agreſtis odor. 170.30
 Silymbrium. 78.30. & 131.30
 Silymbrio odor acrior est. 85.30
 Silymbrio nocer culcus. 199.30
 Silymbrium mutatur in mentam
 25.1. & 170.1. & 218.30
 Silymbrii partes omnes odorant
 84.1
 Silymbrii flores. 243.1
 Silyrinchio peculiare. 99.1
 Silymbrium purgandum. 191.1
 Sims quid faciat in arborib*. 220.1
 Sitim exinguens. 121.30
 Smerea. 79.10
 Smilax. 47.30. & 173.10
 Smilax quando maturer fructum
 146.30.
 Smilax edera est cilicia. 48.1
 Sol ex nube interimit triticum.
 106.40
 Sol etiam penetrat ea quæ sub
 terra sunt. 177.10
 Sol quid operetur. 241.30
 Sol omniſficat. 251.30
 Solis calor uim habet gignendi.
 144.1

INDEX.

Solis delubrum.	114.40	Stelis.	271.1	Surculi ferendi qui optimi.	178.10
Solus potentia.	150.20	Stercus quale arboribus apti fit.	179.10	Sus calidior.	151.20
Solaris.	94.10	Stercus ruminantium.	179.10	Sues in aegypto ubi nascant.	61.20
Solaris herba semper floret.	90.1	Stercus quodlibet non conuenire cuig arbori.	181.30	Syderano.	65.10
- & 96.10		Stercus aliquando nocere.	227.30	Syderano plantarum.	219.40
Solstitij non ferendum.	194.10	Stercus quod optimum fit.	92.20	Syderum uia.	174.10
Solum mutat plantas.	168.10	Stercus uehementissimum.	190.1	Sylux prouentus mirabilis.	11.30
Solum saepe uerti debet.	192.10	Stercorario qbus proficit, quibusq obicit.	107.40	Syluestres arbores quomodo fructificent.	11.20
Solum quando aptum fit accipere semen.	176.30	Stercus uehemens.	181.20	Syluestria quæ natura sint.	11.30
Solum quomodo aptum reddatur ad plantas.	177.30	Stercus quid inuuet.	118.1	Syluestria acrioris succi.	91.20
Solum exile crebram agitatione exigit.	181.40	Stercus leuissimum.	181.30	Syluestria magis moribus gaudent.	11.40
Solum aliud in ætate profundendum, aliud in hyeme.	191.20	Stercus resitit frigori.	225.1	Syluestria semper uirentia.	11.20
Solum pluniosum.	192.30	Stercus qd efficiat in solo.	179.10	Syluestres arbores.	10.1. & 30.6
Solum nigrum.	177.40	Stercus quomodo addat.	181.20	Syluestria cur odorantur.	150.20
Solum ad odorē optimū.	169.40	Stercoris plus quis ager postulet.	181.40	Syluestria quomodo nascant.	112.40
Soli uarietas.	194.10	Stercoris suilli usus.	168.10	Syluestria locis frigidis durant.	144.30
Soli differentia.	116.1	Stercorandi ratio.	179.10	Syluestria qua re mutantur.	190.1
Somnum faciens.	214.30	Stercorata loca quantum præstent.	106.20	Syluestres arbores quomodo floreat.	11.10
Sonchus.	95.10	Stercoratio quomodo fieri debeat.	105.40	Syluestres plantæ.	11.10
Sorbum dulcius cultura reddit.	175.20	Stercorare bonum est.	192.10	Syluestres arbores semina augēt.	144.10
Sorbo radix qualis.	11.40	Stercorationes.	175.40	Syluestres plantæ longuæ.	61.40
Sorbi fapor.	161.10	Stercoratio quali solo commodior.	181.10	Syluestria plura q̃ urbana.	78.10
Sorborum genera.	42.10	Stercorandum quod solum copiosius fit.	191.30	Syluestres plantæ quàm altè agite radices.	11.10
Sorbum sterilesce in nonnullis locis.	14.10	Stercorandi tempus.	181.1	Syluestres duriore urbanis.	72.10
Sphaceli folium.	79.40	Sterilitas unde.	175.30	Syluestres arbores an morbis obnoxie.	65.1
Sphacelismus ubi fiat.	210.20	Sterilitatem asserens uinū.	127.10	Syluestres cur prius germinant.	142.40
Sphondyla nullam radicem intætam relinquit.	122.10	Snibæ folia.	171.1	Syluestrium in fructificando diuersitas.	164.1
Spica quando proueniat.	101.40	Snimulus in lapide.	70.40	Syri cuiusmodi aratri utantur.	106.1. & 192.10
Spicam quæ gerant.	103.20	Storba.	79.1	Syri quomodo colantur plantas.	17.10
Spicæ positura.	191.10	Strangias triticum.	192.40	Syriæ mons terebinthi plenus.	112.40
Spicanonis causa.	149.10	Stryax.	116.40	Syria pitum non fert.	114.10
Spina.	10.40	Suber.	71.40	Syriæ odorata quæ.	116.10
Spina candida.	14.1. & 81.1	Suber ubi proueniat.	41.40	Syria producit balsamum.	116.1
Spina ceanothos.	60.40	Succatio quo pacto fiat.	117.10	Syriæ plantæ.	14.20
Spina quando germinet.	172.40	Succi plantarum.	144.1	Syria cedri gignit.	11.10. & 76.20
Spina quæ aqua congelat.	125.40	Succorum uarietas.	19.10. & 117.10	Syriaca herba.	171.20
Spina ficiens.	16.10	Succus uinosus.	19.10	Syrinchij radix.	144.10
Spina regia.	197.10	Succus pinguis.	19.10		
Spinae indicæ succus.	111.40	Succi odorati.	111.40		
Spina Aegyptia.	111.40	Succus dulcis.	19.10		
Spinae pro folijs quibus.	17.10	Succorum cura.	144.10		
Spinarum lachrymæ.	144.40	Succi colores.	111.10		
Spinae ixinæ lachryma.	111.40	Suffrutices perpetuo uirentes.	16.1		
Spinarum fructus.	82.10	Suffruticium differentiæ.	12.10		
Spinalis masticha.	81.1	Suffruticium pars maior semine radicetq nascitur.	22.40		
Spodias quàm altæ radices habent.	11.30	Suffruticium genus.	191.2		
Spongia ubi crescat.	11.40	Suilli steroris usus.	181.1		
Squalor.	220.40	Suillum sterus.	168.10		
Straginx quomodo distinguant acris species.	40.20	Suillus finus.	18.40		
Statuæ quare sudent.	215.10	Surculus quid sit.	7.10		

T

T Abes arborum.	66.20
Tamaricis lignum.	71.10
Taxus gaudet umbrōsis.	49.1
Taxus quando germinet.	11.10
Taxus tarde fert fructum.	140.1
Taxus qualis fit.	19.10
Taxi usus.	71.40
Tectis apta materies.	75.10
Teda ex radicibus pinū.	141.1

INDEX

Tedam habet pini radix.	119.10	bet.	55.1	Tofosum folium.	105.1
Teletheus ferre medicamina.	112.10	Thracia.	195.1	Traducio de lingua in linguam	2.40
Teletheus locum esse rigum.	112.10	Thracia frigida.	114.40	quid possit.	2.40
Tempora ferendi.	185.40	Thracia quid ferat.	54.10. & 171.1	Transferendi ratio.	2.40
Temporis conditio.	113.20	Thracas quem locum inhabitant.	216.40	Translatiois unitas.	90.40
Temulentia medel brassica.	68.10	Thracium triticum.	104.10. & 195.1	Tribulus.	79.1. & 81.10. & 94.10
Terebinthum.	248.10	Thrasas peritus radicum.	115.10	Tribuli semen.	79.1
Terebinthi usus.	76.1	Thrasas Mantinenis quale venenum invenit.	114.10	Tribuli species.	81.10
Terebinthus quomodo uratur.	114.1	Thraupalus gaudet umbrosis.	49.1	Tribulus ubi nascitur.	132.40
Terebinthorum species.	44.10	Thraupalus quales radices.	51.10	Tribulus iuxta folium aculei gerit.	81.10
Terebinthi lachryma.	144.40	Thuis tarde tert fructum.	14.1	Trimestria.	195.10
Terebinthus arbor.	115.10	Thuis frigidus gaudet.	49.1	Trionum.	100.10
Terebinthus ubi nascitur.	51.10	Thutum.	72.1	Trionum quomodo discernat.	107.10
Terebinthus perpetuo uret.	15.40	Thuis ubi gignatur.	114.10	Trionum amarum.	107.1
Terebinthi fucus.	111.40	Thuis quomodo ematur.	114.40	Trioni satio.	109.10
Terebinthi ubi frequenter.	112.40	Thuris arbores in quali terra nascantur.	115.1	Trisaginis folia ad quid utilis.	115.40
Terebinthum in olea gigni.	171.10	Thuris arbor quatenus sit.	114.10	Triticum.	100.10
Terebinthus quando germinet.	51.10	Thuis.	54.10. & 144.40	Triticum opem nascitur in Phocide.	108.10
Terebinthus spissa.	71.10	Thuris arbores apud ardes.	115.10	Triticum quot diebus a flore maturat.	102.10
Terebrans quae facilia.	74.40	Thuis qua ratione figura accipiat.	115.10	Triticum qualem terram possit.	109.1
Terebra ex quo arbore.	76.10	Thuis quod melius sit.	115.1	Triticum quando erugine capiat.	191.40
Teredo qualis.	71.40	Thuis incidi sub cane.	112.10	Triticum degenerat.	197.1
Teredinem quae arbores sentiant.	71.10	Thuris arboris folium.	114.10	Tritici radix.	11.10. & 100.10
Terra qua triticum crescat.	110.40	Thuis quomodo legatur.	114.10	Triticum quomodo servandus.	110.10
Terra quae facilius sit ad reddendum.	110.1	Thymus semen.	79.10. & 112.10	Triticum inual in Tiphia.	199.10
Terra natura.	14.1	Thymus ubi nascitur.	51.10	Tritici immutatio in hordeum.	14.1
Terra genera.	116.10	Thymiflos.	199.10	Tritico florit aqua obesse.	106.10
Terra secunditas.	107.10	Thyrium.	175.10	Triticum in Euboea.	104.10
Terra quo pacto in artem odore concipiat.	151.10	Thyrium producit mare.	56.40	Triticum uentrem sentit.	209.10
Terra terre miscendum.	191.10	Tibialis harundo.	61.10	Triticum e radicibus enascitur.	107.40
Terra colores.	191.10	Tilix discrimina.	40.1	Triticum perit ex nimio stercore.	181.10
Terra adusta.	211.10	Tilix flos.	40.10	Triticum magis infestatur erugine.	208.40
Terra cinerea.	211.10	Tilix cortices.	42.40	Triticum trimetris.	191.40. & 205.1. & 204.10
Terra uertenda.	191.40	Tilia quae ex causa flexibilis sit.	11.10	Triticum Africum.	104.10. & 191.40
Terra species.	157.10	Tilia facilis in opere.	71.10	Triticum nudum.	196.10
Testiculi usus.	116.10	Tilia feronna.	14.1	Triticum qualis ager ferat.	191.10
Tetralix.	81.10	Tilia qualis sit.	74.10	Tritici genera.	104.10
Textilis harundo.	61.10	Tilia quale locum optet.	115.1	Tritici usus ad efficiendum unum.	142.10
Thalia.	211.10	Tilia uertit sua folia.	171.40	Tritici quomodo pereat.	108.10
Thapsia quomodo secunda.	117.40	Tilix cadendi aptum tempus.	68.40	Tritici palea.	101.10
Thapsiae succus.	117.10	Tilia calida.	151.1	Tritici species.	204.10
Thapsiae radix.	118.1	Tilix usus.	75.40	Tritico quod solum apertum.	101.10. & 191.10 & 40
Thapsiae uatura.	119.1	Tilix fructus.	19.40	Tritici quomodo putrefcat.	110.1
Thapsiae fructus.	118.10	Tilia qua ratione tractanda.	190.40	Tritici satio anceps.	104.10
Thasii quid obferuent cum agros conducunt.	106.10	Tilia ubi vix nascitur.	51.10	Triticum quando seratur.	100.10. & 201.10
Thasii in oculis mygdalas.	116.10	Tiphia.	60.10. & 100.10. & 101.40. & 199.1. & 118.10	Tritici quod hyeme ferit.	104.10
Thesiae radix solum purgat.	97.10	Tiphia quali terra nascitur.	109.10	Tritici insipidum primo.	117.10
Thessalia quomodo frigore laborat.	214.10	Tiphiae radix.	11.10	Triticum in solium.	15.1
Thessalo Pifistrati filio quid acciderit.	24.40	Tiphia apta in aliud genus transire.	108.10	Tritici durabile.	197.10. & 110.10
Thimolus plurimam nucem habet.		Tiphium.	197.10		

I N D E X.

Triticum quādo erumpat. 100. 30
 Triticū sanata multa animalia in-
 tercut. 203. 10
 Triticum ponticum. 104. 10
 Triticum quibus differat ab hor-
 deo. 101. 40
 Triticum quando metatur. 110. 30
 Triticum ubi melius feratur. 106. 1
 Triticū flantibus qñ pereat. 109. 40
 Triticum ex tithia. 199. 40
 Triticum muratur in lolii. 106. 30.
 & 170. 1. & 199. 40
 Tuber an radix. 11. 10
 Tuberis terræ radix & fructus.
 118. 30
 Turdaria quomodo floreat. 96. 30
 Tussis remedia. 125. 40
 Tussis ficæ remedium. 121. 30
 Tussis paliuri fructu curat. 46. 40
 Tyllus insula Arabici finus. 17. 30
 Tyllus insula rubri maris. 158. 40
 Tyli Arabiæ materies. 71. 10

V

Vallatoria harundo. 61. 10
 Vela ex libro papyri. 58. 20
 Venæ in planis. 8. 30. & 9. 1
 Venena multa in monibus na-
 scuntur. 247. 20
 Venena paulatim interficientia.
 124. 30
 Venenum inferens mortem sine
 dolore. 124. 30
 Venena debiliora usu longo sūt.
 125. 1
 Venenosæ plantæ. 246. 40
 Veneri accommoda herba. 126. 40
 Venti ad fructum multū momen-
 ti habent. 19. 20
 Venti frigidi. 159. 10
 Venti marini meliores terrenis.
 154. 30
 Venti occidui meliores exoriui.
 154. 30
 Venti frigidi quando adurant.
 154. 30. & 223. 30
 Venti ratio habenda. 186. 40
 Venti quibus, quandoq; obfint.
 109. 40
 Venti qd facili ad fructus. 107. 30
 Ventorum proprietates quæ sint.
 224. 30.
 Veneri iuuvis medicamen. 126. 30
 Ver quale tēpus sit. 142. 1. & 176. 30
 Veratrum. 54. 30
 Veratrum incendit. 118. 1
 Vere alre pascendum. 186. 30
 Vere sano melior. 177. 10
 Vere arbores recte ferunt. 176. 30

Vergilijs orientib* ferēdū. 194. 30
 Verris quercus. 13. 1
 Vermes gignunt omnes arbores.
 65. 10
 Vermes in frumentis. 109. 20
 Vermes quomodo frugibus inna-
 scantur. 194. 1
 Vermes fructū adimūt olei. 66. 10
 Vermis in albo. 98. 1
 Vermib. obnoxia arbores. 42. 30
 Vermes in quo ligno. 71. 40
 Vermes necans remedium. 121. 1.
 & 126. 30
 Vermes consumūt triticū. 109. 40
 Vermiculi quomodo nascant. 110. 1
 Vermes qua occasione fiāt. 220. 1
 Vermiculatio plantarum. 219. 40
 Vermiculatio arborū morb. 65. 30
 Vermiculatio discrimen. 122. 30
 Vermiculi qui caudicem inscri-
 bant. 69. 1
 Vermiculatio quæ fructus sen-
 tiant. 66. 30
 Vernilago. 81. 10. & 40
 Vernilago nigra durat diu. 122. 10
 Vernilaginum genera. 121. 1
 Verna putatio. 186. 30
 Verni temporis dies. 177. 30
 Verni flores. 86. 1
 Vernilaginum radix occidit ca-
 nes. 121. 10
 Vescicaria. 94. 10. & 99. 40
 Vescicaria alienat mentem. 127. 10
 Vescicariæ species. 120. 30
 Vescicariæ genus. 123. 30
 Vinaceum unde gignitur. 215. 40
 Vineta quo pacto ponēda. 186. 10
 Vingum an sit radix. 13. 20
 Vingi radix cibo idonea. 13. 30
 Vini odor in uetustate melior.
 249. 1
 Vinum attrahit odores. 171. 30. &
 255. 20
 Vinum certis saporibus immuta-
 tur. 238. 20
 Vinū quomodo corrupta. 238. 40
 Vinū ex hordeo quomodo fiat.
 242. 40
 Vinum urinam mouens. 119. 20
 Vinum morale. 250. 40
 Vina mōrana odoratiōra. 250. 40
 Vini mira natura. 127. 1
 Vinū quod nō odoratus sit. 250. 30
 Vinacellū quo pacto duret. 148. 10
 Vinosus sapor. 234. 1
 Vinosi saporis mutatio. 256. 30
 Vinosa dulcedo. 236. 30
 Viola. 84. 1
 Viola candida. 256. 10

Viola alba. 99. 1
 Viola nigra. 142. 10
 Violarum differentie. 84. 30
 Violæ nigre odor. 255. 1
 Viola alba prima se ostēdit. 85. 40
 Viola celeriter euanescit. 249. 10
 Viola alba quomodo foliata. 95. 1
 Viola femine exit. 85. 1
 Viola remotæ odoratiōres. 251. 20
 Violæ odor. 142. 1
 Viola nigra perpetuo floret. 84. 1
 Violæ alba differētiā habēt. 84. 10
 Vipera quomodo pareat. 99. 20
 Vipera quomodo remediū que-
 rant. 234. 40
 Vipera cibo sunt ceruis. 203. 10
 Viridia quædā nihil olent. 248. 30
 Viridia quædam mandi possunt.
 sed non semper. 246. 10
 Virentia ficca. 12. 10
 Viscum habet ilex. 45. 30
 Viscum ubi crescat. 171. 1
 Visci differentie. 171. 10
 Viscum arbores necat. 228. 19
 Viscum ē robore. 36. 40
 Viscum non nisi aliena in arbore
 nasci. 172. 10
 Viscū quale alimētū exigat. 172. 1
 Vitæ brevis sunt quæ largē fructu-
 ficiant. 222. 40
 Vitæ longitudo arborum. 164. 30
 Vitæ brevis est animal secundū.
 265. 10
 Vitæ ad maturitatem frigiditatē
 cupit. 161. 1
 Vitis præcipue postulat ablaquea-
 tionem. 182. 20
 Vitis syluestris radix. 127. 40
 Vitis lachryma. 112. 10
 Vires quare terra operiēdæ. 223. 40
 Vires necessario putandæ. 181. 10
 Vires refecandæ. 186. 30
 Vires quomodo celerius senescūt.
 188. 30
 Vires nouellas quatenus refecare
 oporteat. 188. 30
 Vites in sicco solo quando pu-
 tandæ. 185. 1
 Vires in humido quādo putandæ.
 188. 1
 Vinbus q tēpore simus def. 181. 30
 Vinū oculi exaccantur lachryma.
 188. 10
 Vinum distractio. 189. 10
 Vinibus quocūq; conueniant. 26. 20
 & 156. 30. & 157. 1. & 180. 1
 Vinum falcatio. 187. 1
 Vitis nouella diminutione perit.
 229. 40

Vitis tolerare potest plagā. 128.40
 Vitis cur ferotina. 146.1
 Vitis sylvestris quā durabilis. 122.10
 Vitis materies. 229.10
 Vitis diligentiam postulat. 187.10
 Vitis odore lauri offendit. 173.30
 Vitis in gelidis locis sapore non caret. 239.40
 Vitis quomodo feratur. 26.10. & 178.40. & 186.1
 Vitis quomodo excelsa fiat. 15.30
 Vitis an gaudeat pulvere iam matrescente uua. 29.1
 Vitis cortex. 11.20
 Vitis fructum quando conficiat. 145.30
 Vitis humida fumosa. 77.30
 Vitis quomodo putanda. 28.30. & 176.1. & 187.10
 Vitis non bene ferit semine. 136.1
 Vitis florens non uult imbrē. 66.1
 Vitis quare huculetur. 65.30
 Vitis auctu facilis. 135.40
 Vitis ex nouellis suum producit fructum. 21.1
 Vitem bene putatam quid consequatur. 187.1
 Vitium uulnera. 65.30
 Vitis quomodo pullulare queat. 129.40
 Vitis quid proprium sit. 149.40
 Viti accidit ro ratios. 221.1
 Vites recte conferere magni refert. 185.1
 Vites nigrae solidiores. 185.10
 Vitis soluta quomodo cognoscenda. 185.10
 Vitis semen. 196.20
 Viti etiam seriores imbres tempestiui. 154.10
 Vitis ferendae tempus. 185.40
 Vitis amat aquam. 28.20
 Vitium genera. 26.30. & 185.1. & 205.10
 Vitis fructifera. 72.20
 Vitis ldx. 46.30
 Vitium germina. 246.10
 Vitis quomodo colenda. 64.30
 Vitis quomodo restauranda. 64.40
 Vitis articulatione fide neniāt. 221.20
 Vitis quibus auxilietur. 168.20
 Vitis qua ratione formāda. 186.30
 Vitis lenta. 71.30
 Vitium radices. 12.10
 Vitis fumida. 213.30
 Vitium quatrundam florē nullus sequitur fructus. 20.40
 Vitis in flore quid patiat. 221.30

Vitis oculorum obrasio unde accidat. 221.30
 Vites quānam breuioris uitae sint. 64.1
 Vinum propaggines. 221.10
 Vitis maturitas. 204.30
 Vitis flos. 20.20
 Vitis morbi. 65.10
 Vitis nimio & frigore & calore laborant. 65.30
 Vitis lauro & brassica offenditur. 65.10
 Vitiū depampinatio quid faciat. 221.10
 Vitis quomodo tractetur. 190.40
 Vitis quid eueniat. 194.30
 Vitis quomodo inferatur. 134.10
 Viti cortex detrahitur. 67.10
 Vitium cortex. 9.10
 Vitis multū perit alimentū. 156.30
 Vitis aliquando tulit fructum sine folijs. 214.30
 Vitis quo pacto crescant. 222.40
 Vitis desideratio pratense solum. 185.20
 Vitis conueniens solum tribuendum. 150.1. & 185.20
 Vitiū semina unde petēda. 185.30
 Vitis quando colenda. 188.20
 Vitis canthara. 169.20
 Vitis quando crescat. 188.40
 Vitis quandiu germinet. 189.1
 Vitium quo pacto fructus augeatur. 189.1
 Vitis seipsum nō sustentat. 177.10
 Vitis clauicula. 173.20
 Vitis molesta olea. 184.30
 Vitis ficus molesta. 184.30
 Vitis densa quae sit. 185.10
 Vitis quae plus perit alimentū. 185.10
 Vitis alimentū copia sterilescit. 147.1
 Vitis quae ob causam officiat gelu. 224.30
 Vitium morbus articulationis. 221.1
 Vitis cito senescunt. 164.40
 Vitis marina. 16.20
 Vitis quomodo tractandae quae materia luxuriant. 187.40
 Vitis incrementum. 164.20
 Vitis quomodo non probe possint germinare. 153.40
 Vitis flora. 86.1
 Vitineum uallum. 221.30
 Vitis quomodo tollat. 118.40
 Vitis uirginis remedium. 221.10
 Vitis radices. 178.30
 Vitis radices quae potius ferenda. 185.30

Vitium medicamentum. 120.40
 Vitis capitis aprium remedium. 221.40
 Vitis quae sit. 170.1
 Vitis quid flagitet. 30.10
 Vitis ualida. 75.1
 Vitis non facile perit. 228.30
 Vitis auctu facilis. 15.10
 Vitis humida. 71.30
 Vitis quando cadatur. 68.40
 Vitis frugifera. 30.20
 Vitis uertit folia. 16.30. & 173.40
 Vitis usus. 75.40
 Vitis quid ferat. 16.30
 Vitis humor. 221.40
 Vitis getera. 47.40
 Vitis quae plantae amēt. 180.30
 Vitis nō tantum uositu. 184.20
 Vitis apta. 116.40
 Vitis. 117.40. & 171.10
 Vitis quaedam mutatur. 25.20
 Vitis semen. 126.20
 Vitis muratur. 25.20
 Vitis arbores. 10.1
 Vitis arbores morbofice. 65.10
 Vitis cur minus odora. 150.10
 Vitis breuior uita quā syluestribus. 69.40
 Vitis odor. 216.2
 Vitis quid uocet. 10.20
 Vitis omnia tēperantiora. 10.30
 Vitis arborum. 66.20
 Vitis quomodo nascantur. 110.1
 Vitis infestatio. 109.30
 Vitis. 190.1
 Vitis. 94.10
 Vitis sine uinacea. 211.10. & 215.40
 Vitis. 161.20
 Vitis summa detrahatur. 169.20
 Vitis a medulla creatur. 187.30
 Vitis sapor. 216.30
 Vitis sine uinaceis nasci molitur. 150.10
 Vitis morbus. 221.30
 Vitis uersicolores. 213.40
 Vitis remedia. 118.40
 Vitis ab unguentis perimuntur. 225.1

Z

Z Ea ualida est. 200.40
 Zethum quem potum uocent. 242.40

THEODORI GRAECI THESSALONI

CENSIS, AD NICOLAYM QVINTVM PON
TIFICEM MAXIMVM.

10 **Q**VAM magna exultare laetitia possint homines nostrae aetatis,
 pater sanctissime, non absens nunc, ut tempore elapso, relatum
 accipio: sed iam annum apud te manens, rerum ipsarum expe-
 rimento plane intelligo. Quod enim solum uetus illa & lauda-
 ta Platonis sententia remedio urbibus futurum permultis ac uariis
 detrimentis laborantibus asserit, nostris his temporibus cer-
 te uideo contigisse. Quod enim tu, qui summus philosophus
 semper fuisti, summus princeps creatus es, praedare actum iam est, quod uir doctissi-
 mus ille futurum affirmat, cum aut philosophus regnare, aut rex philosophari ince-
 perit. Quippe nunc arma, quae per Italiam, Europamque totam sauebant, penitus
 conuiescunt, & Mars furens ille uinculis tuae cohercetur prudentiae: omnesque in-
 ter se gentes reconciliatae, pace tranquillissima ex tua opera, tuisque consiliis perfru-
 untur: & clarissima quietis munera, id est, studia literarum, quae diuturna bella eri-
 puerunt, tuo pontificatu reflorescere pulcherrime incepere. Pacem namque ipsam abs-
 te fundatam ueluti quandam plantam, flores eiusmodi, atque fructus abunde sequun-
 20 tur. Et urbes Italiae omnes nunc literarum ornamentis exultantur, quibus prius or-
 barae, deformes, & uelut lugubri quadam ueste indutae, modo uiduarum degebat;
 consistunt nunc, augenturque maiorem in modum coetus philosophorum, oratorum,
 poetarum, denique professorum omnium liberalium artium: & excitantur mirum
 in modum ingenta hominum te autore diue Nicolaë, qui non solum tua tempora paca-
 ta sic reddidisti, uerum etiam cuiusque suae uirtutis, laborisque praemia magnifice proponis.
 Non enim tu pecunias conseruandas inutiles censes, sed assidue quaeque large distri-
 buis, & diuitem sic te opinaris, si tibi pecuniae usus sunt, si summa liberalitate laudem
 tibi comparas immortalem. Nec tu aurum ad condendos exercitus sumptus, ut non
 nisi sanguinolenta manu calicem diuini sanguinis labijs admoueas tuis: sed fessa op-
 30 pida relinquis, templa condis, omne literarum genus ut pulchre uigeat, facis: quae pau-
 peribus inopia reddant leuiorem animo largiris: omnia denique laudabiliter statuis,
 quibus felicitas publica cunctis mortalibus contingere possit. Sed nihil clarius, nihil
 sanctius, nihil denique humanae uitae commodius, quam ea tua cura, & diligentia, qua
 literae florent, & homines plurimi docti, eruditique euadunt, quaque doctis nihil omni-
 no deest, quod uel honoris, uel pecuniae consequi debeant. Qua in re peculiarem
 profectio laudem illam quoque tibi reddere licet, quod non solum uolumina omnia,
 quae lingua latina praebere possit, summa cum diligentia colligenda, & usque a barba-
 ris ultra Aequilonem degentibus conquirenda magno cum sumptuum curas: sed etiam
 Graecorum numerosa opera conuertenda in latinum sermonem percentes: idque tan-
 40 to cum desiderio agis, ut breui, pauci utque libri insignes restent linguae illius, qui lati-
 ne legi non possint. O rem perutilem, & summo pontifici dignam. Haec enim ut ho-
 mines eruditos, omniique barbarie perpuratos reddere potest: ita etiam humanio-
 res, iustioresque reddat necesse est. Haec tuas bibliothecas summe princeps non pau-
 cis quibusdam Iudaeorum libellis, ut de Ptolemaeo Philadelpho scribitur: sed pluri-
 mis, amplissimisque Graecorum codicibus gentis nobilissimae, omnique literarum gene-
 re praestantissime facis pleniores. Quocirca ratione optima bibliothecas istas, quae
 tantum luminis afferant linguae Latinae, tantumque utilitatis praestent hominibus, the-
 sauros longe meliores illis existimari oportet, quos pontifices quosdam semper cu-
 stodisse, modoque Colchidici illius draconis, abique ulla utilitate super eis assidue inui-

gisse accepimus. Quæ cum ita sint, te iure optimo fundatorem quietis, autoremq[ue] aurei cuiusdam seculi, non solum Quirites, uerum etiam omnes Europæ incolæ appellat, & summis laudibus extollunt, & honoribus perinde ac deum in terris alerum prosequuntur. Sed hæc quanquam plenius explicare magnopere cupio de mentissime princeps, tamen Theophrasti opus, quod mihi interpretandum decreueras, me iam ad se trahit, ut inspicere te celerius possit: quapropter de his aliis latius, uti debeo, referre pro uirili mea conabor. Nunc Theophrasti libros de plantis fronde hilari, pro tua solita humanitate accipies: quos credo traduci à me iussuras, non quod me satis id facere posse putaueris (parum enim ea in te me ualere, tu minime ignoras) sed ut hominem græcū latine dicentem aliquando audires. Nouitas enim rei non nihil delectationis asserre quoq[ue] in genere potest. Mihi tamē res adeo meas uires excedere uisa est, ut nisi pro lege tuā uoluntatem firmissime mihi statuerem, facile hercle recusassem, quæ bene expedire non possem. Cæterū tua iussa tantum apud me ualent, ut quantum ego summo cū labore alieno in coelo serere possim, cogitare nō uelim, dum modo tuæ uoluntati morem gessisse uidear. Inspice igit & lege quoad tuæ occupationes permittant, libros quos iussu tuo in latinā cōuertimus linguam, atq[ue] in tuo nomine ædidiimus: & si quid recte dixisse uideamur, id diuino tuo auxilio tribue. Te enim non secus ac deū pijsime inuocantes opus incepimus.

20

THEODORI GRAECI THESSALONI

CENSIS PRAEFATIO IN LIBROS THEOPHRASTI DE PLANTIS.



PRAEFANDVM illud Heradii dictum arbitror, quo abiecit cuiusdam domunculæ aditū breuiter simul & pulchre minus aspernandum asseruit. Is enim casam aliquando ingressus furnariam, sedisse ignis hybernū forsitan causa diutius dicitur. Quod cum à quibusdam interim quæreretur, quos eum uisissimum locū introire puderet: subridens ille, introite, inquit, sum enim hic etiā dii. Nam etsi nobile, atq[ue] graue studiū illud putari debeat, quote non uoluminis alieni interpretem, sed tui autorem exhibeas: tamen non adeo contemnendum equidem interpretandi studiū dixerim, ut nunquam ad hoc digneris accedere. Est enim uel in eo ipso utilitas quædam, quam negligi minime ab homine philosopho decet. Proderit namq[ue] hominibus non minus cum sententiam alicuius uilem aperuerit, quàm cū suam ipse docuerit. Nec illa dicendi ratio deest, quæ depromenda sanè sit ex philosophiæ magistræ omnium rerum (ut ita dixerim) officina sermonis: cum de aliena lingua in tuā transductio exigat quidam, ut idem aperias: sed non idem, quod uulgus seruare in transferendo consueuit: sed quod proportionē linguæ utriq[ue] philosophus suo iudicio aptissime daret. Ite exprimi quidem ornate singula, præstantius est: sed nō adeo uerborum ornatum indulgendum, ut si quid non nisi mutata sententia transferre ornate ualeas, tueri elegandam malis, quæ sententiam: quæ forma quodammodo est orationis. Vocabulorum etenim modum, utpote materiam quandam pro formæ istiusmodi ratione, non formam istam pro uocabulis capiendam philosophus nouit. Addo etiam impo-
nendum nominum aptam inuentionem, quæ cum in interpretando persæpe necessaria sit, philosophia profectò opus est: quæ natura perspecta, nomina noua quidam, sed quod ad recte rationis iudicium pertinet, nullo minus reddat antiqua. Sūe enim

40.

enim nomina rebus imposita, quemadmodū placuit: & poni quotidie pariter licet. Nec tempus ullum excogitare futurum ualeas, quo aut rerum inuentio, aut nomen impositio cesseret. Non tamen id officium uulgo, cui remere omnia placent: sed philosopho certe homini rationum indagatori tribui debet, ut neque ratio desit nomen, & posita sint quemadmodum placuit: quanquam hac ratione potius, quam illa placuerit. Quamobrem interpretandi studiū quamuis ampla quadam careat grauitate, spernendum tamen non ducimus: sed Heracliti dictū illud, deos immortales hic etiam esse, præsumitur: atque ex cæteris philosophiæ studiis, quibus nos dediti sumus, ad hoc non nunquam uenimus: sed interest, quod partim libenter, partim non
10 libenter id facimus. Cum enim ex latinis literis in græcam linguam uertendum aliud quid est, libenter id uertimus: minore enim cum labore plura linguæ usu paternæ conficere possumus: an etiam non inepte, sit hoc aliorum iudicium. At cum latinis hominibus, quibus cum nunc uiuimus, aliquid nostræ linguæ interpretari necesse est: hoc profectō libenter haudquaquam suscipimus. Sumus enim inter latinos, non minus lingua, quam patria peregrini. Quapropter non solum amplum, ac difficile quoddam opus uertendum in linguam latinam nunquam meo arbitrio mihi sumerem, sed etiam nec paruum quoddam aggredi auderem. Verum mihi quoque idem euenire planissime uideo, quod actum sponte, sed animo inuito refert Homerus. Quod enim aliās nollem, facit ut uellem diuus Nicolaus, quem nostra ætas sum-
20 mum habere pontificem meritō gloriatur. Hic enim ut libros Theophrasti de stirpibus latino aperirem sermone iussit: rem uehementer arduam, non tantum homini græco, uerum etiam latino. Nam & genus istud scribendi longe copiosius, ut omnia, græca lingua obtinet, quam latina: & latinis autoribus cura defuit, qua suis hominibus plenius hæc, & quoad romana posset oratio, syncerius explicarent. Licet id uisdere, cum in alijs singulis, tum in ijs, quæ Plinius secundus exposuit. Nam ut cætera omittam (uix enim pauca inter tam numerosa eius capitula, menda mihi carere uidentur) quod de arboribus glandiferis inquit, monstrasse satis hoc loco futurum reor. Has enim arbores generis unius uocabulo amplecti latinum sermonem posse omnino negat: ea credo de causa, quod nullum inuenerit, quod illi græcorum generi responderet, quod *δρῦς* dicitur. Itaque quatuor quedam genera reddit: Quercum, robur, esculum, cerrum: & græca illa adiungit, *ἄμυρος, αἰγίλον, ἀρίστον, πτερόφυλον*: quasi quatuor hæc, latinis quatuor illis respondere non possent. Nec robur pro communi omnium genere capi satis apte liceret. Sic per incuriam autor ille cum minus dilucide docet, tum inopem plus, quam sit, latinam linguam ostendit. Magna etiam in reliquis autoribus percipi potest negligentia. Quæ tamen singuli ignorarunt, uel neglexerunt, colligi magna serè parte in omnium simul operibus possunt. Sed quam laboriosum id sit, uel ex interpretibus, tum antiquis, tum hisce nostris ætatis, argumentum deduci facile potest. Prisci enim illi si quid traduxere, forensis id certe generis oratio est: aut rerum gestarum narratio, aut de uita hominum disputatio. Quæ quidem dicendi genera, si non æque plene, atque lingua græca sermo latinus conficere possit: paulo tamen arctius potest. At commentationem plantarum attingere nemo ausus est: ob eam credo difficultatem, quæ plus laboris, quam laudis afficeret. Elymū enim & zeam, & olyram, & cætera generis eiusdem, quibus nam nominibus latini appellent inuenisse non est, qui non summo labori tribuerit. At cum panicum, & semen, & filiginem, & reliqua dicentem interpretem audis: nil penitus esse arbitraris de cuius inuentione laudem ipse mereatur. Inter iuniores uero scilicet nostræ ætatis homines, aut paulo antiquiores, qui elegantius interpretari studuerint, alia quedam sibi traducenda sumpserunt: plantarum uero laborem, nec isti pati ullo pacto uoluerunt. Qui autē, ut latine singula dicerent mi-

nus curarunt, græcis ipsis uocabulis usi adeo sunt, ut nullum serè fructum ex eorum interpretatione homo latinus capere possit. Itaq; si eos quoq; difficultatis potissimum causa nihil de plantis aperuisse putaueris, haud quicquam mea sententia erres. Fit ergo & autorum, seu ignauia, seu ignorantia, ut magna cum difficultate conuerti hæc possint in linguam latinam. Verum non minus difficultatis, quinimo longe plus parit linguæ ipsius inopia. Minus hoc fortasse credibile latinis hominibus propterea dici uideretur, quod M. Tullius, ne uerbis quidem à græcis latinos suoperari autumat. Sed qui libros non solum latinos, sed græcos etiam pari studio lectitant, facile re ipsa persuaderentur M. Tullij sententiâ incredibilem potius esse arbitrari. Quod equidem, ut uere de me cōsiterear, haud ita esse uehementissime uellem: minus enim in hisce interpretandis nunc elaborarem, si M. Tullius non ex minimis quibusdam, quæ fortasse latini melius habent, simplici quadā, atq; absoluta oratione cauillaretur, sed ueram sententiam diceret. Nūc uero quā laborandum sit, non solum, ut priuata quædam, & rari usus uocabula, sed etiam pleraq; apud græcos usitatissima, & in promptu omnibus habita, latine dicamus, uel hinc satis possit intelligi: inter herbam enim & fruticem Græci genus tertium reddunt, idq; phrygium nomine usitatissimo uocant. Latini autem eo nomine uacant, nec quatuor genera faciunt, sed arboris, fruticis, herbæq; appellatione uniuersas plantas amplecti se satis existimant. Item, quid apud Græcos usitatus sit acremone: quod ramos prægrandes significat, in quos arbor cōtinuò post caudicem spargitur. At apud latinos nullum proprium nomen inueneris: sed ramos, tam eas partes, quā germina antinacula dices. Addo opissimum & chylissimum, quorum differentiam nullus inter latinos autores nominibus proprijs exprimere potuit. Succatio cū uel liquatio, utriq; potius commune, quā alterutro propriū reddi debeat. Facit igitur & linguæ inopia, ut per ardua sit plantarum interpretatio. Auger uero laborem, uel autorum magna in multis dissensio. Cum enim herbam, quā Græci *ἀνέμοιον* uocant, alius louis caulem, alius uitalem, alius digitillum, alius sedum appelleret: quis sequendus potius sit, haud sine magno labore possit decerni. Etsi forte in his minutijs tam laborari curiosum nimis esse credideris, at arborem insignem, aut fruticem memoratu dignum, inconsideranter cœpisse, quis non summo errori dederit? Vt abieti similem illam arborem, quā Græci *ὀφύον* uocant, quoniam certo debeat appellari nomine inter latinos minime constet: alij enim fagum, alij scissimam, alij ornum appellasse appareant. Idq; coniectura assequi tantū poteris. Nullus enim aperte de hac arbore scribit. Sed quod fagum, quidam in tenuissimas laminas secari dixerint, nō eam fagum significari putatur, quæ glandem fert, & scabra materie constat: sed arborem potius illam, quā Græcos *ὀφύον* appellare proposui: eam namq; ita secari omnium præcipue posse uidemus: qua de causa scissimam alij appellare fortasse placuit. Verum quod manifeste nemo docuerit, hæsitare interpretem, & laborare necesse est. Hoc idem uel in alijs plerisq; conspiciere licet. Sed omnium durissimum illud certe accidit, quod rextus propositi operis, mēdosus adeo est, ut nulla serè pars sit exemplaris, quod unum tantum habere possumus, quæ uel librariorum inscitia, uel alia temporum offensa non tam deprauata sit, ut & summa cum difficultate sit emendandum: & nonnulla intermitteri necesse sit, quæ uix congrue intelligi possint: præsertim in ijs libris, qui de plantarum historia describuntur. Quas ob res difficillimam porrò prouinciam nobis hanc summus pontifex delegauit, remq; profectò nostras uitres penitus superantem, expediendam mandauit. Sed quid agam? Fieri non potest, ut eius principis iussa recusem. Res enim nulla tam plena laboris est, ut eam aggredi iussu diui Nicolai nō debeam: quem deos immortales idcirco tam amplio principatu magnificasse existimo, ut eius singulari uirtute, humanum genus felicitatem

licitatem seculis memorandam omnibus valeat adipisci. Quem ego non solum, ut dominum colo, & omni officio, uel potius pietate, obseruo: sed etiam ut uirum doctissimum, omnisque uirtutis genere præditum, animo summe beneuolo amplector. Aggrediar igitur, quæ meus hic dulcis tyrannus interpretari cõggit: & partim plantarum nomina, quibus latina lingua non caret, diligenter pro uiribus quæram: partim noua, rebus nouis nomina imponam, ubi id non inepte pro meo modulo facere possim, & ex fonte deducendo Græcorum, quoad liceat Latinorum succurrã inopie. Nonnusquam etiam græcis utar, aut quia usitata latinis hominibus sint, aut quia proferri aliter nequeant. Denique singula textus græcæ orationis adeo perfectumur, ut ne minimum quidem prætermittere uideamur, quoad scilicet sine abs-
 10 sona, & barbara illa Gulielmi interpretis locutione, quæque græca latine aliquo pacto exprimi possint. Hanc enim cum in his omnibus Theophrasti libris probemus, tum maxime in his sex, quos de generatione, siue de causis plantarum addidit, per cõmodam ducimus: quippe cum rerum rationes naturalium dilucide potius traduci, quàm eleganter desiderent. Sæpe namque rationes rerum, elegans latina peruertit traductio: præsertim eas, quas Peripateticorum ille æquabilis, eruditus, seuerus, minusque benignus sermo exponit. Sed forsitan non solum hæc prædixisse, uerum etiam deum aliquem inuocasse par est. Nam si in secandis quibusdam radiculis deos præcari necessarium creditur: cur non in interpretandis omnibus plantarum generibus,
 20 hoc idem facere longe magis cõueniat? Igitur diuinum implorandum auxilium est. Sed quem potissimum deum uocemus? an non Syluanum, non Pana, non Cere-rem, non Dryades, nõ Faunos? non eiusmodi aliquem, sed quem uera religio deum, aut iam habet, aut post nescio quot annos habebit. Ita hercle ac decet ipsum sanctissimum patrem inuocemus, quem uniuersa iam Europa, ob eius integerrimam uitam, innumeraque erga omnes beneficia, diuum appellat: deumque proculdubio post appellabit, cum immortalium petet collegium. Er-
 go tu diue Nicolaë, namque deus iam mihi es, adfisso
 obsecro, & fructum nonnullum no-
 ster hic labor pariat homi-
 nibus, facias.

THEOPHRASTI DE

HISTORIA PLANTARVM, LIBER PRIMVS,

THEODORO GAZA INTERPRETE.

Per quas partes historia plantarum haberi possit. Cap. I



PLANTARVM differentias, reliquamq; naturam ex paribus, affectionibus, generationibus, utraq; petere oportet: mores enim & actiones, quemadmodum animalium genus, minime plantis fortuitur. Sunt autem, quæ per generationem, affectionem, uitamq; sumidebeant patetiora cognituq; faciliora. Quæ uero per partes nescitur necesse est, uarietates utiq; plures habere uidemus. Hoc enim ipsum primo non satis constat, quæ partes, quæq; non partes debeant appellari. Sed nonnullam controuersiam recipit: partes enim quoniam suæ naturæ ratione consistant, perpetuò durare uidentur, aut simplici, absolutaq; ratione, aut postquam confectæ fuere, ut scilicet animalium partes, quæ postea concresecunt, nisi quid morbo, aut senectæ, aut læsione perdat. At in plâis nonnulla ita se habent, ut annua duntaxat potuit natura, ut flos, muscus, folium, fructus: deniq; omnia quæ ante fructus, aut unâ cum fructibus proueniant: quinetiam germen ipsum, quippe cum arbores annuatim incrementum tam partibus supernis, quam circa radices semper capeant. Quamobrem si quis partes hæc esse asserat, cum partium multitudinem incertam, tum partem nūquam eandem esse sequetur. Sin autem partes esse negauerit, cōtinget protinus, ut ea partes minime sint, quibus plantæ perfectæ redduntur, talesq; esse spectantur. Quippe omnes cum germinant, uidentur, fructum gerunt, pulchriores atq; perfectiores & sunt & esse uidentur. Hæc ferè sunt in his ambiguitates. Sed forsitan non omnia neq; in cæteris, neq; in ijs quæ ad generationem pertinent, pari ratione querere decet. Eaq; ipsa singulis annis oriunda, minime in partium genere collocanda sunt, ut fructus. Nec enim foetus partes animantium esse possunt. Sin autem clementia temporis plantæ aspectu pulcherrimæ reddantur, at pulchritudo nullo ipsa indicio est. Nam & animalia dum uterum gerunt, pleniora, pulchrioraq; redduntur: pleraq; etiam partes quotannis amittunt, ut cerui cornua, aues nidificantes pennas, quadrupedes pilos. Quapropter haud temere facitatum dixerim, præsertim cum is affectus persimilis sit foliorum iacturæ. Pari modo de ijs, quæ ad generationem attinēt, differendum est: quippe cum etiam in animantium genere, quædam simul nascantur, quædam tanquam naturæ aliena secernantur. Germinatio quoq; non secus esse uidetur: etenim generatio ipsa generationis perfectæ gratia est: ad summam, quemadmodum diximus, non omnia similiter, atq; in animantibus accipi debent. Quamobrem numerus quoq; incertus est: Nam uis undiq; germinandi habetur, quoniam & undiq; animatum est. Hæc ita opinari non tantū rei præsentis, uerū & futuræ gratia cōuenit. Etenim quæ assimilari nequeant, assimilare contendere, superuacuum certe, ac recusandū, ne uel propriam ipsam rei speculationem amittamus. Plantarum uero historia (ut simpliciter dixerim) aut per partes externas, totamq; formā, aut per internas haberi potest, ut etiam in animalium genere partes abditæ è dissectionibus patent. Sed capere in his ipsis oportet, quæ in omnibus insunt eadem, quæq; propria cuiusq; generis sint, atq; etiam quæ in his habentur similia: propriū inquam folium, radicem, corticem. Nec illud latere nos decet, qd proportionem intelligi debeat, ut in animalium genere, ad ea scilicet redigendo, quæ quamuis similia, perfectissimaq; continentur. Ad summam, omnia quæ

que in plantarū genere spectantur, similitudo petenda ex ijs est, quæ in animalibus inſunt, quoad fieri poſſit. Igitur hæc ita determinare libeat. Partiu uero differentie (ut formula rem cōplectar) tribus ſerè in rebus cōſiſtunt: aut enim in eo quod quædam nō habent, ut folia, & fructus: aut quod nō ſimilia, neq; paria habēt: aut tertio, quod non ſimiliter habent. Horū diſſimilitudo figura, colore, ſpiſſitate, raritate, aſpē-
10 ritate, leuitate, reliquisq; affectionibus enoteſcit: ad hæc omnibus differentijs ſapo-
rū. Diſparitas aut in exceſſu atq; defectu eſt multitudinis, magnitudinis: uæ: quæq; (ut pingui Minerua dicaſ) & illa omnia exceſſu, defectuq; diſtinguuntur: nam plus, minusq;, nō niſi exceſſus, defectusq; ſunt. Non ſimiliter uero poſitu conſtat: exem-
pli gratia, quod fructus quædā ſub ſolijs, quædam ſuper folia gerunt: ipſarūq; ar-
borum, aliæ cacumine ſerunt, aliæ latere, nonnullæ etiā caudice, ut morus ægyptia,
& quæ fructum pariunt ſub terrā, ut archidna, & quod uingum Aegyptij uocant:
item ſi quædam pediculū habeant, quædam careant. Hoc idem uel de floribus dici
debet, quippe cum alijs circa fructū ipſum naſcantur, alijs ſecus. Ad ſummā, poſitio-
nis ratio in his, & ſolijs, & germinib. accipi debet. Ordine præterea nō nulla differre
uidentur: quibuſdam enim rami incōditi, ut robori: quibuſdam ordinati, ut abieti,
utrinq; miro ordine inuicem reſpōdent: quibuſdam etiā rami prægrādes ordinati,
pareſq; numero, ut trinodibus. Quas ob cauſas differētijs rebus his capi oportet,
quibus uel tota forma in ſingulis perſpici poteſt.

Quid radix,caulis,caudex,ramus,surculus.

Cap. II

20



E paribus autem ipſis ſigillatim tam referre conandū, ſi prius eas nu-
mero perſecuti fuerimus. Partes primæ, maximæ, communesq; pluri
morū, radix, caulis, ramus, ſurculus: quibus ueluti partibus quiſpiam
diuidere poteſt, quemadmodum in animalū genere: eſt enim quodq;
eorum diſſimile, atq; his omnibus tota conſiciantur, neceſſe eſt. Radix
eſt id, quo alimentum attrahitur. Caulis, in quod alimentū deſertur: caulem enim
appello, quod ſupra terram ſimplex aſſurgit. Id enim commune pariter annuis atq;
perpetuis eſt: quod in arborum genere caudicem uocitare ſolemus. Rami, qui a cau-
10 le ſilli multiplices ſparguntur, quos nonnulli nodos appellant. Surculus, quod ex
his indiuiduum, ſimplexq; oritur, quale præcipue germen annotinū appareat. Sed
hæc potius arborum generi conueniūt. Caulis uero (ut dictum eſt) cōmunior qui-
dem habetur: ſed nec ipſum quidē omnia habere uidētur, ut ex her baccis quædam
habent, ſed non perpetuū, ſed annuū tantum, ceu quæ diuturnis radicibus uiuūt.
In totum, planta res uaria eſt, atq; multiplex, inq; uniuerſum de ea referre difficile.
Indiciū uero, quod nihil penitus eſt, quod cōmune accipi poſſit cū cētis plantis cōue-
niens, ut animalibus, os, uenter, & alia proportionē eadem, alia quodā alio modo.
Neq; enim radicē, neq; caulem, neq; ramū, neq; germen, neq; ſoliū, neq; florē, neq;
fructū plantæ omnes habere uidentur. Cortex rursus, aut medulla, aut neruus, aut
40 uena minime omnibus ineſt, ut in fungorū ac tuberū genere patet. Quibus rebus,
hiſq; ſimilibus natura utiq; plantarū cōſiſtit. Sed hæc (ut iam dictū eſt) arborū præci-
pue ſunt, hiſq; cōuenientius hæc accōmodet partitio, ad quas uel reliqua redigi par
eſt: cæteras præterea omnes formas hæc propē exprimūt atq; declarāt. Diſtāt enim
eorū multitudine, paucitate, ſpiſſitate, raritate: etiā eo quod ſimplicia prodeſit, uel in
plura ſcindunt, reliquisq; ſimilib. Partiu aut quas retulimus nulla ex particulis ſimi-
libus conſtat. Similibus inq; particulis, qd ex eiſdē pars quælibet radicis aut caudicis
cōſtat. Sed quod acceperis, caudex nullo pacto uoceſ, ſed pars caudicis. Quemad-
modū etiā in animalū membris: nam pars quæq; tibie, aut cubiti ex eiſdē cōſtat: ue-
rum nō ijs, quæ eodem uocabulo cognominentur, ut caro, ut os: ſed nomine illa ca

rent, ut etiam quodq; uniformium instrumentorum. Eiusmodi enim omnium particulæ nomine carent, quanq̃ multiformium particulæ nomine suo noscunt, ut pedis, manus, capitis, digitus, nasus, oculus. Hæc ferè partes plantarum maxime habentur.

Quid matrix, quid fructus, quid humor.

Cap. IIII



Ed sunt etiam aliq̃, quibus constant, cortex, lignum, & matrix, ubi scilicet esse potest. Quæ quidem omnes particulæ cõstant similibus, quæq̃ priores hæc habentur, quibusq̃ istæ cõsummant, ut humor, neruus, uena, caro. Hæc enim principia sunt: nisi uires elementorũ dixeris: sed illæ tamen communes rerum omnium habentur. Essentia itaq̃, naturaq̃ uniuersa plantarum his in rebus consistit. Quædam uero quali annuæ partes accedunt, quæ partui fructuum accommodantur, ut folium, flos, pediculus, id est, quo folium dependet. Ad hæc capreolus, muscus, ubi scilicet esse potest: super omnia semen, fructus. Est autem fructus, quod carne & semine constat. Sunt præterea quibusdã propria quædam, ut robori, galla: utri, capreolus. Arbores persequi hunc in modũ possumus. Annuis uero quæq̃ annua gigni cõstat. Nam ad fructũ usq̃ natura eorum tantum se ampliatur, quæ suo uno fructificent anno, quæq̃ biennio durent, ut apium & alia quædam, quæq̃ plus temporis obtineant: his omnibus caulibus quoq̃ pro ratione conueniet. Cum enim semen parturiunt, caulem tum emittunt, utpote, quæ non nisi causa seminis caulem promant. hæc ita discerni placet. Partes autem nouissime dictas, quid quæq̃ sit, nota reddere subsignationis, conandum iam est. Humor itaq̃ patet, quem nonnulli simpliciter liquorem in cunctis appellant: quemadmodum etiã Meneſtor. Quidam in cæteris absq̃ nomine capiunt: in quibusdã uero liquorem, inq̃ alijs lachrymam uocant. Neruus ac uenæ per se nomine carent: quædam uero similitudine nomina partium animalium cõfortiuntur. Quin & alijs quoq̃ differentijs hæc fortasse inter se distent, atq̃ in totum genus uniuersum plantarum differat: est enim uarium atq̃ multiplex, ut proposuimus. Sed quoniam notis ignota persequamur oporteat, notaq̃ sint grandiora, patentioraq̃ sensui offeratur, hinc proculdubio de his primum prout rexerint, dicendũ est. Reliqua enim ad hæc ipsa redigere habebimus, quantum & ad usq̃ quoq̃ modo similitudinem singula cõtinuare uideantur. Cum uero partes sumpserimus, differentias protinus earum adiciendum: ita enim simul & natura euidens, & tota generum differentia conspicua fuerit. Maximarum itaq̃ partium differentia penè dicta est, uidelicet radices, caulibus, reliquarũ: uires enim cuiusq̃, quarumq̃ rerum gratia, quæq̃ sint, postea dicemus. Illa enim quibus tam hæc, quam cætera consent, explicare prius oportet, sumpto à primis initio. Sunt autem prima, humor atq̃ calor. Omnes enim planitiæ humorem caloremq̃ sibi insitum quendam possident, sicut etiã animalia: quæ cum deficere incepere, senectũ, diminutioq̃ consequitur: cum quæ penitus descere, exiccatio, morsq̃ occupat. In primis igitur illis humor nomine caret, sed in quibusdã (ut dictum est) nuncupatur. Hoc idem uel in animalium genere percipere licet. Solus enim humor habentium sanguinem certo nomine redditur. Quamobrem ad id prius ratione ipsa discernimus. Alia enim sanguinem habere, alia carere fatemur. Est igitur ea pars, calorq̃ illi connexus.

Quid lignum, quid caro, quid cortex, quid matrix, ex quibus cortex.

Cap. IIIII



Disunt uero & alia genera ab internis diuersa, quæ ipsa quidem per se nomine carent, similitudine autem ex animalium partibus appellatorem sibi mutuuntur. Habent enim quodãmodo neruum, quod continuum, fissile, prælongumq̃ est, sed insociabile, germinisq̃ in fecundum, & uenas habens. Venæ ipsæ cætera neruo similes, sed maiores, crassioresq̃

crassioresq; sunt, & ramulos, humoremq; habentes: item lignum & caro. Alia enim lignum, alia carnem habent. Lignum fissile est, caro omnibus dimensionibus diuidi potest: quomodo terra, quæq; ex terra consistit. Vnde sit, ut inter neruum & uenam ipsa media sit: patet eius natura, cum in cæteris, tum in fructuum cute. Cortex & matrix proprie nuncupantur, sed ea quoq; reddere definitione debemus. Cortex est pars ultima, & à subiecto corpore separabilis. Matrix, qd in medio ligni tertium à cortice continetur, uelut medulla in ossibus: id nonnulli cor, alij medullam appellant. Partes tot penè numero habentur, quarum posteriores ex prioribus consistant. Lignum ex neruo & humore, nonnulla etiam ex carne. Cum enim indure-

scunt, transcunt in lignum, ut palma, ferula: quicquid lignescat, quemadmodum raphanorū radices. Matrix ex carne, & humore. Cortex quidem ex tribus illis, ut roboris, populi, piri: quidā ex humore & neruo, ut uitis. Folia uero ex humore & carne. Rursum ex his maxime, & primæ illæ, quas enumerauimus, partes componuntur, non tamen omnes ex eisdem, neq; simili modo, sed diuerso. Igitur expositis tam omnibus ferè partibus, differentias earum, & arborum, plantarumq; omnium naturam nunc assignare tentandum est.

Quid arbor, quid frutex, quid herba. De malus, beta, amerina, nucella. Cap. V



Ed cum doctrina euidentius tradi soleat, cum per species diuidimus, recte hunc in modum agetur, ubiq; fieri possit. Sunt itaq; prima, & maxima, & à quibus omnia penè, aut certe plurima continentur, arbor, frutex, suffrutex, herba. Arbor est, quod ab radice, caudice simplici, ramosum, nodosum, furculosum aut facile dissolubile assurgat, ceu olea, ficus, uitis. Frutex, quod ab radice, caudice multiplici, ramosumq; se attollit, ut rubus, paliurus. Herba, quod ab radice foliatum, sine caudice proueniat, semenq; caule ferat, ut frumenta, & olera. Sed definitiones ita accipi, probariq; debent, ut notis ac lineamentis quibusdam quasi in uniuersum à nobis subsignentur: etenim discere nonnulla suapte natura fortasse appareant: quædam etiam ob culturam diuersa effici, atq; à sua natura discedere: ut malua in altum se attollens, atq; in arborem transiens: quippe ita sit, neq; tempore longo, sed mensibus senis, aut septenis, ita, ut longitudine, crassitudineq; instar hastæ possit grandescere, quapropter commode ad usum baculi uenit: tempore uero longiore exacto pro ratione, magis quoq; incrementa capessit. Simili modo & beta: nam ea quoq; ampliorem magnitudinē capit: sed longe magis amerina, paliurus, edera, ut proculdubio arbores efficiantur, quamquam frutices sint. At myrtus, nisi sæpius purgetur, in fruticem transiit. Quin & nux auellana, quæ quidem & fructū mellorem, copiosiorēq; feret, si quis plures uirgas reliquerit, scilicet, & quæ sua natura potius fruticosa sit: neq; malus, neq; punica, neq; pirus: deniq; nulla, quæ ab imis plantigera sit, caudice uno esse appareat, sed cultura cæteris absolis uicq; tales redduntur. Nonnullas etiam caudice diffusas multiplici, causa exilitatis relinquimus, ut punicam, ut malum. Oleas quoq; & ficos multifidas dimittere assolent. Quinetiam magnitudine, paruitateq; omnino diuidenda nonnulla quispiam fortasse censuerit: quædam etiam robore imbecillitateq; & diuturnitate, ac temporis breuitate: quippe cum uirgultorum, olerumq; nonnulla caudice uno consistant, & arboris quali naturam adipisci spectentur, ut radix, ut ruta. Quamobrem eiusmodi olera, nonnulli oleriarbores uocant, & quidem omnia olerum genera certe, aut plurima cum permanferint, quasi ramos quosdam capessunt, totaq; in arboris figuram mutantur, diu tamen durare nequeunt.

Arborum alie urbane, alie syluestres, alie fructiferae, alie steriles, alie floriferae, alie flore carentes. De agro elephantio. Cap. VI



Vas ob res, quemadmodum diximus, non exquisita, arctiusque ratione, sed potius nota quadam subsignandi & formula, definitiones accipi debent. Nam & diuisiones modo simili capiendae sunt, ut urbanarum, syluestrium, fructiferarum, sterilium, floriferarum, flore carentium, perpetuo uiuentium, folia deperdentium. Syluestres enim, atque urbanae, cultura potius esse uidentur: nam omnem plantam, & syluestrem, & urbanam esse ci posse Hippon autor est, scilicet, cultum adeptam, aut non adeptam. Steriles item, & fructiferae, & floriferae, & floris exortes, ob loca, coelumque ambiens, redduntur eodem modo perpetuo uiuentes, & folia deperdentes. Etenim circa agrum Elephantium, neque uitis, neque ficis folia decidere aiunt: ueruntamen eisdem rebus cuncta amplecti conuenit. Est enim quid naturae commune pariter arboribus, fruticibus, suffruticibus, herbisque: quorum etiam causas, cum referre placuerit, de omnibus communi docere ratione oportet, omnia penitus singulorum determinatione: nam causas quoque communes omnium esse ratio est. Quinetiam naturalis quaedam differentia protinus in syluestrium, urbanarumque genere nobis se offert: siquidem alia uiuere nequeant absque cultura, ceu illa, quae coli solent: alia cultum nullum patientur, sed deteriora reddantur, ut abies, pinaster, celastus. Ad summam, quae loca frigida, niuosaque adamant: pari modo in fruticum, herbarumque genere, capparis, lupinum. Urbanum autem, & syluestre uocitare debemus, redigendo tum ad praedicta illa, tum uel maxime ad id, quod omnium urbanissimum esse constat. Homo autem aut solus, aut maxime omnium urbana species est.

Formarum differentiae, quod alie terrestres, alie aquatiles, alie in paludibus, alie in lacubus, alie in fluuijs, alie in mari. Cap. VII



Ornis quoque in ipsis differentiae totorum, atque partium patent, ceu magnitudo, paruitas, duritia, mollitia, leuitas, asperitas corticis, foliorum, reliquorumque: denique pulchritudo, & deformitas quaedam, item bonitas, & prauitas fructuum: quippe cum plura syluestres ferre uideantur, ut piraster, & oleaster: urbanae autem meliora: succos quoque ipsos dulciores, suauiores, atque in totum dixerim, temperatiores praestent. Igitur haec naturales quaedam (ut dictum est) differentiae sunt, ac longe magis sterilium, fructiferarum, folia deperdentium, perpetuo uiuentium, quaeque alia huiusmodi sint: omnium uero semper, omnesque differentiae pro locis accipi debent, quippe cum aliter forsitan capi nequeant. Tales autem differentiae generalem quandam facere distinctionem posse uidentur, ut terrestrium, atque aquatilium, sicuti in animalium genere. Sunt enim plantarum quaedam, quae non nisi in aqua uiuere possunt. Namque aliae secundum aliud genus humorum discernuntur, ut aliae in paludibus, aliae in lacubus, aliae in fluuijs: quaedam etiam in ipso mari nascantur, minores in nostro, maiores uero in Rubro: nonnullae praemadidae quasi, atque palustres omnino spectant, ut salix, platanus: quaedam degere in aquis minime queunt, sed arida loca persequuntur: ex minoribus quaedam etiam litora unguis desiderant. Ceterum inter eas quoque, si quis arctius inquirere uelit, alias communes, & quasi uitae ancipitem agentes inueniet, ut myrtus, salicem, alnu: alias uel ex ijs, quae terrestres proculdubio sunt, mari nonnunquam uiuentes, ut palmam, scyllam, albucum. Sedem eiusmodi omnia, & in totum hoc modo pensare minus accommodata contemplatio est: nec enim natura hoc modo, neque in eiusmodi rebus necessitate interdicere diuisiones, atque in totum historiae plantarum accipere huc in modum debemus. Omnia itaque tam haec quam cetera differunt, ut diximus, tum ceterorum forma, tum partium discrimine: uel quod quaedam habent, quaedam non habeant: uel quod quaedam plura habeant, quaedam pauciora: uel

uel quod non simili modo habeant, uel quemadmodum superius situs diuissimus. Nam loca quoque assumptisse fortasse non ab re est, quibus locis singula apta, aut non apta sint procreari: nam id etiam differentia magna, & maxime propria plantarum esse percipitur, quandoquidem terrae adhaerent, & nunquam ea absolui, sicut animalia possunt.

Differentia plantarum à figura, caudice, à cortice & ligno etiam.

Cap. VIII



Vnc particulatim differentias explicare conandum, quo primum in uniuersum, atque ratione communi, deinde singulatim differētes, plus quoque agnoscere progressu orationis uideamur. Sunt igitur plantarum aliae procerae, & longo caudice, ut abies, pinus, cupressus: aliae contortiores, & caudice breui, ut salix, ficus, punica: similimodo & crassitudine, tenuitateque distat: quaedam rursus caudice uno, quaedam pluribus. Ab his proximum uel illud quodammodo est, alias procreandae sobolis uim retinere, alias carere, & alias ramos multos gestare, alias paucos, ceu palmam: item robore, & crassitudine, aut aliquibus huiusmodi differentiis discernendū: rursus quaedam cortice tenui, ut laurus, tilia: quaedam crasso, ut robur: item quaedam cortice leui, ut malus, ficus: quaedam scabro, ut robur, suber, palma: haec dum adolescunt leuiori cortice sunt: cum senescunt, crassiores, scabrioresque. Nonnullis cortex radicis specimen gerit, ceu uiti: quibusdam etiam cadit, ut portulacae, unedoni, arbuti. Ad haec alijs cortex carnosus, ut suberi, robore, populo: alijs neruosus, macilentusque, pariter arboribus, fruticibus, annuisque, ut uiti, arundini, tritico: & alijs multiplex tunicis, ut tiliae, abieti, uiti, lino geniste, cepis: alijs simplex, ut fico, arundini, lolio. Corticis ratione ita differentiae colliguntur. Lignorum autem ipsorum, atque in totum caulium, alij carnosus, ut roboris, ut fici, & ex minoribus glandis, betae, cicutae: alij macilenti, ut cedri, ut celtis, ut cupressi: & alij neruosi, abietis enim palmarumque huiusmodi sunt: alij enerues, ut fici: similimodo alij uenosi, alij uenis priuati. Sed in fruticum, & suffruticum, & ad summam sarmentorum genere, aliae quoque differentiae comperiri possunt: quippe cum arundo geniculata: rubus, & paliurus spinosa: tithys, & palustris, aut lacustris nonnulla, insecta pariter, atque aequalia conspiciantur, ut iuncus. Gladioli uero, & butomi caulis aequalitatem quadam peculiarem fortius est, & longe magis fungi fortasse pediculus eo in genere poni debeat. Igitur haec differentiae rerum illarum esse appareant, quibus fieri compositio potest. Illae uero ad effectiones, uiresque referuntur, ut durities, mollities, lentitas, fragilitas, densitas, raritas, leuitas, grauitas, quaeque alia eiusmodi sint. Salix enim sicca tantummodo leuis, suber etiam uiride leue est: buxus & ebenus ne arefactae quidem leues redduntur: & aliae fissiles, ceu abies: aliae frangi celeriores, ut olea: aliae item enodes, ut sambucus: aliae nodosae, ut pinus, abies. Nec huiusmodi differentiae denegandae naturae sunt, nam fissilis abies certa meatuum rectitudine, fragilis olea obliquitate atque duritia, flexibilis tilia, & quaecumque alia huiusmodi sunt humoris sui lentitia: grauis buxus, & ebenus, quia densa: robur, quia terrenum: parimodo & reliqua omnia quodammodo ad naturam redigi possunt.

Differentia medullarum, discrimin radicum, differentia radicum in summa.

Cap. IX



Edullae praeterea ratione inter se discrepant. Primum si aliae habeant, aliae careant, ut nonnulli tam alias quasdam, quam sambucum medulla carere asseuerant: nam & inter eas quae certo habent, alijs carnosae, alijs lignosae, alijs membranosis similis. Carnosae, uiti, fico, punice, sambuco, ferulae: lignosae, larici, abieti, pino, & quidem huic praecipue, quod tectae plurimum ingerat: his durior atque spissior, corno, ilici, robori, cytisso, moro, ebano, celti: quae quidem coloribus inter se distant: omnes enim nigrae inspecantur.

Quinetiam robori talis, quod nigrū cognominant, omnesq; lignis duriores: quam obrem flexum nullum recipiunt: aliae tamen alijs solutiores, membranīs similes, atq; bonibus nullae, aut raro. In fruticosis uero, atq; materia humili, ceu arundine, ferula, reliquisq; eiusmodi tales nimirum habentur. Quaedam medullam ipsam magnam; atq; perspicuam continent, ut ilex, robur ceteraq; praedictae: quaedam parum, incertioresq; gerunt, ut olea, buxus: haud enim ita in his distinctia spectatur. Quam obrem sunt, qui non in medio, sed per totum lignum dispersam esse affirmant, ut nullus sit certus locus medullae: nec desunt, quae nullam omnino medullam habere uideantur, nam palmae nullum penitus discrimen colligi potest. Radicibus praeterea distant: alijs enim multae, longaeq; radices, ut fico, robori, platano, quippe cum istae, si locum habeant expeditum, subire quantumuis facile possint: alijs paucae, ut punicae, malo: alijs una tantūmodo data est, ut abietis, pino, ita scilicet ut una, & praegrandis in ima descenderet, paruae autem complures ab illa exirent. Item earū, quae unica radice firmantur, quaedam praegrandem, alteq; infixam illam demittunt, quae ex medio tendit, ceu amygdala: sed olea paruum illam, ceteras grandiores, contortioresq; gerit: & alijs crassiores, alijs inaequales, ut lauro, oleae: alijs tenues omnes, ut uiti. Differunt praeterea leuitate, asperitate, spissitateq;: quamuis enim omnium radices, rariore corpore partibus superioribus sint, aliae tamen alijs spissiores, magisq; surculosae constant: & aliae neruosae, ut abietis: aliae carnosae potius, ut roboris: quaedam ueluti nodosae, uillosaeq; ceu oleae. Quod exinde euenit, quia breues, ac tenues illas per multas, atq; promiscuas mittunt: nam etsi omnibus paruae & grandibus exeunt, tamen non omnibus eodem modo congeltae, frequentesq;. Sunt item aliae radicibus altis, ut robur: aliae summā adhaerentibus terrae, ut olea, punica, mālus, cupressus: item alijs rectae, aequalesq;: alijs obliquae, inaequalesq;: id enim non solum loci ratione euenit, quod scilicet & recto tramite progredi nō possunt, sed etiā naturae ipsius proprium est, ut in lauro & olea liquet. Fico, ceterisq; huiusmodi radix obliqua propterea est, quod expedita, faciliq; semita carent. Medulla omnibus inest sicuti caudicibus, & ramis, qui certe non absq; ratione sua testantur principia. Item quaedam prolis sursum uersus procreandae uim obinent, ut uitis, ut punicae: quaedam nullam penitus proferre sobolem possunt, ut abietes, cupressi, pini. Suffruticum quoq; herbarum, reliquorumq;, has easdem differentias assignare licet, nisi quid radice penitus careat, ut tuber, fungus, cranium: nam alijs radix numerosa, ut tritico, ordeo, tiphæ, omnibusq; huiusmodi esse similitudine quadam cōcernuntur: alijs paucae, ut leguminibus. Olerum quoq; maior serē pars radice cohaeret singulari, ut brassica, beta, apium, rumex: sed nonnulla propaggines magnas subgerunt, ut apium, beta: quae quidem pro corporis sui ratione altius, quam arbores sanē radiantur. Sunt alijs carnosae, ut raphano, rapae, aro, croco: alijs lignosae, ut eruce, ocyamo, & syluestribus magna ex parte: quibus non protinus plures, & filiae exeant, sicut tritico, ordeo, & ei, quam specialiter herbam appellamus: haec enim in annuorū, herbarumq; genere differentia radicum, ut aliae protinus multiplices, atq; aequales praescindantur: aliae simplices promanant, aut binae, scilicet quae maxime constant: nam aliae plerq; ex ijs proueniunt.

Radix gladioli, & ari, radix scellarum, ceparum, & bulborum.

Cap. X



D summam, radicum differentiae in olerum genere, atq; materia humili complures accipi possunt: sunt enim aliae lignosae, ut ocyami: aliae carnosae, ut betae, multoq; magis, ari, hastulae regiae, croci: quaedam quasi carne, & cortice constant, ut raphanorum, raporum: aliae geniculatae, ceu harundinum, graminum, & quicquid harundinaceum: quae quidem foliae uel

maxime

maxime ijs, quæ super terram emineant, similes formari cernuntur: etenim tanq̃ harundines fibris innixæ corradicantur. Aliæ tunicis multiplicibus, corticofac̃q̃ porriguntur, ut scyllæ, bulbi, atq̃ etiam cepe, hisq̃ similiū: semper enim his aliquid circa eximip̃ potest: quæ quidem omnia, duplex quodammodo genus radicis exhibere uidentur. Nonnullis hoc idem de omnibus capitatis, terrac̃q̃ conditis, placet: habent enim & carnosam illam, & corticosam, ut scylla, & eas, quæ ex illa proueniunt: non enim crassitudine, tenuitateq̃ tantum discrepant, sicut olerum, arborūq̃, sed etiam genus diuersum habere uidentur. Euidētissima gladioli est, atq̃ ari, quippe cum altera crassa, leuis, carnosā: altera tenuis atq̃ neruosa sit. Quamobrem dubitauerit
10 sanē quispiam an inter radices hæc poni debeant: etenim quod subter telluri cohæret, radix esse appareat: quod uero cæteris ē diuerso promitur, nihil obtinere radicis dixeris: radix em̃ parte postrema tenuior est, inq̃ acutius assidue tendit. Radix uero scyllarum, bulborū, arorumq̃, e contrario crescit: item cæteræ, radículas de suo latere mittunt: scyllarum uero, & item ceparum, nihil penitus mittunt. In totum, quæ de capite per medium pendent, radices esse uidentur, atq̃ coalescunt. Pars uero illa extuberans, ad cymæ, aut fructus modū consistit: sed cum natura eorum plus esse q̃ radix debeat, idcirco oriri ambiguitas potest, quippe cum totū illud radicem esse assueuasse, haudquaq̃ recte actum intelligatur: radix enim bulbi, & gethyi, caule omnino carebit, & in totum omnia, quæ natura sub terram distendi uoluit, caulis ni
20 mirum expertem fortientur naturam, si totum radice consumari placuerit: ac proinde tuber, quod nonnulli aschium uocant, & uingum, & quicquid sub terram aliud latitat, radices proculdubio erunt, quorū nullum forma constar radicis: hæc enim natura uiribus, non locis, discerni oportet: sed fortē recte id quidem dicitur, illud tamē radix nihilominus est. Sed illa quoq̃ radicis differentia reddi debet, ut alia tanta, alia talis sit, alteraq̃ alimentū ab altera capeat: quanq̃ & ipsæ, & earum carnosæ illæ alimen-
tum sibi attrahere uidentur. Arorum itaq̃ radices rustici alunt anteq̃ germina ædere inceperint, redduntq̃ ampliores, dum germinandi impetum cohibent: omnium enim eiusmodi naturam deorsum uersus potius uergere, manifestum est. Caules enim atq̃ in totum partes supernæ, breues, imbecillesq̃ sunt: inferæ autem,
30 grandes, frequentes, ualidæ: nec solum in prædictis, uerum etiam in harundine, gramine, deniq̃ omnibus quæ harundinacea, ijsq̃ similia sint: quæq̃ ferula cea, horum quoq̃ radices grandes, atq̃ carnosæ.

De Croco, perdicio, uingo, laferpicio, maguderi, et platano in Lycio.

Cap. XI



Lerac̃q̃ etiam herbaceorū radicibus eiusmodi continentur, ut aspalax, crocum, quodq̃ perdicum uocatur, quod perdeses se ad id uoluerit, terramq̃ suffodiant. Pari modo, quod Aegyptij uingum appellant, etenim folia eius ampla, & germen pusillū, sed radix longa, & in modū fructus, & cibo idonea. Colligunt id, cum amnis effusus fuerit,
40 eoq̃ deorum aras exornant. Euidētissimā & maximam præ cæteris differentiā laferpicio obtinet, & quæ Magydari nominata est: harum enim utriq̃, omnibusq̃ huiusmodi natura radicibus potius constare tota uidetur: igitur hoc ita sumendum est. Quædā autem ex radicibus plures differentias præter prædictas fortiri apparent, ceu Arachidnæ radix, cuiusq̃, quod simile est araco: ambæ nanq̃ fructū non minorem superno afferunt. Pars ipsa carnosā radicem simplicem, crassā, altius insidendam mittit: cæteras uero quibus insidet fructus, tenues, ac summo cespite cohærentes agit: loca arenosa potissimū amant: neutrum folia gerit, neq̃ folijs quicq̃ simile, sed quasi binorum fructuum, partibus inter se oppositis, secunda potius ex-
tant, quod mirum profectio est. Naturæ, uiresq̃ plantarum tot differentijs uariant:
b

Radices omnium prius, quam partes supernae augescunt: nulla tamen subire altius potest, quam solis calor attingat: calor enim est, qui uim habet gignendi. Ceterum uel natura humi ad radices altitudinem, longeque magis ad longitudinem plurimum conferre uis detur, si leuis, rara, transmeatuque facilis sit: nam in eiusmodi locis ulterius produci, & maiora incrementa sequuntur. Constat id maxime in genere urbanissimorum: haec enim, si aquae copiam habent, in quantum libeat progredi possunt: praesertim si locus inanis sit, nec aliquid obstat, ceu puteus, aut aliquis aqueductus, quemadmodum in Lyco datanis, apud aqueductum nouella adhuc, circiter tria ac triginta cubita misit cum simul & copiam alimenti, & loci liberale spacium adepta fuisset. Ficum (ut ita loquar) longissimam radicem habere putaueris: ad summam, quae raro corpore sint, rectamque agant radicem, longius mittunt: & nouae, si ad uigorem aetatis suae perueniant, magis quam ueteres, longitudine, altitudineque radices fulciantur: quippe cum etiam radices una cum reliquo corpore diminui soleant. Succiperit omnium radicem insuauiores, quam fructus sui habent: quarundam etiam penitus ferre insuaves: quam ob rem sunt, quae radicem fortiter amaram, quamquam fructus ipsa praedulces partant.

Qualitas radices iridis, & ficus Indicae, & lupini uis.

Cap. XIII



Edicatae nonnullae, odoratae aliae, ceu iridis: natura, uisque peculiaris radices sico Indicae. Illa enim a germinibus mittitur, quatenus se sico pariter coniunxerit, tellurique tunc inhaerescit. Fit itaque circum arboris frons, quens radicum concursus, qui caudicem nequaquam attingit, sed ab eo paulo distat: huic simile, uel potius quodammodo mirabilis, si quid ex folijs radicem dimittat, qualem circa Opuntiam herbulam esse quandam enarrarunt, cui datam est, ut & mandis sua uitate possit. Quod enim lupinus inspicit, minus mirum, ut si sub alta serantur materia, radices obfidentes summum uersus terrae perferant, ualenterque germina edant. Radicum differentias istis conspiciari ipsis debemus.

Quae arbores enodes, quae nodosae, qualitas nodorum, ceci, rodi, crataegi, gongri.


Cap. XIII




Rborum autem uel tales differentiae capi possunt: sunt enim aliae nodosae, aliae enodes, tam natura quam loco, plus minus uel: enodes inquam, non ut nodo omnino careant (talis enim arbor nulla esse uidetur) sed si quid eiusmodi sit, locum inter alia obtinet, ceu iuncus, tithys, gladiolus: ad summam, si quid inter palustria sit: sed ita enodes accipio uolo, ut nodos paucos naturae ordine habeant, qualis sambucus, laurus, ficus: denique omnia quibus cortex leuis, quae uel concauo & laxo corpore surgunt: nodosae, olea, pinaster, oleaster. Horum alia in umbrosis, & a uento silentibus, & dilutis locis: alia in apricis, & hybernis, & gelidis, & macris, & aridis: nam inter eas, quae genus interfortissimum, quaedam minus nodosae: ad summam, montanae campestribus, & siccae palustribus nodosiores. Item ratione fatus, etenim crebrae enodes, atque procerae, rariore nodosiores, contortioresque assurgunt: fit enim ut alterae sint in umbrosis, alterae in apricis. Mares quoque foeminis nodosiores, ubi sexus haberi uterque potest, ut cupressus, abies, ostris cornus: genus enim quoddam, cornum foeminam accipio. Syluestres nodosiores urbanis, tam simpliciter, quam quae sub eodem genere statuuntur, ut oleaster, olea: caprificus, sico: pirus, pirastro: haec namque omnes nodosiores, omnes spissae, raris corpore magna ex parte nodosiores: mares enim, syluestresque spissiores, praeterquam si qua ob nimiam spissitatem omnino enodis sit, aut paucissimis nodis, ut buxus, ut celis. Quibusdam nodi inordinati, utque forte euenit: quibusdam ordinati tam interuallo quam numero, ut retulimus: ob id eas egregias uocant: quibusdam enim paritas ferre undique seruatur: quibusdam assidue grandius, quod crassiori adiacet parti, idque pro ratione, quod in oleastris & harundinibus praecipue patet: geniculum enim, ueluti nodus

ei nodus est: quidam inuicem respondent, ut oleastrorū: quidā promiscui, utq̃ fors-
tulic, extant. Sunt quædā binis, quædā ternis, quædā pluribus nodis, nonnullæ quæ-
nis. Abietis recti, & nodi, & rami quodammodo infixi, ceteris aut minime: quāmob-
rem abies ualidissima est. Mālo profectō nodi peculiāres, faciēbus enim belluarū si-
miles extant: unus pregrandis, alij circa eum parui complures. Nodorū alij cæci, alij
foecūdi. Cæcos appello, quibus nullū germen enasci potest: qui non solū natura, sed
etiam lēione fieri solent, cum pars arboris ictu aliquo disiecta, ad uulnus consolidan-
dum enitens, oris undiq̃ plagæ circumactis, callo cicatriceq̃ tumuerit: crassioribus
ramis id potissimū euenit, nonnuncq̃ etiam caudicibus: ad summā, quāmcunq̃ par-
tem caudicis, aut rami incideris, uel disiceris, nodus ibidem nascitur: tanq̃ si quod
unum est dirimens, alterū principiū facias: siue ob eam ipsam lēionē, siue ob aliam
causam: ictus enim naturæ contrarius est. Ramuli omnīū nodosiores semper uiden-
tur, quia minimū ijs internodiū interiacet: quædāmodū sculnei, qui nuper prouene-
rint, tactu asperrimi sunt, & uitis palmitū summitates: ut enim nodus in cæteris, ita
gemma in uite, & geniculum in harundine. Quibusdā ueluti cradæ gignuntur, ceu
ulmo, robori, & præcipue platano: quæ si in asperis, aridis, uentosisq̃ locis stent, ita
omnino fiat necesse est: deniq̃, qui proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput
concreuerit, hic senescens, crassior redditur. Nonnullæ gongros à quibusdā uoca-
tos habent, uel quod pro arboris natura respondeat, ut olea: quippe cum nomē id
maxime oleæ conueniat, eoq̃ morbo plus, q̃ cætera laborare uideat: premium id
nonnulli appellant, alij crotonā, alij alio noīe utuntur. Rectis unistripibus, minusq̃
ab imis plantigeris, id aut nullo pacto, aut minus accidere solet. Olea, & oleaster, uel
caudicum concauitates peculiārem in modum habere uidentur.

Que longe & ramosæ arbori. Cap. XIII

 Vnt igitur aliæ ad longitudinē tantum aptæ potissime augeri, ut abies,
palma, cupressus: ad summā, quæ simpliciore assurgunt caudice, quæq̃
haud multis radicibus, neq̃ ramis frequētibz patent: aliæ pro sua na-
tura his ipsis respondent, tam longitudine, quā profunditate: non-
nullæ illico in ramos spargunt, ceu mālus: quædā ramosæ, molemq̃ su-
periore grandiorē gestantes, ut punica. Veruntamen ad singula, & locus, & ali-
mentum, & cultus, plurimū ualet: indicium, quod eædem, si crebræ serantur, excel-
sæ, gracilesq̃ reddent: si raræ, breuiorē atq̃ crassiores: & si confestim ramos succi-
das, purgesq̃, excelsæ ut uitis: si relinquo, breues assurgent. Quinetiam illud fidē
satis præstare potest, olerum enim nonnulla arboris figurā capessunt, ceu malua be-
taq̃ (ut dictum iam est) omnia locis suis melius augecunt: nam & inter ea, quæ ge-
nus idem sortiunt, quæ suis in locis manent, enodiora, ampliora, pulchrioraq̃ ex-
tant, ut abies macedonica præstātor, quā parnasia, cæteraq̃ spectatur. Quæ qui-
dem omnia, atq̃ in totum syluestris materies pulchrior, & cōmodior, & copiosior
parte montis aquilonia, quā meridiana enascitur. Aliæ item perpetuō uiuent, aliæ
folijs deciduis sunt.

Que semper uiuant, & quibus folia decidant, ut platani in Creta, & quercus Sybari. Cap. XV

 Irent ex urbanis perpetuō, olea, palma, laurus, myrtus, pini genus
quoddam, cupressus: ex syluestribz, abies, pinafter, iuniperus, simlax,
thuta, & ea, quā Arcades phellodryn appellant, elia, cedrus, picea, my-
rica, buxus, ilex; aquifolia, celastrus, phillyra, acuta spina, apharca, quæ
monte Olympo proueniūt, potulaca, arbutus, terebinthus, laurus. Potulaca, atque
unedo folia inferiora dimittunt, cacuminibus perpetuō uiuent, ramisq̃ assidue præ-
b 2

postero gignunt. Hęc in arborum genere. Fruticum autē, edera, rubus, harundo, rhamnos, cedrula: est enim quiddā pusillum, quod nunq̃ arborescit. Suffruticū, herbarumq̃, ruta, brassica, rosa, uiola, abrotonum, sanficum, serpyllus, origanū, apiū, equapium, papauer, & syluestriū genera complura. Ex his quoq̃ nō ulla cacumina perdurant, amissis reliquis, ut apium, equapiū, origanum: nam & ruta affligitur, atq̃ mutatur. Omnia uero tam in his, q̃ in reliquis generibus, quæ coma perpetua uiuent, folijs angustioribus sunt, & pinguedinem quandā, suauemq̃ olentiam reddunt: nō ulla quanq̃ sua natura semper uiuere nequeant, tamen ex loci causā, folia nunq̃ dimittunt, ut dictū de his est, quæ in agro elephantino, Memphiq̃ proueniunt. At qui inferius ea parte, quam delta, à triquetra figura uocant, parum intercipit temporis, quin perpetuō uiuant. In Creta insula, agro Cortynensi, platanum apud fontem quendā stare asseuerant, quæ nunq̃ folia deperdit. Iouem sub ea cum Europa concubuisse fabulant. Quercus in agro Thurio est, ubi Sybaris perspicua, quæ nunq̃ folia dimittit: eam non unā cum alijs germinare aiunt, sed post ortum caniculę. Talem & in Cypro esse platanū fertur. Omibus autumno, & per autumnum folia decidunt: alijs tamen ocyus, alijs tardius, ut quædā etiā ab hyeme occupent. Foliorum iactura non ita germinationi respondet, ut quæ prius germinauerint, prius folia dimittant: sed nō ulla germinant quidē præmaturius, sed nihilo ante cæteras folia dimittunt. Quinimō quibusdam tardiores inceptant, ceu amygdala. Quædam serotinæ germinare esse solent, sed nihilo (ut ita dixerim) tardius, q̃ cæteræ, folia deperdunt, ut morus. Regio autē solumq̃ madidū plurimum ad perdurandū conferre uidetur: quæ enim in siccis, atq̃ in totum tenuibus locis extant, prius folia dimittunt: & ueteres prius quam nouæ: quædā & ante quā fructū præcoquant, folia deperdunt, ut serotinæ fici, & piri syluestres. Illis, quæ perpetuō uiuent, occasus, ortusq̃ uicissim occurrunt. Non enim semper eadem durant, sed alia proueniunt, alia exarescunt: idq̃ circa æstiuum solstitiū maxime factitari uidetur. An quibusdam etiā post Arcturi ortum, aut secus, in aliqua regione fiat, considerandum relinquo. Foliorum occasus ita se habet.

De foliorum differentia & figura: de lauro Alexandrina.

Cap. XVI



Folia uero in cæteris omnibus arboribus sibi ipsa similia sunt: populi autem, atq̃ edera, eiusq̃ qui croton uocatur, dissimilia, figurāq̃ diuersa habentur: noua enim orbiculantur, ueterata in angulum exeunt: inq̃ id omniū mutatio desinit. At edera contra: dum enim noua est, angustiora folia gerit: cum autem ætate prouecta fuerit, rotunda: nam ea quoq̃ apta est folijs immutari. Illud sanē peculiare, quod olea, tiliæ, ulmo, populo euenire uidetur: uertunt enim partes supinas mox post solstitiū æstiuum: eoq̃ argumento rustici solstitiū confectū intelligunt. Omnia folia parte prona, supinaq̃ inter se distant: ac cæterorū pars supina uiridior, atq̃ leuior est: neruulos enim, & uenas in pronis habent, sicut manus. Oleaginosū uero pars ea ipsa candidior, minusq̃ leuis: edera quoq̃ frondes leues parte superna habet. Omnia, aut certe plurima parte supina, perspicua pendent, eaq̃ Soli exponunt, uertunturq̃ magna ex parte solem uersus: quapropter haud facile dixeris, utra pars potius ad ramulum uergat: quippe cum resupinatio quidē partem proximiorē pronam reddat, natura uero nō minus supinā uelle uideatur, præsertim cum reflexus Solis causa fiat. Facile id spectari in ijs potest, quæ crebra, ordinataq̃ sunt, quemadmodū myrti. Nonnulli & alimentū parti supinæ per pronā deferri existimāt, quia mada semper, lanuginosaq̃ est. Sed non rectē, id enim absq̃ natura propria fortasse contigit, quia nō simili modo alterant. Alimentū uero per uenas aut neruos, æque ambabus deferri partibus.

Ex altera

Ex altera enim ad alteram deferri nulla ratio est, cum meatus non habeat, neque ima quæ subeat. Sed de alimento, quibus tandem ministrantibus offeratur, altera disputatio esse debet. Folia uero pluribus ipsa quoque differentijs inter se distare uidentur: quippe cum arborum alijs ampla sint, ut uiti, fico, platano: alijs angusta, ut oleæ, punice, myrti: alijs rara, ut pino, abieti, cedro: alijs ueluti carnosæ, scilicet quia pulpa constant, ut cupresso, myricæ, mælo: & in fruticum genere, cneoro, stibæ: & herbarum, semperuiuæ, polio, quod contra uermiculos noxios uestimentis interpositum ualet: nam betarum folia, aut brassicarum, earumque, quas rutulas uocant, alio modo carnosæ sunt: caro enim in altitudinem distenditur, non in rotunditatem
10 crassatur. Myricæ inter frutices, folium carnosum: nonnullis harundinaceæ, ut palmaræ, coici, cæterisque similibus, quæ (ut in uniuersum loquar) folijs angularibus constant. Etenim harundo, gladiolus, butomus, cæteraque palustria, folijs eiusmodi sunt. Cuncta autem folia, quasi ex duobus constare uidentur, mediumque ueluti carinam habere, unde & cæteris meatus medius amplius porrigatur. Differunt item figura: alia enim orbiculata, ut piri: alia oblonga, ut mæli: alia in acutum producta, & in angulum depressa, ut edere Ciliicæ. Ad hæc alia multifida, & quasi ferrata, ut abietis, filicis: uitis quoque aliquatenus fissæ, fici laciniatæ, & (ut ita dixerim) cruciformia: nonnulla insecta, ut ulmi, roboris, nucisque auellane: quædam cum extremo, tum lateribus sinuata concidunt, ut filicis, roboris, smilacis, rubi, paliuri, aliorumque:
15 pini quoque, laricis, abietis, atque etiam cedri, & cedriæ extremitate pungentia. Quod spinas omnino pro folijs habeat, nullum inter arbores est, quod nos quidem nouerimus: at in genere materiæ humilis, spinæ pro folijs, acorne, drypidi, acano, omnique penè generi spinoso: his enim omnibus loco folij, spina oritur. Quod si quis folia hæc esse negauerit, carere folijs ea omnino sequetur, ut quædam aculeata quidem sint, folium uero habeant nullum, ceu asparagus. Rursum alia pediculo carent, ut scyllæ, bulbæ alia habent. & alia longum, ceu uitis, edere: alia breuem, ut quasi infixæ cohaereant, ceu oleæ, non sicuti platani, & uitis propendentia, atque tremula. Illud quoque differentiam facit, quod non ex eisdem partibus pendeant, sed plurimis quidem ex germine, nonnullis uero ex ramo, robori etiam ex caudice.
20 Oleribus ex maiore parte folia silico ab radice exeunt, ut cepæ, allio, intubo erratico: ad hæc hastulæ regix, scyllæ, bulbo, isirinchio: atque in totum bulbosus, quorum non solum, quod primum oritur, uerum etiam caulis omnino sine folijs est. Quorundam enim folijs iam perfectis caulis conuenienter talis assurgit, ut lactuæ, ocyimi, apij, & frumentorum. Simili modo nonnulla ex his caulem primo mittem, post horridulum spinulis gerunt, ut lactuca, & cuncta folia spinosa redduntur: atque etiam magis in fruticum genere, ut rubus paliurus. Omnium autem pariter arborum, atque reliquorum differentia publica, quod alia multis folijs, alia paucis constant: & alia latis, alia angustis: & alia ordinatis, ut myrtus, alia inordinatis, utque forte inciderit, ut maior penè pars cæterarum plantarum. Peculiare in oleribus, ceu cepa, 25 gethyo, foliorum concauitas. Ad summam, foliorum discrimen, aut magnitudine, aut multitudine, aut figura, aut latitudine, aut angustia, aut cauitate, aut asperitate, aut leuitate, aut quod aculeis horrent, uel non. Ad hæc dependentia, unde, quod: unde, id est, ab radice, aut germine, aut caule, aut ramo: quo, id est, pediculo, aut sine ne ipsos: cuius etiam generis complura spectantur: fructiferisque nonnulla fructum folijs intercepta gerentia, ut laurus Alexandrina, quæ fructum super folijs gignit. Foliorum differentias iam communius diximus, hisque penè continentur.

Ex quibus consistens folia, et pediculi qualitas, et distinctio fructuum.

Cap. XVII



Constant autem foliorum alia ex nervo, & cortice, & carne: ut fici, & ut
tis: alia quasi ex nervo tantum, ut harundinis, frumenti. Humor com-
munis omnium est: omnibus enim inest, tam his, quam reliquis annu-
is, ceu pediculo, flori, fructui, quicquid aliud ueniat: uel potius & ijs,
quæ minus annua sunt: nihil enim est, quod careat humore. Pediculo
rum alij ex nervo consistere tantum uidentur, ut harundinis, frumenti: alij ex eisdem,
quibus caules. Florum alij ex cortice, & uena, & carne: alij ex carne tantum, ut qui
inter lola nascuntur. Fructus quoque simili modo: alij enim ex carne & nervo, alij
ex carne tantum, nonnulli etiam cute constant. Humor hos quoque omnes comi-
tatur: ex carne & nervo, ceu prunorum, cucumerum: ex humore & cute, mori, pu-
nicæ. Alij secus distinguuntur. Omnium (ut sic dixerim) pars exterior, cortex: inte-
rior, caro: quorundam etiam nucleus.

Semina arborum, et quæ semina congesta, et quæ discreta. De siliqua,
hoc est sicut ægyptia. Cap. XVIII



Ostremum in omnibus semen est: hoc humorem, caloremque insitum
in se habet: qui cum desierint, semen infecundum, sicut urinum ourum
relinquitur. Quorundam semen protinus post tegmen ambiens sub-
est, ut palmæ, nucis, amygdalæ, quibus ambiens plura unq; sunt, ceu
palmæ: quibusdam caro & nucleus interiacent, ut oleæ, pruni, alio-
rumque. Alia siliquis includuntur, alia folliculis uestiuntur, alia uasculis continentur:
quædam etiam nuda patent in siliquis annua, ut legumina, & sylvestrium pleraque.
Quin & arborum quædam, ceu siliqua, quam ficum ægyptiam quidam appellant:
& cercis, & coleræ circa Liparam: in folliculo ex annuis quædam, ut triticum, mili-
um. Simili modo uasculo inclusa, & nuda: in uasculo, ut papauer, quæque papaueri
similia: nam sesamæ modus quidam peculiaris. Nudo semine olerum pleraque, ut
anetum, coriannifum, cuminum, feniculus, pleraque alia. Arborum nulla semine
nudo, sed aut carne obducto, aut cute, aut crusta, ceu glans & uiboicum: aut ligno,
ceus amygdala & nux. Nullum in uasculo semen arboris est, nisi conum uasculum
dixeris, quod absolui de fructibus potest. Semina ipsa quibusdam protinus carno-
sa, ceu illa, quæ nucum, & glandium genere comprehenduntur. Quibusdam caro
in nucleis est, ceu oliuæ, lauro, & alijs. Non desunt, quibus in nucleis tantum, uel nu-
cleacea, & quasi retorrída consistent, ceu cnico, & similibus: necnon & multis oleri-
bus, palmæ profecto euidentissima: cavitatem enim nullam hæc habent, sed tota ple-
na, atque perfolida sunt: tamen his quoque humor quidam, calorque inest, ut di-
ctum est. Differunt præterea, quod alia congesta, atque promiscua: alia discreta, at-
que distantia, ut cucurbitæ, cucumeris: & in arborum genere, fici, mali. Quin & con-
gestorum ipsorum quædam putamine aliquo, aut tunica continentur, ut punicæ,
mali, piri, uiris, fici: quædam congesta quidem, sed nullo inclusa, ut eorum, quæ spi-
cam inter annua gerunt: nisi quis spicam ipsam ambiens quoddam esse putauerit.
Quod si ita sit, racemus quoque ita se habebit, ut reliqua, quæ racemata æduntur,
quæque uniuersa ob fertilitatem, uirtutemque soli prodeant: quemadmodum Syriæ,
alijsque locis oleas fructificare affirmant. Quin etiam illud pro differentia quadam ac-
cipi posse uidetur, quod alia uno pediculo, singularique annuæ congesta gignun-
tur, ut de rateis, spicisque diximus, nullo ambiente communi tegmine proveni-
re: alia secus. Nam unumquodque semen, aut ambiens, seorsum acceptum, princi-
pium annexus proprium habere uidetur, ut acini, tum uicæ, tum punici. Item triti-
cum, ordæum, malorum, pirorumque, ubinam coniungantur, comprehendantur
que

que, uelut membrana quadam, quam caro fructus obducit, minus perceiveris, tamē uel eorum quodque principium habet proprium, & naturam distinctam: sed punici idcirco euidentissima, quod expressius discernuntur: nucleus enim cuique adhæret: nec quemadmodum ficum incerta, præ nimio suo humore conculcatur. Hoc enim inter se distant: quanquam utraque carne quadam, & eo, quod carnem cum cæteris comprehendit, continetur. Hæc enim circa nucleū unumquodque, carnosum illum habent humorem, Granum uero ficarium commune quasi omnibus est, sicuti & uinaeum, & quæ his similia. Sed eiusmodi differentias plures capere fortasse possumus, quarum præcipuas, maximèque naturales, haud ignorare oportet. Quæ autem pro saporibus, figuris, toris que formis accipi possint, omnibus fermè exploratæ habentur, ut explanatione nulla indigeant, nisi tantum adusque quod fructus figura nulla rectilineus, neque angularis.

De succorum, odorumq; differentia. Cap. XIX



Vccorum uero alij uinosi, ceu uitis, mori, myrti: alij pingues, ut oleæ, lauri, nucis, amygdalæ, pini, laricis, abietis: alij dulces, ut fici, palmæ, roboris, glandis: alij acres, ut origani, satureiæ, nasturtij, sinapis: alij amari, ut absinthij, fellis terræ. Odore præterea distant, ut aneti, cedrutæ. Quorundam dilutos putaueris, ut prunorum: alij acidi, ut puniceorum, & quorundam malorum. Sed omnes, qui uel huic generi contribuantur, uinosos putandum: alij alijs generibus assignantur, quorum singulos in libro de saporibus persequemur, tam genera ipsa numero amplectentes, quam eorum inuicem differentias reddentes, quæque uis cuiusque, naturæque sit. Arborum quoque ipsarum humor, uti retulimus, uarijs generibus consummari uidetur: alius enim succo lacteo similis, ut fici, papaueris: alius resinaceus, ut abietis, pini, omniumque coniferarum: alius aquosus, ut uitis, piri, mali: & in oleum genere cucumeris, cucurbitæ, lactuæ. Nonnulli acrimoniam quandam sortiuntur, ceu thymi, satureiæ. Quisdam etiam suauem olentiam præstant, ut apij, aneti, feniculi, reliquorumque similia. Omnes (ut absolute loquar) pro natura cuiusque arboris (utque in uniuersum transigam) plantæ, propriam differentiam sibi sortiuntur. Quippe unumquodque, temperamentum quoddam, missionemque obtinet peculiarem, quæ scilicet fructibus subiectis conueniat: quorum pluribus quædā similitudo innotescit, quamquam incertior, sensusque dubia: scilicet ea de causa, quod saporis natura, puram, sinceramque confectionem, concoctionemque in carne fructus consequitur. Alterum enim, quasi materiam, alterum quasi formam, speciemque arbitremur oportet. Semina quoque ipsa, & tunica, quibus uestiuntur, saporum discrimine inter se distant. Vtq; simpliciter loquar, uniuersæ arborū, plantarumq; partes, ut radix, caulis, ramus, folium, fructus, cognationem quandam habere tota cum natura uidentur: quanquam odore, saporeq; differant: ut partium plantæ eiusdem, aliæ odoratæ, & bene sapidæ sint: aliæ inodoratæ, insipidæq; omnino.

De odoribus florum, & foliorum, & radicum, quorūq; genera humor arborum habeat, deq; folijs, & fructu tilie.

Cap. XX



Vibusdā enim flores inodorati, folia uero odorata: quibusdā ē diuerso folia magis & ramī, ut coronario generi: quibusdā fructus: alijs neutrum, alijs radix, alijs pars aliqua. Similis & saporis ratio est: alia etenim mandī queunt, alia nequeūt. Neq; folijs, neq; fructibus peculiare præcipue, quod in tilia cernimus: nam huius folia prædulcia, & plerisq; ani

maliū pabulo: fructus uero mandī a nullo potest: e contrario nancq̃ nū mirū, ut folia non mandant. Fructus uero non tantū a nobis, sed etiam ab alijs animalibus mandī possint. Sed huius, ceterorumq̃ similium causas postea contemplari conabimur.

Florum genera & differentie.

Cap. XXI



Vnc exploratū illud habeamus, per omnes partes differentias plures uariis modo exultare: nam & florū, alij lanuginei, ut uitis, mori, edere; alij foliati, ut amygdalæ, māl, piri, pruni. Item alij grandes habent: oleaginei uero foliati quidē, sed pusilli: pari modo & annuorū, herbaceorūq̃ genere, alij foliati, alij lanuginei. Cunctorū, alij bicolores, alij unicolores, idemq̃ candidi: quippe cum tantū serē punicæ phœniceus, & quarundā amygdalarū sub ruffis exeat. Nulla inter urbanas alia est flore uel bicolore, uel pleno: sed si qua sit, syluestris profectō est, ceu abies: flos enim eius croceus, & illi, quos in mari externo, rosas colore similes tradūt. At in annuorum ex maiori penē parte tales exeunt, & bicolores, & binē: bini inquam, quod in flore alterum florem insidentem mediū gerunt, ut rosa, uiola nigra, liliū: nonnulli etiā folio uno emergunt, descriptionem tantum plurium ostendentes, ut flos iasione: in hoc enim haudquāq̃ folium unumquodq̃ discernitur: nec conceptaculo pars infima eget, sed postremo in angulos exeunt. Oleæ quoq̃ flos penē talis esse uidetur.

Qualis floresem uitis, olea, rosa, mālī medicæ, & punicæ flos.

Cap. XXII



Differunt etiā ortu & positu: alia nancq̃ florem circa fructū ipsum producunt, ut uitis, olea: cuius prostrati flosculi perforati spectant, idē argumentō capitur propē arborē defloruisse: nam si exaruerint, aut madefacti fuerint, unā cum fructibus defluent, atq̃ ita nullatenus perforabuntur. Maior serē pars, fructum in medio floris tenet. Sed non defunt, quæ uel super fructū ipsum florem insidentē emittant, ut punica, mālus, amerina, prunus, myrtus: & in fruticū genere, rosa, maiorq̃ pars coronariarum: semen enim sub floribus habent: sed conspicuū id in rosa, quia extuberat. Nōnulla etiā cum seminibus ipsis flores ædunt, ut ueneria, cnicū, atq̃ omīa quæ florem folio numero so producunt: singulis enim seminibus, singulos flores annexos gerunt. Simili modo & herbaceorū nōnulla, ut gihi: & in olerū genere, pepo, cucurbita, cucumis: quippe omnibus flos in postremo fructus, & crescentibus fructibus, flos diu infixus seruatur: alia secus, modo quodā peculiari, ceu edera, morus: etenim florē hæc in totis fructibus habent: sed neq̃ postremis insidentē, neq̃ in singulas partes ambientem, in medijs inculcatū: nisi fortē concerni nequeat propter lanuginē. Sunt & simplices quidam flores, ceu cucumerum, qui postremis samentorum emergunt: ob id eos auferunt: cucumeris enim prohibent incrementum. Inter flores mālī medicæ, qui ueluti colum quandam erectam in medio habeant, fecundos hos fore affirmant: qui uero non habeant, hos fore infecundos. An alijs quoque floriferis eueniat, ut florem sterilem gignant, siue separatim, siue non separatim, prætermitti non debet. Etenim genus quoddam, & uitis, & punicæ, fructum perficere nequit, sed ad florem usque generatio tantum peruenit. Flos quoque punicæ copiosus, crebërque est. Denique amplitudinem sui quodammodo pomi æmulatur: parum se subitus attollens colligit, & ambitu congruo sinuatim reddit. Plantarum, quibus genus cōmune, alias florere, alias nullo flore exhalari quidam affirmant, ut palmarum marem florere, foeminam minime, sed protinus fructum promere: igitur quæ genus

genus idem sortiunt, id differentię obtinent: sicuti & omnia, quę fructu perficere nequeunt. Floris naturam plerasq; differentias habere, satis his liquet.

Quomodo distent in fructificando arbores.

Cap. XXXIII



Arbores autē uel hisce in fructificādo distare uident: nancq; alię fructū ex nouellis surculis gignunt, alię ex annotinis, alię de utrisq;. Ex nouellis, ficus & uitis: ex annotinis, olea, punica, mālus, amygdala, pirus, myrtus, omnesq; ferē similes: omnes enim ex annotinis. At si contin-
gat ut aliquid condipiant atq; floreat (euenit enim id quoq; nōnullis,
10 ceu myrto, ut sic dixerim: pręcipue cum germinaf post Arcturi exortū) id perficere nequeunt, sed semiconditū perit. Ex utrisq;, tam nouellis q̃ annotinis, si quę māli bis ferę sint, aut si aliquid bis fructificet. Item caprificus, quę maturat, ficusq; profert ex nouellis. Peculiaris maxime ortus, si quis fructus caudici profiliat, ut moro ægyptię. Hanc em̃ ex caudice ferre nōnulli affirmāt: alij grandibus ex ramis eam fructificare, sicuti & siliquam dicūt. Hęc enim fructū uel ex his product, nō tamē copiosum, Vocant enim siliquā, quę ficus ægyptias appellatas, producit. Arborū item alię cacumimbus fructificāt, alię lateribus, alię parte utraq;: sed plura ex alijs fructū cacumine ferunt, q̃ ex arboribus, ut frumentorū, quę spicam pariunt. Fructū, erica, pira, amerina. Olerū, quibus radix capitata. Parte aut utraq;, tam arborū quādā, q̃
10 olerum, blitum, attriplex, brassica: nam & olea idem quodāmodo facit. Cumq; cacumina ferunt, copię indicium esse dicitur. Palma quoq; fructū quodāmodo cacumine gignit: sed hęc & folia, & germina, cacumine gerit: quippe uis eius genitalis parte superiori tota consistit. Igitur differentiās quas particulatim capere decet, his contemplari contemur. Illę uero naturę totius esse uident, scilicet quod plantarū alię urbanaę, alię syluestres, & alię fructifere, alię steriles & perpetuō uiuentes, & folia deperdētes, quemadmodū diximus. Quędā etiam in totū folijs carent, & alię florū succidę, alię in succidę: & alię germine uel fructu p̃coces, alię serotinę. Pari modo & reliqua his similia persequendū, & hęc quidē in partibus, aut nō sine partibus esse cōstat. Illa uero propria maxime, & quodāmodo maxima differentiā, quę uel in animalium genere patet, quod alię aquatiles, alię terrenę. Plantarū enim genus quoddā eiusmodi est, ut nisi in solo madente nasci minime possit. Quędā nascunt quidē, sed non similes, sed longe deteriores. Cunctarū aut arborū plantarūq;, ut rem absolute contingamus, species in quoq; genere plures: quippe cum nihil ferē simplex sit,

Replicantur differentię plantarum.

Cap. XXXIIII



Ed quę urbanaę aut syluestres dicunt, hanc ipsam euidentissimā, summamq; differentiā habeant, ut ficus, caprificus: olea, oleaster: pirus, piraster: pinus, pinaſter. Quę uero in alterutro illorū genere collocent, harum differentiā fructibus, folijs, ceterisq; formis, partibusq; percipitur. Sed syluestriū plurimę noīe carent, exp̃ticip perpauci sunt: urbanař aut plurimę noīe suo noscunt, sensusq; earū cōmunior: Exempli gratia, uitis, fici, punice, māli, piri, lauri, myrti, reliquarūq;. Facit em̃ usus cōmunis, ut exploratę differentię habeant. Illud quoq; utroq; in genere propriū: syluestres em̃ mare, aut scemina, uel solis, uel p̃cipue discernunt: sed urbanaę generibus certe pluribus constant: quorū alia inuentu, numeroq; facilia: alia difficilia, scilicet causa uarietatis. Sed partiū, reliquarūq; naturarū differentiās hisce cōtemplari tērandū. De generationibus aut post hęc referre cōgruū est: id em̃ p̃dicta quasi de cetero consecrari uidet.

De modo generationis, sationisq; in arboribus.

CAPVT I



ARBORVM, & summatim plantarum generationes, aut sponte, aut semine, aut radice, aut auulsione, aut ramo, aut surculo, aut ipso trunco faciunt, aut etiam ligno minutatim conciso: nam eo quoque modo planta exoritur. Sed principatum in his spontanea obtinent. Quæ uero semine, radiceq; fieri solent, naturales maxime, inter reliquas esse appareant: nam ipsæ quoq; spontaneæ quodammodo sunt, & syluestrium ob id generi accommodantur. Reliquæ autem hominū artū, aut electui pertinent. Singula igitur modo ex prædictis aliquo erumpunt, sed pars maior pluribus sanè modis procreatur. Olea enim omnibus prouenit rationibus, præterq; surculo: defixa enim nequit germen citare, ut ficus ex crada, & punica ex uirga. Quanc̃ nonnulli adminiculo quoq; defixam ad egeram, uitam egisse communem, factamq; arborem affirmant. Sed id raro: illud uero ex maiore parte à natura facitari uidemus. Ficus quoque omnibus modis emergit, præterq; ex ramo & surculo. Mâlus & pirus, raro ex ramis. Cæterū cuncta magna ex parte, his quoq; enasci contingit, modò leues, no-
uelli, facileq; auctiles petantur. Verū illi prouentus magis naturæ conueniunt. Cōtingens autem pro possibili accipi ratio est: quippe cum in totum, quæ ex supernis potius enascantur, paucissima sint: quemadmodū quæ ex palmitibus uitis proueniunt: ista enim nec ex prora, sed ex palmitibus exit, & si quid aliud eiusmodi annotetur, seu arbor, seu suffrutex: ut ruta, uiola, sisymbrium, serpyllus, elenium. Omnī itaq; communis maxime generatio, quæ auulsione, atq; semine fiat. Omnia uero, quæ semen ferunt, semine quoque gignuntur. Nasci & laurum ex auulsione affirmant, si quis sublati furculis serat: sed quod auellitur, radice, aut stipitis aliquid habere oportet. Fieri tamen potest, ut & absq; eo, tam punica, quā mâlus uerna exoritur. Amygdala quoq; fata exurgere potest. Sed plurimis serè modis uenire olea uidetur: nam ex trunco, ramo conciso, radice, ligno, uirga, item adminiculo, quemadmodū diximus. Myrtus inter cætera huic maxime similis: nam & ligno, & ramo prouenit. Ligna tam eius, q̃ oleæ, palmo minora diuidi haudquāq; oportet, neq; cortex detrahi debet. Arboreis modis prædictis exeunt, atq; con crescent: insitiones enim aut inoculationes, misturæ quædam, aut alio pacto generationes esse uidentur: de quibus postea dicemus.

Quomodo suffrutices herbe iterumq; arbores nascantur.

Cap. II



Vsfruticum autem, atq; herbarum pars maior semine, radiceq; nascitur, quædam etiam utroq;: nonnulla tamen ex germinibus, ut dictum tam est. Rosa & lilium, caulibus concisis, ut etiam gramen exeunt: caule quoq; toto propagato, rosa & lilium nascitur. Peculiaris maxime generatio, quæ ex lachryma fit: quippe lilium ita exire uidetur, cum id quod defluxit, sole exaruerit. Lachrymam quoque equapij uim eandem sortiri uolunt: etenim lachrymam id quoque emittit. Prouenit & quoddam harundinis genus, si quis in obliquum colos præcisas, simo, terræq; abscondat. Peculiare quoque in ijs, quæ radice capitata coherant, ut ex radice proueniant. Cum autem uis genitalis tot modis comprehendatur, arborum pars unique maior, quemadmodū paulò antè retulimus, pluribus modis apta est exoriri. Sunt tamen, quæ ex semine tantum nascantur.

nascantur, ut abies, pinus, larix, summatarum omnes coniferae, item palma: ni forte apud Babylonem e uirgis quoque proueniat, sicut nonnulli asseuerant. Cupressus ceteris quidem in locis semine prouenit, in Creta autem insula etiam truncus, ut montosa in Tarras. Apud hos enim cupressus caedua est, quae ex caesura germinat, modis omnibus praecisa: nam & ab terra, & parte media, & superna: nonnisi loci uel ex radiobus germinat, sed raro. De robore diuersa sententia est, quidam enim ex semine tantum eam produci statuerunt, alij ex radice quoque, sed lente: nonnulli etiam ipso caudice detruncato, a uulsioue, aut radice, nihil ex ijs, quae ab imis plantigera non sunt exoriri posse arbitrantur. Cunctorum autem, quorum generatio numerosior est, quae a uulsioue, atque etiam magis quae sobole perfici potest, ocyssima, & auctu perfacilis est, si ab radice soboles accipiantur: & quae sic, aut ullo pacto plantis ferantur, haec omnia fructus similes asferre uidentur.

Quamobrem degenerent interim satis, et quae non degenerent, sed meliores fiant quoque, et hoc in arboribus. Cap. III



Vae autem fructibus eorum, quae sic quoque proueniunt, satis sint, haec (ut ita loquar) omnia deteriora reddunt. Quaedam etiam omnino degenerant, ut uitis, malus, ficus, punica, pirus: quippe cum ex grano sicario nullum penitus genus procreetur, sed caprificus tantum, aut ficus syluestris erit.
 20 pit: colore etiam saepe numero discrepans, ex nigra enim candida, & ex candida nigra gignitur: ex uite quoque nobili, ignobilis, & saepe diuersa genere exit. Nonnumquam nil penitus urbanum, sed plane syluestre prouenit: & adeo quandoque, ut fructum perficere minime queat. Quaedam fructum ne compilare quidem ualent, sed ad florem usque tantummodo ueniunt. Nascentur ex nucleo quoque oleae, syluestris olea: ex acinis mali punici glaucis uilia exeunt, & ex enucleatis dura, & plerumque acida: eodem modo ex pira uiriatum pirastrum: ex malo tum deterius genere, tum acida ex dulci: & cotonea ex struthaea. Amygdala quoque degenerat, tum sapore, tum quod dura ex molli reddat. Idcirco ad uitam inserere, aut plantam saepius transferre praecipit. Quercus quoque deterior exit: itaque cum plerique ex ea, quae in Epyro nascitur, seruisent, nullo pacto prouenire similis potuit. Laurum, atque myrtum praestare interdum inquirunt, sed magna ex parte eas quoque degenerare, ne colorem quidem seruare, sed ex fructu rubro fieri nigrum, ut in Antandro. Plerumque cupressum quoque ex foemina, marem prouenire affirmant. Palma inter ea, quae semine exeunt, & pinus conifera, & picea, tineosa maxime (ut sic loquar) persistere in totum uidentur. Haec igitur inter ea, quae mansuescere patiuntur. Inter feroces autem plures genus suum seruare possunt, scilicet uirium portione, utpote cum natura ualidiores sint: contrarium enim haud probe putaueris, nullum scilicet posse in illo ordine degenerare, atque omnino inter eas, quae semine tantummodo exeunt, nisi quod cultura ualeat immutari. Loca quoque a locis differunt, et aer ab aere: quibusdam enim in locis regio similia proferre uidetur, ut etiam in Philip-
 40 pis: e contrario uero pauca, paucisque in locis mutantur, ut ex semine syluestri urbanum, aut ex deteriori absolute gignatur melius: id enim de punica tantum in Aegypto Ciliciaque euenire accepimus. Namque in Aegypto acidam tum semine, tum planta in dulcem quodammodo, aut uinolentam conuertit. Cilicie uero circa Solos, iuxta amnem Pinarum, quae contra Darium dimicatum est, omnes sine nucleo surgunt. Quod si quis etiam palmam nostratam in Babylone ferat, reddi fructiferam, & loci illius domesticis similem, consentaneum est. Eodem modo, & si qua alia tellus ad alium fructum ita se habet: etenim omni cura, culturaque exuberantior iste persistit: indicium quod ea quae aliorum inde transferuntur, pinus sterilescent: quaedam etiam germinis infaecunda omnino reddunt: quin & aliam, ac reliqua opera permutantur: & ut syluestres emiteantur, & urbanarum ipsarum

quædam neglectæ immiteſcant, ceu punica, amygdala. Quidã etiam ex ordeo, tritico: & ex tritico, ordeum gigni, eodemq; fundo id fieri aiunt: ſed hæc pro fabuloſis quibuſdã accipies. Quæ enim hunc in modum mutari poſſunt, ſponte ſanẽ mutari oportet. Diuerſitate autem regionis mutatio ſequitur, ut in Aegypto & Ciliciã de punica diximus nulla adhibita cultura. Eadem ratio ubi fructiſcæ ſterileſcant, ceu perſicum Aegypti, & palma in Græciã: & ſi quis eam, quæ in Creta inſula poſtulus nigra uocetur, tranſtulerit. Quidam & forbum ſterileſcere uolunt, ſi ad loca ſeruentia uenit: hæc enim ſua natura, frigida quærit. Vtrumque ex contrarietatibus accidere ratio eſt, ſiquidem nonnulla ſolo mutato, naſci omnino reuſent. Mutatio nes, pro ſoli natura, tales proſectò accidunt: pro ſatu autẽ, quæ de ſemine diximus. Nam & corũ, quæ ſemine ſeri poſſunt, numeroſa notatur mutatio. Punica & amygdala, cultura mutantur: punica, ſi ſimum ſuillum, aquarũq; fluentium copiam adpiſcatur: amygdala, ſi quis paxillum adigat, lachrymamq; deſluentem diutius auſerant, reliquumq; cultum impendat. Pari modo, quæ ex ſylueſtribus manueſcant, aut ex urbanis tranſeunt in ſylueſtres, quædã cultu, quædã autem neglectu mutantur: niſi quis non mutationes quidem illas, ſed clementia, ſive acceſſiones in melius, deteriusue putauerit. Neq; enim oleaſter, olea: nec pyraſter, pyrus: nec caprificus, ſi cui fieri poteſt: quod enim oleaſtro accidere dicunt, ut ſi ſurculos decidas, aut in totum tranſferas, germen oleagineũ proferat, magna quædam mutatio eſt. Sed hæc utro modo accipi debeant, niſil referat.

20

Oſtenta in arboribus. Cap. IIII



D hæc fortuitam quoq; mutationẽ fieri aiunt interdũ fructuum, nonnunq; arborum ſummatim ipſarum: quæ quidẽ aruſpices oſtenta eſſe exiſtimant: exempli gratia, punicũ acidum edere dulce, & dulce acidum: rurfus arbores ipſas, ut ex acida dulcis, & ex dulci acida ueniat: ſed deterius in acidum, q̃ in dulcem mutari. Item ex caprifico, ficum, & ex fico, caprificum: ſed de fico in caprificum deterius, & ex olea, oleaſtrum: & ex oleaſtro in uicem oleam, quod raro euenit. Rurfus ficum ex candida, nigram, & ex nigra candidam: pari etiam modo, ut ex uite. Ergo hæc tanq; prodigia, & præter naturæ normam accidere arbitrantur: ſolita uero, nullo pacto mirantur, ut quod in uite quam capneium uocant, cernitur: nam ex nigro racemo, candidũ, & ex candido, nigrum, hæc præſtat. Neq; enim aruſpices iſta interpretant, quoniam ne illa quidem, quæ ratione regionis mutari ſoleant, quemadmodũ punicam in Aegypto mutari propoſuimus: ſed hic ita fieri mirum, quoniã una tantum, aut duæ, & hæc raro per uniuerſum tempus mutantur. Et ſi aliquando ita ſit, in fructibus potiùs diſcrimen, q̃ in totis arboribus percipitur. Nam talis quoq; rei temeritas, fructibus nonnunq; contingit, ut ficus poma a uerſa ramulis ſerat, & punica, uitisq; caudice ſuo fructiſcent: ad hæc uitis fructum abſq; ſolijs produxit: olea, ſolijs amiſſis fructificauit, quod & Theſalo Piſiſtrati filio accidiffe proditũ eſt. Nonnunq; ratione hyemis, aut alias ob cauſas quædã accidunt, quæ normæ naturali incongrua iudicantur: cum tamen non ita ſit, ut olea penitus aliquando aduſta, reſurginauerat tota. Bæotiẽ uero germinibus omnibus à locuſtis deroſis, iterum germinauit. Sed hæc haudquaquẽ pro abſurdis animaduerti forſitan debent, quippe cum ad manifeſtas cauſas redigi poſſint. Sed potiùs, ſi non ex proprijs locis fructiſcent, aut non fructus proprios ſerãt, natura tota immutatur, ut diximus. Mutationes arborum tales adnotantur.

Quæ herba degenerent, melioreſcunt: Siſymbrium in mentem, triticum in ſolium, legumina coſtibilis, & incoſtibilis, & quo pacto craſſeſcant. Cap. V

Exre



X reliquis autem plātis, sisymbrium, nisi cultura coherceatur, in men-
 tam mutari uidetur. Quamobrem saepius id transferre cōsueuerunt.
 Triticum in lolium transit. Sed hæc in arborum genere, si ita sit, spon-
 te, fortuitoq; eueniunt. Annuis autem paratu quodam, & opera con-
 tingunt, ut tipha, semenq; mutari in triticum solent, si pista serantur:
 idq; non protinus, sed anno tertio. Quod similiter ferè fit, atq; cum semina ratione
 locorum permutantur. Nam ea quoque singulis in locis temporis spacio pari serè,
 atque tipha mutantur. Triticum quoq; syluestre, & ordeum, culta & mitigata per
 temporis tantundem mutantur, & hæc fieri mutatione loci, culturaq; uidentur.
 10 Nonnulla etiā utroq; modo. Quædam cultura tantum, ut legumina: ne incocti-
 bilia fiant, nitro pridie macerata ferere in sicca tellure, præcipiunt: lentem, ut crasse-
 scat, paxillo demittunt: cicer, ut grandescat cum putaminibus madefactū obseritur.
 Temporum quoque ratione semina immutantur, ut leuiora, facilioraq; reddantur:
 ut si eruum quis Vere serat, facile, gratumq; exit, non graue, quemadmodum si aut
 umno seratur. Fit & in oleribus culturæ causa mutatio, ut apium, si satum concu-
 cetur, cylindroq; spissetur, coæqueturq;, crispum inquit prouenire. Mutantur
 item, regione, tellureq; mutata, ut etiā cætera. Hæc esse omnium communia con-
 stat. An uero ob aliquam offensam, aut demptionem partis, arbor reddi infœcūda
 possit, quemadmodum animalia, prætermittendum non est. Ergo secundum red-
 20 ditam illam diuisionem, nihil ad plus minus ue ferèdum causa detrimenti notatur,
 sed aut totum perit, aut incolume perdurans fructificat. Senectia uero communis
 quædam corruptio generibus omnibus accidit: absurdum uero plantas sponte ori-
 ri, mutariq; appareat.

In animalium genere mutationes.

Cap. VI



Am In animalium genere potius huiusmodi fieri mutationes naturales,
 pluresq; profectio cernuntur. Quædam enim temporis ratione mutari
 uidetur, ut accipiter, upupa, & similes uolucres. Item pro locorum mu-
 tatione, ut coluber stagnis exiccatis marcescit. Euidētissima uero non-
 10 nulla cum in generatione consistunt: mutantur enim per animalia plura, ut cum ex
 tineæ eruca, tum ex ea papilio gignitur: inq; alijs pluribus hoc euenire notatum est:
 sed fortè id non absurdum, nec simile huic quod quærimus est.

De satu, & scrobibus, & radice, & positu arborū, & satione ficus.

Cap. VII



Erum ita arboribus summamq; omnibus terræ stirpibus euenit, ut
 antè iam dictū est, quò sponte germinetur facta mutatione quadam,
 ex ui aspectus coelestis, generationes, mutationesq; hisce cōtemplan-
 dum. Cum uero cultus, operaq; plurimum ualeat, atq; etiā magis
 satus magnas differētiās faciant, de his quoq; referre condecet, & pri-
 40 mo de satu. Ergo tempora antè exposuimus, quibus plantas quamprimum petere
 conueniat, & a solo simili eius quo ferendum statueris, aut etiā deteriore: scrobes
 uero tempore antè longissimo, atq; altius semper descendendum, etiā ijs, quæ telluri
 summae adherent. Radicem autem nullam altius descendere ternis semipedibus
 quidam uolunt: itaq; illorum cōsiliū improbant, qui altius ferunt, sed haudquaq;
 rectè id affirmasse in plerisq; uidentur. Nam si aut solum altum, aut regionem com-
 modam, aut etiā terram facilem nanciscatur, multo longiorem radicem impellunt,
 quæ scilicet apta sint stirpe alta adherere. Pīnum itaq; ueste soliditatē, quò transfer-
 retur, longiorem quā octo cubita radicē habere quidam uidisse retulit, quanquam
 non totam resosam, sed abruptam, Plantas, si fieri possit, corpore fibrato capi oportet.

ter: si minus, ex parte potius inferiore, quàm superiore assumes, præterq̃ in uite. Et fibratas in recto demittendum: at infibres, aut ad palmi magnitudinē, aut plus paulò sternendum. Quidam etiam fibratas ipsas sternendas præcipiunt. Positum quoq̃ obseruandum ex æquo, quem arbores nonnullæ habere, aut in aquilonem uersæ, aut in orientem, aut in meridiem. Plantas etiam ipsas uiutradices faciendum, quæ scilicet pati hoc ualeat: alias apud arbores ipsas, ut oleas, piro, malos, ficus: alias ex emptas, ut uites: quippe cum istæ apud parentem uiutradices minime effici possint. Si autem plantæ fibratæ, aut particula stipitis suffultæ, accipi nequeant, ut oleæ lignum subtile scindendum, & lapide interiecto ferendum. Pari modo & fici, & reliquarum. Seritur ficus, & si quis ramū uastiorē, ex acutū percutiat malleo, quoad super terram exiguum relinquat, ac deinde arena superiniecta operiat, easq̃ plantas meliores effici uolunt, quandiu nouellæ extant. Vitis quoq̃ satio similis cū palo feritur: palus enim ratione infirmitatis palmitem antecedit. Serūt hoc modo & puniceam, & alias arbores. Ficus, si iuxta scyllam seratur, ocyus crescit, minusq̃ a uerbis infestatur. Summatim, omne scyllæ appositum, facilius germinat, celeriusq̃ augetur. Quæ autem ex trunco, præcisæq̃ feratur, deorsum uersus sectura in uersa ferere oportet, nec palmo minora præcidere, ut retulimus, corticemq̃ minime detrahere. Seruntur autem ex his rami, quibus germinatibus, terram semper assidue accumulandum, quoad satis corroboretur. Hic oleæ, myrticq̃ satus proprius est: cæteri autē communius omnibus competunt. Ficus in radican-do præcipua & satio 20 qualibet maxime inter omnes arbores est. Puniceas, myrtos, lauros, crebras ferere, non plus, quàm nouenos pedes distantes, præcipiunt: malos distantiores paulò, piro amplius, & prunos: amygdalas, & ficos, multo amplius. Simili modo & punicea. Pro loci quoq̃ ratione interualla relinquendum: in montanis enim minora, quàm in campestribus: omnium autem (ut sic dicam) maximum, ut solum commodum, conueniensq̃ cuiq̃ tribuatur: tunc enim præcipue quodq̃ uiget. Vt autem absolute loquamur, oleæ, fico, utiq̃ solum campestre maxime competere statuunt: nucum autem, pomorumq̃ generi, radices montium. Nec inter ea, quibus genus commune est, solum accommodandum ignorare oportet. Vitium solo differentia maxime numero 30 mero sa est. Quot enim genera telluris, totidē & uitium esse quidam affirmant. Quæ cum secundū naturam feruntur, frugifere prodeunt: cum præter naturam, facile sterile scunt. Igitur hæc omnium quodammodo communia sunt.

Satus ex cultura palmarum: genera palmarum. Satio cæterarū arborum, cultus & opera. De simo, & finorū generibus. De puluere. Amygdalam ex amara dulcē fieri. Cap. VIII



Palmarum autem satus, cultusq̃ sequens, præter ceteros, peculiaris esse uidetur: Serunt enim ligna, quæ in fructibus insunt, bina iuxta, composita subter, binaq̃ superne colligantes: omnia prona: germen enim non de supinis, cauisq̃ paribus mittunt, ut quidam uolunt, sed e supernis. Quapropter in eorū coniunctione, quæ superponuntur, 40 minime effi operiendū principiā, unde germen. Plura autem simul ferūt, quoniam satio unius infirma est. Horum radices amplexu mutuo connectuntur: atq̃ illico primi ortus promiscui coalescunt, ut unus ex cunctis caudex cōficiatur. Satus ex seminibus talis fieri solet. Ex trunco autē palmæ ipsius, cum partem abstulerunt supernam, qua cerebrum includitur (auferunt autem cubitorum duorum longitudine) quam fissuris humore ipso detracto, defodiunt, solum arenosum, saluginosumq̃ concupiscit. Idcirco ubi tale non sit, agricolæ salem aspergunt: quod quidem circum radices facere haud quaquam oportet, sed longius amando accumulare quantū semifertarius. Quod talem appetat locum, illud quoq̃ arguemento capiunt

caplunt. Nam ubi palmarum copia sit, humus arenosa cōcernitur: quippe apud Babylonem qua palmæ nascuntur, sic esse aiunt. Quin & in Africa, & Aegypto, & Phœnicie, Syriæ quoq; cauæ cognominatæ, tribus tantū in locis arenaceis eas gigni, quæ conditi, referuariq; possint: reliquas autem, quæ cæteris in locis proueniunt, minime durare, sed protinus putrescere. Virides tamē suasu esse, gustuq; gratas, atq; ita consumi amant, & crebram rigationem. De simo diuersa sententia est: Quidam enim has simo delectari negāt, sed abhorreere omnino statuunt. Alij usum simi concedunt, clementumq; magnū capere eo affirmāt. Riuis tamen simum miseri oportere inquirunt: quemadmodum Rhodij facere solent. De hoc ita querendum amplius est: forsitan enim alij hoc modo, alij illo colere consueuere. Et simū ipsum cum aqua utilem, sine aqua non esse cōtingit. Cum autē anniculæ sunt, eas transferunt, & salem adiiciunt, & bimas iterum transferunt: etenim mutatione sedis uehementissime gaudēt. Transferūt quidam Vere, sed Babylonij circa sydus. Ad summam, pars maior eo tempore ferit, ut & proueniat, & crescat celerius. Nouellam minime tangunt, sed comas duntaxat religant, ut procera assurgat, nec uirgæ torqueantur. Post hæc deputāt, cum iam maiuscula sit, & crassitudinem habeat: tantū uirgæ relinquant, quantum magnitudo palmit: quandiu nouella sit, fructum nullo intus ligno producit: postea cum ligno quidam Syrios nullam adhibere culturam, sed purgare faciūt, atq; irrorare affirmant. Aquam scatulentē, potius quā pluriā eas quatere aiunt. Tale autē in conualle, qua palmaria sunt, exuberare, Conuallem istam, per Arabiam usq; ad rubrum tēdere mare, Syrios affirmare, ac plerosq; qui inde uenisse sent, referunt. Eius itaq; conualis parte cauiissima, palmas exoriri enarrant. Sed hæc utroq; modo forsitan fieri possunt: nā pro regionibus, sicut & arbores ipse uariant, Culturas quoq; inter sese distare, haud pro absurdo intelligi debet. Genera autem palmarū plura. Primū enim & quasi discrimine maximo, quod aliud fructiferum, aliud sterile, quo Babylonij lectos, & uasa conficiūt. Fructiferarum alie mares, alie foeminae. Intere est autē, quod mas primū super spatham floret, foemina fructum oblongum ilico praestat. Fructuum ipsorum differētiæ plures: alij nanc; sine ligno intus, alij cum ligno: & alij duro ligno, alij molli. Colore quoq; inter se discrepāt: alij enim candidi, alij nigri, alij flauit: ad summam, nō pauciores, quā siccorum colores, aut absolute genera statuunt. Ad hæc differre magnitudine figuraq; uolunt: quosdam enim in modum esse malorum, magnitudineq; tantos, ut quatuor tantum in spicam teneātur, alios minutos cicerum magnitudine. Saporibus plurimū differre inquirunt, sed optimū tam inter nigros, quā cācidos, genus quod regium uocant, cum magnitudine, tum uirtute: sed rarū id esse: nam tantū semē in hortis anti qui Batoni apud Babylonem cōperiri affirmāt. In Cypro genus quoddā peculiare palmarum est, cuius fructus nunc; maturescit, crudus tamen suauis apprime, dulcisq; est, dulcedinemq; ipsam peculiarē sortitur. Quædam nō fructu modo, uerum & arbore ipsa, longitudine, formaq; reliqua distant. Non enim magnæ, excelsæq; sed breues, fecundiores quā ceteræ, trimæ protinus fructificites. Tales etiam in Cypro, in Syria quoq; Aegyptoq; palmæ proueniūt, quæ quadrimæ, aut cum plurimum quiuēnes fructificāt, hominis altitudine assurgētes. Genus aliud est in Cypro, quod & foliū amplius habet, & fructū multo ampliorē, discrimineq; peculiari discretū, magnitudine māli punicī, figura oblongum: non tamen lapidum tanq; ceteræ, sed radicibus similem, ut nō deuoretur, sed succo tantū expresso expuat. Igitur palmæ, generibus (ut dictū est) pluribus constāt. Recondi autē ex ijs fructibus, qui Syriæ nascūtur, illos tantū posse, quos palmaria conualis parturit, narrāt. Qui uero in Aegypto, & Cypro, & alibi gignūtur, hos recentes omnes cōsumi. Est autē palma, quoad simpliciter exprimi possit caudice uno, atq; simplici corpore. Quædā

tamen uel bifida exeunt, ut in Aegypto, quasi bifurcae statura caudicis à parte, qua
 finditur, uel quina cubita, parte sc̃p̃ inter sese prop̃ partes ipsas assurgunt. In Creta
 quoq̃ plures bifidas prouenire affirmant, quasdam trifidas. In Lapaea uel quino ce
 rebro genus quoddam enasci tradit. Fertilibus itaq̃ locis plura eiusmodi, atq̃ in
 rotũ genera, differẽdasq̃, amplius factitari cõsentaneum est. Genus aliud est, quod
 plurimum gigni in Aethiopia fertur, Cyce uocatur, fruticosum, nõ uno caudice, sed
 pluribus, & interdũ aliquatenus cõiunctis: uirga minime lõga, sed cubitali tantũ, le
 uis tamen coma cacumini adnexa: folio amplo, & quasi ex duobus minutis cõpactio
 forma eximia: fructum figura, magnitudine, saporeq̃ diuersum, q̃ ceteræ præstāt,
 quippe rotundiorẽ, gustuq̃ gratorẽ, sed minus dulcem. Triennio maturant, ut fru
 ctum ueterem habeat nouo subnascẽte. Panes quoq̃ ex his cõficiunt. De his igitur
 uel amplius cõsiderasse oportet. Palmæ autẽ, quas humiles uocant, genus aliud est,
 quasi æquiuoce dictũ. Nam excepto cerebro uiuit, & ab radicibus succis repullu
 lant. Fructu quoq̃, & folijs distat. Sũt em̃ lato, molliq̃ folio: ob id sportulas, tegetes,
 & capitis umbracula eo contextunt. Quin & in Creta insula multæ, atq̃ etiã multo
 plures in Sicilia tales proueniunt. Sed hæc prolixius, q̃ propolita res exigeret, dixi
 mus. In cæterorum autẽ satũ plantas in contrariũ multũ permutat. Quanc̃q̃ sint, qui
 referre nihilo uelint, minimeq̃ in genere uitium. Alij pampinum laciuiorẽ, & qui
 amplius fructũ protegeret, ita exire, minusq̃ amitti acinos putat, atq̃ hoc idẽ effici
 in fico. Nam si in cõtrariũ permutata seratur, fructũ non amittere, sc̃ñsilem̃q̃ ita
 fieri cõsent: fructũ præterea seruare, si quis, dũ nascitur, ealem statim desingat. Sa
 rus, generationesq̃, quo pacto se habeat, dictum serẽ est, prout scilicet formula, no
 taq̃ subsignandi amplecti singula licuit. In cultu & opera omniũ, alia cõmunia, alia
 singulorum propria esse cõstat. Cõmunia, fossio, rigatio, stercoreatio, item purgatio,
 & aridorum exemptio. Quanc̃q̃ secundũ plus, minus ue differat. Aliæ nanq̃ magis
 simũ, & aquam diligũt, aliæ minus: & cupressus, quæ nullo pacto simũ, necaquam
 cõcupiscit, sed etiã emori dicĩt, si copiose nouella adaquetur. Punica & uitis aquam
 diligunt. Ficus cũ rigatur, magis germine uiget, sed fructũ deteriorẽ parit: præterq̃
 laconica, quæ riguis uet̃hemẽtissime gaudet. Purgari omnia quærunt, melioraq̃ red
 dũtur exemptis aridis, tanq̃ alienis, quæ tũ in crementũ, tũ alimenta impediũt. Ob id
 cum arbor annosa est, eam totã decidunt, germinare nanq̃ denuo incipit. Maxime
 purgatione myrtũ & oleã egere Androcion autor est. Etenim quo pauciora reli
 queris, melius germinat, fructumq̃ copiosius præstāt, uite excepta. In hac enim plu
 ra relinquere ad germinationẽ, q̃ ad fructificationẽ, satius est. Ad summã, & hæc,
 & reliqua omnis cultura, pro natura cuiusq̃ propria impendenda est. Fimo quoq̃
 acerrimo, & rigatione copiosissima, ut & purgatione, oleã, myrtũ, punicamq̃ egere
 Androcion ingit. Nec enim medullã eas habere, nec ullo morbo sub terra infestari.
 Sed cũ arbor uetustã est, ramos decidere, & truncũ deinde colere, tanq̃ denuo satũ
 oportere. Sunt qui diurnissimã & ualidissimã myrtum, & oleã esse affirmat. Hæc
 igitur præscrutari quispiã diligentius uelit: & si nõ omnia, tamen quod de medulla
 putatur. Fimus autẽ nec pariter omnibus, nec idem omnibus cõuenit. Aliæ nanq̃
 acriorẽ uelle uidentur, aliæ minus acrem, aliæ penitus leuẽ. Acerrimus hominis est,
 ut & Chartodras, omnium optimũ eum esse asseuerat. Secundũ suillum. Tertius
 prarũ. Quartũ ouitum. Quintũ boum. Sextũ tumetorũ. Stipularius diuersus, diuer
 soq̃ modo addit. Quidã enim illo debilior, quidã efficacior est. Omnibus fossione
 prodesse existimant, sicut etiã sarculationem minoribus. Melius enim ita coalescere
 aiunt. Pulvis quoq̃, ut nõ nulla crescat uireantq̃, facere uidetur, ut uia: quãobrem
 inferius sæpe excitant. Nõnulli & ficos suffodiunt, ubi puluere opus sit. Megarẽses
 etiã pepõnibus, cucumeribus, atq̃ cucurbitis, cũ uenti anniuerfarij perflāt, puluerẽ
 sarculo

farculo exciāt, atq; ita dulciores, mollioresq; reddūt absq; rigatione. Hoc igitur con-
cessum indubie habet. Sed vitē puluere cōspargere, aut ullo pacto tangere, cū uua
nigrescere incipit, haud quāq; oportere existimāt. Sed si unq; ita agendū sit, cum ni-
gra omnino reddetur, agendū censent. Alij neq; tunc oportere aiūt, nisi quoad run-
candū sit. De his ergo ambigitur. Si quid autē fructū non fert, sed se totū in germina
uertit, partē caudicis infimam scindūt, atq; lapidē interponūt, ut cunq; disiectū, itaq;
fructificare posse asseuerāt. Pari modo & si quam radicis partē secueris, fructū crea-
tum iri. Quamobrem radices uitium summas, quum farmētis luxuriāt, euellunt. Fi-
corum non solum radices amputāt, uerumetā obducto cinere obstruūt, & passim
10 caudicem scindunt, itaq; fructū copiosius dari affirmant. Amygdalæ uel palo ferreo
infixo, cum penetratū sit, aliū quernū foramini facto adigūt, terraq; occultāt: quod
punire nonnulli uocāt, perinde ac si arbor iniuriā lasciuiret. Hoc idē & in piro fieri
solet. Amygdalam uel ex amara dulcē effici uolūt, si quis caudice circumsolūt, præ-
terforatq; mēsurā dodrantali, undiq; lachrymā effluentē in idē defluere sinat. Sed
hoc tam ad fructificandum, q̃ ad bene fructificandū conferre creditū est.

Quæ fructus amittant antequam percoquant. De caprificatione. De conditione statuum.

De culicibus ficarijs. De remedio ad culices.

Caput IX



Ructum autē anteq; coquāt, amittere possunt, amygdala, mālus, puni-
ca, pirus. Omnīū maxime ficus, & palma, qbus uel auxiliū magnopere
10 quærit, unde & caprificatio cōperta habetur: nā ex pomis annexis cu-
lices egrediētes corroduunt, & per uia reddūt sicuti cacumina. Regiones
quoq; ad iacturā fructuū differūt: quippe cū in Italia iacturā fieri negent: quāobrem
caprificadi usus terræ illius incolis nullus penitus est. Nec in aquilonis, & macrofis
locis id desiderat, ut in Phalico Megarēsis agri, & partibus quibuldā agri Corinthij.
Platuū quoq; cōditio paritate referre uidet. Aquilonijs enim prius q̃ australis-
bus fructus decidūt: & si crebriores, uehementioresq; fuere, maior iactura sequatur
necesse est. Itē natura ipsarū arborū refert. Præcoques enim amittūt, ferotina: haud
quāq; amittūt, ut laconica, & aliæ quædā: quamobrem eas caprificare minime as-
10 lent. Hæc igitur locis, genēribus, coeliq; ratione discrimen recipiūt. Culices uero fici-
rij, pomis caprifici egrediūtur, ut dictū est. Sed ex putrescētibus eorundē granis gi-
gnūtur, cuius indicij afferūt, quod postq̃ euolauerūt, grana siccibus nulla penitus
insunt. Euolat magna ex parte, pedē, aut pennā relinquētes in pomo. Est uel alterū
culicū genus, cētina: uocātū, quod ociose uiuit, quēadmodū fuci inter apes, & quos
ex altero genere sua poma ingressos adspexerit, protinus necat: id uero suis moris
operculis. Laudant caprifici potissimū nigra, ex locis ortæ saxosis: ob rationē, quod
permulta ista grana cōtineant. Noscūt quæ apte culicibus emerferint, quod rubrae,
& uersicolores, & robustæ constant: contrā, quæ minus apte, albæ, imbecillesq; cer-
nunt. Apponūtur ficis, quæ scilicet eam operā desiderāt, cum pluerit: ubi uero plu-
40 rimus sit pulvis, ibi plurimæ, ualidissimæq; caprificus exeunt. Quin & poliū culices
gignit, cū copiose fructificat. Et ulmis foliiculis genus quoddā bestiolarū innascitur,
quod cnipes appellāt: qui cum in ficis gignūtur, ficarios illos culices deuorāt. Huius
remedium cācos statuit alligādos: in eos enim uertere sese culices inquit, sed ficis
quidē auxiliā istiusmodi cōperta habētur. Palmis autē mascularū coitū referūt: hoc
enim & perdurare, & maturescere fructus potest. Caprificationē ob similitudinem
quidā rem appellarūt, quæ sic fieri solet. Dum mascula floret, spatham abscondētes,
quā flores emergūt, protinus, ut lanuginē, & florē, & puluerem cōtinet, super fru-
ctum feminæ decurrit. Illa sic eo aspersu afficit, ut suos fructus nullo pacto amittat,
sed cūctos cōseruet. Vnde fit, ut bisario adiūmēto mas esse feminæ ualeat. Fructife-
ram enim feminā uocāt. Sed alterū uelut coius, alterū ratione et alia cōtingit.

De genitu syluestrium arborum.

Caput I



VONIAM de urbanis arboribus dictū est superiori uoluminet nunc de syluestribus simili ratione indicare debemus: seu ali- quid idē cum urbanis, diuersum uē habeāt, seu in totū sui gene- ris existāt. Ergo generationes earū simplices quādā esse intelli- guntur, omnes enim semine, uel radice proueniūt: quod ita sit, nō quia uel aliter fieri nequeat, sed forsitan, quod serere quicq; nemo conet. Namq; enasci potuissent, si locū idoneū, cultumq; congruum adipiscerētur: quemadmodū illae, quae lucos, aquasq; desiderāt, ceu pla- tanus, salix, populus, ulmus. Hae em̄ omnia & similia, (sata germināt, & celeriter, pulcherrimeq; ex auulsione. Quae etiā si quis praegrandē, eamq; cū arbore se exae- quantē transulit, perdurare optime potest. Harū maior sanē pars defixa quoq; feri nuncq; recusat, ut populus tam alba, q̄ nigra. Igitur earum nō solū semine, radiceq; generationē, uerum etiā hanc assignare ualemus. Reliquarū autē supradictae notan- tur, praeterq; earum quae semine tantū proueniūt, ut abietis, pinī, piccae. Quae uero semen, fructumq; ferāt, tam ex radice, q̄ ex ijs ipsis prodire nimirū possū. ut. Namq; eas quae steriles esse arbitrantur, generare quidā affirmāt, ut ulmū, salicem: argumen- tumq; capiunt, non solū quod pleraq; procul radicibus suis erumpūt, uerum etiā in contemplatu eorū, quae interdū euenisse notantur: ut in Phineo Arcadiae, cū aqua quae in plano obstruis faucibus extumuit, demū erupisset, ubi propē à loco inun- dato salices steterant, hic anno secundo, solo resiccato salices iterum surrexisse affir- mant: ubi autē ulmī, iterum ulmos: & ubi pinastra, & abietes, ibidem pinastra, atq; abietes: quasi istae quoq; illas amularentur.

De salice quae frugifera dicitur, deq; platano quae in tripode euenisse narratur. Item aërem rerum omnium semina habere, omniumq; inundationem semen afferre.

Cap. II



Aeterum salicē celeriter fructum anteq; in plenū crassetur, percoqua- turq; dimittere asseuerant: quamobrem Homerū haud improbe fru- giperdā hanc appellasse inquirunt. De ulmo uel illud indicū asserunt: cum enim statibus delatū semen in loca proxima fuerit, nasci arborem aiunt. Itaq; simile in his euenire percipitur, atq; in suffruticum, & her- barum nōnullis. Quamuis enim semen nullum conspectū habeāt, sed aliae uelut la- nuginē, aliae florē, ut thymum, tamen ex his germen emittūt. Iam platanus quidem manifestum semen producit, ecq; gignitur, quod tam alijs q̄ illo praecipue indicio constat: etenim in tripode aëneo, platanus aliquando prouenisse narratur. Has igitur generationes syluestrium statuendū, atq; etiā spontaneas illas, quas uel naturae interpretes reddunt. Anaxagoras enim aërem semina omnīū habere, quibus cum aqua unā delatis omnia gigni asseuerauit. Diogenes ex aqua putrescente, missu- ramq; quandā cum terra capessente, plantas nasci existimat. Cleodemus ex eisdem quidem atq; animalia, plantas quocq; cōstare putauit. Sed quanto ē turbidioribus, algentioribusq; tanto amplius animalū priuari constantia & natura. Quin & alij quidam de generatione referunt: sed haec à sensu quodammodo remota esse uiden- tur. Quaedam uero confesse, conspecteq; annotantur, ut cum annis exundauerit, aut riuo digressus, aut tota unda effusus, ut Nessus in Abderensi agro alueum saepe penumero mutat: & simul ut mutauerit tantū syluae locis cōgenerat, ut intra trien- nium opaca undiq; reddat: rursus cū imbres crebriores diutius occupauerint, nam his quoq; generationes plantarum fieri solēt. Ergo amnium inundatio, semina, fru- ctusq;

Etusq̃ afferre uidetur, & aqueductus, herbarum semina præbere creduntur. Im-
bres autem cum hoc idem faciūt, & (semina enim secum plerq̃ deferūt) tum etiam
putredinem quidam aquæ, terræq̃ committūt: nam & ipsa terræ ægyptiæ mistura
materiam quandā gignere uidetur. Nonnulli q̃, modò subegeris, mouerisq̃ solum,
familiaria protinus terræ illius emergant, ut in Creta insula cupressi. Fit certe & in
minoribus simile: simul enim quæcunq̃ fuerint mota, herba exit. In seminadesa-
tis autē segetibus, si subnouētur, tribulum emergere aiunt. Igitur hæc quidem mu-
tationem consequuntur telluris, siue seminibus præiacentibus, siue etiam ipsa terra
modo quodā affecta, præparataq̃ ad gignendū. Quod haud absurde forsitan credi
10 potest, humoribus simul interclusis, quorū uis magna est: alibi autē uel ex pluuijs,
peculiarem frequentia syluæ exortam prodidere, ut in Cyrena factio quodā piceo,
crassoq̃ humore. Ita enim proxima sylua surrexit, nuncq̃ antea uisa. Laserpitium
quoq̃ quod superiori tempore deerat, causa quadam eiusmodi extitisse tradūt. Mo-
di igitur generationum huiusmodi, tales adnotantur.

Differentiæ inter urbanas arbores, & syluestres: fructificatio arborum. Quid cultus incultusq̃
faciant. De cedro, & terebintho. Caput III



20 Væque autem aut frugifera, aut sterilia intelligātur necesse est, & aut
perpetuò uiuentia, aut folia deperdentia, & aut florentia, aut flore ca-
rētia: quippe cum in omnibus, tam urbanis quàm syluestribus, publi-
ce quædam istæ diuisiones habeantur: priuare autem sera fructificatio
atq̃ corroboratio. Item copiosa fructificatio, prima species syluestriū:
namq̃ serius fructus suos perficiunt, atq̃ in totum florescūt, germinantq̃ serè sem-
per serius, naturaq̃ ualidiora sentiuntur, & plus fructus præmonstrant, minus uero
maturāt. Ni forte id & reliqua omnia facere soleant, quæq̃ cōmune genus fortium
tur, ut oleaster, pirasterq̃, minus quàm olea, & pirus. Sic enim omnia, præterquam
si quid inuentu rarum proueniat, ut in cornis & forbis: horū enim syluestria urba-
nis maturiora, suauioraq̃ tradūt: & si quid aliud cultura non patitur, seu arbor, seu
ex minoribus aliquid, ut la serpitium, capparis, & in leguminum genere lupinum,
30 quæ quidē uel natura esse syluestria dixeris. Quod enim mitigari recusat, ut etiam
inter animalia est, id natura syluestre iudicandum appareat: quanq̃ Hippon sylue-
stre, urbanumq̃ esse unumquodq̃ putat: & cultu quidē urbanum, incultu reddi
syluestre: quod partim recte, partim non recte putat. Etenim quodq̃ neglectum
degenerat, immutescitq̃. Sed haud quodq̃ cultum melius redditur, ut retulimus.
Quapropter discernendum diligentius, & quædam syluestria, quædam urbana di-
cendum: ut animalium, quæ non nisi cum hominibus uiuunt, quæq̃ mansuescere
possint. Sed hoc nil forsitan differt, utro tandem modo proponatur. Omne autem
immutescens, tum fructu deterius, tum ipsum breuius, & folijs, & ramis, & cortici-
bus, & tota forma efficitur: quippe spissiora, contortiora, durioraq̃, tam ipsa fieri so-
40 lent, quàm uniuersa natura, utpote cum ijs potissimū urbanorum, atq̃ syluestrium
discrimen intelligatur. Quamobrem quæcunq̃ ex mansuetscentibus eiusmodi con-
stent, hæc syluestria nuncupātur, ceu pinus, & cupressus, aut in totū, aut masculat:
quinetiā nux iuglans, atq̃ castanea. Item eo quod frigoris cupida, montanaq̃ po-
tius sint. Etenim id quoq̃ ad arborem, & summarim plātarum immanisuetudinem
assumi oportet, seu per se, seu etiā per accidens. Verum syluestrium determinatio,
siue hunc in modum, siue aliter accipi debeat, nil ad rem præsentem fortassis refe-
rat. Illud autē uerum, ut nota, absoluteq̃ subsignemus, syluestria montana potius
esse, pluraq̃ eorum locis eiusmodi magis uigere, nisi quis aquas concupiscentia,
secusq̃ fluuios degentia, & in lucos assurgere solita accipiat. Hæc enim & similia
campetribus potius cōnumerantur. Cæterum montibus quidem magnis, ut Para-

nafo, Cyllene, Olympo, Perico, Mysioq, & si unq locus alius huiuscemodi, nasci omnia certū est, scilicet ratione uarietatis locorum. Habēt enim stagnantia, madētia, sicca, crassa, saxosa, prataq, media omnia penē telluris discrimina. Ad hæc alia concava atq trāquilla, alia sublimia & uentis exposita, ita ut permulta, & uaria gignere possint: quæq planis proueniūt, isti quoq præstare ualeāt: nū tamen absurdū si qui ex mōtibus nō æque omnia ferāt, sed propria quadā sylua, aut in totū, aut ex maiore parte sciteant: ut in Creta insula circa agrū Idæum, cupressus enim ibi exuberat: & in Cilicia, Syriaq cedrus, nonnulliq Syriæ terebinthus. Fit enim proprietas ex locorum discrimine, sed propriū iam in uniuersum penē exposuimus.

Quæ arbores nō nisi mōtibus nascūtur, quæq perpetuū uiuant.

Cap. IIII

10



Omibus autē propria, quæ nasci in planis nequeūt. Macedoniæ abies, pinastrū, picea, aquifolia, tilia, caprinus, buxus, portulaca, taxus, iuniperus, terebinthus, caprificus, philycā, apharca, nux iuglās, castanea, ilex. Quæ uel in plana descendūt, tamarix, ulmus, populus, salix, cornus, alnus, robur, lacra, pirus, pomus, ostrya, celastrus, fraxinus, paliurus, spina acuta, acer, quam in mōte caprinū, uel in plano gallicā uocāt. Quancq alij aliter distinguūt, & genus diuersum aceris, & caprini faciunt. Omnia uero, quæ cōmunia mōtibus, planisq habentur, ampliora, uisūq pulchriora in planis proueniunt, sed usu meliora, tam materie q fructū in mōtibus: pīris, malisq exceptis: hæc namq planis præstātiores nō solū fructū, uerū & materie inspectātur: quippe cum mōtibus breues, nodosæ, spinosæq assurgāt. Omnes autē etiā in mōtibus, cū adeptæ loca propria fuerint, & pulchriores certe proueniūt, & copiosius ferūt. Sed (ut abso lute atq simplici agā ratione) quæ æqualibus montū tractibus emigrēt, primum obinēt: ex reliquis uero, quæ infimis, causisq, præstātiores: omniū deterrimæ, quæ cacumīne, nisi quid sua natura frigus adamet. Sed hæc quoq si u inter se dissimili distant: quæ de re postea dicendū. Nunc singula secundū prædictas differētiās diuideremus. Ergo inter syluestria perpetuū uirent, quæ primo uolumine retulimus, abies, pinastrū, picea agrestis, buxus, portulaca, taxus, iuniperus, terebinthus, aquifolia, apharca, laurus, suber, quercus, celastrus, spina acuta, ilex, tamarix. Reliqua omnia solā amittūt, præterq: si quid aliq loco supfluat, quæadmodū de quercu, & platano, quæ in Creta est, indicauimus, aut si q̄s oīno locus alimēto exuberet. Fructū reliqua quidē omnia ferūt: de salice uero, & populo, & ulmo (ut diximus) uaria sentētia est.

Differētiæ quæ de locis proueniunt: tum de persica & palma.

Caput V



Vidam & populū solā sterilē putant, ut Arcades: cæteras autē omnes, quæ mōtibus proueniūt, fructū parere. At uero in Creta, & populi nigræ complures fructificāt. Vna apud adytū spelūcæ Idææ, qua munera deo dicata conseruātur: altera parua ab ea proxima fiat: & ulterius duodecim plurimū stadia ad fontē quēdam Sauri dictū, pleræq sunt, & in monte proximo ab Ida, cui Cedrio nomen: necnon & circa Tiresiam. In montibus aliq ulmum tantū ex his fructiferam aiunt, ut Macedones. Discrimen autē ad fecunditatem, sterilitatemq summū, uel locorū natura facere potest, ceu in persica, palmisq patet. Persica enim in Aegypto, & locis proximis fructificat, quancq in Rhodo usq florē dūtaxat deuenit. Palma apud Babylonē fructū mirū in modum largit: in Græcia uero ne fructū quidē maturat, apudq nonnullos nec fructū ullum ostēdit. Simili modo etiā alia pleræq huiusmodi percipiūtur: nā & inter minora herbarum, ac reliquæ stirpis humilis, quædam in eadem contermina tellure fructifera, quædā sterilia gignuntur, quæadmodū centauriū in Elia agro fecundū: quod montuosis æditur, infecundum: quod plantis, flosculo tantū gaudens: quod concauis, ne flocet quidē, nisi improbe. Itaq & reliquorū, quæ unigena cōstent, unamq apellationem

pellationem sortitur, aliud fecundū, aliud esse infecundū uidetur, ut illex. Quædam fructifera, quedā sterilis, & alnus uero similiter, ambæ tamen florescunt.

De *Hyestriam arborum floribus. De germinatione. De florum, fructuumq; prouentu.*

De galls.

Caput VI



10 Erē autē omnes, quas inter unigenas masculas uocant, steriles magna uidebūtur ex parte, earumq; alias abūde florere, alias parū, alias nullo pacto florere affirmāt. Contrā inter alias, mares tantū fructificare putatur, uerum ē floribus arbores generari, sicut ex earū fructibus, quæ fructum parere possint, atq; spūsum adeo exortū facitari interdum utrinq; ut nisi facta semita, nullus trāsitus sit. Quin & de floribus quarundā sententia uaria est, ut retulimus: quidā enim robur, & nucē auellanam, & castaneā florere existimāt, item pinū & picem: alij nullā earum, sed uillum nucis, & muscū roboris, & nucamentum picæ proportionē grossis præciduis respōdere existimāt. At Macedonē incolæ ne illas quidē florere arbitrātur, iuniperum, scilicetā agrestem, accerem: nonnulli binas iuniperos esse dicūt, & alterā florere quidem, sed fructum non ferre: alterā nō florere, sed protinus fructū ostendere, ut sicos, poma præcidua. Itaq; penē fieri, ut sola hæc arbor fructū in bienniū habeat. de his igitur amplius cogitandum. Germinatione uero alijs simul, atq; urbanis: alijs mox, alijs tā tardius, omnibus
20 certo tēpore uerno: sed fructū diuersitas numerosior est, quod uel antea diximus. Non enim maturitates pro germinationū ratione sequuntur, sed plurimū interest: nam & earū, quæ serius fructificāt, quas nonnulli anno reddere uolūt, ut iuniperi, ut ilicis, germinationes in Vere proueniunt. Vnigenæ autē ipsæ pro locorū natura, præpostero inter se discrepant. Etenim quæ paludibus astant, primæ germinant, ut Macedones uolūt: secundæ, quæ planis: nouissimæ, quæ montibus. Ipsarum autē singularum arborū, aliæ cum urbanis germinare incipiūt, ut potulaca, apharca, pirus: post urbanā paulō, aliæ ante fauoniū, & statim post afflatus fauonij. Ante fauoniū cornus, tā mas, q̄ femina: post fauoniū, laurus, alnus: paulō ante æquinoctiū, tilia, caprinus, fagus, ficus. Quin & nux iuglans, quercus, sambucus mature germināt, atq; etiā magis quæ steriles, lucosæq; sunt, populus, ulmus, salix: paulō ab his serius
30 platanus. Reliquæ ineūte Vere, ut caprificus, philyca, spina acuta, paliurus, terebinthus, nux iuglans, castanea. Serotino germine malus est, tardissimo ferē omnī suber, arīa, quadratoria, thuia, taxus. germinationes ita se habēt. Florū prouētus (ut ita loquar) pro ratione germinationis sequitur: differūt tamen, multoq; magis fructus confectio uariatur: quippe cornus ferē circa æstiuā solstitia reddit, præcox scilicet: nam serotina, quam quidā foeminā dicunt, post ipsum autumnū fructificat, huic fructus ingustabilis: lignū infirmū, fungosumq; tanta est inter ambas differētia, cū mari firmissimū sit. Terebinthus circa tritici messē, aut paulō serius semē reddit: fraxinus atq; acer, æstate: alnus, nux iuglans, pirorumq; genus quoddā, autumno: robur & castanea serius, nam circa Vergiliarū occasum: eodē modo & philyca, & illex, & paliurus, & spina acuta, post occasum Vergiliarū. Arīa hyemis initio: malus primis frigoribus: pirus serotina est, quippe quæ hyeme sua perficit poma: potulaca, & apharca fructū primū, cum uua dulcescit, maturant: posteriorē, cum floret: bis enim istæ fructifera hyeme ineunte uidentur. Abies & taxus, paulō ante solstitiū florent. Est abietis flos croci colore, aliasq; pulcher: fructū post Vergiliarum occasum dimittit. Pinaſter, & picea paulō germinatione præueniūt, diebus scilicet circiter quindecim post uergilias: istæ quoq; ratione uidelicet reddūt, sed hæc mediocritus. Omnium autem tardissime iuniperus, telastrus, illexq;, suos fructus perficiunt. Iuniperus enim anniculum habere uidetur, quippe cum nouus anni ex actū fructū occupet: utq; ali

qui uolunt, nec maturari solet, quapropter decerpitur, & aliquantū temporis referuatur. Quod si in arbore relinquatur, marcescit. Licet quoque semen anno perficere Arcades aiunt: simul enim fructum antecedentem maturat, & nouum demonstrat: quamobrem in his euenit, ut assidue fructum habeant. Celsus quoque ob huiusmodi fructum amittere proditur, serotina admodum, & tilia, & buxus. Fructum ingustabilem cunctis animalibus tilia, cornus, foemina, buxusque gignunt. Quin & edera, iuniperus, pinus, potulaca serotinae habentur. At uero (ut Arcades uolunt) & in his, & omnibus ferè seriores quadratoria, thuya, taxus. Fructuum lacturae maturitatesque syluestrium arborum tales differentias fortissimum, non solum si ad urbanas spectantur, uerum etiam si inter se ipsas cōferuntur. Euenit autem, ut cum primum inceperint, reliqua germinationem continuent: pinus uero, abies, roburque, intermittit, tunc turgeant, ternaque germina adant: ideo & ter squamosae dicuntur: omnis enim arbor cum germinat squamas corticum spargit. Fit germinatio prima statim mense Februario ineunte: quanquam in Ida monte die maxime XV mensis eiusdem. Tum circiter triginta intermissis diebus, aut paulo pluribus, iterum germinare incipiunt, ab extremo surculi, usque proximum germinis antecedentis. Et quaedam sursum, quaedam in latera circumquaque emittunt, ueluti geniculo facto, surculo primi germinis, quo modo scilicet & prima fieri germinatio solet: idque agitur circa Martium definitum. Huius germinationis tempore galla quoque omnis gignitur, tam nigra, quam candida: nascitur magna ex parte noctu uniuersa: incipit autem, excepta resinacea, si ab aestu occupetur, inarescit, augeri quoque amplius nequit: alias enim magnitudine ampliore grandesceret: qua de causa, earum aliqua non maiores fabis euadunt: nigra uero pluribus diebus uiuet, & magnitudine maiori nonnullae capessunt. Postea diebus circiter quindecim intermissis, rursum germina tertio mittunt mense Aprili, diebus longe paucioribus quam prius, forteque id sex, aut septem diebus summum absoluitur. Sed germinatio similis, eodemque modo efficitur. Quod cum uentum sit, non amplius in longitudinem, sed in crassitudinem, incrementa ueruntur. Omnium itaque arborum germinationes conspicuae, sed abietis, pinique maxime, quoniam genicula in uersus rectos porrigantur, rami quoque conditi ex aequo spectentur. Ad materiam quoque cadendam tempus nunc potissimum intelligitur, propter amplitudinem corticis. Ceteris enim temporibus cortex facile detrahi nequit, detrahitur quoque nigrescit materies, aspectusque deformior redditur: nam ad usum quidem non refert, quinimo robustior est, si post fructuum maturitatem cadatur. Haec praedictorum fructuum propria.

Germinationes in arcturo. Quid amentum, & iulus euellere. Qui aestus faciles, & difficiles.

De radicibus syluestrium.

Cap. VII



Germinationes autem, quae ad ortum arcturi post uernum fieri solent, omnibus ferè communes esse putantur, manifestiores tamen in urbanis, atque earum praecipue, fico, uiti, punice: denique omnibus, quae uberius coalescunt, & ubi tellus pinguis, lactaque sit, quae sub arcturo fieri solet, plurimam in Thessalia, Macedoniaque fieri dicunt. Simul enim contingit, ut etiam autumnus placidus, longusque sit. Ita & coeli quoque proposita mollities. Nam & in Aegypto ea de causa, semper ferè arbores germinant, aut certe parum temporis intermittunt. Sed germinationes (ut diximus) communes omnium sunt: intermissiones autem praedictorum tantum esse intelligitur: proprium uero nonnullis, & quod amentum appellant, scilicet praedictis: habet enim, & abies, & pinus, & robur, ac etiam tilia, nux iuglans, castanea, picea. Id robori ante germinationem uerni temporis initio gignitur: sit ueluti foliorum conceptus inter antecedentem obstru-

obstruſionem, & ſequentem exortum, medius. At ex proprietate autumnī, poſtq̃
folia decidere, peculiaria eius cōfeſtim gignuntur, quaſi grauida intumeſcat, ut ger-
mina pariat, dureſq̃ per hyemem uſque ad uer. Nuci auellanae, poſtquam fructus
decidit, racematum quiddam, uermis prægrandis, magnitudine ſingulari, pediculo
pingue, emergit: quod nonnulli iulum appellant. Hoc ex minutis ſquamis innu-
meris ordine nucis pinæ conſtat, ut ſpeciem non abſimilem nuci pinæ nouellæ,
ac uiridi gerat: niſi quod oblongius, & per totum ſere pariter craſſum tendat. Hye-
me hoc augetur: incuntes Vere dehīſcit, & ſquamata illa flauelcunt, & in longitudi-
nem uel tripollicarem increſcunt. Cum autem Vere folium exiſtit, iſta decidunt, &
10 nucs caliculacea tegmina totidem quot flores ſuper pediculum contrācta gignun-
tur, eorumq̃ ſingulis nucs ſingulæ inſunt. De tiliā, & an quicquam aliud amentife-
rum ſit, cogitandum. Sunt præterea quædam auctu faciles, quædam difficiles: faci-
les, quæ apud aquas aſſurgunt, ut ulmus, platanus, populus, ſalix: quanquam de
hac nonnulli ambigunt, uſpote difficili auctu: & ē fructiferis, abies, pinus, robur:
omnium facilima taxus, lacra, fagus, iuniperus, acer, caprinus, oſtrya, fraxinus, ala-
nus, picea, pbrulaca, cornus, buxus, pirus. Fructificant protinus, abies, pirus, picea,
etiā ſi in quantumlibet magnitudinis creuerint. Auctio uero, ac germinatio reſta
quis incerta eſt tum modo, tum germine. Sed abieti certa, & continua, atq̃ præpo-
ſtera. Cum enim primum ſciſſum de caudice fuerit, rurfus de eo alterum ſinditur,
20 idq̃ aſſidue faciatur, poſt quæq̃ germinationis ſuperuentum: at cæteris ne rami
quidem aduerſe conditi inter ſe conſtant, paucis quibuſdam exceptis. Illud quoq̃
differentiæ incrementum communiter omnium pariter urbanarum, atque ſylue-
ſtrium habere uidetur: quædam enim ex cacumine, & latere germinant, ut pirus,
punica, ficus, myrtus pars ſerme maxima: quædam non cacumine, ſed latere tantū,
& ipſum, quod præſit, propellitur, ſicut etiā caudex totus, ramiq̃ prægrandes au-
geri conſueuerunt. Fit hoc in nuce iuglande, & auellana, & quibuſda alijs, quarum
omnium germina in folium unum ſiniūtur. Qua de cauſa ratione optima nullum
germen ſuperuenit, quo creſcere poſſint, cum deſit augendi principium. Frumen-
tis quoq̃ incrementum quodammodo ſimile: hæc enim protrufu corporis ſui præ-
30 ſentis aſſidue creſcunt, etiā ſi ſolijs diminuantur, ut in depaſtis ſegetibus pateſcit:
nec de latere quicquam emittunt, ut legumina aliqua faciunt. Igitur hoc pro germi-
nationis, ſimulq̃ auctuonis differentia capi poteſt. Sylueſtria uero alta eſſe radice
quidam negarunt, quod ſemine omnia proueniant, ſed nō recte. Nam fieri poteſt,
ut cum diutius uixerunt, radices procul demittant: nam & olerum plura hoc idem
faciunt, licet hæc imbecilliora ſint, atque indubie ſemine terræ ſummiſſo oriantur.
Omnium itaq̃ ſylueſtrium alta radice deſcendere illex uidetur: abies, pinusq̃ mo-
dica: thraupalus, & prunus, & ſpodias, quæ uelut ſylueſtris prunus habetur, ſu-
perſicie uiuaciores: ſed hæ uel paucis adhaerent radicibus, thraupalus autem mul-
tis. Et accidit cæteris, quæ non in profundum radicem agunt, præcipueq̃ abieti,
40 pinoq̃, ut radicibus ſtatu euerantur. Arcades ita referunt. Idæi abietem altius,
quā robur radice deſcendere uolunt, uerum ſimpliciore, meatuq̃ rectiori: prun-
umq̃, nucemq̃ auellanam, altiſſimam radicem habere inquit: ſed auellanam
tenuem, atq̃ robuſtam, prunum numeroſam. Ambæ tamen diutius uiuant opus
eſſe: prunum etiā emori contumacem referunt. Acerem ſuperſicie aliquatenus
gaudere. Fraxinum numeroſiorem, denſam, altamq̃ fortiri. Iuniperum quoq̃, ce-
drumq̃, per ſumma inniti, & alnum tenuem agere. Item ſciſſimam: nam ea quoq̃
ſummiotenus, paucisq̃ radicibus degit. Sorbo radix per ſumma ceſpitum, ſed ualida,
craſſa, moriq̃ contumax, multiplex tamen modice. Hæc alta radice deſcendere,
ſuperſicieq̃ gaudere notatur.

leus humor cœlo cadens, nec alijs magis insidens frondibus. Quin & cremati roboris nitrosum cinerem esse affirmant, hæc roboris propria. Arborum uniuersarū, ut dictum est, quo ad genera sigillatim accipi possint, plures sanè differentiæ intelliguntur: publica tamen, qua foemina, masq; distinguuntur: quorum alterum fructiferū, alterum sterile in alijs est: ubi uero ambo fructifera, fructū meliorem foemina præstat, nisi fortè mares eas libear uocitar: sunt enim qui ita uocant. Proxima huic differentia, qua urbanū à syluestri discernitur. Aliæ uero per species unigenarū ipsorum redduntur, de quibus nunc indicare debemus: proprias quoq; formas simul persequendo illarum, quæ minus conspectæ, notatq; habentur. Roboris genera, id enim potissimum diuidunt, & quidam obiter, aliud urbanum, aliud syluestre appellant: nō dulcedine fructus distinguendo: nam dulcissimus fago, quam reddunt syluestrem: sed quoniam cultis magis proueniat, lignumq; leuius habeat: fagus autem scabra, montuosiq; nascens. Ergo genera, alij quaternā, alij quina assignant. Cæterū nonnulla nomine discrepant: ut eam, quæ glandem dulcissimam fert, alij quercum, alij placidam uocant. Quod idem etiam in cæteris faciunt. At ut Idæi diuidere consueuerent, genera hæc roboris habentur: placida, cerrus, latifolia, fagus, salicortex, quam alij recticorticem uocant, omnia fructifera: sed dulcissima glans fago, uti retulimus: secunda placidæ, tertia latifoliæ, quarta salicorticis, ultima & amarissima cerro: sed non singulis cuiusq; generis dulcis, sed etiam amara nonnullis, ut in genere fagi uidere licet. Distant etiam magnitudine, figura, coloreq; glandium. Peculiare fago, & salicorticis, quod ambæ in genere dicto utili, glandes parte postrema utrinq; lapide sunt: alijs in putamine, alijs in carne ipsa: ideoq; detractis lapillis, concava perinde, atq; in animalibus relinquuntur. Folio quoq; caudice, materie, totaq; specie distat: namq; placida non erecta, nec leuis, nec excelsa est: quippe quæ corpore in orbem comosum, contorto, sinuosoq; stet, ut nodosa, alosoq; assurgat. Materies robusta, uerū infirmior, quam fago: hæc enim robustissima, putredine nulli obnoxia est: sed nec ipsa erecta, quanq; minus torra quam quercus. Caudice uero crassissimo constat, ut tota quoque breuis species reddatur. Nam eius etiam corpus in orbem comosum, minimeq; erectum est. Cerrus rectissima, excelsissima, leuissima & materie per longitudinē robustissima, nunq; in cultis, aut rarenter nascens. Latifolia secunda tum rectitudine, tum excelsitate, at ad ædificiorū usus post salicorticem deterrima. Ad cremandum quoq; carbonemq; faciendum uitrijs obnoxia, sicut & salicortex: quin & maxime, post illam tamen putrescit. Salicortex enim crassio quidem caudice, sed fungoso & cauat: si crassus sit, magna ex parte cernitur: quapropter ædificijs minus hæc utilis habetur. Item breui putrescit, quod ex natura eius arboris accidit: qua de causa concava & inanis reddit. Sunt qui & corde hanc solam carere uolunt, & fulmine solam laci, quamuis non altitudine excellat. Acolum quidam nec ad sacrificia lignis eius utuntur. Hæc pro materie uniuersæ speciei modo discrimina intelligūt. Callas singula ferunt genera, sed quercus tantum ad coria utilis, cerrus, latifoliæ, uisu quidem haud absumis quernæ, nisi quod leuior, sed ad rem nullam utilis: fert & alteram, nigram, qua lanæ inficiuntur. Quod autem penem quidā appellant branchijs simile cerrus sola producit, canum, mucosumq; cubitali longitudine pendens, ceu uillus lintei prolixus: nascitur id ē cortice, non ē furculo, unde glans: nec ē gemma, sed à latere supernorum nodorum. At uero salicortex id nigricans, pusillumq; gignit. Idæi hunc in modum distinguere solent.

Alia glandiferarum distinctio. Quæ arbor improba ad carbonem faciendum. De pinorum generibus. De pice, abiete, taxo, oltra, ilice: deq; flore, & fructu illic. Cap. X



Accedones quaterna genera faciunt: Verique cum, quæ glandem dulcem producit: a sculum, quæ amaram: fagum, quæ rotundam: cerrum, quam alij sterilem dicunt: alij fructu uitiatum ad eò ferre, ut eum animalium nullum mandere possit, præter quæ fues: & hos, cum aliam nullam habent: magnæ ex parte caput tentari. Materies quoque improba, & laborata quidem, omnino inutilis: rumpitur enim, & cadit: rudis autem melior, ob id sic ea utuntur. Improbæ etiam ad cremandum, & ad carbonem faciendū: quippe cum carbo eius omnino inutilis, quod transiliat scintilletque, præterque in ætæris officinis. His enim utilior cæteris hic habetur. Quod enim statu desinente protinus extinguitur, paucus absumi potest. Salsicorticis materies ad axes, similisque tantum commodæ est, roboris genera hæc assignant. Sed cæterarum pauciora sanè adnotant: partemque ferè plurimam mare, ac fœmina discernunt, ut indicauimus: præterquam in paucis, inter quæ & pinus habita est. Pinorum enim aliam urbanam, aliam syluestrem assignant. Sylvestris binum statuunt genus, quorum alterum idæam, alterum maritimam uocant. Harum rectior, celsior, materieque crassior idæa: folio tenuiori, imbecilliorique maritima, & cortice leuiori, utilique ad coria: quod alteri minus. Nux maritimæ rotunda, breuique dehiscens: idæa oblongior, uiridis, minusque hincens, tanquam syluestrior. Lignum maritimæ ualidius, nam eas quoque terrenorum differentias sumi par est: haud enim incognitæ sunt usus causa: idæa ramosior crassiorque stat, ut retulimus. Ad hæc picem ipsa omnino copiosius præbet. Picenior, dulcior, tenuior, odoratuque gratior sentitur, dum cruda est: decocta uero deterior euadit, quoniam multum habeat serum. Sed quæ isti nominibus proprijs distinguunt, alij mare, fœminaque diuidere solent. Macedones uero etiam genus quoddam pini sterilem dicunt, & marem breuiorem, folioque durior: fœminam proceriorem, folijs pinguem, mollem, procliuioremque. Mari lignum circumcincta medulla durum, & operi fabrilis uersuale: id autem est cor eius. Ratio, quod minus pinosa, minusque tedam ingerens, & leuior, cursuque uenarum probior est. Fit in arboribus magnis, cum prostrata parte candida, & circumstante putruerint. His enim detractis, medullæ relicte securis a digitur. Est decolor omnino, neruoque tenui compacta, quam Idæi tedarij sicum appellant. Quod uero pinis subnascitur, colore teda rubidius maribus potius inest, odoris grauissimi, nec tedam redolens, nec flagrans, sed ab igne dissiliens. Igitur genera pini hæc assignant, urbanam, atque syluestre: syluestrisque marem, & fœminam, ac tertiam sterilem. At Arcadiæ incolæ, nec sterilem, nec urbanam pinum appellant, sed piceam. Etenim caudicem euidentior esse piceæ, utpote, qui gracilitate non careat, & operibus ipsam materiam ineptam: nam pini materies & crassior, & leuior, & excelsior est. Folia quoque pinū multa, pinguis, alta, flexaque habere: piceam autem etiam coniferam ipsam, pauca, squalidiora, horrentioraque. Piceæ item euidentior: pauci enim, atque amaram, ut etiam coniferam: pino autem copiosam, bonique odoris. Nascitur picea in Arcadia pauca, sed circa Elium agrū multa. Igitur in genere toto discrepare uidentur. Picea uero ea quoque ratione distare a pino uidetur, quod pinguior, folio tenuior, magnitudine minor, erectaque minus assurgit: præterea, quod conum minor, horridiorque nucleū, resina solidior ferat. Ambabus folia capillata, & materies candidior, similiorque abieti, atque in totum minus pinosa. Magna & hanc ad pinū differentia habet: pinum enim adustus radicibus nunc regerminare, piceam regerminare quidem affirmant, ut in Lesbo accidit in-

censo monte Pyrrhæo, qui picis scatet. Morbum pinis accidere talem Idæi incolæ narrant: cum non solum cor, sed etiam pars externa caudicis in tedam transierit, tunc strangulari quodāmodo: quod spōte accidit ubertate arboris largissima, quos ad quisq; coniectare possit. Teda enim totum efficitur. Ergo hæc pini propria affectio est. Abies quædā mascula, quædā fœmina est. Distant inter se folijs: mari enim acutiora, magisq; pungentia, flexaq; magis: quamobrem a spectu crispior tota arbor uidetur. Quin & materia differunt: nam fœminæ candidior, mollior, operibusq; facilior, atq; totus caudex procerior: mari autem uariator, latior, durior: medulla refertior, atq; in totum aspectu deterior. Nuci maris pauci nucleis parte priore insunt: fœminæ nulli omnino, ut Macedones referunt. Folium pinnatum, atq; in angustius tendens, ut tota species concameratum sanè imitetur, simileq; potissimum cyathis Bœotiorum appareat: densum adeo est, ut nec niuem, nec imbrem transmittat. In summam, arbor forma decora est, quippe germinatio quædam peculiaris nunc præter alias agitur (ut retulimus) solaq; ordinem seruat. Est magnitudine excelsa, longeq; pino procerior. Distant etiam ligno, non paulum: nam abietis nervosum, molle, leueq; pino autem tedaceum, ponderosum, atq; carnosius: nodi plures pino, sed duriores abieti. Quin & reliquis omnibus ferè duriores, quanq; mollius lignū est. Ad summam, nodi densissimi, solidissimi, patentioresq; abieti atq; pino: coloreq; tedæ proximi, & maxime sui generis, pinoq; magis, quam abieti: habet ut pinus ægidem, ita abies album, dictum lussion, ueluti ægidi respondens, nisi quod id habet album. Aegis uero, gratius colorata est, quoniam tedam gerit. Spissum hoc & candidum, pulchrumq;, ex arboribus iam uetustioribus gignitur, sed frugi, inuentu rarum, uile, copiosum. Faciunt ex eo tabellas pictorias, atq; codicillos plures, lautioresq;, & materie præstantiores. Arcades ambo ægidem uocitant tam pini, quam abietis, & copiosiorē esse abietis uolunt, sed meliorem pini. Abietis enim totam commodam, leuem, spissamq; pini uero exiguam & crispiorē, robustiorē, in totumq; meliorem. Sed hi nomine inter se dissentire uidentur: abies uero differentijs illis à pino distinguitur, ac etiam circumauctione, siue agnatione, quam superius diximus. Scissima nullas penitus differentias habet, sed ferè æquiparatur abieti: simplex genere est, erecta, leuis, enodis, crassitudine, altitudineq; æqualis ferè abieti. Quin & cætera non absimilis est: lignū coloratum, robustum, neruatūq;: cortex leuis, folium crassum, bifidum, oblongius, quam pino, extremo aculeatum: radices, nec multæ, nec alte descendentes: fructus leuis, glandeus in calice echinata, placida tamen, & leui, non hispida, ut castanæ, similis tamen illi dulcedine, atq; succo. Nasctur etiam montibus candida materie, quæ ad multa perutilis: etenim ad carpentia, lectos, subsellia, mensas, nauigiaq;: campestris nigra, & ad hæc minus utilis, fructum tamen similem ferunt. Taxus quoq; genere simplex, procerâ, auctu insignis, similisq; abieti, nisi quod non pariter excelsa, magisq; alis sinuata est: folio quoque abieti similis, sed pinguior, molliorq; ligno. Quæ in Arcadia nascitur, nigro, aut puniceo constat: quæ autē in Ida, flauo, & cedro simili: propter quod uendentes, fraudare dicuntur: tanq; cedrum uenundent. Totū enim cor esse cortice detractio. Corticem simile cedro habere, tum scabrida, tum colore: radices breues, graciles, per summaq; cespitum: rara hæc circa Idam. At in Macedonia, Arcadiaq;, uel fructū abunde proferre, rotundū, faba paulo maiore, colore rufum, tactu mollem aiunt: quod si iumenta folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil patiuntur: fructus & ab aliquibus hoibus manditur, suauisq; est, atq; innoxius. Est & ostrys species simplex, quæ nonnulli ostryam uocant: tam corpore, q; cortice scissimæ uicina, folio pini. præterq; quod id multo oblongius, inq; acutū depressius, atq; maius, neruo multiplici de medio constans. Reliquis autē rectis in modum costarum tum prolixius,

tum crassius potrectis: item per neruos rugatum, & ambitu leuiter serratum: materies dura, decolor, exalbida: fructus pusillus, oblongus, ordeo similis, colore flauus: radices sublimes: aquas conuallesq; arbor hæc gestit. Domum inferri minime idoneam tradunt: quippe mortiferam esse, & partus quacumq; fuerit, difficiles reddere. Tilia quædam mas, quædam femina: distant inter se tum materie, tum totius corporis forma, & quod aliter fructifera, altera sterilis. Nam materies mari, dura, flaua, nodosior, spinosiorq;: femine candidior, flexibiliorq;, ex quo cunas faciunt. Item femine odorator, & mas sterilis, nulloq; flore est: femina, & florem, & fructum gignit. Flos calicula interfectus præter folij pediculum, amentumq; futurus, pediculo altero annexus, uiridis, dum in calicula est: detectus autem leuiter flauus: floret cum urbanis: fructus oblongus, orbiculatus, magnitudine fabæ, similis ederae acino, quinis angulis, ueluti neruis eminentibus, inq; acutum, cum sese contrahentibus partibus, qui scilicet maiusculus est, minutiusculus autem confusior constat. Cum ille maiusculus scabitur, paruula quædam, ac prætenuia semina, quantæ tripliciter emittit, folium & cortex dulcia, suauiaq;: folium forma ederae, nisi quod in angulum acutiorem rotundatur. Et quanquam iuxta pediculum curuatus, tamen de medio in acutius coactum præterdit, scq; prolixius protrahit, crispum in orbem leuiter atq; serratum. Medullam exiguum materies continet: nec multo reliquo molliorem corpore, nam & reliquum ligni molle est.

Acetis, & fraxini genera.


Cap. XI.



Ceris (ut retulimus) alij bina, alij terna genera statuunt. Vnum, quod communi generis nomine acere uocant: secundum caprinum, tertium lectirotarium, uidelicet, ut Stagiritæ distinguere solent. Caprinus uero ab acere distat, quod acetri candida, atq; neruata materia, caprino autem flaua crispasq;, ampla ambabus: platano in sidendo similis. Venis enim in longum fluctuat, sed gracilior, macilentior, mollior, longior. Omnia eius fissa in acutum compressa, abscinduntur. Nec ita semifissa, sed summum potius præfissa multiter uia minus sunt, quam pro sua magnitudine esse debeant. Cortice paulo scabrius: ori, quam tilia uestitur, subliuido, crasso, spissioriq; picea, inflectiq; contumaci. Radices paucas & sublimes, crispasq; ferè magna ex parte tam flaua, quam candida gerit. Riguis potissimo nascitur, ut Idæi uolunt, inuētusq; rara est. De flore nasci aiunt fructum haud ualde oblongum, & paliuro similem, uerum oblongiorem assignant. At uero Olympi incolæ caprinum montanam potius esse uolunt. Acerem planis etiam nasci, atq; nascentē in monte flauam grate coloratam, crispam, & solidā esse; qua ad opera lautiore utuntur: campestem uero candidam, rariorem corpore, minusq; crispam, quam nonnulli gallicam, non acerem uocant: marisq; materiem crispiorē esse, atq; cōtortam, & planis eam potius nasci, germinareq; maturius. Duo & fraxini genera, quorū alterum excelsū, procerumq; est, lignū candidū, crassiusueniū, neruatum, mollius, enodius, crispusq; habens. Alterū humilius, minus acutē, scabrius, durius, flauius. Folia laurinis, lauri latifoliae similia, in acutius tamē coacta, & ambitu leuiter serrata, ac subidentia. Ramulus totus, quē folium unum putaueris, quoniā simul cuncta folia ferat, singulari pediculo, & singulis folijs coniugatum, ueluti per genicula pendentibus constat: amplo interuallo coniugationibus distinctis, similiter atq; in sorbo. Sunt alijs breuiora internodia, coniugationesq; pauciores: alijs utputa candidis longæ, pluresq;, & singula folia oblongiora, angustiora, coloreq; porracea: cortice leui, spisso, tenui, coloreq; rubro integitur: radicibus crebris, crassis, sublimibusq; adhaeret. Fructum Idæi nullum hanc habere existimant,

mant, atq; etiam flore carere. Fert tamen in siliqua fructum minutum nucis modo, qualis amygdalæ, gustu subamarum. Fert & alia quædam uelut muscos, quemadmodum laurus, uerum magis adstringentiâ gustum, singulaq; per se in orbem circumacta platani pilorum specie. Horum alia circa fructum, alia multo semota exesunt. Quin & implicamina quædam eodem modo nascuntur. Leuis illa locis potissimum concauis, madidisq; emigrat: scabra, siccis, atq; saxosis. Quidam alteram fraxinum, alteram bubulam. Fraxinū uocant, uidelicet Macedones. Maior, & rarior corpore bubula est, ob id minus crispa. Est enim omne campestre leue: montanū autem omne, scabrum. Quæ montibus nascitur, colorata, leuis, robusta, lentaq; est: quæ in planis, decolor, rara corpore, scabraq; assurgit. Ad summam, arbores sere omnes, quæ tam montibus, quàm planis eadem proueniunt, monte coloratæ ualde, candidæq; assurgunt, ut scissima, ulmus, reliqueq;: plano autem rariores corpore, pallidiores, deterioresq; præterq; pirus & fraxinus, ut Olympi incolæ uolunt. Hæ namq; in planis cum fructu, tum materie præstant, quippe montibus scabræ, spinosæ, nodosæq; proueniunt: planis autem leuiiores, fructuumq; dulciorem, carnosioresq; ferunt: uerum magnitudine campestris semper excellunt.

Quod cornu mascula, & femina. De cedro. Quocq; mespilorū, & forborum genera. Cap. XII

80  Ornus quædam mascula, quædam femina, quam & femini cornū uocant: habet foliū amygdalæ, nisi quod pinguius, crassiusq; cortice nectuosum, & tenuem: caudicem non nimis crassum. Cæterū femina uirgas paruas, sicut amerina, suo latere proferit, & fruticosior est: nodos ambeq; perinde ac amerina tum geminatos, tum inuicem congruos habent. Materies maris excors, totaq; solida, cornubus spissitate, firmitateq; similis: foemina uero medullâ continet, & mollior est, atq; cauatur: od id ad uenabulorū usum inutilis. Maris longitudo duodenorum maxime cubitorum, quanta uenabulorū macedonicorū longissimorum est. Caudex enim totus nulla excellentia extat. Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt, foeminā autem fructuosam. Nudum fructus oliuæ similem habet, gustu dulcis, odoratuq; gratus: flos oleæ: & floret, fructificatq; eodem modo, ut singulari pedicula plura proferat. Tempore quoque ferme conueniunt. At Macedones ambas fructificare affirmant, sed foeminæ fructū ingustabilem esse: radices autem modo amerinarum habere ualidas, & nulli perniciosi obnoxias. Nascitur etiā in humidis locis, nec tantum in siccis: prouenit semine, atq; auulsione. Cedrum quidam binam esse affirmant, alteram lyciam, alterā punicam: alij simplicem dicunt, scilicet qui Idam incolunt: est iunipero non absimilis: sed folio maxime distat, quippe cedro durum, acutum, spinosumq;: iunipero mollius: excelsior quocq; iuniperus nasci uidetur. Cæterū alij nominibus minime diuidunt, sed ambas cedros appellant: cedrum tamen cum additione, cedrum acutū nuncupant: ambæ nodosæ, alosæ, & materie tortuosæ: uel potius iunipero parua, spissaq; materies, breuiq; putrescens, cum cæsa fuerit, cedro maxima ex parte corde repleta & putredinem nullam sentiens: fructus cedro odoratus, pulcher, gustatū suauis, iunipero cætera quidem similis, sed niger, gustuq; alstringens, ut præ nimia acerbitate, propè ingustabilis sit: durat in annum, tum cum alter subnatus fuerit, præcedens decidit. At ut Arcades uolunt, fructus simul retinet ternos, id est, anni proxime exacti nondum maturum, & tertij ante præsentem iam maturum, atq; gustabilem, & tertium nouum ipsum demonstrant. Saryrus ambas sine flore sibi rusticos attulisse inquit: cortice cupressio similes uidebantur, uerum scabriori. Radices rare corpore ambabus, atq; per summa telluris dispersæ. Nascuntur saxosis, &

frigidis locis, & solum eiusmodi quaerit. Mespili tria genera, anthedon, satanea, gallica, ut Idaei diuidere consueuerunt. Fert satanea fructum grandiorē, candidiorē, solutiorē, lignumque incus mollius habentē: reliquae minorem, sed odore praestantiorē, magisque gustu alstringentē, ita ut seruari diutius possit. Lignū quoque his spissius, flauiusque; cetera autem simile. Flos amygdalae omnibus, uerum non rufus, ut illi, sed propere uiridis: magnitudine arbor ista excellit, gyroque comatur: folium magna ex parte infissum, quae uel apium parte postrema imitantur, ampliore figura: quodque promissum neruolum, apio tenuius, oblongius, rotumque circumtūsum est, & pediculo tenui, ac longo dependente ante decidat, uehementer rubet: radice numerosa, atque arborescens, ob id diuturna, & inextirpabilis est: lignum quoque spissum, solidum, nullamque sentiens putredinem habet. Nascitur & semine, & auulsione. Morbus earum, ut senescentes uermibus erodantur. Vermes isti grandes, & alij, quā qui in reliquis cernuntur arboribus. Sorborum duo genera dicunt, foeminam fructiferam, & masculam sterilem. Ceterum fructibus differunt, quod aliae orbiculatum, aliae ouatum ferant: distant & succis, nam omni quasi ex parte odoratiore, dulcioreque orbiculati sentiuntur: ouati saepe numero acidi, minusque odorati: folium ambabus rotum prolixo, neruaceoque pediculo constans. Singula uero in uersum condita, modo alae lateribus exeunt, tanque ex omnibus unum exultet, ad neruum usque laciniatum, uerum inter se ampliusculo singula distant. Decidunt non paulatim, sed simul tota illa alata facies. Sunt in uetustioribus, breuioribusque pauciora. Omnibus in postremo pediculi folium impar prominet, ut etiam cuncta numero impari abfoluant. Figura laurum tenuifoliam imitantur, uerum ambitu serrata, breuioraque sunt, nec in extremum acutum mucronata, sed in rotundius orbiculata. Flos racematim singulari pedicelo, & multis minutis, & candidis constans. Fructus quoque cum large fructificatur, racemi modo acruatus producit. Quippe multa eidem cohaerent pedicelo, ita ut faui quodammodo speciem gerat. Eroditur a uermibus super arborem, crudus adhuc, magis quam mespila, pyraque, quamuis hic maxime omnium sit acerbus. Ipsa quoque arbor uermibus obnoxia est, atque ita senescens exarescit. Et uermis eius peculiaris, rufus, pilosus. Noua admodum fructificat: etenim trima continuo parit. Autumno cum folium amiserit, protinus amenitatem gerit pediculum, pinguem, ac turgidum, quasi iam parturiat: germina itaque hyeme perdurant. Aculeis tam foribus, quam mespilus caret: cortice leui, pinguisculo: colore ad flauum albicante, nouae uestiuntur: annosae autem scabro, nigroque. Praestat haec arbor magnitudine, rectitudineque: coma concinna ornatur, quippe magna ferme ex parte nucis pineae figuram suo uertice capit, nisi aliquid impediatur. Materies solida, spissa, colorata, ualida. Radices haud multas, nec alte descendentes, ualidas tamen, & crassas, & incorruptibiles agit. Nascitur radice, auulsione, semine: solum gelidum, atque humectum quirit, quo tamen si uiuacior, abolerique contumacior, tamen montibus etiam nascit.

De ceraso, flamma Iouis, sambuco, salice, & eius generibus.

Cap. XIII



Arbor natura peculiaris cerasus est, magnitudine excellens, quippe, quae ad uigintiquatuor cubita crescat: recta, admodum crassa, ut & bicubitalem ambitum & radice compleat. Folium mespili, sed admodum durum, latiusque, ut & longinquo arborescens colore sit manifesta: corticis leuitate, colore, crassitudineque tiliae similis: quapropter cunas ex eo consueciunt, sicut etiam & corticibus tiliae. Hic neque recto meatu ascendit, neque gyro pariter obducit, sed mucronatim ambit, ab inferius sursum uersus se, ad minusque contrahens, quemadmodum foliorum descriptio. Cumque desquamatur, hoc eodem modo de

do decorticatur, alioquin præscinditur, nec pars aliqua eodem filo detrahi potest. Quin & per crassitudinem prætenuis modo folij scinditur, reliquumq; durare, arboremque tueri potest, simili modo ambiendo: reliquo autem cortice ablato, humor tunc quoque defluit: & cum externa tunica tantum detracta sit, reliqua pituitaceo quodam humore nigrescit, rursusque anno secundo, alia, uice illius subnascitur, uerum tenuior. Materies in neruo cortici suo similis, se in anfractum conuoluenti. Virgæ quoque eodem modo illico enascuntur. Ramis crescentibus euenit, ut alij deorsum assidue pereant, alij sursum uersus increpant: omnino arbor minus ramosa est, sed multo enodior, quam populus: radice multiplici perquam summa, sed non crassa innititur, & conuolutio eadem radice, & corticis radicem regentis est: flos candidus, piro ex mespilo proximus, ex paruulis floribus constans, forma fauaceus: fructus rubet, figura Iouis flammæ persimilis, magnitudine fabæ, uerum Iouis flammæ ne deus durus, ceraso autem mollis: nascitur ubi tilia, in plenum, ubi amnes, & rigua. Sambucus quoque iuxta aquam potissimum, locisq; umbrosis emicat, cæterum & in minus eiusmodi solo nasci non recusat: est fruticosa uirgis: quæ anniculæ, donec folia decidant, in longitudinem crescunt, tum in crassitudinem se distendunt: uirgis excelsio non nimis magna, sed sena maxime cubita: caudici crassitudo modo galeæ: cortex leuis, tenuis, spissus materies fungosa, & siccata, leuis, medulla præmolli constans, ut uirgæ totæ concauentur: quamobrem ex his baculos faciunt præleues. Siccata ualida est, & inoffensa aquis, etiam disquamata si sit: disquamatur sua sponte, cum exaruerit. Radices per summam cespitem non multas, nec grandes agit: folium, quod particula latim exeat, molle, atque oblongum, sicut lauro latifolia, uerum maius, latius, rotundiusq; de medio, subtriusque: extremo in acutum compressius, ambitu feraratum, totum autem circa unum pediculum, crassum, neruosumque, tanquam ramulus constat: & foliorum alia hinc, alia inde geniculatim, coniugatimq; adhaerent, ac inter sese spacio distant, unumque exit in cacumen: subrussa admodum folia, fungosaque sunt: defluit id totum simul, & hinc unum folium totum esse ratione putaueris. Ramis quoque nouelli quædam ad geniculorum speciem habent: flos candidus est minutis permixtis candidis constans, specie faui super fissuras pediculi. Redolet lirim, grauius enim: fructum uero non secus singulo pediculo crasso annexum, racematum profert. Hic maturefcens nigrescit, immaturus omphaceus est: magnitudine eruo paulo maior: humore, aspectu uinaceus, & interna uisu fessamacea continet. Salix quoque aquatica, & multigena est. Nam alia nigra dicta, quod cortice nigro, aut puniceo tegatur: alia candida, quod candido: uirgas pulchriores, & ad texendum commodiores nigra profert, candida spissiores. Est tam nigræ, quam candidæ genus quoddam paruum, & incremento in excelsum orbatum, sicut uel in cæteris arboribus idem intelligi potest, ut in cedro, & palma. Hoc Arcades non salicem, sed hellicam uocant, existimantq; (ut retulimus) fructum fecundum eam parere.

Ulni genera quot sunt. De populo, alno, betula, corylia. Cap. XIII



Vnt & ulmi genera duo, alterum montium, alterum ulmus uocatur: interest, quod ulmus fruticosior est, montium auctior: folium indiuiduum, leuiter circumserratum, oblongius quam piro, scabrum, non leue. Præstat hæc arbor, & amplitudine, & altitudine: non crebra circa Idam, sed rara provenit: amar rigua: materies flaua, robusta, neruata, deformis: quippe tota cor est. Utuntur ea, uel ad lautiores fores: & uindis casu facilis, sicca difficilis est: sterilis denique putatur, gummam in

peciolis gignit, & animalia quædam culicea, & amenta peculiaria gerit. Autumno multa, minuta, nigra: cæteris uero temporibus quid ferat, minus animaduersum est. Populus alba, nigraque, uniformes habentur: corpore ambæ erecto, sed excelsior, leuiores nigra: figura foliorum similis, & lignum cum ceditur, albedine simile est: utraque ne florem quidem habere existimant. Alpina, populo albæ non absimilis est, cum magnitudine, tum uero quod ramis albicantibus spargitur: folio ederae, sed parte altera sine angulo, altera oblongo, inque angulum exeunte acutum: colore parte resupina, pronataque ferme simili: pediculo prolixo, tenuique annexo, quamobrem non erecto, sed inflexo: cortice asperiori, quam populus alba, scabriusque, ut pinus sylvestris. Alnus quoque sterilis, & unigena est natura, corpore recto, ligno molli, medullaque molli, ut uirgæ graciliores totæ concouentur: folio piri, nisi quod ampliori, nervosiorique: cortice scabro, rufoque intus, quæ de causa coria tingit: radice summa, nec maiore quam laurus: nascitur in aquis, alto nullo pacto. Betula folio caryæ dictæ conditur, præterque quod paulo angustiori, cortice autem uersicolore, & materie leui, non nisi ad baculos utili. Colytea folio salici uicina est, ramosa, foliolaque, in totum amplius fructum in siliqua sicuti legumina gignit, eaque lata, non angusta: semen inclusum paruum, non magnus: durum modice, non nimis, nec abunde pro magnitudine sua fructificat. Sed quæ fructum in siliquis ferant, rara inueniuntur: quippe inter arbores, pauca huiusmodi habentur.

De nucæ auellana, terebintho, buxo, cratægo.

Cap. XV

10



Vx auellana (etenim hæc quoque natura sylvestris est) quoniam sylvestris, nullo, aut non multo deterius, quam urbana, fructificet: & hyemes quacumque perpeti possit, montibusque magna ex parte proueniat, & quidē sæcundissima tempora ubertate. Ad hæc quod non caudicosa, sed fruticosa, uirgis sine alis enodibus, uerum breuib, crassisque nonnullis assurgit. Cæterum & manifeste potest differi tamen, quod fructum meliorem, foliumque amplius habeat: circumserratū foliū ambabus, similimum alno, sed latius: atque arbos ipsa amplior, sæcundior assidue redditur, uirgis præcisis. Ambæ binō genere constant, quædā enim rotundam, quædā oblongā nucem largiuntur. Sed urbanarū fructus candidior est, locis aquis potissimo fructificat melius. Syluestres translatae mansuecunt, cortice summū habent tenuem, pingue, maculis albidis, peculiariter uariatū. Materies admodum lenta, ut pregraciles uirgæ, desquamate, crasse, derasæ renouentur. Habent modicam tenuem, flauam, quæ cocauant: peculiare his iulus callo compactus, ut retulimus. Terebinthorum alia mascula, alia foemina: mascula sterilis est, ob id sexui maris adscriptatur: foeminarum, alia fructum protinus rufum promit magnitudine lentis, qui concoqui nequit: alia uiridem eductum, rufum postmodum tingit, & cum uite maturescen-
tem nigrum nouissimo facit, magnitudine fabæ, resinofum, & sulfurosum. Circa Idam & Macedoniæ breuis, fruticosa, contortaque nascitur: at apud Damascum Syriæ, magna, copiosa, decoraque: montem enim quendam terebinthis refertū, ut nil aliud habeat, referunt. Materies ei lenta, radices ualidæ in profundo, atque in totū incorrupta hæc arbos habetur: flos oleæ, uerum colore rufus: folia circa unum pediculū, plerumque specie laurinorum coniugatim quemadmodum sorbo, quodque parte postrema acuminet, impar exit: uerum minus angulata, quam sorbo, ambituque laurino similiora, & pin-
guia cum uniuerso fructu. Fert & ad nucis similitudinē quædā concaua, ut ulmus: quibus bestiole, tanquam culices innascuntur. Fit in his resinofum quid, leniusque, sed resina tamē non hinc legitur, sed à ligno: fructus resine copiam non mittit, sed manibus tantum adhæret: & si non lauetur, postquam collectus est, inter se coherescit: cum uero lauat, candidus, præbeque maturus supnat, niger subsidit. Buxus magnitudine non excelsa, folio

myrto

myrto similis, nascitur locis algentibus atq; asperis. Quippe Cytora talis est, qua plurima prouenit. Olympus quoq; macedonicus, frigidus est: nam & in eo gignitur, quamquam non magna: maxima autem, pulcherrimaq; in Cyrena est. Proceram enim crassitudineq; cæteris longe præstantior, ideo uel insuaue est buxum olens. Cratægus, quam alij cratægionem uocant, folio mespilæ promisso scilicet est, uerum maior, latior, oblongiorq; nec serrato, quemadmodum illa sit. Hæc nec admodum magna, neq; crassa. Materies ei uersicolor, ualida, flaua: cortex leuis, mespilo similis: radix singularis, acta in profundum. Magna ex parte fructus rotundus, qui maturus scens siccatur, nigrescitq; gustu, & succo, mespilaceus: quapropter ueluti syluestris mespilus apparuerit: est specie simplex, & sine ullo discrimine.

ilicem præter glandem, granum quoddam ferre puniceum: necnon uiscum habere, & hyphear, atq; ideo quaternos habere fructus. De smilace, phellodry. Item phellodrys, atq;

ilicis fructum uocari acylum, Roboris uero glandem. Dein de arbutio, potulaca, pruno, ac subere. Cap. XVI



Lex folio roboris est, uerum minori, aculeatoq; cortice leuiori, quam robur. Arbor ipsa magna assurgit, modo roboris, si locū, solumq; adpiscatur idoneum: materies spissa, robustaq; radix alta admodum atq; multiplex: fructus glandosus, sed glans ipsa pusilla est: ueterem nouus occupat, nam sero maturefcit, quamobrem biserâ hæc à nonnullis exq̃ ilumata est. Fert præter glandem, granum quoddam puniceum, & uiscum, atq; hyphear habet. Quapropter ut fructus quaternos habeat nonnunq; contingit, binos proprios, binosq; alienos, uisci scilicet atq; hyphearis: fert à septentrione uiscum, à meridie hyphear. Smilacem Arcades uocant arborem ilici similem, folio tamen non aculeato, sed molliori, profundiori, differentiisq; pluribus distinguendum: nec materie, ut illa, solida spissaq; sed soluta, molliq; in operet: quod phellodryn iidē Arcades nuncupant. Natura huiusmodi est: simplici quidem ratione inter ilicem, & robur hanc esse putaueris: & quidam sceminam ilicem esse putarunt, ideoq; ubi illex nō prouenit, hac ad plaustra, similaq; uruntur opera, ut Lacedæmonij, & Elij. 40
Dores quidem uel agrestem eam appellant: est mollior, ac solutior ilice, durior ac spissior quercu, colore ligni decorticati, candidior ilice, fulutor quercu, folio similis ambabus: uerum maiori, quam illex, minori, quam quercus: & fructum pro magnitudine minorem, quam illex habet: maiorem, q̃ quercus. Fructum ilicis, huiusq; nonnulli acylum uocāt, roboris autem glandem: est & medulla manifestior, quam illex. Phellodrys natura huiusmodi est. Arbutus, quæ pomum cibo idoneum ferat magnitudine non nimium præstat: corticem tenuem tamarici similem habet, foliū inter ilicem & laurum: floret mense Iulio: flores singulari appendice parte postrema racemati coherent, specie quisq; myrto oblongo similis, ac magnitudine tantus, non foliatus, concuius tanquam ouum exalprum ore aperto: cum autem defloruerit, retinaculum perforatur: quodq; defloruerit, tenue, sicut uerticillis circa fissum, uel carniū doricus extare apparet. Fructus anno integro maturefcit, ut simul hunc haberi, atq; alterum flore sponderi contingat. Potulaca quoq; folio arbuti similis est, magnitudine non nimium præstans, cortice alio circumrupto solito, fructum arbuti similem parit. Prunus his folio similis, corpore parua. Peculiare in hac, fructum lanugine pappo dicta, perire: id enim de nulla alia arbore accepimus. Hæc regionibus, locisq; pluribus assignantur communia. Quædam uero propria locis, certis redduntur, ut suber arbor Pyrrheni familiaris, caudicosa, parumq; ramigera, admodum tamen procerâ, auctiq; insignis, ligno robusta, cortice unice crasso, durumpiq; solito, quemadmodum piceæ, uerum fragmensis grandioribus: folio fra-

xini, crasso, oblongiori, non perpetuo, sed deciduo: fructum glandosum aspidue fert, aquifoliae similem: detrahunt corticem, uniuersumque diuidendum censent: alioquin arborem deteriorem effici uolunt: rursum uero intra triennium repletur.

De colutea, colutea quoque, et lauru alexandrina, ficoque, et uiti: de quibus ea uide, quam uocant phalacras: quotque rhamnorum genera. Item de equo, et paliuro.

CAP. XVII



Olutea quoque Liparæ propria traditur, arbor magnitudine præstans, fructum in siliqua serens, magnitudine lentis, qui oues mirum in modum pinguefacit. Nascitur semine, & simo præcipue ouillo. Tempus serenum di, cum Arcturus occidit: serendum semine præmed facto, cum iam in aqua pullulare inceperit. Habet folium non ab simile scenograeco: germinat primo uniuersum, triennio maxime: quo quidem tempore baculos decidunt: tunc enim præstantiores esse uidentur: & si ita quis decurauerit, mox arbor emoriatur, haud enim latere plantigera constat: spargitur deinde in ramos, quartoque anno arborefcit. Arbor circa Idam proueniens, quam colyteam uocant, genus aliud est fruticosum, ramosum, alosum, inuentum rarum, non crebrum: folio laurino, lauri, latifolio, sed rotundiori, ampliori, ut uel ulmeo simile appareat, oblongius tamen: colore parte altera herbido, tergo autem albedo, neruolosque: tum ibidem neruulis prætenibus fibrisque, tum inter eas propagines, quæ de medio callo, in costarum speciem adducuntur: cortice non leui, sed quasi uitis uestitur: ligno duro, spissosque constat: radices per summa graciles, atque solutas gerit, sed uibratas, flauasque maiorem in modum: fructu, floreque carere putatur. Amentum autem, surculum, gemmasque citra folia, admodum leues, pingues, candidasque, facile amentacea fundit: præcisâ, uel igne deusta, ab imis subnascitur, atque resurgit. Illa quoque propria esse circa Idam feruntur, laurus alexandrina cognominata, & ficus quædam, uitisque. Lauri proprietates, quod fructum super folia gignit, quemadmodum myrtus syluestris: quippe fructum ambrosie super dorsum folij ferunt. Ficus fruticosa est, nec excelsa, sed crassa, ut uel cubitali ambitu sit, ligno contorto, lento, inferius leui, nulloque ramo superius, gyro comato, colore tam folij, quam corticis liuido, figura folij tilie similis: mollia quoque, lataque sunt, magnitudine similia: flos mespili, & cum mespilo floret: fructus, quem ficum appellant, rufus, magnitudine oliuæ, sed rotundior, gustu mespilaceus: crassas radices agit, ut ficus urbana, lentasque: nunquam hæc putret, & cor solidum, non mollem medullam continet. Vitis nascitur ea parte Idæ, quam uocant Phalacras: est fruticosa, uirgis paruulis, & ramulis cubitalibus penè exporrigitur: quibus acini laterales nigri adherent, magnitudine fabæ, dulces, qui lignum uinacei modo intus continent: folium rotundum, indiuiduum, paruumque. Cæteris quoque montibus propria quædam natura dederat, alijs arbores, alijs frutices, alijs reliquæ materię aliquid. Sed proprietatem singulis locis inesse, dictum sæpius est: discrimen autem quod in prædictis unigenis, tam arboribus, quam fruticibus præcipitur, in reliquis quoque plurimis pari modo, ut exposuimus, intelligi potest. Exempli gratia: in rhamno, paliuro, equo, oëto, fluida, edera, rubo, multisque alijs. Rhamnorum enim, alia nigra, alia candida, fructusque diuersus, ambæ uero aculeigeræ: æquorum quoque alia candida, alia nigra: & flos, fructusque utriusque pro ratione discriminis, alius candidus, alius niger: nonnulli etiam medij quodammodo sunt, quibus flos in purpuram candicans, nec enim fuluus, nec exalbescens est: folia quoque tenuiora, leuioraque candida, ut uirgæ, similiter graciles, & leues. Paliurus quoque differentias nonnullas habet: omnes autem fructiferæ sunt. Et paliurus quidem in siliqua fert, in qua terna, aut quaterna semina gignit, quibus medici contra tussim contusus utuntur: habent enim lentitiam quandam, atque pin-

guedinem, ut semen lini. Nascitur locis dilutis, & aridis, sicut rubus: sed non minus diluta querit: folijs deciduis est, non perpetuis, quemadmodum rhamnus.

Rubi genera quot: ac de canirubo, fluidarumq; generibus, & medicamento ossio, quod fluida dicitur. Item de edera, similace: deq; arbore appellata Eno-
nimo. Cap. XV III



Vbi genera plura, sed maximo inter se discrimine distant: quod quædā erecta excellatq; quædam propè à terra, protinusq; deorsum uergens: cumq; se terræ coniunxerit, radicans rursus, quæ humirubum quidam appellant. Canirubus autem fructum subrutulum parit, malo punico similem: est inter fruticem, atque arborem puniceæ, non absimilis folio amerinæ. Fluidarum, aliam masculam, aliam feminam dicit, quod alia sterilis, alia fructifera sit: nec uirgas longas gerit, neq; crassas: folium ulmeo simile, nisi quod parum oblongius, densumq; aliquantulum: ramulorum nouellorum folia paribus internodijs coniugatim condita adherent, & planè è lateribus ordo uersus conspici-
tur. In sicut his cortarij alba coria. Flos candidus, racematim enascens. Hic ubi de-
fluxit, fructus cum labrusca rubescit: fiuntq; ceu lentes tenues congestæ: figura his quoq; in modum uuæ. Medicamentum fluida dictum, ossium in his continetur: radix per summa, & simplex, ut facile auelli possit radicatus: lignum sine medulla, & cæsum quoq; incorruptum perdurat. Nascitur omnibus locis, sed in argilaceis pos-
sissimo præstat. Edera quoq; multigena est: quædam enim humi repens, quædam se in excelsum attollens. Et excelsarum genera plura, sed trina summa patescunt, candida, nigra, tertiæq; clauicula. Horum item species plures: quippe alia fructu ran-
tum candida, alia etiam folijs: rursus fructum tantum candidum ferentium, alia ma-
iufculum, densum, & uelut in globum circumactum fructum profert, quæ corym-
biam quidam uocant. Athenienses acharnicam rigum eam appellant. Alia mi-
norem, sparsiorēq; modò nigre. Habet nigra differentias, sed non hunc in modum conspicuas. Sed clauicula differentijs maximis discernitur, etenim folijs plurimum distat, cum paruitate, tum quod angulata, concinnioraq; sint, cum edera rotundio-
ra, simplicioraq; habeat. Distant etiam internodiorum longitudine, atq; etiam steri-
litate, quoniam fructum quædam non ferant: quod non in ederam transfigurent, ut quidam uolunt: at uero si omnes edere scant, ut alijs placet, ætatis certe, dispositio-
nisq; nō generis erit discriminis: quemadmodum piræ ad pirastrum. Tamen eius quoq; folium multū ab edera distat, uerum id rarum, & in paucis euenit, ut uetustate per-
mutetur, ceu in populo alba, & crotone. Ergo clauiculæ plura genera: sed quæ con-
spectiora, summaq; occurrant, tria sunt: herbacea, ac uirens, quæ plurima est: secun-
da candida: tertiā uersicolor, quam thraciā quidam appellant. Et harum quæq; di-
stare uidetur: quippe herbaceæ quædam folio tenuiori, oblongiori, atq; etiam den-
siori: quædam minus hæc omnia habens: & in uersicoloris genere, alia folio amplo-
ri, alia minori, macularumq; habitu diuersa: pari modo & magnitudine, coloreq; distant. Auctu perfacilis herbacea, inq; plurimum uenit: manifestam, quæ edere-
scar affirmant, nō tantū folijs, quæ maiora, latioraq; habet, uerumetiam germinibus: protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea uero crassiora, breuioraq; ac edera, ut semen proferre incipit, germen sublime, rectūq; edit. Est quidē uniuersa edera radice numerosa, dēsa, flexuosa, surculosa, crassa, nec nimis alta, sed præcipue nigra, & inter candidas, quæ asperissima, immixtissimaq; habe-
tur: quā obrem eius amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat & excicat, ablato alimēto. Crassatur hæc maiorē in modū, atq; arborefcit in tantū, ut per se ipsa edera arbor fiat. Attamen ex maiore parte semper super aliud uitam degere solet,

atq; (ut ita dixerim) amplexicaulis est, ita pro sua natura, uel quiddam eiusmodi illico gerit. Nam ē germinibus radículas alidue inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quasi de industria à natura exhibitis: atq; ita humorem auferens, exhauriensq; arefacit: & si inferius succidatur, nihilominus uiuere durareq; potest. Habet uel aliud discrimen non mediocre in fructu: nam alius dulcis, alius uehementer amarus, tam in candida, quam in nigra: indicium, quod alium aues mandunt, alium minime attingunt. Edera ita se habet. Smilax, id est, edera ciliica, amplexicaulis ipsa quoq; assurgit: fructus aculeatus, & uelut præhorridus. Folium edere, parum, sine angulo, iuxta pediculi retinaculum humectum: peculiare, quod mediū illum tallum, qui instar spinæ animantium secat, prætenuem habet, & interualla staminea, non ex eo porrecta, ut cætera, sed circa eum in orbem circumacta, ab annexu pediculi ducit, ad caulem uero foliorū internodia consummantem: uillus ab eisdem pediculis, atq; folia tenuis, seq; conuoluens dependet. Flos candidus, suauiter olens, uerno proueniens tempore: fructus proximus herbæ folano atq; melothro, & maxime uuæ labruscæ uocitata: racemi peniles ut ederae sunt, uerum ad labruscam potius ducunt: nam de eodem puncto pediculi acinorum exeunt. Colore fructus rutilus est: nucleos in uniuersum quidem binos continet, quantū grandior ternos, & paruulus unum. Nucleus durus admodum est, & colore forinsecus niger. Peculiare racemis, quod per latera caulium sepiunt: postremoq; caulis, racemus omnium maximus propendet, sicut in rhamno, & rubo: unde fit, ut extremo fructifera, latere large fructifera ista spectetur. Arbor Euonymus dicta, nascitur cū alibi, tum in Lesbo insula, monte Orcynio, cui nomen Ordyno: magnitudine mālū punice, atq; folio eiusdem maiori, quam Vincaperuina: & molli, ut punica. Germinare mense Septembri incipit, floret in uere: flos colore albæ uolæ similis, odore infestus, uelut cruorem inferens: fructus cum putamine siliquæ sesame proximus, intrus solidus, prætereq; quod in uersus diuiditur quaternos: hic pecus enecat gustatus: quinetiam folium idem facit, & potissimum capras, nisi purgentur, interimit. Purgantur autem anocho. Et de arboribus quidem, atque fruticibus dictum iam est: reliqua de cætero indicandum.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI
TERTII FINIS.

THEOPHRASTI DE HISTORIA PLAN
TARVM LIBER QVARTVS.

Quibus locis quæque arbores gaudent.

Cap. I



L XPOSITAE superius sunt differentiae unigenorum: omnia uero suis locis meliora proueniunt, magisq; uigent: nec syluestribus loca propria defunt, sed singula sibi accommodata sortuntur, quemadmodū urbana. Quædam enim aquosa, & palustria adamant, ut populus, ut salix: deniq; omnia, quæ secus flumina nasci solent: quædam ædita quærun, atq; aprica: alia potius umbrosa. Pinalstrum enim pulcherrimū, amplissimumq; apricis emigrat, umbrosis autem nasci omnino nequit: contra abies umbrosis pulcherrima, apricis haud similis sibi assurgit. Itaq; in Arcadia circa Cranam uocatam, loco quodam cōcauo, & silente à uentis, quem nunq; solem attingere aiunt, abietes plurimum

rimum tum longitudine tum crassitudine cæteris præstant: non tamen pariter frequen-
 tes, neque pulchre cernuntur, sicut etiam pinatriti, quæ locis umbrosis enascantur.
 Quamobrem ad lautiora operum, ut fores, cæteraque magnificiendâ hisce minus utun-
 tur, sed ad nauigia, domosque duntaxat: quippe trabes & antennæ ex his optimas fa-
 ciunt, atque etiam malos præstantissima longitudine, sed non similiter ualidas, atque
 ex ijs, quæ soli expositæ stant: sed ex breuitate densiores illis, robustioresque. Taxus
 quoque, & padus, & thraupalus gaudet uehementer umbrosis. Montium cacumini-
 bus, locisque algentibus thuiâ enascitur, & excelsa quiddam. Abies & iuniperus nascun-
 tur quidem, sed non in excelsum, sicut etiam circa Cyllenum promontorium eue-
 nit. Celsatrus quoque summis, gelidissimisque prouenit locis. Igitur hæc frigidorum lo-
 corum auidæ, ratione posueris: reliqua uero (ut ita dixerim) omnia apricis potius gau-
 dent. Verum id quoque pro modo suæ cuique telluris euenit. Itaque in Creta insula mon-
 tibus Idæis, Leucisque uocatis, super summa, quibus nix nunquam deest, cupressum
 comperiri affirmant. Nam id genus syluæ plurimum, & in montibus, & omnino in
 insula est. Sunt autem (ut dictum superius est) tam in syluestribus, quam ex urbanis,
 alia campestria, alia potius montana. Inque montibus ipsis ad portionem alia in imis,
 alia in summis proueniunt, ita ut & pulchriora, & fertilia exurgant. Vbi quoque autem
 uniuerseque syluæ pars ad septentrionem spectans, ligna spissiora, pulchrioraque pro-
 fert, & summata meliora: atque omnino robustiora in aquilonijs exeunt, augentur,
 atque proficiunt: densæ in longitudinem potius, ideoque enodes, rectæ, proceræque fi-
 unt, remique ex his optimi sumuntur. Potius autem in profunditatem, & crassitudi-
 nem distenduntur: propterea obliquiores, nodosiores, atque in totum solidiores,
 spissioresque assurgunt. Has easdem ferè differentias habent & quæ opacis, æstati-
 permotis nascuntur: nodosiores enim, breuiiores, minusque rectæ, quæ apricis, quam
 quæ flatibus expositis locis extant. Quod autem singula terram propriam, cœlique
 accommodatam temperiem querunt, eo sanè manifestum, quod quædam loca ali-
 qua ferunt, quædam nec sponte ipsa nascentia, nec satis facile ferunt: & quanquam
 apprehenderint, fructum nullatenus pariunt, ut de palma, & moro ægyptia, alijsque
 quibusdam retulimus. Sunt enim plura, locisque pluribus, quæ tamen scripturæ, non
 tamen augeri, fructificareque possunt, sed uitiata in totum assurgunt: de quibus for-
 tasse dicendum est, in quantum habeamus historię.

De moro ægyptia, & ficu cypria, & filiqua, & persea, glandis, & nucifera.

Caput II



Vnt enim pleraque in Aegypto arbores, ut morus, & persea dicta, &
 glans, & spina, & alia quædam, quæ peregrinari omnino nequeunt.
 Morus similis quodammodo moro nostri est: quippe folio, magni-
 tudine, aspectuque proxima. Fructum præter cæteras peculiariter gi-
 gnit, ut uolumine primo differuimus. Non enim germinibus, non ra-
 mis, sed caudice pomum parit magnitudine sicus, & uisu proximum: succo, atque sa-
 pore caprificis sanè simile, uerum longe dulcius, granisque internis omnino carens:
 multitudine numerosus maturefcere nequit, nisi scalptum: quod ungibus ferreis
 scalpitur: quæ cum scalpta sint, ad quartum diem maturefcit: hisce ablatis, alia & alia
 ex eodè loco subnascuntur, nullo diuersa: idque alij ter, alij sæpius facitari affirmant.
 Lactuosa arbor admodum est, & ligno ad multa percommodo. Proprium id præter
 cætera habere uidetur, quod cæsum continuò uiride est. Siccatur autem in profun-
 do aquæ: mergitur enim in profundas fodinas stagnaque protinus, atque conditur, ma-
 defactumque in profundo siccat: cumque siccum omnino fuerit, superfluitat, atque
 innatat: itaque probe cõditum esse uideatur, sit enim leue, atque solutum. Morus pro-

prietates hæc sortita est. Proxima natura eius uidetur, quæ in Creta ficus cypria nuncupatur: nam illa quoque fructu caudice, ramisque crassissimis fert, nisi quod genus quoddam sine ullo folio, tanquam radicula mittit, cui fructus præpilarur. Caudex magnus & populo albæ similis, folium ulmo in fructus quaternos perficit, totiesque germinat, sed nullum ad maturitatem perducit, nisi pomo ipso immaturo inciso, emissisque lacte. Dulcedo ficibus non absimilis, & interna grossis planè conueniunt: magnitudo autem pruni est. Similis etiam siliqua, quam Iones Ceroniam uocant. Nam & ipsa caudice maximam fructus partem expellit, ramis autem (ut diximus) paucè fert. Siliqua, quam ægyptiam ficti quidam appellant, errore scilicet (nulla enim omnino in Aegypto, sed in Syria nascitur, & in Ionia circa Cnidum, Rhodumque) folijs semper comantibus, flore candido, & olente grauissimè, radice leuiter sublimi, atque omnino plantigera imis partibus est, superius tamen subarscens: fructum antinicum simul, & noui habet: altero namque detracto post Canis ortum, protinus alterum gigni patet, gignitur enim uix modo indidit et atque uniformis: tum autem circa æstuum, & æquinoctiis floret: dehinc hyeme exacta, durat usque ad Canis ortum. Ergo similitudo quidem, quoniam hæc etiam fructum caudice fert, differentiis autem prædictis à moro utique distinguuntur. Est in Aegypto alia quoque arbor perfecta dicta, aspectu magna, formosaque: folio, flore, ramo, totaque figura potissimum piro uicina: nisi quod altera folio perpetuo, altera deciduo est. Fructum abunde parit, omni tempore perficit, quippe nouus anniculum semper occupat. Maturitas anni uersariorum afflatu cõficitur: reliquum cruditiorem auferunt atque recondunt. Est magnitudinem piri, figura oblongus, amygdalæ modo, colore herbidus, nucem intus quemadmodum prunus continet, uerum longeminorem, mollioremque: carnem uehementer dulcem, suauem, concoctumque facilem: nil enim eos, qui nimium comederint, tentat. Radice arbor exuperat, tum longitudine, tum etiam crassitudine, multitudineque: materiem robustam, & uisum gerit decoram, atram, ut faba græca. Ex hac etiam simulacra, & lectos, & mēsas, & reliqua similia facit. Glans à fructu nomen accepit: foliū ei simile atque myrto, oblongius tamen: illaefa, magnaque arbor est, uerum non recta, sed contorta. Fructus putamine cõtuso unguetarij uti solent: est enim boni odoris, sed fructus ipse inutilis, magnitudine, uisumque in ruri proximus: materies ualde, & tam ad alia quam ad nauigia percommoda. Cuciofera quæ appellatur, palmarum similis est, similitudinem in caudice, & folijs representans: sed differt, quod palma indiuidua, simplexque assurgit: hæc cum aliquatenus increuerit, scinditur, sicque bifida, iterumque horum utrunque pari modo diuiditur. Item uirgas breues, nec multas profert: cortice sicuti palmarum ad utensilium nexus utuntur. Fructum peculiare parit, nam & magnitudine, & figura, & succo singularem: quippe magnitudine feramē, qua manum impleat: rotundum, non oblongum, colore flauicantem, succo dulcem, & ori gratissimum: non cõgestum, ut palma, sed per singula discretum: nucleum magno, uehementerque duro, ex quo annulos uersicolores detornant, quibus in singularijs uinculis utuntur. Materies à palma plurimum distat, altera enim rara corpore, neruosa, & uiridis: altera spissa, grauis, carnosaque, & cæsa, crispa admodum atque dura. Persæ quidem maiorem in modum eam præferebant, sed lectiones pedes ea cõfidebant.

De spina, quotque eius genera. Itē de pruno, et arboris magnitudine circa Memphim. Cap. III



Pina ex eo nomē accepit, quod tota arbor aculeis horret, excepto caudice: nam & super germina, foliaque aculeos gerit: magnitudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum. Tectis idonea cæditur. Eius duo genera sunt, quædam enim candida, quædam nigra: altera imbecillis, facileque putrescens: nigra autem robustior atque incorrupta: ob id

ob id in nauis fabrica ad costas, uentrisq; compagine ea utuntur: erecta non ualde
 affurgit. Fructus in siliqua modo leguminis, quo incolæ coria perficiunt uice gallæ.
 Flos & pulcher aspectu, ut coronas ex eo facerent: & medicamentis perutilis, qua de
 causa colligi à medicis solet. Fit & gumma ex ea, manat tum arbore percussa, tum
 sponte, sine ulla fissura: cum autè cæsa fuerit, anno tertio protinus refurgit. Copia
 huius arboris large habetur, & sylua ingēs circa agrum Thebanū est, ubi & robur,
 & persea, & olea quoq; eo loco emigrat: non aquis fluuij riguo (distat enim plus q̃
 trecentis stadijs) sed suis fontibus, qui circa eum tractū permulti exsiliunt. Oleum nū
 hilo deterius hoc nostrate habetur, nisi quod deterius olet, quoniam natura sole raro
 10 utatur. Materies arboris dura: & cæsa, colorē celtis utiq; repræsentat. Alia quædam
 arbor prunus habetur insignis magnitudine, fructū ferens natura, & magnitudine
 mespilis proximum, nisi quod rotundū nucleum habet. Florere incipit mēse Iulio,
 fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit. Qui circa agrum Thebanū colit,
 propter arboris copiam, fructum siccant, lignoq; exempto tundit, offasq; faciunt.
 Nascitur peculiaris quædam materia circa Memphim: non folijs uel ramis, uel tota
 forma proprietatem sortita, sed affectione, quæ accidit: quippe facies eius spinosa,
 foliumq; filicibus non absimile: sed cum ramulos quisquam tetigerit, folia quasi he-
 betata concidere, tum tempore aliquo post reuiuiscere, rursusq; uirere assument.
 Atq; propriè quidem eius regionis, tanq̃ si quis arbores, aut frutices dicat, insignia
 20 hæc assignantur. Nā de ijs quæ in fluuio atq; paludibus exant, postea disseremus,
 cum de reliquis etiā aquatilibus uerba faciemus. Omnes autè huiusmodi arbores
 suis locis magnæ, tum lōgitudine, tum crassitudine assurgūt. Itaq; circa Memphim,
 arborei tanta magnitudine esse ferūt, ut tres homines nequeat eius amplecti cau-
 dicem, cuius etiam materie cæsa commoda operibus est: admodum enim spissa, co-
 loreq; celtis arboris est. In Africa uero celtis plurima, optimaq; gignitur, necnō &
 paliurus: quin & quibusdā partibus, ut Nassamonico agro, & apud Ammonem,
 aliosq; exsistit. In Cyrenensi autè cupressus, oleaq; optime prodeunt: oleumq; plu-
 rimum fit. Sed omnium maxime peculiare laserpitium est: nam id quoq; copiosum
 ea regio profert, odoreq; suauissimum.

30 De Ceste, & Paliuro, & palmis Africæ sitientis: & Micro monte, ubi Liberum patrem natum
 subulantur, deq; malo medicæ, & persicæ. Caput IIII



Celtis proprium genus præstat, magnitudine quanta pirus, aut paulo
 minore: incisuras foliū habet, ac ilicis esse uideatur: materies nigra. Ge-
 nera eius plura, fructibus inter se discreta prodūtur: fructus magnitu-
 dine fabæ, maturefcit uuarum modo, uarie colores immutās: nascitur
 quemadmodū myrta aduersa inter se, densus super germina, gustatu
 inter Lotophagos dictos prædulcis, suauis, innocuus, atq; etiam bonæ frugis. Ven-
 tribus est suauior, qui sine ligno interiori est: nam uel genus huiusmodi redditur, &
 40 uinū eo exprimitur. Multa hæc arbor, fructuq; copiosa est. Exercitū itaq; Ophelli,
 cum in Carthaginē proficisceretur, uel eo fructu diebus pluribus pastū cōmeatum
 defectu, accepimus. Est igitur in insula Lotophagia Pharide uocata larga copia, ce-
 terum nō minor in continenti, sed longe largior est: plurima enim hæc omnino in
 Africa, & paliurus, ut retulimus: quippe apud Hesperides hisce ad urendū utitur.
 Sed hæc celtis distat ab ea, quæ Lotophagorum. Paliurus certe fruticosior est, folio
 huic nostrati similis: fructu diuerso, nō enim lato, sed rotundō, rubroq; magnitudi-
 ne, qua cedri, aut paulo minore: nucleū nō mandēdū, modo acinorū punici habet:
 fructum uero iucūdum per se, atq; si quis uinū infundat, tum ipsum suauiorē, tum
 uinū suauius reddi asseuerant. Nonnulli celūm arbore fruticosam, ramosamq; tra-

dunt, caudice firmo, uel fidei, fructu nuce obducto, parte externa minime carnosa, sed potius pelliculari: cibo nō tam dulci, q̄ gustatu alijs grato, & uinū quod eo exprimitur, non nisi binos, aut ternos dies durare, dein aclescere: suauiores itaq̄ fructum apud Lotophagos esse, maieriem autē optimam in Cyrenæa prouincia, tractumq̄ Lotophagorum seruidiorem cōfirmant. Radioem autē esse quidem multo nigriorem, q̄ lignum, sed minus spissam, & ad pauciora commodam: quippe tantū ad pugiones, glutinamētaq̄ usui est. Lignum, tibijs, & alijs plerisq̄ expetitur. Parte autē Africæ, qua nunc pluit, pleraq̄ alia, & palmas magnas atq̄ optimas puenire aiunt. Cæterū ubi palma, falsilaginem, & rigū esse locū, nec admodū in profundo aquam cōperiri, & dulcē & ibi salinam inuicē propinquas. At ubi reliqua oriūtur, solum siccū, & omni aqua orbatū esse: alibi uero puteos etiā esse centū passuū, ut non nisi iumentis per uerriginē haurire possint. Quamobrem miram quo tandē pacto effossæ sint altitudines tam profundæ. Igitur aquas subditas palmis uel ad Ammonis delubrum esse ferūt: uerum differentiā, quam diximus, obtinet. Thymū quoq̄, parte pluuiæ carēte, plurimū nasci, & alia peculiaris naturæ complura, atq̄ etiam leporem isthic gigni, & damam, & struthum, & alia ex genere bestiarum. Sed hæc an locū aliquē bibendi gratia petant, incertū est: præsertim cū post dies aliquot bibant, ut nonnulla ex urbanis tertio, uel quarto die potū ducitur. Serpentes autē, lacertæ & similia, quod sine potu uiuere possunt, nulli dubiū est. Afros hæc enim mādere affirmare aiunt, qui uel apud nos uermis quidā multipes, aterq̄ gignitur, sese in orbes conuoluēs: hunc autē locis illis multū admodum nasci, naturaq̄ esse humidum narrant: rore uero partē carentem pluuiæ, semper abundare: quapropter palmam, & si quid aliud humectis proueniat, partim eo quod de terra ascēdit, partim ratione cœli cōstitat nutriti. Satis enim humoris est, pro magnitudine, & natura eorū, utpote sicca, & ē siccis constante: & pro desiderio arborū, quæ cum plurimæ nō sunt, tum peculiare nascuntur. De laserpito qualem naturā fortiatur, postea indicandum. In Asia uero apud singulos peculiaria quædā proueniūt: quædā nanq̄ proferūt terræ, quædam nullo modo producūt, ut in Asia ederam, & abietem parte superiore Syriæ, itinere à mari quinque dierū, enasci negāt: sed in India usam in monte, cui Mero nomen, affirmāt, quo Liberum patrē ortum fabulæ aiunt. Qua de causa Alexandero cum aliquādo ex India descēderet, coronatus & ipse, & exercitus ibat. Harpaltus uero in Media tantū locare eam cōtendit, serēdo sæpe in hortis Babylonijs, & curiosē colēdo, sed nihil efficere potuit. Hæc enim nullo pacto uiuere ualebat, sicut reliqua, quæ aduecta de Græciā sunt, hospitari pariebantur. Hoc igitur ob cœli cōditionem regio recusat. Et buxum uero, & niliā uix summo conatu recipit: nam his & cultores hortorū uehementer laborant. Alia uero tum in arborū genere, tum in stirpe humili, peculiaria gignit. Et omnino plaga ad exortū, atq̄ meridiem spectās, ut anis mala, ita etiā plantas præter cætera loca peculiare ferre uidetur, ut Media prouincia, & Persis tam alia plura, q̄ mālum, quam medicā & persicam uocāt. Habet hæc arbor foliū simile, & penē æquale, atq̄ potulaca: aculeos quales pirus, aut spina acuta, sed leues, acutosq̄ uehementē & ualidos. Pomum eius non manditur, sed odore præcellit, necnon & foliū arboris odoratissimū est. Et si inter uestes pomū ponatur, inoffensas conseruat. Vtile & cum medicinā mortiferā quis biberit, uel ad oris suauem olētiā: quippe si quis interna pomi in iure, aut aliquo humore cōcocta in os expresserit, digesseritq̄, suauē halitū reddet. Semen detractū Vere sulcis seritur diligētissime cultis, rigatur deinde quarto, aut quinto die: cum aut maiuscula fuerit, transfertur Vere iterū ad molle, rigumq̄ foliū, nec ualde tenue, tale enim desiderat. Fert poma omnibus horis, alijs decidentibus, alijs subnascētibz, alijs mature scētibus, Floribus his tantū fructus enascitur, qui (ut diximus) ueluti colū quandam exantem,

extantem, in suo medio gerunt: qui enim ea careant, infœcundi labuntur. Seritur etiam sicilibus in uasis perforatis, quemadmodū palma. Hæc itaq; (ut dictum est) Persidi, Mediæq; familiaris habetur.

De ficu Indica, alijsq; multis Indicæ arboribus, quotq; bebeni sint genera. De Terebintho Indica: deq; lanigeris arboribus, necnon seminibus, et herbis Indicæ. De orizæ. De spina cādida, que herculacea dicta est.

Caput V



10

Indica autē regio, arborem sicū uocatam sortitur, quæ ē ramis radices dimittit singulis annis, ut primo uolumine retulimus: dimittit aut non ex nouellis, sed ex anniculis, atq; etiā uetustioribus. Illæ se terræ cōtum gentes, ceu sepem circū arborem faciūt, ita ut ueluti tabernaculū condatur, quo etiā morari homines solent. Radices autē nascētes euidentissimè à ramis discernūtur: sunt enim albiore, hirtæ, tortuoseq; binaq; fronde soliatæ. Item arbos comam supernā lasciuā gerit, totaq; fornicato ambitu pulchre orbiculatur, & magnitudine uehemēter excellit: quippe umbrā bīno stadio facere fertur: & crassitudine caudicis, pleraq; ultrā q; sexaginta graduum orbē colligere, magna uerò ex parte quadraginta. Foliū pelta nō minus habet: fructum admodū paruum, magnitudine ciceris, ficui similē: quamobrē Græci ficum eam arbore appellabant. Parū mirum in modū fructificat, nō tantū pro magnitudinis desiderio, uerum

20

etiā omnibus rebus. Nascit arbor hæc circa Acesinam amnem. Est & alia arbor & magnitudine insignis, & suauitate fructus, amplitudineq; mirū in modū præcellēs: hoc sapiētes Indorum, qui nudi degūt, cibo utūtur. Alia cui foliū specie prælōgum, simile pēnis struthiorū, quæ super galeis imponūtur, lōgitudine duorū cubitorum: alia cui fructus longus, nec rectus, sed cōtortus, cibo dulcis, sed morsus in aluo, difficultatesq; facit intestinorū: ob id Alexāder ne quis manderet, interdixit: alia cui fructus similis cornis. Sunt & alia plura ijs diuersa, quæ Græciā gignit, sed nomine carent: nec mirum quicq; ex eorū proprietate putandū. Nam (ut quidā referūt) nulla omnino arbor, nullus frutex, nulla herba similis ijs cōperitur, quæ in Græciā proueniūt, paucis exceptis. Hebenus quoq; eius regionis uernacula est. Huius duo ge-

30

nera cōstant, alterum materie laudatū, pulchrumq; alterū uile, uitiatumq;. Rarum, quod præstātius: reliquū permultū habetur: colorem commēdatum, non re cōdita, sed statim sua natura capescit: fruticosa est cythi modo. Ferūt & terebinthū habent, ut alij similem terebintho: cui folia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia: fructus autē diuersus, similis enim amygdalis. Nam & in Bactris terebinthū hanc esse, ferreq; nuces amygdalarum magnitudine: quonā non magnas, sed uisū similes, & suauitate amygdalis præstantiores, & ideo loci illius homines his potius uti. Plantæ autē ex quibus uestes conficiunt, foliū moro simile habēt, corpore autē toto rosæ caninis proximæ cernūtur: ferūtur ordinatim, quapropter ē longinquo aspicienti, uites apparēt. Palmas quoq; nonnullæ partes pleraq; habēt. Hæc in arborū genere. Fert

40

& femina propria, alia leguminibus similia, alia tritico, alia ordeo. Cicer enī & lens, & reliqua nostræ regionis ibi haudquaq; habētur, sed alia quædā nascūtur, quibus edulia proxima cōficiuntur: nec discerni queunt, ut ferūt, nisi quis audierit. Est & ordeū, & triticum, & genus quoddā aliud ordeī syluestris, quo & panē suauem conficiūt, atq; alicam bonā. Id Græcorū equi cum principio manderēt, interibāt: deinde paulatim, cū paleis affuerit, nihil penitus lædebantur. Serūt potissimum quod orizam uocāt, id semini nūcupato simile est, pistumq; tanq; alica, redditur cōcoctū perfacile, aspectu solijs simile: statq; magna parte tēporis in aqua: effundit nō spicam, sed ueluti subam modo milij, atq; panici. Est enim aliud quod Græci φάρων, id est lentē uocabant, hoc uisū fœno græco simile est; metitur circa uergiliarum occasum. Interest

etiam terræ ipsius ratione, quod quædā omnia ferat, quædā nō ferat. Quippe mon-
tuosa & uitē, & oleam, & nucleū pomorūq; uniuersum possidet genus: uerū oleam
sterilē, & natura penē inter oleastrū, atq; oleam. Item specie tota distat, & foliū latius
hoc, angustius illo. Hæc in India. In regione autē Aria dicta, spina est, ex qua lachry-
ma gignitur, illyria similis tam uisu, q̃ olfactu: hæc ubi sol illuxerit, desit. Quin &
alia multa præter hæc nostratū tum agris, tum amnibus proueniunt. Alijs locis spi-
na candida nascitur ramis ternis, ex qua regulas, atq; baculos faciūt: succosa, humo-
ris lactei, fungosaq; est: herculaceam hanc appellant. Est etiam aliud, stupis humilis,
magnitudine quidē raphani, folio uero tam magnitudine, quā forma lauro similē
id qui comederit protinus moritur. Quocirca ubi equi adessent, nuncq; eos à mani-
bus laxabant. Codrosia provincie nasci quiddam folio laurino referūt, cuius quan-
tulumcunq; iumenta comedisent, mox interibant: similiter affecta distentaq;, atq;
illi, qui morbo comitali uexantur. Aliam autem esse spinam, folio nullo, radice sin-
gulari: aculeum acutissimū quoq; in nodo gerētem, quo fracto, aut attrito, succi las-
cium multum effluere, qui cæteris omnibus animalibus cæcitatem infert. Homi-
nes autem

Quibusdam item locis herbam quandā exte sub qua serpētes minutos admodum
connatos manere: quorum iclu, moriendum protinus esset, cum herbā quisquam
aggressus fuerit. Quin & à palmis incoctis strangulari, qui comederit, idq; postea
perspectum. Sed huiusmodi uires, tam animalium, quā plātarum, uel apud alios
forsitan competiri possint.

Arbores odoratæ ubi nascūtur, & quæ sint. Quid ferat septentrio. Item quid quoque loco proueniat.

Quid in Creta, Rhodo, Lycia, Ponto, Propontide. Quid Thmolus, Olympus, Ida, quidq; multi
alii montes ferant. Quæ in toto orbe loca ad naualem materiam. Caput VI



Inter plantas autē omniū maxime superfluit, plurimumq; à reliquis
distant, quæ in Arabia, Syria, Indiaq; odoratæ nascūtur: ut thus, myr-
ra, casia, laser, cinnamomū: quotquot alia huiusmodi, de quibus alio
uolumine plene retulimus. Ergo plagis ad exortum, meridiemq; uer-
gētibus, & hæc ipsa peculiaria, & alia his plura proueniūt. At uero se-
ptentrionem uersus nō ita est: nihil enim effatu dignū narratur, præter communes
has arbores, quæ & loca frigida amant, & apud nos quoq; reperiuntur: ut pinus, ro-
bur, abies, buxus, castanea, uilia, reliquæ similes. Nihil enim præter hæc aliud habet,
sed potius ex humilibus quædam, loca argentea quærunt, ut febrisfuga, absinthium.
Item quæ radice, succo uē medētur, ut uerratrum, agiatorium, scammonia: cuncta
ferē quorū radix expetitur. Quædā enim in Ponto, ac Thracia gignūtur: quædā cir-
ca Oetam, Parnasum, Pelium, Ossa, Parthenium. Multa etiā in Arcadia, & agro
laconico exeūt: nam ea quoq; regio medicaminibus scatet. At odoratorum nihil
his penitus, cōsecratæ excepta, quæ in Illyria, & circa Adria prouenit: & laudata
quidem, cæterisq; longe præstantior. Verū in feruidis, meridianisq; locis, uelut ex op-
posito, copia odoratorum habetur. Cupressum quoq; loca feruida magis habēt, ut
Creta, Lycia, Rhodus. At ex ijs quæ mansuescere possunt, laurū, myrtum, quæ mi-
nime in frigidis durare affirmāt, minusq; myrtum: argumentoq; capiunt, quod in
Olympo laurus multa, myrtus nulla omnino, in Ponto autē toto neutra est: quanq;
summo studio, omniq; solertia ferere cōstāt ad usus religionis. Fici tamen multæ,
magnæq;, & punica, amplæ opacitatis habentur: quin & piri, & mālī permultæ, ac
uarij generis, maiorem in modū bonæq; frugis, & uernæ, præterq; si quæ ferotinae.
Ex syluestribus uero robur, ulmus, mālus, & similes: sed pinastrū, abies, atq; picea
desunt, & omnino quæ tedam in se gerunt. Humida hæc autem, & multo deterior
Sinopensi: quapropter non multus est eius usus, nisi ad ea, quæ sub diuo. Hæc circa
Pontum,

Pontum, aut certe locis quidem eius quibusdā haberi nouimus. In Propōide uero & myrtus & laurus montibus multis in locis prouenit: sed fortasse sunt etiam quæ locorū propria poni debeant, quippe cum singula (ut retulimus) diuersa secundū materiam habeāt: non solum quod eandē meliorem, deteriolem ue possideant, uerum etiā quod ferant, nec ne: ut Thmolus, Olympusq; mysius nō cē, & castaneam plurimā ferūt: item uitē, mālū, punicā. At Ida, quibusdā earū caret, quibusdā perraras habet. Et circa Macedoniā, & Olympū picricum, quædā earum comperiuntur, quædā minime: in Eubœa uero, & circa Magnesiā euboicæ multæ quidē habentur, ē reliquis autē nulla: nec circa Pelūm, nec reliquis montibus tractus
 10 istius. Quin & ad naualē materiem locus ibidē exiguus est, & omnino in uniuerso terrarum orbe: quippe cum Europe, Macedonia, & Thracia, & Italia tantū habere uideatur. Asia uero, Cilicia, Sinope, Amysus, adhæc Olympus & Ida, uerum non multum. Cedrū enim Syria gignit, eaq; ad trēmes utuntur. Et ea uero, quæ aquas adamant, ac secus fluuios degunt, parī modo intelliguntur.

De platano, & Algarum generibus, ac bryo: item de marinis, quercu, & abiete, & uite,
 & ficu, & palma.

Caput VII



10 Latanum enim esse in Adria negant, præterq; circa Diomedis delu-
 brum: inq; uniuersa Italia raram esse affirmāt: quantū multū, magniq;
 fluuij utrobq; diluant: sed locus planē recusare uidetur. Dionysius ty-
 rannus maior, ambitiosius cōtendens in Rhegio cōseuit in hortis eas,
 quæ nunc in gymnasio stant, nec ullā magnitudinem capere possunt.
 Contrā, alia loca plantarum habēt plurimā, alia ulmo & salice scatent, alia tama-
 rice, ut Hæmus. Hæc tgitur quemadmodū diximus, locorum propria poni debent
 pariter in syluestribus atq; urbanis. Cæterum in quibusdā fieri forsitan potest, ut
 20 ager cultu diligētissimo adhibito ferre queat, quot uel nunc, & animalium, & plan-
 tarum quibusdā euenire uidemus. Summam uero differētiā naturæ arborum,
 & ad summam plantarum existimandum, ut inter prima retulimus, quod alia ter-
 rena, alia aquatila ex plantis quoq; ut ex animalibus constant. Etenim non solum
 30 in paludibus, lacubus, fluuijsq; uerum etiā in mari materiæ quædam proueniūt hu-
 miles, & in extero etiam arbores. Quippe in hoc nostro exigua omnia nascuntur,
 & nihil ferē super mare emicat: at in illo, & hæc eadē excedunt, & alia de arboribus
 maiora longe assurgunt. Nostri itaq; tractus euidentissima communissimaq; algæ-
 rum genera sunt ignotiora uero, & maxime propria ratione locorum, abies, ficus,
 quercus, uitis, palma. Horū alia iuxta terram, alia pelagica, alia ambobus locis com-
 munia: & quædam multigena, ut alga, quædam unicum genus sortita. Nam algæ
 quoddam genus, folio lato, colore herbido est, quod porrum quidam appellant,
 alij cingulum: radice hirta, extrinsecus squamata, intrinsecus longa admodū, cras-
 40 saq; plene cepigethys non absimili: aliud folio crinito, terræ ipsi adhærens, sæpeq;
 mari tantū alluitur: alterum altius degit, nascitur quidem in mari extero circa Her-
 culis columnas, misra magnitudine, latitudineq; ut ferunt, amplius, quā ut manu
 apprehendi possit. Fertur hoc ad mare internum fluxu extrinsecus, portumq; id
 appellant: annuū esse aiunt, & nasci Vere desinēte, utgere æstare, minui autumno,
 interire atq; decidere hyeme. Quin & reliqua omnia nascētia deteriora, obscurio-
 raq; hyeme fieri. Hæc itaq; ceu terrena circa mare deprehendunt. Alga uero prope
 niens in alto, quam spōgiarū pelagicā deferūt, in Creta insula iuxta terrā, super sa-
 xa, plurima, optimaq; prouenit: qua nō solum uitas, sed etiā lanas, uestesq; inficiūt, &
 quandiu recēs infectio sit, color longe purpurā præstat. Gignit parte aquilonia tum
 copiosius, tū melius, ut etiā spongiæ, reliquaq; similia. Sūt alia graminibus proxima,

quippe folio simili, & radice geniculata, longa, oblique adhaerente, modo graminis, & caule calamaceo, ut gramen, magnitudine alga multo minora. Est aliud bryum dictum, folio coloris herbidum, amplo, nec lactucis dissimile, rugosiore tamē, & uelut contracto: caret caule. Sed ab uno initio plura folia huiusmodi exeunt, & rursus ab alio. Nascitur super lapides, fistulāq; iuxta terrā. Et minora quidē hęc lermē traduntur. Quercus autē, & abies terrenae quidē ambae spectantur: nascitur uero super lapides atq; fistulae: caret radiobus, sed modo patellarū adhaerēt. Folii ambabus uelut carnosum, oblongius, crassiusq;: & abieti crassius, frequē, nec leguminū siliquis abūmīle: cōcauum intus, nec quicq; intra se cōdnens: quercui tenue, ac potius tamaricis: color ambobus accedēs ad purpurā: forma tota abietis erecta, quercus flexuolior, atq; in latitudine magis ampliata: ambae uel multicaules sūt, sed simpliciores abies: rami abieti, longi, recti, solutiq;: quercui breuiores, cōtortiores, spissioresq;: magnitudo tota ambabus cubitalis, parum uē altior, uerū maior (ut simpliciter dicā) abieti. Quercus uel ad lanas inficiēdas utilis mulieribus: ramis adnexa pendet pleraq; animalū testigerorum, subter alia quā dā cauli ipsi adhaerēt: ad quā dā tota obesa ingreditur mulipede, & aliae quādam generis eiusdē bestiolae, quodq; polypi specimen gerit. Hęc itaq; terrena, contemplatūq; cōstant facilia. Quidam autē uel alterā quercum nascenē in alto referūt, quae etiā fructum fert, & glans eius comoda est. Quin & alias magnitudine insignes quā dā compertas, homines nantes seq; summergeites referre, traditur. Vitis utroq; nascitur loco: nam & terrae proxima, & pelagica est, & maiora fert folia, farmēta, fructumq;. Ficus folio caret, nec magnitudine praestat, color cortici puniceus. Palma pelagica est, caudice admodū breui, uirgis rectis ferē, quae subtus exeunt: nec in ambitu, sicut rami uirgarū, sed uelut in latitudinē sigillatim cōtinuatae, nonnūq; etiā inter sese differētes. Virgarum autē, seu furculorum ipsorū similis natura quodāmodo est, folijs spinarū acanicarum, ut soncis, atq; similibus. Hi tamen erecti, nec quemadmodum illa, circumflexi, & folijs a mari corrosi: nam eo quod mediis caulibus trāsmeat per torū, reliquis quoq; aspectus proximū est color his & caulibus, atq; uniuersae plantae ruber intese, atq; puniceus. Et ea quidem, quae hoc in mari proueniūt, tot esse uidētur. Spongia namq; quae & plysiae uocantur, & quicquid eiusmodi, naturā alteram planē sortiuntur. In extero autē circa Gaditanum fretum, porrum (ut retulimus) nascitur, & ea quae in lapidem transfigurantur, ut thymum, & quae lauriformia sunt, & reliqua.

Apud mare rubrum in Arabia nullam arborē prouenire praeter spinam stitentiē: idēq; mare belluis plēnū, plurimāq; habere caniculas. De plantis, & arbusculis mirae naturae: deq; magnis arboribus in insulis, quas & flus operit. Item circa Persidem magnus esse arbores. Caput VIII



Maria autē rubro uocato in Arabia paulō a Copto superius, arbor nulla in terra prouenit, praeter spinā, quae dipas uocatur, & hęc rara, propter seruores, & aquae penuriā: quippe nō nisi quarto, quintoq; anno pluit, & tunc impetuose, & breui tempore. At in mari nimirū exēit, easq; laurum & oleam appellant. Laurus atq; similis ex toto est, olea folio tantū: fructum olea proximum his nostris oliuis parit, & lachrymam emittit, ex qua medici sistendo sanguini medicamentum componunt, quod fieri laudatissimum solet. Cum autem aquae plures inceserint, fungi iuxta mare quodam in loco erumpūt, qui sole tacti in lapidē cōmutantur. Mare hoc belluis refertum, plurimasq; caniculas habet, in tantū, ut nare tutū non sit. In sinu autē Heroo cognominato, ad quem descendit Aegyptij, laurus est, & olea, & thymū: uerum nō uiridia, sed lapidis specie parte a mari eminente, similia tamen uiridibus tam folijs, q̄ germinibus. Colos quoq; floris in thymo, tantū nondū perfecte floruerit, liquidō deprehēditur.

Longitudo

Longitudo arbuscularum cubitorum ternorū est. Qui uero ex India missi ab Alexandro nauigarij, plātas marinas, quoad in aqua sint, colorē algæ minutæ habere: cum uero exemptæ ad solem ponuntur, mox salī similes fieri narrauerunt. Luncos quoq; lapideos apud mare id prouenire, quos nemo uisū a ueris potuit discernere. Eo mirabūdijs referūt nasci arbusculas quasdā, colore cornu bubuli, ramis asperas, & cacumīnibus rubentes, quas cum cōpressius tractātur, frangi, & igni iniectas, ut ferrum exardescere: restinctas tamen trāquillari, ac eundē colorem seruare. Insulis autem quas operit æstus, arbores nasci ingentes, magnitudine platanorum, populorumq; altissimarū: & contingere, ut cū æstus inuasit, reliquæ omnes totæ integantur, maximarū uero cacumina extent, ad quæ naues religuntur: cumq; æstus recesserit, ad radices æquo modo annecti possunt. Folia arboribus laurea dicunt: florem uiolæ, & colore, & odore: fructū magnitudine oliuæ, & hunc odoris admodū boni: folia nunq; decidere, florem & fructum primo autumno nasci, uere defluere. Alias quoq; uisas in eodem mari semper folia retinētes, & fructū lupino similem serentes retulerāt. Circa Persidem Carmanīæ cōterminam, qua maris æstus fieri solet, arbores magnæ similes potulacæ tam forma, q̃ folijs spectātur, fructum plurimū serentes, amygdalis similem extrinsecus, interna uero singulis quasi connexa inuolutantur. Subprodūt istæ arbores omnes ā mari parte mediā, stantq; radicibus polyporum modo: cū enim æstus recesserit, omnia inspicī possunt. Aqua uero nulla omnino eo in loco est. Riui nanq; aliqui relinquuntur, quibus nauigant, qui & ipsi maris particulae sunt. Quamobrem constare quidā existimāt, quod ipso mari alitū, non aqua: præterq; si quid ē terra stirpibus attrahant. Quod ramen & ipsum falsum esse haud dubie intelligi potest, quippe cum ne in profundum quidem radices descendunt. In totum genus idem mari, atq; terra nascentium esse uolunt: & marina quidē pusilla, & ficus specie prouenire: terrena uero magna, atq; uiridia, floretq; odorato, & fructu modo lupini.

De arboribus quæ in Tylo insula, quarum nonnullæ lanigerae sunt. De plantis, quæ in amnibus, paludibus, stagnisq; proueniūt: deq; Papyro, Sati, Mnasio. Caput IX

IN Tylo autem insula, quæ in sinu Arabico est, parte ad orientem spectante, tantā arborum multitudinē esse affirmant ubi æstus recesserit, ut locus frequentissimo uallo munitus relinquatur: atq; his omnibus magnitudo, quæ fico: flos odore excellēs, fructus inguitabilis, & uisu lupino similis. Lanigeras quoq; arbores multas eandē insulam ferre proditum est: has folia uitigena gerere, uerū minora, fructum nullum. Id in quo lana cōtinetur māli amplitudine cerni, uerū nascens compressum, cum tempestiuæ maturitatis sit, aperiri, & lanā excipi, qua telas textūt, alias uiles, alias preciosas. Hoc idem & in India (sicut dictū est) & in Arabia fieri asseuerant. Esse etiā alias arbores flore uiolæ matronalis affirmāt, uerū sine odore, magnitudine uel quadruplo uiola maiore. Est & alia quædam arbor foliosa rosæ modo, florisq; roseti: hunc noctu comprimi, folis exortu aperiri, meridie in plenum expādi, uespertinerū colligi paulatim noctūq; concludi: incolæ eum dormire tunc dicere affolent. Quin & palmas & uites, & genera nucum, pomorumq;, & ficos, quibus folia nunquam decidunt, nasci eadem in insula affirmans. Aquam coelestem fieri quidem, sed non ad fructus usū esse, sed fontes in insula esse permultos, quibus omnia rigentur: & eam aquam frumentis, arboribusq; magis prodesse: qua de causa, post pluuiam protinus hāc perfundunt, quasi illam ablucere, atq; abstergere uelint. Er arbores quidē maris exteri, quæ hactenus exploratæ habētur, tot ferē esse constat. De ijs autem, quæ in amnibus, paludibus, stagnisq; proueniūt, deinceps dicendū est. Quæ locis huiuscemodi

degant, tribus generibus consummari omnino uidetur. Sunt enim alia arbores, alia ueluti herbacea, alia frutetitia. Harundinem, gladiolum, fleum, iuncum, butomū, quæ omnibus ferè fluuijs, locisq; eiusmodi communia sunt: nonnulq; & rubi, & paliuri: & arbores, ut salix, populus, platanus: quædā usque adeo, ut aqua occultentur, quædam ut parū excedāt: quorūdam radices, & caudicis aliquid tantū in aqua, reliquū totū corpus extrā patescit. Hoc enim salici, alno, platano, ulix, deniq; omnibus aquarum auidis euenit: quæ & ipse omnibus ferè fluuijs cōmunes certō intelliguntur. Nam & in Nilo platanus prouenit, non tamen multa, atq; etiā populus est rarior: at fraxinus, & quæ bubula fraxinus cognominatur, plurima est. Quæ itaq; in Aegypto nascitur, in totum quidem numerosiora utiq; sunt, q̄ ut membratim enumerari queant. Cæterum (ut simpliciter, ac absoluta ratione agamus) omnia cibo idonea, succosq; dulces habetia percipiuntur: sed præstare dulcedine, copiaq; alimoniz tria illa uidetur, Papyrus, & quod uocatur Sari, & tertium, quod Mnasium appellant. Nascitur papyrus non in altitudine gurgitum, sed propè intra duo cubita, nonnulq; etiam minus: crassitudine radices qua uola uiri robusti, longitudine super dena cubita prouenit: super terrā ipsam radices obliquas, tenues, dēscēsq; in limum demittens sursum, quos papyros dixere, profert, triquetros, angulatos, magnitudinem quaternorū ferme cubitorum, coma in utili, exiliq; fastigiatos: fructus nullius fœcundos, hosq; ex multis partibus mittit. Radicibus pro ligno utuntur, non tantū ignis gratia, sed ad uasa quoq; plurifariam faciēda: quippe materiem amplam, probamq; præstat. Papyrus ipse ad plurima utilis, etenim ex eo nauigia faciūt, & e libro uela, tegetesq; texunt, & uestem quandam, atq; stragula, ac fures, aliaq; plura: & quidem externis hominibus chartæ euidentissimæ habentur: sed summam, frequentissimamq; opem, & in re cibaria præstat. Omnes enim incolæ, & crudū, & elixum, & assum manducāt, & succum deuorāt: manducamentum autē expuunt. Talis papyrus est, talesq; usus præbet. Nascitur & in Syria circa lacum, quo & calamus odoratus: unde & Antigonus in re nauali fuses fecisse proditur. Sari in aqua prouenit, circa paludes, plana q; ubi amnis recesserit: habet radicē prædurā, flexuosamq; ex qua, quæ farsa uocant, exeunt: his longitudo duū cubitorum, crassitudo pollicaris. Triangulū id quoq; papyri modo, & comam similē gerit: qui manducāt, eius quoq; manducamentū expuunt. Radice fabri ferrarij utūtur: carbonem enim optimum facit, propter ligni duriā. Mnasium herbacets annumerandum, itaq; usum nullum exhibet, præterq; in re cibaria. Dulcedine quidē præstare tradita hæc sunt. Nascitur etiam aliud in paludibus, stagnisq;, quod terram minime attingit: natura lilij simile, sed foliosius, & folia inter sese quasi uno condita uersu: color uiridis admodum: usus eius medicis ad mulierum profluuia.

De faba, loto, & corfio loto radice, & malinathella.

Caput X




Aba in paludibus, stagnisq; exit. Caulis eius, q longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo digitalis est, similis calamo molli, nō geniculato, rimas intrinsecus habet tendētes per totū lilij modo: caput super hunc fauo orbiculato uespærum non absimile: inq; singulis cellis singulæ fabæ continentur paululo super id eminentes, multitudine plurimū terdenæ: flos duplex, q; papaueris: color roseus in plenū caput: super aquam folia ad singulas fabas amplexa exeūt: fabam quanq; cōterenti amarū illud, ex quo pilula fit, inflexū patescit. Fructus ita se habet. Radix crassissima, hārūdine plenior, rimas similiter, atque caulis habens: manditur, & cruda, & elixa, & assa, eoq; cibo qui incolunt paludes, utuntur. Nascitur itaq; sponte uel plurima: cæterum, & seriatur in limo, paleis large admixtis, ut descendat, incorruptaq; maneat, sicq; fabera faciunt,

faciunt. Sin autem semel apprehēderit, perpetuò manet: radix enim ualida est, nec: procul harundinum stirpibus, uerū spinis subhorrēs: quamobrem crocodilus eam refugit, ne occurrēns oculo offēdatur, quoniā acute nō uidet. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciciāq; sed tractus ipsi nō plene cōficiunt. Et circa Toranam agri caldidici quodam in lacu exit, magnitudine mediocri, ubi & percoquitur, & perlicitur, & in plenū fructificat. Qui lotus uocitatur, planis parte maxima prouenit, cū rura inundantur: huic natura caulis similis fabæ, & fructus eodē modo, uerum minores, gracilioresq;. Nascitur fructus in capite, modo quo in faba: flos cādidus, lilijs soliorum angustia proximus: multi, ac densi promiscui exeunt: sole occidēte se comprimunt, 10 caputq; integunt: ad ortum aperiuntur, & super aquam assurgūt: idq; facit dum caput perlicatur, floresq; defluant: capitis magnitudo quanta papaueris maximi, & percingitur incisoris nō alio modo, quā papauer: nisi quod in his fructus frequētius habetur, qui milio nō absimilis est. In Euphrate caput, floresq; mergi referunt, atq; descendere usq; in medias noctes: tantumq; abire in altum, ut ne demissa quādem manu capere sit: diluculo deinde redire, & ad diē magis: sole oriente iam extra undas emergere, floremq; patefacere: quo patefacto amplius insurgere, ut planē ab aqua absit alte, Aegyptij capita ipsa acerbis putrefaciunt, cumq; tegumenta putruerint, in flumine lauando separant fructum, & siccantes, pincentesq; panem faciunt, eoq; cibo utuntur. Radix loti corium appellata, rotunda est, cotonei mālī amplitudine, cortice nigro, quali nux castanea tegitur: corpus internum: candidum, elixum, assumq; in specimen albuminis uertitur, gratū cibis: mādatur etiam crudum, sed gratus decoctum, seu aqua, seu pruna. Quæ non nisi in aquis cōperiri queant, tot serē explorata habentur. Locis autē arenosis, haud procul à fluuio nascitur terrenum, quod malinathallam appellant, figura rotundum, magnitudine mēspili, sine nucleo, sine cortice, folia ut gladiolus mittit. Hæc incolæ legentes in britō ordeaceo decoquunt, dulcia admodum efficiūtur, hisq; pro bellarijs utuntur. Omnia nascentia inibi bobus, pecoriq; cibo idonea sunt. Sed inter omnia genus quoddā præstantius stagnis, paludibusq; exoritur, quod & uiride pascit, & siccatum bobus hyeme præbetur. Est etiam aliud frumētis sponte internascens, quod cum syncerum à frumēto secreuerint, leuiter plāsentēs, hyeme, solo humescente ferunt: æditum mesunt, & siccant, atq; ita bobus, equis, lumentisq;, id quoq; cum fructu subnascente, pabulo præbent: fructus magnitudine sesamæ, rotundus, colore uiridis, bonæ frugis maiorem in modum. Hæc ferē superuacua in Aegypto notari possunt.

Fluuiorum singuli quid priuatim ferant. De tribulo, ac plantis Lacu Orcomenij, quæ sunt salix, oleagnus, sida, barundo tibialis, gladiolus, pbleum, tipha, mentiflora, icma, ipnum.

Caput XI

40  Lutuorum singuli priuatim aliquid ferre uidentur, ut & loca terrenas: Nec enim tribulus in omnibus, nec ubiq; erumpit, sed palustribus fluuium tantū: altitudine cum profundissima quonorum cubitorum, aut paulo profundiore, ut in Strymone fluuio. Tanta penē & harundo, & reliqua prodeunt: nihil autē eius excedit, præterquam ipsa folia inflexa quodāmodo, & occultata tribulum. Tribulus ipsemersus in aquā, pronus ad inuē uergit: folio amplo ad effigiē ulmē, pediculo admodū longo, caule parte summa quidē crassiori, unde folia, fructusq; dependēt: inferna autē graciliori, continue usq; ad radicē capillamenta quædā indidem exorta gerente, quæ maxima ex parte aduersa inter se congruunt: nonnulla etiā discrepant, subtus ab radice ampla exeunt, superiora assidue ad minus, minusq; procedunt, ut postrema omnino exiguasint, & differentia magna ab radice ad caulem exulset: pleraque lateraliala gerat

mina insurgant, quippe terna, quaternaq; quorum maximum assidue, quod ab ra-
dice propius absit, tum quod post id sequitur, & reliqua deinceps pro ratione. Ger-
men ipsum, quod latere promitur, uelut caulis alter est: primo quidē gracilior, sed
folio, fructuq; similis: fructus niger, durusq; uehementer: radicem quantum, qua-
lemq; habere, querendum. Talis natura tribuli est: nascitur semine decedente, ger-
menq; in Vere suum emittit. Radicem alij annuam, alij diuturniorem affirmā, &
caulem ex ea oriri. Hoc igitur querendū propriū, præter ea, quæ reliquis insunt.
Capillamenta illa cauli adnascenda intelligūt: hæc enim nec folia, nec caules esse
uidentur: nam lateralis quidem ipsa germinatio communis harundine, alijsq; ha-
betur. Propria itaq; priuata, communia publice contemplari congruum est. Quin
& secundum loca diuidendum, ut si alia palustria, alia lacustria, alia fluuialia potius
sint, aut etiam omnium locorum cōmunia: & quænam in humido, ac siccō eadem
nascantur, & quæ in humido tantū: utq; simpliciter agam, ad ea quæ uolumine pri-
mo exposuimus cōmunissime digere dum est. Lacu itaq; Orchomenio arbores,
materiæq; humiles illæ proueniunt, salix, oleagnusq;. Oleæ, amerinæq; speciem præ-
fert, sida, harundo tibialis, & reliqua, gladiolus, phleum, tipha: ad hæc mensiflora,
icma, & quod ipsum appellant. Quod enim icma uocat, alius mergitur in aqua.
Horum reliqua quidem explorata habentur. De oleagno, sida, mensiflora, icma,
ipnoq;, quæ alijs quoq; locis forsitan proueniūt, alijs appellata nominibus, reserere
debemus. Est oleagnus natura fruticosa, nec cæteris amerinis absimilis folio: figura
quidē proximo cæteris, sed molli, ut mālus, lanuginosq; flore populi albæ, uerum
minori, fructu nullo. Nascitur plurima super insulas fluitantes. Sunt enim & in eo
quædam fluitantes, ut in Aegypto circa paludes, & in Thesprotide, alijsq; stagnis
sed illæ minus aqua implentur. Talis est oleagnus. Sida specie papaueri similis est:
tale etenim caput gerit, nisi quod amplius: ad portionem magnitudine mālī tota am-
plitudo: nec nudum, sed cādīdis membranīs intectum: hisq; forinsecus folia herbe-
scentia proxima rosis adhuc in calice contentis, quaterna se applicant: apertum gra-
na rubra ostendit, figura non modo papaueris, sed orbiculata, exigua, nec multo
nilio maiora. Saporem dilutum quendā ut triticū, reddit: crassatur æstate, pediculo
paruo annectitur: flos calicis rosæ similis, sed maior, & ferē duplex magnitudine.
Hunc itaq;, & foliū super undas emicare affirmāt: mox cum defloruerit, fructusq;
compilatus sit, magis in aquam declinari, demum terram attingere, fructumq; fun-
dere. Fructificare autē in lacu tria: hoc, & butomum, & phleum, proditum est. Fru-
ctum butomī nigrum dicunt, magnitudine sidæ proximum. Phlei anthe'llam uoca-
tam, quo ad lixiuium utuntur, id placentaceum quoddam est, molle, rubidum. Et
phlei uero, & butomī scemina sterilis est, ad nexum utilis, mas inutilis. De icma &
mensiflora, & ipno querēdum. Peculiare inter hæc maxime tipha est, partim quia
folio caret, partim quia non ut reliqua radice numerosa adhæret: nam illa deorsum
uersus non minus turgent, uiresq; intendunt: potissimo gladiolus, sicut etiam gra-
men: qua de causa difficile hæc intereunt, & omnino genus eiusmodi uniuersum
diuturnius est. Radix gladioli plurimum inæqualitate à cæteris distat, quod pars
quædam crassa carnosaq; sit, quædam gracilis atq; lignosa. Quin & germinatione,
generationeq; refert: nascitur enim de ramaceo illo radix altera tenuis, iuxta latus:
deinde caro rursus in eo cōglobatur, ex qua sese caulis promit, in quo positum ger-
men est. In profundum quoq; radices eodē modo demittit: quamobrem omnium
maxime mori cōtumax, euelliq; difficilis est. Proxime ferē gramen ē geniculis or-
tur: radices enim geniculatæ, atq; ē singulis germen sursum, radix subtus erumpit.
Pari modo & spina quæ ceanothos appellatur germinat: uerum huius radix non
harundinosa, neq; geniculata est. Hæc prolixius propter suam affinitatem placuit
explicari.

explicari. Vt quoque autem loco, id est, & terra, & aqua, saltu, harundo (excepta tibiali) gladiolus, tipha, phleum, butomum exeunt: sicut in aqua tantum: de tipha ambigitur. Maiora autem melioraque semper inter utroque loco nascuntur, quae in aqua exeunt esse affirmant. Insulas quoque floatantibus nonnulla eorum provenire, ut gladiolum, butomum, phleum, ita ut partes easdem omnino seruent. Cibo idonea ex nascentibus lacu, sicut, & ipsa & folia omnibus, germen suis, fructus hominibus: phlei, tiphae, butomique pars tenera ab radicibus proxima est, ut quam pueri paruuli potissimum mandunt. Radix sola phlei pecudibus pabulo est: cum autem squalor uiget, nec humor, qui perlueret cacumina, incelsit, omnia squalent, quae stagnis degunt: sed praecipue harundo, de qua utique indicandum restat, nam de ceteris sepe omnibus satis iam dictum est.

De harundinibus, quarum genera duo, de quibus sagittaria, quae appellatur à quibusdam cretica. Cap. XII



Arundinis duo genera tradunt, tibialem, & reliquam: quippe unum genus reliquae deprehendi, sed inter se invicem firmitate, crassitate, tenuitate, exilitateque. Crassam & validam, uallatoriam uocant: alteram autem tibi-alem. Nasci tibi-alem super insulas fluitantes, uallatoriam in comythibus. Comythes uocant ubi acruata harundo, implexaque mutuo radicum tactu sit: quod sit locis stagnorum, ubi tellus pinguis, letaque est. Nonnunquam etiam ubi tibialis, uallatoria gignit: longiorē quidem, quam reliqua uallatoria, sed uermibus erodendam. Huius differentias eis tradunt. Tibialium quandam nonno anno provenire nonnulli uolunt. Hunc quoque ordinem generandi statuunt: quod error est. In totum enim aucto lacu enascitur. Sed quoniam id superiori tempore nonno anno potissimum euenire uideretur, ortum quoque harundinis talem esse credidit, euentum fortuitum pro ordine certo capientes. Gignitur uero copiosior, meliorque, cum post imbres frequentes biennium, cum minimam aqua permanit: quod maxime posteriori tempore factum meminere, cum in faustum illud Cheroniae accidit: quippe ante hoc annis pluribus lacum altitudine extendisse, post, ubi uehemens pestis inuasit, impletum quidem affirmant: sed cum inundatio non permanisset, sed hyeme decreuisset, sic & harundinem provenisse. Fertur enim, uideturque aucta altitudine lacus, duranteque inundatione crassari harundinem, & fieri crassatam quidem armamentariam: bombydiam uero, cum non aqua permanserit. Generationem itaque talem tradidere. Distare autem à reliquis harundinibus armamentariam (ut in uniuersum capiamus) praestantia quadam nutritionis naturalis confirmant: quippe pleniorē, carnosiorē, in totumque faciem femine laetiorē spectari: etenim folium amplius, candidiusque habere, & minus laeuginis quam ceterae: quasdam etiam omnino nihil habere, quas & noie spadonum appellant. Hinc paria optima fieri quidam affirmant, sed pauca tamen in opere bene succedere: ceteri tempestive solitas, usque ad Antigenidem, cum adhuc simplicius tibia uterentur sub Arcuro, mense septembri: quippe sic caelas plerisque quidem post annis utiles esse incipere, multaque interim exercitatione sonandi indigere, sed ora lingua-
rum comprimi, quod erat illis theatrorum moribus utilius: sed postquam uarietas, fictioque accessit, caesa mutata est. Caedunt enim nostra aetate, mense Maio, & Iunio, paulo ante solstitium, uel sub ipso solstitio: & fieri utiles in trimatu referunt, & breui exercitatione egere, linguasque disiectu defleci: quod his necessarium est, qui sonos fingant, & multifariam fluctant. Haec armamentariae cadendae tempora tradunt. Preparatio uero, & confectio hunc in modum fieri solet: Cum collegerint, hyeme sub diuo exponant suis uestitum tunicis: Vere autem dispoliam, attritumque expurgat, Soli exponunt: aestate posthac concisam in internodia, rursum sub diuo, ad tempus quoddam exponunt, relicto internodijs superiori geniculo. His longitudo palmo nunquam

nor: optima ex internodijs ad parium constructum, media totius harundinis molissima paria gerunt, quæ aduersum germina exeunt: durissima, quæ proxima radicibus habentur. Linguae eodem internodio exemptas congruere, cæteras esse discordes: proximam ab radice læuam poni, dextramque germina uersus pateat, indico duas in partes internodio. Os linguae utriusque secundum calami incuruam faciunt: & si quo alio modo linguae conficiantur, non satis eas congruere. Talis preparatio, atque confectio est. Nasctur plurima inter Cephisum, & Melanem. Pelecania locus hic nominatur. Huius quædam partes Chytri uocati, lacus altitudines sunt, quibus harundinem laudatissimam prouenire affirmant. Quin & quo Probatia dicta desertur. Is autem amnis est ex Lebadea perfluens. Sed omnium optima nasci creditur circa Oxeam, 10 Campen uocitatem. Locus hic Cephisi ostium est: uicinus ei campus pinguis, & hiliaris, quem Hippiam uocant. Est etiam alius locus aquilonius Oxeæ Campæ Boëdras noie, quo etiam ipso nobilem harundinem nasci asseuerant. In totumque ubi crassum, lætum, fecosumque solum sit, Cephisusque se permisceat, atque etiam altitudo lacus ampliatur, harundinem optimam oriri. Nam circa Oxeam Campen, & Boëdriam, hæc solum, sed plura harundinis etiam intelliguntur, quæ differentijs uel sensui manifestis discernuntur: quædam enim densa, tam carne, quam geniculis: quædam rara, paucisque geniculis: & alia caua tota, quam fistulariam quidam appellant (nihil enim fere ligni, carnis uel habet) alia solida, & tota penè intus repleta. Item alia breuis, alia procera, excelsa, crassaque: & alia gracilis foliosaque, alia paucis folijs omnino: multæ quædam differentie pro natura, uel singule nanque ad singula utiles. Non minibus alij alijs appellant, sed canna communissima quodammodo est, quæ & frutetiam maxime omnium referunt, & apud flumina, lacusque potissimo nasci: plurimum tamen in quoque genere distare inter sese aquaticas, & sicco nascentes perhibere. Sagittaria quoque, quæ ceticam quidam appellant, sui generis est, nodis paucis, genicula 30 ta, carnosior omnibus, maximeque flexu recipiens, atque omnino obseques, quo libere at flexi calefacta. Magnas & folia differentias reddunt, quemadmodum diximus, non multitudine, magnitudineque tantum, sed etiam colore: quippe quæ laconica cognominatur, uersicolor est. Item positu ipso, atque annexu: quædam enim ab ima parte foliorum plurima ferunt, ipsæque perinde atque frutice se attollunt. Quidam uel discernendum penè lacustrium esse uolunt, scilicet multa habere folia, & gladioli, phlei, algæ, butomiisque folijs similia: uerum hoc amplius scrutari oportet. Genus autem quoddam harundinis uel terrenum emigrat, quod non erigit caulem, sed super terram spargitur graminis modo, atque ita se ampliat: mascula solida est, femina inanis: quippe ad hanc mare, sceminatque distinguunt. Proueniunt ex eodem fundo plusculæ, non tamen frutetant: folio non longo, sed salici simile: magnitudine præstantes, atque robustæ, ut uicem 40 bastarum præbeant. Hæc circa Acefinam amnem oriuntur. Omnis autem harundo uiuax est, atque adusta melius resurgit: itemque stirpe crassa, numerosaque est, ob id mori peritica. Radix ipsa geniculata, quædammodum graminis: uerum non omnes simili modo informantur. Sed de harundinibus hæc tenus.

De iunco & insulis fluitantibus in lacu Orchomenio.

Cap. XIII



Estat ut de iunco dicamus, utpote generi eidem annumerando: nam hic etiam inter aquatica poni debet. Tria huius genera sunt, ut nonnulli distinguunt: acutus, & sterilis, quæ marem appellant: frugifer, quæ atriferum uocamus, quoniam semen nigrum serat: crassior hic, atque carnosior: tertius, magnitudine, crassitate, carnositateque insignis, qui mariscus uocatus est. Ex his atrifer per se suo genere provenit: acutus, atque mariscus eodæ cespite exeunt, quod absurdum apparet, uisumque mirabile fuit, toto cespite iunci deportato: quippe pars maior sterilis erant eodæ exorti, frugiferi autem pauci. Igitur de hoc cogitandum. Fructus omnino minor habetur: commodior autem ad texendum mariscus, quia mollis, carnosusque est. Omnino frugifer in callum de regulari furculo ipso tumescens, mox ueluti oua parit, circumdantes enim spicatum pediculos iunco linearum affixos initio gerit: quorum summitatibus paululo laterales orbis uasculorum leuiter hiscentes inducit. His semen exiguum effigie cuspidis sagittarum ingerit, nigrum, non ab simile semini herbæ inguinalis, uerum exilius, radice longa adhaeret, multoque crassiore, quam acutus. Hæc omnibus annis moritur, dein altera rursus à iunci cacumine desiguitur: quod uel uisu percipi facile potest: quippe aliæ siccæ, aliæ uirides demissæ cernuntur. Caput cepis, & gethyis simile, utpote quod in unum ex pluribus conglobatum prælatumque inferius, regumētisq; subrubris in tectum constat. Ergo propriis his radicibus eueniat, si quidē per annos exarescant, ac desuper denuo generent. Talia iuncorum natura intelligitur. Sin autem, & rubus, & paliurus in aquis uiuere possint, aut propē, ut quibusdā in locis percipitur, eorum quoque differentia iam explorata habentur: quippe cum de ambobus uolumine superiori dixerimus. Insulis autem fluitantibus, quæ in Orchomeno sunt, magnitudo utique multifaria, sed quæ amplissima ad ternorum ambitum stadiorum spectatur: at in Aegypto magnæ admodum coagmentantur, ut & fues permulti in eis nascantur, quos incolæ transcentes uenari consueuerunt. Atque de aquaticis hæcenus.

Vitam plantarum aquatiliam, quam terrestrium breuiorem, sicut & in animalium genere. In quibusdam tum urbanis, tum syluestribus uitæ longitudinem uel fame à fabularum autoribus traditæ testimonio patere, ut oleæ Athenis, in Delo palmæ, oleastri in Olympia, phagorum in Troia super tumulum Ili, platani in Delphis, atque alterius in Caphyis Arcadiæ, quas scuisse dicunt Agamemnonem. Quæstio pulcherrima, an arbor eadem maneat cum caudex paulatim præciditur, mutaturque uniuersus. Cap. XIII



E breuitate uitæ plantarum aquatiliū in tantum usque sandū habemus, uel delictet, quoad aliquatenus in uniuersum possumus exprimere. Vita aquatilibus breuior, quam terrestribus est: sicut etiam in animalium genere manifestum sentimus: sed singulatim terrestrium enarrare uitas nimis durum decet. Ergo syluestres nullā habere differentiam rustici putant, sed omnes longeuias, nullamque esse breuem uolunt. Sed hoc quidē ipsum uere forsitan putent (omnes enim uitam reliquarum longe superant) ueruntamen inter se distant: quædam enim magis, quædam minus longeuiæ, ut in genere urbanarum etiam deprehenditur: sed quænam sint istæ, querendum. Urbanæ aperte differunt, eo quod aliæ longæ uitæ, aliæ breuis sunt. Sed quoad simpliciter dici potest, uita syluestribus longior, quæ urbanis: atque omnino istis, quæ in oppositum generatim distinguui possunt, ut oleastro, quam oleæ: & pitalstro, quam piro: & caprisico, quam fico: quippe robustiores, spissiores, fructuque in fecundiores existunt. Vitæ autem longitudo in quibusdam tum urbanis, tum syluestribus, uel fame à fabularum autoribus traditæ testimonio patet.

ter. Nam oleam Athenis referunt, palmam Deli, oleastrum Olympiæ, fagos Troiæ super tumulum Ili. Sunt qui & Delphicam platanum, & alteram in Caphyis Arcadiae stantem, fasas Agamemnonis manu dicant. Sed hæc quo pacto se habeant, indagatōis alterius forsitan interest explorare. Quod autem summa arborum differtentia sit, plene intelligi potest: uiuunt enim prædictæ, aliæq; complures longo tempore. Breui profectò punica, ficus, mālus, præcipue uerna: & dulcis minus, quàm acida, ut inter punicas, quæ nucleo caret interiori. Genera quoq; uitium nonnulla uitæ breuis habentur: potissimò, quæ fecundissima sunt. Videntur & quæ aquis propinquæ proueniunt, minus durare, quàm quæ in siccis, ut salix, populus, sambucus. Quædam senescunt quidem, putrescuntq; uelocius, sed ex eisdem rursus latere suo germinant, ut lauri, mālī, punicæ, & auidarum aquæ pars maior. De quibus etiam ratione quispiam quærat, eadē ne dici debeant, an diuersæ: & quemadmodum si præcisio caudice, ut agricolæ faciunt, rursus germina assidue, recteq; colendo inuites, aut si in radicem usq; decideris, uel deusseris (Nam hoc etiam facere solent, nonnunquam & sponte accidunt) utrum inquam ita arborem eandem dici oporteat, an alteram. Etenim si partes incrementis, & minutionibus, atq; etiam purgamentis naturalibus distare assidue uideantur, sic arborem eandem esse appareat: cur enim in his potius, quàm in illis referat? Sin autem caudex potissimò ueluti essentia, naturaq; arboris esse credatur, cum hic permutetur, totam quoq; arborem alteram esse ratione putaueris. Nisi fortè quia eadem utriq; initia sunt, idem esse posueris. Atqui sæpenumero euenit, ut & radices alteræ sint, permutenurq; prius putrefactis, alijs denuò nascentibus. Nam eo modo quo uitēs omnium maxime longæuas putant, quoniam non alias creant, sed ex se replentur, irridenda cōparatio fortassis appareat: modo caudex non perduret. Hic enim sicut fundamentum, naturaq; arborum constat. Sed hæc utro tandem modo dici debeat, nihil ad præsens referat opus.

De uitæ oleæ, ac uitium, quoq; modo colendæ uiter.

Cap. XV



Illud autem diuturnissimum forsitan sit, quod omnibus rebus durare queat, ut olea, & caudice, & germine laterali, nepotumq; procreatio-
ne, atq; etiam stirpe incorrupta: uitam uero unius in qua posito caudice, pro principio temporis agi mensura debeat, annis maxime ducentis consummari uidemus: sin autem credimus (quod quidā de uitibus referunt) quod radicibus particulatim detractis caudex, naturaq; tota similis, ac similifera quantumuis temporis permanere queat, hæc prorsus longæua omnium præcipue constat. Colendum autem hunc in modum censent: Cum uitis iam delabi uidetur, palmites admittendum, fructumq; anno capiendum: deinde altera ex parte uitis suffodiendo radices omnes purgandum, post festiucum implendum, terramq; accumulandum. Isto itaq; anno male admodum ferre aiunt, postero melius, tertio & quarto stabiliri: ferreq; multas bonasq; uuas, ut non alio modo se habeat, quàm cum uigebat. Cum iterum languescere incipit, partem alteram suffodiendum, colendumq; simili ablaqueationis ratione, atq; ita semper durare posse affirmant. Id autem anno maxime decimo fieri. Qua de causa, nec præcidere unquam eos debere, qui ita faciunt, sed per multas grates caudices eosdem durare, ut ne minus minime quidem sit, qui seuerint. Hoc igitur expertis accipientes credere fortasse debemus. Quæ autem uitæ longæ, breuis ue sint, ijs quæ retulimus contemplari oportet.

De mor

De morbis arborum: quicq; communes, & qui priuati sunt. Quid syderatio, uermiatio, radication, clauus, fungus, olla, scabies, cochleæ, cradatio, cerasta: quid in uite hirculatio, quid roratio.

Cap. XVI



Orbos syluestribus accidere negant, quibus intereant: tamē eas quæ que male affici dicunt: perspicuoq; præcipue, cum uel paulò post germinaturæ, uel germinare incipientes, uel florentes, grandine uexantur: cumq; flatus frigidus, seruidus ue, his eisdem temporibus succedat: tempestiuis autem hyemibus, nec si excedant, quicquam offendi. Quinimmo omnibus algorem prodesse uolunt: quippe nisi alserint, deterius germinare. Vrbani morbi plures eueniunt: alij omnibus quasi communes, aut pluribus: alij priuati per genera. Communes, uermiculatio, syderatio, radication: omnes enim ferè uermes etiam gignunt, sed quædam pauciores, quædam plures, ut ficus, mælus, pirus. Minime autem (ut simplici ratione dicam) acres, & succo humentes lacteo uermiculantur, eodemq; modo syderantur. Magis autem nouellis, quam uigentibus id accidere solet: & omnium maxime fico, & uitē. Olea præter uermes, qui & ficum interimunt fortificantes in ea, clauum patitur: quidā fungum appellant, alij ollam, hoc est uel uti solis exustio: nonnunquam etiam nouellæ, propter nimiam fertilitatem intereunt. Scabies, & cochleæ adnasci soliti, ficorum peculiaria sunt. Non tamen id accidit eis ubiq; sed morbi his quoq; ratione locorum euenire uidetur, quemadmodum animalibus. Nam apud aliquos scabies nullo modo infestat, ut nec circa Aeneam. Ficus maxime radicationem, cradationemq; sentit. Vocant radicationem, cum radices inarescunt, marcescuntq;: Cradationem, cum rami: crados enim ramos ficulnos quidam appellant, unde & morbo nomen. Caprificus neq; radicatione, neq; cradatione, uel scabie infestat, neq; radicibus uermiculatur. Quædam nec suos grossos amittunt, etiam si fico inserantur. Scabies potissimum gignitur, cum aquæ parum post uergilias incesserit. Nam si multum fuerit, causa contrahendæ scabiei omnis abluatur: & accidit tunc, ut & caprificus, & grossi decidunt. Vermium autem qui ficorum proprij sunt, alij ex ipsis nascuntur arboribus: alios parit, qui cerasta uocatur: omnes tamen in cerastam figurantur. Sonum ædunt ceu paruuli stridoris. Ficus laborat, & si imbres nimij fuere, sic enim ad radicem quasi glabratur: quod quidem uitium aulam appellant. Vitis hirculatur, quod eius præter syderationem potissimum est, aut cum germina à flatibus fuerint abscissa, aut cum imperitiâ culturæ fuerint læsa, aut tertio cum in supinum fuerint excisa. Roratio, quod quidam vindem dicunt, cum uitis deflorescens irrorat, aut cum fieri solet genus affectionis, hoc est, ut acini defluant, & remanentes paruuli consistent. Quædam & cum alserē ægrotant, ut uitis: oculi namq; primo putatæ hebetantur: rursusq; ex calore nimio idem euenit: etenim eorum quoq; temperamentum possunt, sicut etiam alimentum omnino. Omne quod præter naturam sit, periculosum occurrere: uulnera quoq; ictusq; circumsodientium magnopere faciunt, ut mutationes æstuum, aut frigorū non tolerentur. Cum enim per luxationem laboremq; debile sit, facillime à tēporis excessu deuincitur. Porro, ut quidam existimant, maxima ferè pars morborum ictu iniurioso contrahitur. Quippe, quæ syderata appellant, quæq; radice inarescant, hac eadem de causa laborant. Credunt & hos duos esse morbos duntaxat, sed id quidē haud confessum satis habetur. Ex omnibus uero infirmissima est uerna mælus, & earum potissimum dulcis. Quibusdam læsiones, nonnullæ sterilitatem, non necem inferunt: ut si quis larici cacumen auferat, uel palmæ, sterilesceat ambæ uidentur, nec penitus interire. Ægrotant aliquando & fructus ipsi, cum alitatus, imbresq; tempestiue nō fuerint. Accidit enim arboribus, ut aliās fructus amittant, factis, aut non factis pluuijs, ut ficis: aliās deteriores reddant

tur, putrefactæ, strangulatæq; humoris nimietate, aut contrâ exiccatæ penuria ultra modum. Pessimum cum deflorescentibus quibusdâ, imber incellit, ut oleæ, utiq; simul enim defluit fructus propter exilitatē. In Miletio oleas cum florent, erucæ erodunt, aliæ frondem, aliæ florem: genere diuersa: itaq; arbores dispoliant. Nascentur tempore austri: & uento, si sol acrior infecutus fuerit, rumpuntur. Circa Tarentum fructum uberem oleæ semper præmonstrant, sed sub flore pars magna perditur. Hæc ergo propria locorum.

De Arachinio morbo oleæ, deq; tabe, uredine: quæq; morbis præcipue infestantur.

Cap. XVII



Ritur & alius morbus oleis, qui Arachiniū appellatur. Nascentur enim hoc, & fructum absumit. Adurunt & æstus quidâ & coluias, & uuas, & alios fructus. Sentiūt & uermiculationē fructus quorundâ, ut oleæ, piri, mali, mespili, punicæ. Vermis oleæ natus sub cute fructū admittit: at si in ipso nucleo erodens, prodest: sub cute gigni prohibent pluuijs, quæ post Arcturū sequant. Et in drupis quoq; oleis uermes nascuntur, qui ad lacturam peiores certeprehendunt, & maridi, putresq; omnino uident. Hinc & austrinis nascunt, & riguis magis. Gignuntur & culices in aliquibus arborum, ut in robore, & fico, & consistere ex humore uidentur, corticibus subdito gustu dulci. Gignunt iisdem & in quibusdâ oleribus: alibi uero erucæ, diuerso scilicet ortus principio. Et morbi quidem hi ferē, atq; in his sunt. Affectiones autem quædam temporæ, aut aliâs per se euenientes, necare assolent, quas nullus dixerit morbos, ut tabes, & quod uredinem quidam appellât. Alij uero apud alios status interimere, ac exure re noti sunt: ut in Calcide Eubœæ olympias cum flauerit frigidus ante solstitia, aut post solstitia hyberna: arbores enim exurit, atq; adeo aridas, liccasq; facit, ut ne sol quidem tempusq; longum reddere ita possint: quocirca uredinem uocant. Hæc sæpe aliâs, & Archippo Athenis magistratu anno quadragesimo facta uehementissima prodit. Laborant maxime loca concaua, & inter ualles, & uicina fluminibus, atq; in summam, quæ ab omni afflatu penitus silent. Ex arboribus uero ficus præcipue infestatur, secundo loco olea: oleaster magis laborauit, quanq; robustior, quod mirum fuit. Amygdalæ penitus, mali, piri, punicæ sine noxa extiterunt: quamobrem id quoq; mirum: exuruntur statim à caudice, atq; in totum magis, priusq; (ut ita dixerim) sentiunt partes inferiores. Deprehenduntur quædam statim in germinatione. Olea uero quoniam semper uireat, tardius. Quæ itaq; frondes amiserint, reuiuiscunt: quæ minus, penitus pereunt. Nonnunq; quædam exusta, folijsq; arefactis regerminarunt sine ulla iactura, foliaq; reuixere. Id quibusdam in locis uel sæpe penumero euenit, ut in Philippis. Quæ autem tabuere, modo non penitus perierint, ciussime possunt regerminare, ita ut uitis statim fructificet, sicut in Thessalia fit. Ponto autem circa Pantocapæum tabes bisariam inuadit: aliquando frigore, cum annus frigidus est aliquando gelu, si diu durauit: ambo post brumam, diebus maxime quadraginta peractis, fieri solent. Fit gelu sereno tempore: frigus, quo tabes, præcipue cum in sereno squamulæ quædam deferuntur, patet: calidius uero non durât, quanq; circa Thraciam conrescant. Sedenim morbi, quot, qualesq; sint, ac rursum interitus, qui excessu hyemis, aut æstus eueniant, quicq; ab afflatuum frigore, calore uel proficiantur, hisce contemplandi: quando nil prohibet nonnullos etiam cum syluestribus communes haberi, tum uniuersa arborum nece, tum etiam magis fructuum lue: quod aperte euenire uidemus, quippe cum sæpe nec illæ probe fructificent: sed credo æque id obseruatum habetur.

Quæ

Que arbores, quibus detractis partibus aut egrescant, aut interimantur. Cap. XVIII



Estat, ut exponamus, quæ partibus quibuscumque ablatis, enecentur. Communis itaque omnibus mors cortice in orbem detractio. Omnes enim ferè hoc modo necari videntur, excepta potulaca, quæ tamen & ipsa si quis carnem uehementer presserit, germinet futurum luxa uerit, morietur. Itaque uerius fortè, excepta subere, dixerim: hanc enim & iuuari potius cortice detractio, affirmat, scilicet tam extero, quam interno carni propinquo, sicut etiam potulacam. Nam & ceraso detrahitur, & uiri, & tilia, ex quo fuit: & ex minoribus malua, sed non uitalis, neque princeps, sed summus, qui plerumque subnascens alio decidit: corticis enim disruptio communis arborum est, ut potulacæ, ut platani. Cum uero nonnulli arbitrantur, nouo iterum subnascens, exterum inarescere, disruptis, multisque decidere sponte, sed non æque in omnibus rem esse conspiciam: ergo omnes (ut creditur) cortice detractio intereunt: sed refert, quoniam celerius, tardius uel, & magis, minus uel. Quippe aliqua plus temporis permanent, sicut ficus, tilia, robur. Quidam eas & uiuere interdum, nec interire affirmant, & corticem ueluti pumicis specie concalcere, atque naturam peculiarem quandam haurire. His itaque mederi conantur, luto fouentes obstruentesque: & harundinibus, atque id genus stramentis operas, illigantes ne frigeant, uel subarescant: etiam nonnulli resitui, regenerareque potuisse proditum est, ut apud Heraciam trachianam ficus: sed præter uirtutem soli, temperamentumque coeli superuenientes quoque respondeant opus est. Frigoribus enim, aut etiam caloribus nimis consecutis, statim intereunt. Refert & tempus anni: quippe in germinatione abietis, pinique, cum etiam cortice turgido sunt mense Febuario, uel Martio, si quis detrahit, statim moriunt: hyeme diutius tolerant, & magis quæ robustissimæ sunt, ut ilex, robur. Harum enim interitus diuturnior est. Latitudinem quoque aliquam decorticatio habeat oportet, omnium quidem, sed maxime robustissimarum. Nam si angustam admodum feceris, nihil absurdum, si non interierint. Quamque sint, qui etiam si quantumlibet auferatur, necari penitus dicant. Sed hoc de infirmioribus quidem consentaneum dixerint: Quasdam enim & si in orbem non ex cortice, interire affirmant, quæ uel solum tenue, ieiunumque tenent. Igitur hæc, ut iudicauimus, mors communis omnium est.

De decacuminatione, id est, salice, platano, populo, quæ resurrexerunt. Cap. XIX



Vam uero decacuminationem appellat, tantum inter arbores, pino, abiete, piceæ, palmarum assignat: quidam & cedro, & cupresso referunt. Hæc enim detracta coma, decisoque cacumine, tota intereunt, nec quicquam germinat, sicut nec si adusta, aut tota, aut parte aliqua fuerint: reliqua autem omnia & præcisæ germinat, & nonnulla meliora reddunt, ut oleæ. Intereunt maxima ex parte uel sileo caudice. Nulla enim tolerare uidetur, præterquam uitis, ficus, punica, malus. Quædam uel ab ulcere ampliori, altiorisque intereunt: aliæ nihil offenduntur, ut pinus, cum tæda descendit, & omnia ex quibus resina colligi potest, ut abies, terebinthus. Harum enim uulneratio, ulceratioque in profundo: quippe ex in foecundis, foecundæ: & ex paucaferis, multiferæ reddunt. Quædam etiam securi ita tolerant, tam stantes, quam a flatu prostrate, ut resurgant, uiuant, germinetque, ut salix & platanus: quod & in Antandro, & Philippis euenerat. Cum enim platanus procidisset ramis amputatis, truncum securi luxato, surrexit noctu leuata onere, atque reuixit, & cortex iterum circumtextit. Erat duobus lateribus circumdolata, longitudine decem cubitis maiori: crassitudine, ut quatuor uiri non facile amplexerent. Salix autem, quæ in Philippis surrexit, fuit quidam detracta, sed non circumdolata. Aruspex tunc quidam persuasit, ut sacrificarent, custodirentque arborem, utpote factam ostento fausto. Surrexit

& Stagiris in museo populus alba procidua. Medulla exempta nulla fere arbor moritur: argumentū, quod multæ arbores magnitudine excellentes cauantur, inanesq̃ fiunt. Arcades quadantenus si eximatur, uiuere dicunt: tota uero ex uniuersa arbore exempta, & pinum, & abietem, & reliquas omnes interire.

Que mors communis omnibus: oleumq; necare omnia. Item de cytho, & edera, atq; aurore perniciosus. Quodq; brassica temulentiam propulset. Cap. XX



Communis omnibus mors, & si radices amputentur, uel omnes, uel plurimæ, & quæ maximæ sint, uitalesq̃ in primis: igitur hos interitus ex demptione dicendum. Qui autem oleo consequitur, adiectione uerius quadam, quàm demptione incurrit: quippe oleum omnia necat. Qua de causa radicum extirpandarū reliquis oleum infundunt. Vallet oleum magis in nouellis, & in præsens nascentibus, sunt namq; debiliores: quapropter & tangi eas agricolæ prohibent. Necantur & inuicem inter sese alimentari pina, & ceteris in rebus impedimento. Molesta & edera adnascens, ac uinciens: molestus & cythus, nam omnia ferme necat: sed eo ualentior auro est, hic enim uel cythum ipsum interimit. Quædam non necant, sed succi, odorisq̃ uiribus reddunt deteriora, ut brassica, & laurus uisum offendunt: olfacere quippe eam, & attrahere dicunt: quamobrem germen cum illis propinquum fuerit recedere, atq; auerti, utpote inimicum fugiens odorem. Androcides exemplo hoc usus est: de medela contra ulnum confecta, ex brassica uidelicet, temulentiam posse propulsare: quippe cum uiris etiam uiua, odorem brassicæ fugiat. Interitus itaq; quo pacto fiant, quot sint, quotq; modis eueniant, ijs, quæ explanauius, patet.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI QVARTI FINIS.

THEOPHRASTI DE HISTORIA

PLANTARVM LIBER QVINTVS.

De cædendâ materie tum rotundâ tum quadratâ, quandoq; cædendum robur. Cap. I



DE MATERIE, cuiusmodi unaquaq; sit, & quo tēpore tempestiue cædatur, & quibus cōmoda operibus cōstet, & quæ tractatu difficilis, facilis ue, & quicquid eiusmodi cōmentationē continet, æque atq; superiora, explicare tentandū nunc est. Cædi itaq; tempestiuū, rotundā quidē materiem, & oēm quæ decorticanda accipit, cū germinare incipit: tunc em̃ cortex extricatu perfacilis est: quod turgere appellant, scilicet ratione humoris, qui sub eo cortice fieri solet: postea inextricabilis reddit̃, materiesq̃ nigrescit, informisq̃ fit. Quadrandā autē post turgorem, securis autē deformitatē auferit. Deniq; omne, quod pro ualido capi oporteat, tempestiuus cædi, nō solum cū germinare desierit, sed etiam cū fructū percoxerit. Verū decorticationis causa sit, ut rotunda, quanq; intempestiua, pro tempestiuis ad usum ueniant. Quāobrem tēpora per euentū dici contraria debent. Abietis materies primo turgore coloratior reddit̃: nam & corticem abietis tamē, & pinū, & laricis potissimo detrahunt. Igitur istæ Vere cæduntur, tunc em̃ germinant: reliquæ aliquādo post messē, aliquādo post uindemiā, & Arcturum, ut aria, ulmus, acer, fraxinus, carpinus, scissima, uilia: ad summā, quæ aptæ obrui sunt. Robur fertilissime cædendū, uidelicet hyeme post autumnū: qd si sub turgore

- gore cædatur, citissime omnium ferè putrefcitur, seu cum cortice, seu sine cortice caplarur: potissimum, quæ primo turgore: proxima, quæ secundo: tertia, quæ tertio: quæ autem post fructuum maturitatem cædantur, quamuis non turgida sint, incorrupta perdurant, præterquam quod sub cortice uermiculi quidam nascentes, caudicem per summa inscribunt. Quibus signis pro sigillis nonnulli utuntur. Robur proscitum cæsum tempestiue, neque putredinem sentit, & prædurum, spissumq; ad similitudinem cornu perdurat: totum enim cordis speciem gerit. Salsicortex tamen uel eo tempore cæsa uincitur. Quin & illud è contrario euenit, cum in germinatione cæduntur, cumq; post fructus æditos: tunc enim exiccantur caudices, & arbores radices regerminare minime possunt, sed post fructus regerminant: quam eo tempore cædi difficilius possint. Duritiæ causa cædi etiam post lunæ occasum præcipiunt, quasi duriora, & computrescere periculiora forent. Sed cum maturitates fructuum inter se differant, constat quod etiam uigores arborum referre ad cædendum est necesse: semper enim serotinarum magis cæsura serior. Quæ de causa particularim quidam expedire conantur, ut pinum, & abietem cædi oportere cum germinare incipiunt: scissimam, uliam, acerem, carpinum autumno: robur (ut diximus) post autumnum. Sunt tamen qui etiam id tempestiuum in Vere existimant, cum amentum, quod uocant, gerit: & picem, cum uua eius florere incipit. Quæ igitur tempestiua omnibus annis cæsis sit, hunc fermè in modum denotatur.
- 40 Certo autem constat, quod uigentium arborum melior, quàm nouellarum, uel arborum materies sit: quippe cum earum alteræ plus terræ, alteræ plus aquæ contineant. Vfus uero plurimos, maximosq; pinus atq; abies præstant: harumq; materies amplissima, & pulcherrima constat.

De differentia, quæ inter abietem, atq; pinum. Tum quæ quadripartita, bipartitaq; ac simplices dicuntur. Quæ febri lignarij breuia appellant. Cap. II



- stant istæ inter se multifariæ. Pinus enim carnosior, neruisq; paucis est: Abies neruaciore, atq; rigidior, ita ut utraq; è contrario habeat neruos ualidos, carnem mollem & raram: quæ de causa altera grauis, altera leuis est: altera enim tæda referta est, altera nullam ingerit tædam: ob id etiam albior est. Ad hæc pino rami plures, abieti longe duriores, uel potius & omnium ramorum durissimi: ambabus spiculi, & cornu sanè imitantes, colore flauo, & tædæ similes, qui cum abscessi fuerint tam pino, quàm abieti, humor defluit, sed abieti largior est. Præterea tunica multiplici abies, modo cepæ: assidue namq; tunicæ conspectæ subditam aliam gerit, atq; ex his tota constat. Quapropter qui remos dolant, singulatim, pleneq; auferre conantur. Nam si ita auferant, remus ualidus relinquetur: sin autem permutauerint, nec pariter dempserint, infirmus reddetur: hunc enim in modum ictus, illo demptio fit. Est etiam excelsior, atq; procerior abies: ideoq; antennis, maioribus ex ea facere assolent. Habet & uenas, neruosq; omnium nobilissimos: crescit hæc primò in excelsum quoad libere solem accipiat. Neq; ramus ullus, neq; germinatio lateris, neq; crassitudo interim facitatur: post in profundum latumq; incrementum capessit, atq; ita ramorum exortus, & laterales germinationes sequuntur. Hæc abietis propria: illa uero & pino, & abieti, & alijs communia conspiciuntur: alia enim quadripartita, alia bipartita, alia simplex. Quadripartitas appellant, quibus in utranque partem medullæ, bini uenarum cursus naturæ contrariæ pertendunt: atq; per utranque cursum adigunt ictus, cursibus contrarios inferentes, dum in utranque partem medullæ securis remeat. Ita enim eueniat necesse est, naturæ ueriarum ratione. Ergo tales abietes, pinosq; quadripartitas appellant, & easdem ad opera uehementer probant. Materiem enim spississimam præstant, & ægidem gignere illas solent.

Bipartitæ illæ cursum uenarū unum tantum in utraq; partem medullæ gerunt, eisdemq; inuicem contrarios habent, ut & securis duplex adigi debeat, simplex per utrumque cursum istu contrario: mollem hanc materiem refert, sed in opere pessimam, quoniā maiorem in modū peruertitur. Simples uocant quæ unū duntaxat uenarū habent cursum. His itidem securis utraq; ex parte medullæ adigitur: laxiorem naturā materiem hanc esse affirmant, sed à peruersione tutissimā. Discrimen arbores suis corticibus ostendunt: quāobrem ubi primum arborem uiderunt, cuiusmodi sit, discernere queunt. Quibus enim uenæ egregie perfluunt, quæq; in opere obediunt, his cortex leuis, rectusq; est: quibus autē ē contrario, his scaber, contortusq;. Atq; de reliquis eadē ratio est. Sed quadripartitæ pauca, simplices, plures, 10 quā reliquæ comperiunt. Omnis autē materies amplior, procerior, obediētiore, solidior, atq; in totū melior, & copiosior, quæ partibus aquilonijs exit, ut etiam prius retulimus. Et ipsius arboris partes, quæ aquilonē aspiciunt, spissiores, adulescentioresq; constant: quæ uero ab latere, aut in orbe perflant, hæ uertunt, cōtorquenturq; aquilone, ut medulla earum contorta sit, nec in rectum porrecta. Hæc integra quidē ualida esse credunt, cæsa autem imbecilla, quod pleraq; habent diuersitates. Breuiā hæc fabri lignarij uocant, quoniā ita pro usu cedere consueuerunt.

Quæ neq; ad fabrilem, neq; ad ignarium commoda. Quæq; fabriili usu materia, quibusq; in terris præstantissima sit. Tum quid orbes in ligno. Deq; stimulo in lapide, & oleastro, in quo pressisso inuenit dicitur occurrere. Cap. III



Summā, quæ humilis, tranquillis, umbrōsis, contactisq; locis assurgunt, deteriora tam ad fabrilem, quā ad ignariū usum ueniunt. Ergo huiusmodi differētiæ, pro locis (ut simpliciter loquar) unigenorum ipsorū adnotant. Quidā enim per tractus diuidunt, aiuntq; materiem optimā omnīū quæ in Græciā aduehunt, macedonicā ad usum ædificatorū esse: leuissimā est, obediens, & tylium nimirū continens: secundā ponticā tradunt, tertiā rhyndaciā, quartā æanicā: deterrimā parnasicā, atq; eubolcam: nodosa enim & aspera, & citō putrescens. De Arcadia animaduertendum est: Robustissima, quæ enodis, leuissimāq; eademq; uisu pulcherrima est. Nodosa certe, aut 13 male adulta, aut hyeme oppressa, aut aliqua simili ratione efficitur: in totū enim nodositas probæ nutritionis indigentia est. Sed postq; nutrita improbe fuit, si commodo nutrimento potita se recreet, atq; ita proficiat, sit ut nodi abforbeantur incrementō obducto. Probe etenim coalescēs, gliscensq; super ne obducitur, & sæpe quæ de foris leuis cernere, scissa nodatissima extitit: quæ de causā medullas conspiciari scissum solent. Nam si nodis istæ transfixæ sint, extrā quoq; habeant nodos necesse est. Fiunt & orbes, hyemis, improbæq; nutritionis causa. Orbes autē uocant, cum facta conuolutio quædā ampla, circulis pluribus circumacta sit, quā neq; nodum omnino dixerim, neq; ipsius crispitudinē ligni: hæc enim per totū serē, atq; equaliter ampliatur. Longe id iniquius, tractatūq; difficilius, q̃ nodus artifice obstat: proxime, atq; in lapide, qui stimulus uocatur, nasci omnino uidetur. Nodos autē obducto incremento occupari, atq; in plenū integi, sensus ipse percipere euidentissime potest. Cæterū uel ex alijs perquam similibus rebus, id ita fieri constat: sæpe enim pars arboris comprehensa ab altera proxima est, atq; in eiusdē corporis magnitudinē coagmentata: & si lapidem, aut aliquid simile arboris alæ inculcaueris, demū insinuat, atq; occultabit amplexu auctioris obductæ: quod etiam in oleastro, qui Messariis in foro stabat, euenisse accepimus, quo succiso, urbem capī, ac diripi oraculum erat, sicuti actū est. In hoc em̃ percisso, repertæ ocreæ sunt, & alia quædā Attidritus: 40 parte qua primū affixa fuere, ad ramorū ambitum concauata. Huius oleastri, quod adhuc

adhuc superest, parum admodum extat. Alijs quoque locis permultis complura eiusmodi facta produntur. Sed hæc (ut dictum est) pluribus publica habentur.

De arborum qualitatibus, & quæ spississima, ac durissima, mollissima: quæq; calidissima, frigidissima, necnon quæ lenta, & rigida sint materie.

Cap. 1111



Ro natura autem singularum arborum propria discrimina assignantur, spissitas, raritas: grauitas, leuitas: duritia, mollitia, & si quid eiusmodi aliud perspicitur potest. Quæ cum omnium urbanarum pariter, & syluestrium communia sint, de omnibus uerba faciamus oportet. Ergo spississima, grauissimaq; buxus tota: ebenus sua tantum medulla, in qua & coloris nigredo constat. Ex reliquis ceteri primatus indubie datur. Spissa & roboris medulla, quod atrum cognominant, atq; etiam magis caryss, quippe cum hæc proxima ad ebenum accedere uideatur. Nigra admodum, spissaq; terebinthus est, & quidem Syriæ uel ebeno nigriorem ipsam esse affirmant: & capulos quoque pugionum ex ea fieri, & pocula thericlea tornari, quæ à fictilibus fecerni non possunt; uerum cor tantum accipi, & perungi materiem oportere uolunt. Sic enim & meliorem, & nigriorem effici posse. Quin & aliam arborem reddunt, quæ cum nigredine uarietatem quandam præ se fert subrutillam, ut aspectus ebeni uersicoloris appareat, fieri ex hac lectos, & subsellia, & reliqua lautiora opera narrant. Amplam maiorem in modum, & frondibus conditam pulchris, similemq; piris eam assignant. Sed hæc spissitatem quoque unâ cum nigrore fortiuntur. Spissa autem acer, & carpinus, atque in totum omnes crispæ: ad hæc olea, & oleaster. Raræ corpore inter syluestres, tectisq; idoneæ, abies maxime: inter reliquas autem sambucus, ficus, mælus, laurus. Durissima roboris, carpini, ariæq; materies: hanc enim antequam terebrent, madefaciunt, quò scilicet molliorem reddant. Molles in uniuersum, quæ raræ corpore, ac solutæ consent. Tilia inter carnosas præcipue mollis, necnon & calidissima eadem esse uidetur, indicium quod aciem ferri maxime hebetat: tincturam enim uisui caloris perlatat. Edera quoque calida est, & laurus, atque in totum omnes, quibus facere ignaria solent. Menestor, & morum addidit. Frigidissima, quæ aquatiles, aquosæq; sunt. Lenta salix, uitisq;: qua de causa scuta ex his facere solent: icta enim protinus plagam contrahunt: sed leuior salix: rarior enim, & ob id ea magis utuntur. Platanus lentore non caret, sed hæc natura humilior est, sicut etiam ulmus: indicium, quod post cæsuram, erecta materies multum humoris emitit. Morus spissa, simulq; lenta est. Rigorem quoque fortissime ulmus seruat, ob id ulmeos cardines ualuarum adiungunt. Nam si ipsi firmi permaneant, ualuarum quoque stare in tortæ possint: alioquin torqueantur necesse est. Faciunt eos ligna permutantes, quod rardicem uersus, quodq; in cacumine fuit. Sic enim inter se coarctata, utrumque impetum alterius prohibet, cum suapte natura aduersetur. Nam si alterum per naturam eodem tendat, quò momentum est, ruina utique eodem sequi facile possit. Valuas autem non statim apponunt, sed compactas statuunt. Nonnulli anno tertio consocere, lautioris operis desiderio: nanque æstatis calore exiccatæ dehiscunt, hyemis uero humore oppletæ coherent: ratio, quod rara, carnosaq; facile autem attrahant humectum. Palma leuis, tractatu facilis, mollisq; est, quemadmodum suber: sed melior subere, quia lenta: suber enim rigidum est. Quapropter simulacra nunc ex palmis condere inceperunt, sprete suberis materie, ut incommoda. Neros non per totum corpus expandit, neque prolixos extendit, neque eodem posituræ modo cunctos porrigit, sed multifario. Siccati hæc materies potest, & cum dolatur, & serratur.

Thuiam, quod & Thuia dicitur, nasci apud sanum Ammonis. Ex quibus item simulacra decorum fieri solita. Quae ponderosa simul ac dura, quaeque discordent. De nucce cuboica, alijsque quae perpetua sunt natura: tam quae cariem, ac tinea sentiant, aut non sentiant: deque teredine, tineis, & uermibus, qui in materie nascuntur.

Cap. V



Huium, quod thuia ab alijs appellatur, nascitur apud Ammonis sanū, atque in Cyrenensi agro, forma cupresso similis, cum ramis, tum folijs, caudice, fructuque: uel potius ceu cupressus syluestris. Copiosam uel ubi urbs hoc tempore est, comperiri affirmant: atque etiam memorant 10 contignationes quasdam uetustissimas thuiæ. Perdurat enim materies hæc incorrupta omnino. Radice huius arboris nihil crispius, eaque preciosa opera conficiunt. Simulacra ex his sculpere solent, cedro, cupresso, loto, buxo: minora etiam ex olearum radicibus: rimas enim istæ non capiunt, & carnis aequalitate quodammodo constare uidentur. Hæc igitur proprietate quandam locorum naturæ, uisusque ostendunt. Ponderosa autem, leuiasque, ex spissitate, raritate, humilitate, lenitate, siccitate, rigiditate, duritate, mollitudineque accepisse oportet: quædam itaque simul, & dura, & ponderosa sunt, ut buxus, ut robur. Quæ autem rigide, atque durissimæ sint, hæc pondere carent. Omnes syluestres urbanis, & masculæ sceminis, spissiores, duriores, ponderosiores, in totumque robustiores, quod etiam ante retulimus. Quin & minus fecundæ fecundioribus, & deterius fructificantes, probius fructificantibus, tota quasi ex parte firmiores, nisi usquam mas fructuosior esse soleat, ut alias quasdam affirmant, & cupressum, cornumque. Verum inter uires quidem, quæ minus fructificant, gemmis crebrioribus constant, solidioresque sunt: idem etiam in malorum, reliquarumque urbanarum genere patet. Natura perpetua, cupressus, cedrus, ebenus, celtis, buxus, olea, oleaster, pinus, quæ tedam gerit, aria, robur, nux cuboica. Sed diuturnior inter has cupressus uidetur: itaque in Epheso cupressina materies, ex qua ualuz templi Dianæ, quatuor ætates reseruata durauit. Sola hæc nitorem etiam recipit, ideoque ex hac condere operum lautiora consueuere. Ex reliquis post cupressum, ac thuiam, morum æternam potissimum esse arbitrantur, simulque ualidam, & in operibus facilem, 13 atque uetustate nigrescere modo celtis. Item alia in aliud, & in alio perpetua: exempli gratia, ulmus in præfatu. Robur defossū, atque in aquis demersum, putredine quippe immune hoc omnino uidetur, ob id fluuijs, lacubusque naues hac etiam materie condunt: sed mari putrescit: quantum reliquæ magis durare ualeant: quod quidem & ratio uult, utpote cum sale maceratæ, conditæque sint. Fagus quoque, siue scissima in aqua permanere posse incorrupta uidetur, mada factaque melior reddi. Quin & nux cuboica nequaquam putrescit. Dicunt & pinum plusquam abietem corrodi a teredine posse: hanc enim esse amaram, pinum uero dulcedinis non nihil habere, eoque magis, quo fuerit teda refertior. Omnes teredinem sentire affirmant, præterque oleastrum, atque oleam, quas amaritudinis causa neque teredo, neque tinea rodit. Quæ mari putrescere aptæ sunt, erodi & teredine solent: quæ autem terra, uermiculis, tineisque. Teredo enim non nisi in mari nasci potest. Est autem ipsa teredo, corpore parua, capite magno, & dentibus. Tineæ uermiculis similes constant, quibus paulatim materies perforatur: sed hæc curari facile possunt. Nam si offensa materies trahatur in mare, durare nimirum ualeat. Quæ uero teredinem senserit, curari hæc nihilo potest. Verum autem, qui nasci in materie solent, alij putrescente ipsa materie generantur, alij parientibus alijs uermibus: pariunt enim uel in cæsa materie uermes, quemadmodum in arboribus, qui cerasiæ uocantur: cum scilicet tam eroderint, atque excavauerint, ut se circumagere possint. Fugiant ligna colorata, amara, duraque: quoniam hæc erodere

erodere nequeant, ceu buxum. Tradunt etiā abietis cum germinat decorticatā materiam aquis inoffensam durare nimirum posse. Patuit id apud Phineum Arcadiæ, cum oblitus faucibus campus in lacum redundaui: tum enim ductis pōtibz ex abiete, cum amplius extumesceret aqua, alijs super alijs fabricatis, postea extrusis obturamentis unda erupit, discessitq; uniuersa materies incorrupta comperta. Sed forte hoc, casuq; innotuit.

In Tylo insula Arabiæ materiem esse, ex qua fabricate naues incorrupte penē in mari perdurent: tum de materijs cōdiendis, inueteratūq; que materie faciles in opere, que difficiles, et cer cerdones ex piro syluestri tabulas faciūt, ac quomodo circi intortī permanent. Caput VI



N Tylo autem Arabiæ insula materiem esse affirmant, ex qua naues ædificant, quæ mari incorrupta penē perduret: quippe cum annos plusquam duētos demersa immunis ab omni offensa seruetur. Extra aquam diuturna quidē eadem est, sed nō tantundem: ocyus enim putrescere incipit. Quin & illud tractus eiusdem mirādum referūt, quancūq; nil ad putredinem spectans: arborem enim constare ex qua baculos cædunt, pulchrosq; admodum faciūt, nec sine uarietate quadā coloris, pellibus tigriū proxima: ponderosam unice materiam hanc affirmant, cumq; in solidiora quisq; proiecerit, modo siciliū fragilis. Addunt etiā tamaricis lignum, nō ut apud nos, imbecillum, sed ualidū, sicut iligneū, aut aliquid ferme materiæ huiusmodi, ibidē cōperiri. Id igitur loci coeliq; discrimina, uiresq; indicat. Materiem autē unigenam, ceu roboream pineamq; cum condiūt (cōdire namq; consueuerūt) nō par alitudine maris uniuersam demittunt, sed aliam iuxta terrā, aliam paulō superius, aliā altitudine ampliores: sed quæ radici proximiora sunt, citius descendūt: uel si fluitet, plus deorsum uersus sanē inclinant. Materierū item alię in opere faciles, alię difficiles: faciles, quæ molles, & omnium præcipue tilia: difficiles, quæ duræ, nodosæ, crispæ, conuolutionibusq; perplexæ. Aria, roburq; omniū difficilimæ. Sed quoad particulatim reddere liceat, pinī, & abietis nodus difficilissimus constat. Semper autē inter unigenas mollior durior præstātor: carnosior enim: & quidem fabri hac de iudicādis asseribus ratione utūtur. Ferrū uitiatam, duramq; materiā magis, q̃ mollem cedere ualet, etenim in molli obrunditur, ut de tilia dictū est: contrā in dura acuitur: qua de causa cerdones ex piro syluestri suas tabulas faciūt. Medullam (ut fabri aiūt) omnis habet materies, sed conspecta potissimū in abiete. Eius namq; orbiculorū compositio corticea inspicatur, quod nō æque in olea, buxo, atq; similibus: quamobrem quidā buxum atq; oleam medulla omnino carere existimant: has enim minime omniū distrahi posse. Est autē distrahi, ut mota medulla, cōtorqueatur materies: uiuere enim diu uidetur. Quamobrem quidā undiq; simul demere solent, sed præcipue ex circis, quō intortī permaneāt, ideoq; scindūt. At uero absurdū putaueris, rotūdā materiæ medullam illatæ atq; immotā posse edurare. Immutatę uero, nisi tota extrahatur, cōmouere materiem atq; peruertere: dispoliatā enim mori facilius posse cōsentaneum potius dixeris. Māli tamen atq; antēnæ medulla exempta incōmode relinquūtur: sed hoc per accidēs, quoniam plerisq; uestitur tunicis: sed fortissima, tenuissimaq; postrema pars est, sicillima enim: atq; ita ex reliquis quæq; ad portionem existimari utiq; debet: ergo solida materie, sicillimis illis tunicis medulla dispoliatur. An uero sicī ratione medulla cōstet, querendū. Materiam autē dum trahitur tam fissā, q̃ sectā peruerret, si id nō ut oporteat, secetur: rectā enim fore sectionē oportet, nec ullo pacto obliquam. Exempli gratia: Si medulla per A lineā constet, haud quāq; per BC secandū, sed per BD: hoc enim modo medullā perire, silio uiuere posse arbitrātur. Sed nullā materiem medulla carere hac existimant ratione.

In omni ligno suam inesse medullam: ac lignorum alia esse fissilia, alia dolatilia, alia rotunda:
quæq; pondem cedant, quæ non.

Caput VII



Onstare enim uel eas medullam habere, quas carere putaueris, ut buxum, celtim, ilicem. Argumentum, quod ualuarum sumptuosarum cardines facere ex his artifices solent, cumq; architecti faciundos ex medulla præcipiunt: quod item, uel omnem medullam distrahi posse, etiam durissimarum materierum, quas nonnulli corda appellant, argumentum sane accipi potest. Materiei autem (ut sic loquar) uniuersæ pars durissima, rarissima medulla est, atq; etiam ipsius abietis: rarissima quidem, quoniam neruis amplo inter se distantibus interuallo, carneq; media copiosiore constat: durissima uero, quod & nerui durissimi, & caro durissima est, qua de causa architecti partes medullæ proximiores auferendas præcipiunt, ut quod spississimum, molissimumq; materiei sit, tantum relinquatur. Lignorum alia fissilia, alia dolatilia, alia rotunda: fissilia, quæ diuidentes per medium secant: dolatilia, quorum partes exteras circumdant: rotunda, quæ scilicet intacta omnino relinquunt. Ex his fissilia nullam penitus rimam patiuntur, quoniam enudata medulla exiccat atq; emoritur: dolatilia & rotunda, rimas admittunt, longeq; magis rotunda, quod medulla in his lateribus plenioribus circumdatur. Haud enim quicq; ex cunctis est, quod fissura immune possit euadere. Itaq; loreis, reliquisq; quorum usus ad cardines, ne findatur, fumo illinunt bubulo, ut siccetur, sensimq; diffusetur, atque euaporetur humor medullæ. Vis medullæ huiusmodi est. Pondus sustinere abietem ualide, & pinum (nil enim ponderi cedunt, ut robur, & reliquæ tertenæ, sed renituntur) argumentum, quod nunc rumpuntur, sicut olea, & robur: sed prius quam uiribus, carie, aliæque deficiunt. Palma quoque præualida est, & in diuersum, quam cæteræ incuruat: quippe cum reliquæ omnes in inferiora flectantur, palma e contrario fornicatim se flectit. Quin & pinum, atq; abietem reniti affirmant. Iuglans frangi se sonitu prænunciat: est enim uel eius materies ampla, ususcq; ad opus rectorium, ita ut præsentire homines possint: quod & in Antandro accidisse, omnesq; e balneis terrefactos profugisse traditum est. Valida etiã ficus, sed in rectum pertendens. Pinus omnium ferè maxime uiribus ualeat, & ad usum ædificatorium spectabilis eadem potissimum est, laxitatis, rectitudinisq; meatuum causa. Hanc enim ne findi quidem ullo pacto posse affirmant, si glutine muniantur. Obedientissima philyca est, candorq; ei celastri modo. Tilia inter reliquas præcipue talis est. In totum enim præfacilis openbus est, præ sua mollicita, ut retulimus. Flecti facile possunt (quoad simpliciter reddere rationem licet) omnes, quæ lentæ sunt: sed moro, atq; caprifico primatus indubie datur. Quamobrem surculas, circos, deniq; ornamento quæcunq; fieri soleant, hisce conficiunt.

Quæ facile, difficiuq; secantur, terebrenturq;: quæq; torno sculpturæq; conueniant: quæ humidissima, quæ nauibus aptissima sint: quæ testis, et plerisq; alijs commodissima, ut abies, pinus, cedrus, picea, robur, tilia, acer, carpinus, iaxus, ilex, scissima, ulmus, buxus, potulace, iuglens, terebinthus, philyca, apharca, celastrius, laurus, salix.

Caput VIII

40



Ecantur, findunturq; facilius, quæ humidiora capituntur, quam ut sicillissima sint: altera enim cessant, altera constant. Quæ uero nimis uiridia sunt, hæc admodum coeunt, segmentaq; inter dentes serrarum admittunt, implentq;. Qua de causa dentes alterna inclinatione fabri permutant, ut sponte educi possint. Sunt & terebratu difficiliora, quæ nimis uiridia: Terebramenta enim, ut ponderosa expui haudquaquam celeriter possunt, siccorum est diuerso celeriter. Aer enim feruefactus confestim expuit. Rursus difficile leuia, & sicca secantur: euenit namq; ut ueluti fictili sectio inferatur. Quam obrem

obrem lignis perforandis aquam infundunt. Securi, torno, sculpturaeque faciliora, quae uiridia: quippe cum ferrum magis insidat, harenaeque, nec quicquam resiliat: securis quoque molliorum, sculpturaeque expeditior, leniorque. Quin & cornus ualidissima est: reliquas ulmus uiribus suis facile uincit: quae de causa cardines (ut dictum est) foribus ulmeos addunt. Humidissima fraxinus, scissimaque: lectulos enim cadere aptos ex his conficiunt. Ad summam, quibus quaeque materies commoda, & quae nauibus, aedibus ue idonea (nam huiusmodi usus plurimus, summisque operibus adhibendus est) explicare uidebitur. Quantum commoditatis singula fortiantur, pro uiribus aperiemus. Abies, pinus, cedrus (ut summam contingam) consistit apudissimae nauibus: 10 triremes enim atque longa nauigia, ex abiete, leuitatis gratia faciunt. Rotunda uero ex pino, quoniam non putrescat. Nonnulli etiam triremes ex eadem conduunt, quod abiete carent. Qui Syriam, Phoenicemque incolunt, cedro utuntur, quia pino etiam egent. Cyprii picea: hanc enim illa insula habet, uideturque pino praestantior, & caetera quidem ex his: carinam uero triremibus quernam subiiciunt, ut cum in terram attrahitur, resistere possit. Nauibus onerariis, pineam, atque etiam quernam subiungunt, cum extrahendas aedificant: minoribus uero scissima deputata est: atque in totum ex hac testudinem condere assolent. Nec pino, atque abieti quercus coagulari ualet, altera enim spissa, altera rara: & altera similis, altera minus. Affectus autem similis ea esse oportet, quae sociari, consilarique debeant, non contrarij, seu si ligno lapidem 20 coniungere uelis. Tornatus nauibus rotundis ex moro, fraxino, ulmo, platano: lentitiam enim, firmitatemque adesse oportet: sed deterrimus, qui ex platano fuerit, celeriter enim putrescit. Sunt qui triremibus uel ex picea leuitatis causa tornandum statuant firmamentum: testudinem, & auriculas ex fraxino, moro, ulmoque fabricant: ualida enim haec esse oportet. Haec ferè naturalis annotatur materies. Sed testis commoda, copiosior est: abies enim, pinus, cedrus, iuniperus, utque in plenum referam, commoda unaquaeque materies est, praeterque si qua firmissima penitus consistit. Non enim quaeque operi eidem accommodatur, quemadmodum nec in nauium fabrica. Reliqua materies artium proprijs redditur: exempli gratia, uasis ac instrumentis, & si quid aliud eiusmodi habeant. Sed ad plurima penè usum abies praestat, quippe 30 quae ad tabellas etiam accommodari pictorias possit. Aedificijs itaque optima, quae uetustissima, modò immuni carie sit. Operibus enim (ut ita dixerim) omnibus aedificatorijs aptissima est, sed nauibus propter flexum humidior capiatur necesse est: Nam ad coagulationem quidè sicciior aptior est. Nauis enim compacta, ut extra mare fidelior constet: & in mare protracta humore inhibito, se undique protinus comprimit, atque rimis coniunctis omnibus continuat: nisi quicquam penitus exauerit, tunc enim gluten aut omnino aspernatur, aut non aequè recipit. Sed iam particulatim materiem, quae comoda sit capiamus oportet. Abies & pinus (ut proposuimus) & domibus, & nauibus, & alijs plerisque commodissima sunt: sed plura abies expedit. Picea usus quidè ad utrumque opus, & maxime ad nauale, sed putrere celeriter incipit. Robur tam nauibus, quam domibus commodum: nec non & in terra obrutum durat. Tilia foris nauium longarum, & arcarum, mensurarumque fabricae expendenda est. Habet etiam corticem funibus cuiusque per commodum. Acer, & carpinus, lectis, iugisque iumentorum, atque in totum operum sumptuosioribus caeditur. Taxus tenuis et scilicet coagulationem capla, scrinijs, subsellijs, atque in totum similibus praestit. Illic honos ad axes plaustrorum uerticis simplicis, & iuga lyrae, psalteriorumque. Scissima ad plaustrorum, uectabulorumque uilem fabricam. Vitis ulmus ad fores, praeter, & torcularia: quin & ad carpentarij opus, sed mediocriter. Buxus ad axes plaustris, & ad burem aratris. Porulaca mulieribus ad opus textorium. Iuniperus ad rem aedificatoriam tum subdiualem, tum obrutam sub terram. Durat enim im-

munis putredine: pari modo & iuglans. Quinimò omnium præcipua operi subterraneo redditur. Est & buxi usus ad nonnulla: quæ tamen monte Olympo pro-
uenit, ob suam breuitatem, nodositatemq; extat inutilis. Terebinthus non nisi fru-
ctu, resinaq; utilis. Neq; philycæ honor, præterquam in alio pecore: semper enim
fronde abundat. Apharca uallis expetitur, & ad urendum comoda est. Celastrus
usus ad baculos. Quidam etiam laurum addunt: seniles enim, & pulchros, & præle-
ues baculos ex hac faciunt. Salicis ad scuta, cistellas, canistras, & eiusmodi reliqua. Reli-
quas quoq; arbores singulatim persequi pari modo possumus.

*Quæ quibus instrumentis conueniant. Cedrosq; in Syria præstantissimas, ac tredcem passuum lon-
gitudinē fuisse earum, quæ ad undecimem Demetrii regis casæ. In Corsica arbores amplissimas,
magnosq; discrimine ceteras excedentes. Romanos in Corsicam profectos condendi oppidi gratia,
& destitisse ob uastarum arborum multitudinem, ex ijsq; ratem edificasse quinquaginta uelis du-
centam. Item de Latino agro, & monte Circeo.*

Capit. IX



Ecce non ad instrumenta fabrilia digestio singulis fieri potest: ut, malleo-
sus & terebra ex oleastro optime fiunt: quanquam & buxeis, ulmeis,
fra . in eisq; utuntur. Malleos magnos ex picea faciunt: simili modo &
reli quarum cuiq; opus quoddā tribuitur: sed hæc pro usu discerni desi-
derant. Materies autem unaquæq; pro loci natura (ut etiam prius retulimus) suam
obinet differentiam. Nam alibi celtis, alibi cedrus miranda allurgit, ut uidere in Sy-
ria licet. Illic enim cedri in montibus, cum longitudine, tum crassitudine præstantis-
simæ exeunt: quippe adeo crassescunt, ut sint, quas ulnæ hominū quatuor nequeant
amplecti: addit his ampliores pulchrioresq; comperiri in hortis. Quod si quis sinat
nec cædat, mirum in modum quodq; arborum genus, modò sibi proprium habeat
solum, excrescere posse uidetur. Itaq; quod in Cypro reges cum ex imperiis, tum
ex transuehendi difficultate, nunquam materiem cæciderint, longitudo ijs, quæ ad
undecimem Demetrii regis casæ sunt, passuum tredcem. Ligna autem mirifice
procera, enodia, leuia, sed amplissima magnitudine arbores, magnosq; discrimine
ceteras excedentes nasci in Corsica produnt. Quamuis enim in Latino agro, pinus,
& abietes tum magnitudine, tum pulchritudine, inter omnes Italicas præsent, ta-
men ad earum rationem, quas Corsica gignit, pro nullo certe habentur. Romanos
enim aliquando condendi causa oppidi in eam insulam nauibus quinque & uiginti
profectos, tam uastis arboribus locus dicitur excepsisse, ut nauigantes per sinus quos-
dam, & portus, nexus, densaq; malos percinderent: & omnino insula tota confers-
tissima, & quasi efferata immani arborū turba spectaretur. Quamobrè Romanos
à condendo oppido destituisse aiunt. Sed nonnullos ingressos, breui ex loco tam lar-
gam cæcidisse materiem, ut ratem perconderet quinquaginta uelis ducendā, quam
in pelago perisisse addunt. Corsica igitur seu ratione laxationis, seu etiam telluris,
coeliq; uirtute locis plurimū ceteris præcellit. Latinus autem ager aquem totus abun-
dat, & plana laurum, myrtumq; habent, scissimamq; mirabilem: tanta enim longi-
tudine cæditur, ut pro carina Hetruscis nauibus possit sufficere. Montuosa pinum,
& abietem ferunt. Circæum uero, quod uocant, excelsum quod dam promontori-
um tradunt frequentissimum arborum, & robore, lauro, myrtosq; maiore ex parte
scæten. Circen in eo habitasse incolæ referunt, & tumulum Elpenoris monstrant,
apud quem myrti proueniunt modo coronarij generis, cum ceteræ ampla exeant
magnitudine. Insulam antea Circæum istud fuisse noratur: nunc enim à fluuijs
quibusdam exaggeratum, factumq; litus est. Magnitudo insulæ circiter octoginta
stadia. Sed pro locorum proprijs, permulta magnaq; exultant discrimina, ut sæ-
pius diximus.

Quæ

Que ad usum ignarium, adq; carbones conficiendos commode: quæq; fumose sint, & quarum fumus acerbissimus. Item quo modo fumo immixti euadant, flammamq; molissimam faciant. De atragena, & cur statim e cedro fudent. Materiem item oleagineam, vel sepe laboratâ germinare.

Caput X



Vo autem pacto sese ad usum ignarium quæq; materies habeat, dicendum nunc est, exploratumq; habere conandum. Ergo carbones optimos spississimæ materies faciunt, ut aria, robur, arbutus: solidissimos enim ita, ut diuturniores, efficacioresq; sint. Qua de causa in metallis argenteis hisce ad decoctionem primam utuntur. Sed deterrimi
 10 inter eos, roboris, quod terrestriores. Vetusioris arboris, & potissimum annosæ, deteriores, quàm nouellæ eadem de causa sunt: summa etenim siccitate constant, ideoq; cum ardent, dissiliunt: humoris nanque aliquid habeant, oportet. Optimi, quos ætate uigens materies fecerit. Sunt enim spissæ, terrenæ, humidæq; naturæ temperatiores: commodiores etiam, qui ex apricis, siccis, aquilonijsq;, quàm qui ex umbrosis, humectis, austrinisq;. Generis item siccioris quantum spissius est, carbonem præstat commodiorem: quo spissius enim, humidius est: atque in totum, ordinis uel naturæ, uel loco siccioris pars spissior, commodior eadem de causa est: usus uero diuerforum diuersus. Quibusdam enim operibus molliores expecti solent, ceu ferreis metallis, iuglans, cum tam exarserit: & argenteis, qui confecti ex picea
 20 sunt. Quinetiam artes carbones suos desiderant. Et quidem excusores pineos potius querunt quàm quernos, quanquam infirmiores sint: ad flarum enim respondent commodius, quoniam minus marcescant, extinguanturq;. Est autem flamma eorum celerior. Deniq; rarorum, & leuium, & aridorum tam carbonum, quàm lignorum acutior est: contra spissiorum, & humidorum, lentior atque crassior. Omnium acutissimam humilis reddit materia, sed carbones nullos relinquit, eo quod corpulentia caret. Cædunt, componuntq; ad carbonem conficiendum, quæ recta & leuia sunt: enim uero quamdensissime componi ad concremationem oportet. Cum uero fornacæ circum accenderint ignem, uerbis interperungentes transmittunt, flammamq; penitus excitant omnibus corripiendis. Hæc querere ad car
 30 bones solent. Fumosa genere quidem uniuerso, quæ humida sunt. Et uiridia quoq; fumosa eadem de causa experimur. Humida inquam, quæ palustria, ut platanus, sâ lîx, populus: nam & uitis fumosa dñ humida est. Palma suapte natura fumosa est. Ex quo illud Cheremonis carmen: Palmæq; uenas usq; fumossissimæ radice natas. Fumus acerbissimus, sici, caprifici, & cuiusq; lacteo succo humentis: causa humor est. Hæc tamen decorticata, & aqua superinfusa madefacta, deinde siccata, omnium maxime immunia fumo euadūt, flammamq; molissimam faciunt: utpote cum proprius quoque, innatusq; humor exemptus sit. Quinetiam cinerem eorum, lîxiuamq; acrem sentimus, ac præcipue amygdalæ: quanquam ad fornaces, artesq; reliquas commoda percipiatur. Ad ignem excipiendum apertissima ficus, oleaq;. Fi
 40 cus, quia lenta, & rara corpore: sit enim exinde ut facile attrahat, nec quicquam dimittat. Olea, quia spissa & pinguis. Fornices tamen ex multis fieri possint, tamen optimi, qui ex nucæ, ut Menestor est autor: celerrime nanque, largissimeq; respirant. Ignaria commodissime capi ex atragena uocata existimant. Arbor hæc uitis, & labruscæ similis surgit: modo enim illarum arbores scandere solita est: sed conceptaculum ex hac, terebrum uero ex lauro faciundum censent. Non enim ex eodem quod agat, quodq; patitur, sed è diuersis accipiuntur: & alterum efficiendi, alterum patiendi uim obtineat, natura protinus exigit. Cæterum uel ex eodem nonnunquam cōficiunt: nec defunt, qui nihil referre arbitrentur: commoda etiam ex rhamno, quæ quidem uel conceptaculum præbere idoneum potest. Non enim

tantum humore exinanitum, arefactumq̃, sed etiam rarum esse oportet, ut attritus efficacior esse possit. Terebrum pati pertinacius esse debet: quæ de causa laureum faciunt: id enim pro sua acrimonia ualētius resistens, opus commodius expedit. Quin & ex rhamno, ilice, tilia, & serè plurimis id fieri solet, præterquam ex olea: quod certe absurdum putaueris: oleam enim duriorem, pinguioremq̃ esse constat. Sed hæc ob immodicum scilicet humorem inepta redditur ad ignitionem. Quodq̃ autem genus ignariorum aquilonijs statibus ignem ocyus, magisq̃ concipit, austrinis minus: & locis æditis, atque sublimibus magis, quam concauis. Cedri materies nata est humorem emittere, & in plenum omnes quibus oleosus est humor. Quam obrem deorum statuæ uisæ sunt aliquando sudasse: ex his enim condere eas consuevere. Quod autem Lucinam appellant, & sacrificijs obseruandum aruspices iubent, concreto quodam humore, extuberat, magnitudine piri, aut paulo maius, minusue. Germen potissimo citat materies oleaginea cum rudis, tum sæpe laborata in opus, si quem humorem sentiat, locumq̃ habeat humectum: ut iam cardo quidam ualuz prodatur germinasse, & poculum limo iniectum.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI
QVINTI FINIS.

10

THEOPHRASTI DE HISTORIA
PLANTARVM LIBER SEXTVS.

De suffruticibus, herbisq̃, ac frugibus: tum quæ maxima omnium generum differentia, deq̃ aculeatis herbis, et quod tribuli proprium: item quibus desit aculeus.

Caput I



DE ARBORIBVS atq̃ fruticibus dictum iam est, nunc de suffruticibus, & herbis doceamus, cōsequitur: & si qua in hisce alia genera comprehenduntur, illa quoque adnotemus oportet, ut fruges: nam hæc quoq̃ inter herbas deputari desiderant. Sed primum uerba de suffruticibus faciamus: id enim genus propius ad prædicta accedit: quod nimirum surculosum assurgat. In omnibus fortè plantarum generibus, syluestre semper urbano copiosius est, uel si id minus cæteris constet: in natura quidem suffruticum ita proculdubio esse fateri conuenit. Pars enim exigua hoc in genere urbana notatur, quæ coronarijs penè consumetur: ut rosa, uiola, lous flos, sansucum, elium: item serpyllum, silymbrium, helenium, abrotonum: hæc enim omnia surculosa, minutisq̃ condita folijs constant, fruticesq̃ proinde redduntur. Item etiam in olerum genere simili ratione sentitur: exempli gratia: Radix, ruta, quæq̃ similia, de quibus haud minus fortè secundū propriam appellationem dixisse conueniet, cum mentionem coronamentorum, atque olerum faciemus. Nunc de syluestribus primum dicendum est. Horum igitur species, partesq̃ plures, cum singulis generibus, tum totis speciebus existunt, quas utique discernamus oportet. Sed maximam cunctorum generum acceperis differentiam, quod alia sine aculeo, alia aculeata. Et rursum in eorum utroq̃ permulta generum, specierumq̃ discrimina constant, de quibus iam referre tentandum est. Ergo aculeatorum alia ex toto aculei sunt, ceu corruda, & nepa: hæc enim nullum iuxta aculeum folium gerunt. Alia folijs constant aculeatis, ut acanum, eringium, cnecum: hæc enim alia in folijs aculeum gerunt,

runt, quamobrem folijs aculeigera dixeris. Quædam etiã iuxta folium aculeatum, altero quoque folio conduntur, ut ononis, tribulus, phleus, quam nonnulli stoebam appellant. Tribulus uel semine aculeigerum constat: habet enim in semine aculeum. Qua de causa id quoque proprium est (ut sic loquar) præ omnibus licet utique adnotare. Nam ramis quidem aculeigera, uel inter arbores, fruticesq; multa comperire potueris, ut pirum syluestrem, malum punicum, paliurum, rubum, rosam, capparin. Hæc in aculeatorum genere discrimina senseris, quoad notatim liceat subsignare. At eorum quibus aculeus deest, digestio nulla penitus generatim fieri potest: quippe cum foliorum diuersitas, amplitudine, paruitate, figuræq; immensa incertaq; sit. Quamobrem alio modo diuidere illa tentandum profectò est. Sunt autem genera eorum complura, summisq; differentiis discreta, ut edera, melothrum, rubeca, sinerea, calia, origanum, satureia, lens, saluia, marrubium, pulicaria, apiastrum, ceteraq; similia. Atque etiã quæ minus similia sunt, scilicet quæ serulacea, & neriscaulia consent, ceu foeniculum, equisocniculum, ferulago, ferulaq; herba muralis, siue muricida à quibusdã uocata, ceteraq; similia. Hæc enim omnia, atq; in totum, ferulaceum suffruticum naturæ addixeris. Genera uero atq; discrimina, singulis hisce indicatis habentur, alijs euidentiora, alijs occultiora.

10 *Edera, & calia duo esse genera. De origano, thymo, sphacelo, saluia, marrubio, pulicaria, ferula, ferulagine, mandragora, cicuta, eleboro, albuco, foeniculo, muricida.*
Caput II



Deræ namq; duo genera, mas, & foemina. Quoniam altera masculus, durius, pinguiusq; folium habeat, floremq; ad purpurâ inclinatum: am-
10 babus tamen flores rosas syluestribus proximi, uerum minores & sine odore. Calia quoq; duo genera, alia enim candida, alia nigra: candida folium modo curis oblongum, figura quodammodo oleagineo simile: nigra quale tamarici carnosum. Candida magis se humi spargit, odorataq; est: nigra odore caret. Radix ambabus, quæ alte descendit, grandis, ramisq; permul-
ti, crassi, surculosisq; ab ipsa protinus tellure, aut paulò superius sparsi, lenti admodum constant: quamobrem hisce ad colligandum modo iunci utuntur. Germi-
nant, florentq; post æquinoctium autumnû, & multum denique temporis florent. Et origani uero genus nigrum, sterile constat: candidum, fructuosum est. Quin
10 & thymum candidum, nigrumq; reddunt: serò id admodum floret: nam circa æstium solstitium incipit. Mel apes hinc capiunt, & hoc augurio apiarum constare affirmant, an probe melletur, nec ne: etenim si aliter defloruerit, mellatio minus probe succedet: destruitur, peritq; flos, si imber incessit. Semen foecundum satureiæ, atq; etiã magis origani manifesto sentitur. Thymi nullum ostendi potest, sed floribus quodam permiscetur modo: flores enim serunt, itaq; oritur thymum. Qui
tamen Athenis deportare desiderant, quaerunt atque inueniunt. Peculiare tam
40 præ ijs ipsis, quàm præ reliquis omnibus, uel ex locis sortiri thymum autumant: nam quò flatus è mari nequeat peruenire, illic nasci durareq; posse omnino negant. Qua de causa nec in Arcadia satureia, & origanum prouenire possunt. Quanquam similia multa, multisq; in locis gignuntur. Proximum sanè, quod etiã in olea euenire notatum est. Nec enim ea trecentis à mari stadiis prouenire posse uidetur. Sphacelus, & saluia inter sese distant, quasi alterum urbanum, alterum genus syluestre dixeris. Sphacelo folium leuissimum, còtractissimumq; squallens: saluia scabrius. Sunt & marrubij duo genera, aliud enim folio herbido, ser-
ratori, incisurisq; profundioribus, & proinde conspectioribus discreto constat, quo unguentarij uti ad nonnulla consueuerunt: alterum rotundius, squallensq;

uehementer, sicut sphaceli, incisurasque habens obscuriores, minusque serratum. Pualicaria mascula, & foemina constat: distant quemadmodum caetera, quae sic diceri debent: foemina enim tenuiori folio conditur, & compressior est, atque in totum minor: mas amplior, crassiorque caule atque ramosior, & folium amplius, pinguisque habens: necnon & flore splendor est. Ambo fructifera sunt: in totum serotina germine, floreque constant: quippe cum circa arcturum, & post arcturum incipiant. Mari grauior odor, foeminae acrior, ideoque contra bestiarum morsus commodior est. Haec igitur & similia discrepare quasi inter se sentiuntur. Sed adsunt alia facie uniformi, tum in ijs quae ante enumerauimus, tum in caeteris: plura namque 10 proueniunt. Ferulaceum autem genus (nam id quoque inter suffrutices est) in plures species spargitur. Sed primum de eo quod commune omnium constat, dicendum est, scilicet de ferula atque ferulagine: seu idem genus ambabus differens magnitudine tantum, seu etiam alterum sit, ut nonnulli putarunt. Ergo natura earum quae conspici possit, consimilis certe sentitur, praeterquam ratione magnitudinis: ferula enim grandis admodum surgit, ferulago autem humilis. Sed unicaules ambae geniculatae sunt. Folia & caliculi quidam geniculis erumpunt, ac alternatim exiunt: folia alternatim inquam, quod non ex eadem parte geniculorum, sed permutatim caulem magna ex parte amplexa, sicuti harundinea proueniunt, nisi quod deflexa haec magis molliue, magnitudinisque causa: folium enim grande, molle, multifidum, ut capillamenti modo se res inspectetur, maximaque terrae proxima, & 20 reliqua subinde ad portionem: flos mellinus, semen obscurum, anetho simile, sed maius, finditur cacumine, inque stipites quosdam haud magnos dispergitur, quibus flos, semenque insidit: nec flore fructu ue laterales caules carent, sed modo anethi ferunt: annuo caule constat. Et germinatio in Vere primum foliorum, tum caulis, ut etiam in caeteris fieri solet: radice alte descendit, eademque singulari innititur. Talis ferula est. Ex reliquis autem quaedam huius proximiora caule constant, ceu mandragora, cicuta, elleborum, albucum: quaedam ueluti neruicaulae sunt, ut foeniculum, muricida, & eiusmodi reliqua. Fructus mandragorae peculiaris, quod niger, racematus, uinofususque suo sapore sentiat. Sed praecleara summeque peculiaris natura laserpitij, & papyri Aegyptij: nam haec ferulacea constant, & de papyro inter 30 aquatiles prius reulimus.

De laserpitio, magyleri, quidque differant inter se: item de nepa, corruda, sine asparago, et quae aca nacea sunt: de berbæ laneria, sonco, cinco, acarna, spina candida, et eria, aculcofa, suso agresti, buxo asinino, carduo pinea, uermilagine.

Caput III



Elaserpido nunc indicandum est. Laserpitio radix multa, crassaque: caulis quantus ferulae, & crassitudine fere proximus: folium quod maseptum uocant, apio simile est: semen latum, foliaceum, scilicet quod folium appellatur: caulis annuus sicut ferulae. Ergo Vere ineunte maseptum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitque uehementer, & carnes mirabile in modum suauis redditur. Post hac caulem addit hominum cibo idoneum omnibus modis, elixum, assumque: corpora eo quoque purgari ferunt. Quadraginta diebus succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice: quae de causa alterum scaparium, alterum radicarium uocant. Radix nigro cortice tegitur, eumque detrahare solent. Sunt ueluti certae mensurae caedendae radices, quibus quantum conferre putetur ad futuram caesuram reseruantes, reliquum abscondunt. Nec enim de uite, neque plus constituto caedere licet: corrumpitur enim putrescitque, si diu mansit. Praeparant id, conficiuntque in Pyraeum portu aduectum hoc modo: Cum in tralis coeuerint, farinamque admiscuerint, quatuor longo spatio temporis: hinc etiam colore capessit, & coctum iam incorruptum perdurat.

perdurat. Præparatio, cæsuræq; ita se habet. Locum Africæ amplum occupat, ampliore, quàm quatuor stadiorum millia in hortis Hesperidum ferunt: sed maiorem partem colligi apud Syrtis. Peculiare huius culta fugere loca proditur, quâobrem si colatur, miscetq; solum, deuia, atq; omnino degenerat, utpote natura culturæ aspernâs, ferocitatisq; constans uernaculum. Cyrenêses annis septem prius, quàm ipsi urbem habitarent, laserpitium extitisse affirmant: habitant uero annos maxime trecentos usq; ad Simonidæ Athenis magistratum. Illi sic referunt. Alij radicem laserpitij cubitalem fieri tradunt, aut paulo maiorem: hanc in medio extuberare in ca-
 10 put, quod sublimè penitus extat, ut ferè super terram esse appareat: unde primum quod lac appellât, erumpit, dein caulis assurgit, ex quo magydaris, & quod folium dicitur, exeunt. Folium id semen est, quod cum aufer ingenue post caniculam flau-
 uerit, discutitur, atq; ita laserpitium nascitur, eodemq; anno radix consummatur, & caulis. Sed hoc haud quicquam peculiare notetur, nam alijs quoq; idem tribuitur: si dixeris, quod discissum id protinus nasci potest, ortum peculiare fortiri, su-
 prædictisq; propterea diuersum accipi posse. Ad hæc circumfodiendum id annum censent: nam si relinquatur semen omne, caulemq; totum proferri, & deteriora
 tam hæc, quàm radicem reddi existimant: defossa autem fieri meliora sollicit solo
 subactio, beneq; gluto. Sed huius contrarium illi uolunt, qui culta reculare in-
 20 quunt. Mandi quoq; radices in aceto recens decisas referunt. Folium colore aurum æmulatur. Contrarium etiam quod pecora folio esicato purgari minime indicant.
 Nam & Vere, & hyeme, pecus ad montem dimitti affirmant: cibis nō solum hoc, sed etiam altero quodam abrotono simili administratur. Vm ambo calefactoriam
 fortiri planè uidentur, & purgare quidem nequaquam uelere: excicare autem, & concoquere unice posse. Quod si qua pecus ægre scens, aut aliàs minus bene se ha-
 bens ingressa sit, mox eam sanari, aut emori aiunt, sed magna ex parte posse seruari.
 Hæc igitur utro tandem sint modo, quærendum. Quod uero magydarium uo-
 cant, nimirum à laserpitio differt: tenerius enim, minusq; uelens id sentire, &
 sine lasere est. Necnon & aspectu manifesta experto homini cōstat. Nascitur in Sy-
 30 ria: nam apud Cyrenam, & monte Parnaso large prouenire eandem affirmant. Sed quidam laserpitium id appellant. An culta id quoque modo laserpitij fugiat,
 quærendum. Quin & si quid simile, aut proximum habeat, ad folij, cauliscq; ratio-
 nem, & si quam ullo pacto emittat lachrymam, id inuestigandum. Ergo naturam
 ferulaceam, hisce cōtemplari oportet. Aculeata uero sequitur, ut hoc exponamus,
 quoniam distinctum superius sit, aliud totum esse spinosum, aliud spinosum folia-
 rum, seorsum de utroq; dicendum: atq; tertium illud addendum, quod iuxta aculeum
 folium gerit. Phleus enim, tribulus, capparisq; peculiare nimirum obninent,
 ut non solum caulem aculeatum, sed etiam folium habeant hispidum. Inter ea ue-
 ro distincta genera, plurimum quod aculeato folio cōstat, nimirum dixerim: quod
 ex toto spinosum inspicitur, exiguo, id est numero, quemadmodum diximus. Et dis-
 40 ficile quicquam fermè inueneris, præter corrudam & nepam, quæ post æquino-
 ctium autumnū florescunt. Nepa enim florem in carne extuberante sub extremo
 aculei profert initio candidum, postea leuiter accedentem ad purpuram. Corru-
 da propter aculeos pusillum quandam producit peciolum, ex quo flosculus tan-
 dem ipse erumpit. Nepa radice singulari, eademq; breui adhæret. Corruða radice
 large alta, numerosa, eademq; tam crebra innititur, ut pars superna radicum tota
 connexa, & continua reddatur, ex qua uel ipsorum caulium facitatur prouen-
 tus. Exit caulis de corrudagine Vere, ciboq; idoneus est: deinde durefcit, flores-
 centq; in dies: flos non solum ex hoc, uerumetiam de primoribus emergit caulibus.
 Hæc annuo constat caule. Igitur quæ spinosa in totum sunt, naturam eius

modi obtinuerunt. Illorum uero quæ folio constant aculeato, genus (ut sic loquar) magna ex parte acanaceum est: acanaceum inquam, quoniam conceptus, & id cui flos inhaeret, aut etiã fructus, spina, uel spinaceum quicquam sit. Sed differunt inter se magnitudine, figura, colore, multitudine, paucitateq; spinarum, reliquarumq; rerum, exceptis tantũ admodum paucis, ceu herba lanaria, fonco, & si qua sint alia. Reliqua (ut ita loquar) omnia eiusmodi sortiuntur naturam. Nam & cnecum natura spinosa est, quanquam discrepat semine. Verum hæc omnia eiusmodi sunt, acanaceum, spina candida, æraria, cnecum, aculeosa, fusus agrestis, burxus asininus, carduus pinea, uernilago: hæc tamen non aculeatis folijs constat. Carduus etiã nimirum eiusmodi folijs est, & beta syluestris, & alia plura huiusmodi percipiuntur. Sed præter ea prædicta discrimina, distant inter sese, quod alia multis constant caulibus, ramisq; fundunt, ut cnecum: alia superne cacumine tantũ sparguntur, quemadmodum rithutrum: & alia protinus primis imbribus germinant, alia post: nonnulla etiã æstate, ut quæ tetralix à quibusdã uocata est: & carduus pinea pari modo, & flores differentia faciūt. Carduus enim pulchre, diuq; floret. Acarnis differentia nō sunt.

De cneco syluestri, cuiusq; generibus, ac de acarna iterũ, & fusis agrestis, carduoq; & carduo pinea: de cæto etiã, quæ tantũ in Sicilia nascitur. Tum corũ quæ spinosus folijs constant, iuxta aculeum quædam solum gerere.

Caput IIII



Necum syluestri, urbanoq; discernitur: syluestris genera duo notantur, alterum urbanum admodum simile, recticaulius tamen, quamobrem ex eo mulierum præscarum nonnullæ colu utebantur: fructum nigrum, maiusculum, amarumq; parit. Alterũ genus densum constat, caulesq; sonceos profert, & quodammodo humiciale sit. Nam propter foliorum mollitiã declinatur, procumbitq; ad arua. Fructum amarum, frequentem, barbæq; modo hirsutum gignit. Sunt ambo seminosa, uerum syluestre copiosius fert: eius peculiare præ alijs syluestribus est, quod illa duriora, spinosioraq; urbanis proueniunt: hoc autem, mollius, ac leuius constat. Acarna quoad simpliciatione exprimi licet, aspectu cneco urbano similis est, colore flauicans, succo pinguis. Fusus agrestis his candidior est, habetq; peculiare, quod in folijs euenit: decerpta enim, carniq; allata, succum sanguineum effundunt: quæ de causa quædam id est, cruor à quibusdam spina est hæc nominata: grauis etiã odore, cruoremq; representans, serò perficit fructum. Autumno enim & quidem in totum (ut summatim proponam) uniuersa spinaceorum natura fructus, serotina existit. Hæc autem omnia tam semine, q̃ radice proueniunt, ita ut breue quoddam, inter ortum, & seminum perfectionem labatur spacium temporis. Cardui non solum peculiare illud notatur, quod radicem uescendam tum decoctam, tum crudam obtinuit, sed etiã quod eandem optimam habet cum floreat, quodq; radix durefcẽs lacteum succum emittit. Floris quoq; prouentum peculiarem putaueris: etenim circũ solstitium incipit carnosam, ciboq; idoneam partem crassefcẽtem sortitur. Ortus autem eius non spinosus, sed oblongus fieri assolet: quod propriũ habent tantũ, in eorum genere, quæ folijs constant aculeatis: è diuerso, quàm uernilaginẽ, habere uidemus. Illa enim tametsi non aculeato folio constat, tamen acarni speciem gerit: senescensq; flos, in lanuginẽ, papum uocatam, conuertitur, modo laurini, myrtini, & cæterorum generis eiusdem. Pergit hæc ad ætatem usque, aliud parturiens, aliud florefcens. Semen illud humoris aliquantulum continet, aculeoq; armatur. Folium cum arefcit, remittitur, nec quicquam amplius pungit. Carduus pinea haud multis prouenire in locis potest: est ab radice foligera, quæ de media semina-
lis acanus, uelut mālum exuberat: folijs nimirum occultatus. Hic lachrymam iucundi

lucundi saporis parte profert postrema, quam spinalem masticham uocāt. Hæc igitur eiusmodi genera omnibus ferè terris possunt comperiri. Quæ autem Cactius nuncupata est, in Sicilia tantū nascitur, Græciæ nusquam habetur sui generis plantæ: hæc enim statim ab radice caules repētes in terram mittit, folio lato, atq; spinoso. Caules hos cactos appellāt: desquamati cibo idonei sunt, paulò amaricātes, & referuare eos aqua salsa conditos cōsueuerunt. Alium uero caulem erectum producit, quem pternicem uocant, is quoq; cibo aptus excrescit, sed referuari nō patitur: fructus in quo semen, spinata specie est, uetū exomptis lanuginosis seminibus, is quoq; uescēdus relinquitur, & cerebro palmæ similis est, Scaliam eum appellāt. Ergo quæ spinosis folijs constant, differentijs eiusmodi persequi congruum est. Quædam uero folium iuxta aculeum gerunt, ut phleum, inturis, ononis, tribulus, lappago, spinamurdis, alia pleraq;.

De phleo, inturi, id est capparī: de tribulo, cuiusq; duobus generibus: deq; ononi, herba aculeigera.

Caput V



Phleum folio cōstat carnosio, multifidum, multistripsq; est, nō ramen alte descēdit: germinat cum uergilijs, primoq; aratro unā, nec folia id dimittit. Nō enim annuū, sed diuturnius est. Inturis præter prædicta, peculiare: ut retulimus habet, quod & folium, & caulem gerit subhispidum, nec phleum, & lappaginem æmulat, quæ folijs mitibus constant: unistrips, humile, humile caule est: germinat, floretq; æstate, & folium usq; uergilias uiride perdurat. Gaudet locis arenaceis atq; tenuibus: cultis haud quicquam exire dicitur, cum apud oppida, & loca plana proueniat, non la serpij modo apud montuosa: hoc igitur minus uere putarunt. Tribulus uero peculiare sortitur, quod fructu aculeigero constat. Eius duo genera sunt: unus enim folio ciceris exit, alter spinosus, foliatus constat: ambo terreni, atq; multifidi sunt: serius germinat, qui spinosus folijs est, & apud septa uillarū is solet erumpere. Semen præcoquis, lesamæ uicinum: ferotini rotūdum, nigricans, septum in siliqua. Atq; ea quidem, quæ folio quasi orbantur, spinamq; gerunt, hisce ferè constare animaduertimus. Ononis ramis aculeigerum est, anno tantū perdurans: folio rutæ similis, sed per totum appositum caulem, ut ueluti coronam ex interuallis tota species repræsentet: florem minutulum, & in siliqua non undiq; septum ædit. Nascitur lento, plenoq; solo, & præcipue in segetibus, atq; cultis: qua de causa agricolis inimica exit. Viuax admodū est: cum enim altam nacta tellurem fuerit, protinus sua infima pellit, & singulis annis, furculis in latus emissis, rursus anno postero deorsum uersus pellere solita est. Effodienda tota, extirpandaq; penitus est, quod solo madefacto agendum: sic enim facilius interit: nam si uel paruulum relinquantur, ex hoc assurgere iterum potest. Incipit germinare æstate, perlicitur autumnō. Ergo syluestre genus suffruticum intelligere ex his licet.

De suffruticibus urbānis, & coronarijs: de uiola nigra, & roseis, & eorum differentijs.

Deq; lilio, narcisso, croco.

Caput VI



Urbana uero angustam quādam obseruationem obtinere, siquidem numero tantū consummentur coronariorum. Quamobrē in uniuersum de coronis indicare tentandum est, ut genus amplecti totū possimus. Enimuero ratio coronariæ naturæ ordinem quandam sortitur propriū, sed ita ut partim suffruticibus sit, partim herbaceis permista: qua propter comprehendere illa quoq; debemus, mentionem utiq; faciendo, quoad opportune fieri possit, sumpto à suffruticibus initio. Diuidi autem hæc bisariam exiunt, ratione scilicet usus: aliorum enim flores tantū uisusunt, & eorum alius odor

ratus, ut uiola: alius sine odore, ut louis flos, flamma. Aliorum etiā rami, folia, & in
 torum uniuersa natura odorata sentiuntur, ut serpylli, helenij, silymbrij, & aliorū quo
 rundam: sed utrunq; genus annumerandum suffruticibus constat: necnon & illo
 rum florigerorum natura magna ex parte suffruticea est, alia annua tantū, alia diu
 turnior, uiola nigra excepta. Hæc enim ramulis caret, sed ab radice foliata cōstat, &
 perpetuū uiret: utiq; aliqui ferūt, etiā florem semper promere potest, si modo quo
 dam colatur. Id igitur propriū ista fortiantur. Reliquorum autē uel potius omnium
 totæ quidem formæ ferē omnes perspicuæ sunt: quamobrem si quas alias habeant
 proprietates, hæc exponamus, oportet. Quippe alia simplici specie constare, alia
 differentijs uariari uidemus. Simplicia quæ lignosa, ut serpyllum, silymbrium, hele
 nium: præterq; si alia syluestria, alia urbana, & alia odorata, alia minus odorata exis
 stant, quorum quidem & cultura, & terra diuersa est, atq; etiam cœlum diuersum.
 Quidam uero ex floribus nulla parte discerni possunt, ceu uiolæ nigræ: hæc nanq;
 differentiam nullam habere uidētur, quanquam albæ nimirum habeant: colorem
 enim earum uariari liquidū patet, atq; etiam magis liliorum: siquidem (ut aiunt) ne
 purpurea quidem lilia desint. Rosarum autē differentiæ permultæ, foliorum mul
 titudine, paucitate, asperitate, leuitate, colore, odore. Quippe cum plurimis quina
 folia sunt, quibusdam duodena, uicenaq;, alijs longē plura: sunt enim quas centifo
 lias uocāt quæ circa Philippos plurimæ exeunt, easq; incolæ ex Pangæo transferen
 tes ferunt: illic enim multæ eiusmodi fiunt. Sed folia interna parua admodum sunt,
 ita etenim oriuntur, ut alia intus, alia extrā emicent, non tamen iucundi odoris, nec
 amplæ magnitudinis sunt: odoratiores inter amplas, quibus pars ima scabra. Ad
 summam (ut dictum est) & odoris, & coloris præstītia, locorum ratione contingit
 nam & quæ in eadem tellure proueniūt, diuersitatem bonæ, exilis ue olentia, nul
 lam ostendunt. Odoratissimæ, quæ apud Cyrenam gignūtur, & proinde unguen
 tum iucundissimū illic faciūt. In plenum uero, & uiolarum, & reliquorum florum
 odores ibidem synceri præcipue sentiūtur. Nascitur rosa etiā ex semine, quod flori
 subditum suo in malo contentū cneceum, uel acanaceum lanugine quadam obdu
 ctum gerit, ut primis seminibus proximum sit. Cæterum quoniam tardè perficitur
 semine, fata caule cōciso (ut dictum est) ferūt. Vsta, recisæque florem melius profert:
 relicta nanque excrefcit, syluesticq;. Sæpius transferre eam satius est: sic enim pul
 chriorem effundi rosam affirmant. Syluestres, asperiores tum uirgis, tum solijs con
 stant, & florem minus odoratum, minusq; coloratum, nec tantundem magnitudi
 ne ferunt. Viola nigra distat ab alba tum aliorum quorundam, tum plantæ ratione
 ipsius, quod latifolia, humilifolia, carnifolia extet, & radice multa cohareat. Lilia co
 loris supradicta differentia inter se distant: unicaulia in uniuersum ferē assurgunt,
 bicaulia raro: quod cœli, terræq; rationi fortassis attribūdum est. Singulis caulibus
 aliās unum lilium, aliās plura exeunt: pars enim postrema effundit: sed hæc rariora.
 radice copiosa, carnosa, orbiculatæq; adhæret: fructus detractus germinat, & lilium
 reddit, uerum minus: facti & lachryma cæcum quoddam confluum, quod etiam
 ferunt, ut dictum est. Narcissus, uel liliū (alij enim hoc, alij illo nomine uocant) fo
 lium albu: cui terræ proximum gerit, sed longē latius, modo lilij: habet caulem sine fo
 lio herbaceum, florem suo ferentem cacumine, in membrana ueluti uasculo inclu
 sum, large amplum, coloreq; nigrum, figura oblongum: hic decidens sponte ger
 minat: cæterum & qui legūt defigere eum solent. Quin & radice ferunt, quæ car
 nosa, rotunda, amplæq; constat. Serotinus admodum: post arcturum enim & circa
 æquinoctium floret. Crocum natura herbaceum modo prædictorum erumpit, sed
 folio angusto ferē, nanq; in capillamenti modum foliatis: serō floret, seroq; germi
 nat, aut præmature, uitro scilicet modo tēpus acceperis: floret quippe uergiliarum
 occasu,

occafus, paucisq; cubus, confestim uero cum folio florem quoq; expellit, quinimq; prius. Radix multa, carnosa, in totumq; uiuax: gaudet calcari, & melius ira euadit: radice attrita pede inferius, ideo iuxta semitas, fontesq; pulcherrimum exit: satus a dice fieri assolet. Hæc in hunc modum proueniunt. Reliqui autem omnes prædicti flores femine exeunt, ut uiola, lous flos, iphyum, flammula, elium: nam & ipsa, & eorum radices ligno nimirum constant.

De ananthe, abrotano, sampfuo, serpyllo, sisymbrio: tum qui flores uerni, qui æstiu, qui autumnas
les: & de uiola, ac rose uita: tum de myrto ægyptia miri odoris. Caput VII



- Enanthe quoq; semine obserēda est, nec enim hæc excludi à floribus debet. Ergo quæ dicata floribus sunt, hisce atq; similibus penè accipi debent, reliqua & florem & semen omnia ferunt: quanq̃ non omnia ferre putantur, quod fructus quorundam haudquaq; manifestus existat. Nam & flos nonnullorum incertior est. Quinetiam quod lentius, difficultiusq; seminata perficiuntur. Planta propterea uti potius cōsueuerunt, quod uel inter initia proposuimus. Quanquam sunt qui ea omnino fructu carere a se uerent. Sæpe enim exiccata, tritaq; seruisse se inquit, sed nūquam germen erupisse, nec serpylli, nec helenij, nec sisymbrij, nec mentæ: nam huius quoq; periculum se fecisse affirmāt: attamen illud uerius est. Neq; defunt qui uel hæc experti fuerūt, & natura ipsa syluestrium planè attestari uidetur: serpylli etenim syluestre etiam genus est, quod deferētes ex montibus ferunt, ut apud Sycionem fieri solet, atq; etiam Athenis ex monte Hymetto: apud alios uero, ut in Thracia, mōtes & plana omnia serpyllo scatent. Sed sisymbrio, reliquisq; odor acrior est. Serpyllus apud nonnullos etiam thymum penitus redolet. Cōstat ergo quod omnia sui ortus primordium ex semine capiūt. Sed abrotanū radice, aut auulsione potius quā semine germinat, semine enim difficulter exit, & hoc testis antea uiuiradicis causa intimato, quemadmodum Adonidis hortulos emoliuntur. Seritur æstare: friget enim uehementissime atq; in totum morbo obnoxium est, etiam ubi sol uehementer illucet. Sed cum conualuerit, creueritq; magnū, robustū, atq; arboraceū cōstat, quemadmodum rura, nisi quod hoc lignosius, & siccus, & squallidus est. Sansucū utroq; modo emigrat, uidelicet & semine, & auulsione: præstat seminis copia, & iucundi odoris semen est, & quidem mollioris odoris: necnon & planta eius trāsferri potest. Abrotonum quoq; semine abundat, nec sine odore est, sed id radices rectas, altasq; agit: est ueluti unistirps, crassa scilicet illa radice: reliquis uero de ea exeūtibus spargitur, quod non sansuco, nec serpyllo, nec sisymbrio, nec helenio datum est: hæc enim in summo terræ adhærēt, radice multifida torrida. Radices omnes lignosæ sunt, sed longe magis abrotanī, magnitudinis, siccitatisq; causa. Serpyllo peculiaris auctio germinum: quippe cum in quantum uis longitudinis procedere ualeat, nasci scilicet adminiculum, aut iuxta sepes aliquas farum: crescit præcipue in puteis. Genera urbana reddere nō est, ut retulimus: ferocia esse affirmant: hunc enim in montibus tum saturiatum quendā atq; uehementissimum, tum gratum odore, mollioremq; comperiri. Tempus ferendi plurimum autumnus: hoc enim primum serere nimirum properāt. Cæterum & Vere nonnulla ferūtur. Omnia autē umbram, aquam, simūq; unice amant. Serpyllum squallorem patitur, atq; in totum aquæ paucae indigum est: sed simo præcipue gaudet, & iumentorum potissimum. Transferendum quoq; id sæpius censent: melius enim sic redditur. Sisymbrium uero & degenerat facile, nisi transferatur, ut dictū est. Florum prima uiola alba se ostēdit: emicat ubi cœlum clemētius statim, etiam nondum hyeme exacta: ubi uero immitius, postea. Vere non unquam cum uiola alba, aut paulo post lilium exit, & quæ uiola

flammea uocatur, syluestris dicitur. Hæc ceteris omnibus, quibus coronarij utuntur, longe præcurrunt. Post hæc narcissus, & liliū exeunt. Ad hæc bulbi flos, quidam enim coronis hunc etiā inferunt. Sequitur uitisflora, & nigra uiola, & c. syluestrius aurelia, & genus fremij, quod limonium uocant, & pugio, & hyacinthus: & quibuscumq; ferè alijs montanis utuntur. Rosa ferior hisce est, & nouissima quidam erumpit: prima autem inter uernos desinit flores, parum enim temporis durat eius prouentus. Nam & reliqua in syluestrium genere parum durant, excepta hyacintho, tam syluestri quàm urbana: hæc enim plurimum durat. Adde uiolam albam, atq; etiā magis flammeam. Nigra (ut dictum est) per annum durat, sicul-
tus adhibeatur. Eodem modo uitisflora: nam ea quoq; addicta floribus est, naturaq;
herbacea constat. Si florem atteras, auferasq;, nec seminefcere sinas, nec solum desit
apricum, durare plurimum potest: flos specie constat racemi, candidusq; est, ut la-
brusca. Hæc igitur uerna potius esse uidetur. Aestiuā autem, lucernula, louis flos,
cerinthus, iphyum, sansucum, phrygium. Item quod desyderium uocant, cuius ge-
nera duo sunt: unum cui flos hyacintho similis, alterum decolor, album, quo in ses-
pulis uti mos est, & diuturnius uero id ipsum est. Floret & consecratrix aestate,
& lanaria dicta, flos aspectu pulcher, sed caret odore. Lirij alterū genus, & crocum
tam montanum, quod exors odoris est, quàm satuum, autumnō florere incipiunt:
statim enim primis imbribus florent. Quin & syluestrium genere spinæ acutæ fru-
ctu, & ederae ciliæ flore utuntur. Temporum quidem ratione, ordinem hunc sine
gulorum ortus fortiri animaduersum est, sed quoad plenius dici liceat, nullum in-
termittitur tempus, nec ipsa hyems flore uidua est. Sed hæc etiā, quanquam gelu
insecūda apparet, flosculos tamen habet scilicet autumnalibus prorogatis. Quod
si hybernū tempus clementius fuerit, longe magis ita continget: etenim quoad
absolute liceat loqui, maior pars florum uel ultra tempus sibi accommodatum pro-
trahi potest, & si loca aprica sint, magis id euenit: ex quo fit, ut perpetua florum con-
tinuatio agatur. Tempora hæc generationum notantur. Vix uiolæ albæ anni ma-
xime tres: senescens diminuitur, candidioresq; assidue flores fert. Rosæ quinque-
nium ad uigorem scilicet, non adustæ, neq; recisæ. Sed eius quoq; flores senescens
deteriores redduntur. Ad iucundam autem olentiam, & rosarum, & uiolarum, &
reliquorū florum, solum coelumq; singulis accommodatū plurimum cōfert. Nam
in Aegypto cætera quidem omnia sine odore floreq; etiā aromata dicta sentiuntur:
myrti uero mirum in modum odoratæ assurgunt. Prouenire ante hæc nostra,
& rosas, & uiolas, & reliquos flores tractus illius, etiā binis mensibus plusq; du-
rare haud hoc breuiori tempore aiunt. Videtur & annus (ut diximus) ad bonā olea-
tiam referre, cum scilicet talis, aut talis inceserit: non imbrium squallorumq;
tantū ratione, sed etiā quum tempus certum, & aqua, & flatus, & in
totum cœli commodæ mutationes accessere. Montibus autem (ut
simplid transfigam ratione) & rosæ, & uiolæ, & reliqui omnes
flores, odore longe deteriores emergunt. Atque coro-
nariorum, & in totum suffruticej generis com-
mentatio, hisce similibusq; absoluitur.

De herbaceis & oleribus: triusq; esse sementes hortensium: & quid quoq; tempore feratur:
necnon quæ serb, quæ uelociter ex oleribus emicent. Caput I



SEQUITVR ut de herbaceis doceamus: id enim reliquum ē generibus est, in quæ principio plātas omnes digessimus: quo in genere olera etiam, & frumenta quodammodo comprehenduntur. At primum de oleribus indicandum, sumptio ab urbanis principio: sunt enim hæc syluestribus longe notiora. Sementes hortensium, quibus feri singula solent, tres certe notantur, una hyberna, alia æstiuæ, tertia quæ inter eas cadit,

post hybernũ solstitium: quas ita appellant, non ratione satius, sed ortus, ususq; cuiusq;. Satus enim in contrarijs ferme consistit temporibus, quippe cum hybernũ principium post æstiuũ solstitium sit, mense Iulio, quo brassicam, radiculam, rapam, & quæ semētis postera uocant, ceu betam, lactucam, erucam, rumicem, sinapi, coriannum, anethum, nasturtium ferere assolent: primamq; semētem istam appellant. Secunda post brumam Ianuario incipit mense, qua seminant, designantq; porrum, apium, gethyum, atriplicem. Tertia, quam æstiuam appellant, mense Martio agitur, qua cucumis, cucurbita, blitum, ocimum, portulaca, fatureia feruntur. Quin & alias plures sementes similiũ singulis temporibus faciunt, ut radices, ocimi, & aliorum quorundam, sed omnibus sementibus, quæ postera uocant, feri optimæ possunt. Omnia pari tempore nequaquam proueniunt, sed alia celerius, alia ferius, quæ scilicet prouentu cōmuniōra consistunt. Celerrime ocimum, blitum, eruca: & de hybernis radix, die nanq; (ut ita loquar) tertio erumpit, lactuca quarto, aut quinto: cucumis, & cucurbita circa quintum, aut sexto, uel, ut alij uolunt, septimo: sed prius, celeriusq; cucumis. Portulaca serior hisce exit. Anethum quarto. Nasturtium, & sinapi, quinto. Beta æstate, sexto: hyeme, decimo. Atriplex, octauo. Brassica, decimo. Porrum & gethium nō conueniunt, sed porrum decimonono, nonnunquam etiam uicesimo die prouenit: gethium decimo, aut duodecimo. Coriannum prouentu contumax est, quippe quod si nouum sit, nasci recuset, nisi conuoluatur. Satureia, atq; origano dies plus quam triginta dātur. Omnium difficillime apium nascitur: quadragesimo enim die affirmant, qui celerrimum eius prouentum tradidere: sed sunt, qui quinquagesimo uelint, quod etiā omnibus sementibus feri potest: quidam enim omnibus id adiungunt. Ad summam, quæ locis pluribus feri patiuntur, hæc nihilō celerius ex maiore parte proueniunt: quod mirum, si tempus, aer uē, nihil cōferat ad celeritatem. At si improba, frigida, celoq; tristi circundata sunt, ferius prodeunt: nam & tempestas, serenitas uē sementi succedens, facit ut aliās ferius, aliās maturius germinetur. Discrimen illud quoq; in sementibus singulis, quod locis apicis, temperatisq;, maturissime prouentus fieri solet: causas enim eorum (ut simplicius loquar) in pluribus constare credendum est: exempli gratia, in seminibus ipsis, in celo, in tempore, quo singula fieri placuerit: adde tempestates, serenitatesq;. Sed hoc amplius inspectandum, in quibus tempora differant, atq; in quibus cōueniant: radicem enim tertio die tam æstate quam hyeme quidam prouenire affirmāt. Ad hæc temporum (ut retulimus) diuersitate plurimum differunt. Ergo tempora germinandi hæc & sunt, & singulis addicuntur. Refert ad celeritatem, seriotem uē prouentum, & seminum ætas: quædam enim maturius ex recentioribus exeunt, ut porrũ, gethium, cucumis, cucurbita: quamobrem nonnulli semen cucumeris lacte, aut aqua pramaceratum ferunt, quo celerius exeat. Con-

trā quādam ex uetere celerius, ut apium, beta, nasturtium, satureia, coriannum, organum: haud enim omnia oriri melius ē recentiori possunt, quemadmodum dictum est. Peculiare in beta inquit euenire, quod non semen omne continuō pullulat, sed longo tempore post, anno scilicet sequente, & tertio: qua de causa ex larga copia feminis exiguum prodire solere. Quodq; autem seminum si auctum in plenum deciderit, ad tempus usque suum in humo perdurat: nec prius germen ullum emittit, ut ratio est: sic enim in syluestrium genere euenire uidemus, nisi semen intereat. Perfectiones autem fructuum omnium aetate contingunt, sed prius, celeriusq; (ut simplicius agam) illa perficiuntur, quae prius fata fuerunt. Refert enim & tempus: fata enim diebus calidis, celerius caulescunt, semenq; ocyus red- 10 dunt, ut radix, ut rapa: quaedam non anno tantum fructificant, uerum etiam bi- matu, ceu apium, porrum, gethyum, quae quidem uel plus temporis edurare queunt. Nec annua dici debent: maior enim eorum pars simul atque semen perfectum sit, exarefcit. Omnibus penē, quae caule emisso fructum perficiunt, facies eo perfici solet, quod ex caulibus laterales furculos addunt: exceptis quae uniuersa constant, ut porrum, gethyum, cepe, allium. Omnia autem aquam, simumq; cupiunt: sed magis quae infirmiora sint, curaque egeant maiore, aut etiam alimen- to copiosiori.

Quae olera ē quibus nascantur: nasci uero ē semine, auulsione, ramo atq; radice. Quae caule reciso regerminant: quaeq; radices perdurent: et quae regerminant, et quae non.

20

Caput II



Nascuntur omnia ē semine: nonnulla etiam auulsione, ramo, radiceq;. Auulsione, brassica: semper enim uel aliquid radicis eius accipitur. Ger- mine, ruta, & origanum desiguntur, necnon & ocimum: nam id quo- que transfertur cum ad palmum, aut plus altitudinis uenerit, dimidio absciso. Radice allium feritur, & cepe, & bulbus, & artus: & in plenum, quae in ca- pitatorum genere eiusmodi sunt. Nasci etiam ea possunt, quorum radices plus tem- poris durant, quamquam annuo consistant caule: sed quod omnia prouenire semi- ne possunt, manifestum hinc est. Ruta enim sic nascitur, quod quidam negant: ue- 30 rum tarde, qua de causa furculo ferere eam solent. Illorum uero, quae radice proue- niunt, radix quidem diuturna est, ipsa autem annicula consistunt: itaque radices talium suo latere germinant, pluresq; redduntur, non tantū in urbanis, atq; horten- sibus, uerum etiam in syluestribus (ut dictū iam est) ceu in bulbis, gethyis, scyllis, alijsq; quibusdam. Quaedam etiam non capitata, uerum diuturniora germinare posse cer- nuntur, ut apium, beta: mittunt enim radices, quibus folia, caulesq; proueniunt. Gethyum quoque latere germinat, & porrum subtus suo latere promit, ueluti quoddam caput bulbaceum, ex quo foliorum ortus: caule tamen arefacto, semi- neq; sublato. Sed quoniam eorum capita minus usui sint, idcirco siccanda minime leguntur, ac proinde nunquam feruntur: sed haec forsitan, & similia genere, & 40 proxima quodam modo naturae ceparum consistunt: quamobrem mirum est. Ve- runtamen & in omnibus tam urbanis, quam syluestribus, quaecunq; diuturniora, simulq; terrae propiora consistunt, horum radices regerminare facile possunt, ut uel in fruticum, atque suffruticum genere fieri nouimus. Verum in cepis, alijs, bul- bisq;, uel numero haec quodammodo amplecti potueris. Prouentus autem (ut re- sulimus) trifarius est: semine, qui communis omnium est: caule, radiceq;, qui prae- dictis tribuitur. Caule uero reciso (ut ita loquar) omnia regerminant, exceptis quae secula uocant. Sed euidentissima quasi & usitata, ocimum, lactuca, brassica: & quidem lactucae regerminatos caules suauiores affirmant. Primos enim lactuosos esse

304

esse atque amaros, utpote minus concoctos: alij ē contrario uolunt secundos scilicet lactie reseriores constare, sed dulciores sentiri, quandiu teneri sint. Verum in brassica ceteris esse suauiores caules regerminatos cōfessum habetur, si antequam excaulescat, folia detrahantur: radices plurimum certe perdurant, & aliz regerminant, aliz non. Radix & rapa, si terra cooperiantur, usque ad ætatem durare, & crescere possunt: quod olitorum nonnulli de industria faciunt: non enim regerminant, neque folium mittunt, nisi accumulata humum semoueas, quod uel in reliquis deprehendi facile potest. Maxima olerum pars unistirps, ea scilicet radice, quæ agitur in profundum. Etenim quæ illas æque crassas latere suo mittunt, ut apium, 10 betacq; de media quodammodo spargunt: nec à principio continuo fundunt, sed ad ipsam unicum stirpem fissionem eiusdem illius lateralisq; agunt. Et eas quidem manifestas ex usu reddit affirmant. Betis autem radix unica, sed longa, crassa, rectaq; sicut raphano: crassas hæc laterales gerit, & alias binas, alias ternas, alias etiā unam, quibus exortæ fibræ coherent, & alligant. Carnosa radix hæc est, & gustatu suauis, quamobrem crudam nonnulli mandunt: cortex non crassus, neque extricabilis est modo raphani, sed potius equapio proximam dixeris. Eodem modo & atriplici radix una alte descendens, aliz uero ex ea se deprimunt. Omnium maxime unistirpem rumicem esse putaueris: laterales enim crassas nullas penitus agit, sed tantum prætenues: nititur altissima omnium radice, maiore nanque semipedibus 10 ternis: syluestris breuiorem agit, multicaulis atque ramosus consistit, & tota forma, cum perfecta est, betæ proxima sanè cernitur. Diuturnitate quoq; syluestrem, & in totum (ut ita loquar) omnia olera uincit. Perdurat quantumuis temporis, ut aiunt: carne plena, atq; humecta consistit: qua de causa effossa diu uiuere potest. Ocimo quoq; radix unica data est, quæ crassa esset, alteq; descenderet. Cæteræ uero, quæ de latere prætenues oriuntur, admodum proluxæ adherent. Quædam singulari illa in rectum tendente carent, ut blitum. Sed continuo ab extrema multas crassas proluxiores, quàm atriplex agunt.

Quibus lignosæ, & quibus carnosæ, & quibus breues radices: deq; diuersis seminum figuris, & eorum differentijs: item quæ feraciora semina.

Caput III



Mnium radicum lignosissima ocimo data est, sicuti etiā caulis: bliti enim atque atriplicis minus lignosæ. Vt enim in plenum loquar, aliz carnosæ, aliz lignosæ: carnosæ, ut betæ, apij, equapij, rumicis, raphani, & omnium maxime capitatorum: istæ nanque ne siccate quidem omnino durescunt: lignosæ, ocimi, bliti, atriplicis, erucæ, anethi, rumicis, corianni, atq; in summam omnium multicaulium: habet enim & anethum, & coriannum, quæ unistirps sunt, radicem lignosam, & non prolixam, neq; fibris multis subnixam. Ambo multis caulibus, multisq; ramis consistunt: quapropter 40 nulli pars eorum superior, pro ratione inferioris extat. Breui radice illa constare non tantur, lactuca, portulaca: breui in quantum ea recta, quæ deorsum mittenda est, tum ipsæ quæ in latius porrigi solent. Lactuca ea ipsa multiplici radice quasi omnino caret, sed fibris tantum coheret, quamobrem unistirpem hanc (ut ita dixerim) maxime omnium esse putaueris. Ad summam, omnia æstua breuem radicem sortiuntur: etenim pepo, cucurbita, cucumis ita se habent, tum propter tempus, tum & forsitan magis ratione naturæ, quæ tempus secuta est. Lactuca translata radicis est breuioris, quàm sata: illa enim ex lateribus magis mittit. Breuior etiā sylvestris, quàm urbana, & superne multicaulior est: quodq; ex cæterorum numero florem uniuersum citare utiq; constat: ocimum uero particulatim primum inferius, deinde

cum ea defloruerit parte, florere superius incipit. Vnde fit, ut diutius istud floreāt, quemadmodum faba, & inter herbas quæ solaris nominata est, & quædam de syl-
uestribus alia. Floret etiam cucumer cum in modum, qui pepo cognominatus est:
etenim huic præpostero germinet, sanè accidit. Flores alijs candidi, alijs lutei, alijs
ad purpuram leuiter accedentes, rubri nullis emergunt. Semina figuris etiam inter
se distant: etenim maiore quidem ex parte rotunda sunt. Sed non desunt oblonga,
neq; lata, neque foliata, ut atriplicis: hæc enim similia, atq; in laserpitio consistunt.
Adde quædam angusta & canaliculata, ut cumino. Color quoque differentiam fa-
cit: sunt enim alia nigra, alia candida, alia ligno proxima. Publica differentia, quod
alia inclusa siliqua constant, alia nuda adherent: ut quod alia cortice, alia pappo fa-
nugine obducuntur: radici nanque, & sinapi, & rapo, semen in siliqua: corianno,
fœniculo, anetho, cuminoq; nudum adheret: bleto, betæ, atriplici, ociminoq; cortice
continetur: lactuce lanugine obducitur. Omnia feminis, germinisq; large fœcunda:
da: sed fœcundissimū omnium cuminum est. Peculiare etiam quoddam de hoc dicunt:
imprecari nanq; & maledicere serendo oportere affirmāt, quod latius, copiosiusq;
proueniat. Difficile (ut ita loquar) omnia exiccantur, cumino excepto: nec modo
frumenti consistunt, quod cum primum in plenum creuerit, mox exiccatur & ded-
dit: sed quæ cortice continentur, difficilius exiccantur, & inter ea maxime ocimum,
Omnia siccata fœcundiora reddūtur: qua de causa detracta antea exicare consue-
uerunt. Omnia feracia, largeq; fœcunda consistunt: sed fœcundissimum ocimum,
porrum, & cepæ sunt, quæ latere potius apta sint fructum parere, ut radix, rapa, &
reliqua generis eiusdem: quædam parte utraq; serunt, ut blitum, atriplex, hæc enim
fructificare, uel ex suo latere possunt: sicq; copiosius, protinus enim nodis singulis
semen incidēs racematim nimirum gerunt. Quæ seminibus uetustioribus fata sunt,
celerius excaulescunt. Celerrime uero quæ uigentibus: est enim uel eorum uigor
quidam, quo prouenire, cōsummariq; optime possunt. Pulchritudo quoq; ad por-
tionem sequitur: quin & si acruatim serantur, melius quædā nasci, augeriq; posse
uidentur: sic enim porrum, & apium serunt in lacinijs colligatum, atq; ita ampliora
redduntur. Locus quoq; ad incrementum aliquid conferre uidetur: quamobrem
cum apium transfertur, palum tantū adigere, quantum apium facere uolueris, iu-
bent: necnon & semen eius colligatum in lacinijs palo adactō, & fimo, terraq; inge-
sta serendum censent. Quædam etiam figuram subditi loci imitātur: cucumis enim
formam accipit loci, in quo fata fuerit. Quin & saporum differentiam quædam se-
mina capiūt præparata, ut cucumeris, si lacte maceratum seratur: sed hæc fortè cul-
tui accommodari potius debent.

Quæ olera plura genera habeant, quæ pauciora, ut radix, id est raphanus, rapa, brassica, beta, cucumis, cucurbita, cuminum, lactuca, apium, cepa, ascalonia, geibryum, allium.

Caput IIII



Enera autem alijs plura, alijs minime. Plura ut ocimi, rumicis, bliti, na-
sturtij, erucæ, atriplicis, corianni, anethi, rutæ: his enim diuersitatem
generis deesse omnino uolunt. Quædam è contrario pluribus con-
stant generibus, ut radix, brassica, beta, cucumis, cucurbita, cumi-
num, allium, lactuca. Diuidunt hæc folijs, radicibus, coloribus, sapo-
ribus, reliquisq; eiusmodi. Vt radicis genera corinthium, cleonæum, liothalassium,
bœotium. Amplissime corinthia adolefcit, quæ uel stirpe constat detecta: hæc enim
sursum uersus protruditur, nō ut cæteræ in terram ampliari solita est. Liothalassia,
quam thraciam uocāt, ualidissima aduersus frigora traditur. Bœotia dulcissima est,
& figura rotunda, nec ut cleonæa, prælonga. Quibus folia leuia, dulciores, suauio-
resq; sunt: quibus autē scabra, aciores. Genus præterea redditur, quod folijs eru-
cæ

305

cæ simile constet. Radicis genera hæc notauerūt. Rapæ alij esse, alij nō esse diuersita-
tem generis putant, sed mare tantum, fœminatq; differre, nasciq; ambas ex eodem
semine: sed ut effœminentur, raras deponere oportere: nam si densæ positæ sunt,
omnes masculculecæ alunt. Quod idem futurū etiā si in terra uitiosa seueris, qua de
causa semine sacas plantatim transferentes deponunt. Semen quoq; deterius, me-
lius ue uisū percipi potest: quod enim probū sit, tenuē senties: quod uitiosum, cras-
sum. Gaudet frigore & rapa, & radix: & sic eas dulcescere putant, simulq; incre-
mentum in radicem, non in folia uerti. Austrinis atq; serenis temporibus celeriter
caulescunt. Hoc igitur rationē sanē exigit, quatenus in ambobus differētiæ similitu-
dinis constent. Brassicæ autē trifariam datur digestio: alia enim crispam, alia leuem,
10 aliam syluestrem notatur. Syluestri foliū leue, sed paruum atq; rotundum, & ramis
folijsq; permultis condita est: ad hæc succum asperum, & instar medicamētī habet,
quamobrem eo medici ad aluum purgandā sæpe utūtur. Quin & illud differētiā
facit: genus enim quoddā earum est, quod nullum aut prauum semen producat. In-
totum crispæ succi probitate & folij amplitudine, leui præstātor est. Inter betas uero
candida, sapore nigra præstantior, pauciorumq; seminū est, quam siculam quidā ap-
pellarunt. Pari modo in genere lactucarum, cādida dulcior atq; tenerior: cuius tria
genera addūt, laticaulē, rotundicaule, & laconicum: huic foliū carduo simile, & recta,
ampla, & à caule minime brachiata hæc est. Inter latas adeo quædā laticaulēs fiunt,
20 ut pro ualuis hortorū hisce nōnulli utātur: quæ uero lactis admodū copiosa, & folio
pufillo, & caule candidiori consistit, syluestri similis est. Apiorū cum in folijs, tum in
caulibus discrimen utiq; constat: aliud enim folio spisso, crispo, dēsoq; aliud rariori,
lacionq; cauleq; maiori. Horum iterū aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut uer-
sicoloris: uerū ad summam, eiusmodi omne syluestri proximū est. Cucumeris atq;
cucurbitæ partim genera esse existimāt, partim negant, quemadmodū & in radicis
ac rapæ generibz, sed in uno eodemq; genere alias meliores, alias esse deteriores
affirmant. Cucumeris genera tria notant, laconicum, scytalum, bæotium: ex his la-
conicum melius nigatū euadit, reliqua nō rigata præstātoria sunt. Differūt & cepæ,
& allia genere: sed ceparū genera plura, ut quæ à locis nomina accepēre, gardiæ,
30 cnidiæ, samothraciæ: item setanice, & fissiles, & ascaloniæ. Ex his setanice minimæ,
sed largæ, dulces: fissiles uero & ascaloniæ, tum cultu, tū natura inter se differūt: fissi-
lem etenim hyeme sua cum coma inertē relinquūt, Vere externa folia detrahūt, &
reliqua colūt: detractis his folijs, altero germināt, simulq; inferius finditur: unde fissi-
les appellatæ sunt. Quidam uel omnibus detrahēda folia censent, ut uim suā imo
contineant, neq; effusa seminescāt. Ascaloniarum peculiaris quædā natura notata
est: etenim solæ fissiles, & quasi steriles ab radice consistunt, nec ea parte crescere, ac
proficere possunt: quamobrem non eas deponunt, sed semine serunt: cum deinde
germinatum sit, transferunt. Perficiuntur adeo celeriter, ut cum cæteris, aut etiam
prius euelli possint. Plus temporis dimissæ in terra, putrescent. Plantatæ caulem
40 ædunt, semenq; tantummodo fundunt: tum exinaniuntur atque inarescunt. Hæ-
rum igitur talis natura est. Differunt & colore nonnullæ: etenim apud ssum cætera
quidem candidis similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, sar-
dianisq; similiter ferē affirmant. Cretensium peculiaris maxime natura notatur, sed
ascalonijs quodammodo proxima, ni forte uel eadem dici debeat: est enim in Cre-
ta genus quoddam, quod semine quidem sarum in radice crassatur: depositum ue-
ro in caulem, semenq; rotum funditur: sine capite, saporeq; dulce est: id enim quæ-
si ē contrario cæteris habet: omnes nanque depositæ melius, celeriusq; perficiuntur.
Omnes post arcturum proueniunt, tepido adhuc solo, ut depositas imbres
occupent. Seruntur & toto capite, & circumciso, sed germinationes haud similes

fieri solent: parte nanque inferiore cepæ nascuntur, superiore herba tantum erumpit: sectæ in rectum germinare omnino nequeunt. Gethyum dictum sine capite est, & quasi longa ceruice cõsistens, ob id germinatio tota in fronde: sæpiusq; retondetur, ut porrum, qua de causa semine seritur id nec deponitur. Cepas huc serere differentis discernere licet. Allium ante solstitia, aut paulo post solstitio seritur nucleatim diuisum. Discrimen eorum, quod aliud præcox, aliud serotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. Differunt præterea magnitudine singulari: Cyprium uocatum maxime tale est, quod nõ decoquunt, sed in myrtotis utuntur: & cum tunditur, mirum quàm spuma increstat. Quid & illud differentiã facit, quod quædam non nucleis coagmentatur. Dulcedo autem, & odor, & crassitudo, eorumq; causa, tempore cultuq; penè uidentur contingere, ut etiam aliorum. Perfici etiã semine potest, sed tarde: primo etenim anno caput accipit porri, sequente discerni in nucleos incipit, tertio redditur perfectum: nec quicquam deterius, sed etiam quidam uel deposito melius id existimant. Radicis autem alij, aut cepæ, haud similis ortus fieri solet: alij nanq; cum nucleus extumuerit, tota intorquetur: & hinc aucta in nucleos rursus discernitur, atq; ex uno plura efficiuntur, dum caput consummatur. At cepe continuo ab radice aliud atq; aliud obducit, ut & bulbus, & scylla, & eiusmodi omnia. Etenim alia & cepæ, si nõ euellantur, plura in dies fiunt. Super fistula quoque, & allium capitari posse, & cepe affirmant. Satis de generibus dictum est.

Quæ qua cura, culturaq; gaudeant. Quæ aque oleribus prosint, et quæ obfint.

Translatione olera melioris fieri. Quæ bestiolæ olenibus innascuntur.

Caput V



Quas, fimusq; omnia olera sanè diligunt, ruta excepta, hæc enim si misalpernatrrix penitus est: sed hyberna magis quàm æstiuã desiderant, & imbecillia magis, quàm ualida. Fimum stipularium maxime laudant: iumentorum uitiosum putant, quoniam maxime inarescat: fimum unã cum satu intermissum potissimum disponunt. Quidam etiam inter serendum superiaciunt: quin & stercore humano in concocto ad succum probe conficiendum utuntur. Hyberna aquæ cupidiora sunt, quàm æstiuã: & infirma, quàm ualida: item quæ alimento plurimo egeat. Diligit aquam & cepe & gethyum: quanquam nonnulli negant, si principio bis, aut ter imber incessit. Aquarum optimæ, quæ dulces, & frigidæ sunt: pessimæ, quæ salsæ, & rarefactu difficiles notantur: ob id, quæ ductu feruntur, perutiles: herbarum enim semina inuehunt: sed omnium optimæ, quas Iupiter dederit: his enim uel animalia noxia interiri creditur. Sed non defunt, qui cucumeribus & cepis eas prodesse minime putent. Rigantur cætera quidem hora matutina, aut ad uesperam, ne aqua feruens sole officiat. Ocimo etiam meridie aqua datur, germinare nanque celerius id exiliis mant, si inter initia feruenti aqua rigitur. Aqua admodum multa cõferre creditur, præsertim si finis non adsit: sæpe enim olera esurire dicuntur, idq; olitores paritos haud difficile posse intelligere. Omnia translata, meliora, grandioraq; fiunt: porrorum enim radicumq; magnitudo ex translatione. Potissimum autem transferunt ad

& cætera quidem tolerant, ceu gethyum, porrum, brassica, cucumis, apium, rapa, lactuca. Omnia auctu faciliora, grandioraq; ueniunt semibus depositis, quàm fusim satis. Bestiolæ innascuntur radicibus, pulices: brassicæ, erucæ atque uermiculi: & lactucis, porris, alijsq; pluribus porricidæ appellatæ. Has igitur humor collectus interimit, & finis acruatim inieciens: in dustria enim bestiola condens sese, ut in stramento quiescit in stercore. Quamobrem uenari facile est, aliter nulla uenandi datur facultas. Radicibus contra pulices ne nocent

ceant remedium, interserere eruum: sed ne nascantur, nullum medicamen com-
pertum referunt. Ocimum sub canis ortum pallefcit, coriannum falefcit. Ergo quæ
accidere solent, ex his liceat cogitare.

*Quæ firmiora femina, quæ imbecilliora. Item de aruensibus, syluestribusq; ut ruanice,
brassica, rapa, lactuca, equapio, paludapio, montapio, cucumere.*

Caput VI



- 10 Eminum alia firmiora ad perdurandum constant, alia infirmiora: fir-
miora, coriannum, beta, porrū, nasturtium, sinapi, eruca, satureia, ad
summam omnia ferè acris saporis: infirmiora uero gethium, id enim
durare nequit, atriplex ocimum, cucurbita, cucumis: in plenti aestiua
magis, quam hyberna: sed inter ea quæ fortissima constant, nullum
ultra quadrimatum durare potest, ita scilicet ut ad sementem adhuc utile sit. Sed be-
ma sanè meliora, triuma nihil ferè deteriora, quadrima iam deteriora: uerū ad usum
cibarium diutius permanēt: quanquam in ualidius alant necesse est, ut quæ partim
respirarint, partim læsa à bestioliis sint. Interitus maxime ex bestioliis fieri solet: na-
scuntur enim in omnibus etiam acris atque acerbis: cæterum uel humore exhau-
sto amara redduntur, & ideo ad usum deteriora. De seminibus, & ad summam de
hortensibus sit satis dictum. Nunc de syluestribus & ijs quæ aruensia nūcupamus,
20 pariter indicare tentandum est. Sunt igitur quædam nomine supradictorum uo-
cata: genera enim illa syluestria quoq; omnia esse cernūtur, & maior ferè pars aspe-
ctu uicina urbanis est, præterquam quod folijs ista minoribus, caulibusq; scabrio-
ribus constant, & succo potissimum acriori, uehemētioreq; conduntur, ut satureia,
origanum, brassica, ruta: nam & rumex syluestris est, & quæquam gustatu gratio-
ram urbana, tamen succu acutior, quo præcipue differant. Omnia autem uel sic-
ciora urbanis sentiuntur, & fortè ob id ipsum magna ex parte acriora, uehemen-
tioraq; sunt. Brassica præter alia modo peculiari caules fortitur, rotundiores enim
leuioreq; gerit, quam satiuæ: & foliorum appendicem illa latum, hæc habet rotun-
diorem, & folium ipsum minus angulatum: nam cætera quidem scabrior tum cau-
30 libus, tum folijs cōstat. Rapa uel radice longa, & modo raphani, breuiq; caule con-
sistit. Lactuca folio breuior, quam satiuæ est, idq; cōsummatum aculeatur, & caule
simili modo breuiori perficitur: succum acrem, ac medicatum habet. Nasctur inter
arua, liquatur per mellesem tritici, & purgare aquā intercutem dicitur, & caliginem
arcere ab oculis, & argemam auferre, cum lacte mulieris. Equapium, paludapium,
montapium, tam inter se distant, quam ab urbano plurimum differunt. Paludapi-
um enim, quod apud aquæductus, & in paludibus prouenit, folio raro, nec hirsu-
to consistit, sed simile quodammodo apio est, odore, sapore, figuraq;. Equapium fo-
lijs uicinum paludapio est, sed hirsutum, & grandicaule cōstat, & radicem crassam
modo raphani agit, sed nigram: fructum quoque nigrum producti, magnitudine
40 cruo ampliorem: ambo utilia referunt ad urinæ difficultates ex uino dulci albo, &
ad pellendos calculos. Nasctur omnibus locis, & lachryma ex eo myrrhæ similis
defluit. Quidam in totum myrrham id esse affirmāt. Montapium maioribus etiam
differentijs distat: folio nanque cicutæ simile constat: radice tenui, caule anethi: mi-
nutori tamen datur in uino austero gratia menstruorum. Quædam cum supradic-
tis nullatenus succo, aut utribus conueniunt: ut cucumis syluestris urbano peni-
tus incomparabilis est, sed aspectus tantū similitudinem gerit: quemadmodum in
coronarijs uiolæ, folium enim habet cōsimile. Horum igitur differentias
ex prædictis hisce accipies.

De arvensium differentijs. quodq; ea uocentur olera, quæ nobis usui sint cibario, ut sunt intubum, aphaca, andryala, porcellia, senecio, & intubacea omnia: item per gallinaceus, enthusicum, mentestrum, hircibarbulum, corchorus.

Caput VII



Ruensium aut appellatorum post hæc discrimina, atq; in totū cuiusq; herbacei minus cibo idonei generis, exponemus. Olera enim uocamus, quæ nobis usui cibario sunt, quæ quidē in summa uniuersorum continētur necesse est: quamobrem nec ea dimittamus, oportet. Er go olera appellantur, intubum, aphaca, andryala, porcellia, senecio, atq; in totū quæcunq; intubacea constant, propter foliorū similitudinem: eiusmodi enim omnia folijs intubo quodāmodo proximis conduntur: item pes gallinaceus, 10 enthusicum, mentestrum. Quidam uel alia innumerabilia nomināt, inter quæ illud, quod hircibarbulum uocant, cui radix longa, & dulcis: folia croco similia, nisi quod longiora: caulis breuis, super quem calyx ampla, & barba de summo uertice cana pendēs prolixa, unde nomen accepit. Pari modo & alia specie quidē eiusmodi constant, succis uero cibo idonea, uel cruda, uel cocta oriuntur: quædā enim coqui exi-
gūt, ut malua, betta, rumex, urtica, muraleum, uessicaria, quæ cruda etiā manditur, & alia plura: inter quæ & corchorus, qui ob amaritudinē in proverbio est: solium eius ocimum sane æmulatur. Ex cunctis autē alia annua, alia annicaulia extant: nec defunt, quæ radice diutius durēt, quanq̃ ipsa arefcāt. Quinimō eiusmodi haud pau-
ciora ferē adnotantur. Nascuntur alia radice, & semine: alia semine tantū, nisi quod 20 sponte etiam proueniant.

Germatio quibus temporibus in oleribus, arvensibus ut fieri soleat: deq; florum differentia, & quæ differentie in caulibus publicæ.

Caput VIII



Erminatio uero tam eorum q̃ reliquorū, partim cū primis imbris post ægnoctiū fieri solet, ut aphacæ, canariæ, & eius quam buprestim quidam appellant: partim post uergilias, ut intubi, & omniū ferē intubaceorū: & alia cū germine florē adunt, ut aphia: alia nō longe post, ut fremium. Quædā incunte Vere, tam caulem, q̃ florem emittunt, ut intubum, & omnia intubacei generis: & ē spinosis, quæcunq; generi olerū attri-
bui debeāt. Florum autē differētia magna, de qua primo uolumine retulimus: com- 30 munis ferē omniū constat: sed nō defunt, quæ flore penitus careāt, ut epimetrum. Euenit uero, ut quæ unā cum fructu florem dimittūt, celeriter deflorescant: cum ta-
men primus senuerit, alius atq; alius subnascitur, idq; per totā hyemem, uerq; assidue usq; æstatē facitatur. Senecio quoq; diutius floret, quanq̃ reliqua minus, ut & crocum tam odoratū q̃ candidū, & spinosum, quæ carēt odore. Omnium autē her-
barum discrimen publicū, quod aliæ recticaules, & neruicaules sunt: aliæ annicaules, ut malua, scandix, cucumis syluestris, solaris, quæ porro tali natura est: nam inter
omnes (ut ita loquar) magisq; talinatura est ut inter spinosas tribulus, atq; inturis, & alia plura: nā illorū etiā differētia numerosior est. Quædā uero amplexicaulia pla-
nē exeūt: sed si nō habeant, quibus accumbāt, humi serpunt, & humicaulia dici pos- 40
sunt, ceu petina & lappa, & summatis quibus caulis gracilis, mollis, prælongusq;. Qua de causa semper ferē sup alijs hæc proueniūt: quæ quidē differētia publica est
omniū, nō tantū herbarū atq; suffruticū, uerum etiā fruticū: clauicula enim atq; etiā
magis edera cilicia amplexicaulis cōstat. Item herbaceorum alia multis caulibus, alia
uno tantū condunt: & unicauliū ipsorū alijs germine caulis brachiatur, alijs ē diuer-
so: sicut etiā inter satia, radix, & alia quædā. Multis caulibus cōstat (ut summatis
dixerim) quæ humicaulia exeunt: Vnicaulia uero & paucicaulia, quæ recticaulia
sunt. Ex his caule minime brachiato illa creant, quæ leuicaulia sunt, ut cepe, porro,
allium: quemadmodū etiā inter satia animaduertere licet.

Differen

Differentia herbarum in positi locoq; foliorum, necnon fertilitate, sterilitateq;: tum quæ differentia foliorum maxima, quidq; inter herbarū, arborumq; flores interfuit: atq; de syluestrium herbarum, olérumq; radicibus, et quid distent inter se.

Caput IX



- ifferentia illa quoq; herbaceis datur, quod alia ab radice tantū foliata, alia in caule tantum foliata, alia utrinq; foliata. Ab radice tantū foliata silago, nigella, anchusa, herba, fremium, frondiflora, apargia, plantago, fraus. In caule tantum foliata, crepis, nigella, foliolia, lorus, viola alba. Vtrinq; foliata, intubum, siue ampulla: id enim in caulibus, cum ramulorum prouentu unā flosculus quoq; quidam emergit: & ex spinosis foliatis nonnulla, ceu fonceus. Sunt etiam alia frugifera, alia sterilia: atque in totum ex herbaceis alia usq; folia tantum ueniunt, alia & caulem, & florem ædunt, sed fructum nullum: quædam etiam fructum pariunt, ueluti naturæ perfectissimæ munus: nisi fortè & sine flore frugiferum aliquid sit, sicuti in arborum genere. Quinetiam folia eorum non paucioribus, sed pluribus ferè differentijs, quam arborum, inter se distant, nec differentijs carent, quibus planè ab illis possint lecerni: sed maximam ferè sortiuntur, quod pediculo illa dependet, hæc autem (quoad absolute liceat loqui) se ipsis adherent. Verum non desunt, quæ cauliculaceo quodam appendice annectantur. Sunt quibus antè quam folia, protrudi caulis soleat: maximæ tamen parti folia prærupit, amplissimaq; penè inter initia fiunt, & maxime ad cibum idonea.
- Arboribus uero omnibus cauliculus quidam antè propellitur, frons deinde emergit. Differunt etiam floribus plurimum, quippe cum in arboribus pars maxima florum candeat, & quædam paulò ad purpuram uergat: nec desint qui herbidi, atq; pallidi sint, nulli uero colore ardentiori habeantur. In herbarum autem genere per multi & uarij, tum synceri, tum misti, tum odorati, tum hebetes sentiantur. Item arborea florant, sed non particulatim uniuersum profundūt. Herbarum uero quædam per partes florescunt, ut de ocimo diximus: unde fit, ut diutius floreat, sicut alia multa, & in primis solaris, atque cichorea. Quinetiam radicum multæ differentia, atq; predictis parentiores consistunt. Sunt enim alia lignosæ, alia carnosæ, nec uolæq; sicut etiam in genere satiuorum conspici licet, ceu frumenti & herbæ speculiter nuncupatæ maiore ex parte. Earum autè ipsarum singulæ plurimis inter se differentijs distant, colore, odore, sapore, magnitudine: alia nanque candidæ, alia nigra, alia rubicundæ, ut anchusæ, atq; rubiæ: alia quasi flauæ, & surculi speciem gerentes: adde dulces, amaras, acres, odoratas, maleq; olentes: nec desunt quæ uim habeant medicam, ut aliis dictum est. Carnosis quoq; differentia insunt: nam alia rotundæ, alia oblongæ, glandosæq; ut astulæ regia, atq; croci: & alia multis tunis cis constāt, ut bulbi, uel cuiusuis generis bulbosi: adde cepæ, & gethyi, & similia: alia æquales, fungosæ, mollesq; toto corpore, & quasi corticis omnis exortes, ut aris uel corticem carni adherentem habent, ut mali terræ, & rapæ. Non autem omnes odoratæ, aut dulces, cibo idoneæ constant, nec omnes amaræ ingestibiles sunt, sed quæ posteaquam in cibo assumptæ fuere, nihil nocuerint corpori, eas tantū elusulas statuimus. Quædam enim quamuis dulces, mortiferæ tamen, atq; morbosæ consistunt: alia quamuis amaræ, aut male olentes, utiles planè sentiuntur. Pari modo & folia, caulesq; se habent, ceu absinthij, & sellis terræ. Discrimen etiam in germinando, & in florèdo, ut hyeme incipiēte, aut mediata, aut æstate, aut autumno. Quin & in fructibus ratio gustadi eadem est, & in caulibus, & folijs, & seminibus, & radicibus: atq; in ijs ipsis pro ratione saporū differentia cōstant, ut acidi, acris, dulcis, austeri, & reliquorū eiusmodi, tum simpliciter, tum ratione qualitatis remissionis, intensioris ue. Ergo differentias colligi hinc omnino oportet.

Differre herbas temporibus germinatus, & floris historia singulorum oleum. Spicosa esse, oculum canis, caudam uulpis, linguam agni. Quae & plantago, & coturnix, à quibusdā dicta est bibinella.

Caput X



Ed cum singula distincta superius pro temporibus tam ad germinationem, quam ad florum prouentum, cōsummationemq; fructuum sint, addendū nunc illud occurrit, quod nec ijs quae radice proueniant, nec ijs quae semine erumpant, germinare quicquam ante tempus sibi accommodatum solet: sed suum unumquodq; tempus expectat, nec ab imbris quicquam infestatur. Quaedā serotina admodum tam germine, quam flore percipiuntur: ut carduus, ut cucumis syluestris: quod etiam in suffruticum genere de pollicaria, & inturi, & alijs quibusdā retulimus: nec enim aliquid eorum floret, aut germinat ante proprium tempus. Quamobrem hoc etiam in arboribus differre appareant, quippe cum illorum simul quodammodo omnium germinatio fiat: aut si ita minus, uno quidē, eodemq; dixerim tempore anni germina omnium citari: his autem multis, uel potius omnibus temporibus germen, atq; etiam magis flos exeat. Quapropter si animaduertere uolueris, assiduam pene per totū annum germinationem, & floris productionm uidebis. Semper enim alterum alteri succedēs tempora omnia occupat. Exempli gratia: Aphacam crocum erumpet, & fremium, & senecio, ceteraq; hyberna, tum uerna sequentur, dein autumnalia accedent. Multi uero ex singulis floribus prouetus prorogant suos ut dictum est. Sunt enim quae sita florent, ceu aphaca, & turdaria, & cichorea, & plantago, & alia quaedam: uerum propter assiduam continentiam, occupandiū uicissitudinem haud facile percipi in aliquibus potest. Nec est determinare quae prima germinant, quae uero, nec eorum ipsorum generationes, ac tempora recenseri queunt. Quibus fructibus consummatis, alia initia denuō generādi insiliunt, quod post autumnū æquinoctium euenire potissimum solet. Tunc enim semina ex maiore parte perfecta habentur, & fructus arborum magna ex parte consummati iam extant: simulq; multitudo quaedam eius ipsius, atq; temporis sequitur. Quae autem imperfecta immaturaq; occupantur, his & germinatio, & floris prouentus, & fructus perfectio, ex circuitu ad portionem contingit. Quamobrem euenit, ut alia sub solstitijs florent, alia sub canicula, alia post æstivum, & autumnū æquinoctium. Sed hæc communio sanē contemplationem, ad determinandam principij rationem desiderare uidentur. Quod autem differentiarum plures, aut nullo pauciores sunt, his ipsis planē tam exploratum habetur. Quandoquidem & perpetuū quaedam ex his uiuant, ut polium, ut solaris atque capillus Veneris. His ergo differentijs, quibus in rebus, quodque modo fiant, determinatis, nunc singulorum historias exponere cōgruum est, quae scilicet non pro cuiusq; propria natura consistant, ut quae spicosa, scandē, cōfasc consistant: & si quid aliud tam commune capi de omnibus liceat, quod famis hanc sensui sit, aut folio, aut flore, aut radice, aut fructu: ex manifestis enim partitio fiat eorum necesse est, quemadmodum etiam radicū. Spicosa igitur oculus canis, & cauda uulpina, & plantago, quae agnina lingua à quibusdā uocata est, & ab alijs coturnix, huic quodammodo similis bibinella est. Verum hæc simplicia, & quodammodo uniformia creantur, & spicam nec acutam, nec aristatam gerunt. Cauda uero uulpina hirsutior, & lanuginosior est, quamobrem similis uulpinis caudis cernitur, unde & nomen accepit: huic plantago similis constat, nisi quod florem non quemadmodum illa particulatim addit, sed per totam spicam tritici modo. Ambobus tamen flosculus lanugineus exit, sicut etiam frumento: similis tota specie tritico est, uerum folio latiori. His proxima reliqua quoque spicati generis, non temere dixeris,

Cichoracea

Cichoracea omnia annuo folio consistere. Item de caule cichorae id est, intubi: de Porcellia, Aphaca, Amaragine: hinc repetitio differentiarum radicum. De Asula regia, Epimenidea, Scilla, Aro, Dracuntulo, Ense, Thesio. Cap. XI



Ichoracea uero omnia folio annuo, & ab radice foliata consistunt: germinant post uergilias, fraude excepta. Sed caulibus, atque radicibus differunt magnas sortuntur, quippe cum ceterorum caules simplices, minoresque exurgant. Cichorae, id est, intubi, magnus, multisque ramulis brachiatus, lentus item, & diuidi cōtumax est: qua de causa pro unoculo eo utuntur. Radice quoque germen laterale mittere potest, & alioquin radice prolixum est, ideoque emori cōtumax: decerpitis enim quae ad usum cibarium capi solent, reliquis generationis rursus capescit principium. Euenit autem ut pars eius alia, atque alia floreat, idque assidue fiat usque ad autumnum, quandoque durus caulis esse uideatur. Fert & siliqua, in qua semen circa postremas caulium partes. Porcellia leuior, & aspectu mitior, & dulcior est: nec ut candralia, quae omnino ingustabilis est, & in radice succulentius acrem, eodemque copiosum habet. Aphaca ingustabilis, & amara est: siliuante hae floreat, sed celeriter flos senescit, atque lanugine pappo dicta marcescit. Tum alius iterum prouenit, atque iterum alius, idque tota hyeme, Vereque toto usque estate facit: flos melini speciem gerit. Simili modo uel amarago se habet: nam ea quoque Vere florere incipit, nec secus hyeme tota, Vereque toto perseverat: gustu amara est, unde & nomen accepit. Horum igitur differentiae tales annotantur. Sed tentandum (ut dictum est) reliquorum etiam pari modo colligere differentias. Genus autem uel eorum, quae radice carnosae, aut capitata creantur, amplius certe sentiri, quod & inter se, & ad ceteras differentias (uti retulimus) plerisque fortiter, radice, folio, caule, atque reliqua forma. Radicum enim (ut dictum est) aliae squamis consistunt, aliae carne: & aliae cortice uestiuntur, aliae nudae adhaerent: item aliae rotundae, aliae oblongae: & aliae uescendae, aliae ingustabiles. Vescendae non tantum bulborum, atque eiusmodi, uerum etiam assidue regiae, atque scillae: non tamen omnes, sed Epimenideae uocatae, quae ab usu nuncupatione sortita est: haec angustiori folio, leuioresque reliquae consistunt. Ari quoque radix cibo idonea est: haec folia eiusdem decocta in aceto mandi nimirum possunt, suauis profectio, & ad fracta utilis est. Haec, ut incrementum capiat, cum folijs luxuriatur, quae admodum ampla sparguntur: folia deflecentes ipsa circum obruere solent, quod planta non in germina excreseat, sed totum alimentum in suis attrahat caput: quod uel in bulbis nonnulli in componendo facere assolent. Dracuntula utre radix (sunt enim, qui genus quoddam dracuntulorum appellant, quod eius caulis uarietate habeat quandam) cibo inepta penitus est, & medicis tantum comoda. Ac ensis appellati radix dulcis decocta est, & trita farinae admixta panem dulcem atque innoxium reddit: rotunda haec est, & sine cortice, capillamentis gethyi modo fibrata. Permultas iuxta eam scolopendras reperiunt: gaudent enim ea herba, frequentesque congregantur in eam. Thesii radix gustu amara est, tusa alium purgat. Sunt & aliae quaedam medicae. Verum pars maior radicum neque medica, neque cibo idonea consistat. Et differentias quidem radicum has liceat adnotari.

Differentiam herbarum per folia, per caules. Scillam ante portum satam contra ueneficia esse. Deque narcisso, & scilla: peculiare de amygdala. Cap. XII



Oliorum uero differentiam, magnitudine, figuraque accipi debet. Etenim alibuco solius praelongum, angustum, lentumque leuiter: scillae latius: ensi uel pugio (ut quidam uocauerunt) ad ensis effigiem exit, unde & nomen herbae impositum est. Consecratici harundinaceum potius constat. Aro cum latitudine cauum, atque cucumeraceum est. Narcisso angustum, frequens & pingue. Bulbis, omnibusque bulbosis ualde angustum, sed croco angustius. Caulis alij omnino nullus, ut aro, quod mandi potest. Nonnulla caulem tantum floris sortuntur,

ut narcissus, & crocum. Alijs nimirū caulis assurgit, ut scilla, bulbo, omnibusq; bulbosis: item consecratri, & pugioni: sed omnium maxime astula regiae. Caulis enim dictus albugum unice inter omnes excellit: consecratri minor quidē, sed durior, in totumq; albugum æmulans. Semen quoq; abunde astula regia profert, lignosum semen id est, figura triquetra, colore atro: gignitur in orbiculato quoddā, quod florū subest, decidit æstate. Cum orbiculatū illud dehiscit, floret per partes, ut & scilla: incipiunt ab imis. Vermis in albugo gignitur, qui in aliud animal uolatile, floridumq; transfigurat. Quod cū herba florere incipit, eroso statim operculo euolat: peculiare is præ cæteris leuibus caulium generibus fortiori uidetur, quoniam cum angusto corpore sit, in ramulos superne spargat. Permulta ad cibū affert utilia: quippe albugo totum in cinere mandit, & semen torrefactū usui est: sed radix tusa cū sicu in usu maxime omnium uenit, & utilitatis plurimum autore Hesiodo prebet. Omnia igitur capitata, radice usuacia maiorem in modū sentiunt: sed præcipue scilla, utpote quæ suspensa uiuere possit, & quidē plurimū temporis. Potest etiam fructus recondens seruare, ut poma punica, detracto pediculo. Et satorum nonnulla celerius apud eam germinant. Tradiū, & ante portas saram, remedio esse contra ueneficiorū noxā. Omnia hæc unice sim proueniunt, ut etiam cepæ, & allia, Germani etenim ab radice laterale producant. Nonnulla etiam ē semine idem hoc euidentissime faciunt, ut astula regia, lirium, pugio, bulbos. Sed bulbo peculiare datur, quod nō simul ex omnibus seminibus exit, sed partim anno primo, partim secundo: ut etiam de auena, & loto traditum est. Id ergo, si uerū sit, cōmune cū alijs habetur. Necnō & illud fortasse cōmune est, quanq; non multis, mirū tamen quod in scilla, narcissoq; euenit. cæterorum enim tam recens satorū, q̄ regerminantiū, suo tempore primo foliū oritur, deinde caulis exit: in his uero caulis prius, & narcissi quidē floris tantū caulis protinus exit: flos enim eius plurimum fessinat. Scilla autē caulis per se prius, tum flos ex eo emergens insidit, eademq; florū prouentus ternos ostendit: quorū primus tempus arandi primū significare uidetur, secundus mediū, tertius nouissimū: quorū enim fuerint isti, totidē & arandi tēpora sermē occurrūt: sed cū ita senuerit, tunc foliorū exortus multis postea diebus inceptat. Idem uel in narcisso fieri solet, nisi quod nec aliū caulem præterq; floris propriū habet, ut diximus. Neq; fructū conspicuū parit, sed ipse flos unā cū caule desinit, & cū reforescit, tunc folia exeunt. Ergo præ cæteris quidem plantis, hæc ambo peculiaria dixeris. Præ illis uero, quæ ante foliorū, & caulū ortum florere incipiūt, quod iphyum, & alia quædā ex coronarijs facere putantur: atq; etiam inter arbores amygdala potissimū, aut sola, peculiare hoc sit, quod ea quidem, uel cū flore foliū quoq; promittit, uel paulo post, ut de quibusdā ambiguum sit, quærisc; soleat. In his autē ex altero quasi principio prodire uidet, cum propter diuersum multitudinē, tum quod anteq; flos, aut etiam caulis totus senuerit, germinare incipiant. Germinatio uero prior scillæ, posterior narcissi, & foliū is large emittit, & radix ipsa parua nequaq; est, quanq; non magna: figura nō ab similibus bulbo, uerum non squamata. Hæc igitur quo pacto se habeant, contemplari non ab re est.

Bulborū genera, & differentie. Genus quoddā bulborū lanigerum esse, inde togæ, & alia uerissima texantur. Quod peculiare datū sisyrinchio. Adiantū, id est, capilli Veneris filium in aqua nunquā madescere, eiusq; duo esse genera, atq; ambo ad desinium capillorū utilia olētrita. Fideculam ad urine distillationes utilem. Quid antheris preñiare. Cap. XIII



Lura autē genera esse bulborū nimirū constat. Differunt namq; inter sese, magnitudine, colore, figura, sapore: quippe cum adeo dulces quibusdā in locis exeant, ut uel crudi manducalime possint, ut in Chersoneso taurica. Sed maxima, peculiarisq; præcipue differentia lanigerarum herbarum adnotatur: est enim genus quoddā eiusmodi littoribus nascentis,

nascens, lanamq; sub primis tunicis habens, ut inter internum quod manditur, & externum media ista conculcetur. Texuntur ex ea & togæ, & alia uestimenta: quæ de causa lanatum id constare putaueris, nō modo illius indicii crinitū. Quin & bulbosa plura, nec ipsa pauciora notare licet: exempli gratia: uiolam albam, bulbinam, opitionem, cylicem, & sisyinchium quodammodo, quæ quidē redigi ad bulborum genus desiderant, quod radice orbiculentur. Nam colore quidē penitus discrepant: candent enim, nec squamis constant. Peculiare sisyinchio datū est, ut una radix primo augeatur hyeme, tum ineunte Vere, quod in imo excreuerit, contrahatur, supernumq; crescat, quod manditur. Atq; hæc differentias fortin eiusmodi constat.

10 Propria uero herbaceis uel illa tribui solent: Adiantū, id est capilli Veneris folium in aqua nunq; madefcit, nec quicq; adhæsisse humoris constat: unde & nomen herba accepit. Genera eius duo, candidū, atq; nigrum: ambo ad desitum capillum utilia, oleo trita. Nascuntur maxime locis humidis. Fidicula uel ad desillationes urine unice facit, ut quidā existimant: caulem hæc capillo Veneris nigro similem gerit: folia admodū parua, densa, aduersa, inter sese condita: radicem minimā: loca amat opaca. Inter ea uero, quæ florere particulatim notant, peculiare, quod in anthemio fieri solet: cū enim cæteris omnibus propriū sit, ab ima sui parte deflorere incipere, id à summo incipit florere: candidus flos circumdat, mediū uiridis tenet, & semini color idē. Decidit id uti & spinosorum conceptaculo inani relicto. Genera eius plura.

20 De lappa, solari, carduo, birundinaria, semperuiuo, loto, melfrugo, uesticaria, quodq; eia tria sint genera. Cap. XIII



Otabile & in lappa, quæ sue asperitatis causa uestibus adherescit, ut difficile auferri possit. Nascitur enim flos in eo ipso hirsuto & aspero nō existens, nec euidens, sed intus maturescens, & semen pariens, ut illis simile sit, quod in galeis, ac uiperis euenit. Illa enim ubi intra se oua pepererūt, mox animalia gignunt: & hæc florem in se continens, concoquensq; fructū deinde parit. Quæ autem ita uel florent, uel germinant, ut aliqua sequi uideantur, uelut solaris uocata, & carduus (nam ea quoq; cum solstitiū agitur, floret) item hirundinaria, quæ aduentu hirundinis suum excitat florem: hæc partim naturalem, partim fortuitam habere causam apparuerit. Quinetiam in reliquis propria eiusmodi per multa intelligi possunt, ut semperuiuo datū à natura est, quod humidū, uirideq; semper durare ualeat: folio carnofo, leui, atq; oblongo id constat: planis parietinis nascitur, necnō & in regulis, cum terræ confluuium quoddā arenaceum factū est. Ad hæc alia permulta naturæ superuacue nosse forsitan possis: sed (ut sæpe retulimus) differentias comparatione cæterorū semper contemplari oportet. Quædam enim formis pluribus constant, quanq; nomē unum sortiant, ut ita ferme æqui uoca sint, ceu lotus: huius enim genera plura redundant, folio, caule, flore, fructuq; discreta: inter quæ uel illud redditur, quod melfrugum appellant, diuersum tum uiribus in usu cibario, tum quod nō eadem loca desideret. Alia quoq; plura hunc in modum facile assignari possunt. Quædam uero quibus generibus existunt paucioribus, tamen nō minus discriminis sortiri uident, ut uesticaria, quæ cognomine nois tantum, & quadā planè æqui uocatione accipitur: Vna enim cibo idonea est, & fructū quasi uibanum acinosum præstat: dux uero, quarū altera somnū, altera insaniam infert: & si copiosior detur, interimere sanè potest. Pari modo & in reliquis, quæ plurimū inter se distent, accipi idem licet. Sed de cæteris herbaceis satis dictum. De frumento, uel uersisq; frumentaceis, de cætero indicandum: hoc enim reliquum adhuc est.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI

SEPTIMI FINIS.

De frumento, & frumentaceis, efficitur frumenti tria genera: seminis uero duo tempora. Quae mature ferere, quae sero oportet: de tertio ferendi tempore. Quoto quaque die à satu erumpant. Cap. I



SATIS DE ceteris herbaceis diximus: nunc de frumento, unde uersisq; frumentaceis agamus, modo quo superiora tradidimus: hoc enim reliquum in herbaceis generibus est. Frumenti prima, & maxima genera duo constant: sunt enim alia frumentacea, ut triticum, ordeum, titha, semen, & reliqua quae tritici, ordeique specimen quodammodo gerant: alia chedropà appellata, ut faba, cicer, pisum: atq; in totum, quae legumina uocare solemus: adde tertium genus, milium, panicum, sesamum: & ad summam, quae in aestiuis sementibus communi careant appellatione. Horum omnium generatio simplex, & una est: quippe semine tantum omnia exeunt, nisi quid rarer, parcesq; radice prosiliat. Semen autem duo plurimum tempora notantur, sed primum, atq; potillimum, quod circa uergiliarum occasum accipitur, quod & Heliodus, & maxima ferè pars autorum secuta est: quamobrem tempus id per excellentiam satum appellarunt. Secundū, quod Vere incipit post brumam. Sed nō eisdem datur utrunq; alia enim maiore feri desiderant, alia sero, quod hyemem nequeant tolerare: non tamen defunt, quae tempus utrunq; satis apte contingant, hyemem scilicet, atq; uer. Mature feruntur triticum, ordeum, quod etiam maturius feritur: item semen, titha, siligo, & si quid aliud tritico simile consistat: his etenim omnibus idem penè tempus ferendi statuitur. Ex leguminibus uero faba (ut ita loquar) maxime mature feri exposcit: haec enim suae debilitatis gratia, radicationem hyeme anticipare desiderat. Lupinum quoq; mature feritur: post aream enim ferendū protinus censent. Sera illorum satio est, quae in genere discrepant, ut tritici genus quoddam, & ordeum quod trimestre appellant, quoniam per tantum temporis perfici possunt: & in leguminum genere lens, aphaca, pisum. Tempori utriq; dantur ex leguminibus eruum, cicer. Sunt & qui etiam fabam sero audeant ferere, si minus primis satibus expedire potuerint. Simpliciter tamen ratione dicendum, alia sui roboris causa feri maturius poscere, ut quae hyemem tolerare facile possunt: alia ob debilitatem idem requirere, ut clementia temporis incrementum praesumere queant. Igitur tempora duo illa in primis notantur. Tertium uero additur, quod aestiuis attributum retulimus, quo milium feritur, & panicū, & sesamum, item trionum, geminalisq;. Haec ferendi tempora singulis statuuntur. Erumpit autem aliud celerius, aliud tardius: ordeum atq; triticum die plurimum septimo, sed magis ordeum festinat. Legumina quarto die, aut quinto proueniunt, fabis exceptis: faba enim intra dies plures etiam, quam frumentacea, exit: quibusdam enim in locis uel in die quinto-decimo, alijs etiam uigesimo: haec enim difficilime omnium prouenit, & si cum facta fuerit, imber plus aequo successerit, uel prouentu omnino difficilis reddetur. Sed an ea, quae tempore uerū serantur, celerius exeant, cogitandū. Prouentus autem exortusq; dictos, quoad id uniuersim dixisse liceat, ita faciliari putandū. Nonnunquam enim, & quibusdam in locis uel intra pauciores dies confici possint, ut in Aegypto tertio, quarto uel die prouenire affirmant. At apud alios uel pluribus, quam retulimus, opus sit: nec temere ita eueniat, cum & tellus, & coelum discrepat: cumq; maturius, ferius ue, aratum est, quaeque super uenerint dissimilia constant. Tellus enim

rara

rara, & leuis, & benigno coelo subiecta, celeriter, ac facile reddit: lenta uero, & ponderosa, tarde: & quæ squalleat, tardius. Item si hyems, aut squallores, serenitatesque nimis superuenerint, uel ecotra imbres immodici incesserint, res longè tardius agitur: his enim discrimen summum exultat. Parimodo, & si solum sit cultum simoq; referunt, uel si nihil eiusmodi actum sit: Nam & ad mature, sero uel ferendū quoduis, loca differunt. Qua de causa nonnulli Græcæ incolæ mature omnia serere solent, uidelicet propter sui tractus algorem, ut Phocenses: ne scilicet hyemes herbas paruulas occupent.

Quemadmodū nascantur in frugibus folia, germinaque, & radices. Quo modo ordeum, & triticum, & pisum, & faba, & cicer exeant: quoque radices legumina omnia habeant. De frumentagine, & ordeagine, atque frumenti ortu, leguminumque.

Cep. 11



Eminent alia ex eodem, radicem, solumque fundentia: alia utrunque ex utroque extremo. Triticū, ordeum, tīpha, ad summā omnia, quæ frumētacea consent specie, ex utroque effundunt: quippe quæ parte una, crassaque radice: tenui superna, herbam propellant: sit tamen unum, atque continuum ex ambobus, radice & caule. At faba, ceteraque legumina non eodem modo mittere consueuerunt, sed eadem ex parte radicem fundunt, & caulem, quia etiam nexus siliquarū consistit, inque ea uelut principium quoddam germinandi haudquaquam obscurum. Quod in quibusdam uel ad mentulae formam effigiarum sane inspicere possis, ceu in faba, & cicere, sed maxime in lupino: his enim radix deorsum uersus, solum uero & caulis sursum tendunt. Hoc igitur differunt: sed illo planè conueniunt, quod omnia per annexum siliquæ, atque spicæ radicem capiunt: nec ut in quibusdam arboribus, è diuerso fieri solet, ceu in amygdala, nuce, glande, atque similibus. Omnibus autem radix paulò ante caulem exit: & quidem in frumentaceis euenit, ut radix protinus extra pellatur: germen autem in ipso semine augeri primū incipiat, auctoque subinde semina disiungantur. Nam & hæc omnia bipartita quodammodo constant, quod in leguminibus manifestum est: Illa namque bino claudi corpore, atque ita componi penitus liquet: uerum in eo genere, quia per seipsum sit, illud quidem minus contingit. Radix tamen paulò prius isti quoque prope pellitur. Exit ordeum, & triticum uno folio: pisum, & faba, & cicer multis: legumina omnia singulas habent radices, easdemque lignosas, & ramulis prætenuis modo capillamentorum fibratas. Omnium (ut ita dixerim) altissimam cicer agit, quod nonnunquam uel ex latere mittit. At uero triticum, ordeum, reliquaque frumētacea per multis, prætenuisque innituntur radicibus: qua de causa numerofo ramo, numerosoque caule omnia eiusmodi se attollunt. Quamobrem uel contrarietas quadam inter hæc genera ferre intelligi potest: etenim legumina radice singulari subnixa, multos superne ramos ex caulibus gerunt, fabis tantum exceptis: frumenta uero è diuerso multis subnixa radicibus, multa quidem effundunt germina, sed quæ ramis brachiali omnino nequeant, præterque genus, quod frumentaginem, quodque ordeaginem uocant. Hyeme in herba, frumentacea manent. Omnia tempore mitescent, caulem de medio mittunt: quæ geniculantur, euenit, ut protinus in tertio genu, quædam in quarto gerere spicam incipiant, sed nondum aliqua mole conspicuam. Et quidem per totum culmum spica digeritur, ut sermè cum culmari inciperint, mox eam conspici sit: sed latet, antequam adulta in folliculo fuerit: tum enim sterus sue crassitudine molis euidēs extat. Mox folliculo absoluta, quarto, aut quinto die florere tam tritici, quam ordeici incipit, totidemque diebus ferè floret: qui uero plus temporis referunt, septimo die deflorescere notat. Sed leguminum floris diu-

tina productio est, atque inter cætera erui, cicerisq; diuturnissima. Inter omnia uero faba quidem summo discrimine redditur: quadraginta nanque diebus florere prodita est: sed alij, subinde alio & alio emergente, florere assignant: particularim enim florere aiunt, alij simpliciter referunt, flos enim spicatis uniuersim leguminibus omnibus particularim emergit. His enim primum pars infera floret quæ cum defierit, proxima incipit, atq; ita ad supernam itur successu assidue: qua de causa multa ex eruis euulsa parte ima defluxisse cernuntur, superna uero penitus esse ultidia.

Quot diebus frumenta, quot item legumina maturentur. Terram à terre, & coelum à coelo ad fructuū differre perfectionem. Quibus silijs frumenta, quibus legumina consent. De siliqua, legumine, florumq; differentia. Quæ spicam, quæ iubam, quæ siliquam gerant.

Cap. III



Riticum, atque ordeum postea quam defloruere, crassantur, perficiunturq; cum plurimum intra dies quadraginta: pari modo & tpha, & reliqua huiusmodi. Item fabam diebus totidem perfici uolunt: ita tamen, ut intra tantundem spacium temporis hæc florere, atque perfici nata sit, cum cætera intra dies pauciores consummentur. Sed cicer paucissimis perfici potest, siquidē post sementem diebus quadraginta absolui possit, ut quidam affirmant: Nam in totum celerrime genus id leguminis consummari nulli dubium est. Milium, & sesamum, & panicum, & ad summam omnia estiuæ, dies quadraginta fortiri inter omnes ferè constat: non tamen desunt, qui uel pauciores prodiderint. Differt & terra à terra, & coelum à coelo ad fructuum perfectionem: quædam etenim loca proferre intra pauciores dies uidentur: ut cum alia, tum & maiorem in modum conspicue Aegyptus: illic enim ordeum sexto à sattu mense, triticum septimo metitur, quod apud plurimos octauo. Cæterum nec illo tractu sic multitudine tota fieri solet, sed quoad religionis primitijs tantum statutum est. Poratur enim ad sacrorum quorundam usum farina noua sexto mense, & hæc à locis superioribus super Memphim. Quin & Sicilia apud Milas uocatas agri Mesani celerem quandam fieri consummationem serorum affirmant: esse nanque sementem eorum menses sex: sed tamen cum primis unà metere posse, qui mense nouissimo seuerit. Regionem istam adeo fertilem produnt, ut triginta choës reddere ualeat, pascua minime habeat ubique. Sed mirabilius, quod in Melio fieri aiunt: sata enim intra triginta, aut quadraginta dies metere incipiunt: quamobrem eius loci incolæ fari consueuissent: Eatenus serendum, quatenus manipulum uideris. Sed hæc, nec coctu facilia, nec multa apud eos fieri traditur. Locum istum in exhibendis aliam mentis mancum affirmant: frumenta enim, oleasq; ingenue ferre, uites autem mondice. Sed omnibus mirabilius, quod in Chalcia Rhodiorū insula fieri solet: illic enim locum quendam præcoquem, fertilemq; adeo narrant, ut ordeum satum in eo, cū cæteris fereretur in locis, metere iterumq; ferere, atque cum reliquis unà frugibus rursus metere possint. Maximam igitur hanc differentiam, si uera sit, arbitrari debemus: Quod enim translatum in alium tractum distulerit, ut è Cilicia in Cappadociam, atque in totum trans Taurum aiunt, minus incongruum sit. Locorum enim discrimen summum longi causa interualli exultat necesse est: conterminum uero, eundemq; loco, tantum differre à reliquis, mirabile admodum est. Hic ergo summa cum differentia notatur: cæteri autem tractus haud multum inter sese tempore distant, sata enim in Attica prius, quam in Hellesponto ueniunt ad maturitatem diebus triginta, aut aliquo plus. Quod si satus quoque præcesserit, loci mutatio sit: sin autem simul satum sit, plus temporis certe accedat necesse est. Nec & loca differentiam haudquaquam mediocrem faciunt, nonnulla proxima sunt: segetes enim Satalaminis

391

laminis longe prius, quàm ceteræ Atticæ regionis perficiuntur. Atque in totum loca maritima, tam ad hæc ipsa, quàm ad reliquos fructus festinatiora intelliguntur: ut circa Aetnam uocatam Peloponnessi, & in Phaleco agri Megarensis, nisi iithic uel humi tenuitatem, atque laxitatem offerre quicquam putaueris. Generatio, & perfectio ita se habent. Differunt autem & tota discreta genera inter sese, frumenta, legumina, æstiuæq; & generatim, quæ eiusdem generis consortia sunt. Frumenta etenim folio harundinaceo constant. Leguminum alia rotundo, ut faba, & maxima ferè pars; alia oblongiori, ut pisum, cicercula, cicera, & reliqua huiusmodi; alia item neruata, alia sine neruo, & uena, Sefamum, & trionum discerni ab his sua proprietate cernuntur. Item caulis alijs geniculatus, atque inanis, ut fabæ: quamobrem culmus uocatus est cæteris leguminibus lignosior. Sed ciceri lignosissimus, milio ex æstiuis, & panico harundinaceus: sefama, & triono potius ferulaceus: & alijs caulis erectus, ut tritico, ordeo: & in totum frumentaceis, atque æstiuis, alijs tendens in latus potius, ut ciceri, eruo, lenti: alijs humi procidens, ut erualæ, pisco, cicerculæ. Si aliqua nomine appellata speciali, si ligna longa affixeris, ascendet, & frugifera fiet; alioqui uitiosa, atque eruginosa reddetur. Faba inter legumina sola potissimum erecto caule constat. Quin & floribus differentia tum natura, tum positu data est: de quibus ferè in ijs, quæ in uniuersum digestimus, satis dictum existimamus: scilicet quod alijs lanuginei, ut omnium ferè gerentium spicam: alijs folijs constant, ut leguminum, & plurimis quidem minutis: maior etenim pars florem sessilem ædit. Pisos lanugineus & milio, & panico: sed sefama, atque triono folijs constants, & alia circa ipsam sententiam flosculum habent, ut quæque frumentacea, & miliacea circa spicam. Legumina uero ex eo quodammodo flore, aut ex eodem quidem initio proueniunt: & florem alia uniuersim, alia particulatim produunt: & reliqua hisce proxima, satis iam exposuisse putamus. Ad hæc quæ fructuum ratio exigit, addimus: quod alijs spicam gerunt, ut frumentacea: alia siliquam, ut legumina: alia iubam, ut miliacea: effusam enim illam harundinaceam comam, iubam appello. Ad summam, alijs semen uaculis includitur, alijs membranis continetur, alijs nudum insidet: alijs item fructus in exiremo, alijs in latere: & reliqua, quæ hanc ipsam contemplationem contingunt, diximus. In totum uero genus leguminum fructu copiosius, fecundiusq; profectò sentitur. Sed his feraciora profectò æstiuæ sunt, ut milium, sefama. Lens maxime inter legumina fertilis est: & summam quæ semen ferunt pusillum, copiosius ferè fructificant, ut etiam inter olera cuminum: quanquam hæc omnia copiose ferant. Validiora contra hyemem, atque in totum cœli mutationes frumentacea constant: legumina uero cibi ratione parentur ualentiora, nisi fortè id quidem nobis ita respondet, cum cæteris animantibus è diuerso occurrat.

De frumentaceorum inter se differentia, & generibus ordei, ac tritici, & eorum differentijs: quantumq; nascatur in Asia frumentum. Cap. IIII

40



Rgo genera tota tales inter se differētias sortiunt. Quæ uero generis eiusdem consortia sint, his pro partibus sanè inæqualitate differentia datur: ut inter frumentacea tritici angustiori folio, quàm ordeum conditur, & caulem leuiorem, ruptiusq; difficiliorem id habet. Ad hæc tritici tuniceis integitur multis: ordeum nudum consistit: id enim omnium maxime caret tegumento. Tiphæ quoque, & siligo, & omnia huiusmodi multiplici folliculo includuntur. Ac omnium (ut ita loquar) maxime auenam, natura operuit. Quin etiam culmus altior tritico, quàm ordeo est, & spica plus discreta à folijs emicat. Paleæ quoque suauior, quæ ex tritico, quàm quæ ex ordeo: utpote quæ plus succi retineat, & mollior sit. Ad hæc ordeum à tritico differt, quod ordeum in uersus

spicatur, triticum nullo uersu conditū est, sed æquale undiq; constat. Genus totum ad genus tales ingerit differentias. Rursus eorū utrunq; in plura genera ipsis etiam fructibus, & spicis, & reliquis formis, atq; etiam uiribus, affectionibusq; discreta, diuidi sanè potest. Est enim in ordeī genere aliud binis uersibus, aliud ternis quaternisq; cumq; plurimum, senis: est enim uel huiusmodi quoddam genus. Quod uero pluribus constituitur uersibus, hoc semper serè spissius, posituq; arctius constat. Magnam & Indicum differentiam facit, quandoquidem ramis natum sit brachiarī, ut proposui. Et spicæ uero alijs grandiores, rarioresq; constant: alijs minores, frequentioresq; & alijs distantiores a folijs, alijs proximiores, ut achilleis cognomine. Et ordeorum ipsorum aliud rotundius, minusq;: aliud oblongius, maiusq;, atq; in spica rarius. Item aliud candidum, aliud accedens ad purpuram, quod & farinam reddere copiosius creditur: & contra hyemem, & frigus, & in totū contra coeli mutationes candido ualidius esse uidetur. Triticī quoque genera plura notantur, cognomina ex locis sortita, ut africanum, ponticum, thracium, assyrium, ægyptium, siculum: quæ & colore, & magnitudine, & specie, & proprietate inter se differūt. Quædam uel aliunde cognomina sortiuntur pro suis uiribus, tum alijs, tum uel maxime quæ ad cibum pertineant, ut cachrydias, stlengis, alexandrinus: quorū omnium differentias in supradictis colligere licet. Nec uero ab re fuerit, si illa quoq; pro differentijs capies: & aliud præcox, aliud serum: & aliud auctu amplū multumq; reddens, aliud ieiunum quoddam parumq; ferens: & aliud spicam grandiore effundens, aliud parum: & aliud diu in folliculo manens, aliud aptum breui absolutū, ut africanū: & aliud culmo tenui constans, aliud crasso: quod etiam ipsum africanū datū est. Crasso tamen, & cachrydias dictum consistit. Item aliud tunicis paucis, aliud multis uestitur, ut thracium: & aliud unicalamum, aliud multicalamum, & magis, minusq;. Adde etiam si quid aliud his, aut prædictis ratione uirium proximum sit: eiusmodi namq; differentie naturaliores profectō appareant, quibus & trimestrium annue rari genus par est, & bimestrium, & si quid intra pauciores dies ualeat consummari. Et in Eubœa genus quoddam intra quadraginta dies crassari, perficiq; posse affirmant, idemq; firmum esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leue: quamobrem famulis id præberi inquit, etenim nec multum in hoc furfuris esse uolunt. Igitur genus id celerrimum quidem ad consummationem, sed inuentu rarissimum est. Et bimestria uero quædā habentur, quæ ex Sicilia, & in Achaiam aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumq; fecunda habentur: quantū cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in Eubœa, & præcipue apud Caristum. Trimestria uero permulta, & ubiq; habentur: leuia hæc & parum fecunda, & unicalama sunt, atq; in totum infirma. Leuissimū igitur triticum, quoad simplicitate agere licet, ponticum est: ponderosius ex ijs, quæ in Græciam aduehi solent, siculum datur. Sed eo ponderosius, quod Bœotia fert. Indicum asserunt, quod athletæ, qui Bœotiz ternos semisextarios uix possint consumere, cum Athenis fuerint, facile quina consumunt: leue satis, & quod in laconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris, cœloq; intelligi debet: Nam & Asia ultra Bactra quodam in loco adeo grande frumentum fieri tradunt, ut nucleis oliuæ suæ æquiparent magnitudine grana singula. In Pissotis autem dictis adeo firmum nasci affirmant, ut si quis plenus comederit, distumpatur necesse sit: & Macedoniū ita plerosq; interisse aiunt.

Ab absurdum sanè, & leuitati trimestrium absonum, quod in pontico euenit: Venum enim durum admodum est: hybernū autem molle est: leuitate enim molle plurimum differt.

Duo uniuersi frumenti esse arandi tempora: deq; cicceris differentijs, siliquarumq; in figura. Cap. V



HT quidem arandi tempora uniuersi frumenti duo uidentur statuere: alterum hybernū, alterum uernum, quo etiam legumina ferunt. Ad hæc in genere frumentorum aliud purum lolij nascitur, ut ponticū, atq; ægyptium: purum & siculum satis, & præcipue agrigentinum sicut lolio exit. Siculo proprium datur, quod melampyrum uocant: res innocens, nec sicut lolij graue, & caput tentans. Sed hæc quidē (ut dictū est) loco rum naturæ adscribi decet, idq; agere quoad singulis generibus attingere uideat. In leguminū autē genere, pari modo differētijs eiusmodi capere nō est: aut quod non idem scrutandi studij adhibet, aut etiam quod illa uniformia cōsistunt: etenim præter cicer, & lentem, & aliquatenus fabam, & eruū, quoad colorū, saporūq; ratio differētiā faciat, cætera nullis generibus discernere solent. Ergo cicer, & magnitudine, & sapore, & odore, & forma, pleraq; differētijs ostendit, ut arietinum, & columbinū. Can dida inter omnia dulcedine præstant: etenim eruum, & lens, & cicer, & faba, & sesama: Nam & sesama genus quoddā candidum datur. Sed differētijs hinc potius accipere licet, uidelicet ex his omnibus, quæ siliquis inclusa proueniunt. Eorū enim alia nō intersepta, sed quasi inuicem cōtingentia constant, ut eruum, pium, & pars penē maxima: alia magnopere circūsepta, ut lupinū, atq; etiam magis, & peculiarē in modū sesama: item alia in siliquis longis, alia in rotundis, ut cicer. Et quidē seminū multitudo, pro magnitudinis ratione sequit: pauciora em̄ minor silis qua continet, ut cicceris, & lentis. Quæ quidē differētiæ similes fortasse, ac illæ habentur, quas generi frumentaceorū, tum spicarū, tum ipsorum fructuū ratione tribuimus: nam & quæ siliquæ appellan̄, seminū serē rationem sequunt: alie nanq; leuiter late, ut lentis, & aphacæ: alie cylindricæ potius, ut erui, & pisi: figurā enim huiusmodi ista sortiunt. Sed huiusmodi differētijs multas per singula comperire poteris, quarū alie cōmunes omnibus, alie generatim propriæ habent. Quod autē omnia siliquis adherent, & ueluti quoddā principij inde obtinent, alia eminens, ut faba, & cicer: alia concauit, ut lupinū, & alia quædā: alia n̄ æque expressum, sed minus, ac ueluti indicij principij tantū, constat tum ex ipso aspectu: cernitur em̄ principium quo & fata germinant, atq; radicantur (ut inter initia diximus) & annexa siliquis nutrir, dum consummentur, apertissime possunt tum ex ijs, quæ nunc, & antē satis differuisse putamus. Sed de differētijs hæcenus.

De leguminū, & frumentorū satu: tum de stercoratione. Quæ cuiq; agro conueniant semina. Quædo imbres profunt, quādo noceant frugibus. Quod solum quid prestare possit. Cap. VI



Ere aut quæq; potissimū tempestiuis semētibz præstat: ceterū & sicco solo quidā cōmittunt, ac præcipue triticū, ac ordeū, utpote quæ maxime ualeat perdurare, ubi nō a uibus, aut alijs bestijs tellus obnoxia sit. Haud em̄ commodū semina defactū solū putat: quippe cū semina in eo facile lateſcat, atq; intereant: simul accidat, ut frequēs herba nascat. Imbrem post stationē superuenire omnibus prodest, exceptis quæ officij potius apta sint, ut faba inter æstiuā, sesama, & cumino, & triono. Densum aut, rarum ue sparse semē terrarū etiā ratione cōuenit: plus enim crassa, lateq; tolerare potest, q̄ are nō osa, & tenuis. Quanc̄ dici solet, aliās plus, aliās minus seminis eandē recipere segetem, in faustūq; augurio capiant cū plus receperit: terrā em̄ esurire, elitareq; protinus semen exultimāt. Sed hæc ratio stulte fortasse afferit. Semina uero si cōtemplaris, & præcipue loca ipsa scruteris unā cum solo, positionē quoq; animaduertendo, quæ ad statum, solesq; sit, accōmodatius sanē differētijs colliges. Stercoratio quoq;

pro natura terrarum fieri debet. Nouale hybernium uerno præfertur. Nonnisi quam alte inarare non expedit, ut in Syria: qua de causa pusilli aratris Syri utuntur. Apud alios cultus nimis obest, ut in Sicilia: unde fit, ut multi ex peregrinis facile aberrare possint. Hæc quo ad terrarum naturam satis sit. Discernere autem & semina solent, quid scilicet cuique competat agro. Hybernus etenim locis triticum potius datur, quam ordeum, atque in totum frumentum potius, quam legumen. Ad plenum inculta, & longo tempore post proficissa, tritico deputantur: id enim melius, quam ordeum illa ferunt. Tolerat & frequentiam imbrium triticum magis, quam ordeum, & fertilius segete minus stercoreata perficitur. Pari modo & tritici ratio, quod cui conueniat, habetur: exempli gratia, quod frugali, & pingui: quod ieluno, & gracili, & de reliquis pari ratione animaduertere solent. Aqua, cum fata conceperint, atque adulta sint, omnibus prodest. Tritico, ordeo, reliquisque frumentaceis floribus obest: facit enim, ut cuncta intercant. Leguminibus nihil officit, dicere excepto: id enim abluta falsilagine, radice tabescens, interit, & ab erucis erosum protinus perit. Cicer nigrum, atque etiam rufum, firmius est, quam album. Locis dilutioribus sero ferendum id censent. Faba florens præcipue madeseri cupit: ob id sero eam ferere uolunt (ut dictum est) quoniam diu floreat: sed postquam defloruerit, parum omnino aquæ desiderari affirmant: consummatio enim iam in uicino est. Frumentaceis in plenum crassatis aqua noxia esse putatur, & ordeo magis, quam tritico. In Aegypto uero, & apud Babylonem, & Bactra, ubi terra nullis, aut rarissimis imbribus madet, roribus omnia coalescunt. Adde Cyrenam, & Hesperidem: idem enim uel in his ipsis fieri solet. Omnium (ut simplicius loquar) opportunissima quæ uerna: quam obrem Sicilia frumenti persertilis est: large namque, & molliter. Vere fructificatur, & diuerso autem hyeme solū tenuē multa paulatim recipere possit. Crassum uel seminum copiam, & aquarum inopiam tolerare facile potest: locis autem siccantibus omnes affatus, auræque prodesse putantur. Sed alij apud alios eiusmodi remedia præstant, quod uel antea diximus. Sed omni quasi ex parte squallor potius, quam crebri imbres, frumento expedit: imbres enim cum aliis contrarij sunt, tum semina ipsa sæpe corrumpunt. Quod si minus herbarum quidem luxuriam mouent, ut fata strangulentur, atque omne alimentum amittant, nullum ex seminibus corruptum, mutari in aliud aptum est, præterquam triticum, atque ordeum, quæ mutari in lolium asserunt, magisque triticum. Idque imbribus frequentantibus fieri, & præcipue locis humidis, & imbre longe dilutis.

De lolio, auena, & uicicris. Quod leguminibus solum conueniat. Sesamum uiridem nullum enim mal mandere, nec etiam lupinum. Item remedium ne luxurient fruges. Quid Theophrastus, quid Babylonij in tondendis segetibus faciant.

Cap. VII



Olium autem uernum nequaquam esse, quemadmodum reliqua herba, quod quidam affirmare conantur, rationibus illis constat: confectum enim hyeme ineunte id exortum patescit, multisque differt: habet namque angustum folium, & pilosum, & pingue, eiusque peculiare pinguitudo notatur: pilositas enim auenæ etiam datur. Hoc igitur proprium eorum animaduersum est, atque etiam lini: nam uel ex hoc ipso lolium fieri uolunt. Cicer autem à cæteris leguminibus propria illa distinguunt, quod de floris prouentu retulimus, & quod fructu celerissime perficit, quoniam firmissimum, & lignosissimum constat: atque in totum noualibus ineptum præ sua edacitate est. Herbam enecat omnem, & maxime ac celerissime tribulum. Ad summam, nec solū quodlibet ferre id legumen potest, sed nigrum quodam, crassoque opus est. Fabam ex cæteris nouale optimum præstat, quæ frequenter feratur, fructumque serat copiose. Aquas quoque fluentes his magis prodesse, quam

quàm coelestes affirmant. Panicum, & milium minus aquarum indigent: nam cum plus habent, folia dimittunt: sed ualidius milium, dulcius panicum, quancumque infirmius est. Sefamam uiridem nullum animal mandit, neque lupinum. An uero neque trionum, neque geminalem, querendum: nam ea quoque amara sunt. Trionum sefamæ simi constat, & pinguiusculi est. Geminale cum inaceum quoddam est, atque nigrum: fertur cum sefama. Sed de his scrutari arctius sanè conuenit. Terris autem frugalibus ne luxurient, folijs depascere, atque tondere agricolæ solent: quod uel in Thessalia factatur quotannis. Euenit autem ut depasta quidam etiam quoties libeat, fructum nihilo mutant: retonsum uero etiam semel triticum degeneret, & longum sine ulla crassitudine surgat, quod camatiam uocant. Nec satum id ad naturam pristinam redire posse autumant: sed hoc periculum paucis euenire Thessali aiunt. At apud Babylonem semper, & quasi ordinate bis tondens, tertio pecus admittunt. Sic enim caulem mittit, alioqui folijs tantum lasciuat. Et negligentius quidam colentibus, quinquagesimo cum senore messes reddunt: diligentius uero cum centesimo quinquagesimo. Cultus autem probus, cum quadiutissime aqua intermiserit, quod scilicet multum materiam producat. Cum enim ea terra crassa, spissaque sit, raram atque solutam reddere opus est. Sed materiam, herbamque, quam Aegyptus gignere nata est, illa minime fundit. Igitur hæc uiruti tractus attribues. Multis autem locis uel ex radibus triticum, atque ordeum anno postero exit. Quin & eodem primo anno, ex iis, quæ gratia uenundandi secant, altero cultu mo adnascente profilit. Simili modo & si concuerit hyeme, pluuijs enim secutis festes resubilis redditur. Verum talium spica imperfecta, pusillaque extat. Ex eodem anno sequenti etiam, seminibus depressis, conculcatisque, ut nihil quasi appareat: uidelicet cum transeunte exercitu, semina conculsa in terram corruerint. Necnon & eorum, quos agnos uocitant. At in leguminum genere, aut nullis uis faciendi quicquam eiusmodi datur, aut certe non æque. Et germinationes quidem tot modis fieri solent,

Quid ad incrementum frugum plurimum iuuat: inde prouerbiū, Annum fructificare, non tellurem: frumentis, & reliquis herbis præterquam filici uilem esse stercoreationē. Quid enecet medicam. Semina item peregrina in uernacula transire, atque tum cultura, tum natura terre meliora, deterioraue fieri: quod genus aptum sit transire in aliud, atque nasci inter alia gaudcat.

Cap. VIII



Ad incrementum autem, alimentumque, plurimum quidem cœli temperies, atque in totum anni conditio iuuat. Imbribus enim, serenitatibus, hyemibusque opportune secutis, omnia seracia, permultisque fecunda redduntur: etiam si lata sint falsis, ac tenuibus solis. Quamobrem non perperam prouerbio dicitur, Annus fructificat, non tellus. Verum & terræ ratio multum refert, non solum quod crassa, uel tenuis, & rosida, uel squallida constet, sed etiam cœli ambientis, & flauum causa: quædam enim quibus tenuis, uisiosaque sint, probe tamen fructificant: quoniam comode ad maritimos iaceant flatus. Sed alij alijs comodi occurrunt (ut sæpe iam dictum est) quippe cum alijs fauonius, alijs aquilo, alijs auster prosit. Cultura quoque haudquaquam parum conferre percipitur, præcipue sementis. Exculta etenim terra facile profert. Quin & fimo magnopere adiuuat: calefacit enim & concoquit. Quæ namque stercorentur, festinantius, quam stercoreis indiga, uel uiginti dies erumpunt. Sed non omnibus stercoreatio prodest. Vtilis non solum frumentis, uerum etiam reliquis herbis, præterque filici est: hanc enim fimo superiniectione interire affirmant: interit & pecore incumbente. Quin & medica quæ uocatur, stercoreis, & urinæ causa perit, ut quidam dixerunt. Quodque autem semen naturæ temporis certe conuenit, atque in totum generi, genus certum respondet, etiam inter ipsa unigena, quæ discernere autores conantur. Semina peregrina intra annos tres, cum

plurimū transeunt ad uernacula: expeditq; ex apricis ad paulō minus aprica, & ex frigidis pari ratione transferre. Translata ex locis hybernis, eruptionē in præcoquis bus prorogant. Quapropter squallore intereunt, nisi pluuia serotina seruauit. Ob id cauendū censent, peregrina uernaculis permisceri, nisi ex solo simili migrarint. Nam ut loca in ferendo, oriendōq; inuicem discrepāt, ita cultura egeant diuersa necesse est. Ad hæc differētijs telluris, ac uires seminū, atq; etiam singulorum tempora obseruandū. Cū uero prospere tempora anni succellere, semina uel grauiora, sua uioraq; reddunt. Athenis itaq; ordeū, quod farinæ partem maiore conficit (is enim ager ordeū eximie fert) nō cum plurimū fuerit, sed cum quandā temperiem obtinuerit, commendandū euadit. In Phocide uero circa Elatium non solum ordeū, sed etiam triticum opime reddit. Et apud alios alia, ad quæ soli cuiusq; natura ualeat. Ergo semina meliora, deterioraq; tum cultura, tum terræ natura fieri possunt. Syl- uel crescunt enim, mansuescuntq; modo arborū, atq; in totū permulta tellure protinus uti arbores deterius ueniunt. Genus aut, quod totū transire in aliud aptum sit, nullū præterq; tiphā, & semen cōperies, sicuti inter primas disputationes proposui. Necnō & lolū ex tritico, & ordeo corruptis enascitur. Vel si id minus, nasci quidē inter triticū solum esse, nulli dubio est: ut etiam Ponticū illud triticū atrum cognominatum, & semen bulborū, & cætera quæ nasci inter alia semina solent. Nam & auena magis in ordeo exire uidetur, & in lente aracus res scabra, & dura. In aphacis autem securina securi similis. Atq; in omnibus serē inest, quod simul alatur intermisceturq; seu ratione telluris, quod non inepte putaueris, seu ob aliquā aliā causam. Nonnulla etiam manifeste communia plurimū erumpunt. Sed quoniam plus inter aliqua ualeant, propria eorum putantur: exempli gratia, eruanga erui, & lappa lentis: quod altera eruum potissimo uincat causa imbecillitatis, altera inter lentem maxime coalescat, quæ quidem eruangæ proxima est: etenim pari modo aggreditur, & herbam totam ueluti brachijs capessit: nec secus angit, atq; obstrangulat. Quod autem statim ab radice cumino, & feno græco subnascitur, & hæmodorū uocatur, unicaule constat, nec absimili caule surgit: uerum longe breuiori, & modo capitis superne quiddā gerente: radice autem subrotunda innititur. Nullum, feno græco excepto, inarescit solo tenui, nec ullo pacto pingui hæc prodest. Vt in Eubœa apud Lelantum quidē nasci omnino nequeunt, apud autem Canethum, & si quis alius eiusmodi locus sit, nimirū queunt. Igitur ea tametsi communia plurimū exeant, tamen inter prædicta infirmitatis causa dominari facile possunt.

De coctibili legumine, & incoctibili. Triticum bonam terram exposcere, ordeum uel in graciliore solo proficere. Cur stercoreari terram à faba putetur: item de semine quam spelta nunc dicimus: nec non de bromo, siligine, tiphā, auena, lolio, fefama. Cap. IX.



Octibile autem dici quidem de leguminibus tantummodo solet. Veruntamen & in frumentaceis idem, aut proximum euenire nō absq; ratione putaueris. Sed quoniam usus non idem sit, non æque percipi potest, neque in omnibus leguminibus ex æquo sentitur, sed præcipue in faba, & lenue: seu quod hæc maiorem in modum affici apta sint, seu etiam, quod propter frequentiore usum magis appareant: largius itaq; fieri solet. Sunt enim loca permulta, quæ semper coctibilia ferant, & alia quæ incoctibilia. Sed omni quasi ex parte loca tenuia coctibilia potius reddunt. Cœli quoque conditio mutationem eiusmodi afferre nimirum potest: argumentum, quod eadem segetes aliàs coctibilia, aliàs incoctibilia reddant. Faba apud Philippos cum uentilatur, si ab afflatu incola perflatur, si coctibilis est, sit incoctibilis. Hæc igitur multifariam rem istam posse fieri monstrant, quandoquidem & segetum nonnullæ

conterminæ inter se, situmq; similem obtinentes, nec ullam telluris differētiā sortientes, non parī modo fructificant, sed hæc coctibilia, illa incoctibilia parit. Idq; agitur eādem sulco tantū nonnūquam fegetes discernente. Frui tur potissimum triticum, tum ordeum: quamobrem triticum terram bonæ frugis exposcit, ordeum uel in graciliori solo proficere satis potest. Cicer inter legumina maxime terra potitur, quanquam in ea minus temporis maneat. Faba (ut dictum est) cum aliās molestissima minime est, tum etiā tellurem raritatis suæ, ac putredinis causā stercoreare putatur. Ob id qui circa Macedoniam atq; Thessaliā colunt, cum fabæ florent, arua inuertere consueuerunt. Inter ea quæ tritico, & ordeo similia constant ceu semen, 10 tiphā, siliginem, bromum, auenam, robustissimum, & maxime terram extenuis semen redditur: quippe cū radix ei multiplex atq; alta, culmusq; numerosus cōstet: sed fructus facilis, omnibusq; animalibus gratissimus est. Inter reliquas bromus radice numerosiore consistit: is enim multis dispergitur culmis. Siligo prædictis mollior atq; infirmior est. Tiphā omnī leuissima cōstat: nam & in simplici culmo assurgit, & solo proinde tenui contenta est: nec ut semen, pingue, & latum desiderat. Sunt illa duo, semen & tiphā perquam similia tritico: a uena uero, & bromus uelud syluestria quædam, & immitia constant. A uena quoque terram uehementer extenuat, & multiplici tum radice, tum calamo conditur. Lolium syluestre penitus est. 20 Omnium autē quæ æstiuis sementibus ager recipit, sesama terræ molestissima esse, plurimumq; posse extenuare putatur, utpote quæ multipliciori, crassioriq; calamo, & numerosiore consistit radice, quā milium. Sed quæ terræ, quæq; homini ratione cibi facilia sentiamus, differre inter sese planē uidentur: quædam enim ē contrario facilia ueniūt, ut legumen, ut milium: adde si quid pro usu hominū facilitatem ē diuerso, quā pro usu cæterorum animantium fortiri appareat.

De uitijs frugum, & bestiolis nocentibus: tum quæ fruges plurimum, & quæ minimum durent.
Item de rure rus, & cælum à cælo differre. Caput X



30 Eminum autem uicta quædam omnibus cōmunia ueniūt, ut rubigo: quædam propria dantur quibusdā, ut tabitudo radicis ciceri, & uricarum infestatio: alijs etiā pulicem bestiolarum erosio, nonnulla etiā scabie, atq; falsugine pereunt, ut cuminum. Animalia uero si non in ijs ipsis gignantur, sed extrinsecus uentant, non æque officiunt. Nascitur enim in tritico cantharis, & in eruo phalangium, & in alijs alia genera. Rubigines (ut simplicius loquar) in frumentaceis magis, quā leguminibus: inter frumentacea ordeum magis, quā triticum sentit: & inter ordea aliud plus, aliud minus, sed præcipue dixerim achilleis. Nec fegetum situs, naturaq; parum refert: tractus enim excelsi, perflatq;, rubiginem nullam, aut minimam sentiunt. Concaui & flatibus nullis exposti contra frequentissimam habent: gignitur hæc plenisunio. Maxime intereunt uel afflatibus triticum atq; ordeum, cum aut florentia perflatur, 40 tur, aut flore dimisso protinus infirma concutuntur: sed ordeum magis ita perire certum est: sæpe etiā concrassescunt. Si uehementius, diutiusq; flatus inuasert, exiccantur, & penitus inarescunt, quod quidam euentari dixerunt. Sol quoque ex nube ambo ista interimit, sed triticum magis, quā ordeum: & ita ut quanquam spica exinanita sit, uisu tamen percipiminime possit. Triticū uel uermiculi enecant, alijs protinus nascens erodentes radicibus, alijs cum squalientes absolui nequeunt: tunc enim uermiculus culmum usque ad spicam erodit: dein alimēto consumpto, emoritur. Et si totum erosit, triticum ipsum omnino interit: si uero alteram tantummodo culmi partem, frugemq; fundendā eate nus uiolauit, id quidem spicæ pereat necesse est: reliquum autem incolume extat. Euenit hoc in tritico non omnibus lo-

cis, ut in Thessalia, sed paucis quibusdam, ut in Africa, & in Lelanto Euboræ. Vermiculi uel in ciceris, & cicerulis ipsis gignuntur, cum secutis imbribus calor repentinus humorem incluserit, quemadmodum in ciceribus nasci uricæ solent. Qui autem alimenta sua consumplerint, tam in herbis quam in fructibus pereunt, ut impes: & qui fabis, reliquisque innascuntur, ut de arboribus, & lignis retulimus: exceptis qui cerasæ uocantur. Igitur ad hæc omnia tractuum natura plurimum refert, nec temere: iam enim cœlum diuturnum caliditate, aut frigiditate, aut humiditate, aut siccitate consistet: hoc autem fructus reddere, consummareque potissimo patet. Quapropter quibus locis fieri solent, non semper fiunt. Seminibus autem non uis eadem ad germinandum, ac referuandū utique datur. Quædam enim germinant, consummaturque celeriter, & referuari egregie possunt, ut panicum, & milium: quædam germinant quidem, sed non celeriter, ceu faba, & præcipue quæ coctibilibus. Pereunt celeriter aphaca, atque siliqua: ordeum celerius, quam triticum: & puluerulentum celerius, quam purgatum: & quod in horreis calce leuigatis cōditum est, quam quod in non ita leuigatis. Corruptis itaque animalia propria gignuntur (ut dictum est) cicere excepto: id enim solum gignere animal nullū potest. Et putrescentibus quidem omnibus uermis consistit. Contusis autem sponte ut sit, singulatum proprium quiddam gignitur. Cicer, & eruum omnium maxime durat. Lupinum longe his diuturnius est: sed hoc quodammodo pro syluestri habetur. Differt etiam rus à rure, & cœlum à cœlo ad seminum corruptionem, conseruationem uel: itaque apud Apolloniam maris lonij fabam nullo pacto corrodialunt, ideoque referuandam reponi. Quin & circa Cizicum diu durare potest. Metere quoque tosta plurimum ad diuturnitatem sanè facit: sic enim humoris minus relinquitur. Metunt uetiora legumina quidem, quò plus faciliusque legere possint: celeriter enim defluunt, & arefacta franguntur. Triticum uero, & quoddam ordeus non penitus excicari patiuntur, quod ad reddendam farinam, meliora minus arefacta putantur. Qua de causa in acruos, tam triticum, quam ordeum componere assolent: uidetur enim in acruo crassescere potius, quam attenuari. Frumentū nequaquam corrodipotes, cum admissio imbre prouenerit. Triticum in spica nondum messum durare maxime potest: atque etiam magis lupinum: nec enim id metunt priusquam imber incesserit: quoniam inter metendum exiliat, atque ita pereat semen.

Anniculum semen optimum ad sementem: de quo lupino, et aena.

Caput XI



De ortum autem, uniuersamque sementem, semen anniculum optimum putatur: bimum deterius, & trimum: quod autem ultra acciperis, sterile ferme est, quanquam ad usum cibarium idoneum consistet. Omnibus enim ad generandum uita data est definita: licet ea quoque uiribus inter sese differant, locorum scilicet causa, quibus condantur. Quamobrem Cappadociæ loco quodam Petra uocato, uel quadragenos annos fecunda, & ad sementem percommoda durare proditum est: sexagenos autem & septuagenos ad usum cibarium seruari posse idonea. In totum enim corrupta ea nunquam referunt, quamuis uestem, reliquamque gazam, corrumpi posse concedant: locum etenim istum cum aliis excessum, tum flatibus esse apertum: & auris ab exortu, occasu, meridieque aditum. Feruntque & in Media, reliquisque excessibus tractibus condita diu perdurare ualere. Sed cicer, lupinum, eruum, milium, & reliqua id genus longe diutius: quod etiam locis Græciæ fieri potest. Sed hæc locorum propria sunt, ut supra iam diximus. Creditur & terram apud quosdam haberi, qua illitum triticum seruari uicere potest: ut quæ apud Olynthum, & Euboræ apud Cerninthum effoditur. Reddit hæc triticum deterius quidem ad usum cibarium, sed aspectu

aspectu crassius facit: sextarium ad modum illinire solitū est. Quodq; autē semen feruefactum perit, ac sterile redditur: quāquam sunt, qui ordeum, & triticum apud Babylonem reslire in area, modo eorum quæ friguntur, enarrēt. Sedenim caloris differētia quādā profectio intelligi debet: & communia quidē hæc quasi omnium, aut plurimorum appareant. Quædam uero ex ijs quæ syluestria quali putantur, proprietatem quandā tum in generatione tum in germinatione fortiri planē uidetur, ut lupinum, atq; auenā. Lupinum enim licet robustissimū sit, tamen nisi protinus ab area terræ mandaueris, male proueniet, quemadmodum dictum est. Atq; in totum condit hoc legumen subter terram recusat: quæ de causā ne subarantes quidem id ferunt, & sæpe si in materiem, aut herbam prædensam quampiam incidat, eam ui summa impellendo diducit, radiceq; terram contingit, & germinat. Solum are nosum & uitiosum potius poscit, atque in totum cultis prouenire non uult. A uena ē diuerso: cultis enim melius hæc erumpit. Et non nusquam quæ prius germinis infœcunda esset, si diligenter colatur, germinat, copiosaq; redditur. In totum, solum hæc frugale desiderat. Peculiari uel illo à cæteris frumētaceis hæc discerni putatur, quod annis alternis utrunque semen aptum sit prouenire. Quamobrem qui eam delere penitus uolunt (deleri enim percontumax est) segetes annos duos laxant à fatu: cumq; plene diffusa in herbam est, pecus sæpe impellunt, usq; dum penitus depascatur. Idq; planissimum eius exitium sit, quod simul & alternatam eius germinationem testatur.

HISTORIÆ PLANTARVM LIBRI
OCTAVI FINIS.

THEOPHRASTI DE HISTORIA

PLANTARVM LIBER NONVS.

De humore & sapore plantarū: deq; gummy & lachryma: quodq; lachrymis & ibus, & morbis, & balsamum, & masticā annumerantur: tum de cardui, pinæ, squapij, laserpiij, uitis lachryma.

Caput I



VMOR plantæ, quem nonnulli succum nomine publico appellāt, uires pro cuiusq; plantæ ratione fortitur. Sapor humorum alium magis, alium minus cōsequitur: nec omnibus inesse appareat, ita exilis, & dilutus quidam in plerisq; sentitur. Humor igitur plurimus omnibus, cum germinare incipiunt: sed ualidissimus, maximeq; suam naturam ostendens, cum iam & à germinatione, & à fructificatione cessarunt. Accidit uero, ut uel proprium succi colorem plantæ nonnullæ fortiantur: alijs enim albus, ut la-
40 tuosus: alijs sanguineus, ut ceuteriæ, & spinæ, quam agrestem fusum appellant: alijs uiridis, alijs alius color: sed planius hoc in annuis, & anniculis, quā in arborum genere. Humor autem ipse quibusdam crassitudine tantum consistit, ut la-
tuosus: quibusdam etiam in lachrymæ modum gignitur, ut abieti, pino, terebin-
tho, larici, picæ, amygdalæ, cerafo, pruno, iunipero, ulmo, spinæ ægyptiæ: nam ea
quoq; fert gummam, uerum non ex cortice, sed in uase. Adde illas, quæ thus, quæ
myrrham præstant: lachrymis enim hæc quoq; annumerantur. Ad hæc balsamum,
& chalbanam, & si quid aliud simile sit. Qualem etiam spinam Indicam reddunt, ex
qua illud myrrhæ simile gignitur. Consistit & in lentisco, & in spina ixina dicta la-
chryma, quæ masticam reddit. Hæc autē omnia & ferè quæcunq; aliqua pinguedi-
ne consent, odorata esse notantur: quæ contrā pinguedine carent, hæc sine odore

proueniunt, ut gummi, & amygdalæ lachryma. Quin & pinea carduus, quæ in Creta insula exit, habere lachrymam dicitur: & hirci spinam appellatam addunt. Hæc antea nasci tantum in Creta putabatur, nunc uero in Achaia etiam Peloponnesi, & alijs locis, & Asia circa Mediam comperiri certum est. Eorum quidem omnium lachryma in caulibus, caudicibus, ramisque consistit: quorundam autem in radicibus, ut equapij, & scammonia, & aliorum multorum uim medicam gerentium. Nec desunt quæ tum in radice, tum in caule habeant: caulem enim & radicem nonnullorum liquare consueuere, ut etiam laseris. Ergo equapij lachryma myrrhæ similis constat: quam obrem cum quidam hinc nasci myrrham audiuisent, equapium apud se prouenire putarunt. Scritur equapium etiam sua lachryma, ut lilium, & alia quædam. Laserpitij lachryma gustu uehemens modo ipsius laserpitij constat. Quod enim laser uocant, lachryma est. Scammonia & reliqua huiuscemodi, uim medicam (ut retulimus) fortiuntur. Ex prædictis autem omnibus, alia sponte consistunt, alia incisura, alia modo utroque. Cæsura scilicet capiuntur quæ utilia, magisque operæ pretij sunt. Quapropter amygdalæ lachrymam nullus extrahit, nulla enim in re utilis esse potest. Quibus concretio sponte consistit, his fluxus humoris largior prodit. Non eodem tempore omnium incisuræ atque concretiones notantur. Sed uitis lachrymam consistere potissimo aiunt, si paulo ante germinationem cædatur. Autumno uero & hyeme incipiente, minus. Quanquam ad fructificandū, & tempestiuè quidem, maiore ex parte tempora illa statuuntur.

De cæsura ad resinam, quoque modo resina fiat. Item de picæ.

Capit 11



Erebinthum & pinum, & si quæ resinam alia faciant, cædendas post germinationem affirmant. Ad summam, cæsura earum, non annua, sed post plus temporis fieri solet. Thus atque myrrham sub Cane, feruentissimisque diebus incidi referunt. Sic & balsamum quod in Syria nascitur. Sed diligentior, parciore cæsura eorum infertur. Humoris enim confluuium parcius accedit. Quorum autem & caulis, & radix inciditur, horum caulis antea ferrum recipit, ceu laseris. Eorum denique succum alteri cauliam, alteri radicem uocant: præstantior radicias est: purus enim, translucidus, & sicciore, caulias uero humidior, & ideo farinam ei inspergunt, ut satis coagulari possit. Incisuræ tempus idoneum Poeni nouere. Laser enim illis legendum natura largita est. Quin & radicem caesores, & qui succos medicos legunt, caules liquare antea solent. Ad plenum uero, & qui radices, & qui succos legant, omnes tempus suum cuique obseruant: ergo commune id esse omnium constat. Resina uero in hunc modum fieri solita est. In pino quidem ubi iam uulnerata arbore, teda detracta est, resinam hauriunt, sic enim in uulnus inuectum, humor copiosior confluit: in abiete uero, & picea cum lignis degustatis uulnus intulerint: haud enim quancunque secretionem modo eodem agi mos est. Vulnerant enim & terebinthos parte utraque, caudice scilicet & ramo, sed copiosior & melior, quæ in caudicem defluit. Differunt etiam arborum ratione. Optima enim quæ ex terebintho, spissa namque & leuissima, & odore gratissima est, uerum pauca: secunda quæ ex abiete & larice, & picea, leuior enim, quam quæ ex pino. Copiosissima, & ponderosissima, & picosissima, quæ ex pino: teda enim pinus referta est. Portatur utribus liquida, dein sponte, quo nunc cernitur modo, spissatur. Quanquam terebinthum etiam picem apud Syros largiri affirmant. Est enim mons (ut inter superiora retulimus) ingens, terebinthis amplissimis totus repletus. Quidam & piceam, & cedrum, & palmam addunt. Sed hoc quia rarum, pro contingente potius accipi debet: nam qui Macedoniam colunt, ne pinum quidem picis gratia urunt, præterquam marem. Sterilem enim marem nuncupant. For-

minæ

minæ uero radicem tantū accipiunt. Omnis etenim pinus tedam radice ingerit. Pix optima purissimaq̃, quam loca admodū aprica, & aquilonia præbent; cōtrā quam opaca, horridior limūq̃ referens; locis enim admodum depressis atq̃ opacis, nec uillo quidem pacto pinus exire potest. Est præterea sterilitas quædā fertilitasq̃ tum copię tum bonitatis; quippe cum mediocri hyeme copiosa, & bona, & colore canidior reddatur, aspera uero pauca atque deterior: quæ quidem copiam & bonitatem picis definiunt. Non larga fructificatio pinorum. Idæi quipiam discernunt, & aliam idæam, aliam marinam cognominant, picem fieri aiunt ex idæa largiorem, nigriorem, dulciorem, in totumq̃ faciliorem, & odore gratiorem, dum cruda sit, decocta enim in minus contrahi, quoniā plus habeat ferri: quam obrem eūā tenuiorem hanc esse addunt. Ex marina autem flauiolem & crassiolem, scilicet crudam, ita ut decoctā minus auferat. Sed tedatiorem idæam tradunt (utq̃ simplicius loquar) tantundem tedæ, plus dilutius picis imbribus frequentatis, quam squaloribus reddere uolunt: & ex hybernis, opacisq̃ locis plusquam ex apricis, serenisq̃. Hæc igitur ita Idæi atq̃ Macedones asserunt. Replentur caua plagarum, uidelicet in tantum, ut iterum pix extrahi possit. Frugalis pinū, anno proximo, mediocris: secundo, uisiofa: tertio, repletio non coitu ligni, sed incremento picis conficitur: lignum enim in hac arbore coire, iterumq̃ unum refici nequit, sed cōfectio quidem picis reddi post tantum temporis solet: necesse autē ligni quoq̃ agnationem fieri quandam. Siquidem detracta, deustaq̃ tedā, effluuium euenire picis solitum est. Id igitur accipit ita decet. Idæi ubi arboris caudicem cortice dispoliarint, quod parte solari, binis aut ternis a terra cubitis facere consueuere, confluxum istuc fieri non sine tedā uno cum plurimum anno affirmant. Idq̃ cum securi detraxerint, secundo iterum anno tedā lo cum expleri, & tertio pari modo. Posthac ob eam paulatinam incisuram arborem extenuatam, putrefactamq̃, humi facile a flatu prosterni, tum eius cor extrahi (hoc enim tedam maxime præfert) necnon & radicē effodi: hanc enim omnibus tedam constare, ut diximus, sed hac in re probas quidem (ut dictum est) crebrius uulnus accipere, deteriores uero longiori tempore possit, & parte aliqua referuata, plus temporis resistere posse. Tota uero detracta minus cōstanteum profus est, ternas tamen detractiōnes eiusmodi maxime arbores tolerare posse uidentur: non simul & fructificat & tedificat pinus, sed protinus nouella fructificat, multo autem post facta uetusior tedificat.

Quemadmodum pix uratur, fiantq̃ carbones. Item de thure & myrrha.

Capit. III



Item urere hunc in modum consueuerūt: cum locum æqualem præparauerint, & ueluti arca facta concursum habente, in medium diligenter paumentarint, truncos persusos componunt: proxime sanē compositioni carbonem faciētium, præterquam quod sine fossa opus perficiunt, lignis erectis, & inter se coherentibus, ita ut altitudinem assidue pro multitudine capiant. Quos fieri aiunt cum compositionem descripserunt circuitu centenorum octuagenorum cubitorum: altitudine uero cum plurimum sexagenorum, aut centenorum & quinquagenorum ambabus, si tedā pinuissima sit. Cum igitur tedam ita construxerint, & materiam pertexerint, aliqua terra superinfusa undiq̃, summa cum diligentia occultant, ut ignis nulla ex parte emicare possit. Pix enim peribit, si id acciderit. Succedunt autē per aditū relicti: dein eam quoque partem stipant materie, & obstruunt terra: reliquasq̃ omnes obseruant, & quacūq̃ simum protrudi uiderint, scalis scandentes, terram assidue infundunt, quo nullo pacto flamma erumpere possit. Canalis uero per medium structus acruum, picem fluentem in foueam ducit, cubitis circiter quindecim ab

aceruo. Pix effluēs tactu frigida fit. Vritur duos dies, & totidem noctes cum plurimum: saepe enim postridie ante solis occasum exusta iam est, rogusq; cessit. Id enim euenit cum nihil reliquum est, quod amplius fluat. Totum autē tempus, quo teda uritur, uigilantes obseruāt, ne quid ignis erumpat, & sacrificant atq; concelebrant precantes, ut pix sibi copiosa, bonaq; benignitate fiat deorum. Macedones hoc modo urere assolent. In Asia uero Syros non detrahēre tedam aiunt, sed in arbore ipsa adurere, instrumentum inuecto quodam industrie fabricator: hoc enim partem unam accendi, quā liquefacta, aliam atq; aliam uice pari successione ignem recipere. Finis autem operis, & cessandi indicium, cum scilicet nihil defluit. Terebinthos illi (ut superius exposuimus) urunt: pinum enim nequaquam Syria fert. Resina & pix hoc modo fieri solēt. De thure, & myrrha, & balsamo, & si quid aliud simile cōstet, tam incursura quā sponte prodire posse, dictum iam est. Nunc quæ in ortu, collectu, reliquisq; propria eorum possint intelligi, explicare tentabimus: & reliqua quoq; odorata quoad fieri possit, persequemur: quæ omnia uel maxima quidem ex parte locis meridiei orientiq; datis, proueniunt.

Vbi thus, myrrha, castia, cinamomum gignantur. Item arborem thuris omnem penitus aspernari cultum.

Caput 1111



Ignitur ergo thus, & myrrha, & castia, & cinamomum regione Arabiæ media, circa Saba & Adramyta, & Cribæna, & Mamali: & ex eū 30
thuris, myrrhæq; arbores, aliæ super mōtem, aliæ in pede montis culturis proprijs: quamobrem aliæ coluntur, aliæ uitam agunt incultæ. Montem istum præaltum affirmant, & ningi solitum: amnes quoque de eo in plana fluere. Arborem thuris non magnam, sed quinīs ferē cubitis attolli, per multosq; ramos gerere serunt: folium piri, nisi quod multo minus, & colore ple- 35
nè herbidum modo rutæ, corticem leuem omni ex parte, lauri modo. Myrrham minorem etiam altitudine, fruticosioremq; narrant, caudice duro, contortoq; iuxta terrā, crassiori q; sura hominis, cortice leui, similiq; potulacæ: alij uero qui se uidisse affirmant, de magnitudine fermē cōsentiunt. Neutram earum arborum magnam referūt, & minorem myrrhæ, humidiorēq;. Sed thuris folium laurinum, leucēq;. 40
Myrrhæ aculeatum, non leue, ulmeo simile: crispum tamen, extremō spina horridulum, ilignei modo. Idem ea nauigatione, qua ex sinu Heroum uehementē egres-
sos sese aquam in monte quæsisse dixere, atq; ita uidisse has arbores, & lectionem notasse hoc modo ambarum: & caudices, & ramos incisos quidem, sed alios ueluti securi percussos uideri, alios tenuiores incisuras habere: & lachrymam aliam decide-
dere, aliam arbori inhaerere: nonnusquam etiam subiectas tegetes ex palmis contextas, alibi solum tantūmodo circumpauimētatum & purum. Thus quod tegete exciperetur purum esse atque perlucidum: quod terra, minus: quod arboribus in-
hærerēt ferro depecti, & corticem ideo nonnullis adiungi. Montem autem uniuersum Sabæis diuisum dixere: hos enim loci illius dominos esse, iustitiæq; mutua de- 45
gere, quamobrem nullum suas arbores custodire: unde & thus, myrrhamq; sese lar-
ge ad naues solitudine deportasse narrarunt. Illud quoque idem se audiuisse dixere, myrrham, thusq; collectum undique ad Solis delubrum conuehi, quod Sabæorum esse sanctissimum inter omnia regionis illius: custodesq; Arabes armatos habere, quibus singulos suum thus aceruatum, & myrrham eodē modo relinquere, posita super aceruū tabella, literis significante numerum mensurarum & precium, quod pro singulis mensuris ponendum sit. Mercatores uero qui uenerint la-
bellas aduertere, eiusq; quod placuerit acta mensura precium in eodem ponere loco, unde merces acceperint: faceretotem deinde uenire, parteq; tertia precij deo accepta,

accepta, reliquum fide relinqueret: idēq; seruari tutissime dominis, donec acceptum uenerint. Alij thuris arborem lentisco similem prodidere, & fructum quoque lentisci, folium subruilum. Thus recentium arborum candidius esse, minusq; odoratum: ueterum flauius, odoratiusq;. Myrrhæ autem arborem terebintho similem reddidere, sed scabriorem, spinosioremq;: folium paulò rotundius, gustatu proximum terebintho. Earum quoq; ueteres præstantiores haberi. Ambas uero nasci in eodem loco terra subargilia & sabulosa, & aquas fonte fluentes raras admodū comperiri. Hæc ergo illis repugnant, uidelicet ningi, & imbribus perlui, & amnibus locum illum exhilarari. Arborum tamen istam similem terebintho constare quidam alij tradunt: nec desunt qui terebinthum eam esse omnino putent. Arabes enim qui thus aduexere, ligna huius arboris Antigono attulisse aiunt, quæ nihil à terebintho differrent. Sed hi quidem altera quoq; ignorantia quidem longe maiore laborarunt: thus enim & myrrham nasci ex eadem arbore putauerunt. Quamobrem uersimilium illi narrarūt, quos ex Heroum oppido profectos naui retulimus. Nam & arbos thuris, quæ super Sardes, apud delubrum quoddam surrexit, fronde lauri constat. Siquidem ex eadem ducere argumentum conueniat, quoniam eius thus tam quod caudice, quam quod ramis excerpitur, proximum & uisū, & odoratu, cum ardet, aduecto thuri percipitur. Sola hæc arbos omnē penitus cultum apra est aspernari: ac suauius quidē thus in Arabia nasci referunt, sed melius in uicinis insulis, in his enim & figurari in arbore posse, qua forma uolueris: & fortasse id quidem haud quicquam incredibile sit. Siquidem pro incursura facta, figura thuris sequatur necesse est. Quoddam adeo magna gleba consistit, ut mole sua manū implere, ponere uero plusquam tertiam partem minæ æquare possit. Thus omne iners aduehiur, & aspectu corticis simile est. Myrrhæ, aliud stillatitium, aliud scititium constat. Probatur melior gustu, eiusq; norma concolorem accipiunt. De thure & myrrha hæc ferè ad hoc usq; tempus accepimus.

De cinamomo & casia: tum quid de cinamomo colligendo fabulentur.

Caput V

DE cinamomo & casia illa narrant: fruticem esse utrunq; non amplum, sed magnitudine amerinæ: uerum permultis, surculosisq; ramis consistare. Cinamomum decerptū in quinas partes discerni, & esse præcipue bonitatis, quod germinibus proximum fuerit, idēq; ad palmi longitudinem cedi, aut paulò maius: secundū quod sequitur, quod etiam minus cæsura est: tertium deinde, & quartum notatur: ultimum uero, quod deterimum proximumq; radici: hoc enim minimum corticis habet, in quo summa gratia est, nō in ligno. Qua de causa præferri cacumina solent, quod corticis plurimum habeant. Quidam sic aiunt. Alij uero cinamomum fruticosum enarrant, eiusq; genera duos: alterum nigrum, alterum candidum. Fertur & fabula quedam. Conualibus enim exire id aiunt, in ijsq; serpentes plurimos cōuersari morsum hominibus moriferum inferentes, aduersum quos incolas septis manibus pedibusq; descendere, atq; ita legere cinamomum, quod cum deportauerint, toto in ternas partes diuiso, quodq; ad solem sorte illi cesserit, id solum relinquare, abeuntesq; flagrans sponie illud confestim cernere. Sed hoc planè fabula est. Casiam uero sarmento crassiori constare, neruosamq; admodum esse uolunt, nec ullo pacto posse decorari, ac eius etiam corticem esse utilem. Cum itaque uirgas secant, longitudine binum digitorū, aut paulò ampliores abscindere, recenteq; bouis corio eas perfrungere, ex eo lignis putrescentibus uermiculos nasci, qui lignum erodant: corticem uero nullatenus tangant ob amaritudinem, acrimoniamq; odoris. De casia, cinamomoq; hæc referunt.

De balsamo, quodq; non nisi initium ad nos perferatur.

Caput VI



Balsamum in ualle Syriæ prouenit. Eius arbutta duo tantû affirmant, alterum uiginti iugerum, alterum multo minus. Arboris magnitudo, quæ mâlo puniceæ magnæ: rami multi, folium rutæ simile, candidum tamen, perpetuò uirens: fructus similis terebintho tam magnitudine quàm colore. Is quoq; admodum odoratus est, & magis quàm lachryma. Colligi lachrymam in caudice, & parte superna tradunt: facta incisura unguibus ferreis, sub sydere, cum æstus maxime angit: collectum uero æstate fieri tora, sed quod manat multum nō esse: uix enim in toto die concham posse impleri. Odo rem tamen inferri eximium & copiosum, adeò ut ex paruo spaciū perlongum odor ualeat permeare: uerum syncerum ad nos nullum aduehi, sed quod multum colligitur: pluribus enim mistionibus uitari, quodq; Græciæ uenditur, sæpe adulte rari. Quin & uirgas eiusdem arboris odorem suauissimum præstare affirmant. Et quidem eas quoq; amputari quotannis: partim ut reliqua ualentiora seruetur, partim ut emolumentum plus comparetur: uendi nanque uel eas magno precio posse. Quinetiam ad imbrem cultus eiusmodi causam referunt, quem crebrò incidere assueuerant: necnon & amputationem uirgarum causam nonnullam adijciunt, ne magnæ arbores fiant: sequi enim ex crebra tonsura, ut uirgæ tantummodo mittantur, nec intendi ad unum uires arboris possint. Syluestre balsamû nullum usquam comperit accepimus. Impleri ex maiori orto uasa semichœæ duodecim aût, ex altero uero duo tantû: uendi syncerum argento ad drachmam, reliquum pro modo adulationis. Et balsamum quidem præcipuam quandam in odore naturâ protulit.

De calamo odorato, cylico, cybalbano, comaco, cardamomo, amomo, quodq; hæc ferè sint quibus utimur ad unguenta, casia, cinamomum, cardamomum, nardus, nerum, balsamum, aspalathus, styrax, consecratrix, narta, costus, ligusticum, crocum, myrrha, gladiolus, iuncus, calamus, sansucum, lotus, anethum. Item de tride Syrica.

Caput VII



Calamus uero & iuncus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum, & alium quendam montem paruû ualle minima exeunt. Non ut quidâ dixerè inter Libanû atq; Antilibanum, inter quos campus amplissimus, & pulcherrimus est, quem Aulonem appellât. Qua uero calamus, & iuncus proueniunt, lacus in amplum spaciatur, iuxtaq; eum palustribus siccatis isti assurgunt. Occupât locum plusquam triginta stadia. Virides nequaquam esse uidentur, sed sicci: forma uero nihil ab alijs differunt. Locum ingredienti protinus odor aspirat, non tamen longius spirat, ut quidam referunt: hic enim locus à mari plus est, quàm stadia centû quinquaginta. Sed in Arabia spiratione agri odoratissimâ esse inter omnes cōstat. Quæ in Syriâ odore superuacuo sunt, hæc ferè notata habemus. Chalbani enim grauius olet, & medicinæ potius conuenit. Id nanq; in Syriâ nascitur ex Paco uocato. Cætera autē odorata, quorum in unguentis usus, partim ex India Syris aduehuntur, ac inde mittuntur ad mare: partim ex Arabia deportantur, ut cinamomû & casia: atq; etiâ comacum: fructus alium esse, quem unguentis permiscere sumptuosissimis solent. Cardamomum atq; amomum aliq; ex Mediâ, aliq; ex Indiâ, cum nardo, & reliquis omnibus, aut plurimis aduehi narrât. Quibus ad unguenta utuntur hæc ferè sunt: Casia, cinamomû, cardamomum, nardus, nerû, balsamû, aspalathus, styrax, consecratrix, narta, costus, ligusticum, crocum, myrrha, gladiolus, iuncus, calamus, sansucum, lotus, anethû. Horum alia radices, alia cortices, alia rami, alia ligna, alia semina, alia lachrymæ, alia flores. Et quædam multis in locis proueniunt, quædâ in Asia tantû, & locis apricis, quæ scilicet superuacua maxime atq; odoratissima sunt, quippe cum in Europa nihil præter consecraticem

se craticem inueneris, quæ optima apud Illyrios exit, nō tamen parte maritima, sed mediterranea, magisq; ad septentrionē sita. Verū loci à locis differunt, ita ut producere meliorē possint. Cultus nullus ei accommodatur, nisi quod ablaqueatam soleant reficcare: radicula enim quas Thracia fert, uidelicet, quæ odoris nardo similis est, & aliæ quædā parua, exilēq; odoris gratiam habet. Atq; de odoratis hæcenus.

De succis, & quando, & quomodo fiat succatio, & radicidium, necnon lactisuccatio, & liquatio.

Caput VIII



E succis quæ superius non diximus, uidelicet si qui medici, aut alias quasdā vires sortiātur, nunc pari modo explicare conabimur, simulq; de radicibus differemus. Succorū enim nonnullos premi ex radicibus certū est, & seorsum ipsæ per se multas, atq; cōtrarias vires possident. Ad summā, de omnibus medicamentis, ceu fructu, succo, folio, radice, herba (nam herbas quoq; ex medicamētis quædā, herbarij nominant) uerba, quoad satis sit, faciemus. Radicum autē plures potentia, & ad plura sunt. Quæritur autem medicæ potissimum, ut utilissimæ: differētes, & quod non ad eadem, & quod nō in eisdem uim habeāt. In uniuersum uero & in se habent, & in fructibus, & succis, nōnullæ & in solijs: foliorum quippe vires plurimas, herbas ferē herbarij (ut dictum est) uocant. Radicū lactuosarum succatio æstate semper ferē agitur, partim ineunte, partim prouecta: sed radicidium quāquam etiā fieri per mellē tritid aliquā ex parte non negent, tamen large autumnō post arcturū faciūtari affirmant, scilicet postquam folia defluerunt, & quorū fructus utilis sit prius, quā fructum amiserint. Fieri autē lactisuccatio solet, aut ē caulibus, ut lactariæ, & lactuæ, & partim ferē maximæ: aut ē radicibus, aut ē tertio capite, ut papaueris: huic enim soli peculiare id quoq; datur. Ergo quibusdam sponte succus consistit, spissaturq; lacrymæ modo, ut in hirci spina appellata: hanc enim cedere opus nequaquam est. At plurimorum succi per incisionem manent necesse est: quorum nōnullos statim in uasa colligit, sicut lactariæ, siue lactuæ caprinæ: uocatur hoc enim etiā nomine. Atq; in totum, quibus lactis copia sit, quibus autē minus, lana eorum succus excipitur, ut lactuæ. Quorūdam non lactisuccatio, sed ueluti liquatio fieri solet, ut quæ urentes, aut torrentes, aquamq; infundentes exprimunt, atq; ita stullamentum accipiūt. Enim uero minus liquoris, idēp siccum hæc habēt. Est cæterarum quidem radicum liquamentum fructu infirmius, ac cicutæ ualidius, & obitum facile, breuiq; affert, etiam si exiguum admodum potui detur. Quin & ad alios usus efficacius idem est, thapsiæ quoq; ualidius. Reliqua autem omnia debiliora longe deprehenduntur. Succatio tot ferē modis fieri solet. Radicidij uero differētia nulla eiusmodi redditur præterquam temporis ratione, ut æstate, aut autumnō, & quod has aut illas succidi oporteat: exempli gratia: Ellebori imas, atq; tenuiores, supernā enim in caput extuberant, inuilem asserūt, & canibus dandam cum purgandum est. Et in alijs uero quibusdam differētijs tales assignant.

Quid herbarij præcipiūt secūdis, colligendiq; herbis: tum secundo præcandū deor: quidq; in præcatione absurdū atq; in sectione adiectitum, ut de cauēda aquila, quod periculū secūdis imminet.

Caput IX



Dde quæ medicamentarij & herbarij partim forsitan recte, partim quod rem suam offendent ac prædicent, adiungunt: præcipiunt enim alias uento auerso secare sicuti & alias quasdā & thapsiam, corpore oleo peruncto: nam si aduerso, corpus tumescere aiunt. Fructū quoq; caninæ sentis, statu auerso colligendum censent, alioqui periculum oculis imminere. Alias noctu accipere iubent, alias interdiu, nonnullas priusquam sol irradiet, ut quod uolucrum appellant. Et hæc quidem, hisq; similia, nō ab re dici

fortasse putaueris. Sunt enim quæ uires nocuas fortirentur, quemadmodum & ueratrū incendere, & ignis modo urere aiunt. Mox caput aggrauat, nec diu effodere illud possunt. Qua de causa priusquam fodere adorsī sint, alia comedere, & uinum subinde sorbere consueuerunt. At illa ueluti adiecitia, & ē longinquo ducta appareant: castam enim, quam alij dulcisidam uocant, noctu effodiendam præcipiunt: nam si interdiu, & à pico martio uisus quispiam sit fructum quidem legēs, oculis periclitabitur, radicem autem secans sedem procidet. Febrifugiam quoque secantes accipitrem triteltigerum nuncupatum cauere, ut sine uulnere possint discedere, & alia huiusmodi quibusdam alijs norant. Precari autem in secādo haud quicquam absurdum fortasse sit. Sed quæ addūt, absurda potius dixeris. Panacem enim æsculapicam cognominatam effodientes uarium genus frugum uicissim terræ inijcere aiunt, & placentas ueluti mercedem quandam exoluere, & ense bina adacto acie ter circumscribentes fuccidere: quodq; primum inciderint, sublime tenere: deinde alterum cedere, & eiusmodi alia complura enarrant. Mandragoram quoque ense ter circumscribere iubent: & alterum fuccidere ad occasum spectando, alterum circumsaltare, plurimaq; de re uenerea dicere, quod maledictis, & execrationibus sanè proximum est, quas fatui cumini necessarias putant. Quin & elleborum nigrum circumscribere spectando exortum, precandoq; cauereq; aquilam tam à dextra, quam à sinistra: periculum enim secantibus imminere aiunt: & si aquila propè aduolauerit, moriturum illo anno, qui succidit, augurium esse. Sed hæc planè adiecitia quædam uidentur, ut dictum est. Modus autem radicidij præter prædictos nullus alius datur.

De medicinis ellebori, panacis, tuberis terræ, cucumeris syluestris, trifaginis, caricæ siue piri, & aliorum quorundam.

Caput X



Vnt uero (uti retulimus) quorundam omnia commoda, & radix, & fructus, ut scamoniæ, & tuberis terræ, & thapsiæ, & aliorum quorundam. Nam & mādragoræ folium utile ad ulcera cum farina tradunt. Radicem ad erysipelas rasam & aceto subactam, & ad morbos podagricos, & ad somnum, atq; amores datur ex uino, aut aceto. Consecant eius quoque orbiculos sicuti radiculæ, quos transfixos in fumo suspendunt. Elleborum ad hæc eadem non solum radice, sed etiam fructu utile est. Si quidem in Anticyra (ut fertur) fructu eius purgantur, quem sesamaceum fert. Panacis quoque pleraq; assignantur commoda, nec omnia ad idem fructus, sed ad abortus, & distentiones, & eiusmodi genera dolorum, item ad aures, & uocis languorem. Radix ad partus, & mulierum profluuiā, & ad iumētorum morbos, necnon ad irinum uisum uentis utilis, addit enim suauem olentiā, sed fructus radice ualidior est. Nasctur circa Syriam, secatur per messē tritici. Tuberis terræ radix ad exhalationes inflammationum ualet, & ad menstrua, & ad ulcera ex melle: succus ad caput purgandum illitus, & ad ebrietatem, si sparsum in uino potui des. Radix etiam ad partuum celeritatem appensa benefica est, & ad amores cum eam suffoderint, uino deinde subigunt, inq; pastillos digerunt, sicuti fecis uini, qua maculæ absterguntur. Cucumeris syluestris radix utiliginem, & scabiē pecudum tollit: semen uero liquidum, medicamen elaterium uocatum, id est agitatoriū facit. Legitur autumnō, tunc enim optimum est. Trifaginis folia ad rupta & uulnera in oleo trita ualent, & ad depascētia ulcera: fructus bilem extrahit, & oculis quoq; beneficus est: folium ad albugines tritum in oleo prodest: habet hæc herba folia quercus, & statura uix palmum excedit, & odorata atq; suauis est, sed partes quidē omnes herbæ eiusdem minime ad idem utiles fore, haud quicquam absurdū fortasse appareat. Radicis uero eiusdem

eiusdem partem unam superius, alteram inferius purgare profectò mirabilis sit, ut thapsiæ, & caricæ, quam alij pirum appellant, & roris marini: idem tam inferius, quam superius extrahere posse, ceu elaterium, nequaquam absonum dixeris. Habet thapsia folium fœniculo simile, latius tamen: caulem ferulaceum: radicem candidam. Carica siue pirus folio constat rutaceo breui, caulibus ternis, aut quaternis humi prostratis: radice, qua albugum, uerum squamosa. Legitur Vere. Id igitur prædictis datur peculiare.

Elleborum nigrum, & candidum esse: deq; eius ui, & natura.

Caput XI

- 10 **L**leborus uero niger, & candidus, ueluti æquiuoce didi apparer, sed de facie uaria sententia est: alij enim similes esse aiunt, præterquam quod radices colore inter se differant: esse nanq; alterius candidam, alterius nigram: alij folium nigri laureum, candidi porraceum reddunt: radices autem similes, colore excepto. Qui similes dicunt, formam huiusmodi tradunt. Caulem modo propè albuc, sed longe breuiorem: folia continuo radice annexa, sparsaq; humi: radicem large multiplicè, quæ scilicet præter ues consent, atque utiles sint: nigrum equos, boues, fuesq; necare affirmant, & idcirco eum cauere: candido pecudes nimirum uesci. Atq; hinc primo uim deprehensam, cum illo pecudes purgaretur: tempestiuus autumnus, Vere autem in-
- 20 tempestiuus. Verum Octæ montis incolæ prope Pilæam eo tempore legunt plurimum enim, optimusq; eo provenit loco: non tamen ubique, sed parte una tantummodo Octæ, quam pyram uocant: miscetur in potione, ut uomito bene succedat elleborinæ semen: hæc herbula quædam est. Niger ubique nascitur: nam & in Bæotia, & Eubœa, & multis alijs locis: sed optimus Helicone, ac in totum is mons medicaminibus laudatur: at candidus locis paucissimis exit. Optimi uero & usitatissimi quatuor sunt, cæteus, ponticus, eleaticus, massalioticus: nasci eleaticum inter uites aiunt, & uinum usq; adeò reddere prouocans urinam, ut omnes qui bibunt graciles admodum uentre adducto efficiantur. Omnium tam eorum, quam reliquorum optimus est cæteus. Parnasius uero & ætolicus, eo quoque in loco proueniunt, & quidè multi & emunt & uendunt ignari duritatis, summæq; difficultatis eorum. Hæc igitur quanquam forma conueniant, uires tamen proprias sortiuntur. Nigrum uero ab eo qui comperit, & primo succidit, melampodium quidam appellant, quo & domos lustrant, & pecora purgât, quadam cum incantatione, atq; ad alia complura utuntur.
- 30

Panacis plura esse genera, uescicarium uero duo: deq; lactarium, & roris marini generibus, & medicinis eorum.

Caput XII

- 40 **P**anacis quoq; & lactariæ, & aliorum quorundam genus multiplex redditur. Panacem enim appellant primam, quæ in Syria nascitur, de qua paulò ante retulimus: secundam chironiam, tertiam æsculapiæam, quartam herculanam. Chironia folium habet simile rumici, florem auri specie, radicem longam. Amat loca pingui: utuntur ea aduersus uiperas & phalangias, & tineas uestium, & cætera repulsa data ex uino, & uncta oleo: uiperæ autè morsui aspergitur ex acido uino, & potui datur: ualere aiunt & ad ulcera ex uino, & oleo, & ad nascetia ex melle. Aesculapicæm radice constat magnitudine palmi, candida & crassa uehementer, cortice crasso & salso, caule geniculato undiq; folio thapsiæ simili, sed crassiori: ualere aiunt aduersus serpentes, si bibatur erasum, & ad lienem, cum sanguis circa eam cõstitit ex mulso, & capiti tritum ex oleo, & unctum, & si qua alia parte obscura laboret quis, & uentris

doloribus ex uino rafum: poffe etiam & longas ægitudines depellere. Insuper & ulcerofis humidis quidem ficcum afperfum, prælotumq; uino calido: ficcis autem ex uino fubaftum, & afperfum. Herculana uero confat folio magno, & amplo, ut quoquo uerfus tres palmos perficiat, radice craffitudine propè digiti, bifida, aut trifida, guftu fubamara, odoratu fyncerum thus redolente, utili contra morbum comitialem pota, coagulo uituli marini admifto, ad quartâ partem: & contra tormina è uino dulci: commodæ etiam ad uulnera ficca, ex melle ad madida. Igitur hæc diffierunt illas fortitür. Sunt autem uel alix quædam panaces, una folio tenui, altera non tenui, fed uires hifce ambabus eadem ad mulierum profluuiâ, & ulcera tam cetera, quàm putria, & pafcentia. Quin & ueficarias, atq; lactarias nominis tantum 10 confortes uidere licet. Veficariarum enim genera duo: alterum fonnificum radice rubra, fanguinis modo, fed candida cum ficcefcit, fructu rubriore, grano iligneo, folio lactariæ fimili, aut mâlo dulci, fed pilofio: huius corticem radicis tundentes admodum, & in uino meraculo madefacientes dant, atq; ita dormire faciunt: nafcitur rupibus, & faucibus, atq; fe pulchris. Alterum genus infanire facit, id alij bryorem uocant, alij periffum: confat radice candida, & longa ad cubitum, atq; caua. Dabitur eius radicis drachmæ pondus, fi ut quis ludat, feq; pulcherrimum putet, placuerit. At fi magis infaniat uis, drachmis duabus opus eft: fin autem nûquam infania folui malueris, tres dabis: & quatuor, fi interimêdum fit. Habet foliû erucæ proximum, 20 maius tamen: caulem longitudine ferè quatuor cubitorum: caput gethyi, fed maius, atq; pilofius: nec fructui plantani abfimile confat. Lactarium, quod maritimum granum appellant, folio eft rotundo, caule, totaq; magnitudine ad palmum, fructu candido: demetitur cum uua nigrefcere incipit, & ficcatus fructus tritus potuit datur acetabuli tertiâ parte: mafcula autem uocitata, oleæ folio confat, & magnitudine cubitum æquat: huius lac cum uindemia incipit, exprimunt, & præparato utitur: purgat inferius. Myrtaria uero cognominata candida, lactaria eft, folijs myrti condita, uerum aculeatis parte poftrema, farnetula in terram demittens longitudine palmi, quæ non fimul, fed alternatis annis fructificant, alia hoc anno, alia poftero, quanquam omnia eadem radice exorta: loca montuoſa defiderat: fructus nux appellatur, demetitur cum ordeum turgescit, & exiccatus, purgatusq; datur 30 elotus cum papaueris nigri duabus partibus, ita ut totû modo acetabuli fit. Trahit pituitam per aluum: at uero fi nucè ipſam placeat dare, trita dabitur ex uino dulci, aut cum ſefama toſta, torrefactaq; comedèda. Ergo hæc folijs, fuccis, fructibus utilia cõſtant. Roris autè marini genera duo, alterum ſterile, alterû fertile: & alterum tam fructu, quàm folio utile, alterum tantum radice: fructus canchris uocatur. Habet id fructiferum genus folium paluſtri apio fimile, fed multo maius: caulem ad magnitudinem cubiti, aut maiorem: radicem magnam, craffam, candidam, & ueluti thus redolentem, fructum candidum, ſcabrum, oblongum: nafcitur potiſſimum ſolo ſqualido, atq; faxoſo: radix medicamento ulcerum utilis, & menſibus pota in uino nigro auſtero: fructus ad urinæ ſtillidia, & aures, & argemam, & ad oculorum morbum, lippitudinem nuncupatum, & lactis ubertatem muſlieribus facit: ſterile illud folio lactucæ amaræ confat, fed ſcabriori, candidiori: radice breui: nafcitur id quoque prædicto ſolo uberrime: radix partim ſuperius, partim inferius purgat: quod enim germen uerſus cõſiſtit, ſuperius purgat: quod terram uerſus, inferius. Prohibet & uerſibus interpoſita uermiculos noxios. Colligitur per meſſem triſid.

Vernilaginum, & papaueris genera. Tum radicum differentiis unde liceat accipere. De nymphæa, scythica, & mîlo terre: quoq; Pandius statuaris mente alienatus fuit. Item de Thraciæ radicibus.

Caput XIII



- V**ernilaginum una candida, altera nigra: uires radicum inter se distant, & ipsæ radices specie differunt, candida enim crassa, & grauior olens, utilis traditur ad alui profluuiâ, cum cōfecta orbiculatim modo radicis decocta est, iūco transfixa in seriem: ualet & ad interaneorū animalia lata: cum passa uua comesa acetabuli mensura ē uino bibitur austeror: occidit & canes, & sues: canes in farina ordeacea subacta cum aqua, & oleo: sues cum brassica. Et si hominem ægrescentem experiri uoueris an uiuere possit, lauan dum ea radice triduo iubent. Hoc enim si tolerauerit, moriturū nequaquam existi mant. Nascitur aque omnibus locis, folio cardui, uerum ampliori, & terræ proximo, capite magno acano simili, unde quidam acanum eam uocant. Nigra folio constat modo cardui, præterquam quod minori, leuiori q. Tota autem herba umbraculi speciem representat, radice crassa & nigra extrinsecus, subflaua intrinsecus nititur, loca gelida, humidatq; amat. Leporam & uiridiginem trita in aceto, & ramētis illita expellit: necnon & canes occidere potest. Papaueris quoq; syluestris genera plura notantur: quoddam enim cornicularium appellatū, quoddam autē nigrum est, folio constans uerbasci nigri, sed minus nigro: caulī altitudo cubitalis, radix bre uis, per summaq; cespitum: fructus inflexi, ut cornicula figurantur: legitur circa melleis, & alium purgare potest: folium albuginem ouibus aufert: nascitur iuxta mare locis saxosis. Aliud erraticum uocatum non absimile in tubo erratice constat: quamobrem in usum uenit cibarium: nascitur in aruis, potissimum inter ordeas: flo rem rufum producit: caput unguis pollicalis magnitudine auge: legitur ante ordei messem, atq; uiridius etiam purgat inferius. Aliud herculanum nuncupatum, folio constat struthi, quo splendorem linteis tribuunt: radice in summa terræ eunte: fructu albo: huius radix purgare superius nata est. Non desunt qui contra comitalem morbum ea utitur in uino mulso. Hæc igitur ueluti æqui uoca quædā subiungere placuit. Radicū autē differentiâs, tum succis, tū odoribus accipere licet. Sūt enim aliæ acres, aliæ amaræ, aliæ dulces, & aliæ suauis olentia, aliæ grauis. Dulcis nymphææ uocata, quæ nasci in lacuslibus solet, ut in Orcomeniensi agro, & Marathone, & in Creta insula. Boeoti Madonaim hanc appellat, fructumq; mandit: gerit folia super aquam ampla: plagæ trita imposita sanguinē sistere traditur: utilis & ad difficultates intestinorū pota. Dulcis & scythica, & quidē nonnulli dulcē eam appellat: nascitur apud Mæotim: utilis ad anhelitus & ad tussim siccam, atq; in totū thoracis laborantis medicamento commoda redditur: ad hæc mederi ulceribus potest in melle: sitim quoq; extinguit, si teneat in ore. Qua de causâ, tum ea, tū equestri uocata, Scythas undecim, & duodecim dies, sitim tolerare affirmat. Mâlum terræ olfactu odoratū, gustatu uehemēter amarum est: colore nigrū: nascitur mōtibus optimum quodq; folio constat muris auriculæ simili, tamen rotundior: perutile ad caput, & reliqua ulcera, & ad serpētes, & ad somnū, & ad alia multa: ulceribus capitis adhibere præci piunt in aqua subactum, reliquis rasum in melle & oleo: contra ictus serpētum ex uino acido bibi debet, atq; inspergi morsui: ad somnū in uino nigro austero pertritū datur. Si uulua prociderit decocto abluisse iuuabit. Dulces igitur illæ, amaræ autem aliæ, & grauis aliæ gustatus. Quædā ex dulcibus mentis alienandæ uim sortiuntur, ut quæ carduo similis apud Tegeam gignit, quam cū Pandius statuarū artifex in tem plo, suo fungens officio comedisset, mente alienatus est. Quædam item mortifera deprehensæ sunt, ut quæ apud Thraciæ metalla comperiuntur, gustu faciles, iucun datq; admodū. Coloris quoq; discrimine radices large inter sese differūt: nec solum albæ, & nigræ, & flauæ, sunt etiā ceruleæ, & rubræ, ut rubiæ radix.

De quinquefolia siue quinquepetâ: necnon de rubia, fidicula: quæq; et quot annos feruntur illæse.
Elaterium medicamentorum omnium diuturnissimum. Quo modo radices deteriores fiant.

Caput XIIII



Quinquefoliæ, siue quinquepetæ (nā hoc etiā nomine appellatur) cum effoditur, rubra est, inarescens uero nigrescit atq; quadratur: habet foliū uitis, sed pusillū, & colore simile uirgineo est, & augetur, & definit cum uite: folia omnia quinq; unde & nomen: caules prætenues mitit, & crebris internodijs cōstat. Rubia folio edera, rotundiori tamen consistit: nascitur humi: caulis modo graminis: loca amat umbrosa, cit urinam, quæ de causa ad lumborū, & coxæ dolores ea utitur: nō defunt quæ forma quadā peculiari spectentur, ut nepæ uocatæ radix atq; fidicula: altera enim speciem scorpionis repræsentat, & utilis ad eius ictum, & ad alia quædā habet: fidiculæ uero hirsuta, & acetabulis cauernosa, ceu polyporū cinni purgare inferius apta est: ubi quis eā contigit, polypum innasci affirmant: foliū filicis magnæ proximū est: nascitur in petris. Publica uero radicū omniū, quod aliæ plus, aliæ minus tēporis durēt. Elleborus enī uel annis triginta utilis est. Mālum terræ, quinq; aut sex. Vermilago nigra quadraginta. Fel terræ decē uel duodecim: pinguis hæc, spissāq; admodū est. Peucedanum quinq; aut sex. Vitis syluestris anno, si in umbra, & sine ictu referuet, alioquin putrescit, & inanis, fungosāq; redditur. Et alijs alia tēpora tribuitur. Sed omniū medicamentorū diuturnissimū elateriū est, opportunūq; quod uetustissimū. Itaq; medicus quidā, uir haud insolēs neq; mēdax, elaterium ducentorū annorū uirtute mirabili seruare apud se retulit: eo ā quodam munere donatus. Causa quamobrē tam longo seruari tēpore possit, humoris copia est, ea de causa uel cum præciderint in cinere humidū ponit, & tamen ne ita quidē sicari potest, sed usq; quinquagesimum annū lucernis admodū lumen extinguit. Hæc igitur uis peculiaris isti tribuitur. Radices autē quæ aliquā dulcedinē habēt, ubi diu manserūt, uermiculis erodūtur: quæ uero acerbæ, acres ue sunt, id nō sentiūt: uerū rarefactæ, exinanitæq; uiribus, tandē hebetātur. E bestioliis externis nulla radicem aliquā tangit excepta sphondilæ, quæ nullā intellā relinquit. Hoc ergo naturæ animalis istius propriū deputandum sit. Radicem autē unamquāq; fore deteriore, si fructū perfici, crassescereq; reliqueris, manifestū est: quod idem uel de fructu asserere licet, si radicis succū detraxeris. Sed magna tamen ex parte radicis medicæ succus nunq; extrahit. Cuius uero semen usum medicaminis præstat, huius succum accipi operæ precii est. Vti radicibus potius iubent, quoniam fructus fortior sit, q̃ ut corpus ualeat tolerare: sed hoc in uniuersum haudquaquam uerū esse apparet. Anticyrenses enim fructum sesamacei ellebori dare solent, qui sesamæ similis est.

Quæ loca medicamentis fertilia sint, ut Etruria, & latius ager, ubi Circe. Item cernima Homeri quibus ostendit Aegypti uenenorū feracem. Quæ loca Græciæ medicis scateat herbis maxime omniū consistit. Quādo lac sorbere utile. Tum de moly, cicuta, hircispina, pestinaca. Caput XV



Tractus medicamentorū fertiles potissimo tradūt, extra Græciā, Etruriam, & latinum agrum, quæ Circe habitasse affirmāt: atq; etiā magis Aegyptum autore Homero: hic enim Helenā inde accepisse inquit: Prospera quæ quondam Thonis dulcissima coniux, Aegypti Polydamna dedit, qua plurima gignit,

Noxiā terra ferax, & multa probata uenena.

Inter quæ uel illud medicamen lucius, & meroris esse autumnat, omniū ita ut malorum obliuionem, atq; indolentiā facere possit: & hi quidē tractus proditi ā potius ferē solis uidētur. Aeschylus enim in elegis, copiam medicaminum, uenenorūq; Etruriæ tribuit. Gens Tyrrhena suis clara ueneficijs. Quæq; autē loca nō nihil medicaminum possidere uidētur, sed differunt, quod alia plus habēt, alia minus: etenim quæ

quæ ad septentrionē, meridiem, exortumq̃ pertinet, mirabiles vires fortissimæ: nam in Aethiopia, quæ sagittas ungūt, radix mortifera est. Apud autē Scythas nō solum ea radix, sed etā aliæ plures comperiuntur, quarum aliæ cōfestum eo interimunt tempore, quo gustatæ sint, aliæ possūt. Et harum aliæ celerius, aliæ tardius, ita ut nōnullos tæbe quadam paulatina possint cōsumere. Apud Indos uel alia plura proueniūt genera: sed superuacuum, si uere narratur, quod sanguinē diffundere, & quasi sugare potest, quodq̃ ē diuerso eundē colligit & ad se trahit, quæ cōtra mortiferos serpentium morsus cōperta referūt. Quin & regio Thracum pleraq̃ fert, sed ualidissimam serē illam herbā, quæ sanguinē sūbit: hanc enim alij puncta uena, alij etā uehementius secta retinere, ac penitus prohibere sanguinis profusione affirmāt. Hæc igitur quod cōmune omnium diximus, satis demonstrare uidetur. Locorum autē omnium Græciæ, maxime Pelium mons Thessaliæ, & Telethrium mons Eubœæ, & Parnassus medicamina serūt, item Arcadia & Laconia tellus, nam eas quoq̃ herbis scatere medicis cōstat. Et quidē Arcades pro medicamēto quod aluum purget, fac sobbere consueuerūt in Vere, cum succi huiusmodi foliorū maxime uigent. Tunc enim potissimo lacum medicaminis habet. Bibunt bubulū, quod bos inter animalia omnia permulta pascere, uarioq̃ herbarū genere uesci uidetur. Nascitur apud eos uterq̃ elleborus, uidelicet & albus, & niger: item pastinaca specie lauri, colore croci, & eam, quam illi brasacum syluestre appellāt, medici autē quidam ceran: & quam illi maluam syluestre uocant, medici hibiscum: & mālum terræ, & seseli, & equapiū, & peucedanum, & herculana, & utrunq̃ uesicariæ genus, quod fructū puniceū fert, & quod nigrū oritur: & syluestris cucumis, ex quo componi elateriū solet. Ad hæc lactaria ex qua hippophæes, quod optimum confici apud Tegeam nouimus, maximeq̃ haberi in precio. Nascitur circa Clitoriā panacea, & petræa circa Psophidem plurima, & optima prouenit. Moly apud Pheneum exit, atq̃ apud Cyllenam esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmāt: radice rotunda, nō ab simili cepæ: folio scillæ: usum eius contra ueneficia summa, nō tamen effodi difficulter, ut ait Homerus. Cicuta optima circa Susam, & in totum locis prægelidis. Quin & in Laconico agro bona pars prædictorū exit: nam is quoq̃ medicaminibus scatet. Hircispina lar-
ge in Arcadia nascitur, nec deterior Cretica existimatur, sed etā uisu pulchrior. Et
pastinaca in Patrensi agro præstantior cæteris: huic uis calefactoria est, radix nigra. Necnon & in Parnaso multa ex his proueniūt, & in Telethrio monte. Sed hæc pluribus locis dantur communia.

Dictamnus Cretæ propriū, uiq̃ mirabile, & ad plura utile: omnia etā quæ se minus à terra attollūt præstantiora esse, quæ Creta ferat: ubi optimū aconitum, & quo modo cōficiatur ad nocendum, nullumq̃ contra compertum remedium.

Caput XVI



Dictamnus Cretæ insulæ propriū est, ui mirabile, & ad plura perutile. Sed ad partus mulierū potissimū pollet: folio glechoni simile constat, nec sapore ab simile est: ramulis tenuioribus cōditur: usus foliorū, non ramorum, nec fructus est: ualent ad multa, sed præcipue ad difficiles partus mulierū, ut dictum est. Aut enim facile posse parere faciūt, aut certe dolores penitus sedant. Dantur bibēda ex aqua. Rara hæc herba, locus enim qui fert, exiguus admodū est, eumq̃ capræ depascūt capessendæ causâ uoluptatis. Verum etā quod de telis fertur, affirmant. Capras enim sagitta transfixas, dictamo deuorato telū ejicere. Dictamū tale est, uiresq̃ eiusmodi possidet. Falsum dictamū, folio quidē simile cōstat, sed ramulis minus, & uiribus longe inferius. Quancū enim eisde in rebus profuit, tamen multo deterius atq̃ debilius. Vis dictami in ore percipi continuo potest: ex calefcit enī ex paulo uehemēter: manipulos in ferula, aut canna intercludere solēt, ne expiret: imbecillius enim eū expirauerit. Nō desunt qui naturam dictami & falsi dictami, eandē esse existimēt. Sed quod locis lætioribus exeat

degenerare, falsumq; cognominari, sicuti etiā alijs pluribus euenit, ut uiribus deterioribus ex loco reddatur. Dictamū enim solū asperū uehementer amare inquit. Est etiā aliud dictamū ueluti æquiuoce appellatū, nec enim speciem nec uim habet eandem, quippe qd folio simili lilymbrio cōstet, & ramis cōdatur maioribus. Vnus item & uis nō eisde conueniūt. Hoc igitur (ut dictum est) mirum, simulq; propriū Cretæ insulæ datur. Quidā omnino in herbarum & fruticum genere, & ad summa inter omnia quæ se à terra minus attollunt, præstantiora, quæ Creta ferat, affirmāt. Inter reliqua uero magna quidē ex parte quæ in Parnaso monte proueniūt, anteponiūt. Aconitum nascitur in Creta atq; Zacyntho, sed plurimū, optimūq; in Heraclia Pontica: cōstat id folio intubaceo, radice tum specie tum colore nucis proxima: uim illā mortiferā in hac esse, foliū & fructū nihil nocere affirmāt. fructus herbæ est, non humilis materiæ: herba ea brevis est, & nihil superuacui habēs, sed frumētō similis: semen nō spicuum: nascitur ubiq; & non in Aconis solum, à quibus habet appellationem (is autē uicus est Perandinorū) amat autē loca potissimū saxosa: pascitur eo neq; pecus, neq; ullū animal: confici ad efficiendū modo quoddā enarrāt, nec nosse queng; quamobrem medicos quoniā cōponere nesciūt, pro putrefactorio uti, alijsq; quibusdā de causis epotū nihil penitus posse officere, neq; ex uino, neq; ex mulso. Cōponi autē ita ferūt, ut certis occidere tēporibus possit, uidelicet bimestrī, trimestrī, semestrī, anno cōpleto, nonnullū etiā biennio: pessime illos de uita discedere uolūt, qui plurimū temporis resistere possint: paulatim enim tabescat corpus, & languore pereat diuturno esse necesse: facillime illos, qui cōsestim obeūt. Remediū nuscē esse comperit, sed falso dici quoddā aliud resistēs illi haberi. Non enim herba, sed melle & mero, & quibusdā eiusmodi seruari aliquos potuisse: atq; id raro factum, summaq; difficultate. Aliud quoq; uenenū uim diurnariam enecādi sortiens cōpertum affirmāt: esse nanq; radiculam quandā, quæ eodē die possit occidere: foliū hanc habere ellebori, notamq; omnibus esse, & quidē famulos iratos hac uti solere, deinde mederi in hoc ueniēs, neq; enim celcrē facere interitum, aut leuem, sed difficilē & tardum, nisi fortē quod facile curatu, cōfectūq; sit, ut oportet: atunt igitur, & cōsestim interimī, & aliquo post tēpore: nōnullos & ad annū peruenire, & cū sumitur, facile iuuari: hæc autē diligitius seruari apud Tyrrhenos in Heraclæa, neq; id absurdum si modo quoddā iuuari possit, alio autē minime: quæadmodū & alia ex letalibus. Aconitum uero (ut dictū est) inutile ijs qui præparare ignotēt, nec licitū possidere, sed capitalē poenam institutā. Temporis differentiā pro collectus ratione sequi autumant, mortes collectuū temporibus compares euenire.

Thrasym Mantinensem quoddā comperisse uenenū, quo sine dolore in ferre obitū posset: quodq; Alexias eius discipulus fuerit nō indoctor. Item quo modo Chij cicuta præparent, ut celcrer cecet.

Caput XVII



Thrasym Mantinensis tale se comperisse aiebat, ut facile & absq; ullo dolore in ferre obitū posset. Nec alio quā succo cicutæ, & papaueris, & aliorū eiusmodi. Idq; admodum contractum, exiguumq; uidelicet ad drachmæ pōdus, & irremediabile penitus, & tam ualidū, ut quantumuis temporis perdurare posset, nec quicq; sentiret immutationis. Sed sumendā is cicutā censebat nō unde libuerit, sed ex Susis, & si qua alia loca prægelida, & opaca constāt. Nec secus de reliqs quæ debeāt addi, cēsebat. Quin & alia multa, & ex multis is componēda excogitauit. Alexias quoq; eius discipulus ingenij plurimū ualuit acrimonia, nec infra illū bonis artibus fuit instructus: nam & reliquas medicinæ partes, quas ille nō tenuit, is egregie cōsecutus est. Hæc igitur comperita hoc nostræ ætatis tēpore amplius, quā superiori & præco uidētur. Sedenim uti hoc, an illo modo, plurimum referre omnibus manifestū profectō ex multis est. Nam & Chij nō in hūc modū ante cicuta utebant, sed trita, ut scilicet uti cæteri solebant,

bant. At nunc terere nemo uelit, sed detractō tegmine (id enim rem difficile facit, quoniam confici cōtumax sit) pistam subinde in mortario tundūt, & prætenu cribro transmissam aqua inspersam bibūt, atq; ira obitus celer, facilisq; occurrit.

Consuetudine uenēnō uires fieri debiliores & inertes, atq; ita quibusdā non nocere potuisse elleborum. Quo remedio usus fuerit Eudemus post uiginti duas potiones ellebori: deq; mira in pumicis, ac quantum ualeat cōsuetudo, quod & absinthii depasum ostēdit. Caput XVIII



Mnium uero medicaminum uires debiliores in assuetis porrō deprehendūtur, in nōnullis etiā omnino inertes. Quidā enim tantū ellebori esitantes, ut manipulos totos cōsumant, nihil afficiūtur. Quod etiam Thrasyas sapius fecit, qui radicū peritissimū habitus est. Faciūt hoc idem pastores nonnulli. Itaq; cum ad medicaminū uenditorē, de quo admiratio omnes teneret, quod radicē unā aut duas mādere posset, pastor quidā uenisset, absumpsissetq; iniegrū manipulū, fecit ut nunq; amplius ille pharmacopola laudaret. Idq; singulis diebus, non tantū illū, sed etiā alios plerōq; facere dicebatur: sit enim, ut plerāq; ex medicamētis, propter hominis cōsuetudinē, uim suā amittāt, nec amplius medicamina esse possint. Cū enim ab natura acceptātur, deuincūtur, cōficiunt, nō amplius poni inter medicamina debēt, ut & Thrasyas dicere solebat. Natū as enim singulari ille discernēs, idem alijs medicamen, alijs nō medicamen esse aiebat. Enim uero rationē haberi penitus oportere putabat. Et quidē plurimū ad id iudicādū uir ille ualebat. Verū unā cum natura etiā cōsuetudinē posse aliquid efficere cōstat. Quamobrem Eudemus medicamētarius hac in arte facile princeps, cum se nihil affectū iri pepigisset, quiddā admodū mediosore ante solis occasum deuorauit, quod neq; cōtinere, neq; deuincere potuit. At uero Chius Eudemus arte minime laudatus elleborū bibēs, nō purgabatur, & uiginti duas aliquādo potiones uno die sumpsisse se retulit, fori apud uala fedētem, nec surrexisse priusq; esset meridies, tunc uero domo petita, balneas ingressum, cōnatūq; more solito, nec quicq; euomuisse. Hic tamen auxilio quodā pręparato cohibuit: aceto enim acri aspersam pumicem bibisse se retulit post septimā ellebori potione, rursusq; ex mero eodem modo egisse. Pumicis autē uim magnā adeo esse, ut si in urcū bullientē eam inieceris, seruo rē extinguis non solū parte aliqua tēporis, sed etiā ex toto: pumicem enim exiccare uehementissime, atq; ad se spumā totā recipere uoluit, idq; extinguedi causam esse. Hic ergo largitatē potus, talē retinere iuamine potuit. Quod autē consuetudo plurimū ualeat, multis sanē rationibus constat. Nam & absinthii pecora huius tractus pascere quidam negant. Pontica autē nimirū pascunt, ut pingtiora atq; pulchriora reddātur, & ut quidā uolūt, sine felle. Sed hac nō ad pręsentē disputātiōnē, sed ad aliā quandam spectare potius iudico. Radices uero & uniuersum genus materię humilis, permultis ac uarijs uiribus (ut dictū est) natura condiderat, nec solum ad corpora inanimata, sed & ad animata.

De spina que aquā congelet iniecta: deq; hibisco & telyphono, & uiciu. Item de testiculo, & quibus herbis magis coire quis ualeat, quibus nil penitus: necnon que ad marem procreandū, que ad feminā ualere tradantur, atq; ideo alterā mariscam, feminiscam alterā appellatam. Quo item semen prolificū, quo infecundū reddatur: tum de herbis uolucro & mula. Caput XIX



Pinam enim quandā enarrāt, quę aquam iniecta cōgelet. Et radicem hibisci posse addensare aiūt, si tritam inieceris, sub diuoq; humorē posueris. Constat hibiscum folio maluar, maiori tamen, pilosioriq; caule molli: flore mellino: fructu maluar, caulibus proxima. Vsus eius ad rupta, & tussis ē uino dulci, & ad ulcera in oleo. Aliam si carnibus concoquas in idē aggregare, ac ueluti conglutinare posse affirmāt, aliās uim attractoriā possidere, modo magnetis lapidis atq; succini. Hęc in inanimibus. Thelyphonū ue-

ro, quod alij scorpionē appellant, quia radicē scorpioni similē habet, ad motum scorpionem occidere tradūt, & eum reuiuiscere posse, si elleboro cādido linatur. Enecat idem & boues, & oues, & iumēta, & ad summā omnes quadripedes. Eodem die, si genitalibus uel radícula imponatur, proficit potū contra scorpionum ictus: habet folium tuberis terrae: radicem (ut dictū est) similem scorpioni: nascitur graminis modo, & geniculis cōstat: loca amat umbrosa. Quod si uera sint, quae de scorpione narrantur, iam & reliqua eiusmodi haudquaquē incredibilia dici debeant: nec fabulosa quae attribuntur plantarum uiribus brute componi uideātur. Humanis uero corporibus ultra illa, quae sanitatem, morbos, mortemq; spectant, alia quoque herbas asserre suis uiribus posse asserunt, ut puta, generandi seminis facultatem atq; sterilitatem: & quāsdā ex eodē facere utrūq; ualere, sicut qui testiculus appellatus est. Cum enim gemini sint, alter magnus, alter autē paruus, magnū efficacē ad coitum datum ē lacte caprino tradūt, minorem uero obesse ac inhibere: habet folium laseris, uerum leuius atq; minus: caulem similimū spinā, quam pīrum uocant: mirum ergo (ut dictum est) ab una eademq; natura, diuersitatem tantū uirtum proficisci. Quaedam ad procreandū esse duplicem, absurdum putari minime debet. Tum enim alij quidam, tum Aristophilus pharmacopola plataicus, uires quāsdā compertas se habere dicebat, partim ut quis magis coire ualeat, partim ut nihil penitus ualeat. Id quoque prorogare plus, minus uel temporis posse, ceu bimenſe, aut trimenſe, quāquidē herba uel ad temperandos, castigandosq; adulescentes aliquādo uti aiebat. Quaedam ad procreandū marem, aut foeminā ualere traduntur: quā mobrem herbam quādam marificam, & aliam foeminificam uocant, ambae inter se similes, & oculi mi speciem gerētes: fructus foeminificae modo musci oleaginei, uerum pallidior: marificae uero, sicut oliua cum primum ex musco emergit, geminus, modo testiculi hominis. Ne semen foeticum sit, fructū ederae candidae facere aiunt: contrā ut prolifiscum sit, fructū cratei ex aqua notāt: nascitur id lini modo rufum, & fructum tantū milium fert. Gignere nequaquē posse putatur, & qui semen uolucris collectū modo sextarii triginta assidue diebus portionibus aequis biberit ex uino albo. Sic enim penitus sterile fecit hominē aiunt. Foliū herbae mulae uocatae sterilitatē mulieribus facere uolunt, & aliquid ungulae, ac seminis muli animalis miscendū praecipiunt: constat haec folio linguae ceruiniae appellare, radice numerosa & tenui, montanas planticies, & saxosas amat: mulas hac herba plurimum delectari affirmāt. Vfus eius uel ad lienes, quemadmodum uolucris.

De filice foemina, et quid distet à mascula. De herba ab indo quodam allata, quae, qui usi fuerint, septuagies coire ualeant: tam quae aquae sterilitatem, quae fecunditatem afferant, insensiam uel: de quā mira natura uini regionum quarundam.

Caput XX



Filix foemina utilis cōtra interaneorum animalia lata melle subacta: & cōtra tenuia in uino dulci cum farina ordeacea data: si mulieribus grauidis detur, abortum facere: si ceteris, steriles in totum reddere aiunt. Differt foemina filix à mascula, quod foliū unico artu porrectum haec habeat, & radicem crassam, & lōgam, & nigram. Harum igitur uires sterilitati addixisse natura putatur. Ad rem autē ueneream mirum in modū pollebat, quam Indus attrulerat. Non enim solum edentibus, sed etiam tangētibz tantū genitalibus uim dixere uehementem adeo fieri, ut quoties uellent coire ualerent. Et quidem qui usi fuerūt, duodecies egisse dixerunt. Indum autē ipsum, qui uel magno, atq; robusto corpore erat, septuagesies aliquando coiuisset fatentē licuit audire: uerū emissionem seminis guttatim fuisse, demumq; in sanguinē deuenisse. Mulieris uero uehementer etiā citari libidinē, cum eo medicamine usae fuerint, dicebatur. Haec igitur uis, si uere narraui, mirifice omnes excedit naturas: tamen quādam consistare quae citationes ad coitum facerēt, haudquaquē inepte putaueris. Nam & in alimentis

aliments ipsius tam siccis q̃ humidis vires eiusmodi, atq̃ etiam altarum plerarunq̃ affectionū efficaces manifeste sentimus. Aquam enim nonnisi q̃ esse, quæ prolem mulieribus largiatur, affirmant: ut apud Thespias. Contrā aliam apud Pyram esse, quæ sterilitatem eidem inferre possit. Causam enim sterilitatis mulierum loci illius talem medici reddiderunt. Apud Heracliam Arcadæ, uinum, ut ferunt, fit, quod potū uiros insanos agit, mulieres steriles reddit. Achaia apud Cabyriam maxime, uitis quoddam genus habetur, cuius uinū abortum facit. Et ubi canes uuam comederint, eas quoq̃ abortu periclitari necesse est. In gustu nec uua sensum aliū, q̃ cætera uuae facit, nec uinum à cæteris uinis distare percipitur. In Troezenensi agro uinum steriles, qui biberint, facit: apud Thasum uinū somnificū arte quadā cōficiunt, & aliud quod potū uigilantissimos facit. Sed eiusmodi vires ad corpus spectare, inq̃ generibus corporeis percipi manifestum est.

De herbis quæ ad animum, & mores faciunt, ut uescicaria, anethera, polio, antirrhizo, flore aureo: quodq̃ homines hæc commenti fuerint, suas artes magnificare & celebrare cupientes.

Caput XXI



Nimo uero uescicariam adnotant. Hanc enim uelut dimouere, alienareq̃ mentem affirmant, ut superius comprehensum est. Contrā radix cenothere data ē uino, mētiore, hilarioresq̃ mores reddit. Constat cenothere folio amygdalæ, uerum maior: flore rosaceo: loca adamat montuosa. Id tamen absurdum nequa q̃ appareat: sit enim quasi res creatio quadam ex uiribus, quas radix ista uinaceas possidet: sed potius absurda illa putentur, quæ alligata, & ueneficiorū aduersantia uocitatur, & tū corporibus, tum domibus unice opulari creditur. Adde polium, quod Hesiodo & Musæo auctoribus ad omnē rem seriam, magniq̃ faciendā perutile prædicatur. Quamobrē id noctu effodiūt tabernaculo structo, & ad famam, existimationemq̃ bonā nō minus, quinimō magis ualere putatū est. Necnon & antirrhizum appellatū uilem ad gloriam tradidere: hic lappæ similis est, radice minima, & ferē nulla subnititur: fructum tanquam nares uiculi parit. Hoc perunctos gratiā, uitæq̃ gloriā consequi creditur. Quinetiā qui aureliæ flore coronatur, unguento ex auro ignis experie inperfo, gloriam atq̃ existimationē bonā consequitur. Habet aurelia florē auro similem, folium candidū, fructū tenuem, durumq̃: radicē per summa celsipiti, atq̃ tenuē. Vitis eius ad serpentū morsus ē uino. Valet etiā ad ambusta, cremata, & mista mellī. Sed hæc (ut superius dictū est) commenta hominū esse planē uidetur, qui suas artes magnū care, celebrareq̃ cuperent. Nos reliquorū naturas, viresq̃ persequemur.

De pipere & eius generibus, & grano gnidio, pastinaca, uite syluestri, dracunculo, thapsia, sic dicula, ebano, malo terra, scammonia, filice: tum quæ quibus locis præstantiora medicamenta.

Caput XXII



Super fructus est: eius genera duo: unum enim rotundum, erui modo, tegmine, carneq̃ constans, sicut laurina bacca, subruitiū: iterū oblongum, nigrū, semina papaueris continēs: longe hoc ualidius altero: ambo uim calefactoriā obtinent: quamobrem contra cicutam auxiliatur, & etiam thus. Granum enidii rotundum, colore rubrum, maiusq̃ pipere est: sed caliditate multo ualidius. Qua de causa cum deuorādum datur (dari enim cōtra alui solutionē solet) in pane, aut adipe obductū sumitur: aliter enim guttam adurit. Peucedani quoq̃ radix uim calefactoriā habet: quamobrē unguentum quidā uel ex ea sudatoriū faciūt. Datur & ad lienes radix peucedani: semen inutile est, nec succus ulla in re prodest. Pastinacam agro Spartensi Achaia laudatissimam referūt: natura calefactoriā, radice nigram. Radix quoq̃ uitis syluestris, calefactoria acrisq̃ est: quamobrem ad psiloturi usum idonea, & uitia cutis in facie emūdat: fru-

citu eius defoliare arbores solent: succiditur omni tempore, sed præcipue autumnō.
 Dracūculi radix data ex melle, utilis quæ tussis sanare possit: caulem uersicolore
 serpētis speciem præsentantē gerit. Eius semine nulla in re uti solēt. Thapsiæ radix
 uomitoria est, & si quis continuit tam superius quā inferius purgat. Ad hæc liuida tol
 lere potest. Suppurationes tamen alias exalbidas facit: succus eius ualidior est, &
 quidē tam superius quā inferius purgat. Nullus seminis usus: nascitur tum alibi, tum
 in terra Attica: in qua pecudes incolæ eam nō tangunt, peregrinæ uero depascunt:
 & aut alius soluitur, aut intereunt. Fidicula semper post imbres erumpit, & semen
 nullum producit. Ebeni lignum aspectu buxo simile constat: sed decorticatum ni
 gerrimum redditur. Vile oculis ad corem tritum. Mālum terræ crassum, & gustatu
 amarum est. Nigrum, odoratumque, folio rotundo: quod super terrā spectetur, non
 multum est. Nascitur potissimum montibus, idque pro optimo effoditur. Vsum eius
 ad multa enumerant: sed optimum ad capitis ruptiones, & ad reliqua tamen ulcera
 satis uale: & contra serpentum morsus, & ad somnum, & ad secundas modo pesti
 partim aqua subacta & illito, partim in melle, oleoque derafum: sed contra serpentes
 ē uino aclescente potio, & morso insperfo. Ad somnum uero in uino nigro austero
 attrito. At si uulnæ prociderint, ex aqua colluere conueniet. Id igitur numerofo re
 ferre usu uidetur. At scammonia ueluti ē cōtrario succus tantū usui est, & nil aliud.
 Filicis radix colliquata tantum in usum euenit: gustum astringit non sine aliqua dul
 cedine, lumbricum latū expellit: semen filici nullum est, nec succum quem emittat, 20
 hæc habet: autumnō succidi tempestiue affirmāt. Lumbricum autē gentium non
 nullis natura inesse percipitur. Habent enim omni quasi ex parte Aegyptij, Ara
 bes, Armenij, Syri, Cilices: ē diuerso Thracibus & Phrygibus nullo pacto enasci
 enarrāt. Inter Græcos Thebanis, scilicet uersari in gymnasijs solitis. Et ad summam
 Bœotiens in nati lumbricum nouimus: Atheniensibus nullo pacto. Omnium uero
 medicamentorum, quoad simplicius explicari liceat, præstantiora, quæ locis gelidis,
 a quilonijs, siccisque proueniūt. Quamobrē inter ea quæ in Eubœa oriūtur, meliora
 quæ serant Aegæ: deteriora, quæ Telethrium reddat, asseuerant: sunt etenim illa
 sicciora. Telethrium autem locum esse opacum atque subriguum, certum est. 30

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI
NONI FINIS.

THEOPHRASTI DE HISTORIA

PLANTARVM LIBER DECIMVS.



DE radicibus quæ medicæ sint, quasque uirtutes uel in se, uel in
 succis, uel etiā aliqua parte habeāt: & in totū, si quid ē fructibus,
 aut herbis uires eiusmodi fortūtur, explicandum hoc uolumine
 arbitramur: nec differentias omittendum, quibus liquores atque 40
 odores discerni desiderant. Radicum uires permultas, multisque
 uisibus accommodandas, naturam dedisse, facile intelligi potest.
 Sed quæ maxime uim medēdi obtineāt, has utputa utilissimas
 hominum conquiri ingenij. Differūt istæ (ut uolumine superiori retulimus) quod
 nō ad eadē, nec in eisdē suas uires possideāt. Radices ergo plurimas penē uires in se
 & in fructibus, & in succis gestare uidemus. Sed non desunt quæ in folijs quoque ha
 beat: & quidē folijs insitas uires, herbas magna ex parte uocare herbarij solēt.

Pauca hæc in libro decimo transtulit Theodorus,
 nec plura etiam apud Græcos extant.

Ex suo semine plantas omnes prodiere: curq; agricolæ aliquando semine non utantur. Item esse, quæ
 et semine, et sponte, ut in animalibus, procreantur.

Caput 1



PLANTARVM complures esse generationes, & quor,
 & quæ sint, inter historias antea exposuimus. Sed cum
 nō omnes omnibus conueniant, apte profectō ageatur,
 si nunc, quæ quibuscq; tribui debeant, quasq; ob causas,
 explanemus. Ergo generatio quæ semine administrat̃
 tur, communis omnium plantarum semen producens
 tum est: omnes etenim illæ creari semine queūt: quod
 ita fieri, & sensu exploratum certe habemus, & ratione
 fortassis necessarium. Natura enim cum nihil frustra
 agere solita est, tum uel maxime in ijs quæ prima, po-

tissimaq; cōsistunt, finis rationem inspectat. Primum autem, & potissimum semen
 est: igitur semen nisi generare queat, frustra sit, necesse est. Siquidem semper gene-
 rationis causa semen proueniat, atq; ad id officiū natum penitus sit: quod uel ex cæ-

teris quoq; omnibus haud dubie intelligi licet. Sed quod in plerisq; agricolæ semine
 uti non consueuerint, quia scilicet sponte celerius prodeunt, adulescuntq;: uel quia
 non facile in quibusdam tam arboribus, quàm herbis semen accipi possit: idcirco
 nōnulli semine creari omnia posse negarūt, quanq; id in ficis (ut inter historias dictū
 est) latissime pateat. Sed sit certe illorū germinatio aliter, nisi quid ex ijs quæ sponte
 proueniunt & alimentia confluuo, aut putredine, uel potius immutatione naturali
 creatū extiterit. Constat igitur generationē, quæ semine agatur, plantarū omnium
 esse communem. Sin autem pleræq; non desint, quæ modo utroq; uidelicet & se-
 mine, & sponte ualeāt procreari, absurdū id haudquaquam putari oportet: quan-

doquidem & uitalia quadam tam ex coitu uenereō, q̃ ex terra creatur. Itaq; sit,
 ut generationes pro singulorum propria natura sequantur. Quæ enim sicca, sim-
 plicia, minusq; plantigera extant, hæc (ut ita loquar) nullum ferendi genus admit-
 tunt: neq; enim auulsionis, neq; ramī. Auulsionis inquam, quoniam quæ simplicia
 exeunt, carēt eo quod auellere possis. Rami uero & surculi, quia sint siccissima, sem-
 per enim quod germinaturū est, aliquem humore habere ingenitum, eūdemq; ser-
 uare posse oportet. Quod quidem à natura siccis negatum penitus est. Hæc enim
 ubi dempta ex arbore sint, quamprimū dissolantur, euaporaturq;, simul omnem ca-
 lorem sibi innatū amittūt. Hæc ob eiusmodi causas nequeunt germinare, cætera ni-
 mirum queunt, utpote quæ media quadā temperie caloris, humorisq; consistent, ua-
 leantq; humorem, caloremq; sibi insitum diutius cōseruare. Quapropter nō modo
 auulsione, uerumetiā summis ramulis pleræq; pullulare facile queūt, ut ficus, uitis:
 & inter steriles, & aquarum præauidas salix, sambucus, populus. Igitur in uniuersū
 sum, ac formula subsignandi hunc in modum ea determinasse abunde sit.

Palma quibus modis nasci possit.

Caput 11



AETERUM inter sicca, simplicia, & nepotum exortia, palma sola, præ-
 ter seminis ortū, alia quoq; proueniendi genera patitur. Virgas enim
 tenerrimas babylonios uiuiradices efficere, adultasq; transferre acce-
 cepimus. Quin & Græciæ si quis ramos superne decisos ferat, radix
 demittitur: & germen nō solum cerebro enasci, uerumetiā subtus ra-
 dicari largius asserūt. Item si trūcus inuersus deponatur, sitq; solū humectū, multis

partibus radices demitti, & germina dari exploratū habemus. Id tamen ampliore magnitudinem capere nequit. At pino, & abieti, & cuius generis eiusdē, nihil tale contingere posse notatum est: neq; cupressō, praterq; si usquam genus aliquod sit, quod ab imis plātigerum exurgat, ut in Creta insula circa Dryitas uocatos esse assir mant. Illic enim sic fieri posse ratio est, quod cetera quoq; proles, dūmodo radice alī qua cōsibretur, humoremq; habeat, germinare facile potest. Nam si radicē nullam obtineat difficile, uel potius impossibile est. Sed hoc per suppositionē sit dictum. Palma autem uirgis utiq; procreari potest, frugalitate humi, habilitateq; ad celeris germinandū: terram uero uirgæ petūtur, quia tales humidissimæ sunt. Sed ex cerebro potius, q̄ imis partibus germen prodire ratio est: hinc enim & uirgarū exortus, 10 & omnino uelut principiū quoddā uitale hoc est. Qua de causa cerebro exempto, aut morbo aliquo laborāte, mox palma emoritur. Nam & nepotum illa procreatio non nisi cerebri copia fieri assolet, dempto etenim cerebro exarescit, ut ratio est. Si quidem & cum palma integerrima stat, & radicibus plene adhæret: hoc idem eueniat, cerebro sublato, necesse sit. Ortus autē undiq; propterea sequi, quia humor, calorq; naturalis ubiq; aliquandiu ualeat permanere: scilicet ea de causa, quod ob densitatē meatuum materies hæc exiccari haud facile potest. Vnde sit, ut exhalatu difficilis quoq; cōsistat. Palma his de causis multisario prouētū notatur. Ex reliquis autē quæ simplici corpore ueniūt, nihil diuersis prouenire modis asseritur, quia nulum natura huiusmodi est.

Cur quæ auulsione, siccitate, radice proueniūt, ligno & ramo prægradi nō possint: & cur contrā.

Capit. III



Væ autē pluribus exēit modis, differentia in his quoq; ipsis habere la te uidētur. Non enim quod auulsione, & radice, & ramulo prouenit, ligno etiam, prægrandiq; ramo exurgere potest, ut uitis & ficus: neq; quod contrā his ipsis proueniat, ramulis etiā potest, ceu olea. Causa uero quāmobrem sic in ambobus fieri generibus solet, una & eadē reddi potest. Vitis enim & fici, & reliquorū generis eiusdē partes mediæ, sicca, lignosaq; sunt. Nonnullorum etiā asperæ, quæ quidē difficile germinare admodum possunt. Contrā facile, quæ summa, teneræ, humectaq; sunt, ceu palmes & crada. Et salicis 30 uero, cæterorumq; paries nō secus se habent. At oleæ cōtinue ramī prægrādes humore nō uacāt, scilicet pinguedinis, spissitatisq; causa: & exiccato proinde difficiles sunt. Extrema uero eiusdē sicca ex tenuitate, nec ad edurandū ualida superextant. Pari modo de piro, amygdala, mælo, lauro, reliquisq; asserere licet. Harū enim extrema pullulare ob eandē causam nequeūt: praterq; si quid raro, contrāq; natura ritū eueniat. Quin & ramī prægrādis germen in quibusdā raro erūpit, ut in amygdala. In lauro autē nunq̄, ne auulsione quidē, nisi difficile. Causa eius quoq; siccitas est atq; raritas. Quod enī raro, laxoq; corpore cōstat, infirmius est, q̄ ut humorē, caloremq; seruare diutius possit. Quæ autē ligno conuālescere, germinareq; pollent, ut olea, myrtus, oleaster, hæc etiā spissitate sui corporis, uitale illud, genitaleq; cōseruāt principiū: nō tamē sine adiūmēto naturalis humoris. Haud enim satis spissitas illa facit, si admodū sicca sit, & ad nepotū procreationē inhabilis. Nā & talis eorū procreandi facultas radice detorta, scrupulosa, flexuosaq; datur: quæ admodū etiā lauri. Sūt enim robustiora quidē mori hac eadem de causa cōtumacia. Quantū enim reliqueris germinare facillime potest. At uero illorū, quæ longa innitūtur radice, ut piri, pruni, ac cæterorū, ex radicis copia oriū. Sed fortasse de oibus ad hūc modū in uniuersum dicendū est. Primo quod p summa celsipitū hæreāt, neq; radice alte descēdāt: aut si qua alte demittāt, hæc ramen nōnullas etiā radices summotenus agūt. Tum quod radix facta al mēti cōfluxu, solis sufferuefcet ardore, excoctaq; uelut prægnās partū educta.

cat. Nam & ramis ac cæteris partibus hac ratione germen erumpit. Quæ cum ita sint, germinatio stirpium non sine ratione fieri iam latissime patet. Radix enim quæ per summa adhæret confluuium excipiens succi, idq; ipsum sufferuesfaciens, atque concoquens, germen emittit. Plurima igitur proles iuxta caudicem exurgit: hinc enim partes sublimiores radices coherent: & olea quidē uel stipite suo germen emittere apta est. Pirus uero & punica, & quæ non solum ē proximo, sed etiam ē longinquo prolifescit, utpote quæ proluxa radice subeant, quacumq; radix per summa sit, illic germen suum profundunt. Confluxus enim, atq; excoctio ibidem solis opera facitatur. Quamobrem locus prolificandi incertus. Radix enim quamam sua parte
 10 summa telluris petat, confluxumq; alimentū capessat, constat nemini. Quæ autem uiuaces ac steriles sunt, ceu populo, & alba, & nigra, facile possunt. Quod quidem nulli ex reliquis pariter datum est: quanq; in herbis quibusdā, atq; submisso genere ita fieri certū est: ad quæ iam uenire debemus. Satis enim de arboribus diximus.

De generationibus herbarum, & quæ radicibus, & quæ per auulsionem, & quæ sit ē lachryma.

Caput IIII



Rgo generationes eorum in eisdem atq; superiorum intueri par est: posita omnium scilicet communissima illa generatione, quæ semine prodeat. Cæterum plures eorum quoq; reddere exortus licebit. Quæ uero ratione singula prædictis conueniant, ea prorsus diuidere decet: exempli gratia, radices ipso prouentu, de quo hac in parte differimus.
 Sunt enim quæ tam sponte, quam radice facta proueniūt, ut quæ capitata consens radice, atq; omnino quibus crassa, carnosaq; radix est. Sed nulla & tenui, & diluto cortice integeretur ad modū rapæ, ac raphani, opus est. Id enim genus radices facile exsiccat, imbecilleq; ad perdurandū penitus est: sed tunicas habeant plures oportet, & simul lentitiam quandam, ut bulbus, ut scilla. Deniq; carnis, succiq; bonitate uacare minime debēt: ceu amaracum recens, & liliū, & cætera generis eiusdem. Has enim tantummodo radices ferī, transferriq; posse uidetur: ac earum aliz plus temporis durāt, aliz minus scilicet pro sua quæq; natura. Nec defunt quæ dum suis
 10 in locis manent, germen possint citare, ut quæ anno tantū caulem gerūt: translatae autem siccitatis causa nequeant: rationē enim eandem in ijs quoq; arbitrari, quam in cæteris conuenit. Nonnullorum generano, & auulsionē, extremisq; ramis fieri potest. Brassica enim auulsione, & ruta exoritur. Adde ex coronarijs abrotonum, sisymbrium, serpyllum. Hæ enim radices ē germinibus suis quamprimū dimittunt, nō secus ac edera. Illa tamen omnium maxime uiuax est, siue arbores scādens ample xu suo perstringat, seu in terra abdita ima subeat. Proximū inter olera ocimum est: hoc etenim serippro parte superna optime potest, quanq; lignosum admodū sit: sed qua difficilius exsicari possit, ea prouenit. Quamobrem tempus longū perdurat, & tonsū, & diminutum regerminat. Abrotonū item lignosum est: uerum spissitate, ac coreq; suo seruari aliquantulum temporis potest, modo edera. Nam hæc defixa
 40 quoq; nimirū erumpere ualet. Has igitur generationes pluriū communes notasse par est. Illæ uero cum pauciores sunt, tum raro eueniunt, uidelicet liliū atq; rosæ. At hæc harundo perfissa stirpe enasci, germinariq; potest. Proxima ijs olea, & si quid aliud ligno suo ualeat germinare. Quapropter eadē causa redditur, quod ea quoq; suum humorem, caloremq; fecundū seruare utiq; possunt, nec procul argumēto præcidi solent: quippe cum de minori, apertoq; celerius, faciliusq; germinādū exhibeatur initium. Magnum contrā atq; compressum non æque passibile est, neq; ad germinādum propēsum sit: qua de causa diuidere alia in nucleos solēt, & ceparum fibras, tegumentaq; detrahunt. Deniq; omne nō uiuum à utralibus semouendum

consent: ut etiam arboribus partes, quæ obarescunt, abscindere assolent. Hinc oleæ ac myrti corticem detrahendum nequaquam existimant: obsepi enim conseruatq; arboris uitam. At ceparum, aliorumq; tunicas eximūt, quoniam istæ neq; uiuunt, neq; primarū causæ obtinent. Nam si eiusmodi quicquam detraxeris, germen nullum poterit miti. Sed peculiaris maxime germinatio quam lachrymæ præbent: ut equapij, & lilij, & aliorum quorūdam: nec ratio abest, sed caulibus planè respōdet. Nihil etenim aliud, quàm quod illarum quoq; fœcūdum principium coactum esse oportet. Non enim sine calore, humoreq; generatio talis consequitur. Cur autem non omnium succi, lachrymæq; generandi uim obtinent, causam ad superiores, prioresq; rationes reduci par est: id est, quod neq; caules, neq; radices uim eiusmodi 10 fortiantur. Necnon & quod antè retulimus, plures etiam cæterorum esse generationes, ratione non uacat: quippe cum ea facilius, atq; ex minori principio ualeant generari, quæ imperfectiora sunt. Ergo generationes, quas partes fortiuntur plantarum, quænam sint, quasq; ob causas fiant, considerandum in his est. Si quid enim prætermisum à nobis est, hoc addi, concerniq; ab alijs facile.

De generatione herbarum spontanea, & fructu cupressi.

Caput V



Ponte autē illa exeunt (ut simplicius loquar) quæ minora consistunt: & maxime quæ annua herbaceaq; natura sunt. Cæterum euenit, ut etiam maiora interdum ita gignantur, cum aut imbres frequenta- 20 uere, aut proprietas aliqua in cælo, terra uel consistit. Sic enim Iasser exortum in Africa serunt, imbre piceo quodam, crassoq;. Et syluam quæ nunc ibidē est, alia quadam eiusmodi ratione proluisse affirmant, nulla enim antea erat. Imbres putredines etiam quasdam, mutationesq; humi cōmittunt, cum alte humor descēderit, & plantas ea genitas ratione nutrire, augereq; possunt, sole seruefaciente ac exiccante: quemadmodum & animalium generationem confici maior fere pars auctorum confirmat. Quod si & aër semina præbeat secum afferens illa, ut Anaxagoras auctor est, longe magis sic faciatur, necesse est. Sic enim principia & alimenta nimirum adijci possunt. Item fluuij & concursus, præruptionesq; 30 aquare multis de locis semina arborum, herbarumq; aduehunt. Itaq; æmniū digressione loca permulta sylvarum impleta sunt, quæ sylua prius omnino uacabāt. Verum hæc minus sponte prouenire appareant, sed ueluti semine, atq; planta potius generari. Sterilia uero sponte potius creari putaueris: hæc enim neq; semine, neq; planta gigni existimentur. Sed forte id de maioribus uere indicari nō possit, latereq; naturas seminum potius sit arbitrandum, ut inter historias de salice, & ulmo retulimus. Nam & inter minora non desunt herbæ, quarum natura facile oblescat, ceu thymi, & reliquorū quæ subiunximus. Sensu namq; ea percipi nequeūt, quamquam uisua nimirum patent. Thymum enim satis suis flosculis nascitur, & arborum quoq; quarundā semina paruula, uixq; uisu percipienda sunt, ceu cupressi. 40 Huius enim fructus non id totum est, quod pilæ speciem gerit, sed quod cono innasit, ut prætenue, exile, & quasi laricis semini proximum: quod pilula sua desiccante diabitur, & legi proinde nō nisi ab experto homine potest. Ergo in multis solitum id quoq; habetur, & præcipue in ijs quæ continua in montibus, syluisq; agrestibus exeant. Cum enim sponte cōsistant, haud facile suam conseruare continentia possunt. Sed alterutrū fiat, necesse est: aut radice, aut semine germinet. Pauca interea quæ generis habent societatem, sterilia rustici esse affirmant: quæ & ipsa aut latere consentaneum est, aut quod alimentum ad alia absument. Idcirco fructu uacua ueniunt, quemadmodum uites, quæ uel hirculantur: & reliqua, quibus id ipsum ueniat. Nam si in fructiferis ita sit, cur non idem in alijs quoq; omnibus fiat, quasi ad fructu

fructificandum naturæ ratione referuent. Verum id loco opinionis cuiusdam adiecitæ dictum potius uelim. Cogitare autem diligentius, cōmentariq; spontaneas generationes prorsus debemus. Itaq; quantū in uniuersum exprimi liceat, generationes eiusmodi fieri necesse est, terra sūsseruefacta, coactōq; humore admisso, commutatioq; ex Solis ardore: quemadmodum & animalia prognerari uidemus.

De insitu, inoculatuq; stirpium, & temporibus inoculationum: tum quæ aptæ, inoplate inoculationibus habentur: quæq; nocent inoculatis, & quibus tuta reddantur. Caput VI



- Equitur ut rationem generationū, quæ subditis alijs fierent, explanemus: hoc est, quæ insitione, inoculationeq; ueniant. Est autem earum explanatio simplex, & exposita serē inter ea, quæ suprā docuimus. Quæ enim inserunt, perinde ut terra subdito trunco iurantur. Et quidem non solum appositio, sed etiam satio quædā, inoculatio quoq; ipsa dici iure optimo potest. Sed hic tam id, quod germinat, quā illud, quod generat, humor fecundus proculdubio est, quem habens oculus, oculo apertissime se conspigit: tamq; alimentū obtinens facultatem, germinationem propriam reddere incipit. Cuncta autem eius generis illa de causa facile augescere possunt, quod alimentū copiam præparatam, consecutamq; secum attulerint: sed omnī maxime inoculationes. Hæ namq; alimento purissimo fulcuntur: & simile præterea coire cum simili semper facillime potest. Oculi autem generis quasi societate coniungitur. Nec sine ratione mutuus apprehensus eorum, quibus eadem corticis est natura, facillime sequitur. Discrimen enim inter ea, quæ genus idem sortiunt, minimum est, & quasi translatio tantū facta uidetur. Euenit namq; ut simul & succus & tota arbor ad germinandum turgescat. Quamobrē cum simile aliquid est, & simili fructū ratione afficitur, iure incrementi celeritas utraq; de causa contingit. Cætera quo minus discrepent, eo celerius coalescunt: necnon & generis, succi, atq; temporis ratione discrimen occurrit. Nam & temporis conditio plurimū ualet, uel potius omnino necessaria est. Siquidē germinatio germinū per autumnum, & uer, & ortum caniculæ fieri solet: quippe cum ferre nō nisi turgida ualeant. Rationes quoq; de singulis inoculationibus similes atq; de satione produntur. Alij enim uernam potius probant, dum æquinoctium agitur, arboribus adhuc foetu grauidis. Vnā em cum pariter germinationeq; cortex quoq; adnascitur atq; obteggit. Alij eam præferunt, quæ ex oriēte arcturo fieri solet: tum enim inoculata protinus quasi radicari, maioremq; in modum coire posse affirmant: atq; ita densata compage germen incunte Vere uniuersum erumpere, utpote ex robustiori principio. Alas quoq; nitidissimas nouissimasq; inoculare non sine ratione præcipiunt. Apprehenditur enim facilius leuitatis ætatisq; causa. Sunt enim arbores uiuaces, propēscq; ad germinandū, dum iuuenescunt: sed præcipue apta inoculationi, quibus humor lentescit. Item quæ cortice molli, ac simili uestiunt, & pariter affici apta sunt, melius coalescunt. Quapropter in ijs, quæ natura & ætate inuicem conueniunt, perbelle inoculatur. Lentior enim apprehendendū uiam obtrinet: & cortex mollem pariter & benignum se exhibens haud magnam facit mutationem. Cæteris parum temporis datum propterea est, quia germen celeriter exit. Oleæ plus temporis destinatum est, cum diutius suos parturiat oculos. Ad hæc humidi, tenelliq; petendi surculi sunt, ipsumq; locum per totam æstatē humescere conuenit. Sic enim potissimum fit, ut germen proficiat. Quamobrem nonnulli quatuor & quinque mensium spacio, insitionem rigari oportere existimant. Aqua inoculationi uehementissime officit: putrefacit enim, & admixta facile destruit ratione infirmitatis: quamobrē sub ortum caniculæ turissime agi uidetur, & quidam corticibus ita præligāt, ut aqua admitti nō queat. At insitio-

niperutis est, nisi arbor humida natura constet: itaq; alij limum obducunt, alij olam aqua plenam apponunt, quæ assidue instillet: sit enim præ magnitudine uulneris, ut citissime resiccat, nisi humorem extrinsecus habeat illibare. Iuuat & oculum, corticemq; sine ulla rima seruasse, & furculum sic exacuere, ut medullam nullatenus exacudo nudet: rupto etenim oculo, cortice uel aut medulla nudata, & sic carl, perireq; necesse est. Quamobrem folijs & corticibus insuper obtegunt, atq; alligant, limoq; crinito oblinunt, ut succus persistere possit, ne sol, aut imber, aut frigus officiat. Cumq; trunco leuiter fisco inferendum iam sit, furculum cuspidatim deorsum malleo adigunt, ut quammaxime deprimatur, lesticæq; committatur. Sed humoris quocq; eorum modum obseruari quendam oportet: qua de causa uitem aliis quot antea diebus præfecant ut lachryma effluat, neq; putrescat, neq; uermiculæ, Punicam & sicum, quæq; his sicciora sunt, protinus inferere solent.

Pro natura locorum, insitus, inoculatusq; uariari. Item melius urbana syluestribus inferri, quam contrâ. Quodq; in omni semine alimentum aliquod contineatur.

Caput

VII



Vin & pro ratione locorum, naturæq; arborum temporis proprietatem cepisse ratio est: quippe cum alia solo uliginoso, alia sitienti, & gracili melius degant. Ver illis sicciscentibus rectius profectio accommodatur, quoniam minus succi obtineant. Quæ pinguis, limosaq; sunt, hæc autumnale tempus desiderant: humor etenim uerno tempore largior est, quam qui ad cõseruandum sufficiat. Quandiu lachrymato duret, tempus id tricenis diebus à quibusdam statuitur: necnon & melius ea posse fructificare ratio docet, & præcipue si urbana syluestribus inferueris: plus enim alimentum uires subditæ arboris subministrant. Quamobrem satis oleastris inferere postmodum uel inoculare præcipiunt: coeunt enim, & apprehendunt ualidius, & radix plus attrahens nutrimenti, probe fructificare arborem facit. Nam si e contrario syluestre in urbano seruëris, tamen si differentia quædam erit, tamen bonæ frugis arbor nunquam profectio reddetur. Atq; de consuetudinibus, & institutionibus hætenus. Semina omnia aliquid in se alimentum continent, quod una cum generandi principio natura profundit, sicut in ouis. Qua de causa non inepte Empedocles, oua solent excelsis gignere ramis, inquit. Enim uero natura seminum ouis proxima est. Differere tamen ille non tantum de arboribus, sed etiam de omnibus debuit: habet enim unumquodq; alimentum in se, quo & durare temporis aliquantum ualet, nec quemadmodum a animalium semen, exceptis quæ oua pariunt, protinus perit, ubi seorsum fuerit: hæc enim alimentum fulcita (ut dictum est) munitaq; ad suum cõseruandum principium, durare nimium ualent. Sed alia diuturniora alijs: maxime uero diuturna, quæ spissa, sicca, lignosaq; sunt, ceu palmæ. His enim nullus extrinsecus aditus patet, nec humor ullus includitur, qui putrescere possit. Quapropter neque bestiolis infestantur, sicut frumenta: neque resiccantur, ut semina olerum: sed mira soliditate munita, suum tutantur illud generale principium. Omnibus autem seminibus aliquid pabuli inesse, hinc etiam constat: quæ em arida, & uelut puraminea omnis non cernuntur, ut olerum, hæc suis temporibus ad germinandum mouentur, etiam si humoris quantumlibet senserint. Quamobrem hæc in coenaculis reponunt, suspenduntq; eminentius: nec ullam in eo domicilio aquam conspergunt, aut asperunt. Eo uerius in reliquis sensu etiam percipi alimentum facile potest, quod quidē in carnosissimis lactescere quodammodo solet. Confessum hoc idem serē & in animalium genere est: neq; enim quod ab his emittitur, totum fœdem purum, sincerumq; arbitrandum.

De cura

De cura nature in feminibus conseruandis, communiendisq; uario genere: ac de blechro plantâ,
 & quæ facile germinant augeanturq;.

Caput VIII



Væ autem lignosa, nucleosâq; ambiunt, hæc custodiæ gratia naturam obduxisse putandū est: quemadmodū & quæ pelle, membrana uel cōsistent: hæc enim omnia conseruandorū seminū causa supersunt: principium namq; omniū, potentia humidū est. Sed sunt quorū radices, ramī, ligna, caulesq; plantis abscissi seruare suū uitale principiū possunt (sicut dictū iam est) ita ut ad germen etiā excitandū mouere se ualeant, ceu colla, cæteraq; huiusmodi. Adde ligna oleæ, & caules liliorū, & blechri ramulos: nam ea
 10 quocq; solstitijs floret, quod permirū est. Cætera enim succum quendā leuem, lentumq; habere uident. Nec defunt, quæ pinguiuscula sint: & alia tunicis pluribus obtegunt, alia sua spissitate resistunt, quo minus possint sicari, tum aëre loco uel pro pito mutato afficiunt, & germinant. At blechris sicca omnino sentitur. Verum quia muis ita sit, principiū tamen quoddā eiusmodi habere necesse est, quod unā cū aëris mutatione, alterationeq; moueatur. Mirū præterea quod nō remissa, sed potius intentâ seuitia temporis germinare incipiat: nisi forte dies halcyonides suffecturas puta ueris: nam ad imbecillorū, exiguorūq; mutationē, uel quantumlibet tem-
 20 poris satis sit. Igitur generationes quot sint, quocq; modis fieri possint, quocq; singulis competat, ex supradictis abunde patescit. Germinant aut, augescuntq; facilius quæ
 30 planta sint sata, quā quæ semine, præsertim si radice aliqua fibrata petantur: sic enim partes pleraq; adulas iam haberi continget, quæ tantummodo alimentū desiderarent. At in feminis sata omnia generari necesse est prius, quā incrementa incipiāt. Eadem ratione & quæ radice proueniunt, facilius augentur, ut quæ radice capitata creantur. In his enim nōnihil naturæ prægenitū est, quo plus impetus ad germinādum infertur, quā semina ualeant eniti. Hæc enim, ut prius radices capiant, opus est. Quæ aut naturæ suæ ratione præualent, ijs quoad genus generi cōparandum sit, causam meatuū rectitudine assignasse par est, ut Democritus facit. Agi namq; in
 40 his perlationem facillime, & sine ullo impedimento, inquit, uel potius corporis raritatem, humiditatēq; pro causa reddidisse dignius sit: Quippe cum ea, quæ spissa
 50 & sicca natura sunt, difficile augescere possint. Quod enim spissum, siccū, amarūq; est, natura ignis consistit, & hinc lenta huius accessio est. Contrā quod rarum, laxū, & humidū est, id celeriter crescit. Ad summā, humiditas natura fertili germina, incrementaq; præstat. Argumento illud etiā est, quod pro locorū, consitionūq; natura euenire uidemus. Locis enim serenis, & a uento silentibus, consitioneq; breui interuallo disposita, arbores magnæ quidē exurgūt, sed raræ corpore, atq; humide. At uentosis, & frigidis, & rara consitione, minores quidē, sed spissiores, siccioresq; ueniunt. Aflatus enim, & frigora, & omīno aër ipse occurrentes constipat materiem, atq; coagit: unde cōtractiores q; reddunt arbores, necq; molem eandē possunt capere. Idem etiā sequi cū consilio amplo disposita interuallo est: sic enim spissiores,
 60 & in profundū auctiores consistunt. Contrā uero, cum breui interuallo consiti sit,

Cur foemine magis, quā masculi augescunt. Tum quæ sata semine, deteriora, melioraq; oriatur. Item Thasios adulas amygdalas inoculare.

Caput IX



Idere hoc idem & in animalium genere licet, & præcipue in homine: facilius enim, quā mares, foeminae augescunt: quas quidem natura humidior, solutioreq; creati nullum dubium est. Idem idem etiā in ipsis arboribus latissime patet: punica enim, & ficus, & uitis, auctu faciles: palma, & cupressus, & laurus, & pinus, & olea, difficiles: quam ex ijs quædam meatuum rectitudinem habeant, uerum aut densitas, aut

utrunq; impedimento est: facit enim & siccitas, ne satis augescere possint. Ad hæc imbecillitas plerisque in causa est: nam quæ debilia sunt, difficile augeri, nutricia riq; possunt: deuinci enim, aut impe diri ramos à coelo ambiente, haudquaquam oportet: nam & meatus, qui in directum pertendant, uim tam conficiendi nutrimenti, quam resistendi iniuriæ temporis exigunt. Quæ igitur facilia, difficiliaq; actu sint, his determinasse oportet. Ferè autem omnia, quæ semine inter satia uoueniant, deteriora exurgunt, ceu punica, uitis, amygdala: degenerant enim, & sæpe pappo dicta lanugine, uitiantur: ut inter historias diximus. Cuius rei causa, seminis profectio infirmitas est. Deuincitur enim ab influxu copiosioris alimentii: & quemadmodum infœcunda, copia alimenti redduntur, quoniam digerere nequeunt, sic & deteriora euadunt, quia uiribus carent: quamobrem Thasi amygdalas adultas inoculant. Ex mollibus enim præduræ post satum redduntur: quod idem uel in reliquis fieri potest. Sed quæ robusta inter ea sunt, quæ seri semine posita sunt, hæc diutius permanent, ut palma, & pinus conifera nuncupata, & picea pediculifera. Pari modo de syluestribus etiam differendum est, ni fortè nulla ijs ita deterius mutatio possit accedere: ferocitas enim ultimum est. At uero bonitas succi carnisq; eorum, aëris & omnino loci ratione sequatur, necesse est: nam & urbana ea ipsa inter se differunt ratione. Possunt etenim regiones quadam naturam arboris susceptam seruire, alix statuto tempore, alix semper: nonnulla solo mutato meliora redduntur, ut de punicis Aegypti, & Ciliciæ diximus. Euadunt enim alteræ dulces, uinosæq; alteræ sine nucleo, magnoq; cum acino apud Pinarum amnem fructificant. Omnino cum fructus loca idonea nati sunt, melius seruire sua genera possunt, præcipue si arbores uigent, fructumq; laudatum præstare suapte natura pollent. Semen autem annuum pro terræ subditæ ratione ubique mutatur, non protinus anno primo (parum enim id temporis est) sed tertio. Tum enim ultima mutatio consummandi accedit, ut etiam in animalium genere: hæc enim post tertium partum similitudinem perfecte representare incipiunt. Cæterum primus etiam annus nonnihil indicij affert. Quæ semine exeunt, his de causis deteriora redduntur.

De temporibus germinandi.

Capit. X

30



Nnua germinatio (hæc enim secunda quasi generatio est) non simul omnibus fieri solet, sed tempore discrepat ita, ut quibusdam contrariis sermè temporibus agi uideatur. Alia enim per æstatem, alia per hyemem germinare incipiunt. Sic & fructificatio, nam ea quoque temporibus dissidet. Igitur quoad simplicius differere licet, quæ singulis temporibus commode temperata sese exhibuerint, hæc & germinationes, & fructuum consummationes nimirum singulis temporibus reddunt. Cæterum particulatim quoque discernere ea tentandum est. Quædam facile germinant, quia uiribus ualent, alimentoq; abundant, ut amygdala, punica, & ad summam, syluestria magis, quam satia: quædam suæ debilitatis causa germina facile agunt, ut quæ natura herbacea, & annua sunt. Complura enim ex ijs uerno tempore florent, ut fremium. Nec malus roboris sui ratione præflore apparere, sed ob aliam potius causam. Festinant autem tam robusta, quam debilia, ratione: altera enim sua potentia, copiaq; propellunt: altera uel à minimo aëris momento moueri facile possunt. Quin & humiditas, atque mollities ad emittendum plurimum confert: ut etiam de primo exortu retulimus. Siccum enim, & spissum, neque transieat facile est, neque copiam habet materie. Quæ autem contrariis temporibus germinant, his nonnulli causam humiditate, caliditateq; assignant. Frigida

Frīgida enim æstate, calida hyeme germinare autumant: ut utraq; natura conuenienter temperata utriq; temporis sit. Ita enim & Clidemus cenſet. haud igitur male id quoq; aſſeritur. Sed paucitatem, & debilitatem, & ſi quid aliud in cauſa ſit, adju cere decet, ſicut etiam in oleum genere: portulaca enim, & cucumis, & cætera hu iuſcemodi, præhumida & frigida ſunt: ocimum ſiccum, atque lignolum eſt. Attra men hoc ante ſeruientes dies germinare ita, ut perdurare, atque perfici poſſit, mini me ualeat: cauſa uero debilitas eſt, quemadmodum & cucumeris. Hæc enim quauis arboris altitudinē capiat, in ramosq; ſeſe modo uicis arbuſtiue diffundat, tamen uitæ admodum fragilis eſt. Itaque ante æſtatem germinare non poteſt, ſed autu 10 mnium uſque prorogare etiam cupit. Adde quæ aculeis conſtant, quæq; radice in caput excreſcunt, ceu nepa quæ appellatur, & iphyum, & ſpina regia, & litium. Aliqua & poſt æſtatum incipiunt. Siue igitur poſteriora, ſerioraq; hæc indicare conueniat, ſeu cæteris feſtinantiore, utpote cum primi imbres aq; cedant (nihil em̃ ad rem propoſitam refert) illud proſectò latiffime patet, quod neq; magnitudine, paruitate uē maturum prouentum, ſerotinum uē germinis ſtatueri iuſtum eſt: ne que fortaſſe caliditate, aut humiditate, aut ſiccitate tantummodo, ſed modum quen 20 dam temporis congruentem habeat unumquodq; opus eſt, ut tenerrima effici poſ ſint. Singula enim expectare ſuam perfectionem uidentur, nec prius germen ul lum effundunt, ſed penitus ſibi immota pariter arbores, frutices, herbæq; conſtant: quod manifeſtum præcipue in ſylueſtribus eſt, quorum generatio ſponte, ſineq; ul 30 lo paratu fieri aſſolet. Omnia penē autumnalia, aut certe plurima generi fructis, ſuffruticis, herbæq; attribuiamus. Arbores enim nulla penitus autumnum deſiderat, præterquam ſi germinandum ſecundo cuiſciam ſit: quædam enim poſt æſtatum ſua germina geminant,

Quando arbores perpetua fronde germinent. Item quamobrem aliqua ſemper germinent, floreat, fructificent. Tum de uite inſana. Caput XI



D ſummā (ut in uniuerſum exponam) Arbores, quæ perpetua fronde conduntur, tum germen, tum fructū ſerius proſerunt, ſcilicet ſpiſſi tatis, ſiccitatisq; cauſa: paulatim enim in his aſſuit alimentum. Adde eam partem alimentū, quæ ſolijs aſſidue uenit. Hinc enim collectus, quo arbores ocuſ cogantur turgeſcere, nullus fieri poteſt: ſed ſuo tan 30 tummodo tempore, quoad liceat, commouentur. Rara enim admodum ſunt, quæ in genere ſemper utrentium germine fructu uē præueniant, ut edera, ut rhamnus, & quicquid eiufmodi. Proprietas autem caliditate ne eorum, an raritate, humiditateq; uel etiam omnibus his de cauſis eueniat, quærendum ſanē eſt. Illo tamen prius non ab re fortaſſe expoſito, quæ calida, quæq; frigida ſunt, quibusq; rebus debeant iudicari. Sed de his poſtea. Quamobrem autem alia celerius, alia ſerius germinent, cauſas prædictas reddere poſſis. De his uero, quæ omnibus temporibus germināt, 40 florent, fructumq; pariunt, ceu maloperſica, & quicquid eiufdem generis ſit, ambigere quiſpiam poſſit, non ſolum, quoniam earum temperamentum temporibus ſingulis non reſpondeat, ſed etiam, quod nec ipſa genera inter ſeſe germinis, aut fructus ratione conueniant. Id enim diſſidium eſſe in his tantummodo uolumus, & euenire uidemus, quæ nulla generis coniunguntur ſocietate. Igitur affectionē hanc proximam dixerim animalium foetibus, qui præpoſterò concipiunt. Sed cauſa in illis pateſcit, in his quaeritur: illi enim quia non ſimul ſua principia cœperint, nec forſe in eodem loco, idcirco ſimul concipi nequeunt. Horū autem germinatio quamobrem ſimul non fiat, haud facile dictū eſt. Quod enim radices non ubique uerſus, neque ſimiliter habeantur, aut quod ramī non recipiant ſuccum, neque co 50

quant, quibus prima germinatio prouenire possit, illud ita fiat, necesse est. Sed quæ obrem hæc ita sint, cuius' ue rei causa, facile dici non potest. Vitem enim quam insanam uocamus, non procul argumento fortassis concepiſſe rursus exiſtimaueris; hæc enim, quod minus suum excoquit fructum, pleraque fecundi humoris reſidua continet, quæ aëre mitigato mox in lucem emitit. Sicut cæteris quoque arboribus prima germinatio erumpere solet. Fraxinus uero, & reliqua generis eiusdem perfecte pariunt, atque excoquunt. Quæ cum ita sint, partus diuidi, & alias alium reddi; absurdum certe appareat, præsertim cum unico naturæ impetu agatur. Ambiguitates hæc ferè sunt.

Solutio questionis, quare semper aliqua generent.

Caput XII

10



De causam autem reddendam pro facultate, quæ in his rebus suppetat, primo quod supra retulimus, accipi decet: id est, quanque arborum rem permulta habere principia, tam ad germinandum, quam ad fructificandum. Quod (ut dictum est) naturæ arboris propterea dāmus, quia & permultis sui corporis partibus uiuit, & uim proinde germinandi non paucioribus obtinet. His uero ipsis principiis germina neque cuncta similia inter se, neque paria, neque simul proueniunt. Sed eo uelocius, uberiorque singula coalescunt, quo plus pabuli, ualidiusque infuxerit. Etenim quodque germen, quasi planta quædam in arbore, perinde ut in terra consistit. Cum autem germinatio simul non fiat, neque uires pares concurrant, recte nec fructuum concoctio simul omnium agitur. Nam & partium situs differentiam sanè faciet, ut delictet cum aut ortum, aut occasum, aut septentrionem, aut meridiem spectant, quemadmodum & totarum arborum situs, asserre differentiam potest, aut si loca tenent serena, & placida; has enim tum germinare, tum fructu præuenire notatur. Sed cum communis omnium natura huiusmodi sit, ubi coelum placidum, ferenumque est, breue admodum tempus arbores sua germina differunt, ut in Aegypto: at ubi frigidum, atque immitte, plus prætereatur temporis necesse est. In totum enim breuis quædam intermissio fiet, si tellus copiosum præbeat alimentum, & coelum se temperatum apte exhibeat. Nam & ea, quæ nonnullis in locis folia nunquam amittunt, ut ficus, & uitis: propterea non amittunt (ut dictum est) quia nunquam his nutrimentum, quantum sufficiat, deest. Hoc ergo commune plurimum est: alia enim propter suam naturam, alia propter locum, idem aliquid fortuntur. Sed cum omnia ita diuisa sint, ut alia fronde perpetua, alia decidua capi debeant, causaque illis semper uiuentibus sit alimenti ubertas assidua: eorundemque, alia propter suam naturam, alia propter locum, talia consistunt. Tertiū iam, & quasi deinceps consequens perpetuam germinationem ponere decet. Quod enim semper frondeat, non semper germinare est necesse, sed illud seruire tantummodo eadem germina potest: quod autem germinare perpetue nati sit, alia semper aggenerat, etiam germina, ut scilicet suæ peculiaris naturæ. quod idem uel in alijs fieri aliquatenus patet: germinat enim germinatione alia sub ortum syderū, alia nullo tempore certo, ut etiam uitis. Quod igitur his aliquatenus natura concessit, illis perpetua dote largita est, ut semper germinet, semperque fructificent. Cum autem natura talis eorum sit, nihil iam absurdū appareat, si alia perficiunt, alia flore promittunt, alia pariunt, alia superſcitant, atque paruriunt: nec enim in cæteris arboribus omnes partes simul esse sentimus. Sed quærendum potius sit, quænam, aut unde sit eorum temperies, atque coagmētario. Quod simile esse uidebitur, ut si quæram, quæ temperies semper frondentium sit, præter quod hoc aliam quoque rationem desideret. Addere namque oportet, cur tantum alimentum haurire, atque incoquere possint, ut nunquam generandi desit facultas. Enimue-

ro illa addita ratione, germinatio non nisi fructus generatio est. Nam simul quidem fructus plures gestare, alium perfectum, alium imperfectum, alium subnascens, uel sumptero, alijscq obtingit, quorum concoctio lenta, & fructus absolui difficile potest. Horum igitur causa sit hactenus in praesentia exposita.

An germinet simul suprema, & inferna plantarum.

Caput

XIII



10 **V**trum autem germinatio, & auctio partium superiorum, ac inferiorum, quae in terra conduntur, simul fieri soleant, an distinctae sint tempore, ut inter autores nonnullos conuenit: scilicet radices per autumnum, hyememq auferere: caudices, & ramos per uer, atq aestatem, & praecipue sub sydus: idq ratione sic fieri, siquid & in prima generatione se qui identidem soleat. Radice enim prius semper, quam gemen produci: antecedere namq id, quo alimentum inferatur, esse necesse: quod idem uel in consuetudinibus autummi liquere: tunc enim plantas consitas, radices capessere, non germinare nisi paululum. Nam si radice carerent, mox putrescerent, atq perirent. Sed idcirco eum satius comendant, quod plantarum primordia efficit firmitiora, quibus utiq & caudex, & reliqua generatio prodit. Etenim quae protinus ad germinandum excurrunt, debilia, & infecunda redduntur, quemadmodum in feminum genere hortos Adonidis dictos licet prospicere. Probabilis haec eadem ratio uel hinc uideri utiq potest: par-
 20 tes enim supernae aere frigido impediuntur: infernae autem obruta, obfusaq undique terra, & simul suffusa factae calore, qui fugatus iniuria frigoris se ad ima recipit, atque etiam humoris, alimentiq copia refertae facile auferere possunt. Nihil enim his deest, quod auctiorem, generationemq facere ualeat. Ad haec argumentum illud accipi potest, quod frumentis euenire uidemus. Haec enim hyberno tempore obliuata, perstrictaq, magis radices capessunt, quod rustici carnationem appellant, utpote cum uires, alimenta q de partibus superis ad ima uertantur, regressusq fiat modo itineris cancri. His igitur rationibus auctiorem distingui tempore dixerim. At illis hoc idem negauerim. In prima enim generatione prouenit quidem radix prius, quam germina: sed non adeo, ut spacium quoddam tempus
 30 ris amplum procedat: sed ita, ut breue admodum intelligi possit, quemadmodum in animalium genere cor, quaeq circa cor ipsum consistant. Natura enim (ut ita loquar) nullam penitus rem particulatim, ut ars, facere solet, sed omnia uniuersa, simulq procreat: quanquam alia prius, quam alia consicit. Sin autem in prima generatione necessarium illud credideris, at in alendo, augendoq non alia prius, alia posterius alii requiritur, sicut neque in animalium genere, sed simul quodammodo omnia tota sua mole aluntur, ita, ut non alio modo quam per continuationem cuncta alii, augeri q ualeant: quod praecipue in incremento patescit. Ad haec absurdum, si uis illa alendi dirigat per tam multas partes suum officium, dum format, imperitq alimenta, uel si quod extrinsecus agit, ut flatus, aut ignis, id rem particulatim perficiat. Neque enim haec ita agere uerisimile est, sed potius cum una
 40 cum temporibus mora sunt, tunc per totas plantas transmeare credendum. Quod enim generat, unum est: non quemadmodum Empedocles diuidit terram radicibus, aetherem germinibus: tanquam alterum seiungi ab altero, tribuiq uni tantummodo posset, nec ex una materia, & a causa una generatione fieri oporteret. Locis autem si diuiseris, magnum admodum temporis spacium sequetur. Germinationis uero impedimentum, quod frigus inferre potest, uere quidem asseritur: sed partitionem id naturalem facere nequit. Accidit enim ut radices aliquorum incrementum: quod uel tempore omnibus debito nunquam proculdubio euenit, cum frigus retorserit: sic enim germinatio inhibetur. Radicis autem incrementum nihil impediri potest,

caloris scilicet ratione, cum radix ipsa ad eruptionem, auctiōemq; plene turgida constat. Id igitur tribui naturæ non decet, quod aliquo extrinsecus impedimento se quatur: sed quæ impetu naturali aguntur, hæc solum naturæ imputari par est. Cum uero hyemes tempestiuæ, serenæq; sunt, simul & supera, & intera incrementum capeſſunt. Vbi enim cœlum mite, & germi congruens est, breue quoddam tempus (ut diximus) germinationes intermittuntur. Hyeme autem non solum germina, sed etiam radices inhiberi ratio est. Siquidem earum quoque auctiōes, generationesq; Solis feruore sequantur, necesse sit. Altius enim quàm sol attingat, descendere nequeant, præterquam si nonnusquam solum expeditum, molle, inaneq; sit: nisi enim hoc ita sit, querere sanè quispiā ratione optima possit, cur hyeme radices auſcſcere nequeant, cum neque nutrimentum, neque frigus impediāt: & forte communis hæc quæſtio sit etiam de alijs paribus. Aliter enim unumquodq; quandiu uiuit: augetur uero, quod germinandi cietur impetu. Plantæ autem tam nouellæ, quàm ueteres, undique se ad germinandum compellunt: sed forte euenit, ut moles tunc tota crescere apta sit. Cum uero hilare tempus accesserit, germina liceat prodire: quod iam quasi generatio quædam exiſtit. Quapropter non temere in se ueluti prægnantes gestant: & aggregato, præparatoq; humore ad generandum, temporibus post idoneis partus egerunt. Habent enim in se rami tam paruſ, quàm grandes principia quædam uitalia, quæ teſeſacta temporis indulgentia germina pariunt, etiam si nulla innitantur radice: quod præcipue in plantis pateſcit, quas detractas uitibus, alijsq; componunt in dolijs. His enim germina exeunt tempore congruo. Nonnusquam delixi palmites, & rami ficulni, & palmi parte sua ſuperna germinauere, quod scilicet principiū illud uitale poſſit intelligi, quāquam ſubtus nulla ſeſe penitus radice firmauerunt, urpote quæ principia quidem, uiresq; fortirentur, ſed alimento egerent, quo ſuos partus tueri, augeteq; ualere: quod quia deest, excitantur demum, & pereunt. Quamobrem non improbe affirmare uidentur, qui nouos fructus ſponderi protinus inquit, primis nondum ſemotis ab arbore: hoc enim uires, arborem non deficere ſignificatur. Igitur incrementa utraque ratione fieri poſſint. Cæterum ob hæc eadem potius arborum fieri totarum credideris.

Vtrum arbores hyeme ſint prægnantes, Vere pariant: deq; ratione, ſarietateq; in ſatis, in quatuor anni temporibus.

Caput XIII



Ed ex ijs, quæ paulò ante retulimus, quæ ret proſeſcō quispiā: Vtrum arbores hyberno tempore prægnantes perdurent, uerno autem pariant: idq; ueluti per circuitum agi ſoleat certis temporibus, quemadmodum in animalium genere. An alimenti inopia, rigoreq; aëris id eueniat. Etenim ſi ſereno, molliq; germinare aſſidue poſſint, partus certis temporibus tribui ſolet, ut totum ſimul regerminet, & ſi quid turgēſcit, pariat. Quod ſi cœlum obſequens, miteq; aſſidue ſit, ea quoq; fortaliſe, quæ a poetis narrantur, ratione non carere appareant: neque illud abſurdum ſit, quod Empe docēs inquit: Perpetuis ſolijs, & toto fructibus anno, Vbertate uigent. Ad hæc id prorsus ambiguum eſt: Vtrum maturitates fructuū ſimiles, an deteriores reddantur, cum calor infirmior, tempusq; humidius ſit. Sed hoc uelim per ſuppoſitionem contempleris. Temporum autem circuitu ſolito arbores æſtiuo tempore exinanitæ partim ex germinatione, partim ex fructificatione rursus repleri, reſtituiq; uidentur. Deinde ex ea ipſa reſtitutione temporibus congruis parere, atque germinare partu geſtato quodammodo, tam in paribus, quàm in totis. Recte autem, & ſationes, &

nes, & aggerminationes pluribus fieri temporibus solent: quæ quidem tempora contraria inter se quodammodo esse videntur, id est autumnus, & uer, & ortus caniculæ: quod enim aggerminetur solstitijs, minimum est: sed post arcturum, & sub caniculam longe copiosius germen adijcitur. Ver igitur nullam sui efficit admirationem: est enim id tempus omnium uiuacissimum, fecundissimumq; utpote quod humidum, calidumq; natura sit. Aestas contraria quasi Veri accedit: sicca enim, & feruentissima est, præcipue cum sydere exoritur. Item autumnus non solum siccus, sed etiam frigidus sequitur, aëre iam immutato temporis hybérni accessu. Est autem & frigiditas, & siccitas, germinationi omnino contraria. Igitur temeritas quædam naturæ in ijs ipsis appareat. Verum neq; ad germinandum contraria tempora illa consistunt, neq; hercle inter se dissident aliqua suarum utrius ratione, sed multitudinem profecto aliquam sortiuntur. Tempus enim quod germi accommodetur, humorem aliquem, caloremq; habeat opus est, ut uernum; & quidem id ad germinandum apulissimum proculdubio uenit.

Cur sicca, & feruenti æstate fructus nascantur: atq; autumno sicco,
& humido uidem. Caput XV

RElquis autem ambobus hoc idem ortu caniculæ, & post arcturum obtinere solet: etenim sub ipso sydere quam plurimum serueat, ramæ & autitri affiant, & nubes consistunt, & ipsæ arbores manifeste humescunt, & sub cortice humor quidam expandit: quamobrem eo quoq; tempore consuetum alimentum citatur, siue humore compulso, & facta circum obliuientia quadam, seu ob aliam causam. Id tamen hominibus etiam accidit, & hinc alui uehementer soluunt, & febres permultæ præ nimia corporum humiditate inuadunt. Terra quoq; per idem temporis amplius humescere plane uidetur, & aquæ proinde emergunt, & aliæ permultæ mutationes eueniunt. Sed quam ob causam hæc sequantur, alias disputabimus. Quod autem plantis humefactis, & aëre nullo extrinsecus obfistente germi germinatio non absq; ratione accedit ijs, quæ supra diximus, latissime patet. Autumnus uero, non quemadmodum dictum est, siccus, & frigidus est, sed potius calidus: & simul ac syderis facta mutatio sit, aër humidus satis reddit. Quobrem euenit, ut quasi mistio quædam humidæ, & calidæ fiat, sicut & tempori uerno calor à sequente æstate obtingit: etenim autumno caloris prægressus æstatis aliquid extat. Humiditas autem recens accedit, scilicet ob densitatem, refrigerationemq; aëris. Recte & quæ sterilia sunt, & omnino quæ in uenescunt, quam uetera, steriliori prouentu sua germina duplicant. Adde quæ locis humidis, hybernisq; exeant. Sicciora enim quæ fructifera, uetustioraq; sunt: quoniam altera humores suos ad fructificandum absumunt: altera natura etiam sua non nisi sicca constare necesse est. Sterilia uero, & noua, plus humoris, calorisq; possident. Rursus ubi hyberna loca, & humida sint, statusq; commodi non desint, ibi omnia autumnalia longa, humida, bonaq; redduntur. Sæpe etiam imbres æstiu plurimis eiusmodi locis descendunt. Itaq; aëris ea ipsa humiditate plenius germinant, augenturq; arbores. Nam & ea, quæ bifera esse uidemus, ut pomorum, pirorumq; genera quædam, his in locis potissimum exeunt, utpote cum tempus sese longius protrahat, fructusq; priores celeriter decerpantur, quod etiam fructus prouentum celerem dixeris. Veruntamen refert, quamprimum enim arbor repletur, qua de causa fructus eadē alios perfectos iam usui præstat, alios cōcipit, paritur ut. Ceterum nihil ferre ex ijs, quæ secundo fructificanti, simile primis percipitur. Sed quoniam unā cū plantæ impetu, solisq; & aëris opera non adfuerit, idcirco omnia deteriora redduntur, quod in alijs longè latius patet. Offendit enim & punica fructum secundum, & myrtus: sed augere nullatenus possunt. Igitur propensiora ad su-

pergerminandum (ut ita loquar) omnia, quæ suapte natura facile affici possint, nisi quid siccitatis causa nequeat, ut amygdala: aut nisi fructus decerpitio proximior sit, quam ut tempus germinare germina ualeat. Igitur si autumnus prolixior fuerit, ro-
 fas quoque erumpere posse, & alia generis eiusdem ratio est, ut apud Dion. Macedo-
 niz fieri aiunt. Quæ quoniam coctione uehementiore non egeant, tempus adepta
 quantū satis sit, florem emittūt. Denique (ut sæpius diximus) cum cœlum mite ac hu-
 midum, & in totum cōmode temperatum est, assidue germmare arbores possunt:
 quanquā non omnes, sed aliquæ: minora autem longe amplius possint: quod etiam
 nunc quibusdam ex coronarijs euenit, quæ locis circumobseptis, apricisque cōtinen-
 tur. Nam & cœnantha, & uiola nigra, & alia quædam, assidue florere uidentur. Sin-
 autem & cultus adhibeatur, longe amplius ita continget. Locum uero ualere plu-
 rimū, cum apricus circumobelusque est, uel arborum ipsarum testimonio patet.
 Locis enim eiusmodi pleraque exeunt, quæ nasci alibi nequeunt, & fructum eadem
 afferunt, cum cætera generis eiusdem alijs locis afferre non ualeant, & præflorēt,
 & prægerminant prius, quam reliqua. Sed de his satis.

De ratione bisserorum, tam de floribus, fructibusque.

Caput XVI



Vod autem in biferis uidemus arboribus, simile quodammodo illi est,
 quod in pecore fieri solet. Illud enim, cum primi partus bene successer-
 rint, facultasque scietificandi denuo adest, rursus ad concipiendū citatur, 20
 dummodo tempus suppetat. Et arbores quoque decerpitis fructibus pri-
 mis, concipere possunt alios: sed solo pingui, culturaque pleniore opus forsitan sit, in
 primisque dixerim cœli temperiem pernecessariam, ut tempus, quantum partui sa-
 tis sit, nascisci arbores ualeant. Id enim causæ est, ut etiam si quis fructū, aut florem
 decerpserit, generari iterum alius non possit: quoniam tempus suffecturum partui
 nullum supersit: haud enim fieri potest, ut ante pariant, quam in utero serant, cum
 primus humor consumptus iam totus sit. Accidit præterea, ut gignendi principium
 lædatur illati uulneris causa: ita ut nunquam nisi alio denuo effectio principio, germen
 emergere possit: quod quidem præfens tempus nequit efficere. horum igitur has
 esse causas opinandum. Flores autem rationi germinationis haudquaquam respondēt. 30
 Arbores enim magna ex parte eodem ferè tempore sua germina ædunt. Sed quā-
 obrem fructus longo post tempore maturescant, causam illam reddemus: quod so-
 lia, et germina agilia, facilioraque sint, utpote cum ea crassiore, callosioreque consistit
 materia, fructus purgatior consistant, succisque ipsis præcipue perficiantur: quod
 quidem non aliud, quam maturitas fructuum est, ad quam certe ampliori paratu,
 consuetuque opus est. Item fructus magnis inter se differentiis distant, eo quod aut li-
 gnosi, aut terrefici, aut sicci, aut pingues natura sint: tales enim difficilior confici ne-
 cesse est: quæ de causa sunt, quæ cum flore preueniant, fructum tamen diu retine-
 ant, ceu amygdala. Erui namque, qui ligno constat, difficile admodum potest. Flos ce-
 lerius exit ob eam, quam supra diximus, causam: siquidem ea omnia modum con-
 uenientem, ordinemque sortiri debeant. Quinetiam florum ipsorum, qui mole ali-
 qua corporis emergunt, serius se ostendunt, ut flos puniceæ. 40

Cur culta serius proueniant, quam inculta: Syluestresque fructus non maturent
 cum sint urbanis ualidiores.

Caput XVII



Icultā prius, quam culta germinare incipiunt, ut uitis, mālus, olea, fi-
 cus, & reliqua: quoniam calorem amplius ualeant retinere, cum non so-
 dianantur, neque radice nudentur. Calor etenim est, qui ad generandum
 mouere arbores potest. Adde quod nulla superioribus partibus plaga
 illata

illata est, dum aut rami deputarentur, aut fructus decerperetur. Acceptum etenim uulnus facit, ut arbos labore, frigeat, contrahaturq; in exiguum. Ad hæc ratio illa, & (ut sic dixerim) præcipua, possit ascribi, quod syluestres arbores, quoniam amputatæ, purgatæq; non sint, sua germinandi iniuria minutionibus contineant furculis, quorum quisque pro exigui corporis sui ratione motum letum desiderat, quo protinus germinare incipiat: quod uel in piro syluestri perspicere liceat. Hæc enim facilius quam urbana, eisdem prorsus de causis germen emittit. Cum enim pluribus, minutisq; internodijs diuidatur, principia illa germinandi agilia, propensioraq; ad germen, opera cœli ambiens redduntur. Necnon & siccitas nonnihil conferre uidetur: sic enim minus humoris relinquitur. Quod autem minus sit, motu facilius exstat. Melior igitur, pleniorq; germinatio & fructificatio cultarum arborum est: sed citior neglectarum. Cur syluestres arbores, cum urbanis ualidiores sint, fructus maturare non ualeant, quæres. Pro uirium enim ratione coctiones sequi consentaneum est. Vnam igitur causam fructuum copiam assignasse par est: nō enim tantum suis prævalent uiribus, quantum plus æquo fructificant. Ergo magna geritur copia cuius maturitate uires arborum attingere nequeant. Quapropter agricolæ, partem auferre cum plures prodierint, solent. Altera causa est, quod arbores syluestres spissiores, siccioresq; sint, & succum proinde ad se potius trahant. Alimentum autem & excoctio, non nisi humoris expansione perfici potest. Quod si humor aliunde trahitur, nunquam ab alio capi facile possit. Ad summam, non quæ ualidiora, altioraq; sunt, hæc amplius ad fructificandum ualent. Solutum enim, laxum, permeabile, & humidum id esse oportet, quod fructum large laturum sit. Spissitas uero contrarium est, quod etiam in mulieribus, reliquisq; animantium generibus patet. Idq; ipsum agricultura quoque adhibere contendit, cum superuacua quædam plantis abscondit, alimenta q; subministrat, & omnia patefacit, afflabusq; exponit. Fructum igitur ratione prædicta copiose producant: sed percoquere nequeunt, ob eas quas diximus causas.

De maturitate fructuum, & usu eorum. Item cur non, ut quæq; ualidissima sunt, ita & semine præferantur.

Caput XVIIII



Concoctio in pulpa fructus fieri solet, quam scilicet confici, & succum, saporemq; capessere nostræ naturæ congruum, necesse est. Sed forte hoc ipsum prius distinxisse oportet: Concoctionē aliam pulparum, aliam seminū esse. Et earum alterā ad cibum hominis accommodatam, alteram ad generationē, perpetuitatemq; arborū pertinere. Fructus enim & semina earum rerū causa, natura produxit. Vtrinq; uero concoquendi genus alteri quodāmodo opponi uidetur. Cum enim pulpa humidior & plenior est, fructus minor includit: cumq; is maior est, pulpa minor, durior, saporeq; deterior ambit. Cuius etiam rei causa agriculturā solers adinuenit ingenij, quæ fructus alimētum, incrementūq; ualeat impedire. Omne enim ferè urbanū, nucleo minori fructificat, quā syluestre: & cultū, quā incultū: & melius cultū, quā deterius: quoniam amplius humescunt, & alimentū uberius ad pulpam augendā deducunt: atq; etiā succos pro modo nostro usui congruē, maturēt. Igitur concoctiones multum inter se differunt. Si quidem & minus solitū illud concoquendi genus addidisse conueniat. Sed forte dubitauerit quispiā, atq; statuerit, qd ualidiora exuperat, idem etiam debiliora posse exuperare. Semen aut̄ omnīū esse potētissimū, utpote cū hoc finis cōmunis sit omnīū plantarū. Rei namq; similis generatio, finis proculdubio est: & quidē in animalibus semen nō nisi perfectā natura posse fieri patet: cumq; ob se nilem ætatem defecerit, generatio cessat. Recte igitur dubitaueris, atq; ita statueris.

Seminis enim productio, perfectioni prorsus cuidam tribuit. Quo tandem modo
 ætas in singulis accipi generibus possit, nō tamen quæ uegetiora, robustioraq; sint,
 hæc seminis producendi uim præcipue possidēt. Sed e contrario propemodū lequū-
 tur, cum in alterutram partem succi, uiresq; perrexerint. Quamobrem in genere
 quoq; plantarū idem euenire ratio est, atq; ita portione etiam illam accedere plantū
 iam est: ad utram enim partem succus influxerit, reliqua ieiunior erit; ambabus em̃
 satisfacere nō quithoc exploratū fermē in omnibus est. Plantarū autem genus, tres
 quasdā portiones succi sortitū est. Ducitur enim succus ad arborē ipsam, eiusq; ger-
 minationem, quod quidem fructibus obest, si plus æquo incescit: hac enim de cau-
 sa fructus plerunq; nō prodeunt. Item ad fructū, & pulpam fructū ambientē: impe-
 tus enim factus ad alterum, ne quis ad reliquum fiat, impedimento est. Vt igitur in
 illis nō deest ratio, ita nec in his deest, sed portio planē sua feruatur. Syluestres enim
 arbores, tum fructui, tum pulpæ humorē distribuunt, sed plus ad fructū deducunt,
 ita, ut is effici possit amplior. Ad hæc non inepte omnino fortasse dixeris syluestres
 amplius sua semina augere, quoniam masculæ quodam modo sint, & spissiores, siccio-
 resq; natura consistant. Cultura enim, alimentorūq; copia plantas effeminari ue-
 risimile est. Sed hoc argumentū ē remoto deductū, itaq; similitudine quadā dicatur
 id, uelim. Inter maturitates autem, ea quæ fructibus datur, primatū ad generationē
 obidinet: quæ pulpis, hæc ad hoīm usum præualet. Vtra perfectior sit, alterius inter-
 est disputationis indagare. Nam & in folijs, & in radicibus sic tantummodo uti solē-
 mus, ut olerum ea ipsa excoctio perfectior est, quantū eorum finis in seminibus sit,
 quibus ad pastum nonnunquam utimur.

*Vtrum calidiora sint syluestria, quàm urbana: debeatq; naturæ ratio de syluestribus
 colligi, an de urbanis.*

Caput XIX



Xplodenda nec illa ratio est, quod ex frigidityte arbores syluestres con-
 coquere nequeant. Nuclei uero lignoso quodam, & purgamentatio
 alimento consistunt, quemadmodū animalū ossa. Ergo hoc ipsum nō
 inepte asseritur, nucleū ex lignoso, terren oq; confici alimento. Verū
 semen nō ex eadem, sed ex purissima compilatur materia. Quæ autē
 natura calida, hæc eo copiosius semen apta præferre sunt, quo plus caliditatis obti-
 neant. Et urbanorum caloris indicij, uis ipsa succorū est. Succus enim siccorū, læ con-
 trahit; caprifici, minime aut prauæ. Sec huc rursus alia quædam repugnat generalis
 de caliditate opinio, quod syluestria durare amplius locis frigidis possunt, in totūq;
 robur nō nisi caloris ratione obtingit. Sed de his post hæc forsitan differendū sit: pro-
 lixiore nancq; opus est disputatione: & quæratu oportet, quænam calida, quæ ue-
 frigida sint, quibusq; rebus determinari hæc deceat: atq; etiam quænam eorū cau-
 sa sit, siue sola, siue cum alijs: & quorū nam ratio coquendi diuisionē possit recipere
 tam simpliciter, absolutaq; ratione, quàm quod ad genus humanū attinet, ut quæ acri-
 monia, uel succo medico differrent, quæ quidem medica, & comedantur, & usui po-
 tissimo sunt. Hæc igitur quasi proprietas quædam naturæ animaduertit, ad quā sci-
 licet & alimenta, & culturæ, aut contrā neglectus, scuitatesq; pertinent, ut de lase-
 re, & Inuri ferunt, & si quid aliud cultionem aspernari aptum sit, aut ediuerso si
 quid siccam uel humidam, & hybernā tellurem persequi soleat. Ex hoc autem ipso
 quæret fortassis iterum quispiam cōmuni quadam, ac generali cesprians ambigui-
 tate, utrum naturam ex ijs, quæ sponte proueniunt, contemplari potius deceat: an
 in ijs, quæ cultu hominis exeunt, atq; adolescunt: Et utri generi potius ratio naturæ
 tribui debeat, quod idem ferē est, uel potius pars quæstionis illius, Vtrum in gene-
 re syluestriū, an in urbano sit natura inuestiganda. Natura enim in se principia te-
 net.

net: & id secundū naturam esse censemus, quod in se principium motus possidet, & quietis: cuius generis illud profectō est, quod sponte proueniat, non quod opera hominis, præsertim cum arte quicquā constiterit: namq; ab alienis principiis id producit. Et quidem in animalū genere, ea quæ singantur, aut ad paruāritatem, magnitudinem uē, in totumq; ad effigiem quandam formæ, ut perducantur, facta secundū naturam minime censere debemus. Natura enim semper id spectat, quod optimum sit, ut inter omnes conuenit autores. Cultus uero, & huiusmodi adhibita cura, naturæ auxiliatur, quod perfectius suum exequitur officiū. Dum igitur natura satis sibi non est, hæc per artem assumit, ceu copiam alimentī, pinguitudinēq;
 10 & rerum impediētū exterminationem, quæ scilicet loca etiam apta, & ad singula accommodata ualeant adhibere: in quibus quidem naturam contemplari dignius esse putamus. Sed illa rerum externarū tantummodo ratione optulantur, ceu aeris status, solī, alimentī. Agricolatio uero in ijs ipsis pleraque immutat, disponitq;. Quod si illa hæc exigat, quod melius succedere possint, hæc quoq; illa desiderent, ratio est: præsertim cum agricultura ab ijs ipsis dependeat, atq; in his sua fortietur principia. Nam illud quoq; ijs, quæ sponte nascuntur, absurde, & quasi præter naturam euenire uidemus, ut ex seminibus deteriora reddantur, atq; omnino degenerent. Neq; enim secundum naturam est, sed simile semper generari exposcitur. Igitur ambiguitates hæ, talesq; occurrunt.

20 Solutio questionis, quemadmodum considerata sit in urbanis, & syluestribus natura ratio: ac de maturitate, & uaria fructuum concoctione
 Capitulum XX



Edhis quoq; naturas distinxisse, quemadmodū concoquendi genera, prius oportere, planum profectō est. Alijs enim natura spontanea coniunctior est; alijs cultura, solertiaq; accommodatio: nonnullis utraque ratio cōgruit. Quas ob res omnino considerandū est, quemadmodum natura syluestribus, & urbanis se distribuerit pariter in animalium, & plantarum generibus. Quippe tam syluestribus, quā urbanis, frondes aptissimas & ad conseruationem, & ad perennitatem, & ad auctiōem, & ad fructuū generationē, largita est. Fructiferas item ipsas diuidere sortasse oporteat, ut alia sint, quæ sponte fructificent: alia cultura tantum, & hominis opera serant. Horum igitur determinatio petenda hinc est. De concoctione autem, unde digressi sumus, reliqua subiungamus. Omnia ferē, quibus fructus humidus, aut nudus, aut tenui intestus putamine, celeriter suos fructus perficiunt, ut ficus, uitis: sed præcipue morus. Hæc enim fructum nudum penitus gerit, ut quantumcunq; sol tepescerit, citissime fructus immutari possit, utpote qui minimo egeat calore. Vna enim uis quædam præualida, uniuersaq; excurrere solita, fructū conficit atq; percoquit: sicuti & in germinādo fieri solet. Longa etenim prorogatio germinis, collectum maximum facit. Vnde & germina congesta magno cum impetu prorumpunt adeo, ut uel sonitum facerent, quod quidam affirmant: & concoctiones perfici celerrime possunt. Nanque simile euenit, atque in frumentis, quæ hyemā diu retinuit. Cum enim laxata sint, uelociter augescunt adeo, ut non multo
 40 serius posteriora perfici possint. Adde, quod etiam morus non summatim, sed particulatim fructum percoquere solet: unde & diuissime perseverat, nec humoris tenuitas, aut aquositas amittenda est.

Cur motus citò percoquat, cum serò germinet: ficiuq; & uitis serotine sint. Cur item aliquæ arbores sint præcoques: quodq; in Aegypto arbor quædam centesimo anno fructificet.

Caput XXI



Ructus mori his de causis uelociter maturascere potest: sed ut Menestor autor est, germinat serò hæc arbor, propter loci frigiditatem, excoquit citò propter suâ debilitatē. Vitis autē, sicq; fructus, seriores sunt, quoniam & putamine obtegantur, & succum ampliorem, crassioremq; gerant. Ad hæc ficus mole ampliorem consistunt, et summatim quodammodo maturascunt. Vitiæ autem, & numerosiores proueniunt, q̃ ut breui excoqui possint, & congestis acinis coaceruantur: nec aliquo intervallo discernuntur. Item umbra opacant, nec subduales dependent, atq; humore exuberant: uitis enim aquæ præuida est. Deniq; omnia dulcia breuiori tempore maturascunt. At si quis etiam pro nostro usu uelit decerpere, longe amplius festinationes appareant. Horum igitur causæ cur prius, cur ue posterius perficiantur, his serè constant. Non tamen cunctæ arbores, generis cuiusq; præcoques sunt. Vites enim & fici, permixtis inter se discriminibus distāt, ita ut nōnullis fructus serò admodum maturascere queat: quapropter causas in uniuersum reddamus, fortasse dignius est. Ergo præcoques illæ arbores sunt, quæ nō præhumidæ, nec succo frigidæ constant: quæq; fructum nudum, aut membranis intectum præuenuibus gerunt, cocturamq; succorum aquosam, non crassam consiciunt. Serotina uero, quæ modo contrario se habeant, hoc est, quæ præhumidæ, frigidæ, & fructu, aut pulpa fructus lignosæ, præduræq; quibusq; fructus lignoso septo, numerosoq; continentur putamine. Ad hæc quibus succi pingues, & aliquam eiusmodi fortientes potentiam, aut quibus fructus siccī, parumq; humoris habentes, idq; pingue, uel eiusmodi aliquid. Hæc enim omnia coctionem uehementer impediunt, quod in singulis etiā percipi licet. Quæ enim perpetue uiuent, omnes propè fructum serò perficiunt: ligno autem tam fructus, quàm fructum ambientia, cōstant piceæ, larici, cupressō siccī alij sunt, aut pingues, aut lentitina quadam gliscētes, ut cedro: unde quamuis non magni, consici tamen difficilē possunt, quoniam tales sunt. Ad hæc spissitatis causa parū alimenti influi potest, totusq; accessus parcissimè agit. Inter eas uero quibus frons decidua data est, quæ per humidā, frigidā, & terrenā, serò maturant. Frigiditas enim & siccitas, & multitudo, & terrena concretio, cōfici & maturascere quam difficillime possunt, ut pisorū syluestrium, & glandium. Quæ autem mediæ temperiæ constant, & satis calidæ, solutæq; sunt, hæc tam germine, quàm fructu præueniunt, utpote quæ admissionis ratione percongrua, cum sibi, tum etiam cœlo ambienti consistant. Verū singula non nisi semoto omni impedimento sic accipiēda censemus. Nullus enim neq; maturus, neq; serotinus fructus attribui debet, siqua sint quæ aduersentur. Exempli gratia: quædam quam nudum afferant fructum, serò maturant, ceu smilax, & quædam alia racematim fructificantia: alia non solum serò, sed particulatim etiam maturascunt, ut rubus. Hoc enim in genere, quod quædam natura frigida autē, serotina tam fructu quàm germine consistunt: quod alia nuda, & sine ullō putamine pateant, sufficere sibi nequeunt, cum tempus occupant incommodum. Alia quod siccam naturā fortiantur, diu immatura persistunt. Quodq; etenim siccum, humorem desiderat, quo & nutrirī possit, & coqui. Germen autem prout temporis particeps utriusq; est, ita sese tueri longius, atque protelare potest. Verum quantum formula subsignare licitum est, has eōrum causas dixerim. Nanque ratione ætatis serò, maturæ ue fructus pro tempore perficiuntur: ut plantæ nouellæ ex nimio humore, & in totum copia nutrimenti, tarde suos fructus perficiunt. Vetreſ autē cessant, quod effœtas

efficitas iam eas longa ætas reddiderit, quemadmodum arbor illa Aegypto tribus
 ra, quam anno centesimo fructificare narratur. Ficus autem regionis eiuſdem nun
 quam niſi ſcalptis fructibus, oleoq; perunctis concoquere poteſt, ex humorum ſci
 licet ubertate, nimiaq; alimentorū copia. Nec ſolum fructum ſeio reddi, ſed etiam
 ſterileſcere quædam, nutrimenti copia facit: quemadmodum de uitis, amygdal
 lis, denique omnibus quæ perforatu caſtigantur, retulimus. Omnia nanque illo
 nimio liberata humore, aut ex ſterilibus in fructifera, aut in melioris, ſuauiorisq;
 fructus ſertilla tranſeunt. Amygdalæ, ſi paxillo deciſo, humorem influentem ab
 ſtergas, idēq; biennio aut triennio factas, dulcem ex amara efficiēs. Quin & ficum
 10 reſectis radicibus, & trunco præfixo fertilem ex ſterili, longe q; feraciorē reddi
 affirmant. Simile ferē perſpici in hirculatis uitis licet: etenim earum quoque im
 perum reuocare, quantumq; uacans ſuperflui auferre oportet, ut fructum pa
 rere ualeant.

Quare arbores melius proueniant ſolo non pingui: & quod ſolum aptum ſit frumento:
 atq; in eodem genere aliqua mature, ſerō aliqua parere. Caput XXII

Eiuſdem propē generis uel illa cauſa eſt, quamobrem non pingue, al
 tum, latumq; ſolum arboribus commodum ſit, ſed quod deterius
 conſtit, frumentis autem illud uehementer cōueniat. Radix etenim
 20 arboris alte in eo ſolo deſcendens, ima q; ſubiens ſuccoſa, æquo plus
 alimenti attrahit, quod non in gracili, minusq; alta tellure facere po
 teſt. Hac enim radices per ſumma adhærent, minusq; alimenti, & quantum com
 petat, hauriunt. Nam & in arenaceis, ſabuloſis, ſaxoſisq; terris quantum ſatis ſit,
 capere arbores poſſunt: nſuntur enim, & in diſiecta tellure radices nimirum ſuas
 demittunt. Ad hæc, ſolo eiufmodi utpote ſaxoſo radices amplius refrigerari con
 ſentaneum eſt, quod uehementer arbores querunt. Frumentum autem radices
 plures ſolo utique frugali capeſſit, quoniam alte deſcendit. Vitioſo plerunq; etiā
 exareſcit radicū inopia. Refrigerationem ergo deſiderat, quia radix alte infixā
 30 nō eſt. Cum uero imbres crebri acceſſerint, deterius præ alimento nimio reddi
 credendum eſt. Nam & arborum fructus idcirco degenerant, quia alimenti co
 pia deuincantur, ut ſuperius dictum eſt. Sed abſurdum proſectio putaueris, quod
 inter ea quæ generis ſocietatem habent, animaduertimus: hoc eſt, alia matura, alia
 ſerotina conſiſtere, ut ſici quædam, & uites, & pomi, & piri, & alla. Enimuero
 inter animalia genus nullum eiufmodi eſt, cane excepto, ſed omnia pari tempo
 re, & ſerunt in utero, & alunt cum pepererunt: quanquam tempora pro loco
 rum natura ſæpe permutant, & præcipue quæ cum hominibus uiuunt. Igitur ger
 minationes quoque aliquorum poſteriores forſitan ueniunt, atque ita portionem
 abſoluunt. Cæterum in quibus id deſit, quæſtio iſta quaſi per æquiuationem
 exultat. Eſt enim & animalibus, & plantis à natura exhibitum, ut alia urbana,
 40 alia ſylueſtria ſint, quæ nullum fructum gignere ualeant. Nam ea quæ capriſci
 ſerunt, ſui generis ſunt: quippe quæ nunquam matureſcere, neque perfectio
 nem ullam attingere poſſunt. Vites quoque inſanz uocatæ ſui generis ſunt, quæ
 non ſolum germinant, ſed coquunt, & florent, & racemantur. Et ſi quid aliud ad
 florem uſque tantummodo ueniat: ſua enim natura quodque differentiam ge
 rens, diuerſi generis eſſe iure exiſtimetur. Quæ autem percoquere, germinare,
 florereq; ſimul, alijs tamen atq; alijs partibus ualeant, ut malus medica, hæc plenio
 rem quandam & peculiarem certe ſortiuntur potentiam: ſiquidem id agere poſſint
 perpetue. Simile enim obtingit atque in aëre placido, medioq; conſtato tempore,
 quo ſcilicet germinatio & fructificatio ſacitari aſſidue poteſt, ut ſuprà retulimus.

Ibi tamen aer causa est, & omnibus communis proinde occurrat hic natura visque arbori sua, utpote quae se omnibus temporibus exhibere temperata ingenue possit.

Differentia inter pulpa, fructus, & semen in pulpa inclusum, quò plus temporis perduret: ac de copia & bonitate olei.

Caput XXIII



Ed cum pulpa quae semen complectitur, diuersa per se consistat (hanc enim natura usui hominis accommodauit) terminum eius, tempusque statutum esse necesse est, quod ubi praeterit, noxam utique possint imbres, tempestates, hyemesque inferre. Seminum uero ipsorum nullus terminus est; una enim cum pulpis haec defluunt: proliliunt alta, ut pinipicosae, & ad summam omnium coniferarum. Conis enim adhuc pendentibus, haec exiliunt, uasque ipsa relinquunt inania. Quod idem etiam cupressis euenire nullum dubium est: sed illis semen nucem, his membraceum, & exile adest. Quae igitur putamine ligneo, aut pelliculari quopiam ambiuntur, ut nuces & glandes: haec suis munita tegminibus, ad germinandi usque tempora illaesa seruari nimirum posae sunt. Quibus autem corpus ambiens carne consiluit, haec externa illa mole putrefacta, labefactaque, per se ipsa sub lignea natura perdurant: ut uinaceum, & palmace nucleus. Alia membranae ac tunicae complures tumentur. Nonnulla inter sese modo quodam deuincta, & uasculo communi circumobclusa, uigore certe indomito permanent, ut pisorum, maiorumque semina. Haec enim omnia ferè pulpis plenioribus includuntur, quò plus temporis ualeant perdurare. Custodia & ad generandum conseruatio fructuum haec est. Carnis autem fructus ipsos ambiens terminus quidam statutus est ad hominis usum, ut dictum est. Nam & succi cum diu manserint atque maduerint, deteriores redduntur. Nonnullis quodam tempore post copia largior datur, ut oliuis post arcturi exortum. Ad id enim temporis usque oleum augete creditur, postea carnis incrementum succedit: & si imbres copiose accesserint, oleum in amurca deterius redditur: & saepe fructu ob eandem causam putrescente, inde accidit. Expectatur oliuarum maturitas, nec statim decerpuntur, quoniam sic confectio & decerpitio difficilior fiat: atque etiam arbores, dum percussis percutiuntur, detrimentum nimirum capiant. Ergo si id uerum sit, caloris naturae datum omnino est, ut oleum, ac succi pinguedine large possit praestare, scilicet cum se congrue ad rem subiectam accommodauerit. Enim uero si calor uehementior sit, non eodem fungi officio potest, sed uelut alienus & adiectitius quidam deficit, uimque omnem succi impellens ad carnem corpus tantummodo increcere cogit. Quod etiam aestate ac hyeme imbrium accessu, & aquis saturientibus accidit, tempore incrementi. Caro enim excrescit, atque ita oleum alimenti nimietate absumitur, nisi secuta serenitas corpus excicet atque attenuet. Sic enim seruari, ampliusque exuberare potest. Quod cum aliàs saepe, tum magistratu Nicodori obrigisse memoriae proditum est. Quamobrem olei profluium longe melius extitit. Tandem enim ex dimidiatis portionibus fluxerat. Sed modos coquendi destinatos esse à natura, hominum usui, ex his ceterisque supradictis, quibus de syluestribus discimus, dilucide intelligi potest.

Quae germine annotino, quae nouello fructificant: tum palma in spica ad frumenti similitudinem parere, & cur ita: necnon cur arbores aliquae alternis annis fructificant.

Caput XXIII



Rufcificant autem aliae ex anniculis, aliae ex nouellis germinibus. Quae quidem naturarum discrimine pro ratione suorum temperamentorum plane inter se differunt. Etenim quae siccae, densae, lignosaeque sunt, haec germine annotino fructificant, utpote cum in his parce influat, & germen adeò debile sit, ut neque transducere, neque retinere humorem

rem

rem ualeat tanquam germen oleæ. Quæ autem humidæ, solutæ, plenæq; sint, hæc fructum nouellis germinibus pariunt. His enim in uniuersum uehementerq; im-
petus agitur: quamobrem simul & germen, & fructum effundere queunt. Cæ-
terum & cum ex annotinis fructificant, pusillo quodam emissio germinis ferient,
nec protinus ex lignoso illo antecedente fructus emergit: quoniam nec ullo pa-
cto aptum id sit fructum parere, nisi temere quicquam fiat. Sed peculiaris maxi-
me, tum præ cæteris generibus seminum, tum præ ijs ipsiis quæ ligno constant,
palmarum generatio est. Non enim annotinis quibusdam, aut nouellis hæc ferre so-
let, sed ijs quæ prægnans gestat, modo spicati seminis fructum condit. Virga enim
10 quæ fructum gerit, quemadmodum spica erumpit. Causam uero siccitatem, for-
mamq; uniuersam arboris dixerim. Cum enim custodiam fructus desiderent, siue
extra consistant, siue intus formati demum erumpant, cæteris custodiam illam so-
lia præstant, ut retulimus. Palmæ quoniam fructus non apud solium hæreant,
concreuant intra arborem necesse est, ut ualidi, formatiq; tandem reddantur aëri.
Quapropter in utero parentis natura partum seruauit, quod similiter atq; fructi-
bus inspiciendis agatur. Spicatio autem communis plurium sit, causam quoque
communem quandam animaduerti necesse est. Sed mirum quod ex omni arbo-
rum genere, palmæ tantummodo frondibus id eueniat. Proprium enim si quid
in ijs sit, quæ generis societate iunguntur, iure admiratione dignetur. Verum de
20 hoc amplius cogitare par est. Arbores autem quæ alternis annis fructificent, nec
singulis possunt, quoad pingui minerua colligendum sit, omnes siccæ, præduræq;
sunt. Adde eas quæ fructum non ex nouellis, sed annotinis ferant germinibus.
Ut enim prius colligatur genereturq; opus est: quæ simul hæc facere, quemadmo-
dum quæ probe materiæ altæq; sunt, minime queunt: quod maxime in olea pa-
tescit. Hæc enim infirmissima & fragilissima omnium est, & decussa perticis, aut
præcisa, uehementer laborat. Qui enim oliuas non ita legunt, sed aut sponte de-
cidentes, aut manu concussas, propius ad fructificandum annuatim oleas accedere
aiunt. Regiones quoque plurimum inter se differunt. Itaque in Alethea fructi-
ficari assidue serunt, quanquam anno tertio discrimen pateat. Quæ ualidiores
30 sunt in earum genere, quæ ramis annotinis fructificant, hæc prout deus tempora
duxit, ita fructus reddere consueuerunt, quemadmodum quæ fructum suis no-
uellis depromunt ramulis. Nam eas quoque temporum rationem cœliq; statum
sectari certum est.

*Cur que bene germinauerint male fructificent: et quod prius, quod posterius signatur:
preterea ærem, solem, et proprietatem arborum in fructuum generationumq;
ratione differentias confluere.* Caput XXV



40 Venit ut cum oleæ bene germinant, male fructificent: cumq; bene
fructificant, male germinant: tanquam natura utrique satisfacere
parti non ualeat: sed necesse habeat absumere alteram, ut alteram fa-
ciat. Peculiare quod siccæ, & uinibus euenire quidam enarrant: hæc
enim cum egregie germinant, tum maxime fructificare dicuntur.
Quod si uerum sit, supradictum quoque uerum esse necesse est. Fructum enim
copiosa germinatio facile detrahare potest, quod uirtute loci, & bonis uinibus ar-
borum fieri potissimò solet. Telluris enim eiusmodi alimentum larga copia est: & ar-
bos quæ ualida sit, facile suo robore attrahere possit, ceu amygdala atque punica.
Quamobrem in arbores debiles germinum lasciua minime cadit, sed modice apteq;
ad fructificandum his germina prodeunt. Quod enim satis fructum præstiturum
sit, id neque excedere, neque deficere in germinando oportet. Ficus autem uitisq;

præcipue candida, modicè uliginem attrahunt, ratione suæ infusmitatis. Solum quoque ut minus frugale sit, opus fortasse est, ut ne soli quidem causa excessus possit ullus accedere. Quapropter in insulis hæc amplius euenire uidemus. Verum rationem illam communem de omnibus debilibus reddi melius est. Huius igitur causam hinc petere omnino debemus. In cunctis autem fructibus pulpa, & pars exterior prius quàm semen gignitur: quod ita sit, non solum quia semina magna ex parte lignosa, nucleosaq; sint, lentiusq; proinde cōsistant: uerum etiam quia semen finis fructificandi est, quemadmodum diximus. Quod autem alicuius gratia est, id prius quàm illud esse necesse est. Rerū enim eiusmodi generatio, nō nisi præcondito aliquo, & ueluti iacto quodam fundamento fieri potest. Quæ de causa non defunt, quibus non singuli fructus semen gerant, ut in uuis acinos minores 10 prospicere licet, tanquam eos natura perficere minus potuerit: quanquam non minus dulcedinis his paruulis, quàm magnis illis concessit. Ex quo planè intelligi potest, quàm rara aptaq; excoqui pulpa fructus consistat: siquidem à sole & aëre, & tempore ipso percoqui atque dulcescere possit: quamq; semen opus naturæ proximius sit. Sed hominibus non æque omnia semina usus sunt, sed alia nulli, alia minimo. Quamobrem fructus qui nucleo uacant, præcipue quarimus, & quoad possumus, tales ut fiant, operam damus: ut cum uuas sine uinaceis nasci molimur. At natura tam pulpæ quàm semini modū præscribere proculdubio uult. Verum tamen exuberauerit, reliquum minus consistit. Quæ quidem res, partim humoris, 20 & ad summum alimenti copia sit. Et hinc agriculturam quoque unice auxiliari diximus, partim siccitatis, spissitatisq;. In totumq; enim alimentorum inopiæ ratione accedit. Atque perfectionis, coctionisq; eorum, ac fortè plantarum etiam omnium generationis, germinumq; prouentus celeris causas illas reddidisse non decet: uidelicet aëris solisq; potentiam, & proprias rerum singularum naturas seu humiditate, siccitate, raritate, reliquisq; generis eiusdem diuersas, seu etiam caliditate, frigiditateq; (nam ea quoque natura sortita est) quarum rerum ceteræ prope sensui planè occurrunt. Calor autem & frigiditas, quia non sensu, sed ratione percipi possint, nimirum dubitantur, atque in crebra obloctione uersantur: scilicet quemadmodum cetera quæ ratione solummodo dijudicare ualeamus. De 30 quibus alia quadam ratione determinasse bene est: quando etiam permultæ res sunt, quæ ad ea principia redigi exigant. Sed eiusmodi omnia ex ijs quæ accedant considerentur necesse est, his enim ipsis ludicare, contemplariq; rerum potestates ualeamus.

De quinque frigidorum, & calidorum causis.

Caput XXVI



Rgo causa calidorum frigidorumq; prima redditur, quæ fructiferum sterileq; genus attingat, quasi quæ calida sunt, fructifera esse possint: ut etiam in animalium genere, tam animantes quàm oua gignētium licet intelligi. Secunda pro regionum natura, hoc est ratione frigiditatis. Contraria enim locis contrarijs posse perdurare censetur, calida frigidis, frigida calidis: sic enim principio naturam etiam ipsam generasse omnia uolunt: quasi res à suo simili, per excessum perire, à contrario seruari maxime possint: uelut medio quodam exultante temperamento, sicuti & Empedocles de animalibus inquit. Quæ enim calida sunt, hæc humidis in locis collocasse naturam asserit. Quam eandem opinionem Meneffor quoque non solum in animalibus, sed etiam in plantis uniuersis secutus est. Iudicat enim calidiora quæ maxime sint aquatilia, ut iuncum, harundinem, gladiolum, à gelu proinde torpere hæc eadem minime posse. Et inter reliqua quæ locis agentibus ualeant perdurare, hæc plus caloris 40 sortiri:

fortiri: ut abietem, pinum, cedrum, iuniperum, ederam. Super his enim nec niuem posse durare autumat, scilicet ratione caloris. Item tortuosa hæc eadem esse, per uertigines ob calorem medullæ asserit. Tertia causa celerem prouentum germinis, fructusq; declarat. Cum enim succus etiam ipse natura calidus sit, fit ut & germina reddi, & fructus concoqui celerius possint. Argumentum huius quoque ederam, & quedam alia capit. Quarta eorū est quæ fronde uirent perpetua: nam ea quoque ratione caloris seruari existimatur: quæ autem calorem desiderant, hæc frondem amittere. Ad hæc ignaria optime, celerrimeq; exardescere notat, quæ ex plantis aquatilibus fuerint, tanquam celerius ignem ædere illa possint, quorum natura plus in se caloris contineat. Hæc ferè de caloris ratione dicuntur.

An calidiora, quæ fecundiora. Caneem ac suem ex calidioribus partu numerofo notari. An contraria in contrarijs maneant. Tum quid inepte Empedocles. Item non uideri argumentum caloris quod mature aliqua proueniunt, aut perpetua fronde uireant. Non esse præterea iudicium caliditatis ignaria: quæq; potissimum argumenta caloris intelliguntur. Caput XXVII



Ed protinus de primo ambigitur, an calidiora sint, quæ fecundiora. Etenim in arborum genere fœminas longe fœcundiores uidemus, quanquam minus calidæ, quàm masculæ constant: quod non cognitione nominis, sed similitudine animalium capere decet. Item animalia quamuis quæ fecundiora sunt, calidiora intelligantur: tamen non è contrario quæ minus fœcunda, frigidiora, ut quæ carnioara, gulosaq; sunt. Sola enim ex omni calidorū genere canis & sus, partu numerofo notatur. Ipsorum autem unigenorum quæ speciem similem expressius gerunt, fœcundiora cernuntur, ut in auium genere: calor enim immodice augere, coarctare, indurareq; membra uidetur. Est autem opus tam ad animalium partum, quàm ad fructuum prouentum, excoctionemq; non excessu, sed mediocritate quadam caloris: siquidem calor nimis exiccet, maioremq; in modum condenset, necesse sit. Quamobrem hæc in ancipitem cadunt opinionem, ac determinationem quampiam desiderare uidentur. De aquatilibus uero quæstio facilius est: res enim contraria, neque alere, neque seruare apta est, sed similis. Vnde Empedocles inepte illud quoque asseruit, naturam scilicet ad locum humoris transfuisse quæ in arido generauit. Quo enim pacto animantes aquarum incolæ, uel quantumlibet temporis persistere in arido potuissent, si modo his nostri temporis similes fuerint? Item quod nostris temporibus in generatione euenire sentimus, rem plenè declarat. Nam uniuersum animalium plantarumq; genus, tum generari, tum permanere suo tantū in loco posse uidemus: quocirca suo quoque loco affici nequeunt, contrario & aduerso affectionibus patent, utpote cum distractio & permutatio magna ita accedat. Præterea opinioniones illæ minime inter se consentiunt. Aquatilia namq; calidiora simul & fecundiora inquirunt esse, cum permulta in aquatiliū genere sterilia penitus esse constet.

40 Rursus quæ germine, fructu ue præueniunt, quæq; semper fructificant, semperq; frondent, calida iudicatur: cum maxime (ut ita dixerim) omnium ferò ea fructificent, quæ frondē perpetuā gerunt, atq; in totū (ut supra retulimus) cum germinetur, fructificetur ue celerius ratione infirmitatis. Nonnulla etiā in germinando, florendoq; plus temporis protrahunt, ut & in annuorū genere senecio patet, ea scilicet de causa, quod mediocritatem quandā alimenti obineat. Quod autē de ignarijs notat, id forsitan non caloris, sed uehementis conflictus potius in iudiciū esse quispiam dixerit, attritus etenim est, qui ignē efficiat. Quod si in huiusmodi lignis humor magis extenuari, conuertiq; in aërem facilius possit, id cōtritus uehementiæ, non caloris in iudicio tribui debeat, illa uero potissimò calida tam sensu quàm ratione percipi possunt.

sunt, quæ pinguis, acris, odorataque sunt: hæc enim caliditatem proculdubio sortita videntur. Quare cum sicca fuerint, spissa, & putredine immunia, durant, & succum pinguem acremque retinent: unde pinus quoque calida, & perfacilis ignitu accedit. Caterum non solum hæc, sed etiam alia pleraque calida esse videntur, ut tilia, & ad summam quæ ferri aciem hebetant. Quin & eiusmodi uirium ratione scrutari calida iudicareque decet, uidelicet cum admodum corporibus, calorem cocturamque aliquam, uel tabem induxerint: aut etiam tactu, gustu uel sensum caloris indiderint. Hæc enim nulla penitus egent ratione, quæ fidem amplius faciat, sed cum medicinæ usu, tum sensus testimonio latissime patent. Parte autem ferè tota, plura ex eo genere locis calidis quam frigidis, aut certe non pauciora proueniunt: 10
quamobrem contrariis generibus id quoque ambiguitatis adiungitur. Sequitur autem alimentum quoddam, quo nonnulla ex calidis, frigidis in locis ualeant edurare, haud quisquam fortasse negauerit. Sed quæ ipsa sint, & quonam modo sic consentiant, determinandum sanè sit, nisi forte uirium beneficio potius quodam, uel radicis, uel totius corporis polleat perdurare, ut pirus atque amygdala: & hinc etiam rigori adeò resistere queant, ut minime conrescere possint. Ac de caloris ratione ex his petenda determinatio est.

DE CAUSIS PLANTARVM LIBRI PRIMI FINIS.

20

THEOPHRASTI DE CAUSIS

PLANTARVM LIB. SECVNDVS.



QUAE de germinatione fructificationeque arborum, atque ex toto plantarum, nondum exposuimus, reddere nunc pari ratione tentandum est: singula secernendo, tam ea quæ certis anni temporibus sponte proueniunt, quam illa quæ agricultura parit & auget. Quippe duo illa genera intelligimus, quorum alterum uelut naturale atque spontaneum constat: alterum artem & paratum, quò esse possit, desiderat. Ratio amborum non eadem est, sed altera naturæ, altera ingenio redditur: nec enim natura frustra agere quicquam potest: & ingenium hominis naturæ auxiliari contendit. Sed cum ea priora sint quæ natura producat, de his differere prius iure debemus.

Quemadmodum syluestria germinant, fructificantque.

CAPVT PRIMVM




ERGO (ut simplicius asseram) summum omnibus arboribus tam syluestribus quam urbanis, & in totum omni plantarum generi ad prosperam germinationem, fructificationemque designatur, cum tempestiuam probamque hyemem senserunt: sic enim germinationes fructificationesque fieri possunt egregie. Hyems illa probatur, quæ imbrium aquiliorum copiam, & nitus frequentiam, & in totum frigora sine gelu obtineat. Cum enim arbores post partum fructuum, exinanitæ penitus sint, repleantur alimenti, id quæ retineant atque concoquant, opus omnino est: siquidem probe germinaturæ, fructificaturæ que iterum sint. Copiam igitur alimenti imbrium largitur frequentia. Retinere posse, ac percoqui, hyems sanè facit, cum diu oppresserit. Radices enim quæ alimentum uberius appetant, per totam arbo-
rem,

rem, quod ceperint, expandant, necesse est. Sed nō prius id expedit, quā ipſum alimentum coquatur, & quaſi in utero geſtetur ſpacio temporis quantum abunde ſit: quod nunquam fieri poſſit, niſi frigus uehementius, diutiusq; adiuerit: mox enim aëris indulgentia germina euocat. Quamobrem aquilonios imbres, non aut ſtrinos accedere iuuat. Et multitudo niuis magnopere prodeſt, ut paulatim colligeſcens ſubeat ſolum, nec uniuerſus humor influxu corrūe unito dilabatur. Ita & terra fermentari optime poteſt calore circumobduſo atq; coërcito. Quod etiam enim ſeminibus uehementer conducit: ſibris enim ſubnixæ, firmatæq; conſtipatæ compreſſæq; frigoris, ſimul ac miſcere tempus inceperit celeriter atque uniuerſa erumpunt. Verum ſemina imbres quoq; æſtiuos, qui paulatim crebroq; accedant, magis requirūt, quia infirma ſunt, per ſummamq; telluris adhærent. Hac enim de cauſa mox ſiccari, moxq; maſcere queunt. At arbores & ualidiores ſunt, & radicem altius agunt, & alimento reſertæ ſunt: quapropter eam rem potius deſiderare uidentur quæ ad percoquendum, germinandumq; ualeat auxiliari. Argumentum huius proſectio illud poteſt deduci, quod nunquam ante uer datur germinandi facultas.


Aquarum copiam prodeſſe arboribus.

Caput II

30  Optiam aquarum prodeſſe arboribus hinc etiam intelligi poteſt. Cum enim imbres copioſe acceſſerint, omnes ferè melius uigent: uerum aut ſtrinis humeſcunt atque imbecilliores redduntur: aquilonijs ualidiores, & ad concoquendum aptiores euadunt, utpote quæ ſibi conſistent & ſuum calorem incluſum retineant. Vbi enim cœlum perpetue placidum ſit, arbores probe germinare fructificareq; ualent: ut in Aegypto, tum bonitate alimentorum, tum etiam quod extrinſecus nihil retorqueat. Cum enim alimentum adeſt ubertas, & cœli clementia, probe germinari fructificariq; ratio eſt. Ad rem tamen quæ omnia hæc uel aliqua ex his faciat, alia quadam conditione forſitan opus eſt. At apud nos, ſi non tempeſtiue germina exeant, ſed copia alimentum, cœliq; indulgentia præcurrant, frigus ſubſecutum officit atque adurit. Quamobrem hyemes poſteriores, arbores uehementè infeſtant: fructus etenim recens æditi, aërem miſem atque benignum deſiderant, quò adoleſcere poſſint, maximeq; inter ſua initia, tunc enim infirmiſſimi ſunt: quod autem eſt infirmum, tutelam, & quaſi officium nutricis deſiderat: quippe unaqueq; mutatio generatioq; tempeſtatem huiusmodi omnino depolcit. Germinis autem florisq; ipſe prouentus, & quicquid eiufmodi, mutationes ac generationes quædam exiſtunt. Et quidem plurimæ in his iacturæ eueniunt, cum fructus aut rubigine infeſtantur, aut perciduntur ac decidunt, aut ad ſummam hyeme tempeſtate ue pereunt. Nam & ſylueſtres tunc uehementè laborant, cum nuper germinibus æditi ſtatuſ uel frigidus, uel calidus nimis occurrit, enimvero uterque partus labefacit, atque interimit. Sed hæc in ſingulis contemplari dignius eſt. Totum autem habitum, ſtatumq; cœli ad arborum proſperitatem hunc in modum conducere ex prædictis pateſcit.

Qui imbres arboribus maxime tempeſtiui, intempeſtiuiq; accidunt.

Caput III

40  Equitur ut de imbribus tempeſtiuiſ dicamus. Tempeſtiui omnium maxime hyberni notantur: quas ob cauſas, expoſuimus. Mox qui germinationem antecedunt, tempeſtiui habiti ſunt: his enim plenius ac lætius germinatio agitur, cum ſcilicet plene omnia ſuas formas receperint, alioquin uites probe nequeunt germinare. Tertiū obtinent locum, qui poſtquam arbores deſloruerunt, acceſſerint: pabulum enim conſumit

mationemq̃ fructibus præstare incipiunt, cum non confectum secuti sunt, sed ubi fructus conualuerunt: alioquin cæteri quidem fructus, aut defluunt, aut certe deteriores, infirmioresq̃ præ nimia humiditate redduntur. Oliuæ autem germi-
nibus omnino intereunt, cum alimentum deducatur ad germen. Igitur intem-
pestiui imbres sunt pessimi, atq̃ ex toto inopportuni, qui circa floris exortum ac-
cesserint. Omnia namque imbecillia redduntur, & omnia fermè aut certe plu-
rima pereunt, deciduntq̃, partim rubigine, partim nimio humore. Quæ autem
resistere potuerunt, deterius florent, paucis exceptis. Quod in fruticum, herba-
rumq̃ genere non minus animaduertere licet, ut in ijs quæ coronaria uocita-
mus, & ad summam in agrestibus, sponteq̃ exurgentibus flosculis. Item ex sati-
uorum seminum numero in leguminibus quæ permanere alterutro ex his utri-
que possunt. Aut enim soliditate tum sibiipsis, tum suo retinaculo indita, ut etiam
rosa & lilium, & reliqua generis eiusdem. Aut quod siccitate totius naturæ hu-
morem præcipiant atque absumant, sic enim euincere possunt: quod autem uin-
cit, id nunquam affici potest. Quibus uero fructus diurniores, plusq̃ alimenti,
coctionisq̃ desiderantes, his seriores etiam imbres tempestiui accedunt, ut uiti, pu-
nicæ, oleæ, cæterisq̃ ad summam, singulis pro ratione perfectionis tempestiuitas
data est. Quamobrem non idem omnibus tempus statuitur, ut hyems ad germi-
nandum, sed aliud serotinis, aliud præcoquibus, ut etiam in frugibus trimestrium
generi, & ad summam omnibus serotinis atque præcoquibus. Omnino imbres 10
aquilonij semper austrinis commodiores sunt. Etenim frigidiores occurrunt, & fa-
ciunt ut plantæ amplius humore sibi oblato potiantur, cum & fructus, & plantæ
ipsæ melius consent, ac ualeant omnes. Item superuacuum detrahunt atque as-
sicant, neque diu id insidens humefacere patiuntur, neque æstu solis concoctum
afficere sinunt. Quocirca flatus etiam consecuti iuuant, & maxime si aquilonij
sint: detergunt enim, & quo potiri amplius sit, efficere possunt. Quas ob causas
nocturni quoque imbres præstant diurnis: fit enim ut plantæ humore potiri
plius ualeant, cum sol non protinus illum consumat. Et tutius quoque sic agi nul-
lum dubium est.

*Qui uenti commodiores sint, et quando: tum qualis ager arboribus competat: hinc
de persica ægyptia.*

Caput IIII



Atio eadem, ut & flatus aquilonij commodiores sint austrinis, & pe-
lagici terrenis, & occidui exortuis, quia frigidiores. Ex toto enim
propè flatus frigidi, commodiores calidis sunt, nisi germina nuper
ædita sint, aut flores provenire inceperint, tunc enim frigidi adurūt,
ut dictum est. Præstant item fauonij & solsticiales, & in totum, austræ
duris flatibus atque inuentis. Alteri enim alunt, alteri insipient, & incrementa
impediunt, sed magis minus ue quisque pro situ regionis uires capeffit. Alij enim
alijs tales occurrunt, ut antea dictum est, quamobrem ex toto serè aquilonij com-
modiores sunt austrinis. Cæterum cum uires agrorum quoque discrimina indere 40
possint, & hyeme calidi, æstate frigidi ueniant, opus sit. Hoc enim modo con-
tra temporum iniuriam subuenitur, ut diximus: nocent uero si temporum qua-
litate similes sint, excessum enim sic sequi necesse est. Efficitur inde ratione sanè opti-
ma, ut non iidem omnibus utiles, noxij ue occurrant. Quapropter alijs auster
officit, alijs prodest: pari ratione & fauorinus, & quisque ex reliquis. Omnia ue-
ro uehementer infestant, qui cum germinatur, continuo calidi aut frigidi inceps-
serint. His enim germina facile suam ob debilitatem intereunt. Omnino locum
comptem flatus commodi esse oportet: qui enim aut nullum sentit afflatum,
aut

aut iniuriæ uentorum expositus est, hic certe incrementi laudem nullam assequi
 potest. Quinetiam cœli habitus ipsi ipsis ferme respondet: ær enim qui media con-
 stat temperie omnibus propè arboribus percommodus est: nam & ad germinan-
 dum, & ad fructificandum plurimū iuuat. Qui uero in alterutram partem excessisse
 rint, partim fructus interimunt, partim etiam totas arbores necant, præterquam si
 quæ sint, quibus ær talis conueniat: non enim desunt, quæ excessu lætentur æris,
 & aliæ caloris auidæ sint, ut palma: aliæ frigus potius adament, ut edera, ut pinus:
 has enim locis feruidis prouenire non posse nullum dubium est. Buxus quoq; &
 uilia locis eiusmodi difficilime prodeunt, ut inter historias dictum est. Ratio non id
 10 si ex calore petenda est: ignis enim quodammodo igni adijcitur sine moderatione,
 quam simile etiam desiderat. Eadem ratione locis frigidis prouenire frigidæ quæ-
 dam nequeunt. Contrariorum quoq; copulandorum modus statuitur ita, ut alia
 germinare queant, alia nequeant: semper enim conuenientiam quandam naturæ
 ad cœlum ambiens esse oportet: quod quidem & in animalium genere commune
 animaduertemus: etenim animalia natura loco utriq; propria delegauit: itaq; alia
 pati qualitatem æris possunt, alia nequeunt. Interdum etiam pabuli conuenien-
 tis inopia deficiunt: nam id quoq; tam animalibus quàm plantis esse potest impedi-
 mento. Forsitan & alias complures causas assignare possumus, quæ diuersæ sint
 proprijs naturis. Sed summam differentiam in aquatilibus, atque terrestribus, tam
 20 animalibus, quàm plantis certe uidemus, de quibus nec rationem ferè ullam que-
 rimus, nisi utra nam sint calidiora frigidiora uel: hoc enim tantum ambigitur, cæte-
 ra tanquam naturæ ratione concessa ponuntur: quæ nunquā perpetua communiaq;
 prius indagare congruum sit: his enim compertis, singula quoq; possint notescere.
 Sed hoc forsitan difficultas prohibeat, siue plures causæ sint, siue una. In singu-
 laribus autem plus facultatis differendi habetur: sensus enim in utranque partem
 principia præbet, & longe amplius in plantarum generibus: quæ nanque in his
 eueniunt latissime paent. Summam uero diuisionem eodem in loco syluestribus
 atq; satiuis animaduertimus: quod satiuæ semper humidiorē, mollioremq; ærem
 querant. Cæterum non desunt, quæ in hoc etiam genere locis calidis, frigidis uel
 30 nequeant germinare, nō modo propter suam debilitatem, uel habitum, sed etiam
 alijs quibuscūq; de causis, ut olea, quia per summa terræ radice cohareat, facile nan-
 que gelu concrefcit. Pirus syluestris locis feruidis, ut in Ægypto, germen nequit
 eminare. Quin & piri satiuæ, & mali hoc eodem in agro paucæ admodum, uitia-
 tæq; sunt: cuius rei causa requirenda est, quippe cum eas calidas esse nullus existi-
 met. Quædam igitur ne germinare quidem possunt locis quibusdam, quædā ger-
 minare quidem, sed fructum nullum parere queunt, ceu persica ægyptiā in Rhoe-
 do: & si per loca ita procedas, fructificare quidem eam comperies, sed parcissime,
 nec alibi, quā in Ægypto large suauiterq; fructum progenerat. Pari modo &
 palmam animaduerte licet, atq; etiam magis circa Babylonem ac Syriam fructu
 40 præcellit. Cœlum enim suam ob frigiditatem alia recipere penitus nequit: alia eo-
 usque potest, ut germinādum tantummodo sit: quædam etiam ad fructificandum
 usque euenire possunt: sed fructum perfici, maturariq; nunquam sinit. Hac eadem
 de causa sici in Ægypto, & omnino tractibus illis, frugis bonæ non sunt: æstus es-
 nim perurit, ut fieri percoctio nequeat, sed terra suo duntaxat alimento crudo hu-
 mefacit. Quamobrem nec iustam magnitudinem poma capiunt. Contra frigiditas
 partim tollit humorem, partim ad conuenientem cocturam perducere nequit,
 quod porro in oleis patescit: hinc enim aliæ fructū nulla carne, sed oleo referū pro-
 fundunt: aliæ carnosum sine oleo præstant, plus enim caloris ad oleum cōcoquen-
 dum requiritur. Cœli conditiones, qualitatesq;, utres huiusmodi præbent.

De soli differentijs. Quodq; solum cuiq; commendetur.

Caput V



Ed cum solum etiam magnas recipiat differentias, de eo quoq; dictum est. Enimuero soli ratio naturæ tribuitur. Et frequenter rei utriusque tum cœli tum soli occasio, feliciter germen educit. Ergo quibusdā in locis, arborum pars imā, optime constat: superna uitiōsa est. Quod fieri solet, cum solum arenosum, uel tolosum, uel adustum quoddam subditū est: his enim radices modum excedunt, sed alimentum nullum ad superiora transmittitur. Et his semē soli generibus, germen negatum est, & si quod uliginosum pernitus, limosum ue sit. Ea uero quæ uires quidem obtinent germinandī, sed fructificare non possunt, non improbe frugum atq; arborum ratione discernunt: ut pin¹⁰ gue frumentis aptius sit, tenue arboribus. Frumentum enim, & omnino quæ annua sunt, alimentum id capiunt, quod summa telluris ministrant, ut prius retulimus: quod neq; exiguum, neq; exiccato facile esse debet. Arbores contrā proficiunt tenui solo, quia radices magnas robustasq; agāt, quibus alimentum ex imis ualeant haurire. Quod etiam in solo pingui facere illæ possunt: tamen alimenti copiam adeo largam aurahunt, ut optime germinare, magnitudinemq; amplissimā accipere possint: sed fructum parere nequeant, quoniam non coquunt, quantum abunde sit: quod in tenuiori non euenit, sed modice tam ad germinandum, quam ad fructificandum hauritur. Atq; ita arbores, utpote robustiores, quam ut oblata copia uinci possint, plenē concoquunt, fructumq; gignunt. Solum tamen, quod²⁰ pingue admodum est, nulli plantæ conducit: exiccat enim plus, quam commodū sit, ut et Menestor autor est. Tale genus terræ illud affirmāt, quod ad abstergendū maculas usui est, coloreq; albicat. Optimū scilicet, quod optimo constat temperamento: & ad summā, quod solutū, humidūq; sit, nec frigore torpeat: hoc enim radicibus aditum facilem præstat, alimentumq; laudatissimū subministrat. Quam quidem rem & mitigationes, & agitationes, & stercorationes uolunt efficere. Sed aliud solum alijs arboribus conuenientius est: ut & diuidere solent. Argilaceum enim, atq; etiam magis candidum, fertile oleis notatur: id enim multum uaporis, flatusq; continet, quod natura olearum desiderat. Pratenſe, & arenaceum uitibus per commodum est: & ad summam, quod solutum, leue, tenue, atq; humidum, ita³⁰ ut aqua cœlestis intestino humori ualeat permisceri. Vitis namq; largam copiam alimenti desiderat, quia calida, laxa, humida, & fecundissima est: forsitan & ob hæc eadem fecundissima. Ad hæc radices humidarum plantarū haud facile putrescere possunt, quemadmodū illarū, quæ suapte natura siccescunt: itaq; & attrahere & resistere, & trāsmittere nimirū ualent. Eodem modo reliquis quoq; omnibus, solum pro naturæ ratione idoneū redditur. Idemq; alijs magis, alijs minus congruum.

Solum pingue parte plurima plantis nocere. Et quod solum optimum.

Caput VI



Erūm (ut simplicius loquar) parti maiori, solū pingue, incōmodum est: exiccat enim supra modum, & hac de causa plantas offendi, atq; ⁴⁰ agrefcere creditur: prodest tamen ijs, quæ macilentæ, tristi, ieiunæq; constant natura. Argumentum quod olera, frugesq; solo tali exuberent, quæ quidem naturæ eiusmodi sunt: ieiuna enim plus cibi desiderant. Quod uel hominum naturam huiuscemodi indicare abunde existimant. Homines enim macilentos, ieiunosq; pingui maxime delectari, eoq; in colore, uiribusq; proficere. Sicca etenim corpora largum, ac pingue alimentum desiderant: sicca autem, macroq; nihil utilitatis accipiunt, quoniam humor nō ad sit, quo perfrui ualeant: quinimō periculum est, ne morbi inuadant, cum alijs, cum maxime qui aluum infestant. Hoc & in arborum genere pari modo animaduertemus, nisi quod

quod arbores sibi similes cōstent: corpus autē recreatum ad plenum, in columenq; habitum transeat. Hæc ergo generalis quædam determinatio redditur. Differentiæ uero tam agri quàm arborum permultæ intelliguntur, quod etiam in uitium genere patet. Alijs enim plana, alijs montana loca magis conueniunt, & in his ipsis aliud alijs competit. Quamuis enim exigua quædā diuersitas sit, tamen summis momentis potest immutare naturā. Verum simplex illud asserere facile est, ut & præcipere solent: solidas spissasq; locis sitientibus ferere oportere, solutas uero & humidas mollioribus atq; humectioribus. Sic enim utriusq; alimēta modice suggererēt, cum altera multum, altera parum desiderent. Et quod in uniuersum de arboribus diximus uerum fortasse est, uidelicet pro utrarumq; arborum natura, genus utrumq; arborum ferere oportere: uerum in singulis exquisita animaduersio, sensus potius notionē desiderat. Enimuero ratione determinare in his haudquaquam facile est. Nam & differentias ratione solis uel ascendentis, uel occidētis, uel medium cœlum tenentis, uel aequaliter se habentis, scire nimirum concedet, ut loca plantis apte distribuantur: tam ex toto quàm ipsæ quæ genus idem cōfortiuntur: quemadmodum uinitores distinguere tentant, cum in conuale aliqua ferunt. Non enim eadem semina loco utroq; deponunt, sed diuidunt. Et quidem plurimum inter est ad hunc modum deposuisse. Pari ratione de reliquis quoq; arbitrandum est. Quamobrem hæc (ut superius diximus) sensus dijudicationem desiderant. Verum (ut simplicius asseram) solum quod medium obtinet confusionem contrarium, id est soluti & spissi, siccī & humidi, leuis & pōderosi, atq; etiam superiora modice inferioribus respondentiā, in his ipsis sortitur, hoc omnium optimum omnibus sermē arboribus atq; frugibus est. Id enim ad aëris habitum propius quodammodo quàm cætera uidetur accedere. Cæterum inter hæc ipsa, quod ad alterā partem uergit, melius est, quod & simpliciter quidam optimum asserunt, ut quod solutum, leue atq; humectum est. Id enim alimentum in se continet, & radicibus meatum facilem præbet: spissum, aut ponderosum, ac sitiens, esse incommodum constat. Discrimen uero ad singula pro diuersitate oppositionum recipiūt: uerbi gratia, solum rarum & tenue, si altum siccumq; sit, arboribus commodum, frumētis incommodum est: facit enim raritas, ut imbres hyberni possint alte descendere. Itaq; frumentū humorem attinere nequit, quoniā per summa suam agat radicem: arbores uero dimissis in profundum radicibus attingere atq; attrahere possunt. Pari modo & si qua differentia eiusmodi alia sit, reddet alicui generi commodum, quod alijs incommodum foret, ratione diuersitatis. Sed nec illi imperite dijudicant, qui solum esse optimū arbitrantur, quod calidum, humectumq; est: ambo enim obtinet ea quibus opus omnino est, id est alimentum, & quo alimentum potest cōficere. Recte etiam post primum imbrem id uaporem emittere aiunt. Sed huius generis aliud humectum esse, aliud siccum: humectū frumentis habile, humorē enim satis id ad alendas fruges habere, ad arbores autem minus: siccum uero frumentale, minime bonū consistere, quia id quoq; pabulo careat quod sufficiat. Eiusdem sermē sententiæ sunt, & qui solum pingue, nec rigidū, nec densum nec falsum esse oportere autumant. Alimentū enim caloremq; adesse necessariū putant, atq; etiam facilem radicibus transitū exhiberi. Quæ quidem omnia ad incrementū, fructificationemq; apūissima sunt. Hoc idem illi etiā sentiunt, qui solum nigrum commendant, ut Leophanes. Causas enim continuo tēta reddere, quod & imbrē & squallorē genus id certe tolerare facile possit, utpote quod capax tam caloris quàm humoris nimirū sit. Ergo uirtutē agri prope (ut antē iam diximus) per eadē quodammodo atq; in eisdē intelligere licet, quibus omnes exponere assolēt. Differentiæ uero cum plures sint tam agri q̃ generis plantarum, conueniēter singulis capere atq; contemplari tentandum est.

*Quæ aquæ è terrestribus probentur improbenaturæ ad plantarum usum:
item quæ falsugine proficiant.*

Caput VII



Quarum autem terrestrium differentias (nam eas quoque non parum conferre ad incrementum alimentumque similiter arbitramur atque supradicta) decet statuere. Ergo in genere aquarum, quæ niterum, uel alumen, uel aliquid eiusmodi sapiunt, plantas neque alere neque gignere possunt, scilicet quoad summam sit explicare, præterquam si qua familiare quicquam ac sibi cognatū ualeat enutrire, quemadmodum mare: sed hoc minimum & propemodum nihil est. Quibusdam tamen in locis aquarum dulcium copia permixta plantas progenerat atque enutrit, ut in aquis Thraciæ feruidis licet perspicere. Per se autem nullius ferè stirpis, sicut nec animalis, secundæ intelliguntur. Mare multa & uaria gignit, & est genus quoddam sicut animalium, ita etiam plantarum, quod nisi in mari inuere nequit. Arborea tamen quæ locis æstuum magnæ frugiferæque exurgunt, alimentum ex mari capere fortasse quisquam negabit, dulcemque humorem radices posse ex terra trahere credet, maris ipsam sine offensa circumuenire, quemadmodum aqua stirpes suas in colas tuissime ambit. Sed de his alia sanè habenda disputatio est, necnon de illis quæ iuxta mare ipsum nascentia falsugine quodammodo ad se nutrienda, corroborandaque utuntur: nam ea quoque sui generis esse animaduertimus, ut præter cætera supradicta quasi medium situm hæc adepta statuere ualeamus. Salsæ autem aquæ nutrire quidem plantas quoque terrenas queunt, sed deterius quàm dulces: adurunt enim, augerique prohibent. Minus uero his arbores infestari quàm olera, quamque omnino annua (ut quidem affirmant) ratio est: arbores enim longè robustiores consistunt. Et sortè non desunt quæ commodius ali eiusmodi humoribus possint, ut palmæ, siquidem his sal aggeratus unice proficit. Cæterum sunt etiam in olerum genere, quæ ab humoribus salsis iuuantur, ut brassica, beta, ruta, eruca: hæc enim cum aquis salsis rigantur, longè meliora euadunt. Quamobrem nonnulli nitro aquæ permixto aspergunt brassicam, ut Aegyptij, atque ita multò dulcior teneriorque efficitur, sicut & si prius quàm coquatur, sale commaceretur. Omnino falsugo commoda huic est: habet enim amaritudinem quandam, quam falsus humor subiens, ac ueluti ora aperiens educere potest: quæ de causâ locis salsis brassica optima est. Amaritudo quippe cum sapore, tum etiam alimentum peruerit. Itaque ea sublata dulcior, tenerior, altiorque brassica redditur, sed cæteris in rebus deterior, quoniam nihil educitur alienum, sed hoc aduritur, quod eius familiare nimirum est. Idem ergo uel in reliquis esse amaris ratio docet, ut in felsagine atque uniuerso genere intuborum. At acris, ut allijs, cepis, ac reliquis generis eiusdem, nihil falsilago conducit: acrimonia enim auferre non potest propter saporis similitudinem: quippe cum simile seratur ad simile, meatusque adeat omnis, ut in his fieri solet quæ maculas detergunt ac detrahunt. Aqua falsa ob eam causam amaris commoda est. Si uero Androsthenes uere de Tylo insula rubri maris narrauit, aquas salas fluentes, plusquam celestes iuuare, tam arbores quàm reliquum omne genus plantarum: & hinc agricolas loci illius statim post imbrem riuus eiusmodi ablueri fata solere, consuetudinem esse: Causam dixerim: hæc enim uelut natura facta in illis est: pluuia namque raro illic aqua descendit, sed defluens enutrit & arbores & fruges & reliqua: unde sit, ut & omnibus temporibus commode inferatur. Sed hæc per suppositionem sint dicta.

De utilitate aquarum frigidarum in plantis : quodq; dulces aque, non dulcibus preferantur:
 & cur dulcis aqua & idonea potui alere uel omnino nequeat, uel non perfecte
 fungatur officio.

Caput VIII



- Quæ autem quæ inter potari idoneas, frigida sunt, principatum non dubie obtinent. Percoquere enim hæc potissimò queunt propter caloris circūobstantiam atq; refrigerationem radicū, quam desiderant arbores. Tales uero aquas esse commodiores, argumentum est, quod olera, & radices, & fructus, & reliqua æque omnia frigidis ad aqua meliora euadunt. Quod fieri ratione uidetur, quemadmodum & inter aquas celestes, nocturnæ, & aquiloniæ præstant : sicut etiam inter ipsos afflatus aquilonij, & omnino qui frigidi ueniant. Eandem enim utilitatem hæc omnia præbent. Et ob easdem causas aquæ flatus uel calidi diffundunt & hume faciūt, & insitum calorem debilitant. Sed forsitan frigidi quoq; excessus tam in alendo quàm in generando situi potest, ut etiam in animalū genere, siquidem alimentum, uiresq; caloris demat, sine quibus seruari uita non potest. Non tamen frequēter neq; in multis detrimentum id euenit, nisi alia quoq; causa damnoſa accedat: neq; enim idem in his quod in animalibus agitur aequalibus. Illa enim humore undique continentur, atq; in humore consistūt: plantæ in terra, & aëre stant: quamobrem cum his aqua sese miscet, nunquam terræ uel plantarum tollit calorem, præterquam sibi aër etiam totus frigidus sit, sic enim germine uiduā ac penitus sterilem terrā esse necesse est. A quas frigidas præstantiores esse his de causis iudicamus. Dulces autem cæteras quæ potari nequeant antecedunt, quia plus alere ualeant. Admixta enim falsugine, uel ali quo huiusmodi sapore contractio, non modo nutriri plantæ non possunt, uerum etiam alijs quoq; detrimentis afficiuntur, ut etiam in animalibus euenit. A quarum mixtura utilis est, cum altera dura admodū & quasi incocta crudaq; est, altera molliſ & placida: uel etiam cum aliquem terrenum saporem secum alterutra affert, ut in turbulentis stercoreosisq; uidemus humoribus. Genus enim plantarum tale alimentū omnino desiderat. Quæ de causa sæpe tenuis puraq; crassæ impuræq; congruere potest: & putealis mananti, & fluens pluuiæ aptissime consocietur. Sed mirabilius certe apparet, si qua dulcis & potari idonea, uel omnino alere nequeat, uel non perfecte hoc fungatur officio, ut in aqua Pyræi agri perspicitur, quod etiā in historiis dictum est. Causam uero ex duobus aliquis petet. Aut enim ex debilitate fieri ita credit, quod minus uerum uidetur, quando aër quoq; alere posse putatur: aut quod saporem aliquem noxiū habeat, qui in gustatu hominem lateret, quod etiam in prædicta aqua potest intelligi. Homines enim qui ea lauātur, leprosi efficiuntur. Et plantæ quoq; proximum quendam accipiunt habitum. Haud enim recte causam in illo esse credideris, quod genus id aquæ nimis alere possit, & proinde plantæ laborent ieiunio, reddanturq; deteriores, utpote quæ obductam pabuli copiam nequeant superare. Sed de his satis,

Arbores sibi quasq; locis gaudere.

Caput IX

40



Oca autem sibi accommoda arbores quarunt non solum illæ quæ operoso quodam peculiariq; habitu natura creauerit (ut antè iam diximus) sed etiam quæ communi uulgarisq; prouentu habentur. Quippe cum aliæ sitientes adament tractus, aliæ humidos, aliæ hybernos cupiant, aliæ soli expositos, & aliæ opacis, aliæ apertis gaudeāt, & aliæ in totum palustribus, aliæ montuosis latentur, ut & diuidere autores consueuere. Sed forte non semper eadem appetunt loca, nec una de causa, sed uaria quadam ratione, ut superiori libro retulimus: quanq; naturæ cognatione quodq; ad locum

proprium ducitur, quemadmodum ea quæ sua sponte proueniunt. Spontaneus autem ortus expressius naturam ostendit, siquidem ex eisdem generationes & nutritiones, & singulorū diuisiones agantur necesse sit, uidelicet caliditate, frigiditate, siccitate, humiditate. Quærent etenim omnia, quod sibi pro suo temperamento commodum foret. Item quæ infirma aut robusta sint, quæq; ima telluris radice subeunt, aut per summa augentur, aut aliqua differentia partium discrepent, hæc pro suo discrimine locum appetunt. Sæpe etiam plures ex his causæ in eadem planta intelliguntur, & plerumq; quod alia habeant, alia non habeant, in causa est. Addo etiam quod similes locum exigant similem, & dissimiles dissimilem, cum scilicet naturæ aliqua diuersitas adest. Quo in genere abies, pinusq; collocantur: altera enim opacis gaudet, altera, id est pinus, apricis. Opacis enim aut nullo modo, aut prauè exurgit. Ergo calidæ quidem ambæ, ut aiunt: sed abies sicca, pinus humida est. Argumentum uel ex generatione picis duci utiq; potest: tum etiam ubertati humoris locus rei expositus conuenit: sic enim excoctio confici amplius possit. Semper autem rei excellentis ratione appetētia sequitur. Ex quo illud etiam cōstat, quod inter congenera, quæ mutuo differre uidentur, discrimen eiusmodi quoddam quærens dum sit. Nam quæ genere dissociata, locum tamen petunt eundē, ut edera, & quæ aquis apposita sunt, quæq; nemoribus gaudēt, facile suam rationē aperiant: edera nanque sicca & calida est. Reliqua uero naturæ penitus cognitione loca eiusmodi concupiscunt. Nonnulla ex his causam uel in singulorum differentijs explicant. 10 Pari modo & quæ nisi frondibus obsepta possint seruari, tum in agresti, tum in urbano genere, ut punica & myrtus: quarum altera sicca, spissaq; est: altera, id est punica, raro nec sicco corpore constat. Fructū enim utraq; nucleosum nec humidum gerit, itaq; soli expositus mox obarescit in umbra autē coalescens, & solem modice sentiens, humorem suum seruare, atq; coquere nimirum potest. Quamobrem & punicas, & myrtos breui intervallo conferere solent, ut se contactu operiant mutuo, atq; solis nimios æstus auferere possint. Tum etiā quod radice numerosa non sint, nullo alimenti raptu mutuo infestantur. At si quæ his aduersa consistent natura, hunc in modum seruētis, ceu uitem & sicum, nunq; certe fructificare tantumdem ualeant. Hæc enim quia humida sint, cocturam certe ampliorem desiderāt. Loco- 10 rum diuersitatem causis hisce tribuimus, ubi nihil aliud impedimēto detrimentorū acciderit: ut apud Tarentum oleæ accidere serunt. Silens etenim spiritus, sensu con- spicius est: quippe pleraq; aduruntur, & conflatu ex mari talis occurrerit, ut inue- cta falsugine corrodantur flores ac pereant. Caligo quoque sine ullo flatu egredi quædam uidetur, quæ ubi flores tetigerit, exurit. Quamobrem uates ne caligo egrediatur, sacrificare consueuerūt, & uetari sæpe sacrificijs referunt. Eadē ratio est etiam si quid commodum uel incommodum ex aère ueniat. Interdū enim quamuis solum sit uiciosum, aër tamen bonitate sui temperamenti suisq; flatibus nimirum aduersari potest, ut dictum est.

Diabius ex causis fructus maturefcere.

Capit. X

40



Fructuum autem cōcoctio, partim caliditate, partim frigiditate perfici creditur. Quæ tamen ex frigiditate sit, per euentum fiat necesse est. Calor enim ubiq; uim obtinet concoquendi. Et simplex quædam cocturæ ratio est, sed nō æque percipi potest, propter circūobstentiam caloris. Omnium enim eiusmodi rerum causas ab eisdem uiribus proficisci putandum est. Verum euenit, ut fructus qui serò perficiuntur, maturitatem hybérni temporis opera capere uideant: quoniam antequam perficiantur, hyems occupet. Serò autē fructus perfici quosdā multis de causis euenit, ut antè iam di-
ximus.

VLO

ximus. Quæ enim natura humidæ sunt, frigiditatem uehementiorem desiderant, ceu uitis, sic enim longe melius coquitur. Quæ autem fructum parit sicciorem, ut myrtus (nam ea quoq; serò suum perficit fructum) leuiorem frigiditatē requirunt. Numa enim exiccat, exacerbâtq; media uero temperies & austri ac humidi spiritus, cōmodissime alunt. Neq; enim fructus natura humidiores, excessus frigorum possunt percoquere, sed alios penitus resiccant, alios insipidos reddunt, ceu ficus. Resistere tamen illi maxime possunt, qui plus habent humoris, ut poma, arbuti: quicq; terreni, acerbi, solidiq; natura sunt, ut glans, pirum syluestre, sorbum. Hæc enim humorem, saporemq; suum serò recipiunt. Adde hoc in genere melspila, & 10 mæla syluestria, & omnino quæ arboribus decerpta maturefcere possint, ut pirum agreste, & sorbum: & si nō eadem maturitate, qua in arbore, tamen ita aliquid dulcedinis capiant, ciboq; reddantur idonea, siue putredinem genus hoc maturitatis deceat appellare, ut in drupis oliuis, seu etiam alium quempiam habitum natura-lem. Cæterum nihil fortasse prohibeat, quo minus externo quoq; calore fructus coquatur, ut sorba, cōm alimentis influxus cessauerit. Prius enim assidue aliquo insu-ente humore fructus exuperare non poterat, præsertim cum frigora impedirent. Postea uero cum amplius nihil accedit, & calor in ipsis fructibus coërcetur, utraq; de causa coctionem iam, immutationemq; capiunt. Nam & qui in arboribus ma- 20 turefcere fructus solent, ut uiaæ, decerpti dulciores efficiuntur, scilicet quod pars humoris diluta, sole absorpta est. Hoc idem in ipsis euenit uitibus, cum uiaæ hu- morem haurire desierint, uel cum senescentes in passas mutentur. Quinetiam in cæ-teris fructibus talis ferè quædam mutatio euenit, alijs magis alijs minus. Nonnulli ē contrario maturitatē accipiunt. Etenim in ipsis arboribus, locis seruidis atq; aprissi- 30 mis, immaturi persistunt: scalpui autem, & oleo illiti (ut dictum est) incipiunt matu- rescere, ut ficus Aegyptiæ. Illis enim ad hunc modum tractatis, humoris, ac spiritus aliquid effluit, & calor admitti amplius potest. In olerum autem genere quædam uel ex toto immatura, atq; incommutabilia permanēt, ut cucurbita. Ergo coctionis, cruditatis uē, ad summam commutationum, quæ fieri assolent, ratio in his est.

De incremento & proceritate arborum: tum quæ fructus amittant an-

te maturitatem.

Caput XI



30 Arborum autē ipsarum, semper quæ locis opacis & afflatu silentibus sunt, proceræ, leues, atque excelliores exurgunt: necnon si breui sitæ sint interuallo, modo eodem adolefcunt. Contra quæ locis, flatibus ac uento expositis, atq; apricis, uel raris, solutisq; exēit, minus tales euadunt. Incrementum enim profunditatis altitudinem uetat, & status exasperant, nodosq; faciunt (ut retulimus) retorsionis & consistentiæ causa: quæ cum illis abdicata penitus sint, incrementum longitudinis tantummodo agit. Quamobrē illa etiam quæ nō æque erecta, neq; excelsa surgere apta sint, eiusdem naturæ habitum profectō accipiunt, quo erecta excelsaq; constant, cum hospitata 40 locis huiusmodi fuerint, ceu quercus. Laues etenim, rectaq; & propē abienibus æquales euadunt: ut apud Aemum montem fieri referunt. Tum etiam solutiora, humidiora, imbecillioraq; his locis conficiuntur, quia neq; ex sole, neq; ex flantibus, uel frigoribus densitate possint suscipere. Amittunt maxime suos fructus anteq; maturauerint, ficus, palma, atque amygdala: quod accidit aut alicuius interclusi huius moris causa, ut ficus amittit: aut quod nexu infirmo fructus dependeat, qui mole grandiuscula est, ut amygdalæ, mæla, pira: nā quodlibet humefacere atq; debilitare eos facile potest. Tum etiā status interdū uehementes inuadunt, ut nihil resistere ua- 50 leant. Punica flores facile amittit, quia nexu eorū debilissimus est. Itaq; cum guttæ, pluuie, aut rores in eos deciderint, subeuntes quoquo uersus humectant, labefa-

stant. Quae de causa deducere arbores solent, nec in excelsum eas excurrere sinunt, ne flores in erectum formati humorem suscipiant. Quidam etiam uirgas e contrario feri praecipiunt, ad rationem, ut se subinde ualeant inclinare. Humorem iacturae causam esse, hinc etiam intelligi potest. Piri enim atque amygdalae etiam si non pluant, dummodo aer austrinus, nubilusque sit, amittunt & flores & primos fructus, si continuo postquam defloruere, illud acciderit. Sed horum, ceterorumque similium ratio in nexu, moleque est.

De caprificandi ratione, & culicibus: item arbores ferotinas fructus suos non perdere.

Caput XII



Icorum autem & palmarum non solum in his, sed etiam in intervallis animaduertitur. Quapropter ficos caprificat, quod ea de causa facit, ut culices parui, qui ex caprificubus appensis nascuntur, poma sici aperiant. Generantur enim ex putrescentibus illis, sed simile alimentum quaerentes euolant, atque grauidae grossis assident. Quod idem plerumque euenit, & si non caprificus appendatur, modo caprificus ipsa proxima sit, in qua culices fuerint procreati. Ideoque caprificus in extremo ficis conseritur maturis, matura: serotinis, serotina: medijs, media: ut pro suo tempore singulae caprificationem obtineant. Atque ita caprifici adijciuntur satus, ut culicum aduolans secundo uento effici possit. Cum autem morsu crebro culices ora ficuum aperuerint, humorem absument superuacuum, & auditum liberum auris praebent, & omnino poma spirantia efficiunt. Euenit enim, ut cum calore illo conficiente, spiritus quoque aliquid inter se faciat: ut in his euenit quae igne coquuntur, quo spiritu semoto una cum humore exactoque fructus permanent. Causa namque amittendi haec sunt. Culices autem & gigni ex caprificubus, & rursus easdem subire, ratio est. Gignuntur enim, quia caprifici maturare atque perficere nequeant. Ut enim in ceteris putrescentibus genus aliquod animalis concresecit, ita etiam in his uiuifica quaedam natura est. Sed cum alimentum careant, quaerantque quod sibi conueniat, feruntur ad id auidae quod simile est. Omnibus enim rei cognatae desiderium natura iniicit, quemadmodum & pediculus sanguinis, ex quo putrefactio nascuntur. At solo macro, & aquilonio caprificatio haudquaquam desideratur: quia propter alimenti exiguitatem sponte poma siccantur. Nec ubi solum ita sit temperatum, ut modice alere possit, usus caprificandi est (satura enim non nisi ex cruditate sequitur, cum uis coquendi superare non potest) nec ubi multus pulvis, nam uis siccandi pulueri quoque posita est. Sed absurdum appareat quod flantibus aquilonibus potius, quam austrinis, sici fructus amittunt, cum longe sicciores sint aquilonibus. Ratio uero quod ficus plus condensatae nequeant exhalare, tum etiam succus fortasse intus concresecit, hanc enim & foliorum profluuium causam nonnulli assignant, ut dictum est. Quae autem serotinae admodum sunt, fructus nunquam amittunt, quia sero germinare incipiunt. Fit etenim temporis ratione, ut spiritus non amplius interdudi, coercerique possit. Calor enim se colligens atque resistens exuperat, tum etiam genus id siccum natura quodammodo est, seroque proinde humescit, quamobrem & ad aquari hoc exigit, & aquam sustinet magis. Quod si reseratio faciat, ut spiritu exacto, admissio uel, & humore assumpto poma ualeant perdurare, similiter atque in aegyptia sico euenire quodammodo dixerim.

Utrum caprificatio inuenta sit, ut ficus se comprimant, an ut reseretur: item esse sicos quae caprificatione non egeant.

Caput XIII



Erum id apud nonnullos ambigitur, quasi culices cum grossos subierint, non reserent, sed potius comprimant. Itaque causam e contrario inserendam existimant, tanquam ea ipsa de causa caprificare oporteat. Nam si comprimantur, neque rores, neque ullae pluuiae guttae possint admitti, quibus seruescens satura sequetur, sicut & flores punice decidunt.

dunt. Causam hanc esse uel inde significari abunde credūt, amittunt etenim magis cum imbres senserunt. Argumentū uero quod caprificatio cōprimendi gratia adhi beatur, inde accipi potest. Enim uero si caprificubus carēt, quas arboribus injiciant, arena inspergunt, ut se fructus comprimere ualeant. Pulvis etiam idcirco iuuat ad perdurandum, quia puluere asperso, protinus comprimanitur. Quæ autē feriō fructificentur, non illo eodem tempore aperiūtur, sed se comprimunt atq; possunt durare, nec ullo modo caprificationē desiderant, cum iam uires conceperint, tum etiā temporis immutatione sese aperiunt, nec amplius decidere possunt. Causa igitur utroq; modo accipi potest, sed hæc nihil inter se inuicem repugnare quispiam fortasse putauerit. Cum enim imbres accesserint, grossi in firmiores redduntur, plusq; humoris contrahunt; quo tandē inflato, iactura continuō sequitur, & arena inspar gunt, ut humorem possint absorbere. Ob id & puluerem iuuare existimant, hoc enim humorem posse absorbere qui causa est, ut grossi decidant. Ergo si nulla in his contraditio sit, causa in illo proculdubio est. Si uero contraria hæc inter se sint, eue nient potō ut altera quidē ratione rei principium intrinsecus sit, altera autē extrin secus, scilicet illa humore quo ea maxime decidunt, quæ non prona, sed erecta con sistunt, ut flores punice. Quinetiā ex his ipsis causas oriri aliquas laborantibus morbo uersimile est. Sed morbus cōmune fortasse uitium omnū fructuum est. Comprimendi autem causam cum subeant culices, aliquam reddamus necesse est: nam humorem intestini depasci à culicibus, utpote pabulū aptissimum illis, uerum est.

Quamobrem ad perdurandum plurimum iuuat, quanquam ficus reddat deterio res: quippe cum pastu culicum illo exinanitæ, humore lacteo amplius trahant. Quapropter sunt qui caprificandum non censent, imō uero cum uendunt, clami tant, ficus se uenundare non caprificatas: & plurimum id referre putatur. Item fla nibus aquilonijs minus posse decidere oporteret, his enim magis se comprimūt, nisi forte quod his siccetur, dehiscere arbitradum sit. Plures igitur obiectiones primum illud recipere posse apparet, nisi forte ratione utraq; res fieri possit. Esse autem quæ caprificatione non egeant, absurdum non est (ut antè iam diximus) cum modus aëris, alimentiq; adsit. Nam humorem per totum hoc genus nimium esse, uel ex ipsis erraticis constat. Cruditas enim illa non nisi ea de causa fieri intelligitur, & eas quoque solent caprificare, ut ualeant permanere. His eisdem de causis, & his terq; nonnullæ fructificant, scilicet alimenti nimietate. Primis enim decerpis ficibus, aliæ facile prodeunt: & his rursus detractis, aliæ subnascuntur, quia humoris non desit ubertas, atq; eatenus facultas procreandi accedit. Vt uero non praua let propter excessum. Solum enim hoc genus ex syluestrium numero aut certe cum paucissimis fructum surum nequit perficere, nisi fortè finem eius hæcenus na tura descriperat. Sponte quoque naturæ id potest consistere. Sponte autem na scentium generatio non semine modo agitur, sed aliqua etiam putrefactione, uel potius terræ alteratione: quamobrem id etiam genus frugiperdæ quis nuncupa uerit, ut salicem Homerus cognominat. Nam cætera tamen fructum uisu inco gnitum gerunt, tamen perficiunt & maturant, prout natura sua pergere apta sit. Sed enim hæc proprietates quædam dirimens illa à reliquis possit intelligi. Quod au tem palmarum generi cūuenit, non idem est. Gerit tamen huius rei similitudinem quandam: quapropter caprificari illas quoq; fieri consueuere. Flore enim à mascu lo, & puluere, & lanugine cum fructus insperguntur, siccitatem ex caliditate, ac reliqua potestate concipiunt, atque spirantiores redduntur: quibus causis uis per durandi acquiritur. Huic quodammodo simile in piscium quoque genere euenit, cum mas æditis ouis, uitale surum uirus aspergit. Verum similitudines uel ex remo tis generibus petere possumus.

Cur in syluestribus eiusdem generis alie steriles, alie fructiferae habeantur: de q̃
uitis & ficu amplitudine.

Caput XIII



Vamobrem autem inter congeneres agrestis ordinis alie steriles, alie fructiferae sint, quae quidem foeminae maris uel sexu appellantur, illa profectio causa redditur, quam prius de sterilibus expoluimus, quod propter spissitatem & uirium bonitatem, & molis totius largam nutritionem, infœcundae reddantur. Euenit namque ut eiusmodi arbores omne alimentum ad se nutriendas absumant. Cum enim fructificatio partem superuacuum alimenti desideret (hac enim fructus exoritur, sicut in animalium genere semen effici solet) si se aliorum assidue pars illa conuertat absumaturq̃, tolli generationem necesse est. Haud enim natura utriusq̃ parti satisfacere potest, cum alimentum quantum suffecturum sit capere nequeat. Quibus igitur hoc interdum eueniat, haec tantisper infœcunda redduntur. Quibus autem natura protinus ad fructificandum pertenderit, haec fructum egregie pariunt. Quamobrem & inter agrestes non desunt, quae quamuis eodem in genere contineantur, tamen modo supradictio se habeat: quae scilicet robustiores, spissiores, atq̃ maiotes se res semper alimentum ubertate efficiuntur. Omnes enim penè quae ampliore magnitudine se attollunt, minorem generant fructum, ut ficus Indica uocitata. Haec enim cum miram quendam magnitudine sit, fructum exiguum admodum, eundemq̃ paucum fert, ut quae ad germinandum totum absumat alimentum: etenim folio amplissimo est, & radice cum uero ab eius folijs demissarum generatio nutrimenti copia uidetur accedere. Sed forte ediuerso, ut quoniam in ea quoq̃ pabulum dispensatur, idcirco fructus exilius atq̃ parcius proueniat. De radicibus abunde alibi disseruimus. Inter eas uero quae solum fructum progenerant, sola uitis & ficus incrementum amplissime capiunt. Vitis enim porrecta materia in quancumq̃ partem deuenire facile potest, modo solum obtineat probum ac fertile. Ficus autem se in altum attollit, & ramoso admodum corpore amplissimum occupat locum.

De uitis longitudine, brucitateq̃, & fructuum ratione.

Caput XV



Itam quoq̃ longiorem arbores infœcundas, quam foecundas, & pauciferas, quam multiferas sortiri ratio est, scilicet cum non imbecillitate aut humiditate, aut aliqua eiusmodi causa steriles, uel pauciferae sunt, ut quae aquis appositae uiuere consueuerunt, quaeq̃ nemorosae uel solutae, proximèq̃ putredini constant, ceu laurus. Haec enim, & quicquid eiusmodi, redigi ad praedictas rationes oportet. Fructificatio uero magnam atque potissimam partem naturae detrahit: quod etiam in animalium genere patet. Enimvero quae plurima pariunt, celerrime consenescent ac pereunt. Porro uel in his ipsi arboribus laeuissime identidem liquet. Quae namque seracissimae atque foecundissimae sunt, citius omnino senescunt: nec secus inter congeneres, ut uites, ficos, & reliquas euenire sentimus. Quae autem steriles, uel paucis fertiles sunt, haec ferè omnes perenniores notantur. Fit ergo interdum uel potius frequenter, ut arbores ex uberrima fructificatione languescerent arescant, quod uibus potissimum accidit. Quancumq̃ & reliquae omnes multiferae idem sentiunt, quoniam uis tota naturae consumpta in fructibus sit & frugibus. Et omnino annuis hoc idem euenire uidemus: & causa haec est, ut annua consenti natura. Cum enim fructus perficiuntur, radices protinus exarescunt, quoniam uis naturae tota consumpta eiusdem de causis sit. Arbores autem aut non tam citò flaccescunt, aut certe non ita, ut uitium deprendi possit. At cum tempus uernum extiterit, res conspicua sit, & celerius certe si quid ex aëre tale accesserit, ut opprimantur, assilganturq̃ arbores.

res.

res. Nec solum quæ ad hunc modum exuberauerint, sed etiam quæ large fructificæ
cauerint, laborant sæpe atque intereunt. Quodq; enim exinanitum effectumq; im-
becille est. Imbecilli autem etiam quod minus ualidum sit, officere potest. Quam-
obrem culta celerius, quàm inculta senescunt, & meliora quàm deteriora, & ad
summam urbana, quàm syluestria. Quamquam absurdū fortasse appareat, si quæ
magis coluntur, celerius occidant. Verum cultura non uires auget, sed partum
fructuum qui arbores necat. Vitæ autem longitudo uirum ratione consilii. Va-
let autem uiribus quod spissum atque sterile est. Quapropter Thasi cum agros
mercede sibi conducunt, de cæteris quidem annis minime curant, imò fraudare
10 conantur: de ultimo uero diligentissime literis notant, ut dominus agrum recipere
debeat. Idem uel in animalium genere patet: quæ enim fecundissima sunt, his
uita spacio breui describitur: quæq; plura quàm solent pepererunt, sæpe intereunt:
& potissimò gallinæ, scilicet inter ea, quæ cum hominibus uiuant. Igitur breui-
tis uitæ ratio hæc est. Contraria uero longitudini uidelicet dantur, ut dictum est.
Adde quæ quamuis non large fructificent, imò pleraque infœcunda penitus sint,
tamen sua imbecillitate facile pereunt, quemadmodum in annuis patet, ceu cucu-
mis, de qua prius quoq; retulimus: hæc enim ne ad naturæ quidem suæ perfectio-
nem accedere possunt. Porro etiam in arborum genere non desunt quæ ob rari-
tem infirmitatemq; facile pereant, quamuis non copiose fructificent, ceu laurus:
10 hoc enim in genere, illa quoq; musci fertilis est, fructu uidua.

*Quæ in arboribus partes primum intereant: licet Democriti opinio de arborum etate: atq;
de earum uita contra eundem.*

Caput XVI



Erum nō simul cunctis suis partibus occidit, sed particulatim tam cor-
ruptio, quàm senectia occurrit. Pars enim propemodū quæ maxime
crassescat, putrescit ac perit: nepotes tamen complures exungunt, ut
res quodammodo proxima sit ramis arborum qui exarescūt. Sed in-
terest quod his pars principalis intereat, illis uero ex ijs aliquid quæ dependent.
Verum quoniam regerminatio ab eadem ducatur origine, idcirco arborem quo-
30 que eandem esse censemus, qua de re antè iam disseruimus. Arboribus uero in-
ualidis, corruptionis initia, uel iniuria ictus, & flatuum uehementia, & alijs eiusmodi
di causis reddere licet. Quod enim debile est, ex multis commoueri facile potest.
Et si super debilitatem fertilissima quoq; natura sit arbor, ut punica, & mālus uer-
na, magis quoque ita fiat necesse est: quippe cum ex utraq; ratione noxæ oriuntur
principia. Et mālōs quidem uermiculari etiam celerrime constat: & celerius dulces
hanc offensam accipiunt, & omnino senescunt. Nec solum mālī, sed etiam punicæ:
absumitur enim pabulum, quod natura commodissimū præstat: tum etiam alteræ
earum uelut agrestes, alteræ urbanæ consistunt. Nucleo quoq; uacantes celerius
quàm nudeatæ, & quæ molli nucleō sunt, celerius quàm quæ duro. Et in myrtis
40 uero cæterisq; pari ratione intelligendū, plus enim naturæ detrahitur. Et in totum
istæ debiliores, solutioresq; sunt: unde fit, ut & fructificare maturius ualeant: quod
enim debile est, oeyus, ampliusq; moribus cœli obtemperat. At quod Democrito
placet, recta & minus uiuere, quàm tortili corpore uibrata, & maturius germina-
re eisdē posse de causis (Alteris enim celeriter alimentū transmitti, quo germina fru-
ctusq; proueniunt: alteris uero pigre, quoniā per partem eminentē expedire non
possit, sed ab radicibus nutrimenti omnis cōsumatur copia: hæc enim radice proluxa,
crassaq; inherere) haud recte placere appareat. Radices enim restarū arborum im-
becilles affirmat, atq; ratione utraq; fieri ut celerius pereant: desuper enim ad radi-
ces, cū frigus, tum calorē causa recti tramitis sine mora descendere, eademq; radices

neutrum posse sufferre ratione suæ infirmitatis, omnino arbores huiuscemodi magna ex parte subitus senectam sentire incipere, propter radicū imbecillitatem. Item partes quæ super terrâ extant, cum afflatus debilitate flectuntur, radices funditus commouere, quo facto disrumpi atq; feruescere, ita arbore totâ perire. Hæc Democritus. Sed minus recte asseruisse appareat, ut dictū iam est. Neq; enim quod de radicibus inquit, uerū est, ut superius proposuimus, uidelicet arbores uitæ perennis proluxa crassâq; firmari radice: nec enim sicus, nec cæteræ quæ proluxa crassâq; innituntur, uitam obtinent longam: neq; directæ erectæq; breuem habēt uitam, ceu abies, palma, cupressus, nec amplius augescere, maturius uē fructificare has cōstat eisdem. Atqui hæc etiam sequi protinus oporteret, cum sint tales meatus, & radice non proluxa agantur. Quicquid enim ab eadem dependet causa, eandem res sequi necesse est. Igitur nescio an id causæ sit, nec potius quæ antè iam diximus: quibus etiam difficultas nascendi, & exiguitas atq; paucitas fructuum, & omnino firmitas plantarum dignoscitur. Densitatem, siccitatem, soliditatē atq; pinguitudinē causas dixerim, quibus & uitæ perennitas, & reliqua omnia generis eiusdem debeant assignari. Aduersa uero his ipsis, ex aduersis oriri necesse est. Quæ autem cum ubere fructificēt, nō tamen breui tempore uluūt, nec citō senescūt, ceu pirus, amygdala, quercus, hæc uel in grandiore ætate fecundiora redduntur, ut dictum est. Vinbus enim detractis, alimēti quoq; nimia ubertas detrahitur, atq; ita reliquum pabulum percoqui dispensariq; facile potest. Tum etiam intermissio fortasse aliquid confert, aut omnibus, aut certe aliquibus. Pirus enim atq; etiā magis amygdala, prima quidem specie fructum gerunt abunde, sed sæpenumero educare quæ progenerauerint nequeunt: quippe cum in perficiendo sit potissimū labor ac difficultas. Morus autem leuem quandam dilutumq; fructum, & minime pro sua magnitudine amplum creat. Sed uidet arborum diuturnæ hæc pro causis habean. De fertilitate dictum iam est, quod calidæ, solutæ, humidæq; fertiliores.

Cum semina, quo minora, eo feraciora inueniantur.

XVII



Elimina uero (ut simpliciter transigam ratione) quo minora, eo fertiliores. Etenim quæ minima sunt, maxime fructificare uidemus, ceu milium, erysimum, papauer, cuminum. Ratio (ut in uniuersum dicamus) quod facilius minora effici possunt. Copia autem facilitati adiudicanda est, uel (ut è propiori sumatur) quod eiusmodi omnia facilius augescant, celeriusq; aeris qualitati obtemperant. Argumento temporis quoque breue perficiendi accipi potest. Nam & semina ipsa (ut summam asseram) hæc eadem de causa fertiliores, q̃ arbores sunt, & inter ea magis legumina q̃ frumēta: ocyus enim crassantur, perficiunturq;. Item eorū caules magna ex parte ualidi sunt, nec ligno constant, nec simplices prosiliunt, sed plusculi, atq; in ramos diffusi. Quas ob res rationis est, ut & fructus large sequatur, præsertim si radices non succum auocent, ut in genere ferulaceo capitato uē agitur, sed assidue quod ceperint, sursum transmittant. Quod & in leguminibus, & in alijs plurimis fieri solet. Hæc enim radice singula figitur, nec deorsum latefcūt, sed superiora uiribus omnibus petunt. Verum maxime (ut ita dixerim) omnium cuminum, huic enim radix exigua penitus est. Quæ tamen ex his radicibus ualidā agant (non enim desunt quæ ita se habeant, ceu milium, panicum) hæc pro suæ radicis modo caules reddunt, uidelicet à ualidis ualidos atq; multiplices. Quapropter cum à principio exiguo multi prouenerint caules, fructum quoq; abunde profundi ratio est: sicut & in hordei atq; tritici genere, cum ex uno plures culmi prodierint, sic enim plures spicas emergi necesse est. Hoc idem uel in oleribus patet cum seminis copiam ferant, & radice ualida sint. Alia enim caules

caules plurimos edunt, alia caule uno edito in ramos sparguntur: omnia enim possunt ubi suos emisserint caules, in arboris speciem transeunt. Undique uero atque ex multis multum colligi fructum ratio est. Cum ergo ita contigerit ut & cœlum placidum sit, & natura sursum nitatur, nec radices euocet quicquam, sed iuuent, atque solum rarum, solumque adlit, hæc cæteris fecundiora euadant, ratio est.

Faba imbecillissimum leguminum: sibi item purgationes arborum & tonsuras conferre ad sua facilitatem: cur mutatio contingat in fructibus. Caput XVIIII



- 10 **I** uero faba & aliud quicquid in leguminibus minus fructificet, imbecillitati certe tribuendum hoc est. Qua de causa maturius hæc ferere solent, ut priusquam hyems sit radices concipere ualeant. Faba tamen adeo detrimentis multis frequenterque obnoxia, ut quamuis mature prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Imbecillitatem eius uel sensu percipere licet: est enim corpore soluto, eualido, nec radice numerosa subniscitur, quas ob res a quauis causa offensa transigi facile potest. Causas copiosæ fructificationis tam annuis quam diuturnioribus plantis his rebus determinasse par est. Nam & purgationes prædilationesque arborum, fructus copiam præparant, cum superuacua & ex crescentia illa partim fructum prohibeant, partim alimenta absumant. Itaque his detractis libere ad fructificandum natura suum impetum facit. Qua de causa nuces
- 20 auellanas tondentes refecantesque fructuiferas efficiunt: alimentum enim totum ad incrementa consumunt cum arbore scunt. Mutationes autem fructuum cœli solique ratione fieri constat, enim uero per hæc atque ex his alimenta omnibus suppeditantur. Alimentum uero plurimum ad consiciendam similitudinem ualet, siquidem & in animalium genere, partus feminae similis hac ratione reddatur. Nec solum semina plantarumque mutari uidentur, sed etiam animalia: & quodammodo magis hæc quam genus plantarum, quandoquidem formas pro locorum habitu capiant. In fructibus tamen non æque id percipi potest. Cæterum hi quoque mutantur & maxime in colore, magnitudine atque sapore. In colore, ut femina: nigra enim in candida transeunt, & candida in nigra. In sapore, ut arborum fructus: coloris enim mutatio uel
- 30 nulla conspicua, uel certe non æque his euenit, nisi tota arbor mutata sit, ut ex nigra in candidam transeat, quod interdum his euenit, quæ semine prodierunt. Sed cum defectio ista communis æque animalium plantarumque sit, causam quoque communem aliquam queramus oportet. Nam illud etiam commune animalia cum seminibus habent, ut non protinus, sed tertio partu mutentur. Etenim omnia paulatim sensimque alterantur, a suaque natura discedunt. At in arborum genere eduerso agatur ratio est. Hæc namque principio infirmissimæ sunt, & præcipue quæ prouenerint semine. Sed absurdissima mirandaque omnium maxime in arboribus mutatio in melius esse appareat, ut in Aegypto atque etiam magis in Cilicia punice meliorescunt, & myrtus suauem odorem circa Aegyptum acquirit. Mutatio enim in partem deter-
- 40 riorem numerosa & ubique gentium perspicua est, quocirca illud uehementer mirum. Fit ergo uel in seminis genere, ut in melius transeant, per melius ipsum quasi simile est. In hoc enim discrimen exultat, quod aliis idem permaneat semper, aliis uarie immutetur. Nam quod euenit idem est. Detrahitur enim aliquid naturæ assidue a ui quæ genus utrumque pari ratione deuincit. Hoc enim animalium generi etiam euenit, quippe cum ex candidis transeant in nigra, & ex asperis mollia reddantur. Sed cum in his causam partim aqua habeat partim cœlum, & ad summam qualitates alimendi, in illis quoque ubi cumque aliquid tale eueniat, proximam eandemque necessitatem arbitrari par est. Singula uero tunc magis & forte tantummodo non esse aliquis ualeat, cum & agros & loca expertus studio commentandi peragrandique fuerit.

Cultura immutari uim naturamq; plantarum: deq; mutatione arborum, quæ radicem occasione uitio ue contingat.

Caput XIX.



Roximum sanè huic uidetur, quod ex cultura mutari potest. In primis quidem, & quoad uniuersum exponi licet, cum miscescit, mox uero cum eodem in loco meliorescit. Quippe cultura lætatur, cum minori nucleo reddantur (ut dictum est) & omnino meliora euadant. Prorsus granata dulciora, mollioraq; aquatio facit. Acerbitas enim atq; duritia tale desiderat auxilium. Quod enim indigum est, iuari desiderat, atq; id solum bisarie agitur. Aut enim per additionem quandam, aut per deductionem alterius, sicuti dictum de amygdalis est, quæ castigantur ablaqueanturq;: & de ficis quæ per fissio caudice meliorescunt. Sublata enim nimia alimenti copia, calor insitus amplius in residuo ualet. Sed peculiaris in primis mollitio quæ radicibus exhibetur, appareat. Stercis enim suillum, uel quod uim proximam illi obtinet, radicibus punicarum superiniecitū dulcem efficit succū. Quinetiā copia & frigiditate aquæ mutationē afferri aliquā dicitur: sed omniū maxime euidentissimèq; locorum quorundam, atq; cœli naturæ mutationis causam habere notantur, ut in Aegypto atq; Ciliicia. Nā & illis certe in rebus alterationes mutationesq; perquirendæ omnino sunt, solo, aqua, cœlo, cultura. Deniq; agricolatio arbores fructusq; mitigans, mutare mirum ualet. Ergo de reliquis alias quasdam reddere rationes oportet. De mutatione autē quam radix impertiat, cuius gratia hoc in loco differimus, accipiendum illud censemus, radices tanquam elementa quædam esse arborum, elementorum autem conditionem cætera omnia sectari necessarium esse. Quamobrem de cucumeribus dictū est, quod seminibus in lacte, mulso uel maceratis, dulciores redduntur. Addo etiā alimentum coctius à radicibus accipi, mutatisq; ipsis fieri, ut tota quoq; arbor mutetur. Ab his enim alimentum omne transmittitur, dispensaturq;. Nam & aquæ copia, & solum, & cultura, radices primum attingit, atq; hinc initio principio cætera subinde immutat. Fieri tamen potest, ut alia ualeant alijs auxiliari, ut discissio ficis, & amputatio uiribus, & diminutio amygdalis, uel ictus paxillo ad actio. Humore namq; superuacuo defluente, reliquus calidus coqui atq; dulcescere potest. Inoculatas autem arbores mutari nō dicimus, quoniā aliud illarū principium habeant, quod deuincere nequeunt. Surculus enim, qui uel inseritur, uel inoculatur, truncū subditū loco telluris usurpat, ut antè iam diximus. Atq; ita duplex mutationis ratio intelligi potest, id est quæ radicibus, quæq; inoculatis, in sitis uel truncis tribuitur. Altera per alterationem partis subditæ, altera per aliquorum adiectionem. Quamobrem hæc minus miranda est. Sed cur punica maxime immutatur, causam raritatis imbecillitatisq; recte dederis: quæ namq; huiusmodi sunt, facillime mutationem accipiunt. Cogitandum tamen, an aliam quoq; naturæ aliquam proprietatem licet assignari.

Prænam causam mutationis in deteriorem partem esse negligentiam: tum quæ diminuta meliorescant.

Caput XX.



Mutationum autem in partem deteriorem causas prædictis esse contrarias constat. Sed euidentissima & communissima omnium negligentia est. Omnia namq; serè neglecta immittesunt. Interdum etiam fit ut quasi manca læsæq; fuerint, in deterius transeant, cum scilicet principio nascens quicquam diminuitur, ceu amygdala. Hæc enim amara ex dulci, & dura ex molli sic redditur. Cætera mutationē manifestam nullam suscipiunt, quanquam plantæ quidem uitium a deo interdum laborant, ut omnino perireundum sit. Quocirca mutari quoq; illas magis debere uerissimilius esse uidetur.

Amygdalam

Amygdalam enim posse mutari uel ex toto, procul abesse à ratione appareat: est enim arbor satis robusta. Non tamen desunt, quæ diminuta posse meliorem dicant, ut de piro Phocide Chij referunt. Amygdalæ igitur uires non in eadem arbore accipi debent. Diminuta etenim ualida, nascens inualida est: præsertim si semine prodeat: quippe cum sæpe etiam non diminutæ, amaræ duræq; efficiantur, ut antè iam diximus. Omnino enim omne, quod prouenerit semine, degenerat, deteriore scit: & si eius impetus naturalis motu aliquo immutatus sit, magis magisque ita fiat uerisimile est: quippe alius quasi, atque imbecillior redditur. Nam & quæ in aqua coquantur, si importune moueantur, quo minus percoqui possint, impediuntur. Et terra quoq; eadem de causa ægre madescit: quod enim inter initia agitur, summū, & ad rei perfectionem spectatissimū est. Nec absurdum sola in ea maxime mutationem parere, tum propter rationes prædictas, tum quia neq; uitis, neq; alicuius ex cæteris fructus dum perficitur, amarus, uel acidus sit: sed aut dulcis, aut nondum percoctus est. At eius fructus talis non est, quanq; late, perfecteq; consistat. Sed forte non deest, qui etiam inter cæteros ad saporem acerbum, uel dilutum, uel nō æque dulcem perueniat, dum perfectionē suam acquirit, quanq; nostrum lateat sensum: quippe unigenetum ipsorum alia magis, alia minus esse huiusmodi certum est. Euenit itis, quæ fuerint diminutæ, ut si ætate confectæ iam recidantur, purgenturq; dulciores euadant, demumq; ad naturam pristinam redeant. Ratio, præter id quod res tulimus, est, quod diminutio facultate germinandi prohibita, humorem permiscet, deterioremq; ad fructificandum efficit, qui cum æquo largior sit, percoqui nequit, itaq; amarus relinquitur: & præcisā uero facultatem quandā spirandi, leuationeq; recipit, sicuti cum adacti cunei fuerint. Ergo castigato humore, facta iam arbor ualidior, utpote onere leuata, concoquere melius, & redire ad naturam pristinā potest. Huius igitur naturam uelut restituibilem dixerim. Quædam uero nisi diminuant, fructum percoquere nequeunt, ut uitis, quam cantharam uocitant. Qua de causa, summa uuarum detrudere solent, alioquin putrescunt, & pereunt. Consistat igitur (ut simplicius loquar) quod genus id uitis humoris diminutionem desiderat. Phocis autem appellata, si diminuat, melius arboris speciem capessit: sed non probe fructificat, quippe quæ diminuta nimium generet, & simplex, infirmæq; exurgat: non diminuta uero, spargat sese in ramos, ac transeat in arboris speciem. Quod forte non nihil ad probe fructificandum conferre ualeat. Vires enim adepta meliores, melius concoquere potest. Olera, & herbæ, quæ diminutæ, tuncq; meliores redduntur, ceu porrum, brassica, medica, lactuca, ocimum, hæc omnia teneritatis, alimētiq; probi ratione, meliora, sapidioraq; euadunt. Tollitur etenim acrodo, & sic citas, & si qua humoris lactuosi qualitas sit, eadem molliora, uegetioraq; fiunt, quia radices ualidiores redduntur: & omnino quo amplius diminuantur, eo magis uires concipiunt. Quædam etiam plus pabuli trahunt, & melius possunt incoquere. Duris item, atq; lignosis sublati, proficiunt amplius, utpote cum nihil impediāt, quippe germinatio prima ex debiliore pergens, origine deterior est. Mutationes saporū has reddere possumus.

Quamobrem odores fructuum immutantur. Quæ præterea plante ab una specie in aliam commeant. Caput XXXI



Ed oritur odoris quoq; immutatio, & quidem præcipue cœli, agriq; situ. Loca enim tota serè parte sicca, & cœlum eiusmodi, odoratoria efficiunt: quamobrem agrestia odoratoria sentimus. Sed forte nō in uniuersum, nec plenius odorata sunt: etenim acriora: quapropter solum, cœlumq; quod mediā constat temperie, optimū esse censendū. Nam

quæ terra uliginosa proueniunt, aquam sapiunt, atq; inolida sunt. Sed de odore, atq; sapore, seorsum posthac latius disserere conuenit. Nunc mutationes uel in his fieri posse, tam natura, quam cultu, late ex prædictis patet. Quædam torius arboris, plantæ uel mutationes sponte exoriri uidentur, ut populū candidam transire in nigram, tum fronde, tum etiam tota specie aiunt: & sisymbrium in mentam mutari, nisi cultu retineatur, sæpeq; transferat: triticum item, linumq; lolij capessere speciem. Hæc ergo mutatio, si uerè aiunt, corruptio quædam propter humoris nimietatem esse appareat. Fit enim, cum imbres incesserunt: mutato autem principio, diuersum fit, quod inde erumpit, necesse est. Lolium uero aquam uehementissime amat. Populi si eiusmodi mutatio fiet, tunc foret profectò, cum amplius crassescere arbor inceperit, quod euenire ætatis causa solet: augescit enim arbor in profundum in senectâ, itaq; frons crassior, & rami ampliores, pluresq; conficiuntur.

Folia cur in eadem arbore immutentur. Deq; sisymbrio in mentam mutato. Atq; agri duplicem intelligi debere commoditatem. Caput XXII



Oliorum transfiguratio cõmunis uel aliorum percipitur. Nam & crotonis nonnulla, cum rotunda principio prouenerint, in angulum deinde se colligunt: quasi formam istam suæ perfectionis demum capessere debeat. Quod ita sit, quia res simplex facilius est, quam multifor-
mis: & principium rem difficilem peragere nequit, quia debile est. Sis-
ymbrium, si transit in mentam, odorem tantummodo mentæ recipit, proprio amisso, quia cultura caruerit: speciem uero non recipit, sed quasi nepitæ redditur simile. Omnia nanque in simile sibi quicquam mutantur, non in remorū penitus trans-
eunt. Cultus autem & translatio naturam propriam retinet, atque seruat. Argu-
mentum, quod & agreste sisymbrium talem reddit odorem. Etenim illud quoque naturæ aduersum est, mentam radice alta firmari, sisymbrium per summa celsipitum
coherere, nec tam numerosam radicem sortiri. Quamobrem in his quidem muta-
tionem potius imaginariam quandam fieri dixerim: & urbanum quasi in agreste
transire: nec absurde sic agi, quãdoquidem loca etiam ipsa immutantur. Sui autem
in animalium quoq; genere id euenit ipsum, ut auium immutari & colorem, & si-
guram, & uires aiunt: id quoque non longi temporis spacio, sed annis singulis fieri,
mirari quispiam potius debeat, si non his quoque possit eiusmodi quicquam acci-
dere. Neque enim minus conditam, minusq; distinctam naturam hanc esse, con-
sentaneum est, sed ualidiorem etiam esse credendum forsitan est: atq; proinde mu-
tari posse sine ulla coloris uel alicuius corruptione, idq; in paucis fieri, ut in plantâ
altam transeant: quippe cum neque in generatione suam aliquid formam amittat,
sicut animalia quædam: sed omnium plantarum simplex quædam natura sit.
Mutationes uero (ut supra diximus) in sapore maxime, & odore, & magnitudine,
tam ipsarum plantarum, quam fructuum, foliorumq; fieri solet. Folia enim angus-
tiora, latiora redduntur: & ad summam plantæ ipsæ ad hunc modum diuersæ effi-
ciuntur. Quapropter locum unumquodque sibi conuenientem querit. Conue-
nit autem is, quo uigere maxime ualeat. Quamobrem non omnibus solum idem
aptissimum est, sed alia gracile, macrumq; amant: alia arenaceum: quædam etiam sa-
bulosum, ut brassica. Sed agri commoditas duplex certe intelligi debet: aut enim,
quæ naturæ conueniat, aut quæ uiribus, roborisq; congrua sit, ut amygdalis solum
gracile commodum est: quoniam si altum sit atque pingue, nimia pabuli ubertate
lasciuientes, sterilitate afficiuntur, ut in uniuersum de arboribus antè retulimus.
Sed de alteratione, mutationeq; hæc enus.

Quod

Quod quædam non in terra, sed in arbore pullulant, ut uiscum, stelis, hyphear: quidq; hæc inter se differant. Item de spina Babylonica, cadyta, ederaq; uisa in cerui cornibus: deq; terebintho in olea, & polypodio in arboribus: idq; ostentum interpretari. Caput XXIII



- Irandum autem, atq; absurdum maxime omnium appareat, quod quædam ex seminum, plantarumq; numero, pullulare in terra nequeunt, ut uiscum, stelis, atq; hyphear. Stelis Euboicum uocabulum eithyphear Arcadum: uiscum commune. Hæc naturam eandem omnia sortiri quidam affirmant, sed ea de causa differre uideri, quia in diuersis plantis proueniant. Hyphear enim, & stelis in abiete, pinoq; nascuntur: uiscum in quercu, terebintho, atq; alijs pluribus. Alij differre ista inter se uolunt, argumentis non inepte illud adducunt, siquidem uere narrant, quod non solum in congeneribus quodq; illorum erumpat, exempli gratia, in abiete, pinoq; uerum etiam in eadem arbore plura diuersis partibus exeant, ut hinc stelis, uel uiscum, inde hyphear. Item non modo formas, sed etiam fructus dissimiles hæc ferre confirmant. Atqui id quidem obseruari ubiq; par est, etiam in agris, qui inter sese plurimum discrepant. Viscum enim aliud folio esse perpetuo, aliud deciduo, haudquaquam absurdum est: siquidem aliud uirenibus semper arboribus, aliud frondem amittentibus insidet. Fit enim, ut in his careat alimento, in illis habeat quantum abunde sit.
- 20 Causa enim perpetuæ, deciduæ uel frondis hæc est, quemadmodum diximus: sed hoc utro tandem modo se habeat, nil refert ad id, quod in præsentia quaerimus. Nasci autem humi nulla penitus ratione ualere absurdum certe apparet, præsertim cum tam multum, ac ualidum fructum pariat. Si uero semina quoq; aliqua eiusmodi sint, ut quod apud Babylonem spinæ iniectum, sub ortum syderis, eodem die enasci, atque etiam spinam posse complecti celeriter, asserunt: & Syriaca illa herbula Cadytas uocata, quæ arboribus, uernibus, atq; alijs quibuscumq; innascitur: hinc porro anceps admiratio reddi, ut ratione alterutra magis, minus uel miranda sit res, quippe utriusq; in ijs euenit, quæ cum admirabilia, contraq; opinionem hominum sint, amplo tam numero ualeant cõperiri. Alias enim minus miramur, ut de re ita fieri solita: alias uehementer
- 30 miramur, multitudinis causa. Nam quod humi gignitur, arboribus etiam, plantisq; alijs idem posse ingigni absurdum non est: imò uero solitum planè habetur, ut ederam in multis creari, & quod mirabilius, uisam esse in cornibus etiam cerui aliquando: & terebinthum in olea, & polypodium uocatum in quibusdam arboribus. Et quæ rariora, & pro ostentis potius capienda uidentur: ut laurum aliquando ortam in platano, & quercu: & reliqua, quæ tanquam ostenta interpretantur. Cum enim in partem arboris conuersam penè in terrâ putredine semen deciderit, pullulat, uiuitq; subinde alimentum ex subiecta capiens arbore. Quod etiam de edera, quam in cornibus prouenisse aiunt, si uerum sit, non temere dixeris. Sed in alijs tantummodo posse creari, humi autem nulla penitus posse ratione, id profecto absurdum recte
- 40 appareat. Enimuero plantas quoq; more animalium amicas inter se, atq; focias esse credi forsitan potest. At humi nullo pacto posse generari, mirandum omnino est: præsertim cum & fructum ferat, quod ita prouenit, & semen quo possit creari. Etenim si qua corruptione alicuius, quod in arbore est, talis generatio fieret, ut in animalibus quædam ingigni animalia possunt, rationem nonnullam assignare possemus: sed putredo nulla penitus est, nec prouenit nisi semine, ubi ues, quæ fructum deuorauerint, excrementum in arbore egresserunt. Tum enim semen ipsum tunc in arbore situm, tempusq; generationis adeptum, pullulat. Igitur hoc uehementer, multisq; de causis mirum. Proximum tamen quoddam insitionibus, atque inoculationibus euenire apparet. Alimentum enim paratius, & quasi confectum,

percoctumq; propemodum capitur: quod etiam uiscum uidetur exigere: at quod eiusmodi alimentum desideret, imbecille natura est: hoc autem neque de uisco, neque de stelde, neque de hypheare dicendum uidetur. Hæc enim ualida, & nutrire idonea esse putant. Nam & boues, & iumenta hoc pabulo possi messem aluntur, atque pinguescunt. Ad hæc ipse fructus uisci, quam bonis sit uiribus, sua plantarum lausissime indicat. Quod si non infirma, sed tam ualida sint, cur non per se pullulant, atque proueniunt? Quippe quæ uiribus ualent, terram uisua diiungere, seque abscondere possunt, quod lupinum etiam facit. Sin autem semen frigidum, & concoctu perdifficile habeant, at diuturniorem sequi oporteret exortum, ut & alia serius hac de causa exeunt. Nam & betarum aliquas anno postero erumpere, germinareq; asserunt: neque enim periculum esse, ut putrescant, intelligi potest. Nam & ea ipsa, & alia longe his infirmiora tute perdurare posse uidemus. Hæc igitur quæstionem non soluunt, sed potius nodum arctius alligant.

Solutio questionis: Quamobrem uiscum, & similia non nisi in arbore aliqua nascantur. Tum de conchis, cancro, & coccyce auc.

Caput XXIIII



Rgo principium, normam naturalem sectantes, capere quemadmodum res fieri solet, debemus: id est datum ijs a natura esse, ut non nisi in alijs ualeant prouenire: sicut & animalia quædam non nisi in animalibus possunt creari, ceu quæ in conchis nascuntur, neque in cæteris aptis præstare animalibus pabulum. Verum origo latet eorum. Plantarum autem eiusmodi generatio patet. Initium uero à pastu auium exortiri, uelut accidens ad generationem animaduertimus, quod uel in alijs euenit. Pica enim, & aliz quædam aues, glandes reponentes, obruunt terra: quippe uisco detractio, confectioq; in aluis, quod frigidissimum est, semen cum excremento purum demittitur, & facta mutatione aliqua in arbore stercoreis causa, pullulat, atq; erumpit. Vires autem bonas concipit ratio est, cum pabuli copia, tum uel maxime ratione fortassis naturæ propriæ. Validiora tamen illa esse, quæ in abiete uel pino nascantur, consentaneum est. Plus enim alimenti, & idem pingulus eiusmodi arbores subministrant. Porro uel in animalium genere permulta eiusmodi facere natura uidetur, ut alijs alia ad generationem, salutem uel utilia sint: ut inter historias animalium expressum est. Quamobrem nec in hac parte admirari fortasse debemus, siue de industria pastus, egestusq; auium fiat, seu fortuito incidat: neque dicendum, generationem non nisi auium opere concipituisse. Neq; enim uita fortasse conchis possit seruari, nisi opera cancri: neque apium natura constaret, nisi à sua prole adiuuaretur, ut quidam affirmant: neque coccydis genus extaret, nisi sua ouia alieno in nido supponeret. Sed quemadmodum perire, aut seruari, mutua opera euenit, tam in generando, quam in uiuendo, sic etiam plantarum generi operam ab animalibus ipsis præstari, res nulla est quæ prohibeat. Causam ergo hanc uel huiusmodi aliquam esse putandum. In his autem, quibus semen imponi retulimus, nec fori uita illa, & euentitia ratio locum possit habere (agitur enim ex uoluntate) uerum tempus superferendi capiunt, cum subiacens planta turgescere incipit, ut spina illa dum sydus ortitur, intumescere plane uidetur: humecta enim & agilem esse ad generandum oportet. Ortus uero illa celeritas, non solum ob eam rem, qualitatemq; temporis, uerum etiam naturæ propriæ ratione contingit. Atque de his satis.

Plantarum

Plantarum plantis praesidio esse. Item de ijs, quae aliquid querunt, cui incumbant, ut edera, simlax, cucumis, serpyllum, uolucrum. Caput XXXV



Sse autem uel inter plantas, quae ad salutem generationem uel mutuo auxiliantur, hinc etiam potest intelligi. Enimuero in syluestri genere, quae fronde decidua sunt, semper uiribus prosunt: cum solijs putrescentibus eueniat, ut humus propemodum stercoreus: quod cum ad pastum saecundum, tum ad germinationem perutile est. In parte uero urbana, quae plantis uitium inferere solent, quod humorem nimium detrahant, quatenus olenibus interponunt, uel eadem de causa, uel propter bestiolas, quae in plerisque nascuntur, ut eruum ferere inter radices: consueuere, contra papiliones, & quicquid eiusmodi alijs praesidio adhibere. Nam & in ijs, quae sua sponte natura generant, pleraque huiusmodi contineri credendum est, praesertim cum ars rationem imitetur naturae. Adde quae arboribus sustinentur, atque amplexicaulia constant. Haec enim aliquid, cui incumbant, quaerunt, ceu edera, simlax, cucumis, & alia quaedam: & inter minora, serpyllum, & uolucrum. Haec enim omnia uitae apud aliud agunt: quod si obtinere non ualeant, humi sese projiciunt, atque humicaulia fiunt: praeterquam illa, quae arborefcere possunt, ut edera. Vitis quoque in hoc enumerari genere debet: nunquam enim materia, germinaque sustinere, aut certe non eque ualeret, nisi quod se sustentaret, haberet. Quippe & cum clauicula ea de causa sortiri putetur, ut protinus apprehendere, copularique possit: sicut etiam edera germinibus undique profolientes radículas gerit. Quae autem corpore leui, atque gracili constant, facile arbores scandunt, offensantesque, ut uolucrum, lupinum, siliqua. Haec omnia noxam arboribus inferunt, perstringendo, obumbrandoque, pabulum auferunt, caetera prohibendo. Edera uero infixam etiam rapit: quod obrem omnium molestissima haec arboribus haeret. Accedit enim ut fronde perpetua sit, & uiribus admodum ualeat, alimenterque proinde multum, semperque desideret. Exicat penitus cum arboris summa complexa concreuerit: tunc enim undique alimentum aufert, atque percoquit. Nec difficile forsitan fit, pleraque etiam alia plantis comperire damnosa. Sunt etenim haec longe plura, quam utilia, sicut etiam animalibus: nam ex odore noxam capiunt quaedam, ceu uitis odore lauri, atque brassicae: quod protinus in germinatione liquefcit. Cum enim germen propinquum lauro, uel brassicae est, retrorsus parte sua postrema flectitur, & quasi odoris uehementiam fugit. Vitis namque olfatrix est, sicut & uinum odores rerum appositum trahere aptissimum est: & magis, atque celerius, quod amphoris continetur: quoniam id neque multum, neque crasse obtectum sit. Sed multa esse, quae possint offendere, facile percipi potest, ut dictum est.

Cur folia circumagantur aestiuo solstitio: curque in aliquibus per uices se comprimant flores, aperturientur. Praeterea cur quaedam se uicibus mergant, emergantque: uem uim magnam à sideribus nasci in plantis. Caput XXXVI



Vae autem alicuius generis, uel etiam plurius, diuersorum communia sunt, ut tiliam, & oleam, & ulmum uertere sua solia aestiuo solstitijs: & quosdam flores noctu comprimere, interdum aperiri: & quod in Eufrate aiunt, non modo florem Lori aperiri, & claudi, sed etiam caulem alias ascendere, alias occidere, & emergere à solis occasu ad mediam noctem: & quicquid eiusmodi, haec omnia communem quandam habere rationem putandum est: quam in congeneribus res deprehendi facilius possit. Ergo solia circumaguntur aestiuo solstitio, quia illo potissimum tempore solia decidant: causam uero ante iam de omnibus diximus. Cum igitur foliorum agatur profluuium, cuncta aequaliter affici necesse est, & quae infirma, & quasi confecta senio sunt, exarescunt, ac decidunt: reliqua circumaguntur tantummodo. Omnibus igitur illud euenit uel magis, uel minus: sed conspe

ctius in ijs est, quia summo coloris discrimine pars prona discrepet cum supina: hæc enim ampliora, candidioraq; folia gerit. Quibus uero e numero semper uiuentiū, nō idem eueniat, causam assignauerim, quod eo tempore amplius uigeant, ualentioraq; consistant ad germinandū: quod enim ualidū est, affici nō facile potest. Horū compressio, ac parestactio facilius intelligi potest. Fieri em̄ frigoris caloris ue causa, cum genus illud plantarum frigidū, imbecilleq; sit. Comprimit enim flos, humore coactio, & quasi concrero. Sic enim ut quoq; destituit sui caloris. Aperit se utiq; calore diffuso, laxanteq; quod opera efficitur solis. Quæ aut̄ altius descendunt, frigidiora hæc esse, imbecillioraq; constant, cum magis mutationē temporis sentiant. Nec temere tam citō hæc sentiunt, quæ undis degunt, immersa præsertim locis seruidis, æstuosisq;. Nam & in ijs, quæ non tali habitu sunt, celeriter à sole, atque syderibus transmitti quæque intelliguntur. Itaque non modo aquæ per summa terræ uagantes, sed etiam quæ subrus absconditæ sunt, solstitijs, atq; ortibus syderum affici, mutariq; sentiuntur. Necnon & terra ipsa, & mare mutatur quorundam uel syderum. Flores quoque permultos proxime his interdum affici constat. Assidue nanque circumaguntur cum sole, seq; eodem inclinant, quō sol perferatur: quod quidem latius in minoribus perspicui licet. Quorundam etiam folia, hoc idem pati animaduertimus, ut maluar, atque eiusmodi. Causa uero in detractione humoris est. Eodem nanque inclinantur, quō sol humorem seruofaciens prouocauerit. Igitur hoc fidei faciendæ gratia dictum ad illud superius sit. De cæteris autem, quæ arboribus, plantis ue ad summam eueniant, ex arborum genere petere rationes, atque contemplari tentandum: propria quoq; uniuscuiusq; assumpta natura, statimq; agri adiectio. His enim communes affectiones, diuersitatesq; generum, & quæ conueniant, aptaq; singulis sint, percipi nimirum possunt. Simile quoq; uel idem, an possit contemplari oportet. Multa enim cum inter se differant, haud quicquam differre uidentur. Sed hæc finem hic habeant: quæ autem in agriculture eueniant, cuiusq; rei gratia fiant singula, deinceps pari modo indicandū iam est.

THEOPHRASTI DE CAVSIS PLANTARVM
LIBRI SECVNDI FINIS.

THEOPHRASTI DE CAVSIS
PLANTARVM LIBER TERTIVS.

Ex satiniis, urbanisq; multis esse, quæ coli non patientur.

Caput I



SATIO plantarum bifariam agitur, ac duplici omnino genere consummat: A ut enim quæ sponte proueniunt, contemplamur: quod genus naturæ initium est: A ut quæ hominis ingenio, paratuq; fiunt, consideramus: quæ quidē auxiliari naturæ ad finem destinatū retulimus. Itaq; cum de ijs, quæ sponte proueniunt, superioribus libris dictum abunde sit, nunc de reliquis modo simili differemus, si prius id explicauerimus, pleraque tam in arborum genere, quàm in submissa materia esse, quæ culturam minime patiantur. Hoc enim alterius generis ueluti finis, alterius initium patet, cum scilicet de ijs

- de ijs quæ sponte prodeunt ad ea, quæ ars efficit, indaganti ratio tenerit. Sed absurdum fortassis id ipsum appareat: siquidem quod cultum assumpserit, tanq[ue]m fortem sibi accomodatam, nō magis uigear, lætiusq[ue] fructificet, cum ars naturæ auxilietur: absurdum tamen nō est, neq[ue] alienum. Principium uero illud capiamus oportet, naturam cuiusq[ue] rei non ex eisdem constare, neq[ue] ē singula materia perfici. Non uero omnibus finem eundem coctionis potestatisq[ue] fructuum esse, sed singulis pro eius rei ratione, ad quam genita sint, sapore, odore: cæterisq[ue] finem utiq[ue] statui, sed præcipue sapore, odoreq[ue], fructus cocturam determinare solemus. Et hæc certe ad hominis usum redigimus, ut antè iam dictum est. Sed cum quibus quodq[ue] cōsistit, his etiā
- 10 nutriatur, commoditatisq[ue] rationi non solum genus, uerumetiam modus adscribitur: non idem prorsus utriq[ue] stirpium conueniet rationi. Agricolas uero, tum copiam, tum genus cōmodum alimenti molitur. Ager enim agitur, consecutusq[ue], & plus pabuli præstat, & sapores immutat. Ergo ratione optima, cultus quibusdam commode adhiberi, quibusdam minime possit, ceu illis quæ sicca, acrida, amara, atq[ue] ad summum uenenosa sunt, usumq[ue] medicaminis præstant. Hæc enim sublati uiribus heberantur, atq[ue] efficiuntur, ut alia fructum omnino parere nequeant, alia humidiores, deterioresq[ue] pariant: quæ etiam aquosa reddantur, ceu absinthium, & fel terre. Et omnino uis omnis medica, uel radice, uel fructu, uel ramo, respondent
- 20 ijs, quæ in gustatu quandam uehementiā monstrāt. Quo in genere capparidis quæ enumeratur, & lassæ, & rumex, & satureia, & cunela, & thymum. Quædam enim ex his, aut nullo pacto locis cultis proueniunt, aut uiriose. Quædam multo deteriora efficiuntur, ceu rumex, satureia, inturis: nō nulla dulcescunt, cum humefcere, atq[ue] succo abundare inciperint, ut corni fructus: hic enim miscetur, deterior redditur, atq[ue] in totum arbos ipsa humida, soluta, imbecillisq[ue] fit. Sorbum dulcius quidem redditur, sed minus odoratū: uitres enim succi, boniq[ue] odoris deficiūt. Eadē ratio de lassere est, & de lupino, & quicquid eiusmodi. Lassæ enim non æque uehemens est, quia copiosiori, humidioriq[ue] alimento uescitur. Lupinum syluestre, atq[ue] luxurians, redditur infecundum. Enim uero copia quoque nutrimenti aduersatur terræ molitio, quemadmodum diximus. Quodq[ue] autem pro sui principij ratione
- 30 modum sibi pabuli seruat, solumq[ue] capessit idoneum. His enim ipsis spontanea illa perfici generatio potest. Omnino enim (ut sæpe retulimus) summa ratio cōstat, solum coelumq[ue] obtinuisse aptissimum: hinc enim fertilitas, sterilitas ue exultat. At uero hæc ipsa illis certe aduersa uident, quæ in uita sua natura possunt miscere: quippe cum ad meliorem aërem transferantur, diuersumq[ue] alimentum capiant: quibus rebus mutatio, & quasi naturæ dimotio sequit. Quin & in ipsis, quæ colimus, illud ipsum quodammodo testificari uidemus: sunt enim quæ cultum nimium, exquisitumq[ue] aspernentur. Ex quo intelligi potest, terminū eius quoq[ue] certum statui oportere: atq[ue] ita nihil quodammodo prohibet esse, quæ transiata nullam penitus culturam desiderant. Igitur non omnia cultione lætari manifestum hinc est. Forsitan etiā
- 40 alia nullam penitus curam desiderant: alia cur desiderant, lætiant.

Que opera agriculturae sunt in uniuersum.

Caput 11



Eid quum duo illa prædicta sint, quibus alimenta fertilitatesq[ue] admittuntur, cultura prosectio, & agro unice auxiliatur, sed aërem commodiorem præstare utique non potest. Verum ad mutationes, atque uicissitudines temporum, arbores ipsas agrumq[ue] præparatum ita esse oportet, ut & pabuli fructus adit ad incrementa futura, & res nulla aduersa ualeat offendere. Nam id quoq[ue] in obseruatione habendum est. Sūt etenim necessariae amputationes, purgationes, decacuminationes, stercoreatio

nes, foffiones, atque reliquæ curæ, quæ arboribus adhibentur. Et de fegetibus uero par ratione animaduertiffe oportet. Alijs enim non idem, alijs non tantumdem, alijs nō eodem modo, nec eodem tempore conuenit exhibere. Nōnullis fortē, nec ullo pacto præstari aliqua debeant. Quæ quidē omnia prudentes agricolæ generatim distinguunt, sicut & in ratione purgandi, alia ferro, alia manu, alia quibufdam aduncis detrahenda præcipiunt, ut oleæ, piri, mālī, ne laborent ulceribus propter ramorū gracilitatem & siccitatē: his enim prærida & tenella detrahi tantummodo iuuat. Vites quoq; simili modo discernere decet, scilicet immature, serōue & in breui, longo uel palmite amputandas, & quicquid eiusmodi, ita scilicet ut quæq; ad finem redigant. Igitur agriculturæ spectatio, & per singula diuifio ista est. Sed disputatio ista, quæ rerum explicet causas, de singulis agatur necesse est, nec eas causas latere oportet. Qui enim sine causæ notione quicq; faciat, & conseruandæ, resq; euenientes tantum sequatur, quod sibi statuit ut efficiat, fieri forsitan potest: nō tamen cur ita effectū sit, nosse ualeat: ut in ratione medendi prorsus intelligere liceat: perfectus tamen qui utranq; rem teneat. Sin autē accidat, ut quis magis contemplationi deditus sit, hic certe rationis, & causarū autor germanus exiit. Sed de multis altercatio partim simplici, absolutaq; ratione, partim in meliōrē, deteriōrē uel partem exoritur, ut uel in cæteris fieri artibus solet. Verum hic uel propriū quiddam euenit. Commoda enim tractus, quē aliqui colunt, in uniuersum sæpenumero capiunt, cum & interdum ratione agatur utraq;: quod tamen sit melius, iudicio nullo discernitur, quasi pro statu aëris culturæ opus proueniat. Nunq̃ enim orbis uniuersi conditionē, circuitionemq; potius, quā plantarū, ac seminum naturā sequei oportet. Nam cum sæpe illius intemperantia deprauari cogantur, suis tamē hęc uiribus partim sustinent, partim repugnant: sicut natura hominum, arte medendi tueri, atq; defendere solet. Ergo altercationes super illas artū cōmunes, his quoq; de causis oriuntur. Cæterū multa etiam cōsensu omnīū constant, quasi à rebus ipsis fidem sibi acquirerent: alia in uniuersum, alia generationis, atq; diuifione, ut illico generationis, sationisq; ratio mouet. Quā quidē exponere haudquā difficile est.

Quæ semina committi debeant terræ.

Capit. III



Emper enim solo turgenti semina mandare oportet. Sic enim optime germinatio agitur, sicut etiam animalū foetus tum probe conficit, cum uulua libenter semen suscepit. Turgescit solum, cum humectū, atq; tepidum est, statimq; temperatū aëris obtinet: tunc enim agile, fertile, atq; lectum consistit. Quod duobus fieri temporibus maxime arborum generi solet: Vere, ac autumno. Et quidē his temporibus arbores magis ferimus, sed melius Vere: tunc enim solum humidū est, & sol tepefaciens elicit germen, & cœlum placidum, atq; roscidum constat, ita ut ex his omnibus educatio, & germinatio prospere sequi possit. Habet tamen & autumnus naturæ confusionem quandam eiusmodi, quocirca germina eo quoq; tempore proficere posse retulimus. Qui tempus hoc magis, quā uernum commendant, rationem assignant, quod solo adhuc tepido, plantæ melius radices concipiant. Initū autem ualidius semper antecessisse oporteat, à quo cæterorum omnium ortus, atque in totum uis uitalis producitur. Quamobrem germinationem incunte Vere, probe uniuersimq; acitari existimant, quod iam humus temperiem sentire, atque intumescere cœperit: at Vere gelido adhuc solo (nondum enim hyemis algorem esse decussum) plantis depositis radices frigere prauēq; germinare. Ideoq; autumno ferendum potius omnia iubent, quæ scilicet germen possint educere. Sunt enim quæ nequeat, ut pirus, & mālus, & ex toto, quæ gracilentæ, lignosæq; sunt: quippe cum sicca natura consistant, hyemēq;

hyememq; ob debilitatem sufferre non ualeant. Item plantam autumnalem grauidam esse, iamq; ad pariendum propensam, uernam non pridem concipere incipisse. Itaq; alteri, quæ nuper conceperit, euenire, ut cæca ex germinibus pieraq; pariat. alteram uero, quæ diu in aluo gestauerit, incolumes, optimosq; elidere partus. Has ferè rationes, & eiusmodi alias referunt.

Quod satio uerna præfertur autumnali. Item secundum locorum naturam, sationum tempora esse custodienda.

Caput IIII



Aeterum (ut antè iam diximus) satio cõmunior omnium, uel plurimum tam fructuosum quàm plantarum, temporis uerno tribuitur. Enim uero plantæ ipsæ concitæ iam sunt, & aër benignus, & germen ad eliciendum idoneus. Omnino tempus id fecundissimum est, & dies tepidiores, prolixioresq; faciunt, ut celerius germinent. Radicatio uel eo tempore ualenter fieri potest, cum propter impetum naturalem plantarum, tum propter humi turgorē, atq; etiā aërem iuuantē ad educandū. Sol enim nō modo quæ super terram exant, sed etiā quæ celantur sub terram uegetiora, melioraq; reddit. Argumentū, quod radicis auctio aut nulla ulterius, quàm sol tepefacere possit, aut deterior agitur. Hyems contrā mox post sationē secuta, pleriq; officit: corticem enim oleæ detrahit, sicut succum intestinū crassat, atq; coagit: & reliquis magna ferè parte causam offensæ aliquā infert. Sed hæc forsitan ille excludet, qui satum autumnalem asserit meliorē, ipsq; dicit esse cõmodiorem, quæ frigora sustinere possint. Verum cum hæc plura possunt argumēta à natura ipsa deduci, tum quod arbores ipse ueris non tempore ad germinandū potissimò excitentur, tum quod satus eiusdem temporis cõmunior sit, nō dubitem naturalius per uer conseri affirmare. Nam & ubi per ortum caniculæ, statimq; Etessarū arbores germinant sua germīna, fructumq; pariunt, tunc porro consensiones ibi aguntur, utpote, cum multo melius sit cœli habitū, & plantarū naturalem impetū obseruari. Sed fortè impetus quoq; ille ratione aëris circumfusi efficitur. Vbi uero imbres per æstatem crebrescunt, ut in Aethiopia & India, uel ut in Aegypto, cum Nilus restagnat, illic paulò ante imbres, aut post satū conuenire consentaneū est: tunc enim aëris consistit temperies. Necnō & loca ipsa suæ ratione naturæ diuidi, atq; diuersis temporibus tribui licet, ut temperata Vere melius conferunt: diluta, & pluuia, & palustria, æstate sub ortū syderis: sicut multa in agro Laconico ferere solent sitientia & squalida autumnis. Sic enim fiet, ut cum hyeme telluris ima calida, summa frigida sint, uis augendi conclusa in profundo radices nimirū subeat: quo aut amplius, ualidiusq; fuerit radicatum, eo copiosius germen proficiet. Et de temporibus consensionis accommodandis satis dictum iam est.

De scrobibus faciendis: quodq; per austrum melius feritur.

Caput V



Vm autem solum humectum, ac facile peruium radicibus esse oporteat, ut longæ, crassæ, robustæq; fiant, idcirco scrobes longo tempore antè defodere decet, & maxime anno prius, quàm plantas terræ committas, ut humus solem, niuemq; tempore utroque combibat: hume enim in modum soluta, suspensaq; redditur. Nonnulli tempus decernunt ab æstiuis solstitijs ad Arcturum: tunc enim solum tam extra, quàm in scrobibus diffundi maxime uolunt, nec quicquam penitus procreari. Conferunt autem autumnis post Vergiliarum occasum, ubi imbrem obtinuerunt, ut solum humectum possit alimenta præstare. Scrobes non prodius replent, ut prius partes infimæ seminis confibrentur, alioqui uires ad superiora feruntur. Alii enim, & auget omnia solis aërisq; potestas: sed cum aliā in profundū radices agant, alia per sum-

ma terræ dispergant, idcirco scrobes non pari altitudine faciunt ijs, quæ in summo coherent, ceu oleæ, fico: sed quantum natura exigit, subministrant: lapides subijciunt, ut plantæ & per hyemem humore perfrui, & per æstatem possint refrigerari. Enimuero contra utrunq; tempus ita præparasse oportet, ut lapides humorem contineant, & æstate radicibus calorē propulsent. Alij sarmenta substernunt, alij uas fictile plenum aquæ apponunt, alij lignū infodiunt satis crassum, quod postea extrahunt, ut nunq; alimentum copia deficiat, ex humoris confluxu solo assidue humescens. Deniq; obtinendū est, ut tam ad imbres, quàm ad solem, & aërem modicè actum sit: ijs enim ipsis alimenta, atq; incrementa proficiuntur. Sed cum solum flatibus aquilonijs cōcreseat, atq; siccescat: austrinis contrā labescat, atq; humescat, plantæq; 10 pariratione humidior, siccior uel seipsa reddatur, hæc de causa melius per austrū fertur. Radicatur enim, germinaturq; celerius, cum planta turgens creditur solo turgenti, cœlumq; adest emollitū, atq; benignū. Quod enim in frugem bonam sit euasurum, simul parte inferna, supernaq; citet germina, opus est. Aquilone autē aduersa omnia ueniunt: frigens etenim plantæ, atq; laborant: & solo gelato, neq; radicē eque demittere, neq; germen ædere possunt. Igitur obseruatio talis cœlo reddenda est.

De habitu plantarum que ferantur.

Caput VI



Emina uero ab arboribus nouis, aut certe uigentibus petere decet. Et omnino danda opera est, ut nitidissima, rectissima, atq; laudatissima sint. 20 Enimuero quæ eiusmodi sunt, apprehendunt, conualescuntq; præcipue cum iuuenili ætate sint, & corpore pleno consent, melius germinant. Quod enim leue ac nitidū est, tanq; incolume, inoffensumq; consistat. Contrā scabrum, atq; nodatū, præsertim cæcis & euanidis nodis, quasi incolumitate orbatur est. Et quanq; sanos habeat nodos, quod tamen adiderit, exile est, præterq; ea, quæ non crebro sponte suæ naturæ consistunt, ut palmites. Hinc enim & apud arbores ipsas uiuiradices pleriq; faciunt. Alij thaleam ramis absciunt, ne uires ad excitandū germen absumant. Ad hæc leuitas, rectitudoq; seminis meatū facilem, expeditūq; præbet alimento fluenti, ut incrementa sequi possint celeriter. Recte illud quoq; animaduersum est, ut ex simili solo, aut nō deteriori, semen accipiatur. 30 Alterū enim mutationē nullam efficiet, alterū melius educabit. Quippe mutatio imbecilli cuiq; magna causa est. Imbecille autē semen est. Hæc enim de causa situtis quoq; eisdem seminibus reddunt, aquilonis spectatu, uel austrī, uel ortus, uel occasus: utq; apud parentes spectabant, ita seruandū censent, quā maxime possint, quod nihil naturæ, morisq; soliti immutetur: quasi mutationē pati minime ualeant. Nam & loca eisdem de causis perq; similia quaeritant, & uiuiradices ferentes terræ cōmittunt. Sic enim ualidiora, & quasi iam uitam adepta reddunt, & plantas radice aliqua fibratas potissimō petunt: quod simius consequi possint, à parte inferiore arboris, potius quàm à superiore accipiunt. Hæc enim uiuaciora intelligunt, excepta uite, ac fico, & quicquid humidū sit, quemadmodū diximus. Quippe humida 40 parte superiore melius germinant. Cætera ob siccitatem, tenuitatemq; sui corticis, aut nullatenus germinant, aut certe deterius. Quæ aut suffulta sunt fibris, quasi præcondita partem naturæ aliquā gerunt, qua uti protinus possunt, quemadmodum uiuiradices: quapropter recte præcipiunt, qui plantas eiusmodi deponi crectas censent, nec aliqua parte subtracta: sicut illæ serendæ sunt, quæ radice penitus carent, scilicet ut radix proueniat. Fit enim ut in obliquum depositis, radicular primæ ascendant. Stulte autem quaeret alias, qui ultro quas habeat amiserit. Recte etiam plantam non multo excedere terra præcipiunt. Difficulus etenim augetur, cum pars quæ laborat, amplior illa est, quæ terræ immerfa nutritur: plerq; etiam exarescunt, ut ficus,

ur ficus, & quicquid solutum. Tum etiam pabulum summam magis ad germina procreanda deducitur, cum supra terram paululum extat: quod præcis quoque arboribus euenit: quippe quæ radice tenus maxime præcisæ sint, celerius redeunt, quam quæ alte à terra fuerint detruncatæ. Licet hoc idem et in plantis uitium peruidere, & quicquid amputari in consuetudine desideret. Oleæ, ac myrti, & ad summam omnium, quæ ampliore magnitudine capiunt, plagas alleuatas contegunt, ne intrudatur sol, aut imber. Nam si id acciderit, morbi contrahendi periculum imminet. Ciracumlinum alij luto addunt, alij scilla subdita luto superimponunt, & testam adijciunt. Scilla enim plantam uiridem seruat: luto scillam, testa luto tutetur.

10

De usu stercore in consuetudine. Tum scrobes soli uarietate diuersas esse oportere. Caput VII



Tercus, quod agrum & solutum, & tepidum reddat, quibus ambabus rationibus fertilitas profectio exoritur, certum est. Sed de usu ambigitur, nec eadem norma omnes utuntur: sed alij protinus terræ permixtum, plantæ aggregant: alij inter terræ superiorem atque inferiorem, mediū disponunt. Hinc enim sursum ferri existimant, cum imber inceserit, atque ita succum comendabilem reddi: supernè autē sole siccescere, nec imbrem partes imas posse attingere. Illud tamē consensu omnium constat, stercore non acri, & uehemente, sed leui, ac facili esse utendum. Quamobrem ruminantium præcipue sterco capiant. Quod enim acerbū, ac uehemens est, nimium calefacit, & interdū etiam exicat. Agri quoque uniuscuiusque naturā decet animaduertere, ut cura suscipiatur conueniens: uis delicti si quis solo æstuoso ferat, scrobes aqua nudiustertius debet implere, cumque totam imbiberint, ferere: ut terra facta humectior amplius comprehendat, meliusque radices eliciat. Si uero salsū, arenosūque feris, lapides circa stolonem plantæ dispones, terræque accumulabis, ut salsugo admitti nequeat. Iuuat & dulcem arenam aggerasse, & calculos ab amne, aut faucibus torrentis petitos, inecille. Nam ea quoque propulsant, & simul uim quandā efficiunt utilem. Sin aut locis uliginosis, aquosisque obserendum sit, fossas facies, alias obliquas quæ aquam recipiant, alias rectas: & lapidibus implebis, & terra, quo farculum tangere nequeant: tum arenam, & terram inijcies. Hæc etenim omnia plurimum iuuant. Fossæ namque obliquæ recipientes humorem, solum siccior reddunt, & erectæ illæ lapidibus sua infima parte refertæ confluum excipiunt. Quod si in eiusmodi solo lapides insint, elapidandum non est. Iam enim quod iuuat, nature opera adest. Denique quacunque fodiens lapides, aut glaream, aut arenam, aut terrenū uitiatū comperies, non commiscuisse, ne ue disgregasse terram eiusmodi remedium nullū est, sed eatenus scrobe, uel fossa altiore perducta, glaream atque sabulū subterni oportet. Enim uero lapis si latus, atque perpetuus sit, arbori est noxæ: sin rotundus, minutusque subijciatur, refrigerat, & aquā transmittit, & locū radicibus peruium præstat. Omnino quidē nullum elapidandum existimant solum ex tenui terra. Lapidēs enim hyeme tepescere, æstate refrigerare posse affirmant. Pariratione pro cæteris quoque agri differentiis, quæ profint, accipies. Etenim (ut ex toto loquar) nullo inferius, sed omnium summum est, nosse quid quoque agro serendum sit: nec simplici ratione tantum, sed etiam in ipso continuo rure, cum partes singulæ inter se dispares, incomptæque constant. Ut enim sæpe retulimus, solum conueniens, plurimum & in comprehendendo, & in fructificando potest: quod cum in uniuersis generibus, tum in ipsis, quæ eandem speciem gerunt, licet percipere. Exempli gratia: sicus quoad dici simplicius potest, loca sitientia concupiscit: humida enim fructum putrefaciunt, aut non bene maturant, cum fructus etiam ipse humidus sit. Cæterum, quæ exigat ad aquari, seu laconica, rigua querit. Pari modo &

uites, quæ solidæ, spissæq; sint (ut antè iam diximus) loca montuosa potius amant solutæ uero ac humidæ, planis gaudent. Alimentū enim utraq; suæ naturæ modicè ita capere possunt, altera plus, altera minus. Ad summā, arbores melius in imis montiū fructificare putantur: argumētōq; generatio spontanea est. Vbi enim sponte natura ipsa progeneret, locū illic esse apulsiū creditur. Verum singulorū differentias potissimas esse nihil dubiū est. Ima enim montiū, multa & uaria sunt, atq; in totū quasi una differentia ista exultat imi summiq; ratione, cum aliæ per multā, maioresq; sint, ut inter histórias exposuimus. Ergo solum pratense, ac humidū, uitibus esse habile plures ferme consentiunt: sicut solidum, & sitiens, oleis ac ficis. Vites em̄ alimentum humidius, molliusq; desiderant: oleæ uero, & fici, siccus, atq; callosius. Ad summā, quæ sicca sunt, siccum queritant agrum: quæ humida, humidū. Verū (ut simplicius asseram) ager omnibus optimus, qui solutus, leuis, humefactusq; est: hic enim ad alendū, & ad augendū præcipuus. Excipe tamen illa, quæ uirū soliditate adeò copiam largam capiant alimenti, ut in luxuriā prouant, ceu amygdala. Huic enim gracile, serenū, atq; apriū, longe cōmodius est. Contra nuci euboicæ, opacum atq; roscidum conuenit. Necnon & ad flatus loca situm cōmode obtinere nō parum prodesse animaduertimus, quāobrem id quoq; considerandū est. Prorsus omnia locum spiritus placidi querunt: etenim alimenta locis eiusmodi meliora, fructusq; maturiores præbentur. Ventosum & inquietū nulla penē arbor urbana persequitur. Paruē nanq; detortæ, exiguæq; proueniūt ex flatuū ictu. Quibusdam etiam syluestribus, locus eiusmodi nocet. Fructus enim suos perficere nequeunt, sicut de nuce quoq; euboica narrant ad florem usq; tantūmodo proficisci, cum illæ, quæ locis tranquillis stant, ampla incrementa suscipere, secūdis illisq; euadere possint. Omnino enim (quod sæpenumero diximus) temperiem suæ naturæ conuenientem, omnia desiderare uidentur: pariter in cæteris rebus, & in mutationibus aëris. Sed de hoc generale, communeq; est.

De interuallis plantarum.

Caput VIII



Interualla autē plantarū, quas seris, nō tam ratione loci, quā eorū quæ cōserenda acceperis, statui debent. Quippe animaduertendū, quæ umbras amant, quæ nō amēt: quæ radicem longā deducant, quæ breui tantē. Altera em̄ amplo interuallo serenda sunt, altera breui. Vmbra adamant, quibus fructus siccissimi, nucleosiq; sunt, ceu punicæ atque myrti: quæq; suapte natura soluta, sicca, atq; breui stirpia sunt, ut laurus. Horū etenim fructus soli expositus acerbus efficitur. Hæc propter suam infirmitatē quasi protectum desiderāt, quo se à frigore, æstuq; possint defendere. Nullus enim mutuus radicū decursus, nullus implexus, rixatus ue improbus infestat, cum breuem agent radicem. Quidā amplo interuallo conseri omnia iubent, ne radices serpant inter sese, ne ue pabuli, flatusq; penuria minus auferere ualeant. Hi tamē haud recte præcipiunt, sed discernere decet, quæadmodū superius diximus. Quin & ratione locorum interualla dedisse non dedecet: locis etenim montuosis breuiora, quā planis sunt relinquenda. Montibus enim minus radices comæq; auferunt.

Plantam, dum prima fundit germina, non tangendam. De educatione, et purificatione plantarum. De uicē amputanda.

Caput IX



Lantam unamquæq; dum prima germina fundit, patere intactam manere, ut radicem libere capiat: nec quicq; mouere uelis, ut in uitibus obseruatur: cum uero tenuerit, conualueritq;, amputabis superiora, & quæ optima & aptissima sunt, tantū relinques. Sic enim arbores tractari necesse est: quanq; in cæteris detrali, refecariq; impune omnia possint: quippe

quippe si plantam priusquam radiceretur, ampuies atque sollicites, uehementer læderetur, utpote adhuc imbecillis. Sed si cum radices uirescē cepertit, neq; offensa ulla sequeretur, & plus alimentiad ea quæ reliqueris, transduceretur. Educauo uero & (ut uulgò dicitur) eruditio plantarum tanquam figuratio & formatio arborum est, alti, submissi, lati, reliquorumq; ratione. Omnia serē quæ se in altum extollunt, compescenda agricolæ censent, præterquam illa quæ apta sint excelsa consistere, ceu palama, pinus, cupressus. Minus enim fecunda redduntur, cum alimentum per longinquum transeat spaciū, & priusquam ad fructificandā partem perueniat, absumatur. Sed ut ramis & germinibus scateant, opera danda est. Sic enim non modo copiose fructificant, sed etiam demeti facilius & omnino tractari commodius possunt: quamobrem amputanda prohibendaq; germina illa sunt, quæ intempestiue excurrunt. Quæ quidem cultura atque conditio purgationi serē proxima est, quæ perfectis adhibetur arboribus, de qua differere antē debemus, quā de reliquis agriculturæ officijs: hæc enim consequi uelut deinceps uidetur. Ergo genus id curæ publicum atq; euidentissimū in uitis est: omnes enim eo utuntur, omnesq; uites amputari necessarium arbitrantur, uelut ab ipsa compellātur natura, propter uberrimam germinationem. Quæ de re quoniam cum de germinatione cæterisq; disputaremus, abunde dixerimus, ipsas rationes per se postea contempleri decebit. Nunc autem de cæteris differamus. Neque enim in his parum iuuabit scitē species condidisse: quæq; improbe profuerūt, aut quæ fructum impediunt, detraxisse. Impe-
 20 diunt enim non solum hæc, sed etiam quādā remota, & ea omnino quæ intempestiue prouenerint, quapropter hæc recidendo uim germinandi reuocare ad arborem cōuenit. Fit enim ceu deriuatio quædam alimentī plantarum, prout aliquis deduxerit: quippe cum ad ea quæ relicta sint, pabulū confluat, eaq; tantū augeat. Quod propterea euenit, quia plantæ ipsæ partibus suis solertissime consent, atque etiam quorannis incrementū suscipiāt. Nam & si quis superna semper diminuere uelit, cibis ad radices totus feretur, easq; adeo augebit, ut loca radicibus impleantur ac perhorrescāt, demumq; parte superiore arbores augeri nullatenus ualeant, cum ima totum alimentum assidue petat. Fit enim ex diutina prauitate, ut talis au-
 30 ctio quasi in naturam uertatur. Vitis igitur semper amputari quorannis requirit, sed licet ex summa facultate augefcēdi. Cætera partim annis alternis, partim quadriennijs possit. Nihil enim pariter atq; uitis augefcere potest. Si quid tamen huiuscemodi sit, tantundē certe desideret. Recidere partem eius humidi superuacuum est: tum etiā uulnus facit, ut arbores languescāt, laborēq;. Quapropter post purgationem stercoreandū, cultumq; reliquū adhibendū continuò censent, ut se recreare pabulo possint. Sed arida detrahi tantūmodo debent: hæc enim nec laborē ex aliquo ulcere afferunt, & annexa impedimēto alimoniz sunt. At in perpurgādo refecanda quæ fructū præstare nequeunt, & quæ incrementa cæterorū uetare possint, & quæ inter brachia cōstituerint (extrinsecus enim incrementa libere facitari oportet.) Adde quæ
 40 densa inter se sint, quæq; de medijs prouenerint. Hæc etenim omnia cum solem, tum flatū auferūt, ubi & perflari placide, & solē sentire cōmode arbores debeant. Quamobrem nō improbe illi faciūt, qui arbores ita disponunt, ut meridiē spectent, ceu ficos ac cæteras, & præcipue oleas.

Quo tempore arbores recidantur, purgentur'ue.

Caput X



Ed cum perpurgatio laboriosa plagarū causa sit, nō tempore quolibet, sed post uergilias perpurgandū, quippe cum arbores ualidissimæ sunt, cum humorem ad fructum consumplerint, & nondum alium susceperint. Quæ autē in fructificando ferotiores sint, has scilicet pro ratione purgabis post fructuum decerpitionem. Fico peculiare notatur perpurgandū esse

antequam germinet. Ratio, quod sicus eo tempore coagmentari consolidariq; maxime possint: quod quidē obseruandum magnopere est. Quod enim imbecilis solutaq; sit autumno, & circa uergilias maxime laborat, cum ex temporis siccitate fieri unitas nequeat, putrescit imbre admissa, & turbinibus frigoribusq; languescit, atque emoritur. Hoc igitur arboribus imbecilibus atque solutis proprium datur. Rectilio uero non pari mensura omnibus fieri solet, sed plus illis reciditur, quā amplus curā istam desiderant, id est oleæ, punicæ, myrto. Quo enim his pauciora reliqueris, eo melius germinant, fructusq; melius ferunt. Quod propterea fit, quia germina densa inter se, tenuiaq; consistant, atq; celeriter proinde siccantur, ex quo euenit, ut & fruticis speciem arbores illæ omnium maxime gerant. Minus ea recti desiderant quæ plagis infirmantur, ceu pirus, mālus, & quicquid fœcum, & corice tenui uelutur. Hæc enim resecta uehementer laborant. Qua de causa manu his auferre præcipiunt, ut retulimus, aut ferro perquam leuissime: periculum nanque interitus propter ulcera imminet. Quemadmodum enim radicibus uulneratis, cum soditur, arbores deteriorescunt, & sæpe ægrescunt ac exarescunt: sic etiam uulnere partis superioris noxam eandem his posse adferri credendum est, quæ nequeunt tolerare. Et de purgatione satis fit hæc dixisse.

De ablaqueatione & radicum resectione.

Caput XI



Ablaqueantur autem omnes penè arbores, radicesq; resecantur post a conuersionem, dum nouellæ scilicet sunt, ut alte descendant atque amplius incrementum suscipiant. Sed præcipue illæ quibus radix prima parte terræ natæ soleat, ut oleæ ac uiti. Aetatem uero grandiorē adeptæ cum fuerint, annuas radices, & in uniuersum per summa cespitem adhærentes resecari par est, ut inferiores plures ac robustiores efficiantur. Has enim illæ uetant atque interimunt, nec alimentum subministrare arboribus queunt: imò uero & ipsæ tam æstu quā frigore uehementer laborant. Aridæ præterea detrahendæ sunt, quippe cum annexæ radicibus cæteris officiant, & uermes in arboribus creent. Reliquas haud quicquam tangi oportet. Neq; enim tam perpurgandæ radices sunt, quā partes superiores: quippe cum plus eas dispoliari damnosum est. Nec percipi potest unde nam deceat auferre: & simul undecunque radix proreperit, modò ualida sit, pabulum suggerere poterit. Sed melius certe si undique prodeat. Longitudo & latitudo quo amplior, eo commodior. Itaque illa tantum parasse oportet, quæ ad alimentum incrementiq; rationem pertineant. De rigatione & aquæ generibus satis serè antè retulimus. Quantum enim utilitatis in aqua pluuia, uel certis anni temporibus, uel noctu, uel interdium sit, tantundem etiam in fluente, deductaq; erit. Aestate autem aquis fluentibus maxime non sine ratione utuntur, propter pluuiarum inopiam, & simul ad fructus enutriendos necessarium. Sunt tamen qui per id temporis auferendum potissimò censeant. Verum ut in cæteris omnibus, sic & in his mos solitus plurimum ualet, sit enim tanquam natura. Quamobrem quæ locis siccis ac sitientibus manent, nil plus quā quod sibi sit necessarium quaerunt, rigatæq; deteriores redduntur, non secus ac illæ, quæ aquam nunquam desiderant. Periculum certe si postquam rigare cœpisti, non aquam crebre adhibeas, nam & pristina alimonix facultatem adimes, & nullam afferens aliam committes, ut æstu sæpe arbores exarescere possint. Fructus tamen penè omnium, qui plurimum aquæ capiunt, deteriores redduntur.

De usu

De succatione & temporibus stercoreandi.

Caput XII



Empora stercoreandi singulis statui pro sua purgatione par est: præsertim si post illam sterco sit continuò disponendum. Tum etiam nec tolerare crebram stercoreationem arbores possunt, sed obarescunt uel nimij calor. Haud enim eadem stercoreandi ratio est quæ in fegetibus, locisq; arboribus uacuis: quippe cum in illis sterco dispositum in partes per multas disgregetur, absumaturq; in arbusco radices ipsas subeat, nec uis tota caloris possit excurrere. Ita enim calore multiplicato arbores per se uel facta exarescit. Nam triticum perit ex nimio stercore, si non imbres secuti sunt. Quocirca solo pluuiò, crebra & largior stercoreatio commodior est. Siticulosis atque gracilibus modica prodest. Ob id forsitan, & acerrimũ sterco minime arboribus conuenit. Atq; absurdum appareat, non id ualidissimis conuenire, quod ualidissimum est. Verum causam illud habet, quod superius diximus. Nam & in olerum genere hac eadem de causa succatio cum auatione cõmoda est, & in totũ quod aquæ usus frequens in eo genere sit, atque id ipsum natura humidum constet. Nec temere tam copiose rigandum olera censent: hæc enim non fructũ, sed folia ferant, contendunt. Cæterum & in arborum genere stercoribus nonnullis ex ualidiorum numero uti consueuerũt, potissimò cum fructus emollire, immutareq; uolunt, ceu suillo, quò punicea dulcescant, & nucleo uacua reddatur, & amygdalæ ex amaris in dulces transseant. Vtq; myrtis etiam uehementius congerendum præcipiunt, uidelicet spurcitiis pellium, urinamq; adhibere, cum germina prosiliuerint: quasi fructus ita reddi sine interiori nucleo possit. Quod quidem alij oleæ quoq; prodesse ad latè fructificandum existimant. Porro quod in principio insit, plurimum ualere credendum est. Si quidem & cucumerum semina, lacte mulso uel macerata, dulciorem faciant fructum. Hoc idem uel in cæteris oleribus fieri posse non inepte putaueris, uerum sapor acris illorum usui destinatus forsitan utilior est. Sed de his satis iam antè disseruimus. Sterco autè quod esse utile iudicaueris, semper pro uirium ratione disponere debes, minus scilicet si acre, plus si mollius sit.

Non omne sterco omnibus plantis conuenire.

Caput XIII



Ecce præterea nosse, quod sterco singulis arboribus commodius sit. Non enim quemadmodum aqua eadem omnibus prodest, ita & sterco: sed ut solum singulis diuersum accommodatur, sic etiam sterco. Nam & pro ætatibus discrimen exultat: quæ de causa cum serunt, sterco ruminantium statim plantis subiiciunt (ut dictum est) quia leuissimum sit. Quod autè imbecille est, leuissimum profectò desiderat. Omnino in arborum cura quæ omnium communia sint, hæc uel modo, uel genere inter se differunt: atq; etiã fructuum ratione, ut amputatio, purgatio, folio, stercoreatio. Igitur uitibus uel quadriennio post, uel etiã longiori exacto tempore sumum disponunt. Nanq; si citius stercorentur, nequeunt tolerare: nec ad præsidium adauationis confugiendum est, sicut in arborum genere, cum illa penitus adurantur. Quamobrem (ut dictum est) agro pluuiò magis stercoreatio prodest: alioqui periculum imminet, si non imber secutus sit.

De fossione & eius utilitate.

Caput XIII



Ossio omnibus prodest: tollit enim quæ impediunt uel auferant pabulum, ipsi sumq; solum humectius atq; suspensius reddit. Ad hæc aer humo permiscetur (permisceatur enim necesse est, cum terra agitur) præbet uaporatum quendam humorem, atq; alimonium efficit. Quocirca solum squalidum atque siticulosum, fodere agitareq; sæpe oportet, ut ante iam di-

ximus. Palustribus quoque uliginosisq; fossio prodest: quanquam mirum appareat, solis inter se aduersis curam eandem posse conducere. Verum nihil mirandum id est: alterum enim siccatur, alterum humefacit, scilicet cum utrunq; contrario adiuuari desideret. Alimento autem meliori, uberioriq; cum ipsæ arbores uigent, tum fructus meliores creantur. Nam & nuclei minores, & eorum quæ ligno, crusta ue teguntur, ut amygdalæ, nucis euboicæ, tegmina ista tenuiora, intestina uero ampliora utique fiunt: quippe omnino alimenti copia humefacit, pulpamq; auget fructus. Quas ob res ambobus ratione sic euenit, quod si reliqua quoque ad sit cura, magis magisque ampliores, suauioresq; fructus perficiuntur, quoniam & plus alimenti, & amplior ex coctio foret. Cornum (de hoc enim controuersia est) si uere narratur, immodice alimentum suscipit, itaq; minus saporis boni efficitur: quod & alijs fructibus euenit agro præpingui atq; succoso. Fossio hæc omnia subministrat arboribus, atq; in summa plurimum prodest, cum ea tollat quæ succi auferant.

De plantarum societate, item amicitia & inimicitia.

Caput XV



Am & ea quæ uel planta, uel semine iuxta seruntur, hac eadē de causa nocent omnia: & nonnulla etiam omnino interimunt, præterquam illa, quæ loco medelæ adijciuntur, ut hordeum plantis uitium quidam interfecerunt, aut aliquid siccum, ut immodicum humorem absumeret. Er brassicis eruum sociant, ut ab erucis defenderentur, & quicquid eiusdem generis sit. Adde etiam quæ mutuo amore coniuncta inter se sunt, ut in arborum genere olea, & myrtus. Has enim mutuo complexu radicem degere Androtion refert, uirgasq; myrti per brachia oleæ prorepere atque dispergi, & fructum oleæ protectum, ut nullam uim solis, status ue pateretur, tenerum ac dulcem euadere, sed minorem quàm locis soli expositis. Aliud non est quod seri uelit iuxta oleam. Pinus quoq; benigna omnibus propterea esse putatur, quod radice simplici, atq; sit: feritur enim sub eam & myrtus, & laurus, & alia pleraq;: nec quicquam prohibet radix, quo minus hæc libere augescere ualeant. Ex quo intelligi potest, radicem plus infestare quàm umbram: quippe cum pinus umbram amplissimam reddat. Et reliqua quoque paucis, altisq; nitentia radicibus, ad portionem societatem non negant. Necnon & ea quæ non eodem tempore germinant, fructumq; pariunt, copulari facile patiuntur. Hæc enim minimum auferunt alimentum, & tempora germinandi, fructificandiq; diuersa minus infestant. Molestissimæ tam uitæ, quàm cæteris, ficus atque olea. Multum enim attrahunt alimentum, & umbram faciunt amplam. Amygdala quoque damnosæ est, quoniam & uires solidas, & radicem hæbeat numerosam. Sunt tamen qui inter uites serendam censeant, tanquam innocentiam, & cibo mediocri contentam, & simul quod mature fructificet, nec late ad umbret, minime grauem. Sed hi non recte existimant. Umbra enim & sera feracitas non tam infestant, quàm uires radicum, ut diximus: rapiunt enim alimentum suo amplo discursu, implexuq; enecant. Omnium facillimæ, & innocentissimæ, & malus & punica sunt, nec enim numerosam agunt radicem, & pabulo tolerabili egent, & citò senescunt, ut diu nequeant infestare. In summa tamen, omnia sua non cent societate: quanquam aliquando eueniat, ut altero ex sociatis euulso, reliquum obarescere sit necesse. Sic enim uitibus accidisse notatum est, ubi fici maritæ sublatæ fuissent. Causa uero imputanda mutationi eorum est, quæ simul creuerint atq; coaluerint: enim uero tempus longinquum quasi naturam unam ex ambabus confuderat. Nam si cum nouellæ adhuc essent, alterutram quis euulisset, reliqua non modo non pessum iuisset, uerum etiam auctior, ac melior euulisset. Atque de cæteris arboribus hæc lenus.

De uis

De uitium cultura, ratione, & quæ sola uitibus conueniant.

Caput XVI



uitibus, quæ non cum cæteris habent communia, neque inter primas rationes retulimus, hoc in loco reddemus. Cum igitur & genera uitium, & loca diuersa sint, hoc distinxisse oportet, quod genus cuius loco conueniat. Quippe si secundum naturam conseris, proba euadunt: si præter naturam, infœcunda. Naturæ autem rationem similitudine quadam ferè (ut diximus) capiunt. Serunt enim solo sinienti, & solidior 10 uites solidas, tam generis nigri, quàm candidi: sed ex toto ferè nigrum solidius est. Solo autem pluuio solutas committunt. Dignosci densæ, atque solutæ suis possunt medullis, quas in abscessis nouellis palmitibus scrutari oportet. Habet enim quæ soluta est, plus medullæ, quàm ligni, contrà quæ densa, plus ligni, quàm medullæ. Quod utraque solo illi conueniat, his rationibus constat, quibus enim plus inest medullæ, his meatus ampli, multiq; sunt: quibus autem minus, his angusti, & pauci. Quo fit, ut minus alimenti desiderent, quæ densò corpore constant, & simul humorem ad ætatem seruare facile possint. Sol enim ob densitatem haud æque potest educere. Cum igitur tam exigua detractio fiat, radices quàm satis sit ad fructificandum, suppeditant: solutæ autem illæ, cum detractio large, accessio parce ob 20 telluris siccitatem agatur, palmites imbecilles fructusq; imperfectos progenerant. At agro pluuio genus id conuenientissimum est, utpote, quod copiam alimenti largam desideret: & quamuis multum adimatur humoris, tamen quo sol magis educit, eo uitis plus & in amplitudine proficit, & in fecunditate. Pabulo enim abundat, idq; exuperat, facillimeq; percoquit. Nam & solum præterse uitibus optimum idcirco habetur, quia non modo facile nimisq; pingue, sed etiam humidum sit. Vitis enim plurimam desiderat aquam, eo quod in suo fructu humoris plurimum habeat: & imbribus certe ui sui humoris maxime resistere potest. Sin autem 30 ager neque aridus, neque pluuius sit, sed medium teneat, media conferenda sunt, id est, quæ neque densa sint, neque soluta. Genera igitur singulis agri habitibus apta ita distinguimus.

Quales plantæ uitium serantur: & tempora ferende uitium.

Caput XVII



Emina uero quoniam ualidissima esse oportet, idcirco ab agro frigidissimo peti quidam præcipiunt. Densissima enim magis solo etiam gracili comprehendere posse exillimant. Qua de causa uiuiradices quoque solo pluuio deponendas potius quàm cætera semina censent. Radices enim quas illa demiserint imbecilles, humor nimirum putrefacit. Viuiradices uero solidiores sunt, statimq; comprehendunt, ut impune ualeant permanere. Crassitudo plantarum solo pluuio non inepte decernitur: 40 uiribus enim maxime opus est, quemadmodum diximus. Sed squalenti, neque crassas, neque nimium tenues statuere debes. Alteræ nanque putrescere nequeant; alteræ, id est tenues atque imbecilles, ne priusquam cœperint germinare, exarescant, timendum est. Tempora quoque ferendi non eadem solo utrique redduntur. Pluuium enim & frigidum paulò ante æquinoctium feri debet, quippe tunc siccissimum atque calidissimum est. Stitulosum & seruidum post solstitium. Id enim quo amplius imbrem senserit, eo melius germen effundet. Reliquis omnibus ad normam eorum temporum moderando, ferendi tempus accommodabis.

De scrobibus uitium : & pari ratione de refecandis uitium plantis, & tem-
pore huius operis.

Caput XVIII



Vitum præterea terræ exequi pro soli ratione debebis, à scrobibus
ipsis exorsus, uidelicet in pluuiis. Neque amplas, neque altas facies scro-
bes, ne multa in eis aqua collecta putrefaciat semina. Hinc enim si ager
pluuuius admodum sit, palo ferreo feritur, nec terram aggerendam an-
no eodem, neque postero, ut semine maxime humus afficetur. Sin autem
tem siccum squalentemque colis, contra agendum scilicet est. Totum enim si fieri
possit, in scrobes defodere satius est, ut omni ex parte aquam suscipiat: sed si uisus
facere ita possis, foueis altissimis, amplissimisque peractis, terram plantis accumula-
to, ut minime per æstatem seruescant. Cætera quoque ad hanc normam præpa-
rassè oportet. Nam (ut simplicius loquar) uerissimum illud est, quod prius re-
cimus, culturæ scilicet interesse, ut ager humidus siccetur, siccus autem humefiat.
Quamobrem uerno tempore pastinari perquam altissime iubent, ut spiritus abun-
de permixtus pabulum præbeat. Quippe (ut sæpe dictum iam est) aer quoque ali-
mentum præstare potest. Montosis etiam uentosisque locis statuunt, quæ consitioni
commoda sint. Scrobes enim pro moribus afflatuum præparant, & semina cum
obseruatione ponunt eadem, ne aduersa flatibus germinant, frangi etenim uer-
næ esse est, ne uel delapsa præter naturam augerentur. Vitis enim cum ex his aliquid
accedit, deterior proculdubio redditur. Pari modo & reliqua ratione agri decerni
omnia debent. Vineta hunc in modum singulis locis disponi, & his de causis con-
uenit. Refecari autem plantas breui relicto palmite præstat ubique, ut radices ui-
res, incrementaque capiant. Tum etiam solum magna ex parte ieiunum est, & quod
alere nequeat, locis montosis & frigidis rectionem etiam uernam cauendam exi-
stimant, frigus etenim exicat. Tempus tamen putandi ferè idem omnibus statuit
sub ipsam scilicet germinationem, ut planta plena humoris protinus exicetur, ut
germen optime prodeat: quippe putationem istam non fructus, sed germinis gra-
tia faciunt. Autumnalem uero fructui præparant: qua de causa post Vergiliarum
occasum continuò illam adoriri oportet: tunc enim uites sibi maxime constant, &
rectæ minime lachrymant, nec quicquam rumpuntur: quod quidem utrumque
damnum, retonsa post solstitium, & fauonij status nimirum sentiunt, & plantæ
ipsæ laborant, & germina extremis exeunt gemmis iuxta cæsuram, quoniam ali-
mentum partim effluxit, partim in summitate remanserit. Quæ rudi agro disposita
sint, triennio post refecari par est: quippe cum hæc celerius germinant, quia solum
nuper colit inceperit, & alacre semina educanda complexum sit. Quæ autem diu
cultis mandaueris, hæc serius amputabis. Vitis uero subtus circum sua crura insti-
tuenda, formandaque est. Nam si undique leuis, expoliataque sit, melior, fecundiorque
euadet. Nec difficulter possit ita formari, si quis non eos reliquerit palmites, qui
perpulchre excurrerint: sed illos qui aptissimi ad formationem destinatum consti-
terint: quippe singulas gemmas singulis reliquisse abunde. At si necitudo certò be-
ri possit: quia scilicet uitis non per eandem tulerit partem, gemmæ prorsus internæ
tollendæ sunt, ut ad exteras alimentum excurrens, uitem scindat in brachia. Sem-
per enim ad partem uitium atque capacem persluitur. Quamobrem uitem (ut di-
ximus) pro uoluntate formare facile est, sed hoc in agro humecto atque frugali.
Siccò enim, squalentique, palmites qui optime profuerint, reliquisse necessarium.
Cum enim siccus ieiunusque sit, nunquam alio facile profert. Quapropter factum
impetum conspiciari satius est. Quin & afflatuum ratione refecidisse decet, nec
præter naturam quicquam est enitendum. Plantas ad hunc modum, hisque de cau-
sis tractare consueuerunt.

De sale

De falcatione uitium, ac reliqua cultura, & de mensura palmitum.

Caput XIX



Vitibus iam perfectis, primum ac summū falcatio dabitur: quippe cum bene uitis puratur, & germen, & fructum melius affert, & uiuere diutius potest. Secundū, & quodammodo illi proximum, decumatio est: enim uero in hac etiam scire necessarium, quanam reliquis se, quæ uē detraxisse conducatur, tam ad fructuum rationem, quā ad totam uitis naturam. Reliqua cultura communior atq; facilior est. Nil tamen tam facile est, ut non sit cum solertia. Omnes quippe uites, culturae ingenium, modum atq; rationem exposcūt. Differētia uero quam in operibus locorum ratio facit, cum in omnibus constat, tum maxime in falcatione, officioq; putandi est; quam rem prorsus generum agrorumq; ratione conātur discernere. Determinationē autem rebus consummār duabus, agrorum statu, & breuitate, longitudine uē recisionis. Quæ enim ad institutionem, totamq; recisionem uitium pertinent, eadem faciitari ubiq; ceruum est. Quidam de generibus, agroq; simili idem sermē determinarunt, uidelicet locis aestuosis, & siccis, & genus eiusmodi uitium refecari ad breuem palmitem, sicciores enim reddūtur, quia uberius alere possint. Contrā ad longum, locis aduersis, genusq; aduersum, ut humidis atq; succosis, & uites, quæ tali habitu consistent: nam & natura humidæ sunt, & summa potius parte fructificant. Alij in uniuersum de omnibus statuunt, non agri ratione, sed generum, qualitatūq; iu bentq; obseruari medullam (ut dictum est) in abscessis nouellis palmitibus. Nam si multum medullæ habeant, multos, breuesq; palmites relinqui oportet, ut uitis bre uitate alere possit, multitudine large fructificet. Sin autē parum medullæ, multum palmitis anniculi gerant, pauciores quidē, sed longiores palmites relinquendi sunt, eoq; longiores ubiq; quo minus inest medullæ. Igitur in uniuersum refecandi mo dum ita determinant. Mensura autem palmitum semper ad rationem medullæ ita capi omnino debet, ut palmiti amplectenti, medulla in latitudine respōdeat. Cum enim uitis pariter ad suum habitum conseruandum, & ad fructum ferendum re ciditur, nullus dubitat, quin & diu uiuere possit, & fructu ualeat semper. Prorsus si medulla partem maiorem cæsuræ occupet, fructus uberes, palmites imbecilles creari, propter alimentī tenuitatem existimant. Contrā si palmes recisus solidus sit, & iuuenili robore constet, parum fructus à parua medulla. Creari enim uuam à medulla, & palmitem à palmitē amplectente medullam, argumētūq; uitē ipsam potissimū esse. Germīna enim omnia, quæ nouellæ annotinis protulerint brachijs, fructu carere propter exiguitatē medullæ, & nouellas minus fructificare quā ueteres, scilicet eadē de causa, cum carnē, & unaceum medulla progeneret. Sed hoc minus uerum apparet, siquidē medulla detracta caro creetur: uinacē nequeat ge nerari, nisi fortē intima parte medulla detracta sic fiat, necesse sit. Sed de hoc aliās. An autē omnino quæ medullam habeant ampliōrē, fructus meliores, uberioresq; præstent: nihil ad præsentē referat disputatiōē. Publicam omnī amputationem hanc esse autuant. Quæ autem palmites large, fructum parcē producunt, his po stre mos palmites relinqui longissimos uolūt: breues autē illos qui aduersum ipsum caudicem extant, ut à breuib; uitis augescere possit, à postremis longissimis illis co piose fructificet, utpote à larga medulla. Cum autē germinant, omnia quæ fructu carent, detrahi cēsent: quæ fructum gestant, dimittantur, cum uua floret: ut nec uitis ad abscisum palmitem incrementum compellat, & quantum alimentī superfit, in eadem parte coactum, uuam augeat. Semper enim ex recisione quærēdum id est, ut & uitis conualefeat, & fructus copia cōsequatur. Hæc igitur generalis quædam atque communis omnium est.

De uitis putande temporibus.

Caput XX



Empus autē amputandi, alij locis tantummodo diuidunt, alij genera etiam tangunt. Iubēt mature illas recidere, quæ in solo sicco & calido, cum primò sua demittere folia cessauere: quæ in frigido atq; pluuio positæ sunt, has paulò ante germinationem: quippe quæ in solo sunt sitiente, humorem suum seruantes, ipsæ meliorescunt, & fructum uini suauioris progenerant: quæ uero in frigido sunt, emissio humore, nec ipso deterior quicquam redditur, & fructus fit incorruptior, & uini suauioris efficiens. Mediū autē ac temperatum obtinentibus agrum, mediū tempus statuitur. Sed non desunt qui mature omnes amputari præcipiant (ut dictum iam est) quod palmites 10 crassiores iam efficiantur, & nulli oculi obrundantur, & si tempus serenum obtin- gat, plagæ siccantur. Quæ omnia plurimū profunt: hyberno etenim tempore gem- mæ pereunt frigore magna ex parte, & plagæ uel siccæscientes rumpuntur. Vere au- tem lachryma effluit, & permulti oculi excæcantur. Atqui nō his de causis festinan- dum quidam existimāt, sed ut uitis statim post uindemiam fructū ferat secundum. Simul enim binos fructus posse gestari denegant. Sed hi minime recte id asserunt. Fructus enim per ætatem conficitur, cum copia adest humoris: quippe cum hac ra- 15 tione generationem agi necesse sit. Argumentum, quod si quis hybernas uineas principio ætatis confoderit, palmites ex nimietate humoris, crebra gemma proue- nient: quod ipsa profectò follis efficit, quia nimirum implet, ut uis solis seruefaciēs 20 condensare, atq; ita gēmas reddere crebriores, uuasq; numerosiores elicere ualeat. Qui tamen ista præcipiunt, secus rationes assignant, quippe gracili, seruentiq; solo colendum mature aurumant, ut humor ad maxime opportunos palmites ueniat, alimentumq; proinde per ætatem super sit. Quæ autē in solo humido positæ sunt, quæ uel in luxuriā prorepere solent, has recidi uerno tempore oportere, ut humor diffusos leuata plaga effluat tempestiue. Luxuriantur enim ex nimio humore, quem excoquere nequeunt, atq; lamenti syluescunt. His dum plantæ sunt, hor- 25 deum, fabasq; interferere placet, quoniam hæc exicare omnium præcipue possit. Causæ, quas reddunt, hæc ferè sunt. Sed & ad agros, & ad mensuram refecandi, omnium diligentissima distinctio illa est, quæ utrorumq; ratione, id est agrorum ac 30 generum redditur. Sunt enim quæ fructum parere nequeant, etiam si recidantur ad breue, sed tamen ad germinandum contendunt, ut quæ aphytæa uocatur. Et apud Acanthum uero ad quatuor gemmas reciditur. Quibus autem palmites lon- gi relictī sint, celeriter ex fructuum largitate senescunt. Nouellas itaq; refecari ad breue perutile est, ut etiam radices melius cōcipere ualeant. Et de falcatione uitium hinc dabitur contemplandi facultas.

De uitis decacuminandis, & quando germinent uites, & quousq;.

Caput XXI



Vic proxima cura, ac uelut secundum obtinens locum, decacumina- 40 tio est. Quamobrem mox eam iustum est aggredi, decacuminareq; cum fructus incipit provenire. Mox uinea confodienda profectò est: tunc enim fructus nouis, & recens æditum germen, farculum tem- pestiue recipiunt, cum maxime augeri contendunt. Post hæc iterum decacuminandum antequam florere incipiant. Interim enim pendula racemī au- gescere solet, quia nondum acina consistunt: post ubi defloruerint, uua pendula iam consistit, acina consistere atque augeri incipiunt. Omnino decacuminatio ac 50 follis, media tempestiue omnium maxime operum reddi exposcunt. Tunc enim uitis augeat fructum, & germina, quibus anni posterioris fructum inchoare, festifi- careq;

careq; incipit. Quod si fodiendi cura non omittatur, bene quæ tulerit, auget, & fructus luturi primordia bene concipit. Germinat uitis ad ortum usq; caniculæ. Cum autem hæc oriri incipit, cessat, quæ fructum futurum probe sit cõceptura. Quippe sole seruefaciente, summa pars germinũ obdurefcit, atq; ita cessat auctio: quo factio germinis humorem consiliter, fructumq; ex eo creari, naturæ lex est. Quæ tamen locis opacis, uel humidis manent, solem tolerant, & plus temporis augetcere possunt. Prorsus & distractio, & mutilatio certum tempus sibi depolcunt: sed id non æque obscurum, neq; difficile cognitu est.

De puluere uinibus excitando: & cur agricole ad uites sale utantur:

Tum de palma.

Caput XXII



Plueris excitationem primis temporibus, cum nigrescere uix incipiunt, damnavi, quodsq; ad maturitatem perueniant, ratio est. Motus etenim percoquendi, motu altero auocatur, uetaturq;: qua de causa ne herbam euellendam per id temporis censent. At omnino inutilem, noxiãq; putari, nulla ratio est. Vtus enim, & quod in alijs fieri solet, utilem esse planè confirmant. Cucumeres nanque puluere occultati, nutriti tenerioresq; reddi creduntur. Quamobrem Megaresenses ita eos tractare consueverunt. Sed mirum uidetur, quod puluis qui tam siccus est, alere queat. Ratio tamen esse in pluribus possit. Nam & quia citata humo, uaporati cuiusdam aëris alimentum reddatur, ut de solo uaporofo retulimus: & quia fructus obiectus puluere defendatur à solis seruore: & quia leuiter molliterq; siccens, amplius à uite pabulum attrahere possit. Quippe hæc omnia cum ad copiam alimentum, tum ad facultatem coquendi nimirum adiuuant: quapropter folijs quoque fructum integere solent. Cum itaque tegmine, & aqua quoad satis sit potiatur, læti, teneriq;, ut debent, redduntur. Et de uinibus dictum satis iam sit. Omnium autem maxime res peculiaris inter curas agricultorum sal esse uidetur, quod radicibus palmarum accumulatur. Nam & ad germinandum & fructificandũ perutilis est. Medicandi enim tutandiq; ratione si eiusmodi quicquam adhibeatur, minime mirum, ut cinis fico, & rutæ: facit etenim siccitate sua, ut radices neq; uermem, neq; putredinem sentiant. De sale uero aut falsugine, quam adhibere consueuerunt (alij enim falsugine, alij sale utuntur) simplex ratio reddi potest, quod palmæ loca falsa plurimum concupiscunt: & argumentum, quod ubi palmarum copia est, solum tale spectatur, ut in Africa, Syria, atq; alijs tractibus. Quo sit, ut ubi falsugo nō sit, ope proxima salis subueniant. Verum hæc ratio communi utiq; iure dici de omnibus potest, quæ loca quærunt diuersa, initio à primis, summisq; generibus sumpto, ut aquatilibus, terrestribus, differētijsq; eorum. Singulis enim loca aptissima naturam dedisse certum est, ut & animalibus: quippe quæstio & ratio eadem est. Cæterum si quid de his quoq; proprium exponendum sit, in solo atq; radicibus quærenda causa est. Hæc enim qualitate quadam ex sale afficiuntur. Enimvero solum leue, solumq; redditur, radices uegetiores, crassioresq; sunt: quippe cum plus pabuli trahant quibusdam partibus meatibus: atq; etiã causa refrigerationis, quod sterius propter suũ calorem efficere minime potest. Palma enim quantũ aërem circumfusum calidum quærat, ut fructus maturefcere possit, tamen radicibus refrigerari ob siccitatem desiderat, quod sal subministrat. Quamobrem apud Babylonios salis usus, non stercoreis est. Causam uero, qua sal palmæ tantummodo prodest, naturæ proprietati imputari par est. Materies enim radicesq; eius arboris plurimum à cæteris distant: quapropter sale remorsæ, alimentum uberius trahunt, quò & sibi satisfacere, & arborem totam augere facile possint.

Sylvestria cultu miscere : & de palma iterum ac de cultura amygdalarum.

Caput XXIII



Ac ita etiam cultus terræ, ut omnium radices ualidiores reddantur. Hinc enim nonnulla ex sylvestrium numero in urbanum habitum transunt. Et sterqus quoque uehementissimum hoc idem potest efficere, ut feces pelium, & urina: quod stercorendi genus myrtis statuitur. Huiusmodi quippe sterqus subire arborem longe amplius potest. Nec non & arborum cæterarum radices remorderi desiderat, ut etiam in punice patet: (nam his quoque urinam infundunt, & pelium feces accumulanti) non tamen pariter atque myrti, sed minus. Humidæ tamen carnosæque remorderi, & sic infarci minime cupiunt. Omnino mutationes arborum culturæ ratione exultant, ut ex acutis amaris uel transeant in dulces, ceu punicæ atque amygdalæ, & quicquid per alterationem suarum radicum natum sit immutari: quippe amygdala triennio post immutatur. Cultum enim per tantum temporis adhiberi par est. Radices punice plus etiam temporis persistunt. Fructus mutatio cum amplius alimentum percoquitur, ratione consequitur. Coquitur alimentum perfectius cum radix qualitatem quandam coeperit. Ad summam (ut etiam ante dictum de seminibus est) per motu, immutatoque principio, cætera quoque atque uniuersam naturæ conditionem permutari necesse est. Alimentum autem mouet atque immutat, si diutius ueniat. Nam & aqua feruenti cum quædā rigantur, meliorescunt, ut malus uerna, & myrtus. Hæc enim sine nucleo redditur, ut quidam affirmant. Deprehensum id est foruit, quod myrtus iuxta balneum stare neglecta. Ab hac enim uacua nucleo redita semina petentes serebant: atque ita genus huiusmodi Athenis esse inceptat. Sed hæc quoniam similitudinis aliquid proferunt, ad fidem rei propositæ faciendam retulimus. Aquæ autem salæ quibusdam quoque oleribus congruunt. Et qua de causa nitro in nonnullis utuntur, expositu in primis rationibus est. Quamobrem hoc etiam uapore cōueniens, admittendum: ips etenim ipsis atque alimento eorum quoque dulcedinem effici certum est. Verum hæc succo constant amaro. Palmis acerbitas inest, quam protinus salis uis à primis inijs tollit. Et de cæteris satis dictum est. Fructum autem perdurare in palma foemina nunquam posse, nisi florem maris cum puluere super eam concusserint (ita enim quidam confirmant) peculiare profectio est: sed simile caprificationi ficorum, qua fructus perficitur. Ergo foeminam minus ad perficiendum sibi sufficere aliquis potissimò dicit: sed hoc non in uno genere aut duobus, sed uel in omnibus, uel in pluribus constare deberet, naturam etenim generis ita diiudicamus. Et in his tamen ipsis paucis generibus mirum, quod palmæ nulla ratio dari possit, cum caprificationis causa conspicua esse putetur. Sed de his satis. Cæterorum peculiaris causas habent conspectiores. Amygdalam enim dum fructum parit, neque rigandam, neque stercoreandam, neque purgandam, præterquam aridis, neque ulla cura tractandam existimant: ne plus æquo ualidior reddita, fructum in flore amittat. Quamobrem agrum quoque minus frugalem querere assolent: & si post hæc fructum parere non possit, radices resollas respoliatasque, hybernis frigonibus tradunt: & reliqua puniendi genera quæ retulimus, afferunt. Proxime illas quoque tractare consueuerunt, quibus cortex sponte detrahitur, ut uitam, iuniperum, tiliam, omnino eas quibus cortex dirumpitur. In his enim natura ipsa rem quæ cōmoda sit, uidetur ostendere, cum corticem disgreget, & tanquam alienum reijciat. Damnosum autem est, omne alienum, sicut etiam quod aridum est. Et de sale hoc idem uero animaduertere licet, ubi proprietas aliqua sit ad naturam accommodata. Et de arboribus hinc ratio comtemplandi sumenda est.

De cultu

De cultu coronariorum, suffruticum, olerumq̃.

Caput XXVIII



Is coronarium, & omnino suffruticeū, & sermē olerum genus respon-
dent: quandoquidē uel in his alia omnium communia sunt, ceu riga-
tio, stercoreatio, sarritio: alia propria generatim habētur, ut purgatio in
coronarijs pariter atq̃ oleribus, quippe serpyllum obarescit, nisi pur-
getur, & silymbriū, & cætera. Rosas non solū præcidūt, uerum etiam
adurunt: desinūt enim florere, syluescuntq̃ passus fecunditate, nisi ita traciētur.
Et brassica & ruta durefcunt & exarescunt, sed dimutillatæ & in ramos dispersæ,
ampliores, meliores, sapidiore redduntur. Enimuero germinatio diffusa, tam sa-
poris quā odoris acorem nimium tollit: quippe suauitas & temperantia in me-
diocritate consistit. At in olerum genere usus detractionis nullus est, præterquam
in ijs quæ retonsa melioresfcunt, ceu porrum: uel ex ijs aliquid quæ numerofo ger-
mine ampliuntur. Euulsio uero illorū quæ apposita sint, uel ipforum congenerum
cum densa inter se sunt, uelut purgatio proculdubio est, ut reliquis plus alimenti,
incrementiq̃ acquiratur. Sunt nonn ullis peculiaria, ut de ruta prædictum est, utq̃
in alijs patet: sed pauciora hæc sunt, & sermē conspicua.

De cultu segetum: quemadmodum agitare solum oporteat: de ratione sementis faciēda:
quosdam agros communem curam negligere: arationem bonam caput esse in
agro colendo: tum de cura nouatum.

Caput XXV



Eliqum & quasi arborum curæ obiectum, cultura segetum est, qua
in parte agitatio soli præcipitur, & tempus sementis, & sarritio adhi-
benda post satum. Sed ante hæc uel etiā simul agrum cuiq̃ accommo-
dandum nosse oportet, ut etiā in arborum genere. Quin & in tra-
ctatione soli non desunt, quæ iudicium agricolæ prudētis desiderant,
ut si aliud per æstatem potius, aliud per hyemem, uel confodiendum, uel relin-
quendum, uel aliquo modo tractandum sit. Quæ nonnulli discernunt: quippe so-
lum pluuium, solidum, ponderosum, & pingue, per æstatem & profcindendum,
& confodiendum affirmant: contrā siuens, solutum, leue, & gracile per hyemem.
Enimuero illa æstiuæ cultio assiccare attenuareq̃ potest, hyberna uero crassare achu
mesacere, quæ scilicet natura indigens utriusq̃ soli desiderat. Et stercoreandum am-
plius solum gracile, minus frugale percensent: tum propter soli uirtutē, tum quod
stercus plus alimenti ministrat, quam excoqui possit. Terrenum quoq̃ aduersi ha-
bitus intermisceri præcipiunt: exempli gratia, ponderoso leue, leui ponderosum,
macro pingue, & contrā. Pari modo, & rubrum & candidum, & si qua contrarie-
tas alia sit: quippe non modo quod deest replere admitti potest, sed etiam solum
omnino reddit ualidius, ut si quod defatigatum atque effoetum iam est, fertili cul-
quam terræ permisceatur, serre iterum incipit, quasi nouum effectum sit, & quæ
sua natura sterilis sit, ceu argilla, si misceatur, seracem efficit. Altera enim alteri
stercoris uice quodammodo fungitur. Quamobrem Megareses miscere ita con-
sueuerunt, & quinquennio aut sexennio post alte defodientes, inquantum im-
ber ualeat peruenire, ima terreni ad summa regerunt, quō seges renouelletur.
Pars enim ad alendum idonea labitur deorsum semper cum aqua. Solum siccum
& tepidum ante imbres feri præcipiunt, ut admissa humoris copia satis alere possit.
Et pluuium quoque eodem modo serendum existimant, ut semina humo adhuc
tepidā pullulent atque augefcant, itaque imbres sufferre possint ualidius. At si ob-
serendum in humido sit, terra antè præcisa, serō semina committi melius ducit. Ma-
tura semente rara solo mandari semina iubent, serotina autem densa. Altera enim
radicem abunde concipere nequeunt, altera optime radicanur, & germine multi-

disparguntur. Hæc igitur cæteraq; huiusmodi (plura etenim sunt) si quis culturas soli exequi diligenter uelit, ad rationem potius agrorum cōsiderasse oportet. Sune enim qui cultum exquisitum pati minime possunt. Sed qui ita colat, plurimum ab-
 terrabit: quod illi euenerat, qui ex Corintho Syracusas profectus, culturam Corin-
 thij agri in Syracusano seruauit. Cum enim lapides e segete frugali legisset, reddidit
 multo deuiore: frumentum enim exarescebat, cum exemptis lapidibus nihil ha-
 beret, quo se posset protegere. Huic proximum est, quod actum in Syria referunt:
 solum enim aratro alte profectum penitus resiccātū est, cum solis intrusu adeo per-
 caluerit, ut propē ueretur. Vnde fit, ut aratris pusillis Syri utantur. Hæc igitur iudi-
 cium callidi coloni requirūt. Verum (ut communius atq; in uniuersum dicamus) ¹⁰
 summum ac primū est omnium, agrum bene arasse. Semen enim solo commissum
 bene profectio perbelle erumpit, cum terra iam mitigata, emollitaq; sit: tum sterco-
 rasse bene, & alium atq; alium cultū adhibuisse operæpretium est, ut sarritionem,
 runcationem, & reliqua. Cura noualium tempore utroq; suscipitur, æstate ac hye-
 me, ut terra solem ac frigora sentiat, quemadmodum de conferendis quoq; arbo-
 ribus proposuimus. Solum enim sæpe inuersum, rarum, leue, atq; materia uacūū
 redditur, ita ut alere facillime possit. Ideoq; præcipiūt nunq; legumina in noualibus
 serere, nisi mature admodum fieri possit, ne æstiuam nouellationem impediant. Ni-
 uem hybernis noualibus prodesse existimāt, pruina uero nocere, corrodere nanq;
 terram extendi uareq;. Postquam primas arationes nouellarūt, rursus Vere cespitem ¹⁰
 inuerti solent, ut nascentē herbam interimant: tum æstate arant, & cum serere
 uelint, profcūdūt leuiter, utpote cum solum bene prægitatū præparatumq; esse,
 ac ea de re operam potissimō dedisse oporteat, quemadmodum diximus. Quapro-
 pter bidentis culturam magis quā aratri commendāt. Id enim pleraq; intacta ui-
 detur relinquere. Thessali uel bidente ualidiori ferramēto utuntur (quod credo id
 esse quod pastinum uocant agricolæ Itali) quod miscum uocitant. Hoc enim altius
 descendens, plus terræ inuertit. Soli cultura hæc est. Euenit autē ijs qui in ea elabo-
 rauerint, ut minus in reliquis elaborandū sit. Contrā qui segnius illam susceperint,
 coguntur profectio, ut sæpe & sarriant, & runcent, cum herba multa erumpat. Sic
 enim semina pereunt. Prius autem quā frumētum herba enascitur, quoniam & ¹⁰
 ualidior est, & prius inest in segete. Nam si frumentū citatius crescat, herba magna
 ex parte strangulatur ac perit, & in totum non æque officere potest.

*Quæ semina cui solo conueniant, & quæ imbres desiderent magis: item quod solum le-
 guminibus conueniat.*

Caput XXVI




Olo pluuiæ atq; frigido conueniunt ad triticū pariter & hordei, atque
 cæterorum frumentorum fructificationem, soluta enim hæc sunt.
 Cætera plus imbris desiderant, & nigra magis quā candida, at si sic-
 ca & rubra, & in locis frigidis reuertentia. Item candida magis quā
 nigra, ut antequam imber desinat, grandescere possint: celerius enim ⁴⁰
 candida perficiuntur. Temperatis autem locis quæ media consistant natura, man-
 dari oportet. Sic hæc discerni quibusdam placuerat: alij secus indicant. Verum
 (ut simplicius agam) solum gracile, hordeum melius præstat. Pingue tritico accom-
 modatius est. Hordeum enim minus ac leuius alimentum desiderat. Triticum lar-
 gius, callosiusq; expolcit. Triticum trimestre solo tenui melius fit. Alimētum enim
 subministrari modicum eo potest, hoc est, leue leui. Africum & draconτίας appel-
 latum, & strangias, & selenusium, lætum exigunt agrum. Hæc enim uberius suc-
 cos hauriunt. Argumētō calamus est, quē crassum gerunt. Ad summā, quodcūq;
 huiusmodi sit, solo frugali apte committitur. At si aliquid genus tunicis multis con-
 regitur,

tegitur, ceu thracium, hoc solo hyberno conuenientius dabitur: frigus enim huic nihil officere potest. Rarum, solutumq; ceu canchrydias uocatum, agro pluuiio ferendum profectio est, quippe cum alimenticopiam id quoq; desiderat: quamobrem & culmo crasso exurgit. Quin & in leguminum genere pariter intelligere licet. Solum enim lentum ac nigrum, cicer melius fert, leue melius fabam. Sic enim urriq; modice alimentum offertur. Et in ceteris uero semper ad alimentum referenda ratio est: nunquam tamen ratione aeris pretermissa, etenim solum apricum & ad summam serenum, infirmioribus commodius est: contrarium ualidioribus: lutosum siccis, & paruo alimento contentis, ut achilleide: quippe hoc succos melius
 10 digerens facit candidiora: ferunt, & coctilia, & sicca loca quoq; soli exposita, plus enim uis solis percoquit. Triticum solo pluuiio uberius quam hordeum geritur, & omnino contra imbres ualidius est: fert idem etiam solo non stercoreato copiosius. Ratio, quod suo naturali calore plenius concoquere possit, & fimum non aequerequirat, quoniam in se habeat quod ex fimo acquireretur. Ad summam, triticum robustius est, & maturius feritur, & locis frigidis magis committitur. Robur autem facere, caloris plane interest naturalis. Quin & quod tunicis inuolutum pluribus sit, fit ut tutius maneant: quapropter solum, quod longo interuallo temporis colitur, triticum magis quam hordeum fert. Triticum enim alimentum eius soli ualidius magis uincere potest. Omnino (ut simplici ratione dicam) publicae ac summae differen-
 20 tiae illae sunt, agri natura, seminum firmitas infirmitas ue, atq; aeris habitus: quae de causa haec considerari ubiq; necessarium. Frigora subsecuta omnibus in locis utilia sunt: sic enim fara plenius radican- tur, cancrificanturq; ita, ut ineunte Vere haudquaquam modica magnitudine careant, sed praecipue in bonis. Austrinum enim atq; omnino serenum tempus celeriter aedit, eruginemq; foetificat. Quae dense fuerint seminata, spicam prius effundunt, quam quae rarenter, quod altera largius radicentur, & multiplicius deorsum scindantur, quia locus superflus, altera protinus fursum excurrant.

De uitijis segetum, erugine, crucis, & uermibus.

Caput XXVII

30  Emina quoq; ad fertilitatem idonea, & uitia quae accidere solent, haud ignorare oportet. Locis enim cauis, & a statu silentibus segetes erugine infestantur: aufugiunt hoc uitium quae stant non erecto, sed paruo cacumine. Quamobrem spicam inclinari utile est, ut imbres decidant, nec rores excipi possint. Inclinatur magis quae longae sint: manent erectius latae ac breues: quod fit, ut istae eruginem sentiant. luuat & multo a folijs spicam distare, humor enim in folijs magis concipitur. Itaq; si propinqua sit, tangitur statim: si remota, non aequae inficitur. Quamobrem hordeum achilleis uocatum, eruginosum, tam nigrum quam candidum est, spicam enim gerit erectam. Contra genus, quod eteocritum uocamus, quia incuruatur, ab erugine innoxium est. Segetes
 40 uento expositae minus erugine infestantur, motus enim humorem discutit. Nam & cum post imbrem flatus secutus, & nox deinde successerit, erugo minus conficit. Flatus enim humorem deijcit, & sol paululum immoratus nullam putredinem conficit, sed prius quam quicquam emarcescat, humor totus assicatur atq; absumitur: erugo autem quaedam putredo est, nec putridum esse quicq; potest sine alieno calore. Triticum plenilunij potissimum eruginem capit: ratio in calore est, quo etiam noctu luna putrefacere potest. Infirmita, fragilioraq; sunt omnia (ut simpliciter loquar) alba quam nigra, tam in plantis, quam in animalium genere. Igitur quod semina locis conuenienter eligi debeant, plerisque rationibus constat. Morbi autem (ut summa dixerim) omnibus seminibus ob alimentum coeliq; temperiem eueniunt

uidelicet cū plus, minus uel alimēti prābetur, aut aēr immodice humidus, siccus uel est, uel etiā cum non tempestiue humescit. Sic enim & uermes, cicēri, cicerculæ, pīsoq; innascuntur, & erucæ. Cicerculis, cum priusquam fuerint resiccata, dies in aerem feruidi accesserint: cicēri uero, cū falsugine ablata dulcedinē ceperit, quippe natura ubiq; animal gignit, modò calor cum humiditate ratione debita coeat. Humiditas enim cū materia subiacet calori ad excoctionem conficiendam, quod uel in tritico euenire uidemus. Vermes enim eius radice creātur, cum post sementem flatus austrini crebre inaccesserint. Tunc enim radice humefcente, & aēre calido, radices caliditas putrefacit animalia procreat. Vermis inde enatus continuo radice erodit. Singulis enim ex eisdem rebus generationē, alimentumq; natura prāscripserat. Alterum genus uermis ingignitur, cum humor effundi nequit cōclusus siccitate aeris circumfusi. Tunc enim calor cōfecta putredine animal cōtrahit. Tunc pabulum idem ei quoq; subministratur. Hocidem & mālīs, & omnino arboribus euenire uidetur, quæ ex siti uermiculantur. Quod enim parum humoris sit, idēq; in arbore maneat, putredinem conficit, ex qua uermis; contra cum alimenti copia superpetit, tunc enim succus ad superiora transmittitur, & quia largior, uincit, nec potest putrefcere. Huic proximum quod etiā uinibus euenit. In his enim austro potissimum uermes ipes uocati gignuntur, utpote cum istæ humescunt, atq; aēr foetificet, tum ij quoq; materiem sibi congenerem statim erodūt. Item carpæ in oleis pari ratione creantur, & quæ in reliquis solent consistere, uel cum germinant, uel cum florent, uel etiā post florem. Enim uero omnia ex simili causa proueniūt. Sed uinibus hoc potissimum euenit, quia natura prāhumidæ sint, & humor earum insipidus sit atq; aquosus. Humor enim qui talis est, facillime affici potest. Nonnusquam ipes omnino nequeunt generari, scilicet loco placidi spiritus, neq; humido, neque succoso. Sed de morbis latius postea differemus.

De satū temporibus in frumentis. Solstitijs non serendum, nisi quedam.

Caput XXXVIII



Erere inbēt alij Vergilijs orientibus, tunc enim semina seruari posse in terra siccā, & irrosca arbitrantur: alij occidentibus, ut etiā Clidemus autor est, quod imbres die septimo ab occasu accedat. Sed optimum fortē atq; tutissimum, solo turgenti semen committere. Cauendum tamen ne ponat in lutulento, aut semina dido, & semisiccaneo, quod quidam amphiergum uocant. Humidum enim limosumq; facit, ut semina diffundantur atq; lacescāt: & si siccetur, oblinat, obstruitq; nec transmeandi libertatem concedit. Semina didum uero facile putrefacit. Tantum enim caloris humorisq; obtinet, ut mouere quidē semina possit, sed compellere germenq; effundere nequeat. Quamobrem sementem hanc omnium deterrimam putant. Quæ enim in sicco facta sit tempestiue, semen minime perdit. Solstitijs serere tutum esse Clidemus negat. Enim uero terram per id temporis madidam ponderosamq; esse, atq; ita uaporosam, ac similem uelleribus male dilaniatis effici ait, nec posse uapores attrahere sursumq; transmittere, cum nō tantum caloris habent quantum sufficeret. Verum quæ ferotina sunt, solstitijs melius obseruntur. Et prodest seminibus in satū, & postea quā satā sunt, dies placidos complures incidere, ut ualeant pulululare. Post hac frigus aquiloniū mediocriter utile est. Nihil enim ualide iam fixis conspatis nocet, sed constipando meliora, fecundioraq; reddit: quippe cum radice robustiore plus alimenti trahatur, & incrementum postmodum citatius ueniat. Quæ namq; continuo se extollunt, gracilia, imbecilliaq; perficiūt, tum etiā quæ intempestiue conceperint atque fuderint, pereunt. Omnino enim intempestiua educatio

educatio fluxa est. Quamobrem alij recidere, alij retondere consueverunt. Iuuat etiam nix, quando terrā fermentet, & rare faciat, & pabulū praebeat, & calore con-
 cluso radices augefcere, corroborariq; faciat.

*Cur agri frigidi, calidiq; frumentarij sunt. Item annuū fructificare,
 non tellurem.*

Caput XXXIX



10

X quo illud quoq; palām sit, quod in quaestione uersatur: Cur ager sit
 gidus, calidusq; frumentarius est, ceu Thracia, Pontus, Africa, Aegy-
 ptus. Etenim supra cetera, frigus etiam aestusq; aliquid conferunt: ut
 de mollitione terrae dictū iam est. Quippe nulla re minor, sed omnī
 maximus circumfusū aēr animaduertitur, scilicet ad tempestiuitatem
 imbrium, uimq; flatus, & frigoris. Qualia enim haec fuerint, talia quoq; semina red-
 duntur. Vnde recte in prouerbio est: Annus fructificat, nō tellus. Si uis quoq; agri
 plurimum ad statum, solemq; ualeat: quod etiam de arboribus diximus. Enim uero
 pleriq; agri, quamuis graciles uitatiq; fruges tamen perficere haud improbe pos-
 sunt, quia commode ad haec ipsa positionem obtineant. Omnino (ut summam di-
 xerim) ager bonae frugis, frigora quoq; multa desiderat. Serenitates enim flatusq;
 austrini uitia magna ex parte sc̄thificāt, eruginosāq; fruges efficiunt. Contrā hyems
 consipatis, canceratisq; stirpibus magnitudinē modicam uerno tempore facit. Ter-
 ram item si occupauerit cultam, rariorem solutionemq; reddit. Qua de causa incre-
 20 menta, exortus, cōsummaōnesq; celeriter Vere ac̄titatur, adeo ut nihil pro sua exi-
 stimatione posteriora uenire, sed etiam antecedere illa, quae fata sunt in agro tepido,
 uideantur. Sicut etiam arbores detruncatae: cum enim uehementer propter succi
 collectū, fauoremq; aēris excitentur, celeriter & augefcūt, & consummant. Igitur
 agri his inter se differentijs discrepāt. Semina autem in ijs quoq; similia capi oportet
 ne qua mutatio consequatur. Atqui nōnulli ualidiora esse illa affirmant, quae ager
 praebeat optimus: hūc uires eorum perdurare biennio posse. Quod si ita est, pro
 30 plantis sanē illi occurrit, quod de arborum plantis asseritur, hoc est, optima, ualidiss-
 simaq; petere oportere. Quapropter utraque ratione rem agi conueniet.

In aequalitatem coeli non esse contemnendam.

Caput XXX



40

Eris quoq; inaequalitatibus cura est adhibenda. Neq; enim quae loca
 aprica, & prospera tulerint, serotinis frigidisq; conueniunt: neq; con-
 trā: altera enim festinare putātur, altera squalore, imbrisq; inopia pe-
 reunt. Quod enim serotina sint, lente concipiunt, pariuntq;. Quocir-
 ca, ut ueniant posteriora, necesse est. Hoc idem frugibus quoq; eue-
 nire planē uidemus: quae enim praecoquis, lactiq; germinis sunt, ceu trimestria, haec
 solo mature cōmissa praueñiūt: nisi quid eiusmodi sit, ut hyemē anticipare debeat,
 quō possit radicem concipere. Sicut & fabam ea de causa mature oblerere solent,
 40 & simul, quia imbrem in flore amet, diuq; resforeat. Nam si serō seratur, imbrem
 haud assequi possit. Prodest fabae imber cum floret, quia raro opere constat. Fru-
 mento in cōmodius est ratione praedicta: ceteris quoq; leguminibus innocens est,
 praeterquam ciceri. Hoc enim abluta falfugine, tanquā re naturali, & sibi ingeni-
 ta destitutum, radicitus statim tabescit, atq; ab erucis exeditur. Fortificatur enim quē
 admodum diximus. Sed semine in uino praemacerato minus posse egrotare puta-
 tur, quod rationis est: sic enim aliquid acerbis habebit, quō possit resistere. Om-
 nino enim si quis immutatum semen terrae mandauerit (ut antē iam diximus) tam
 plantas, quam fructus permolari posse, ratio est. Quale nanq; principium sit, tale
 illud quoq; sequat, quod ab eo ipso principio prodit, necesse est. Ad haec, alimētia

mutatis, tota quoque arborum genera permutari uidemus: quippe ex ferocibus urbana, mitia redduntur, & ex nigris in candida transeunt. Pari modo & fructus. Quapropter semen etiam qualitate affectu aliqua, nil mirum, si radicem protinus, & caulem alteret, & ultimo fructum immutet. Nullis irrorari, solesque sentire prodest flore delapso, sed frigore niueque opus est, ne residentem humorem sol feruefaciens eruginem creet. Hinc enim & agri rorulenti, & caui, & inflatiles potissimum erugine infestantur.

THEOPHRASTI DE CAUSIS

10

PLANTARVM LIBER QVARTVS.

Cur feminibus uires proportionem non sint: femini adiunctum esse uim duplicem, agendi, patiendi.

Caput 1



VONIAM plantarum complures sunt generationes, harumque communissima omnibus, quæ semine facitur, uel certe is quæ semen, fructumque ferat: dubitauerit sane quispiam, quæ recte, cur non proportionem uires singulis feminibus insint, sed infirmiora sint, quæ à ualidioribus prodeant: ut quæ arbores generant, annuis esse infirmiora uidemus. Quippe utraque ratione confessum id ipsum habetur, quando etiam ab infirmioribus feminibus ualidiora proueniant. Semen enim arborem generat. Infirmitatis, robustatisque argumenta hæc sunt. Annua terræ commissa eadem permagent, suosque fructus similes præstant. Arborum femina immutantur, deteriusque fructificant: & altera consummationem sibi destinatam celeriter reddunt, altera diutine ac lente. Arbores enim quanquam robustiores, tardius fructus suos percipiunt. Item arborum femina crusta, ligno uel natura operuit, ut oleæ, pruni, uitis, piri, mali. Et hæc rursus mole carnosæ obduxerat, frumenta uero nuda reliquit, & maxime triticum atque hordeum: præterquam quod runcis prætenuibus uestiri uoluerit: atque semper illa, quod infirmius sit, huic maiorem impertit custodiam, Ambiguitates hæc ferè sunt. Principium uero de his differendi cepisse illud oportet, semen non solum uim agendi, sed etiam patiendi fortiri. Quod cum in omni parte naturæ affirmari uerissime potest, tum in ipsa generatione latissime patet, utranque rationem, & quodammodo non minus illam patiendi uendicare sibi effectum. Sic enim uis quoque feminibus indita ad agendum mouetur, quasi seruescerent. Quamobrem non omnia ex eadem causa germinant, sed cum aeris complexus aptus cuique occurrerit. Hoc igitur posito constat, quod non roboris, sed potius imbecillitatis germinandi celeritas est. Imbecille enim pati aptius est. Hæc eadem ratio reddi potest de consummatione. Enim uero imbecilliora facilius & aeris habitus, & quæ in eis sint elementa possunt perficere. Quod etiam in animalium genere patet. Semper enim quæ robustiora sunt, diuturnius ex toro penè partus suos ferunt atque educant. Tum & frugibus terræ plantæ perexiguæ subiacent: fructus arborum in mole maxima est, quæ auocat ad se cibos, atque absument, ut alia parum ferant, alia penitus sterilia sint, sicut & animalibus euenit, quæ supra modum crassantur atque pinguescunt. Igitur festinata consummationis causam non uiribus, sed his dare debemus: unde sit, ut etiam fecundiora eadem esse nimirum ratio sit. Sed fortè de fecunditate aliquis contradicet, plura inquit esse quæ arbores ferunt. Singulas enim pulpas permulta semina continere, arboremque semine unico generari. Sed hæc leuiores, & quasi semota esse apparent. Genus autem, & similitudinem

dinem fructuum seruare arborum semina nequeunt, ambabus illis de causis: quia plus temporis terræ immersa debilitentur, & quia ingens arborū moles largam nutrimenti copiam attrahat. Quod enim sterilitatis causa est, idem etiam prauitatis fructuum esse, ratio est. Annua contra parū temporis in terra tenentur, & parū attrahunt alimentum, quapropter non primo satū degenerāt, sed tertio. Tunc enim mutationes fieri solent. Itaq; quod illis ob alimentū copiam statim euenit, hoc frugibus cum diu permanferint, ratione occurrerit: praterquam quod altera in partem deteriorerem semper mutantur, altera uel in meliorem pertranseant, si agri, cœliq; status faueat. Sed hoc haud nostri propositū est. Degenerant autē penitus fruges illæ potissimò, quæ uiribus præstant, ut triticum atq; hordeum: hæc enim sola in lolium transeunt: sed magis triticum, quia ualidius est. Itaq; id quoq; non alia de causa euenit, quàm quod plus alimentū trahatur. Lupinum enim omitto, quoniam id incoctile quasi toto est. Igitur ratio germinandi hinc colligi potest. Ad extra uero durandi periculaciam alijs tempus aliter occurrit.

Cur seminum arborum, frumentorumq; & leguminum, alia plus, alia minus durent.

Caput 11

CAeterum esse nonnulla arborum semina, quæ perire celerius possint, non temere dixeris: ut ea quæ in pulpa condusa sunt, uidelicet pulpa uel separata, uel putrefacta. Nudum etenim semen rescitur atque emoritur. Quæ autem corio integuntur, nec suo tegmine possunt absolui, hæc longius durant, sunt enim humidiora, & satis aërem recipere possunt. Sed maxime seruabilia, quæ ligno teguntur: & inter hæc primum obtinent illa, quæ densò putamine sunt, ipsaq; pinguiuscula consistunt, ceu nux auellana: amara tamen ista efficiuntur. Amygdalæ minus perdurant, & minimum nuces iuglandes: quia præterea, minimeq; continuo putamine obteguntur. Oleæ quoq; semen perdurat, & reliqua generis eiusdē. Omnium uero, quæ pulpa ambit, diuturnissimū palmæ est, utpote quod siccissimum sit atq; densissimum. Arborum semina his de causis alia plus, alia minus perdurāt: proximis ferè causis, & frumētā seruantur. Aut enim, quod pluribus tunicis uestiantur, ceu milium: aut quod pinguius sint, ut sesamum: aut quod aliquam acritudinem, amaritudinem uel habeant succi, ut lupinum, & cicera, quod & nigrescit, cum corrumpitur. Triticū magis hordeo, & leguminibus durat, quia calidius sit, & tunicis pluribus tegatur. Hordeum enim nudum propemodū est. Legumina tamen crassius putaminibus sunt, tamen corpore constant soluto, & dulcedinis aliquid habent, quæ quidem non minus corruptionis causam posse afferre uidentur. Quapropter celerrime suæ naturæ tunc dicitur faba, & cicera. Sed dici fortasse uerissime potest, hæc perinde, ac locis ualent, posse durare: quippe cum apud Apolloniā maris Ionij fabas multos perdurare annos confirmet, multos etiam apud Cyzicum. Sed de perennitate eorum, atq; in totum de ratione naturæ postea fortasse latius differemus. Nunc arborū comparatione differentias in his explicasse illas abunde est.

De olerum differentijs in seruanda specie sua. Item, quæ oleribus, fructibusq; duratio.

Caput 111



IN genere olerum cætera suam speciem seruant: brassicam, & alia quedam mutari uidemus. Sed in ortu plus hæc certo inter se differant, quàm frumenta. Alia enim die tertio exeunt, ut ocimum, cucumis, cucurbita: alia quinto, aut sexto: alia quinto & decimo, ut porrum: quadragesimo apium, non nusquam & quinquagesimo. Hoc enim prouentu difficilimum omnium proditur, Coriannum quoque difficile pro

uenit: haud enim germen emittit, nisi aqua præmaceratum. Causam durities habet: crusta etenim tegitur betarū disparitas, cum aliarū mense posteriori emergant, aliarū duobus mēsisbus possit, aliarū pluribus, nonnullæ etiā anno. Diritatem, ac peruicaciam quandam in percoquendo ad germen edendum significat. Quæ per æstatem feri mos est, hæc cōstat, quod ex imbecillitate celeriter augescunt, & ex eo ipso tempore prodeunt, quia hyemem nequeant tolerare: uel quod sicca sint, ce uocumum, uel quod frigida, humidaq; ut cucumis, & portulaca. Abrotonum mirandū profecto appareat: cum enim calidum sit, loca aprica persequitur. Ratio in infirmitate est: uires enim tam contra frigus, quam contra æstum huic deficiunt. In totum uero calor inditus ad facile, beneq; germinandum haudquaquam præcipuus intelligitur: siquidem calida sunt, quæ acra. Porrum enim, & gethium, atq; etiā magis satureia, & origanum difficile germinant. Humorem enim habeat aptum, & nō minus, sed forsitan magis temperiem ad agendum ac patiendum, oportet, quod germinaturum facile, beneq; sit. Omnino quoad genere amplecti possumus, sicissimæ seminum coronaria atq; olerum. Quamobrem uapores hæc celerrime attrahunt, & hinc ea suspendere solent, nec dispergunt aquam in domicilijs, nec asserunt ubi ullo pacto suspenderit. Perennitas his, frumentisq; repositis, uel ad sementes, uel ad cæteros usus proxima est: manent enim fecunda ad quadriennium maxime. Cætera quoq; ad usum ciborum plus temporis utilia durant, sicut frumentum: idq; ratione sit, ut etiā in animalibus prius uis generandi exoleat. Enim uero generandi principium in ijs est, quod tanquam semen aliquis dixerit. Reliquum uero tanquam alimentū, & materiam semini annexam. Verum totum appellare semen sole mus, & hinc ea uiuere, atq; non uiuere dicimus, cum scilicet elemento illo inco-lumia, corrupta uel sunt, ut etiā oua. Euenit hoc idem & generi glandium, & reliquis fructibus. Ad germinandū tamen semen anniculum aptius esse nouellis non sine ratione credideris. Constat enim sibi, & quasi pressiora, percoctiora seipsis red-duntur. Nam ijs quoq; digestio quædam acquiritur, cum exactum sit, quod fuerit alienum. Spacio tamen temporis longinquo senescant, morianturq; necesse est. Caulescunt celerrime, quæ semine ingenti prouenerint, uelote, quæ ualidissimam obtinuissent originem. Caulis enim perfectio quædam est, siquidem fructus finis rationē obtineat. Mox caulem agunt, quæ ex uetustioribus prodierint seminibus. Nam ijs quoq; uelut syncerior quædā uis, atq; largior inest. At nouellis permixta, & ad nutrimentum propensior est, sicut etiā in alijs patet. Semper enim seniora cibi maioris sunt. Unde sit, ut etsi non ea quæ semine ingenti exiuerint, prius caulescāt, quæ tamen ex uetustiori sunt, hæc anticipare ratio est. Qua scilicet de re quidam contrā disputant. Infirmitas enim celerius caulescere aiunt, ut in oleribus li-quet. Causa uero quod passibiliora sint, minusq; alimentum capiant: sic enim sit, ut ce-lerius se perficere possint. Caulescere autem tanquam perfici est. Quamobrem & inter arbores, quæ uetustiores sunt, celerius pleniusq; fructus percoquunt: quæ uigent ætate, uberius quidem, lætiusq; fructificant, sed lentius certe perficiunt. Sed si Vere, quæ ex uetustioribus sint, celerius caulescere aiunt, uetustiora celerius pro-pterea generare posse uidetur, quod seminibus aliquid uel ut materia, alimentūmq; principijs cōiungatur, quod antè macerari oporteat, quā sit germinandum. Quin etiā illud dici de caule quidem potest, uetera minus radices agere, sed sursum po-tius tendere, atq; ita celerius se perficere: quod uel in omnibus ferè uitā breuē agen-tibus constat, sicut etiā de trimestribus ferunt. Tempora tamen & uigores, & natu-ras singulorum haud prætermitti oportet. Sed hæc porro similitudinē nonnullam præsentat. Propria uero generatim tempora per se latius decet exponere, intueriq; tam eorum ipsorum, quā cæterorum comparisonem.

Cur arbores imperfecte generent.

Caput IIII



Rorsus absurdum simul & mirandum appareat, si qua ex imperfectis valeant generare, præsertim arborum naturas uasiles, ceu salices, & ulmos. Imperfectum enim, quod crudum est. Ergo si uerum hoc sit, distinguere perfectionem debemus, ut alia usum hominis spectent, alia generationem. Aut enim ita perficitur fructus, ut eibus minimum sit, aut ita ut ualeat generare. Vnde sunt, qui uim plenè obtinent generandi, quanquam cibo minime idonei constant, alij forsitan e contrario. Sed fortè confectionem hoc in loco statuere colore, sapore, densitate, reliquisq; eiusmodi conuenit. Nam cibo quidem esse idoneum, ueteribus etiam, atq; alijs dabitur. Verum id principale non est, sed primatum uis obtinet generandi, etenim unumquodq; suæ ratione operæ iudicandum est. Atq; hæc dicta uelim per suppositionem.

Cur aliquo in genere, infecundæ semper sint perfectiores.

Caput V



Illud uero absurdum penitus est, si quo in genere infecundum id sit, quod perficitur, quanquam semine prodeat, ut in genere cupressi. Mas enim omnino infecundus est, & semina pleræq; fructu uiduæ constant. Aliqua enim inter congenera fructificare non posse minus absurdum. Nec in feminibus mirum, si quod læsum fuerit, infecundum sit, sed fortassis id quidem & necessarium est. At nihil penitus esse frugiferum, naturam quasi erroris arguit, ceu frustra quid egerit: quod rationibus quoq; illis aduersum est, quas antè exposuimus. At de ulmo, de salice ambigitur. Caprificus proculdubio generat, & flosculus thymi, & aliorum quorundam semina, quæ percipi sensu hominis nequeunt, sed flos tantummodo cernitur. Verum de arboribus alia quoque deduci in quæstionem forsitan possunt. Etenim quod in palmis perspicitur, absurdum profectò est, & rationem desiderat. Et aliqua esse tam exiguò semine, ceu cupressum, eodem utiq; spectat. Hæc enim, ut credatur deesse alijs quibus pabulum, faciunt: nisi fortè alijs genus aliud, tum materiæ, tum alimentum, natura præscripserit, satisq; sit aliquibus, si modo id habeant, quo possint seruari. In frumentorum autem genere, atque omnino in annuis, differentiæ tales decerni facilius possunt, quas scilicet recipiunt in germinatione, perfectione, atque reliquis passionibus, quæ eis euenire solitæ sunt.

An plantæ aliquæ (ut triticum in lolium) de specie in speciem transitum faciant: cur ualidiora in infirmiora mutantur: quæ item in lolium transiant: quæ non transiant. Cur etiã linum in lolium: cur deniq; aliquibus nocent cultus.

Caput VI



Ed de mutatione in formam alienigenam, ceu ex tritico in lolium, & rursus ex lolio in triticum, & ex semine in auenam, mirandum sanè est, tum ob eam ipsam mutationem, tum ob eius peculiarem euentum. Hæc enim sola ex omni numero suam permutant naturam. Triticum enim, quod ex tiphæ, & semine sit, paratu quodam, atque arte consistit: sicut etiam ea, quæ præmacerala fructus afferunt dulciores. Absurdum præterea, quod cum nullum ex frumentis ualidius istis perspicitur, tam magnâ mutationem recipiant. Corruptur enim facilius, quod inualidum est. Et generis autem mutatio talis, corruptio quædam est: & triticum magis hordeo ualidum. Item, quæ ualidiora sunt, transire solent in inualidiora: lolium autem tritico, & hordeo ualidius est: itaque simul euenit, ut eo quod secundum naturam est, ualidius constet,

quod præter naturam. Corruptio enim atq; mutatio, uel seminis sit, uel herbar, necesse est. Seminis igitur lactatio, aut putrefactio, aut in totum resolutio est: quorum nihil natura dari par est. Herbar autem mutatio radicibus iam peractis consequitur: radices ipsas mutari absurdum penitus est. Quamobrem his ipsis ut ratione uacantibus persuasum quibusdam est, nullam mutationem cuiusmodi fieri posse: sed frequentia imbrum lolium prouenire, atq; consistere. Quod etiam per se facere ipsum, patet locis admodum pluuijs, nullo penitus tritico, hordeo uel disperso. Sed obiectiones istar cõuinci à rebus ipsis planè uidentur. Permulti enim (ut aiunt) cum triticum, uel hordeum seruissent, lolium messuerunt. Ergo generis illam mutationem ratione utraque fieri posse, id est seminis alteratione, atq; radice, debemus statuere. 10 Mutatio enim herbar, radice causa euenit: nec temere inter se cõsentiant, cum connexæ sint, cõmunemq; sortiantur originem. Semen enim corruptum nihil penitus producere possit, idq; cõmune est: nec enim radix corrupta nutriendi possit fungi officio. Seminis autem corruptione, non putrefactione, non lactatione, non aliquam ex prædictis esse putandum: sed aliam, quæ præ nimia nutrimenti copia seminibus deliquescentibus euenit, quæ non ex toto semina perdit, sed uictio naturalis principio in aliud genus traducit. Proximum quodammodo est, quod in animalibus euenit ad portionem, cum foemina marem deuicerit, uel etiam cum maior aliqua mutatio præter naturæ operam fuerit: terram tanquam foeminam intelligere decet, & portionem ad hunc modum statuere. Cum igitur terra imbrum frequentia largiore 20 alimenti copiâ præstat, tunc degenerandi occasio euenit, quæ uim generandi non penitus tollit, sed in aliam alterat. Quod autem natura seminum uiuax sit (multo enim uiuacior, quàm animalium) plus quoq; eam durare posse, ratio est. Nam et sine origine seminis pleraq; plantarum grandes, tum humiles, sponte naturæ consistunt. Quamobrè hinc etiam liquidò sit, non herbar, sed seminis alteratione, mutationem illam oriri, donec portionis seruetur existimatio. Sic enim & in animalium genere fieri solitum est: tum etiam imbecille tunc est, cum germinis profligendi mutatio agitur. Vbi uero germinatum, radicumq; sit, planta uelut creata iam est: & diminutio de cætero in incremento, alimentoq; uel etiam ad uniuersam corruptionem, nō ad mutationē subsequitur. Ad hæc, homines experti rem rusticam, folium 30 protinus nascens eiufmodi formam transire. His igitur rationibus semen causam habere appareat. Cæterum alterum quoq; fieri potest, nec temere credes herbam mutari alterata radice, id enim fiat necesse est. Siquidem quodq; ortum à sua origine secundo incipiat. Constat hoc etiam in arboribus, quæ fructus suos cultura immutant, ex acidis amaris uel, in dulces gratos uel palato: uel ex nucleosis, in uacuos nucleos. Ratio enim huius quoque mutationis in alimenti copia est, cum imbres crebre incesserint, & potissimum (ut placet quibusdam) tempore uerno: simul si soles incanduerint, quasi hac utraque ratione mutationem illam exultare necesse sit. Locis enim quibusdam palustribus omnino id euenit: & solum immutatur, ut 40 omnibus palam sit. Quod si non imbres uerni accesserint, largam tritici copiam præstari autumant. Hoc igitur utraq; ratione fieri posse, ratio sit. Sed quauis utraq; eueniat, absurdum fortè non est, differētiam aliquam esse tum soli, tum aëris oportere: nam & cum fata fuere, statim copiose pluuias incessisse, damnosum admodum est. Fit enim, ut radices infirmiores agantur: quod autem infirmum est, affici facilius potest. Generis illa mutatio hac de causa euenit. Sola autem hæc illud pati, & quæ ualidiora esse uidentur (zea enim, id est semen, ualida est) unica hac ratione soluentur. Quoniam enim ualidissima sint, radiceq; numerosa cohereant, idcirco resistere firmitus possunt. Cætera quæ infirma sint, penitus pereunt. Item tempus, quo

quo ista feruntur, magis pluuium est, plusq[ue] tempus in terra tenentur. Cætera ad Ver, & coelo iam indulgente sparguntur, & germinare confestim incipiunt. Quamobrem neutrum ex corruptione illorum, si quando corrumpuntur, consistere potest. Enimvero posse transire in lolium arbiolari absurdum omnino est: semper enim ad proximum, & quod congenere quodammodo sit, mutatio prouenit. Vtrunque uero negatum his esse, imbecillitati tribui debet, cum omnino intereant: sed potius illa transire in lolium possunt, quæ speciem tritico, hordeo uel similem gerunt. Ex his tamen alia ob imbecillitatem tolerare nihil penitus queunt, ut tripha. Alia in proximum potius transeunt, ceu semen *iræuænam*, triticum uero in *tipham*. Aut semen nunquam mutatur: quia plurimum illud, ac ualidissimum alimentum, cuius causa mutatio sequitur, non efforminet, nec ad robustius ducat, & omnino genere pristino expoliet. Quippe alioquin rectius quispiam admiretur, quod non in agreste triticum transeat. Sed huius quoque proxima quædam ratio est, natura enim simpliciter, atque solute permutat. Mirum, & rationem desiderans, si linum quoque in lolium transeat: hæc enim inter se plurimum distant, ni forte pabulum id etiam immodice trahat: quippe agrum amat succosum. Ergo ex nimietate ista quoque mutatio euenit. Lupinum quanquam ualidum sit, matureq[ue] obseratur, nunquam tamen in aliud transit, summi roboris causa: nihil etenim est, quod uincere nequeat. Quippe quod mutationem sit recepturum, neque impassibile, neque nimium passibile esse debet. Alterum enim nihil moueri posset, alterum nullum sustinet motum, utpote imbecillum, sed penitus interit, ut dictum iam est. Inuendum, cætera quoque seminum genera tam agrestia quam satua: an aliqua sint, quæ huiusmodi alterationem possint admittere. Et de lolio satis dictum est. Mutationes enim quæ inter ipsa genera frumenti eueniunt, ut cum ex tali tale, uel triticum, uel hordeum, uel aliquid ex cæteris prouenit, haudquaquam mirandæ sunt. Tempus enim & alimentum, & coelum (ut antè iam diximus) alterationes efficiunt, animalium pariter & plantarum. Quæ quidem ratione omnino ad genus mutandum, qualitatem, quantitatemq[ue] alimentum conuenienter statuendum censemus. Nam & arborum, & omnino plantarum mutationes, quas inter historias explicauimus, his eisdem de causis fieri solitæ sunt (ut antè dictum est) cum alijs cultus noceat, ceu *silymbrio*. Id enim quasi efforminatur, & amisso sui odoris acore, transit in mentam: quippe alimentum, neglectusq[ue] causa, syluestris habitus prouenit. Quædam omnino dispereunt, ut menta radicibus complexu mutuo strangulatis. *Populus alba*, quæ in totum nigræ dissimilis fronde, formaq[ue] tota est, similima in senecta efficitur, quia excicetur, & icuius nutriatur. Sed de his latius alibi disseruimus: atque etiam de animalibus, scilicet illis quoque in generatione quicquam huiusmodi euenire, idq[ue] pullis adultis non amplius fieri, præterquam si quis auium alterationes unâ cum eis ipsis nascentibus exoriri putauerit: tamen affectionibus potius corporis proximæ, quam mutationibus esse uidentur.

Cur aliqua semina non simul, sed particulatim generent.

Caput VII



Aeteris uero de seminibus proditis procul maxime sunt, siquidem uere narretur, adesse, quæ non simul generent, sed particulatim: ut de auena & loto & bulbo fertur, quod alij negant. Sed aut radices regerminare anno posteriori, aut semina posterioris anni delapsa erumpere aiunt. Alij uerò id esse autumant, argumentaq[ue] afferunt, tam alia, quam quod coloni, qui auenam omnem uelint delere, biennio cessare fegetem patiuntur, quò semen utrunq[ue] erumpat, & pascatur, demetaturq[ue] uniuersus fructus,

Sed de bipartita germinatione ita, ut pars in annum prorogetur sequentem, ambigit etiam alter potest: quandoquidem semen, quod contrarium ac biidum est, ut certum nitur, simulque decidit, parte altera immutetur, ac pullulet, altera indomitum anno toto permaneat. Quo enim pars quam inquirunt permanere, infirmior femine toto est, eo affici debet: certius tam ad eruptionem, quam ad totam corruptionem. Præterea cum altera pars germen ediderit, reliqua seiungatur, necesse est; nam si coniuncta sit, quamvis nullius affectionis particeps fuerit, tamen euulsis radicibus illam quoque euelli necesse est: quod sæpe coloni faciunt. Sed nunquam hac ratione semen deleri assument. Tutè autem in terra posse durare aliquantum, usque tempus sit germinandi idoneum, ratio est, & in multis hoc idem animaduertimus. 19
At annum expectare integrum posse, mirum profectò est: necnon & partem alteram esse perfectam, alteram imperfectam. Eandemque perfici anno possit arbitrari minime rationis est. Nec enim in iurra, sed ualida est auena, ut plura perficere ualeat: & simul quæ multò infirmiora sunt, hoc possunt efficere. Ad hæc perfectio naturalis est, quæ maxime conuenit, & quæ sola fortassis perfectio appellanda est. Tunc enim semen alimentum suum capessit, quo incrementum, atque perfectio ministratur. Seiunctum uero, aut penitus interit, aut nihil perfici potest: tunica uero multo triplici regi, & bromo, & femini datum est. Itaque illa quoque inoffensa permanere deberent. Quæ repugnant, hæc serè sunt. Cæterum liqua reddenda ratio est, illam fortasse aliquis potissimò dicet, quod non utraque pars seminis perficiatur, ut germen possit elidere: sed simile quicquam eueniat, ut in animalibus quibusdam oua gignentibus. Post partum enim oua aluntur, perficiunturque alia in aqua & mari, alia in terra & aëre: atque ita uim adipiscuntur, qua possint animalia parere, quod parentes, quæ gestarunt ac pepererunt, facere nequeunt. Quin & alia ratione uerum id esse apparet, cum semina non protinus à tritura meliora sint, quam certo tempore possint: neque nouella anniculis præsent, ut diximus: sed ueluti excoctio nem quandam potestatemque capiant opus sit, exactio scilicet quod in eis fuerit alienum. Quid ergo (dixerit forte quispiam) uetat, in ijs quoque aliquid huiusmodi euenire, ut semina & perficiantur, & corroborentur, excocta quodammodo, quum intestino, tum externo calore? An hoc minime rationis sit, cum calor in terra conclusus alimentum potius coquat quam trahat? præsertim cum semina ista nata sint in aëre perfici, alimentumque non crudum, sed præmaceratum à caule, atque radicibus capiant. Item ouorum illorum una omnium excoctio, atque perfectio, siue extrinsecus, siue intrinsecus est. Horum autem pars imperfecta relinquitur, quippe alterum secundum naturam, alterum minus naturæ opera quodammodo euenit: cum planta adhuc bonis uiribus sit, nec à coctione perfectiore arceatur conditione aliqua temporis, nisi quis semina prius quam perficiantur, exilire, ob suæ naturæ imbecillitatem, putauerit. Ita etenim sit, & multo etiam hordeum antecedit auena, ut culmus flaret inanis. Hoc igitur ad rationem essentiae redigendū est: & ali uero ac perfici semina posse, rerum ambientium opera, non abest à ratione. Indomita enim permanere, præsertim cum tam multis tunicis integantur, minus mirū. Nam & alia permulta, uel potius omnia seruari ad tempus usque conueniens, certum est, quemadmodum diximus. Mirabilius enim quod de betis dictum iam est, nō modo uno mense, & duobus, & tribus, uerum etiam anno integro possit, nonnullas erumpere: quanquā hortus assidue rigetur, colaturque. Lori quoque semen, uel certe quod fructum complectitur, tale est: quia facile absolutum non potest, neque parem capere crassitudinem. Bulbi autem semen differt etiā magnitudine: cogitandum tamen de hoc est. Igitur si aliqua semina tam difficulter erumpant, ut longo tempore possint edant germen in lucem: cōstat quod hæc dum in terra lateret, excoquitur, perficiunturque

ad germen agendum. Quamobrem id quoque fidem aliquam possit asserre. Sed quod pleraque etiam plantæ annexa periciantur, ut fara protinus ualeant pullulare, ratio hæc non uacat objectione prorsus. Longe istis quæ de seminibus ac fructibus quaerimus maius, nec eidem subditum rationi, quod loto euenit arbori, fructu loto herbæ proximū parienti: quodq; de lactaria, & myrtaria cognominata, proditum est. Hæc non arbor, sed frutex terrenus est: quippe utranque non simul omnibus ramulis, sed alternatim fructificare confirmant: quapropter utrium partionem in radicibus fieri necesse est. Sed de his cogitandum amplius est.

De ratione satui, & differentijs frugum: curq; legumina ab ima parte radicem, & germen fundant, frumenta uero à duobus. Caput VIII



Ruges autem si quas differentias uel in ortu, uel in fructu, uel in alia qua parte suæ substantiæ recipiunt, explicare deinceps tentandum est. Ergo triticum, hordeū, atq; similia mature seruntur: legumina ad ueris teporem, præterquam faba, & lupinum. Ratio, quod frumēta non protinus sursum contendant, sed antè radices plenè concipiant, ut se culmo simplici attollere possint. Radicantur autem probe, dum coëscuntur stipanturq; frigore, ita ut multas fibrarum origines concipiant. Legumina uero radice singula, ualidaq; nituntur, & sursum confestim impetum faciunt: ita uerno tem-
 20 pori percommode tribuuntur: enim uero natura eorum familiaris magna parte æris est. Faba mature obserere solent (ut dictum est) causa imbecillitatis, quò se renis diebus radices concipiat, quibus ualenter frigori, ac tempestatibus possit resistere. Lupinum terræ mandatur statim ex aris, quia non nisi solo adhuc tepido sparsum germen bene profundit. Ratio, quia quod durum natura, & quasi incoctile est prorsus, id multū caloris desiderat: argumento nimia eius amaritudo est. Quod si agri calorem nactum sit, macerari, ac probe germen suum potest proferre. Siminus, prauè germinat, & simile euenit, ut si quis exiguo igne ualidissimum quicquam excoquere tenter. Idcirco solum quoque frugale aspernari, arenaceum & exile amare uidetur, hoc enim facilius sentit calorem, & ueluti celerius confici potest.
 30 Nec alie abscondi uult, sed it per summa, ut frui calore amplius possit, atque sublime radices melius capit & germinat. Sed hæc sermè operæ agriculturæ deleganda potius sunt. Naturæ autē illa, quod legumina de eadem parte radicem, atq; germen suum emittunt, quorum alterū summa continuo petit, alterum ima subit. At hordeum, triticum, atq; omnino frumenta, extremo utroque pullulant. Radix enim de crasso quod spicæ adhæret, enascitur: de tenui autem, unde arista porrigitur, caulis exit scilicet proportionē alterum à superiori, alterum ab inferiori, cum radix & caulis ita maneant. Causa uero ex natura eorū petenda est, quod legumina, quia bipartito, & compacti claudantur corpore, unicum quoddam germinandi initium habere in extremo ambarum partium possint, quod annexum uelut ex-
 40 trinfecus cernitur, qua siliquæ copulantur. Quod enim contenta in uasculis sint, principium habere illud necessarium est, aliter enim cibum non possint accipere. Altera autem parte secundum haberi principium fieri non potest, cum continua inter se sint, & siliquæ undiq; ambiuntur. Causam uero quamobrem ita consistent, substantia eorum sortita est. His igitur recte natura eodem in loco principium utrunque posuerat. Frumentis autem quia distincta inhæreant, & tegmine comuni nullo contineantur, atque etiam recta quodammodo specie instituantur, ortum distinxit, fecitq; ut ab uno quidem initio uterque ortus incipiat, sed continuo quodam, ac transcendēte ad utrunq; extremū. Quod eū in germinatione perspicitur, porrigens se per incisuram frumenti. Ergo causam, cur hæc nō pari modo se

habeant, illam existimandum. Pariter uero in utroque genere illud inest, ut radices exortus & nexus seu ligamen, quo uel spicæ, uel siliquæ adherent, ex eodem sint, quo utriq; alimetur subministratur: quippe culmo & primo germi radix alimentum dispensat: fructibus uero nexus, qui uel siliquæ, uel spicæ semen coniungit. Optum ad hunc modum licebit discernere,

Cur legumina celeriter oriuntur, & minus terram consumunt, quàm frumenta. Curq; cicer solum emacret, quamuis celeriter nascatur. Item quæ fruges anno sequenti repullulent.

CAPVT IX



Elerem germinationem leguminibus temporis ratione reddere pos-
sumus, quia mollius atq; fecundius hyberno tempore sit. Verū eius
utriusq; conditionis causam imbecillitas habet, quæ facit ut & ad uer
obserantur, & celerius enascantur. Quod enim infirmius est (ut sape
retulimus) facilius affici, sentireq; potest. Largæq; fecunditatis forsitan
eandem uel certe proximam rationem reddere iustum est: legumina enim multo
fecundius ferunt. Eodem spectat ut & celerius perficiantur, minusq; uim terræ
consumunt. Hæc enim omnia, & quæ eiusdem generis sunt, eueniunt fermè (ut
in summa loquar) ex causa imbecillitatis. Quippe cum ea quæ infirmiora sunt, &
educare, & perfici facilius possint, ut unâ & fructificetur uberius, & terra minus
hoc fati consumatur, & primus exortus facilius atq; celerius agatur: præterquam
si quid tegminis ambientis firmitate uteretur, ceu faba: huic enim tardi prouentus
causa, crassitudo putaminis est: & si satæ impluerit, multo lentius prouenit, quasi
terra pauimentaretur, solidareturq;. Frumentis illa quoq; ad moram percoctionis,
consumptionemq; terræ cōfessa sunt, uidelicet numerus radices, & lentitia fructus.
Enimvero quæ lenta, & pura sunt, pigre in arborum etiā genere coquuntur.
Quamobrem triticū serius, hordeoq; minus fertile est. Et radices uero frumento-
rum, quia multæ sint atq; altæ, uim terræ magis cōsumunt: legumina contrā, quia
fructu terrestriori, & radice simplici summaq; sint, & rara ferantur, uberius ferunt,
& solū minus consumunt, & citatius proinde excoquunt. Vis enim tota sursum
contendēs, cum nihil auocet radix, copiose fructificat, & fauēte aëre facile coquit.
Nam quibus radix numerosior altaq; est, ijs fructus lignosi cōsistit. Breui agrum
emacrat cicer: quamobrem hoc solum nouale nō facit, nec solo quolibet, sed bono
tantū perficitur. Prorsus in hoc minime rationis esse uidetur celeritas consumman-
di, siquidem quadraginta diebus, aut paulō pluribus perfici ualeat. Verum causam
dixerim uires, quibus & cætera superare, & se tam citō possit perficere: quandoqui-
dem & aqua minima indigeat, & hac, ut tantummodo pullulet: inde autē seipsum
plenē enutrit, nisi fortē salfugo quoq; ad perficiendum aliquid conferat, humorem
scilicet exicando, qui modum excedit. Nam & in generatione iuuare quodammo-
do, & familiaris ciceris esse uidetur. Argumentum, quod quæ iuxta mare posita
sunt, meliora euadant, & quod abluta salfugine perit atque uermiculatur. Sed qua
de causa in hoc solo ita eueniat, quærendum: nī fortē proprium id essentia cice-
ris sit. Sed de his causis eiusmodi reddidisse par est. Sola autem de radicibus ena-
scuntur anno sequente triticum atque hordeum: quin & anno primo hæc præ-
runsa regermināt culmo elatere subnascente: ratio, quod hæc sola radices copiam,
uimq; obtinent. Legumina enim radice una, surculosa, summa innitun-
tur. Adde etiā illa quæ conculcata ab exercitu adeō, ut nihil
perspici possit, restibilia tamen efficiūtur. Omnibus
tamen his exigua spica, imperfectaq; fun-
ditur, utpote quæ secūda emerferit.

Cur

Cur legumina minus apta sint cibis hominum, quàm frumenta: curq; cætera animalia hordeo, quàm tritico melius alantur, contrà quàm homines. Quæ item facilia, difficiliaue in cibos animalium sint.

Caput XC



Ed cur cibo legumina difficiliora sint homini, quàm frumentū, quibus in terra minus temporis fuerint, causa explicanda est. Ergo id ipsum, quod plus temporis fuerit, ad facilitatē quoq; referre uidetur. Quamobrem & trimestre triticum, atq; hordeum facilius est: quasi minus terræ in seminibus insit propter temporis breuitatem. Ac cæteris animalibus & gratia, & facillima ista sunt: contrà uero, quæ nobis facilia, hæc illis difficilima, quanq; ualidioribus. Multa enim intereunt tritico satiata, quibus minimū terræ id habeat. Igitur ad has quæstiones, & si qua eiusmodi alia sit, in uniuersum, principitū illud sumendū est, non omnibus eadem esse in cibo idonea, sed singulis pro sua natura cibus status est. Quod cum in multis palam est, tum omnium sermē consensu in ceruis patet: scit, qui uiperas edunt, quibus cætera moriunt; tamen si multa maiora, robustioraq; sunt. Licet & in alijs illud quidē uidere, ut ictu intereant, quo nihil homines patiuntur, ceu serpentes ictu scorpionū. Hoc igitur posito, nō procul à ratione est, ut ceteris animalibus, cum cibo terrestriori uelcantur, talis potius competat: purus autem ille alienus, atq; incommodus sit, disrumpanturq; si ex dulcedine, uoluptateq; plus comederint. Hoc igitur commune, generaleq; est: propriū uero, quod alios quoq; insari eueniat, uel omnibus, uel certe ijs, quæ habent echinū. Triticū enim crudū constat, nec ex facili cōfici potest, multoq; fastidiosior eius palea est. Insuetudo quoque plurimū facit. Peregrina enim quibus facilia sint, tamen immodice sumpta periturbant, atq; fastidiū inferunt. Hæc igitur quanq; diuersa appareant, ratione tamē non carent. Ad summā uero (ut formula dicam) facilitatis, difficultatis uel cibi, tam nobis, quàm cæteris cuiusq; naturæ, ager & aer differentiam faciunt. Enim uero, quæ locis placide spirant, gracilibusq; nascuntur, hæc facillima sunt: quæ gelidis, atq; pluuijs, difficiliora, quia largius, ualidiusq; alimentū hæc habeant. Ob id inter frumenta, quæ Athenas uehunt, Siculum ualidissimum habitum est, & hoc longe pigrius Boeoticū, ut inter historias diximus: etenim ager ille præpinguis, aerq; frigidus est, & reliqui quoq; fructus illius regionis tritico in grauitate respondent. Piesangensis agrū triticum est, quod immodice sumptū disrumpit (ut dictū est) præ nimio scilicet fastidio. Ponticū facillimū, ac durissimū est, quibus in aere gelido. Ratio, quod & semen, & solum leuius sit: & nix iuuat certe ad excoquendū. Semina autē non parum momenti habere, constat sanē ex trimestribus, & si qua tempore breuiori perfici ualeant. Quod enim nō multum terræ attraherent, sed leuiori pabulo uegetarentur, usum quoq; ciborū faciunt leuiorem. Tempus quoq; nō nihil conferre uidetur, quo minus diu in terra semina maneat, ut si terræ iam turgescenti cōmitantē. Quippe si male euenit, ut in ijs, quæ nō frigida, sed feruenti aquæ coquenda immittimus. Nec enim illa morositatem ullam recipiunt. At si ex ijs, quæ breui perficiuntur tempore, graue aliquod sit, ut quod in Lemno fieri narrant, causam seminis ipsius naturæ, tribuere decet. Et de his satis dictum.

Cur legumina diutius florent, quàm frumenta: et flos non simul omnibus partibus exeat.

Caput XLI



Lorent diutius legumina, quàm frumenta, quia flos frumenti imbecillior est: perfici autē ocyus in omni genere, quæ sunt imbecilliora, iam diximus. Ex quo sit, ut etiam pluuiam altera nequeant tolerare, altera & querant eam, & adepta bene succedant. Sed hoc forsitan per accidens est, quod tota planta humorē adepta, melius uegetetur: cum fructus,

quo perfectiſſa, iuuari deſiderat: & præcipue faba, quia rara, & fertilis flore, fructuſq; omniſi maxime ſit. Cicer tamen madefactum perit, ob eam quã reſulimus cauſam. Frumenti ratio poiſſimũ reddi imbecillitate utiq; poteſt. Nequeunt enim ſuſſerre, ſed pereunt, atq; decidunt, ut etiã quibuſdã arboribus accidit. Aliã enim erugine inſeſtantur, aliã uehemẽter humeſcunt. Florem quoq; nõ ſimul omniſibus emerge re partibus, rationi utiq; datur: ſunt enim diſtincta inter ſe omnia ſemina, & ex paſſu ſecundo. Alia enim turgelcunt, alia florent, alia in ſummitate præaugeſcunt. Quamobrem alia perfectã, & arida ſunt, quãuis alimento proxima ſint, alia in ſummitate uiſcunt. Hoc tamen nõ propriũ, ſed cæterorũ etiã plurium cõmune ani madueritur. Sũt enim complura, quæ particulatim florent, atq; fructificãt, ſimulq; 10 germen ſurſum impellunt: unde ſit, ut alia perfectã ſint, alia imperfectã, alia futura. Nec quicq; alimenti tranſcurſio, atq; relatio, ali uetat inferiora. Omniſibus enim cauſis ſubiacer, ex quo ſuccoſ hauriunt, uelut ex aliquo inductu. Hiſ igitur ſloris pro uentus diuturnus, ac nullis imbribus obnoxius eſt ratione. Cæteris cum deſlorue runt, imber enoxat, ſed maxime frumento, ac fabæ, uſpote imbecillioribus. De diſſerentijs, quas inter ſe recipiunt, hætenus.

Cur congenera non perfectiantur omnia eodem tempore: deq; cauſis differentiarum,
quibus congenera diſtinguuntur.

Cepit XII



E congeneribus quæret fortãſſe aliquis, cur non pari tempore perſci 20 omnia poſſint: ſed triticum aliud biſmeſtre, aliud trimeſtre ſit, ſic & hor deum modo ſimili. Et ſi ſit, quod etiã feſtinantiuſ perſci poſſit, maior proſectio ad genus hybernũ diſſerentiã exultabit. Necnon & de cæteris eodem modo quætere licet: ſed maxime de ijs, quæ diximus, quæ ſuo ſo ret, ni fortẽ & eorum tantũmodo diſſerentiã iſtas eſſe quiſpiam credat: nec ſine ra tione. Legumina enim ſata per hyemem haud poſſint algorem ſuſſerre: ſuæ cauſa imbecillitatis, præterq; pauca quædã. Erum etem ſeritur quidẽ ſatu maturo: at hor deo, tritico, atq; reliquis, quæ ſpica puſilla, inſirmaq; ſunt, anceps ſatio datur. Hoc igitur uelut in uniuerſum generi ad genus notatum eſt. Temporis diſparitatẽ com munem cum arboribus habent. Sunt enim in ſingulis generibus aliæ præcoques, 30 aliæ ſerotinæ: ut uitis, ficus, málus, pírus. Ratio in utroq; genere, quod propriæ natu ræ diſſerentiã ſit, q̃ſuis nomĩne indidentur cõmunit: ut & in animalũ genere, natura canis uaria notatur conditione. Huic proxima cauſa eſt, quamobrẽ alia properant, alia diſſerunt. Enimvero ſiue calor, ſiue algor, ſiue aliquid cauſam iſtam habeat, nõ aliter reddenda ratio eſt. Atq; in uniuerſum diſſerendũ ita cenſemus. Frugibus ue ro ex ijs, quæ eueniunt, conſpectius aſſignari ratio poteſt. Triticum enim quod hye me ſeritur, quia numeroſa radice ſit, uireſq; ſuas ad ſe radicandũ primum intendat, multitudinem culmi educit, eſt etenim multicalamũ: trimeſtre contrã paucis radici bus, paucisq; culmis conſtitit, qua de cauſa ſurſum cõtinuo nititur, atq; celeriter con ſummatur: quod enim minus eſt, perſci facilius poteſt. Hinc etiã alterũ large fru 40 ctificat, alterum parcẽ: & alte rum facile, alterũ graue eſt (ut antẽ ſam diximus) cum plus alimenti, & turbulentius trahat. Ex curſu quoq; ratione propere agitur, cum in condendis radicibus haud multũ teratur temporis, uſpote paucis. Qualitas quo que temporis plurimũ fauet, nam & radicoſum illud, ſi eo tempore obſeratur, uelo citius enaſcetur, & in culmoſ ſpargetur pauciores, & ſpicam paruam, atq; paucis ſer tilem geret: & trimeſtre, ſi mature ſeratur, frigus tolerare nõ poterit ſuæ cauſa imbe cillitatis. Sed mirũ, atq; diuerſum eueniat, ſi quod tempore breuiori conſicitur, gra ue, faſtidioſumq; ſit: ut Aenienſes de eo referũt, cuius cura æquinoctio delegata eſt. Reliquũ eſt, ut propriæ naturæ cauſa detur, quam in pluribus diſſerentiã recipere magnas

magnas, cum in exortu, cōsummationeq; tum in proprijs speciebus uidemus, ceu magnitudinis atq; paruitatis, & figuræ. Adde copiam paleæ, & incōmoditatem ratione usus cibarij hominū. Forsitan & genera regiones efficiunt, uel omnia, uel certe aliqua: assimulant enim sibi ipsi quodāmodo, & aut differentia aliquam generis pariunt, aut etiā minus uile reddunt, ut tritico Thracio euenit. Fit enim multis cum tunicis, seroq; prouenit: quod utrunq; uis sanè frigoris facit. Qua de causa cæteris quoq; agris, i heracium istud satum mature, serò erumpit, ac augetur: et quod mature apud alios seritur, serò apud alios exit. Consuetudo enim uelut uim effecta est. Nam, & quod in Asiano agro Aepisyngis uocitato habet uim disrumpendi, 10 quodq; magnitudine nuclei est, agri proprietate, naturæq; uires eiusmodi forniuntur: nec alio translata seruari incōmutabilia possunt. Quod enim de uiribus aiunt, quot agrorum genera, totidem & uitium esse, hoc uere in uniuersum asseri potest. Nec minus locum habet in cæteris, si quis cum agro, coeli quoq; adiiciat qualitatem. Hinc enim fructuū diuersitates exultant, quanq; seminibus positis ex eadem parente petitis: hinc deniq; sterilitates sequuntur, cum planta in alieno agro nequeat respirari. Cum enim ex duabus, aut etiam pluribus rebus, quæ uim habeant, quicquid constitit, pro ratione differentie rerum illarum, totum quoq; differre necesse est. Quod etiam in genere animalium euenit: nam & in mare, & scemina, & agro, & aëre, & omnino alimentis differentias capiunt. Itaq; generū proprietates exultant, & 20 sæpe euenit, ut quod negaret natura, lege naturali proueniat: cum scilicet diu permanserit multiplicatūq; sit. Sed cōmune hoc est, atq; uniuersum asseritur. Frugum autem differentie ob eas, quas retulimus, causas, oriri solite sunt: nam & celerioris consummationis apud nonnullos, ut in Aegypto, mense priusquā in Græcia perfici possunt, clementia habilitatemq; ad alendum aëris causam dixerim. Ad summam, omnis ratio ex his duobus petenda est, uidelicet solo, & aëre, ut dictū iam est: quod enim in Melo in consummandis frugibus euenit, ut qui nouissimo feruisset, cum primis metere possit, agri habitudini fertili tribuendū est. Aëris enim similis omnino percipitur qualitas. Nam quod nō pari tempore semina perficiunt, ut animalia, qualiscunq; regio sit, minus admirari debemus. Genus etenim animalium, quæ potissi- 30 ma sint principia, in se habet: semen autē & planta, ex toto sua principia uel omnia in aëre potius habet, uel certe ea quidem, quæ ad germinationē, & omnino ad generationem, corruptionemq; pertineant. Quāobrem qualis fuerit annus, talis & fructificatio cum cæteris in rebus, tum in celeritate, tarditate ue sequitur. His respondet quodāmodo, nec procul est ratio, qua nullū semen, nulla penitus planta prius mouetur, sed normam suæ regionis semper conseruat: quod de seminibus pleriq; admirantur: quoniam autem aëritatem nonnulla permaneant, nec possint ullo pacto corrumpi, quāuis imbres, serenitatesq; fuerint. Non enim pullulasse, minus dissonare rationi, cum complexū non obtinuerit sibi conuenientē. Causam uero firmitati ambientium non inepte tribueris. Sunt enim alia lignosa, ceu semina florum: alia tunicis inecta 40 permultis, alia tuteis alijs eiusmodi præmunita: & hæc cōmunia naturæ quodammodo intelliguntur.

Quamobrem semina coctilia, & incoctilia fiant.

Caput XIII



De seminibus uero querendū est, quāobrem coctilia, & incoctilia fiant. Vtrum ratione agri, an aëris, an certæ affectionis: & omnia ne, an aliqua tam perdura effici possint. Fabis enim, ac lentibus id potissimum euenire uidemus. Fit sæpe, ut & ager aliās coctilia, aliās & incoctilia ferat, tamen eodem modo colatur: & ex continuis segetibus sulco tantummodo arcente, altera incoctilia, altera coctilia profert. Semina quoq; aliās ex in-

coctilibus coctilia prodeunt, aliās contrā ex coctilibus incoctilia, ut in exortu, germi-
natione, crassatione, copia, bonitateq; nihil interfit, utrum coctilia sint, an incoctilia.
Ergo de his, & si quid aliud possit huic quæstioni subiūgi, primum illud dicendum,
quod coctile & incoctile, ad seruesactionē, resolutionēq; atq; (ut summam dixe-
rim) ad nostri usus rationem dici solitum est. Quod enim resoluti facile potest, & co-
ctura celeriter immutatur, id coctile est: contrā quod resoluti, immutariq; nequit, uel
quod ægre mutatur, hoc incoctile est. Tale aut sit utrumq; necesse est, si alterum ra-
rum, molleq; sit, alterū densum, durumq;. Sic enim alterum caliditate, humiditas
temq;, quibus resolutio agitur, suscipere ualeat, alterum nequeat, sed sua densitate,
duritateq; indomitū semper resistet. Cum igitur coctile, & incoctile ad hunc modū
distingui debeat: animaduertendum, quibus nam rationibus ea ipsa eueniant. Sim-
plex igitur, ueracq; ratio illa est, quā & inter primas disputationes reddidimus: quod
alimenti causa hæc omnia facit, id est qualitate, quantitateq; eius. Sic enim al-
imentum cōmutare nimirum potest. Euenit namq;, ut quæ in locis calidis, stercoro-
sis, tenubus, soliq; expositis sint, alimentū leue, atq; facile habeant: itaq; fructum ra-
rum, mollemq; præstant. Hac enim de causa non nisi coctilia fiunt in Lemno, quia
huiusmodi solum est: quippe omnino agrum eiusmodi coctilem quidā appellant,
atq; in eo coctili fieri coctilia uolunt. Sunt & quæ affert Aegyptus coctilia, soli &
aëris causa: calor enim coctilitati atq; omnino digestionī per necessarius est. Quæ
propter quæ stercorantur, antecedere ea, quæ non stercorantur, uicenis ferme die-
bus autumant. Quæ igitur agro feruenti, leuiq; proueniunt, his de causis coctilia
sunt: contrā quæ terra frigida, spissā, lenta, & quali figulari, atq; etiam pratensi, ma-
dida, & palultri exurgunt, omnia hæc incoctilia propter copiam, uiresq; alimentī,
& densā duratq; sunt ex permissione terrenæ, atq; frigidaē partis. Congelatio enim
& condensatio, ex eisdem quibus induratio fieri solet: ex quo fit, ut locis palustribus
atq; præmadidis, inutilia ex toto creentur. Nihil enim remitti in aqua possunt, quā
obrem nō nisi suum pabulo sunt. Has ferē causas tribuere solo debemus. Sed cum
aquæ quoq; celestis, & aëris qualitas alimentū augeant: idcirco imbribus incoctilia
potius fiunt, utpote cum plus alimentī, & crudius subministrerur. Hoc enim idem
propē solum quoq; eiusmodi facit, & aer si ea frigidityte sit, quæ nō fluit, sed aqua
utilis quædam constet: sic enim coaget, spissabitq;. Cum igitur causæ in hæc digerent,
nihil uetat, quo minus ager etiam idem, aliās coctilia, aliās incoctilia ferat, ubi scilicet
pluuia, ac cœli conditiones nō similes, sed aduersę inceserint. Etiam segetum, quas
sulcus tantūmodo disgregat, altera coctilia, altera incoctilia facere potest, siquidem
solum diuersum sit. Vt enim in metallis, sic & in aruis putandum, uenas spaciari ui-
cinas, diuersas inter sese, quæ suis uiribus differentias reddere possint, tamen si aëris
idem status seruetur. Itaq; interdum segetis quoq; eiusdem aliquam talem esse parti-
culam patitur ratio naturæ. Idem eueniet, & si aëris, status uel frigiditytis talis accedat,
ut uel totum, uel pars concrecant: quod etiam in corruptione euenire uidemus,
cum alia diuersa, alia similia sint, & si qua in ipsis seminibus dissimilis habitudo sit. In-
firmiora enim facilius affici certum est. Infirmum autem uel natura fieri possit, si
quam mutationem receperit.

*Cur in eodem caule, in eademq; filiqua, sub e aliæ coctiles, aliæ incoctiles sint: ac de subis circa Pbis
lippos. Item omnia legumina coctilia, ex incoctilia fieri, non tantum subam, ac lentem. Nec
non unde alia meliora, alia deteriora eueniant.*

Caput XIII



Va de causa nihil prohibet inter fabas caulis eiusdem, alias coctiles esse,
alias incoctiles. Idem & in eadem filiqua euenit, ut quidam referunt, si
uere aliunt. Etenim fieri potest, ut alia ualida, alia inualida sit. Fabæ in fir-
mitatis argumento uel illud potest deduci, quod sola mutare suum colo-
rem ut-

rem uidetur, ut nigra ex candidis efficiatur. Concretionem uero, condensationēq̃ esse ui frigoris, quæ incoctilia reddat, testificare illud quoq̃ uidetur, quod apud Philippos euenire fabis solitum est. Flatus enim in eo loco uehementer frigidus est, & fabę incoctiles pleræq̃ efficiuntur. At si in paleis torrefactus in area relinquuntur, nihil se mutant, sed incoctiles permanent: cum enim à paleis, tum suo mutuo contactu teguntur, simulq̃ terræ calore conseruantur. Contrà, si exaltentur, sublimesq̃ capiantur, flatus amplius ualet, nulloq̃ tegmine defendente, facile subit, atq̃ coagitur: tum etiam dispoliat tunc primum suis paleis, & calore circumplescente destituta, infirmissimæ fiunt. Magna autem cōmutatio mouere plurimū potest: sed si post,

10 quàm tempus præterijt, & quasi firmitus sibi iam constitire, diueniunt, nullam offensam ex flatu capiunt. Iam enim, & putamen ambiens id robustius factum est. Incoctiles autem effici, si diutius relinquuntur sub diuo, ut quidam aiunt, ratio est. Plus enim quàm modicum sit, refrigerant, simulq̃ indurantur. Huic proximum quodāmodo est, ut pluuia, quæ protinus à satione lecta est, incoctilem reddat: qđ enim in pullulando infirmam inuenit, rigere uehementissime facit: quod quidē ad cocturam, non ad exortum enoxat. Nec temere dixerim eorum alterum esse, alterum abesse, cum uis illa in alijs, propterq̃ alia sit. Tum enim insecundum, & germinis sterile, uel difficultate auctile quicquā redditur, cum initia generationis uruntur. Ex coctilibus quoq̃ satis, iterum incoctilia fieri, ratio est: nam ab eisdem aduerso

20 modo dispositis, non temere facilitas percoquendi prouenit. Itaq̃ si aer, aqua, & solum ita se habeat, quidnam causæ sit, cur non semina quoq̃ mutantur. Sin autem uenit, ut putamen coctilium remittatur, incoctilium obtendatur, ut quidam aiunt: & altera uicinitate colorem suum immutent, altera minus, & solutiora cum demetuntur, coctiliora reddantur (etenim id quoq̃ narratur) nihil absurdum: quippe obtentio illa duritie concretionis, crassationisq̃ est: quorum nihil alienū ab ijs est, quę sunt incoctilia. Et nihilo immutari oris halitu posse, illius sanē est, quod prædurum, indo mirumq̃ possit persistere: aduerso autem reddi aduersum debet. Minus quoq̃ in melle resolui, duritici, concretionisq̃ datur. Quod enim durum admodum est, resolui haud facile potest: quod etiam in area si euenerit, incoctilia fieri quidam dixerūt:

30 sed hoc minus uerisimile est. Solis etenim siccitas, etsi minus sua uia reddit, coctilia tamen nihilominus, sed magis potest efficere. Cæterum si uerum id etiam est, prioribus rationibus nihil repugnat: nec quicquam dissonat, si cum uetustescunt, incoctiliora reddantur. Sicciora enim sic quoq̃ efficiuntur, tam ex aëre circumsuso, quàm exhalatione humoris interni. Celerius quoq̃, magisq̃ corrumpi, quæ coctilia sunt, ratio exigit: dulciora enim hæc sunt, & proinde magis possunt animalia gignere. Concoctia quoq̃ eadem plenius sunt, quod etiam ipsum facit ut celerius immutentur, & hæc dari prædictis rationibus possint. Sola autem ex leguminibus, uel etiam ex omni frumentorū numero fabam, & lentem incoctilia fieri, falsò dici existimandum. Sed quod hæc maxime experimur propter usum frequentem, hinc sola hæc

40 incoctilia dicimus. Cæteris item mola frangentes uti solemus, his autem integris, quæ certe non parua differentia est: etenim si attenuatis ijs quoq̃ uteremur, non æque incoctilia esse percipiamus. Igitur & in dicere, & in reliquis incoctilitas deprehenditur. Cæterum si quis illa tantummodo incoctilia esse contendat, nec istud irrationabile est: sunt enim cæteris ferme debiliora: debile autem facilius affici necesse est. Quod uulgariter queritur, quamobrem ea, quæ cornu contigerit, incoctilia fiant. Nunquid stulta omnino quæstio sit: lapis enim multo durior est, cui semina sæpe occurrunt: & nullo minus incoctilia fiunt, etiam si in cornu nihil offenderint, nec bobus aretur. Atq̃ de his satis. Quæ autem ex congeneribus non unā cum cæteris exeunt, sed multo post (ut dictum de beta est) proximam huic causam habent, ut ante

iam diximus. Quemadmodum enim ad coctionem, & omnino ad seruefactionem incoctile aliquid est, ita etiam ad exortum, germinationemque esse potest. Et hoc enim seminum imperfectio quædam est, pariterque in omnibus euenit. Verum de his cogitandum amplius est. Validiora, uegetiora, suauiora, infusuiora uel, atque ad usum cibarium meliora, deteriora uel, pro locorum natura redduntur, ut diximus: quod sicciora, spissiora, constantioraque procreantur locis montuosis, quam planis, atque etiam magis, quam pluuijs. Sunt enim illa spirantiora, & in uegetando temperantiora: non enim cum semina plurima, crassissimaque euadunt, suauius quoque eadem esse necesse: sed alia opus est habitudine. Sarritio quoque plurimum conferre ad suauitatem uidetur, luuat & uegetiora demeti, humore namque uniuerso consumpto, cum ad cibum deteriora, tum minora efficiuntur. Legumina uero, & ut melius legantur, uegetiora demetunt: arefacta enim desluunt. Lupinum post dies feruentes aere humefactio, mane demetitur, quoniam si prius tangatur, decidit, & capi non potest: sed hæc operarum potius præceptio est, naturæ officio illa dari oportet. Flatuum inter esse crassare semina, & a quiloniorum, ad summamque frigidorum præcipue: aduersus his extenuare, atque corrumpere constat. Pereunt quædam imbre, flatuque in tempestiuo, ut de cicere florente retulimus. Faba, triticum, atque hordeum etiam post florem, si adhuc humida, tenellaque afflatu uehementer uexentur, facile pereunt. Eductur enim quod in his tenuissimum est, & conflictata inter se euanescent. Cum euanuerint, pluuiæ secuta hordeo nocet, tritico prodest. Hordeum enim nudum, et omnino debilius est: triticum contra tunicis intactum, densius, ac robustius esse: ut illud paruo indigeat alimento, & ferme tanto duntaxat, quantum aeris opera minima streetur: hoc largius agi exposcat. Item triticum, quia ualidius est, alimenti copiam uiuacit, magisque excoquit, nec nimium recipit suæ causæ densitatis. Hordeum contra plus attrahit pabuli, quia rarum natura est, idque excoquere nequit, quoniam inualidum est, & cum riguum imbre fuerit, sol una cum aduentitio humore internum quoque, & primum educit. Et à flatibus uero coctum, magis hoc perditur, uirgine quod imbecillius est.

Cum frumentum demessum condatur in meas. Curque erugo triticum, hordeumque magis infestet, quam ceteras fruges. Item cur faba eruginem inter legumina maxime sentiat. Deque uermiculatione frugum.

Capit. XV



Ed quaeritur quamobrem frumentum, quod crassatum, & iam siccum propemodum demessum est, si expandatur, non solum non melius, sed etiam deterius fiat: Sin autem componatur in meas, crassius, meliusque efficietur. Nonnulli etiam aquam conspergere assolent. Ratio, quod tunc humefcit. Secutus etiam sol deterius facit, cum alieno humore proprium quoque educit, itaque comprimit semen. At cum in acruum extructum sit, uapor terræ prætenus atque animalis, semina subit, crassioraque reddit. Quod idem etiam euenit, cum in horreis suis repositum sit, & mensuram hinc auget: uaporem enim prætenuem ascendente recipiens, coalefcit. Quamobrem alte demittunt, ut plus uaporis obtineat. Hæc igitur rem confirmant, atque etiam terra, quæ injecta incorruptum tuetur, ac tumefacit. Addo etiam quod semina ipsa per se, sine ullis radicibus, nutrimenti aliquid possint attrahere: unde fit, ut & à flatibus, & ab aere semina uegetari possent, non & temere credas. Erugo quauis comune omnium uitium sit, tamen frumenta magis infestat, & magis triticum, atque hordeum: quod alterum nudum est, alterum tunicis integitur pluribus, & solum spicæ gerit proximius, unde de frugem suam effundit: residet enim in eo humor putrefactus, qui eruginem creat. Adde quod spicam gerat erectam, densioreque: hinc enim humor mi-

nus po-

nus potest defluere: qua de causa spicam aliquantulum inclinari melius est. Sic enim quod continuū est, dissolui, atq; decidere celerius potest. Hæc eadem causa reddenda etiam hordeo est, scilicet cæterorum omnium comparatione. Habet enim prædicta omnium maxime cæterorum. Faba inter legumina magis eruginem sentit, tum quia solta multa undiq; gerit, tum quia densa obleritur, tum etiam quia humorē maxime ad se trahit suæ raritudinis causa. Adde quia fructum terræ proximiorē gerit. Putrescunt enim inferiora potissimum, quoniam minus persilantur. Et ad summam, legumina huiusmodi omnia eadem facilius abolentur. Erugo autem putredine quædam residentis humoris est. Quamobrem si copiosæ pluuie fuerint, erugo nulla consistit: diluitur enim, atq; detergitur. Sed si stillicidia, uel etiam rores plures inceserint, solq; secutus sit, flatusq; desit, nimirum putret. Quapropter locis editis, commodèq; persilatis, minus erugo creatur: cuius rorulentusq; magis, & plenilunij: quoniam lunæ quoq; caliditas putredinem auget, & omnino aer humidior. Sed omnium fragillissimum pisum est, quippe eruginem uehementissime sentit, quia multifolium, terrenum, amplum, uagumq; est. Implet etenim locum totum, etiam si amplo intervallo positū sit: & frigonibus, atq; gelationibus id obnoxium maxime, quia radice imbecilla cohereat. Vermem maxime sentiunt triticū, atq; cicer, uerum nō eadem parte utrūq; sed alterū in fructu, alterū in radice: ambo tamē dulcedinis causa: cicer abluta salsugine, uti retulimus, triticū radice humefacta. Euenit uero, ut triticum bestiolas ita gignat, quia dulcius, quam hordeum est: qua de causa palea quoq; huius suauior. Vermis generatus in eo, ubi alimentū assumpsit, quod in culmo est, spicam aggreditur, & uel totā erodit, uel alterā partem. Sed hæc, cæteraq; eiusmodi uel in loco morbi habenda sunt, quorū causas assignare haud difficile est.

De senu, rationeq; fructuum æstiuorum. Cuiusq; fertilissima sint, que fructum exiguum pariunt.

Item que optime reponantur: et que corrupta bestiolas non creent. Cap. XVI

DE æstiuis autem fructibus, seu sesama, triono, milio, panico, dictū facile id cuiq; est, ea uidelicet, quia imbecilla sint, & perfici celeriter possint, tempore seri æstiuo. Sed quænam sit eorum natura, querendū. Neq; enim terram sapit, que madmodum illa leguminum, neq; leuior omnino. Sesama enim pinguiuscula est, coctionemq; desiderat, & hæc radice singulari coheret: at milium numerosa radice, altaq; est, ac multiplici culmo exurgit. Itaq; cum alimentum, uiresq; in partem digerantur utraq; diuturnius esse deberet. Sesama enim quia stirpe simplici, altaq; sursum uires suas omnes intendit. Sed repugnat huic illa pinguedo. Lenta enim, glutinosaq; plus excoctionis desiderant. Hæc autem (ut dictum iam est) fecundissima omnia sunt. Ergo de his cogitandum latius est. Cum uero ex toto propemodum, quæ fructum exiguum ferunt, fertiliora sint ista, quæ modo enumerauimus: & lens, & reliqua generis eiusdem: atque etiam illa, quæ fertilissima uocantur, ut cuminum, atque papauer: denique omne olerum genus, & quæ in uasculis fructificant: querendum, quænam eorum causa sit, utrum quia minora sunt, confici possunt facilius. Nam & animalia quædam talia esse uidemus, præcipue quæ oua, uermesq; gignunt. At ratio hæc extrinsecus, aliquam uero interiorem petendum. Nam ea quoque re ab animalibus differunt, quod illorum oua ab aëre circumfuso aluntur, periscunturq; omnino grauida sætu redduntur, ut inter priores rationes retulimus: at fructuum educatio, atq; perfectio, in ipsis plantis peragitur, ut uiribus assidue melioribus opus sit. Omnia um optime reponuntur milium, paracum, sesama, lupinum, cicer. Milium, & paracum, quia tunica multiplici integuntur, & sicca sunt: sesama, quia pinguis: lupinum & cicer, quia amaritudinem quandam, & acridinem habent: quæ quidem quali-

tates seruare impune possunt, ut dictum est. Quamobrem & corrupta hæc, nullas bestiolas creant, quemadmodum nec semina olerum. Etenim ea quoque nulla animalia contrahunt, nec quæcunque sicca, & acris. Euenit namque, ut uelut permixtio quædam alimenti extrinsecus fiat. Singula pro suo humore peculiare animal creant, ceu triticum, atque hordeum curculionem: fabæ, quod aliqui midam uocant. Simili modo & lens, lenticula, pisum, & alia. Ratio communis plurimum est. Non enim solum in fructibus, uerumetiam in arboribus, atque etiam in lignis, atque ad summam, in omnibus inanimibus, quæ bestiolas gignunt, uaria specie fecundatur, utpote ex alia atque alia generandi materia.

Quo modo triticum putrescat, hordeumque, & faba. Item quæ non mercescant. Ac cur frumentum contusum, uetusque, feruenti persusum aqua pullulet. Cap. XVII



Triticum puluerulentum putrescit celerius: & quod in domicilijs opere tectorio leuigatis conditum est, celerius, quam quod non leuigatis conditum est: quoniam id caloris plus sentiat. Puluis enim calidus est, uipote siccus, & illimentum calis calorem suscepit utique seruat. Nam & cum uniuersum, altumque acervatum est, putret. Sic enim plus calor ris exoritur. Hordeum multo celerius, quam triticum tunditur: quia solutius, ac nudius est. Sed celerrime faba: protinus enim à messe condita perit nonnisi quam, ut in Thessalia. Prorsus perinde ac loca ualent, semina durare posse appareat. Seruat¹⁰ tur enim apud nonnullos faba omnino indomita, ceu apud Apolloniam, & Tarentum (ut inier historias dictum est) & contusam reparari posse affirmant. Sed de hoc cogitandum. Nonnunquam sponte suæ naturæ tunduntur, lupinum, milium, avena, lolium, sesama, cicer: omnino quæ acerbi saporis sunt. Sed cum auena tunica multiplici integatur, lolium contra nudum sit, alia quoque ui seruari posse necesse est. In summa tamen permanent incorrupta alia siccitate, qua cæchris diuturna est: alia puritate syneeritateque sua, ut alica: & alia succi sui natura, potestateque naturali, ut cicer, lupinum, sesama: alia, quod plenè id habeant, quod arcere, tutarique possit, ut cicera, hæc tamen, & sicca, atque calida est. Frumento sponte contuso præsentissimum remedium areque illatum perueniunt. Horum rationes hinc peti oportet. Quod autem¹⁰ à quibusdam queritur, quamobrem contusum, uetusque frumentum, aqua persusum feruenti pullulet: sic enim periculum faciunt, an uim habeat pullulandi: putrescens autem nunquam germen emittere ualeat, quanquam putredo quoque humore, caloreque fieri solita sit: hoc per æquiuocationem esse ambigui, prorsus appareat. Calor enim, cui uis corrumpendi datur, plurimum differt ab eo calore, qui uim obstat generandi. Et de humore pari modo loquendum est. Calor autem, qui putredinem creat, alienus, aduersusque est. At qui feruenti aqua inducitur, conuenit, ac modice applicatur, quemadmodum frumentum desiderat, quod germinaturum est. Nam simile quodammodo est, ut si quis querat, quamobrem calor, & humor, modo sanitatem, modo morbum corporibus faciant. Constat enim, quod non idem, sed diuersi, aduersique illud faciant. Aqua uero feruenti solent perfundere, propter seminum imbecillitatem, ne quasi gelescent, quoniam celeriter sentiunt. Nam penitus quod corruptum non est, uel frigida pullulum ostendere potest. Accidit uero, ut & tondantur, & putrescant causa alieni caloris,

De operositate in plantis: & quæ præter naturam parari arte queant. Ac de ficorum generibus plurimis: Cuius aliquæ præcoquant.

Capitulum I



10 **I**ORVM quæ in arboribus, plantisq; fieri solita sunt, alia sponte
proveniunt, alia paratu, & opera hominis exsistunt: quæ utraq;
digerere item possumus. Eorum enim quæ sponte procedunt,
alia natura consistunt, alia præter naturam: quippe cum in plan-
tarum etiam genere quiddam eiusmodi, ut in animalibus fiat:
ceu si quid non sibi germen conveniens, fructum uel tulerit:
aut si non suo tempore, aut si non partibus solitis, aut si eiusmodi
di aliquid commissum sit. Hæc enim omnia naturâ penitus negat. Quæ uero ars,
curaq; affert, aut fauent naturæ ad fructuum bonitatem & copiam, aut proprietatem,
operosamq; naturam fructuum creant: ut cum uua sine uinaceo exoritur
uel cum ex eodem palmitis nigre, candidaq; uuae proveniunt: aut etiam cum in eadem
dem uua coloris illa eadem exultat uarietas: & quæcunque eiusmodi alia facere
confueverunt agricolæ: sunt enim complura. Sed cum de ijs, quæ secundum naturam
20 sunt, quæq; naturam adiuuant, antequam disputatum sit: superest, ut de ijs,
quæ præter naturam eueniunt, quæq; operose excogitantur, disseramus: & primum
de ijs, quæ præter naturam uel certò sunt, uel esse apparent. Nam eorum
quoque ratio est, ut cum intempestiue fructificatur, nec de eisdem fructus proueniunt,
ceu si quando ficus per hyemem Vere appropinquante fructum attulerit:
& punica, uitisq; ramis prægrandibus, uel caudice fructificauerit: & quicquid his
proximum. Igitur ad hæc ipsa sumendum in primis est, illis duntaxat hæc accidere
posse, quæ humida, atque fertilissima sunt, qualia prædicta quoque patefunt. Humida
enim, ac fertilissima hæc omnia sunt. Siccis enim, minusq; fertilibus nullis eue-
niunt. Secundum ad germinationem, fructificationemq; intempestiuam subiace-
30 at, aliqua germinandi principia obtinere ramos, siue scapos, siue stipites, siue quod
tandem placeat partes postremas arborum nominare. Nullum enim uocabulum
commune omnium est, sed alix proprias quasdam appellationes sortitæ sunt, ut
thalia, crada, palmes. Quod aliqua germinandi principia obtinent, constat ex ijs,
quæ defixa, germen sexpenumero emisserunt, quanquam ima pars nullis penitus
radicibus niteretur: ut uallum utineum, & ficulneum, & oleagineum. Interdum
etiam non defixa, sed à parente decisa tantummodo germinant, ut palmites, & li-
gna oleæ. Tertium ponatur, germinationem intempestiuam fieri posse hyeme
placida, austro uel sequente. Ex his enim minime irrationabilis euentus talis appa-
reat, cum uis generandi, humorq; fecundus aggregentur, aliàs per se, aliàs ex
40 parte residua humoris prægressi, quo fructus prodierat, quemadmodum etiam in
fico. Cum enim plus illius humoris in hac superuerit, aer mitis, tepidus, humi-
dusq; secutus, mox germina euocat. Quod ita fieri constat profectò ea ratione,
quod fructus posteri de parte eadem nascuntur, qua præcoques: & forsitan præco-
ques etiam ipsa aëris mollitia præcurrunt, maturanturq; celerius. Sin autem mi-
nus hoc ita sit, ac cætera omnia hisdem, proximis uel de causis ueniunt, id est aliis
quibus humoris residuis, uel alijs ex integro consistentibus, uel etiam ratione utra-
que. Est enim natura eius arboris ad utrumque aptissima, cum humida sit, pro-
naq; ad partum. Itaque si tempus serenum diutius fuerit, colorisq; immutatio trahi-
tur. Succus enim haud excoqui potest, sed maturitatis imaginatio in colore tantum

ferē est. Caprificus tamē iuuante iam tempore maturari aliquatenus possunt, quas etiam ipsas secundū naturam quodāmodo esse censendū est. Semper enim eodem, certoq; tenore temporis solent enasci, sicut & fructus earum sciorū, quas biseras uocant. Verum similitudinē cepisse eorūq; par est, ut proxima quēdam omnium ratio notescat, scilicet ex collectu uirium, atq; humoris. Quāobrem ab auersis folijs hæc omnia enascuntur, nō ab aduersis, quemadmodū ficus erumpit. Quæ præcoques pariunt, imbecilliores sunt, ut differte non ualeant, factio illuc impetu humoris. Omnia no genus sciorum multiforme quicq; & uarium est. Aliæ nanq; caprificus tantummodo ferunt, ficus aut nullas, ceu illæ, quæ caprificus candidas cibo idoneas afferūt. Aliæ tam ficus, quàm caprificus nigras uel ingustabiles, uel cibo idoneas pariunt à tergo folij, caprificum tamen ab auerso folio generant. Culices quoq; creare solitæ sunt, quæ caprificus nullas penitus ferunt. Item quædā præcoques gignunt, ceu laconica, & leucomphalia, & plures aliq; quēdam minime. Nec earum, quæ gignunt, differentia continuo, sed diuerso habitu est. Alias enim gignunt, alias nō gignunt: ferunt nō modo apud foliū ipsum, uerumetiam multo interius: nonnullæ etiam ex parte admodū crassā. Euenit, ut aliquæ posteriores quoq; nonnullas præcoques ualeant maturare. Non enim omnes simul, sed alias prius, alias paulō ante caprificus ferunt, quæ certe proximiores germini, atq; sicibus sunt: sed prius decidunt illæ, minusq; concoquuntur. Quæ sicis eueniunt, hæc sunt: nec temere quicq; euenire apereat. Non enim omnes præcoques ferre, sed eas duntaxat, quæ humidiores sunt, uiresq; ad trahendū obtinent. Ratio est, quoniam ex alimentū residuo poma eiusmodi pariant: nec procul rationi est, humorem totum minus excoqui potuisse, cum uires plus attraxerint, quàm percoquere possint. Accedit autem his ipsis intercapedo, quia non semper eodem habitu sint: debiliorem enim, ac deterius cultam minus humoris posse capeffere certum est. Quod si copiose nihil hauserit, nec relinquere quicquam posse fatendum. Nam si pariter culta sit, coelumq; fauerit, nihil est quod etiam anno sequente proferre nequeat. Interdum si cura detuerit, euenit illud quoq; ut præcoques ferre possit, fructum autem nequeat. Quod propterea euenit, quia alterum iam pridem confectum, paratumq; adest: alterum tanquam denuō confici opus est. Nec eas, quæ ex crassā illa prodierint parte, percoqui potius quàm summitate enatas, ratio uult. Alimentum enim & calor summa potius petere solent, atq; omnino arbor ad germen producendū enititur. Itaq; cum unā etiam calor sursum feratur, utraq; sit ratio, ut pars aliqua relinquatur. Quamobrem & germinationes, & florum particulatim prouentus, & fructificationes posteriores sunt. Sed de his satis dictum est.

Cur uites aliquæ prouentus suos accelerent: curq; partes insolite interdum germinent. Cap. II



Proximum autem huic quod uitibus euenit, nam illæ quoque germinum suorum prouentum nonnunq; accelerant, collectio illo secundum, germinatoreq; humore. Locus tamen germinandi certus ipsi est. Gemma etenim dehiscēte germen emergit. Augescit uero, proinde ac coeli qualitas, & temporis spaciū fuerint. Omnia ferme, quæ natura sua uel germinant, uel florent, hoc idem facere assolent. Quæ enim propere concepissent, sæpe tempore inuitante sereno, ante statum tempus pariunt, atq; educant, dum coeli feruetur aequalitas. Igitur germinationes in tempestiuas his de causis fieri arbitrandum est. Illas uero, quæ non parte solita, sed uel ramo prægrandi, uel caudice agantur, haud procul his esse credendū. Cum enim uis generandi in eas partes sese collegerit, mox germen exoritur: quippe cū ibi principii id cōstitit, affluens alimentū subiecto assimilatur, necesse est: ut uel in cæteris fieri solet. Nec temere col-
lectus

fectus ille consistit, ubi quicquid eiusmodi habitus conditus fuerit. Sed longe probabilius, quam in genere animalium agitur, cum ex pectore cornu erumpit, uel cum aliquid eiusmodi euenit. Hæc enim diuersitas maior est, quo plantæ magis, quam animalia partibus consent similibus. Si uero, & germen aliquod præcurrerit fructus, minus admiranda res utique sit. Interdum enim uel palmæ de caudice prouenit, qui si cum uires ceperit, fructum præstat, nihil temere faciet. Sed absurdius certe cum fructus ipse uel ramo prægrandi, uel caudice promitur, quod punicis euenit: causam tamen prædictā esse illam existimandū. Diuersitates autem huiusmodi minus à solito discrepant, cum discrimen committitur loci, ut cum ficus fructum ab aduersis solibus rulerit. Commutatio enim parua hæc est, nec locus ille alienus omnino ab eiusmodi euentu percipit. Ratio enim, quod aggregatio imbecilla, confluxus in eam partem ualidior fuerit. Itaque humoris collectu isto seriore pomis præcoquibus arbor digessit, atque exarat: quin & illa ratione minus absurdum id esse appareat. Est enim genus quoddam eiusmodi, quod auersiferū uocant. Enim uero si quid congener fructum ita natum sit parere, cæteris quoque associatis idem euenire interdum haudquaquam absurdum est, scilicet ubi similis condita fuerit habitudo. Nam & ramis prægrandibus aliquando tulisse, si qua fertilis ea ualida sit, similitudinē quandā sic ægyptiæ refert: quippe cum illa fructum suo caudice ferat, quoniā fertilis, ualidaque sit ad fructificandū. Huius enim argumentū illud potest deduci, quod sæpius partibus ferat eisdem, fructu decerto prior: nec plenē maturitatem fructus capere potest, nisi scalpatur, perungaturque oleo (ut dictum est) propter affluentiam pabuli. Scalptu etenim illo aliquid humoris detrahitur, & oleum seruefaciens cum sole, pomum apertum celeriter commouit. Proximū id quodammodo illis uidetur, quæ particulatim florescunt à parte ima exorsa. Etenim, quæ inter ea uiribus ualent, & quasi perfecta sunt, partim florent, partim fructificant: quæ imbecilliora sunt, uel parte suprema augescunt, & germinant, quodque assidue perficitur, florescere incipit. Alimenti uero influxum pro sua natura, suisque uiribus unumquodque dispensat. Quod si perfectum, atque ualidum sit, fructum parere continuo incipit: sed imperfectum, ac debile ante augescit, corroborationemque, quam aliquid pariat. Et de his hæc dixisse sat est.

30

Vnde uariatio fructuum in eadem planta proueniat: unde etiam uarietas in radice plantarum, & aliæ mutationes eueniunt:

Caput III



Fructuum immutationes, si qui uel ex candidis transeant in nigros, uel ex dulcibus in acutos, aut econtrario, quemadmodum fico, uiti, atque punice euenire proditum est, locis quibusdam nulla in admiratione sunt, neque ullo modo absurdæ uidentur: quoniā natura alias hoc modo, alias illo, & partibus quoque non pariter ferat, ut in uire fumida uocitata, patet. Hæc enim uuas alias candidas, alias nigras asserre uidetur: & alias omnes candidas nigras uel promiscue generat. Quamobrem nec augures hoc iudicare tanquam ostentum consueuerunt. Quod enim folium, ostentum esse non potest. Ratio uarietatis, quod color earum uuarum, neque niger, neque candidus est, sed fumo proximus, à quo & nomen uitis accepit. Itaque ubi uel aliqua parua mutatio euenit, colorem omnino suum commutasse uidentur, utpote, quæ neutrum colorem sincere possideant. Quapropter uersicolores uuæ interdum perficiunt, ut alix ad albedinē, alix ad nigredinē potius inclinent: causam alimentum, uitisque ipsius habitu reddi oportet. Hoc igitur (ut dictum est) concedi ex facili potest. Quod autem punicis euenit, si mutatio facta totarum sit arborum, proximū illi profecto est, quod in Cilicia, & Aegypto fieri perhibent, siquidem sponte mutatio ueniat. Affectio enim, & uis illa, naturæ agri tribuenda est. At si non arbores totæ mutantur, sed interdum id aliquibus eueniat,

alimento, & habitudinē causa imputanda est. Sin autē enormiter tulerint, radicibus causa dabitur, & si qua pars alia principalis sit: quod alia nutrimentū aliud ceperit, uel etiam uarie coxerit, atq; reddiderit. Caelū quoq; nōnihil efficere posse credendum est. His enim ipsis de causis oriri differentias, certū est. Sed omnium absurdissimum hoc in loco partitio radicū appareat. Interdū enim altera parte uel nullas, uel certe pauciores radices arbores gerunt, quanq̃ undiq; fructus pariter ferant, scilicet alimenti quae uersus permissione: ceterū si quae desint, pabulū singulis ab arbore dispensiatur: si uero undiq; adsint, suae parti unaquaq; ministrat, cum meatus reiecto (ut ita dixerim) tramite porrigant sese, portioneq; radicis suae respondeant. Venit quippe, ut pleraq; plantae parte altera utuant, de mūq; repleantur penē undiq; alijs recreatis, alijs ob ariditatem delapsis. Sin autē palmitū quoq; diuersi generis compactio, fidem aliquā facit, quando uitris, quae una est, parte utraq; fructū ferat diuersum, ceu alimenti nulla fieri possit confusio, sed reiecto tramite fluatur assidue, uti ea quoq; licebit: hoc tamen minime sit, & fidem proinde minime facere potest. Ceterae cōmutationes praedictis causis maiore ex parte proueniunt aequē in omnibus, siue colore, siue sapore, siue aliquo alio immutent. Enim uero alimenta dispositiones arborum alterare, promouereq; possunt, uel dum superant, uel dum superant, quae admodū etiam in frugibus euenit. In his tamen semper in partem deteriore mutatio fit: sed in mitigatis, excultisq; similitudo planē animaduertit. Omnino (ut dictū est) paruam in his fieri posse mutationē credendum, ubi nihil ager mutatus est. Sed haec spacio temporis longinquo perficiunt, nec annus sufficit unus, sicut in ijs, quae ex syluestri habitu transeunt in urbanū: uel contra, ex urbano in agrestem mutantur. Magno igitur argumento ad fidem immutationis, agrorū cura etiam est, quae radicibus, alimentisq; adhibita, mutationē facere potest. Sed tam breuiter effici posse, incredibile est, nisi quis & tempus latere, & mutationē esse perexiguam dixerit. Nam in annuis quidem hoc aud temere ueniat: neq; in quibus eueniat, si quando euenire possit, aequē mirandū est: ceu cum ex tritico lolii proueniat, id enim sepe numero fit, & causam scire quodāmodo arbitramur. Imbres namq; id possunt efficere. At si ex lolio in triticum redeat, hoc certe admirabilis est. Ergo ceu imbecillitatē quamdam, uel morbū feminis intelligere licet, quē alimenti coeliq; mutatio tollere possit. Sed haec latius dicta sunt, quoniam ad causam confirmandā ea quoq; assumenda censuissimus, quae latissime patent.

Cur fructus aliquando sine folijs uisuntur: ligneq; interim separate ab sua arbore germinant: & statim lignee interdum defudant. Item cur plantae in plantis nascantur, & arbor prostrata interdum resurgat.

Caput IIII



Item autem sine folijs fructū aliquādo tulisse, si ex toto dixeris, incredibile est: sed si exiguo quodā producto germine, eoq; mox imbecillitate sua delapso, uuas sine folijs extitisse inquis, res uerisimilior redditur: tanq; ad fructū edendum amplior, uehementiorq; impetus factus sit. Quod uere arboribus nōnullis idem promodū euenit, cum abunde fructificant, ceu amygdalae: quippe cum & propter nimiam fructuū multitudinem folia cerni nō possint, & alia imbecilla, exiguaq; prodeant. Quoniam natura se totam ad fructū generandū contulerit, sicut etiam uitis, cum floret, si serō inceperit, fructū sine folijs feruat: & ficus quoq; delapsis folijs poma diuinius retinet. Cum enim fructus constiterint, firmitus adherent, quam fronde: alij ex soliditate peciolli, atq; retinaculi sui: alij quia frigore constipantur. Frigus enim humorem foliorū penitus tollit: fructum, quia largior, & calidior est, tollere ex toto nō potest, sed constitit, atq; condensat. Huc proximum, & si qua olea folijs aliquando amissis fructum attulerat:

attulerat: folium enim utpote imbecillius frigori magis obnoxium, uel alicui euen-
tui factum est: quippe fructus maturi, sponte ruunt. Sed ante, quam sint maturi, ua-
lenter adherent, quamobrem periculis oleas percutiunt. Hæc igitur cætera, quæ eius-
modi primordia tum quædam naturalia, ex seipsis, tum ex circumfuso aëre capiunt.
Nam & ligna, quæ sponte germen emittūt, ceu oleaginea, et quicquid generis eius-
dem, quæ ad prodigia, ostentaq̃ referunt, ratione non carent. Sunt enim natura ui-
uacia, pronaq̃ ad germen fundendū suæ densitatis, humiditatisq̃ causa: quod cum
extrinsecus liquoris aliquid senserint, quamprimum germina ædunt. Enimuero ma-
gna ex parte obruta, & locis humidis posita germinant, præterq̃ si quid præcisum
10 paulò post pullulauit, quod humorem in se aggregatū satis haberet, tempusq̃ unū
germinandi proximum esset. Cui simile quodammodo scillæ euenit, ac cæteris quæ
suspensa germen emittunt. Proxima etiam illa, quæ de lignis nascuntur, & præci-
pue quæ de abiete, quæ lucinas augures uocant. Aëre nanq̃ eblandito, atq̃ remis-
so, hæc erumpere potissimū solent, ubi intestinus humor collectus, & exterius quo-
que occurrens concreuerunt, atq̃ in rotundum conglobati fuerint. Adde his sta-
tuas, quæ exudant: cælo enim austrino, hume cunctoq̃ ita afficiuntur: nec omnis, sed in
quibus aliquid pinguedinis inest, ut cedrus, cupressus, olea, quæ quidem prodigia,
& ostenta esse creduntur. Cæteros huiusmodi euentus, quos narrat, ut laurum
aliquando in platano surrexisse: uel in summa, germinationes, quæ in sede aliena
20 prouenerint: hæc omnia ex aliquo latitante primordio exoriri putandum est, pu-
tre dine uel aliqua immutatione facta in arbore. Ex primordio latitante inquam, si se-
men delapsum excipiat in arbore, cōprehendaturq̃ putredine aliqua subiacente
terrena. Sic enim aliud in alio nasci, & adolescere potest. Sed eiusmodi germinatio
uisco proxima est, aut platano: quanq̃ est longior, quæ ex æneo prouenerat triplo-
de. Vel potius hæc omnia germinationi proxima illi sunt, quæ ex terra contrahitur.
Nihil enim prodire potest, nisi aliqua terrena putredo antecesserit: sicut neq̃ ex pa-
rietibus quicquid prouenit, nisi confluxus aliquis, putredoq̃ talis fuerit, qua planta
erumpere nata sit, atq̃ etiam alimentum postea in fluat: sic enim eorum incrementu-
tum accedit. Sed hæc sponte quoq̃ uel omnia, uel certe aliqua sunt: forsitan & se-
30 minibus delapsis putredine, collectuq̃ humoris fauente pleraq̃ exeunt. Laurus, et
quicquid eiusmodi, fructu suo creatur. Veruntamen si hæc etiam putredine confu-
sere possint, nihil ad causam refert: sin autem arbor aliquando tempestate prostra-
ta restitibilis sponte facta, & uitæ reddita est, ut in Philippis salix, & platanus in An-
tandro, quarum alteri nihil detractum est, præterq̃ pars ramorum, quæ in prostra-
tu perfracta fuerit: alteri, id est platano rami amputati sunt, & pars aliqua circundo-
lata. Causam hanc esse putarunt, quod arbor prostrata parte altera plurimum terre
euulserit: mox flatus noctu ingens aduersusq̃ secutus eam promouerit, ramisq̃ oc-
currens seq̃ insinuans erexerit. Sic enim euenisse in Philippis proditū est. Reliqua
uero permota pariter est, terræq̃ euulsum non minus habebat: & quia detrunca-
40 est, facilius exurgere potuit. Sedenim his nulla causa naturalis reddenda forsitan
est. Quæ aut in ipsis plantis eueniūt, ex prædictis assequi, contemplariq̃ tentandū.

*Quamobrem uuae sine uinaceis parentur, ac in eodem palmitē uua nigra, & alba spectetur. Item
cur uarij fructus in eadem arbore, & cur mitescant terra obrui.* Caput V



Equitur, ut ea nunc explicemus, quæ arte, paratuq̃ operoso efficiant: quorum causas cōspectiores esse aliquis putet, quemadmodum certe sunt. Vuas enim uinaceis uacuas faciunt, detracta medulla palmitis, qua uinaceū gignitur. Palmes idem uuam nigram simul & candidam fert, & in eadē uua acina alia nigra, alia candida cohærent, cum utriusq̃

malleoli dimidiam partem superiorem contuderunt: deinde æqualiter compositos, arteq; colligatos defixerunt. Sic enim compages una ex utroq; coagmetatur: quippe cum omne uiuum cum uiuo sociabile sit: & maxime, quæ societatem generis habent, cum colluxata in naturam conflantur unicam. Sed uterq; per se alimentum sine confusione transmittit: itaq; sit, ut fructus reddatur uarius, prout utriq; conueniat. Quod etiam fluuij faciunt inuicem congregantes, ut Cephissus, & Melas in Bœotia. Seruat enim uterq; suum meatum: in his tamen nec inuicem alimenta iunguntur, sed æque distantia deriuantur, & perfluunt. Hæc eadem causa est, & cum arbor uaria granata mala uel fert. Virgas etenim malleo uelut pramollientes, ut parte contusa facilius inter se cohæreant, mox arctissime colligatas deponunt: tum arbor una ex coitu compositarum uirgarum exurgit, sed singulæ genus suum conseruant, alimentumq; per se trahunt atq; excoquunt: nec aliud commune inter se quam mutuum illum complexum, coagmentationemq; gerunt. Huius proximum uel maioribus euenit, & maxime ijs, quæ natura syluestria sunt. Ficus enim, & quicquid generis eiusdem, arboris complectens caudicem cohæret, atq; unam efficit molem. Quæ quidem partim homines de industria faciunt, partim ipsa sponte unitatem eiusmodi capiunt, quæ scilicet non aduersa inter se sunt, sed mutuo deiunguntur amore. Vbi enim alterum complexum alterum sit, uelut natura unica ex ambobus consistit. Quamobrem si quis alterutrum detrahat, uel dissoluat, utrunq; exarescat, necesse est: sicut & inter uersigenera, quæ simul enata, educataq; fuerint, ut de uite fico nupta, & ipsa marita retulimus. Nam quæ suo complexu, irreptuq; nocent, ut edera, hæc naturæ unitatem facere nequeunt. Alterum enim moriatur, necesse est. Varios igitur fructus ab eadem produci arbore his de causis opinari cōueniet. Res enim similis quodammodo est, ut si quis arborem unam surculis pluribus, ac uarij generis inferat. Primordia enim, naturæ atq; plures unice substantiæ iniiciet: sicut illic ex primordijs pluribus natura una conflatur. Fructuum magnitudo, quos ramis suis annexos ollis inclusos flexu sequaci deductos in terram obruunt, ceu punicarum, aut malorum, ratione contingit. Quantum enim humoris à sole, ac æq; detrahitur, olla coërcendo utiq; seruat, & simul uaporem ex humo attrahit fructus, quo se alere potest. Arborem enim alimentum transmittere tam intempestiue, minus rationabile est, nisi admodum parce. Qua de causa granum punici nihilo maius effici potest, cortex autem in plenum crassescit, ceu nihil ad illud alimenti perueniat. Sucus etenim omnium proprius uel tantum naturali confici, atq; excoqui posse uidetur. Quamobrem mala deteriora, insipidioraq; sunt: at cortex granati uel extrinsecus recipit incrementum, utpote qui minus naturæ conueniat. Vaporis uero attrahitio, qua nutrimentum, profectusq; accedit, ratione minime caret, quemadmodum ari, & cæterorū, quæ ante iam diximus. Pari modo & oleribus sanè euenit, quorum radices olitores percassant folijs direptis quorundā: ut raphani per hyemem, cum maxime uigent, terraq; aggerata, ut nec umbres possint admitti. Sic enim per aestatem mira crassitudine distenduntur.

Quæ cura coletur apium, eaq; ei cachrylium iungatur. Cur item fructus uirides cōseruentur. Tū de cucumeribus præcoquibus: & quamobrem speciem suam apium mutet. Caput VI



Pium uero radice tenuis circumsodientes cachrylio plene obducunt, mox insuper terram accumulāt. Ratio, quod totum alimentum radices absumunt, nec ad germina quicq; transmittunt: quod si diuidatur, plus incrementi sequatur, necesse est. Quæ igitur germen ab imis educere possint, ut cepæ, & quardā alia generis syluestris, radices mittūt. Sed raphanus, quia nullam uim germinandi ab imis obtinet, alimentumq; capit, quod non sursum

furfum transmittere apta fit: idcirco subtrus crassatur, amplissimaq; efficitur. Causa ue-
ro, ut nulla putredo, nulla corruptio accederet, humo cōgestitā datur, quæ aquam
arceat, & in totū, omne quod alienū est, admitti nō patitur. Aprijs uero cachryliū iun-
gitur, quia calidū, densumq; est, iuuat enim ad alimentū trahendū ui suæ utiq; den-
sitatis, idemq; retinet, nec fursum transmittit, simulq; sui caloris beneficio potest cō-
coquere. Itaq; cum alimentī copia large accedat, percoquaturq; incrementū quoq;
large consequit. Eodem profectō uel ea pertinent, quæ cucumeribus, cucurbitisq;
euenirent in mollitia, & incremento, si quis paruos, paruasq; absconderit. Sic enim
nulla pars alimentī à sole detrahit, nec statibus rescicatur: quibus causis moles au-
10 geri nō possunt: ut etiam arboribus euenit, quæ locis soli, uentoq; expōitis manēt.
His illi quoq; respondent, qui in ferula, uel tubo fictili includunt: plus enim alimē-
ti præbetur, quoniā nulla pars exhalatur, nec excicatur. Crescunt uero in longitu-
dinem, & quia nutrimentū facilius recto tramite fluit, et quia nihil est quod auocet,
aduerseturq;. Rado similis facit, ut uirides quoq; ualeant perdurare, si quis apud pu-
teum serat, cumq; tempestiui iam sunt, dimissos in puteū bene operiat: sic enim sol,
afficit uē haud quicq; siccare potest: & aquæ subditæ uapor ascendens facit, ut nul-
lam sentiant siccitatē, sed quasi recenti habitu uiuant. Durant autē diu ex pabuli fa-
cultate, quod radices assidue mittunt. Quippe radices diu uiuere possunt cura adhi-
bita. Quamobrē si quis postq; fructificauerunt, germina decidat, & radices terra tute-
20 operiat, atq; conculet, rursus ex eisdem radicibus cucumeres depromēt, et multo
maturius, quā qui semine ueniant: quoniā radix iam adest, & terra congesta, con-
culcataq; tepesciens satis germen celerius elicit. Nam & tepor ipse nō parum con-
fert ad præcoquem germinationē. Argumentum hoc quoq; euidentissimū, quod si
quis hyberno tempore semina cucumeris serat in calathis, rigetq; aqua tepida, & so-
li exponat, & igni admoueat, ac postea cum tempus seminandi fuerit, totos copiosius
nos demittat in terra, præcoques admodū faciet. Et hæc prædictas causas fortiuntur.
Figuram autē, & speciem suā apium mutat, si satum conculetur, cylindricū super-
inuoluto coërceatur. Fit etenim crispum, quoniā incrementū transire facile neque-
at. & ualis quoque, in quo positum fuerit speciem imitatur: quod propterea euenit,
30 quia nutrimentum, cum prohibetur, arceturq; à uase circumueniente, fertur ad id
quod aduocet, libertatemq; permeandi concedit: fit enim uel ut riuli cuiusdam de-
ductio. Itaq; speciem uasis ambientis capessit. Euenit hoc idem quodammodo & ge-
neri animalī in magnitudine, paruitate, breuitate, & longitudine. Quippe illa for-
mata iam sunt: hæc uero cum generentur, formam recipiunt. Quapropter cum
apium transferre oportet, palum defigere tantum præcipiunt, quantum apium ef-
ficere libeat. Radix enim totum locum implere facile potest.

Quibus rationibus & radices, & germina augeri contingat. Curq; scilla, lentiscone inserta meo-
lius ueniant. Cur item in fisco rutam serant. Quamq; ob causam cinis radicibus congeratur,
seminaq; inuoluant stercore. Quæ ex seminibus colliora, dulcioraq; euadant. Tum quæ de
tractione immutentur.

Capitulum VII



Vic proxima quodāmodo est in mitigandis arboribus radicū auctio.
Cum enim transire libere possint, alimētūq; obtinere copiam, amplius
tum in longitudinē, tum in crassitudinē augescunt. Necnō & qui semi-
na plura in linteolo colligata seruērit, radices & germina faciat amplio-
ra. Quamobrē serere quædā hac ratione consueuerunt, ceu porrum,
apium, atq; alia quædam. Plus enim ualent, quæ plura, atq; ex his omnibus natura
una consistit. At sunt, quæ uic temporis, quo serunt, diuersam speciem capiant, ceu
rapa, si quis protinus ab area serit, ampla efficitur: quod ideo fit, quia plenius radica-

tur, dilaturatq; amplius. Meliora euadūt & quę lentisq; aut scillę inserta terrę inan-
dantur: habet etenim utraq; humorē, caloremq; aliquē, & sit uelut insitio quādam.
Omnino quicquid in alio fieri possit, melius reddatur, ceu ruta in fico: sic enim opti-
mam posse fieri creditur. Cortici infixam serere, & terra occultare consueuere. Eue-
nit namq; ut humor lacteus ille fici, super alimoniam auxiliari quoq; suo calore ualeat
opportune, sicut & cinis congestus radicibus: siue ne radices uermiculent, seu etiam
falsigine coalescant. Habet enim similem quandam uim calefaciendi: quippe lentis
amplitudo efficitur, si semen stercore bubulo inuolutū feratur. Iuuat etenim calor,
& siccitas stercoreis: ciceris aut, si cū putaminibus aqua pre-maceratū feratur. Minus
etenim est, quod putrescat, alimentūq; primū largius ministrat, & si cum ceteris ob-
feratur, maturius ueniet. Hęc admiranda & penitus à natura negata putant: uerū
tamen mutationes eiusmodi sponte quoq; & arte naturę ratione eueniunt, ut in ti-
pha, & semine tritico obducto. Sicut etiam, quę ex seminibus coctiora nigro præ-
macerata euadunt, aut quę melle, lacte ue pari ratione macerata dulciora reddun-
tur. Quale namq; semen terrę committit, tale quoq; progeneret, aptum est. Com-
mittitur aut alteratum & cōmutatum. Duabus enim in rebus quodāmodo princi-
piū omniū immutat, id est, aut in qualitate, aut in quantitate, ceu tiphę & semi-
ni, quod pars aliqua desit, quę si detrahatur principio, generationē minus impedi-
et: sed si exempla sepius sit, & uelut penitus semen dispoliet, atq; afflicto opportunius re-
linquatur, tum in qualitate mutatur, nec eandem multitudinē paleę retinet. Eue-
nit quoq; alijs, ut partibus quibusdam detrahit, nōnihil differentię ortatur, ceu utri
palmitis medulla exempta, uua sine uinaceis gignitur. Quod quidē fidem nonnul-
lam illis forsitan faciat, qui semen à parte unaquaq; transmitti asserunt. Sed huius
solutio eadem est, quam de animalibus diximus. Hęc igitur propter prædictas cau-
sas commutari putandum.

*Quamobrem silymbrium in mentam, & ocimum in serpyllum transeant. Quę in aliam speciem
transeant, ut eruca in aureliam, atq; ea in papilionem.*

Caput VIIII



Silymbrij uero mutatio in mentā, uelut prædictis opposita scilicet est, cū
ex neglectu eueniat. Fit enim, cum quis nō excolit, neq; curam solitam
adhibet, ut radices amplius deducant, quā in partem ut tota cōuersa
debilior pars superna consistit, odorisq; sui uehementiā amittit, quasi
ex ambobus illis, germine atque odore, similitudo proueniat. Quippe
acritudine exolefcente reliquus odor, quia mollis quidā, remissusq; est, proxime ad
mentam accedit. Quamobrē transferre sæpenumero iubent, ne istud eueniat. Hęc
silymbrij causa est. Ocimū aut, quod loco soli exposito situm est, transit in serpyllū,
quia uehementē siccatur. Folio namq; minus, odoreq; uehementius redditur: quip-
pe cum alimentū quoq; minus habeant, quę sicca sunt. Sed eiusmodi mutationes ita
euenire putandū, ut aliquid similitudinis faciant, nō ut omnino speciem exprimāt
alienam. Populus alba, fronde latiore, cortice leuiore, atq; omnino succo lactiore, q̃
nigra est: sed eadem in senectā ob alimenti inopiam, haud procul est à ratione, ut &
frondem angustiorē, & corticem scabriorem habeat: & quicquid euenire ijs soleat,
quę nō æque alimento abundant. Omnino fortasse mirū nō minus est, quod in hac
euenit, cum in proximū, atq; simile quodāmodo transeat. Nam et in animalibus mu-
tationes eiusmodi plerasq; uidemus, alias in generatione, ut cum in ceteris, tum in
ijs, quos papiliones uocamus. Enim uero ex eruca aurelia nascit, mox de ea papilio.
Id enim nō alijs, q̃ papilionū generi euenit. Alias in ijs, quę perfecta iam sint, affe-
ctione, dispositioneq; corporis perspicuas, quas anni tempora faciunt, ceu in au-
bus. Quippe in his potissimū & dicitur, & conspicua est colorū, totorūq; corporum
immu-

immutatio, ut esse aliq̄ uideant̄. Hęc igit̄ (ut dictū iam est) naturalī tribui rationī par est. At quę principio dicim̄, secundū naturā potius euenire arbitrari certe oportet.

De morbis, corruptionēq; plantarum. Præterea morborum initia aut intrinsecus contrahi, aut extrinsecus. Caput IX.



Equitur, ut loco postremæ contemplationis de morbis, & corruptione plantarū loquamur: quę quidē ratio euentus ancipitis est, quoniam & secundū naturam, & præter naturā consistit. Iam enim corruptiones alias secundū naturam, alias præter naturā euenire omnes dicere solent. Morbus aut̄ partim omnino præter naturam esse appareat. Est enim discellus quiddā, atq; perturbatio rei, quæ secundū naturam sit: partim, quia solitus est, & sæpenumero accidit, secundū naturam esse asserimus: in animalibus pariter & plantis, affectiones scilicet discernendo eas, quæ uolentæ sunt, planēq; extrinsecus ueniunt, id est uulnerum, plagarūq; causa. Quæ enim algore, aut ardore, aut aliqua ratione aeris accidunt, hæc præter naturā esse nunq̄ censemus, quāuis ea quoq; uolenta quodammodo, atq; extrinsecus occurrant. Sedenim hoc neq; proprium plantarum generi deditur, cum & in animalibus idem sit: neq; refert ad eam rem, quam in præsentia quærimus. Morborū aut̄ initia, sicut & in animalū genere, uel intrinsecus, uel extrinsecus contrahunt̄. Et corruptio quoq; pari ratione exoritur, aut in totum, aut certe quoad minus possint fructificare. Intrinsecus inquam, cum nutrimenti copia, uel inopia fuerit, aut qualitatis plus, minus uel accesserit: extrinsecus aut̄, cum aut frigora supra modū, aut æstus, aut imbres, aut squalores, aut aliqua coeli grauitas fuerit. Adde plagas, & ulcera, quæ ligone, uel falce, uel aliqua eiulmodi causa ueniunt: nam & deorum numine aliqua damnoſa urgere creditur, ceu grandine. At si inopia quoque fecunditas uel alimentū extrinsecus sit, ut placet quibuscūq; nil referat. Omnia uero, quę coelū iniecerit, uehementius imbecilliora infestant, uirpote, quę minus tolerare excessum ualeāt. Infimissimo uero habitu sunt, primū cum turgescūt, atq; germinare occipiunt: deinde cum fructū creantur, quasi humor desierit: tum enim summa mutatio est. Qua de causa, genus agreste maxime ante germinationē, aut sub ipsam germinationē laborat, ubi grando, aut status prægelidus, uel præferuidus inuasit: uincunt enim ab intemperie. Hyems tempestiua prodest, tam agrestibus, quā satiuis. Facit enim constipando, & condensando, ut magis ualeant, atq; proinde ut melius germinent. Hęc igitur arborū genera communia intelligere licet.

Agrestium plantarum morbos tradi nullo, sed urbanarum complures: atq; alios carere nomine, alios nominari, ceu scabiem, radicationem, syderationem, uermiculationem. Cap. X.



Agrestium morbi nulli tradunt̄, sed urbanarū complures, & forsitan ita est propter infirmitatē horum. Alij nomine uacāt, alij nominant̄, ceu scabies, radicatio, syderatio, uermiculatio. Syderant̄ præcipue plantæ nouellæ, ac furculi suæ causa imbecillitatis: quod accidit, cum siccata telure humorē trahere nequeant: quapropter plurima pereunt sub syduſ: ac maiores ætate uirpote ualidiores, magis resistunt, & alimentū à longe trahūt. Item humor in ueteribus pinguior, & ad fructificandū maturior, q̄ in iuuenibus est, quæq; ostenderint, cuncta educant. Omnino mutationē minus fuisse possunt, quę imbecilliora sunt. Necnō & humescunt quodāmodo magis sub syduſ arbores, ut antē retulimus. Quāobrem eo tempore germinū germinatio accedit. Syderatio his de causis accidit, atq; etiam ictu iniurioso, & uulnere. Nam ea quoq; ratione infirmiora redduntur. Vermiculantur magis quæ ætate proſectiores sunt, quod & ipsum euenire uidet̄ iniuria circumsodientū, aut cum sit propter squalorē labora-

uerint: quippe ex ictu putrescunt, ulcerataq; uermes per saniem creant: quædammodum & alijs omnibus euenit. Sitis autem idem propterea facit, quia minus humoris, q̄ satis sit, habeant. Fit enim uelut dimotio ex natura: dimotionē mutatio atq; alteratio sequitur: mutatione animal ex sanie gignitur. Accidit hoc uel illis, quæ arefcunt: sic enim calor redditur efficator. Vermiculantur maxime mali, quamobrem in locis feruidis obnoxie sunt: radices enim breui siccescunt.

Publicos maxime omnium morbos uermiculationem, & syderationem. Tum quæ magis, minus ue bis infestentur. Item ubi sp̄hacelismum fieri dicant.

Caput XXI



Publici tamen omniū maxime morbi, prædictus hic atq; syderatio constat. Nulla enim ferē sunt, quæ nō uermibus infestentur: alia tamē pluribus, celeriusq; intereunt, ut mali, ficus, pirus: alia paucioribus, atq; ægrius moriunt. Minime uermiculantur, quæ acerbæ, & uehementia sunt, nō modo quia minus putrescunt, uerumetia quia acerbitas partum animalium prohibet. Argumento laurus est, quæ cum breui putrescit, nō breui uermiculatur. Nam ea de causa nec caprificus similiter, atq; ficus putrescit: lac enim eius acerbior est omnino. Quæ dulcia sunt, celerius putrescunt: etenim succus eorū mutationē facilius recipit, quoniā imbecillior est. Hinc mali, & punice dulces magis putrescunt, quā acida, & omnium maxime uernæ, succi scilicet imbecillitate, atq; totius naturæ. Omnia, quæ lentisco inserta terræ mandant, minus uermiculationē sentiunt, odoris, feruorisq; causa. Genera hæc morborū causis prædictis ueniunt. Quidā & sp̄hacelismū, id est morbum radices, extrinsecus plagis, atq; uulneribus fieri aiunt, ut in animalium genere. Translatū enim id nomen à similitudine illius uitij est. Sed minime in omnibus uerum hoc esse uidemus: siquidem cicer radicitus in arefcens intereat, cum in flore falsuginem imber eluerit. Enim uero iactura falsuginis uelut sp̄hacelismus est. Quin & alia pleraq; sine ictu uitio illo uidentur ægrefcere. Et syderationem sp̄hacelismū quidam appellant. Sed hoc nominis fortē differentia est. Copia enim alimenti nimia, uel inopia, arbores eo quoq; modo intereunt: nī forte succi potius cruditate, ac ui extrinsecus occurrente: ut cum post fructificationem humore adhuc tenui causa imbecillitatis gelicidium uehemens consecutum sit. Hæc etenim ratione intereunt: quippe succus serosus & tenuis frigidus, & crassus, & tanquam pinguis, calidus est. Igitur hæc corruptio accidit siue copia, siue cruditate, siue etiam utraq; ratione, atq; etiam imbecillitate placuerit.

De alijs quibusdam morbis, ut squalor. De morbo ficus, qui glabratio dicitur. Deq; articulatione uitium morbo. Item de scabie, impetigine, roratione.

Caput XXII



A ob alimenti inopiā, aliter corruptio sequitur, cum radices sublimes, prospectæq; fuerint (humorem enim transmittere nequeunt propter solis ardorem) Itaq; succus uritur, crassaturq; plus, quā commodum sit: unde morbus, atq; interitus. Huic proximū accidit, cum ob aquæ inopiam squalent. Neq; enim tunc humorē possunt transmittere. Iuat, tuereturq; contra humoris penuriam solum assidue appellare, coæquareq; sic enim per ætatem humoris aliquid trahent, & per hyemem calor adit amplius, qui alimentum dispenset, quod large imbrium copia subministrat. Tunc enim quia nequeunt uegetari, pallent atq; intereunt arbores, modo frumenti. Quippe quod pabulum euincere, atq; percoquere nequit, leiunio labore necesse est. Interdum non penitus pereunt, sed tantum ægrotant, ut minus queant fructificare. Quod enim pabulum non excoquit, neque eumcidit, iam fructificare minime potest. Ficus morbum quendam in radicibus, & paulo superius sentit, quem glabrationem appellant, qui certe ex nimietate humoris solet accidere. Articulatio quoq; uitis nimietati

mietati prorsus tribuitur, & quaecumq; fructificare nequeant, propter luxuriam germinis eodem proculdubio pertinent. Nec enim ista pabulum excoquere possunt, sed & ad germinandum uis tota conuertitur, quasi detracta fluxu rapido nimij alimentu. Accidit magna ex parte fico scabies, oleæ impetigo, uiti roratio, ut & Celidæmus autor est. Fructus enim prætenuis, fluxusq; utpote crudus creatur. Remediū esse potest, uel cum nimia nutrimenti ubertas detrahitur, quemadmodum & amygdalas, & punicas castigare aliqui solent: uel cum arbor firmior, atq; robustior rediditur. Hoc enim amputatio fici ministrat, cum germina inchoat, ne sua opacitate succum percreasset. Depampinatio quoq; uitium, & prægrandium foliorum contortio per totam æstatem identidem facit, ut quidam præcipiunt. Item resectio summæ radicis, & sarmenta superiniecta, & demissa propagines, eodem proculdubio pertinent. Adde suffossiones, & ablaqueationes, quibus radices deteguntur, ut flatibus, atq; frigoribus assuescant, ut quidam præcipiunt: cauendo ne quid paxillus officiat. Hæc etenim omnia alimentū diminuunt, uiresq; augent. Contrā, illis, quæ ob alimentum inopiam deficiunt uiribus, fossio, atq; reliqua cura exhibita recreat uires, si mul & alimentum copiam præstat.

Cur fico scabies accidat. Cur item uites articulentur, gemenq; esse rorationis causam. Atq; unde oculorum obtusio accidat. Deq; fructuum morbis, crambosq; animal. Caput XIII

- 20  Vnt qui scabiem alia quoq; ratione fieri posse arbitrantur, id est cum pluuia lenta Vergilijs exorientibus fuerit. Tum enim humor uitiatu ille refermentatur, & referuescens erumpit, ut pulsula. At si copiose aqua incesserit, causa, quæ scabiem creat, eluetur. Forsitan & interdū detrusa intorsus abolet, ac desinit. Euenit per idem tempus, ut et caprificus & grossi delabantur, quod eas humor nimis subeat. Scabiem his de causis fico accedere aiunt. Vitis autem articulatio uenit, aut flatu ablatis germinibus, aut imperitia culturæ concisis, aut tertio in supinū excisis. Sic enim humor largius collectus uehementer ad germinandū excurrit, ita ut nihil queat fructificare. Rorationis gemina causa est: aut enim, quod rores statim post florem inciderint, aut quod exuperantia fuerit. Quod si ita sit, aërem dixerim in profluuium floris humidiores, uelut eruginem
- 30 procreare: exuperantia uero quasi auocare, dimouereq; alimentum uidetur. Itaq; utraq; de causa desinere adina, quæq; permanere potuerit esse exigua ratio est. Oculorum obtusio accidit, cum acriter frigent. Proximū illi est, quod agrestibus euenit, si cum germina sua festinantius inchoant, gelatio consecuta est. Flos quoq; intempestiuus ratione hac eadem perit: status etenim gelidus adhuc imbecilli occursans, totum perfundit. Arborum morbi, & uitia hæc sunt. Fructuum autem ut uuarum crambus uocitatus, hoc animal est erugini simile, nascitur quū tempore humido residente humore soliorum consecutus inuoluerit: quod etiam pampinis accidere constat. Mali, oleæ, atq; fici fructus uermiculos sentiunt. Sed mala, & ficus quoties uitium
- 40 hoc acciderit, pereunt. Oliuæ, si sub cute uermes nascantur, pereunt, quoniam penitus adimuntur: sed si ipso nucleo, augentur. Caro enim non tangitur. Prohibent illos flatus, & pluuie, quæ sunt sub arcituum. Facit enim refrigeratio, ut fugiant omnes. Aegrotat sæpe & ficus, & reliqui fructus. Causam autem (ut simpliciter loquar) aut ipsa arbor, eiusq; dispositio habet: ut cum in amygdalis humor gummosus efficitur: aut ijs attribui decet, quæ in aëre eueniunt. Oleæ arachnium quoq; innascitur humiditate quadam aëris proximi, quod fructum adimit: germinatur ramis anniculis, cum imbres secuti sint. Qua quidem germinatione fructus amittitur, quia pabulum eo fluit. Quandoquidem & fructus nondum uires cōceperit, humore autem aggregato, mox germen profilit.

De utriusque ratione celi, ventorum, & imbrium. Quodque precipuum discrimen sit in fructuum uermibus. Tunc de cerasia.

Caput XIII



Essimū & oleis, uerbis, & alijs omnibus, si dum florent, impluerit. De-
fluunt etenim flores, & fructus, causa imbecillitatis. Ad sunt & propria
uita locorum, ut apud Miletum, atque Tarentum oleis euenit. Quippe
apud Miletū, cum florent, si aer austrius, serenusque sit, erucæ uariū ge-
nus creatur: quarum altæ frondem erodunt, altæ florem. luvat contra
hoc, si æstus sit consecutus: omnes etenim dirumpunt, atque intereunt. Apud Ta-
rentum cum florent, aliās desiderio flatus erugine infestantur, aliās habitu quodam
ex mari caliginoso, crassoque floribus residente, odorem florum amittunt. Qua de cau-
sa, cum arbores maximæ, atque pulcherrimæ illic sint, fructum tamen minimū red-
dunt. Omniū singula loca sua uita habent, alia ex solo, alia ex aere, alia ex utroque.
Sed cōmunis omnium causa statibus datur, qui per æstatem seruidi, per uer frigidi
admodum ueniant, cum arbores germina, floresque suos incipiunt ædere. In totum
enim uere in ijs quoque asseri potest, excessu, defectu uel alimentis, aut æstus, aut frigo-
ris, languorem accidere. Addo etiam si flatus, & pluuiæ non tempestiue accesserint.
Accidit enim ut aliās fructus amittant, propter aquæ penuriam, ceu sici: aliās dete-
rius fructificent, cum uel putrescunt, strangulanturque nimio humore. Vel contra
plus, quam sit commodum, desiderio humoris siccescunt, cum etiam æstus ple-
rūque, tum uuas, tum oliuas, atque alios fructus adurunt. Vermiculorū multi & spe-
cie inter se differunt. Discrimen tamen præcipuum in his est, quod in alia arbore,
fructu uel alio nati, translati in aliud genus seruari nequeant: quod ratione utique fit.
Alimentum enim cuique ex propria subministratur materia. Sed peculiare, quod de
eo notatur, quem cerasiam appellant. Hunc enim, & in olea creari, & in fico parere
asseuerant. Habet ficus & suos uermiculos, & illos quoque nutrit, quos alienos re-
cepit: omnes tamen in cerasiam figurantur, & sonum ædunt paruuli stridoris. De
morbis dixisse hæc, satis est.

De corruptione plantarum: quodque arbores quedam obestare, ut & animalia
strangulantur.

Caput XV



De corruptionibus arborum primū illud significasse oportet: alias secun-
dum naturam accidere, ceu ariditates in senectā, cum imbecillitate lan-
guescunt, quasi expirent sponte, atque aboleantur: alias præter naturam
extrinsecus aduentare. Quarum alias uiolentas putari, ut si arbor præ-
cisa, aut uulnerata, mortua sit, alias minus, ut quæ propter frigora, tem-
pestates uel accidunt: atque minime omnium uiolentas esse, quas morbus attulerit: sic
cut & in animalium genere. Sunt enim istæ maxime diuturnæ, quāobrem nec præ-
ter naturā esse apparent, æque in animalibus, atque in plantis: quippe cum naturæ
interit, ut uires paulatim deficient. Est præter prædictas, alia quoque corruptio, quæ
nimia fertilitate exultat. Quippe omnino quæ large fructificant, uix sunt breuis, ut
dictum est. Exarescunt enim, quia totus humor ad fructū consumitur, quod accidit
pluribus: nam & nouellæ oleæ pereunt ex fertilitate, quod prius, quam perficiant,
alimentum incrementi sui ad fructificandum consumunt. Sed corruptionē hanc,
neque secundum naturam esse, neque extrinsecus, uiolenterque dixerim euenire: sed
ipsis arboribus imputem, quæ plus, quam modicum sit, ad fructum generandum
citantur: sic tamen ut aeris, coelique uniuersi flatus, causa quodammodo altera cōiun-
gatur. Sequitur enim talis fecunditas e blandito aere, temperieque optima condito.
Hanc igitur siue secundum naturam, siue præter naturam, siue etiam mediā quan-
dam statuere placeat, nihil refert. Arborum autem genus etiam aliquod fortasse
est, cuius

152

est, cui cori: uprio secundū naturam sponte, nec ullo pacto afflicto, sed bene uigen-
ti eueniat, ut pino, cum radices mutare in tedam fuerint. Ita enim sit ex nimietate nu-
tritionis, atq; excessus: cumq; per tedam transmittere pabulum arbores nequeant,
moriuntur. Quod proximum illi uidetur, quod animalibus euenit, quæ extra mo-
dum crassantur, atq; pinguescunt. Cum enim auram attrahere nequeant, nec ullo
pacto spiritu uti possint, propter obesitatem, condensationemq; & illa strangulan-
tur, & pinus. Quamobrem non inepte rustici uocabulum istud de pino usurpant,
Pinum enim strangulari aiunt obesitate, atq; pinguedine. Quippe omnia spiritum
desiderant aliquem, uel solutionem, uel meatuum libertatem. Ergo corruptiones
10 huiuscemodi naturales potius esse putauerim: illas autem utro nomine appellasse
conueniat, nihil refert: ut iam dictum est.

De causis corruptionis secundum naturam. Plures fieri corruptionis causas rigore, & frigoribus.

Qui statui urant, & quamobrem. Cur frigus urat: tum que loca urant frigore.

Capit. XVI



Ed de his dicendum, quæ secundū naturam eueniunt: quoniam hæc sim-
plices quædam, atq; conspicuæ sunt. Harū igitur causæ in duobus uer-
santur, id est in excessu frigoris, atq; æstus. Nam quæ ob inopiam ali-
menti eueniunt: exempli gratia, uel quia humor deest, uel quia ager ui-
10 tatus est: hæc sui generis sunt, atq; lausissime patent. Sed pauciores illæ
profecto, quas affert æstus, nisi squalores uehementes infestent: qui tamen & ipsi cæ-
tera potius necant, quam arbores. Nec nisi perpeui, diutiniq; fuerint, illas perdere
possint annuis ardoribus, qui tempestiue sub caniculam fieri soliti sunt. Plantæ solæ
nouellæ syderantur, & si quid mancum, imbecillum ue sit, neq; enim hæc possunt
sufferre. Plura uero intereū rigore, modisq; pluribus. Alias enim algoris uehemen-
tia gelat, alias flatus prægelidus ruit: non unq; etiam silente, uel certe leuiter citato spi-
ritu, nō tamen puro aëre, sed turbido, atq; caliginoso, itidem euenit. Sic enim sermē
gelatio arborum sequitur, siue cœlum serenū sit, siue non serenū. Quippe circa Ar-
cadiam, Euboiāq; cœlo sereno, uentoq; flante potius gelatur. At in Thessalia, lo-
10 cisq; proximis, aëre immoto, caliginosoq;. Cæterū flatus potius hæc affectio euenit,
cum montes singula circundantes loca niuem exceperint. Hinc enim flatus, & fri-
gora eueniunt, quæ densare, ac urere possunt. Interdū etiam sine uento aër subiens
ipse identidē facit. Quod autē referunt, minus gelari circa Euboiā atq; Bæotiā, Ia-
cu Orchomeno inundante: alterutra fortasse ratione intelligi potest, id est, aut per
euentū, quod eo tempore annus magis pluuius sit, nixq; proinde nō urgeat, atq; ua-
pores humidiores ciantur, utpote à largiore humore. Talis etenim uapor minus fri-
gidus, aut noxius est. Patuit hoc locis quibusdā, quæ tepida reddita sunt, quoniā si
20 minimum alioquin loca uicina cōcreuerint. Flatus qui adurunt locis Græciæ, eueniunt
ab occasu, ut olympias, qui tum alibi, tum apud Chalcidem luctum uocitatum face-
re assolet. In Thessalia enim, & qui ab occasu, & qui ad exortu aspirant, gelare nimis
40 rum possunt. Tempus huiusmodi afflatus maxime circa solstitiū sub diem quadra-
gesimū est, tum enim aër penitus alget. Quæ eueniunt hæc ferē sunt: causa autē (ut
in uniuersum agatur) manifesta propemodū est. Calor enim pulsus à frigore secum
humorē educit, ita ut exhaleet, diffleturq;: quod maiore ex parte ijs euenit, quæ emi-
nent supra terrā. Radices enim, partesq; imæ, indomitæ manent. Saepē etiā aliquid
ipsius caudicis, frigoris iniuriā aufugit. Cæterū radices quoq; interdū uis aggreditur
frigoris, ut arbor tota exarefat. Omīno em origo, accessusq; frigoris desuper, mox
inde uelut per inductū ad ima defluit. Quāobrem coloni, apud quos istud euenit,
bene uites operiūt, & sicos fruticosa specie reddunt: nec terræ magno cumulo opus

est, sed mediocriter feruare utiq; potest. Quidā extrema tantūmodo palmitu, & ramo-
rum sic operiūt, ut in Ponto, & in Media, tanq; aditum frigori negent. Etenim si ea
tute integant, sicut & alia quædā nuda munire consueuerūt, nullam capiunt noxā,
cum nullus aditus frigori pateat. Transit enim à summis ad ima, & radices, uis frigo-
ris. A dustio aut huiusmodi uehemens est, non secus, atq; si à solis ardore, ac mora
longinqui temporis fieret, sicut propter uim uehementissimā frigoris. Hæc em̄ hu-
morem simul & calorem amplius, frequentiusq; educit. Caua aut, & angusta, atq;
fluminibus loca apposita, & omnino quæ ab omni sileant flatu, magis laborare ra-
tio est: præsertim enim spiritus locis eiusmodi consistit, diuissimēq; moratur, itaque
efficacius agere potest. Etenim ubi nō flatus, sed præsentia, statusq; aeris hanc addu-
cit iniuriam, ut in Thessalia, & Macedonia, tum alibi, tum apud Philippos, ibi pro-
fecto loca fossionis concauæ magis laborant. Aër enim immotus gelatur, agrumq;
rotus diutius congelascere facit, ac locis supinis nulla penitus aquæ, aut aeris fieri ge-
latio potest. Motus etenim prohibet.

Cur minus firma frigore aliquando minus laborent: deq; uentis uernaculis. Caput XVII



Ed mirum sanē illud est, rationemq; desiderat, quod non ea, quæ infir-
missima sunt laborare solent, sed interdū quæ egregie robore ualent.
Oleam enim, & sicum aduri nihil mirum, cum alterius radices per sum-
ma cepitum naten, alterius nō sublimiter solum cohereant, sed etiam
raræ sint, ut frigus etiam desuper inuadere possit. Et uitis uero nō nihil
causæ sua natura, & ulcere iniuriæ cæsuræ ostendit. At oleastrū magis olea labo-
rasset, & punicam nullam cepisse iniuriam, quæ imbecilla contra frigora est (concre-
scit etenim celerrime) mirū certe id est. Quippe si gelationes, quas algores, flatuq;
faciunt, differant inter se, haud ratio abesse uideretur, ut illa potius sequacia temporis
sint, quæ infirmissima exant: nisi fortē idem in ijs quoq; euenit, quod prius dixi-
mus. Densis nim magis infidet, atq; immanet frigus, quā raris: rara autē ipsa ni-
mirum penetrat: quod et ut māli nō congelascant, causa est, quam uis imbecilles ad-
modum sunt, ut in Thessalia exitit: facit etenim raritas arboris, ut frigus transeat,
nec aliqua parte arceatur. Quod autem diu nō immoratur, nec uniuersum conten-
dit, efficax id esse non potest: sicut etiam de fulmine intelligere licet. Porro alterutrū
opus est, aut nihil sibi admittant uim frigoris, ut quæ densa, & ualida sunt (talis em̄
pirus, & omne genus agreste, atq; etiam magis, quā steriles, ceu ulmus, & ostrya)
aut cum admiserint, statim transmittant, expellantq;, nec usquam retineant. Causa
eorum petenda hinc est. Impetus autem flatuum, loca quæ inuaferit, perfundit, ac
diluit, quasi flumen irrumperet. Quemadmodū cum pestilens incesserit lues, quæ
propter sæpe quæ tangunt, ac proxima sunt, euadunt indomita, & adeo uis illa ra-
pax, celeriter plerunq; transcurrit, ut gemmas eiusdē palmitis partim congelet, par-
tim incolumes relinquat. Sæpe etiam uite tota à niue abscondita, quod sit locis præ-
gelidis, si postremos palmites nudos excipiat, hosce urit, ac inde ad radices pertran-
sit. Flatus in Ponto congelant, cum coelo sereno, ac fudo quædā in modum squama-
rum perferuntur: quæ quidem ampliuscula sunt, dumq; feruntur admodū patent,
dilapsa minime durant. Quare constat, quod aliqua in aëre gelatio, more pruinae
consistit. Cum igitur aër concrescens flatu percitus occurrat, squamasq; illas dedu-
cit, gelatus ratione consequitur. Flatus autem locis natura frigidis quidam uerna-
culi sunt, ut in Ponto, & Thracia: tepidioribus uero extrinsecus ueniunt, ceu Eu-
boæ. Natura quoq; planē indicat ipsa, non flatu aliquo stabili, uniuersq;, sed te-
mere passim uagante iniuriam illam afferri. Alter enim nunq; intracta euadere
quæ proxima essent. Igitur flatibus eam quoq; proprietatem possumus adnotare.

De cor.

De corruptione & gelu.

Caput XVIII



Elucidium humidamnosum admodum est, cum arbores ablaqueatas, dispoliatasq; cespite occupauerit, sed maxime si adsit aqua restagnans. Quippe si diutius frigus durauerit, radices infirmas dispoliatasq; subiens penitus congelabit. Nam etsi omnino solum agiatum inuenerit, uehementius offendet. Penetrat enim liberius, quod rarum est: resistit ualentius, quod fuerit stercoreatū. Stercus enim utpote calidum iuuat. Quin & si niue delapsa, soloq; fermentato frigus, pruina, geluq; successerit, minus æque ratione utiq; congelabitur. Raritas enim facit, ut seges facilius sentiat. Sed perniciosius gelicidiū terræ arboribus euenit, quàm aque. Magis enim radices id tangere potest. Damnosius uero utrunq; redditur, cum pluuia & gelu misceantur inter se uicibus, sæpeq; alternantur. Hac etenim ratione uires omnes tollunt, quod nō æque glaciæ perpetua euenit, præterq; si diutissime infesta uerint. Calor enim conclusus, coarctatusq; assidue satis tuetur. Omīno damnosior glaciæ illa est, quæ subtus inuadit agrū tenuem, solum, siticulo sumq;. Haud enim calore potest æque resolui, & ulterius irrepit, atq; radices attingit. Euenit autem, ut germinū congelatio, & omnino superiorum partū sæpenumero fiat: radicum perraro, & apud paucos. Ratio, quod radices terram protegentem, & frigus arcentem obtineant, ad quā etiam calor compellitur. Interdum nec superiora ipsa intereūt, sed potius leuiter uruntur. Atq; hæc nō protinus auferre oportet. Enim uero sæpe Vere ineunte illa quoq; germinare incipiunt. Quippe, quæ exaruisse uisa sunt, humescere rursus, reddiq; uiridia possunt. Qua de causa mirandum non est, si cubi ista euenierit, ut olea tum fronde, tum toto corpore arefacta apparens posset regerminare. Haud enim arefactio fuit, sed esse quedam apparuit ex siccitate, atq; calore, quæ uim genitalem frondis non attingit. Atq; etiam minus germinis, et rami. Idem uel alijs quibusdam euenerat, sed consuetaneum maxime illis, quæ natura calida sunt, frondemq; gerunt carnosam. Imbecilla enim atq; gracilia facile abolefcunt, ceu myrtus: hæc enim celerissime uritur, quia & ipsi ramuli tenues, tenelliq; sunt, & tota arbor minus calida est, & proinde ad gelu facilima. Laurus etiam quamuis rara, tamen resistit, perduratq; sui caloris potentia. Punica uero, & ficus rara, humidatq;, minusq; calidæ sunt.

Cur arborum, quæ congelauerint, germinatio uelox sit. Cur item nix non gelet, pruina gelet. Caput XIX



Rborum quæ congelauerint, germinatio uelox, frequensq; est: sit enim, ut radix corroboretur, collectuq; reficiatur alimentī anniculi, quod haud dispensatum, transmissumq; est. Item alimentum primum, quod non effuse, ualenterq; fuerit distributū, consumi tunc ad germen citandum, ratio est. Itaq; incrementum, atq; fructificatio celeriter ueniunt. Hoc igitur nihil dubium est. Quod autem quidā mirant̃ niuem gelare nequire, pruina autem posse, quæ niue infirmior est, nulla ratione admirari debemus. Primum, quod nix non omnibus partibus residet, sed à palmītibus aut germinibus statim liquefcens delabitur: & pruina hæc diu inherendo exurit, tum etiam habitus palmītis causam habere uidetur: quippe cum nix ante, quàm germen prodierit, cadat: pruina uero ubi proxime prodijt, cum infirmissimū est. Interdum etiam cum turgescit, quo tempore nō minus fragile est. Iam enim humescit, rarefcitq;. Ad hæc, pruina niue tenuior est: itaq; ratione utraq; uehementius congelatur. Sed nec illo modo nix residere palmītibus possit, nisi uiris tota celatur: quod si euenierit, calor à niue undiq; integente concludetur, frigusq; foras uersus arcebitur. Quemadmodū à terra fieri solet, in totum uim quoq; incidendi pruina, quā nix efficaciorē sortiri putatur: & noualia proinde

meliorescere pruina, existimant. Glebas enim diffundi subeunte, mordenteq, quoniam constantior est. Tenuior nive propterea est, quia nix ex nube consistit, & uelut spuma est quadam, spiritum in se admodum continens. Ipsa autem pruina per se constat tenuiori quodam aëre, humoreq, condita est. Horum igitur causas ita interpretari censendum.

Utrum gelatio aëris crassitudine accidat, an tenuitate. Hinc rationes ad utranq, pericim.

Caput XX



Elatio uero utrum crassitate aëris, an tenuitate conficiatur: & si ratione utraq, utra magis quaerendū, quis profectō existimet. Nam si aër nunquam geletur coelo minus sereno, nullo pacto gelationis causam habere aëris crassitudo appareat. Quippe serenus, ac sudus aër, tenuior, & proinde dissolutioni habilior est. Gelatio autem non nisi subeunte illo quod incidat, fieri possit. Item refrigerat facilius, & omnino sentit celerius, qui tenuis est. Hinc enim & aqua præcælescita refrigerat, gelaturq, celerius, quia ex calore tenuior facta est. Confirmare hoc idem & loca putantur, quæ suda, & subdiu alia uocitamus: plus enim, ac sæpius in his congelatur. Nonnusquam etiam parui interualli discrimine, ut apud Corinthum, Cranium, & Olympium: quamuis uicina inter se sint, diræ tamen serenitates fieri circa Craniū solent, ita, ut & plantarum affectione, & hominis sensu res percipi possit. Alibi longiusculo interuallo idem animaduertimus. Omnino loca, quæ antè nunq, glacie rigescebant, propter aëris crassitudinem, nunc congelascunt aëre cōmutato, ut apud Larissam Thessaliæ. Prius enim, quod aqua stagnante, pigraq, campus esset repletus, aër crassius, & calidior erat: postea uero aquaeducta, colligiq, prohibita, aër frigidior est redditus, & gelationes plures secutæ sunt. Cuius rei argumentum afferunt, quod tunc oleæ cum alibi, tum in ipsa urbe magnæ, & optimæ aderant, nunc autem nusquam habentur: et uites quoq, tunc nunq, congelabantur, nunc per sæpe. Aqua autem non semper agrum reddi frigidiorē, sed etiam ijs, quæ prius iam diximus: argumentum, quod circa euenerat. Hæc enim tepidior nunc esse putatur, quia Ebrus amnis propius. His de causis aër tenuis gelationi aptior esse appareat: at illis contrā, crassior potius habilior esse creditur. Est enim stabilior, atq, immotior: qui autem est immotus, facilius congelatur. Item styges locis istiusmodi fiunt, quæ maxime corpora subeunt. Haud enim quisquam uirare potest, etiam si in lecto contactus admodum iaceat. Confirmat etiam illud, quod montibus minus, quam planis gelatur. Aër enim tenuior, atq, agilior ubi est, fidem ijs quoq, loca singula faciunt. Quippe cum circa Cithrum Thessaliæ maxime ferè congelatur, qui locus cauius, ac riguius est: & apud Philippos antè magis congelabatur, sed nunc quod aquam ager sorbuerit, atq, ita maiore ex parte resiccatus sit, totusq, excoli inceperit, multo minus rigescit. At qui tenuior ager redditus est, et quia absumpta fuerit aqua, & quia ex cultus sit ager (incultus enim, neglectusq, frigidior) & aërem habet crassiorē. Neq, enim solis eque sentit ardorem, neq, perflatur spiritibus propter materiam: tum etiam aquas stagnantes, pigrasq, locus ille complures habet: quod idem, & apud Crenides olim fuisse proditum, cum Thraces eum locum inhabitabant. Totus etenim campus scatebat arboribus, aquisq, permedebat. Cum igitur nunc magis, quam antè, locis his congeletur, aquarum copia resiccata, non aëris tenuitati causa tribuenda est, ut placet quibusdā. Tales in utranq, partem rationes possunt afferri: forsitan quia utroq, modo fieri gelatio potest. Id enim ex prædictis patet. Sed differt etiam locus à loco, quod plus crassetur, aut attenuetur. Aquosus enim, turbulentusq, nō eque efficax est, nec rursus qui prætenuis est: agilis enim minusq, stabilis. Gelatio autem spacio confis

conficitur temporis. Ad hæc qualitatem quandam illis, quæ sequantur, toties statui cæli, & quicquid extrinsecus ueniat, inelle oportet. Nam si mutationes, remissionesq; crebris inter se uicibus alternentur, nulla possit fieri gelatio: sed (quoad summam referre liceat) celerius affici potest, qui tenuior est. Frigefactus tamen qui crassior, frigidior redditur, sicuti & calidior. Caliditas enim, aut frigiditas in eo firmius continetur, quemadmodum & in cæteris, quæ callosiora, corpulentioraq; sunt. Quamobrem sicubi non dilutus, sed crassus simul, & siccus sit, non absq; ratione hic facilius congelascet. Sed de his satis.

De perniciæ arborum per æstus nimios: deq; uolentis affectionibus, & quæ hominis sunt iniuriæ. Tum quomodo steruus exitio sit.

Caput XXI



Æstus autē nimius plantas, & omnino nouellas arbores perdit ratione infirmitatis: sicut etiam illa, quibus uita annua data est. At uero quæ ra-
dices conceperint, & iam faciæ grandiusculæ sint, has nihil interimere
potest, quia subire, atque uitalem originem aque attingere nequeat.
Sed si quid offendere possit, germina, fructusq; adurit: quippe in to-
tum frigiditas alienior à natura forsitan est. Quoad enim loqui simplicius sit, omnia
excessu rerum, quæ uitam tuentur, intereunt. Enimuero inter agros, alius ex ni-
mia pinguedine sterilescit, alius ex immodica macie. Et aer quoque impedimento
est, cum in alterutram partem modus defuerit. Necnon & aquæ inopia, multitu-
do uel officit. Nam & stabilis aqua, si arboris magnitudinem excesserit, perdet: ut
cum imbres percrebuerunt, aut loca inundationibus concreuerunt, quod etiam
circa Pheneum euenerat. Vbi tamen aqua possit effluere, arbores melius tolerant,
quamuis alte ingurgitatæ. Iuuant enim motus, ut nunquam uires deliciantur con-
tra præsentem alluuiem. Hæc illis de causis fieri arbitrandum. Sequitur ut de ui-
olentis affectionibus disseramus: & si quæ aliæ non aëre aut natura, sed hominis
iniuriæ ueniant, has quoque adijciamus, ut eam, quam corticis in orbem detractio,
aut uulnus aliquod inerat: quæq; appositis quibusdam exulcet, ceu de putami-
nibus fabarum narratur, & quicquid eiusmodi: ac primum de fabis. Enimuero
fabarum putamina radiobus, aut germinibus apposita, uitam penitus tollunt: non
tamen omnibus, sed ijs quæ nuper profluerent, uelut imbecillioribus. Quod ea
de causa hæc facere possunt, quia sua duritiâ, siccitateq; alimentum, parum tra-
hendo, partim arcendo auferunt: alimento etenim destituta prius moriuntur.
Sed hæc, & quicquid generis eiusdem, tanquam germinationi aduersa intermūt.
Quædam autem ex eorum numero, quæ conueniunt, iuuareq; possunt, exitio
aliquando sunt, si immodica, aut uelimentiora, aut minus tempestiua exhibean-
tur: ut steruus si crebrius, uel effusius, uel uehementius, ceu sex pellium, dispo-
natur. Hæc enim propè omnia posse interire creduntur, si immoderata sit, atque
indomita. Periculum idem impendit, & si calidum, aut siccum, aut omnino ue-
hementius, minusq; plantæ conueniens steruus fundatur. Sunt enim (quemadmo-
dum diximus) quæ singulis sationibus congruant: nec idem steruus commune
omnium est, modo aquæ: quanquam ea quoq; radices, si multitudine inebrians
putrefacit: longeq; magis si plantæ nouellæ, nec nimium aquæ cupientes sint, ceu
cupressus, & reliquæ siccæ, aut si quis non tempestiue, uel ijs, uel purgatione, so-
sione uel utitur. Omnia nanque dant causam emoriendi. Temporis au-
tem singulis horis, cum ad hæc ipsa, tum ad sequentia, deus au-
tor est. Corruptiones, quæ per alimenti excessum,
defectum uel, aut per intempestiuitatem
operis eueniant, hæc sunt.

De perniciē, quæ uicinatē iuxta satorum, aut contagione sponte se associantium affertur.
Item quæ herbe alias interumant: quodq; oleum, & pix, & pingue
plantas excutit.

Caput XXII



Væ autem uicinatē iuxta satorum, aut cōtagione sponte se associantium conferunt, has alimenti prorsus rapina solet committere, eoq; celerius, quo ualidiora, pluraq; sint, quæ infestant, ceu quæ syluestria sunt, quæ radice numerosa coherent, quæ multo indigent alimento, quæ abscondere, amplecti, strangulare, atq; irrepere apta sunt, ut edera. Nam uiscum quoq; & omnino quæ aliquā plantam pro sede capiūt, interimere possunt. Edera, & aurio, nimio pabuli desiderio, falsugineq; sibi ingenta arbores necant: sed aurio perniciosior est, quod plus habet falsuginis. Necesse alijs quoq; ab alijs accidunt propriæ, ceu in minoribus patet. Quippe orobancha uocata eruum necat amplexu, compressuq; suo: & limodorū, scenumgræcum interimit protinus radici adnascens: & alia cladem alijs inferunt, ut quæ cum singulis frugibus simul proveniūt, ceu lolium, & auena, tritico atq; hordeo, & lappalenti, & alia alijs. Omnia tamen idcirco interimunt, quia pabulum tollunt, tam quod terra ministrat, quàm quod à sole, & aëre ueniat, atq; eorum quidem ratio manifesta ferè est. Oleum autem, & pix, atq; pingue (nam ea quoq; necandi uim habēt, & maxime contra plantas nouellas, quare tangi eas minime sinunt, sed tutissime circumdant uiminibus) cauam illam habēt, quod sua caliditate, atq; tenuitate labili longe effunduntur, & condensant, aduruntq; corticem. Argumentum, quod cortex dure scit atq; detrahitur, quo laborante, peridurescenq; alimentum transire nō potest. Vim adurendi longe, subeundiq; haberi, argumento illud etiā est, quod qui agrum syluestrem, in aruorum formam traducūt, radicū residuis oleum, aut picem infundunt, aut adipe ungunt, quæ omnino afficiant, præsertim pix, utpote quæ ualidissima est.

De corruptionibus, quæ aut ictu, aut aliquarum partium detractione, aut diminutione, aut omnino sublatione fiunt: quæ præterea plagam tollerant, aut non tollerant.

Hinc quæ dissectis, scissisq; cōtanti.

Caput XXIII



Estant corruptiones, quæ uolentæ appellantur, quæ fieri solent ictu, aut detractione partium aliquarū, aut dimutilatione, aut omnino sublatione. Quædam enim ubi altius uulnus ceperint, intereunt, siccitatis imbecillitatisq; suæ ratione. Palma uulnerata quoq; in cerebro, perit. Vis enim uitalis, germinatrixq; sita in eo est. Quamobrè cum id rescissum, aut omnino alteratum sit, intrusus aeris, caloriscq; alieni corrūpitur, partisq; superioris corruptio mox ad ima descendit. Huius ergo peculiaris quædam natura est, ut & pars conspici possit uitæ præstitrix. Sed sunt, quæ non plagam tolerant solum, sed etiā lignis detractis caudici, indomita maneant, ut quæ humida sunt, probeq; germinant, ceu ulmus, platanus: pars maior eorum, quæ iuxta aquas uiuiscunt. Pinus tecta quoque detracta seruari potest: huic etiā pinguedo promagno habetur. Sed hæc omnia, ceteraq; non nisi bene adulta sufferre possunt, & hinc quamuis putruerint, seruari tamen, ac uiuere queunt. Nam & pinum haud semper tedificare consueuere, sed cum uiget, ætatq; maior est. Caret enim tecta nouella, quæ humorem non excoquit, neq; aggregat: sed totum ad germina, incrementaq; altitudinis absument. Statim enim ac dilatarsi inceperit, uis illa, & habitudo tectæ uidetur consequi. Quæ autem uulnerata, aut castigata, meliora fertioraq; euadunt, hæc quoq; posse sufferre certū est plagam. Igitur & discissionem hæc tolerant, sed uitis, ficus, punica, olea, amygdala, & malus, non ea solum, sed etiā fissionem caudicis sustinent. Cetera omnia fixo caudice pereunt. Etenim quæ ita uulnerata,

rata, tilla ue rursus comprimuntur, & coeunt, hæc uelut ad sanitatem reducta uiuunt, non sicut illa nihil perflua deficiunt. Causam talis tolerantie humor, & naturalis resolutio dant. Quippe alimentum, quantum abunde sit, capiunt: neque resiccantur, neque à frigore quicquam læduntur fissuræ causa. Quod si ita est, hinc ea quæ ex urbanorum genere hillionem tolerant, ceu ficus, olea, amygdala, posse id sustinere credendum, quod partes disiectas celerissime comprimant, coagmententq. Vnde & difficile ista scinduntur, quia tenaci compage constant. Talis enim succus ex ficorum, & oleæ pinguiusculus ille humor, & quisque pinguedinem fortiens. Vitis quoque materies eiusdem generis est. Argumentum
10 quod palmites perfici, & medulla exempta celeriter coeunt, atque etiam magis arundo; hæc enim sponte coit, atque concorporatur. Pîrum quoque scindi quidam dixere. Sed de his cogitandum.

De corticis detractione in orbem: deq; medulla exempta, ac decacuminatione, mutilationeq; plantarum. Capit. XXIIII



Orticis autem in orbem detractio communis omnium, aut certe plurimorum interitus est, de qua prius satis retulimus. Seu enim pars arborum uitalis hæc sit (ut placet quibusdam) ratione optima sequetur interitus: seu hæc condensata arborem contagione deprauet totam, ratione id quoque eueniet. Medulla autem aliquatenus exempta, nunquam arbos emoritur: at si tota detracta sit, moriendum omnino est, ut Archades aiunt. Nec pinus aut abies seruari amplius potest. Causam haud temere illam putaueris, quod medulla pars humidissima, & uitalis præcipue adest: cuius rei argumentum, quod materies, quæ medulla uiuata non est, peruertitur, recuraturq; iam conlecta, usque dum penitus resiccetur. Quapropter abietis, pinicq; materiem filo medio findunt, nec quicquam medullæ relinquunt. Itaq; si hæc aliquatenus detrahatur, nihil absurdum arborem posse durare: sicut etiam, si cortex aliquatenus detrahatur: sed si tota dematur, exarefeat arbos necesse est, ceu destituta uitali quodam principio, aut suo natiuo humore. Decacuminationis, di-
30 mutilationisq; ratio in paucis cogitanda est. Pauca enim sunt, quæ mori ea de causa possunt: quippe decacuminatione abies, pinus, larix, & palma duntaxat pereunt. Quidam & cedrum, & cupressum annumerant. Vocant decacuminationes, cum detracta coma, arboris extremitas præcidetur. Quod non sine ratione arbores prædictas interimit, cum siccæ natura sint, & meatu condantur rectissimo, & unica radice inhaereant. Vulnus enim inest, facitq; ut & frigus, & ardor, facilius subeat: præsertim cum undique insertur, & ex proceritate, atque meatuum rectitudine, non pigre ad radices quoque deueniat. Ita multis de causis arbores istæ decacuminate intereunt. Negata his omnibus à natura nepotum procreatio est, tam siccitate radices, quàm quod impetu suo toto sursum contendant,
40 atque etiam quia radice singulari nitantur, alteq; descendant. Nusquam enim aliamoniæ quæquam superfluit, nec uero dimotum aliorum se uertit. Itaque sit, ut nullum sit exurgendæ prolis initium. Quando igitur hæc omnia insunt, in his singulis ferme arboribus corruptionem illam omnino sectari necesse est. Dimutilatione autem paucissima pereunt. Sola enim uitis nouella maxime interit, & si quid tenellum, imbecillum, atque rectissimum sit. Hæc enim istis moriendi causam committunt. Sed plura certe deteriora redduntur. Amygdala enim amara efficitur, & punica durior: & alia quædam mutari planè uidemus. Ratio explicata est, quod principio alterato, finis quoq; alteratio sequitur.

De animalium depaſtione, & corruptione ſeminum. Item plurimum ad ſeminum uitam tuendam locum reſerre.

Caput XXXV



Vin & depaſtio animalium damnoſa admodum eſt, quod dum ger-
men cædit ac detrahit, ſimul quoque adurit. Fit enim hinc, ut plantæ
gravius infeſtentur. Peculiare, quod de palma, & picea proditur,
has ſcilicet dimutilatione non interire, ſed ſterileſcere. Rationem ſu-
perioribus proximam eſſe exiſtimandum, quod principio alterato,
imbecillioriq; reddito, uires deſiciunt: & fructus idcirco uipote ultimus, creati mi-
nime omnium poteſt. Præterea iam germen adeſt, & quali peracta res eſt fructus:
quod autem eſt futurum imbecillius illo eſt, quod peractum iam eſt. Sed his tan- 10
tummodo iſtud euenit, quia hæc pauciſera ſunt, pigreſq; fructificant, ratione quid-
dem noſtratis regionis. Suis etenim locis ſteriles forſiſſe non ſunt. Nec mirum
ſi qua parte deſiſa, non totæ deſiciant. Principium autem plurimum poſſe, tamen ſi
multiplicatione iam liquet, tamen germina quoq; ipſa conſirmant, cum aſſictan-
tur, tam in alijs, quàm uel maxime in uitium genere. Quippe exeiſis primis germi-
nibus, nil amplius germinatur, ſed protinus ipſe germinandi eſſluxus ceſſat, atque
extinguitur, quaſi uitis excecata, & manca quodammodo fuerit. Principium e-
nim & ualidiſſimum, & infirmiſſimum eſt, non tamen modo eodem. Nam uitem
fertilem admodum germinibus eſſe, germinationes ſequentis temporis latiffime
inducant. Sunt & ſeminum corruptiones, eorum ſcilicet, quæ non ſecundum na- 20
turam ſeruntur, arborum pariter & frumentorum, & omnium cæterorum, quo-
rum & tempora certa ſunt. Viunt etenim omnia ad quoddam tempus, deinde
intereunt. Viuere inquam non actu, ſed potentia. Pereunt naturali ſorte, cum
exiccata penitus ſint, & calor, humorq; totus exactus fuerit. Reliqui omnes ex-
teritis, uel inuita natura eueniunt: ut cum innatis beſtiolis exeduntur, aut cum hu-
meſcunt, uel aliter commutantur. Quamobrem, quæ multiplici continentur ua-
gina, aut diuerſa tunica uestiuntur, aut pingui, uel acria, uel amara, uel oſſea, &
ſicciffima ſunt, hæc omnia diu perdurant, reliqua celeriter uitiantur. Alia enim
inter ſe ſeruefacta abolentur, ceu frumenta & legumina: alia ex aëre, alijsq; ex-
trinſecus rationibus humefacta, ut olera, & quæ coronaria uocamus. Glabran- 30
tur enim quodammodo, ut animalia gignant, quibus pereant. Quæ inter legumi-
na excoqui faciliſſi poſſunt, celerius pereunt, uipote dulciora. Partus enim beſtio-
larum cauſam dulcedo miniſtrat: tum etiam ſua imbecillitate deprauantur. & quia
iam uelut finem ſuum attigerint. Frumentum quoque celerius deſicit, quod dul-
cius eſt. Locus tamen plurimum ad perennitatem ſeminum reſert, ſi ſiccus ac frigidi-
us eſt. Diutius enim locis eiufmodi durant, ut in Media, & Paphlagonia: & in iſſis
ſeruabiliſſora, quæ locis editioribus recondita fuerint. Pari modo, & ſiquis eiufmo-
di locus alius ſit, diu ſeruabit: quippe ambo illa arcantur, quæ ſolent corruppe-
re, calor, & humor. Nam & terra, quam frumentis reſpergunt, identidem facit.
Siccatur enim atque refrigerat. Arborum enim ſemina, quæ mollia, carnoſaq; ſunt, 40
ceu amygdala, nux, glans, putamine ambiente ſeruantur: quæ ſicca, lignoſaq;
ſunt, ut uinaceum, & eiufmodi, ſuis etiam utribus reſiſtere queunt. Verum (ut ſim-
plici ratione loquar) omnia diuturniora redduntur putaminis circundantis præſi-
dio, nam & uinaceum, & granum ſiculneum, & reliqua generis eiufdem, tegu-
mentis ſuis exuta longe amplius reſecantur. Sed omnium iſtiusmodi maxime illa
permanent, quæ nucleo continentur, ceu ſemen oleæ: & quicquid ligni, aut oſſis
ſpeciem gerit, ut ſemen palmar, & cnic, & reliqua cnicel generis: denſa enim hæc
omnia ſunt, proreſcuntq; munita tutiſſime. Semen autem illud interius alijs abſolu-
tum, conſpectumq; ineſt, alijs indiſcretum atq; incertum, ut palmulis,

THEOPHRASTI DE CAUSIS

PLANTARVM LIBER SEXTVS.

Quid sit sapor: quid odor. Item saporum genera, dulce, pingue, austrium, acerbum, acris, salsum, amarum, acidum. Vtrum affectionibus sensuum, an figuris saporum determinetur. Platonis determinatio de saporibus.

Caput I

DE SAPORE atque odore, quoniam ea quoque plantis conueniunt, tentandum pari ratione, atque de cæteris, disputare, ac reddere, quæ, quibusq; de causis generibus eueniant singulis. Ergo quænam sit generis utriusq; natura, amboq; mixta quodammodo esse, pro ratione alibi determinatum a nobis abunde est. Sapor enim partis sicæ, terrenæq; in humore demissio est, uel partis sicæ per humorem ex ui caloris percolatio: quod fortè nihilo differt. Odor autem est partis sicæ,apidæ, indiaphanæ, hoc est translucido corpore demissio. Id enim aëris, atque aquæ commune est. Eadem fermè saporis & odoris affectio est, sed non in eisdem utrunq; proficitur. Hæc igitur iacent hunc in modum determinata. Saporum autem genera numero quidem complecti facile est: exempli gratia, dulcis, pinguis, austrius, acerbus, acris, salsus, amarus, acidus. Sed naturam explicare cuiusque difficile: quippe primum illud ipsum discutiendum: Vtrum affectionibus sensuum reddenda ratio sit, an figuris, quibus singuli consent, ut Democritus censet: ni fortè figuræ etiam indigi ad potentias quodammodo possint, illarumq; gratia subiungantur: an alio modo, si quis extra prædictos alius esse possit. A affectionibus sensuum, inquam, ut si quis dulcem, qui humorem linguæ confertum discernat, dixerit esse, aut saporem, qui leniat, aut saporem tenuem, uel leuem. Aerbum, qui rescicit, aut leuiter denset eundem illum humorem. Acrem, qui deliquendi, aut mordendi uim habeat, aut qui calorem humoris consorti, loco superno excernit, aut saporem denique uim adustoriam, uel calefactoriam sortientem. Salsum, qui assiccet, & mordeat. Amarum, qui humorem corrumpit, aut coagit, aut mordet, aut saporem denique asperum, uel maxime asperum. Austrium, qui abstergere potest, sensum, aut sensus humorem, aut humorem per summa residentem mordet, uel coagit, uel assiccet: aut omnino acerbiter leuem atq; mollissimam. Aut si (quem admodum Plato) uirium differentias in uniuersum reddideris, aggregandis scilicet disgregandiq; ratione, addito leuitatis, asperitatis uel usu, generatimq; digesseris: ut acerba, quæ uenas adurunt, assiccant, atque exasperant. Austera, quæ his magis possunt abstergere atque eluere quicquid linguæ inhaereat. Amara, quæ extra humorem detergunt, ut aliquid ipsius quoq; naturæ absumerent, seu nitrum. Salsa, quæ temperatiora his sunt, minusq; abstergunt, & amaritudinis uacant asperitate, gratiaq; magis palato hominis sunt. Actia, quæ oris calore seruata mutuo seruafaciunt, leuigataq; sursum leuitate sua feruntur ad sensus capitis, atque incidere possunt. Acidia, quæ putredine attenuata iam fuerint, uenasq; subeant angustas, & agitent, fermentent, spumam excitent, atq; attrahere possint. Quæ autè omnibus prædictis aduersa passio, seu affectio sit, hæc dulcedini conuenit, cum scilicet sapor leniter mulcet, & mitigat, quæ asperitate horrescunt. Aggregat hæc affectio, & componit, quæ diffusa sunt præter naturam: contra, quæ consiliunt, duratq; sunt, laxat, & discutit. Ita Plato ratione potentia saporis determinat.

Figuram singulis saporibus reddi à Democrito: tum contra Democriti sententiam de saporibus.

Caput 11



Democritus figuram singulis reddit, ac dulcem esse saporem, qui rotundus, ampliusque est. Acerbum, qui figura magna perficitur. Asperum, qui multus angulis, minimeque orbiculatus est. Acutum (ut nomen indicat ipsum) qui mole constat acuta, & nucis pineæ speciem gerit, & incuruus, tenuis, nulloque orbe conglobatus est. Acrem, qui orbiculatus, tenuis, angularis, atque incuruus est. Salsum, qui angularis, magnus, distortusque est, & crunibus paribus constat. Amarum, qui rotundus, levis, atque distortus parua cum magnitudine est. Pinguem, qui tenuis, rotundus, paruiusque est. Igitur modi tantum inter se distant: sed forte (ut dictum est) ratio quoque figurarum saporum vires secuta est, atque illarum gratia excogitata. Ipsarum etenim uirium causas hunc in modum satis assignasse existimant, quibus scilicet de causis sapor alius alstringit, assiccit, atque coagit: alius lenit, æquat, atque componit: alius excernit, diffunditque, aut aliquid eiusmodi facit. Illud tamen ab his fortasse quis exigeret, ut subiectum quoque aliqua cum qualitate reddatur. Non enim solum quod agit, uerumetiam, quod afficitur, nosse oportet: præsertim si non idem sapor percipiatur ab omnibus, ut etiam Democritus ait. Quippe nihil prohibet, ut quod homini dulce est, id amarum aliqua ex cæteris animalibus sentiant. Constat enim quod subiectum sensus affectum qualitate alia est, quando figura saporis cum eadem sit, non tamen idem agere in omnibus possit. Quod si ita est, subiectorum quoque similitudinem pro causa accepisse par est. Quamobrem disserere de his profectò debemus. Ad hæc argumento est, haud unam potentiam esse figuræ eiusdem, quod contraria in alio, atque alio agere potest. Enimvero singula in suam uerere potestatem nequire, non æque mirum: sicut neque ignem omnia minus uerere posse miramur. At si aduersis inter se qualitatibus afficiat, hoc certe, quamobrem ita sit, explicari magis desiderat: quamquam illius quoque rationem nonnullam reddidi oporteat. Igitur de igne si qua perurere nequeat, aut de aqua, si qua humefacere minus ualeat, haud ægre ratio reddi potest: sed si contrarium agerent, prorsus maiorem parerent quæstionem. Ergo figura autoribus de his omnibus assignanda est. Qui autem per vires saporum rationem exponere maluerit, quale subiectum sit sensus uniuscuiusque, dicant duntaxat necesse est: quippe illius quoque naturam, atque habitum nosse operæ precium est. Quandoquidem & qualiter pars corporis potestatem sentiendi obtineat: forsitan & cum ex pluribus aliquam unum constiterit, cuiusque illorum uim, atque substantiam haudquaquam latere oportet. Absurdum uel illud autoribus figurarum occurrat, ut quæ similia inter se sunt, uim diuersam agendi ex magnitudine, paruitate uel habeant: uiribus enim non formæ, sed molis uiolentiam, & omnino plures, minus uel fortasse aliquis tribuet: at non itidem posse, aut agere forma communis arbitrari, ratio nulla est. Nam si figura consimili sunt, eandem habeant rationem necesse est: quod uel in cæteris patet. Triangulus enim pedaneus, & centipedaneus, æque treis habent æquales duobus rectis: & quadratum quoque pedaneum, & centipedaneum quaternis angulis rectis pariter constant. Quamobrem quæ ex his prouenirent, quantitate quidem differrent, sed forma nihilo essent diuersa: sed enim vires, quæ figuris, aut formis reddantur plures, atque pluribus excident quæstiones.

Saporem

saporem, odoremq; non nisi permissione efficiuntur tribus generibus, plâis scilicet et animalibus, et ijs, quæ arte commiscetur, et saporibus, et odoribus uersari.

Capit III



Apo^{re}m autē & odorem permissione quodāmodo effici, hinc etiā constant. Nihil enim simplicium numero saporem, aut odore habere uidetur, nisi misturā recipiat, ut aer, uel ignis, uel aqua. Nam & aqua per se insipida est. Quæ de causâ ueteres auctores dixere, talem esse aquam, qualis terra, per quam fluit. Et mare uero, & quæ nitroſæ, atq; putidæ, & acidæ aquæ sunt, admittance nō uacant quo sit, ut odor præcipue mare comitetur. Terra, & lapis nullus saporis sunt, nisi aliquam istiusmodi misturam ca^upellant. quanquam terra potius habere sapore appareat: ut quæ adusta, & cinerea est, amara sentitur, & argilla dulcis: nec ratio deest, quoniam permissione partis terrenæ sapor exulteret. Metalla uero, & lapidum genera nonnulla nō modo saporem, uerum etiā odorem habere certum est. Igitur hæc omnia missione quadam, alterationeq; tum sapida, tum olida effici solent. Quippe cinis per uestionem alteratus est: & omnino, quæ igne domantur, saporem quendā recipiunt, uel simplicia, uel commista humoribus. Naturam igitur saporis, humorisq; talem esse, & ante, & nunc explicatum est. Sed cum tribus generibus odores, saporisq; uersantur, id est plâis, animalibus, atq; ijs, quæ arte commiscetur, paranturq;, aut etiā sponte alterantur, alijs in melius, alijs in deterius, ceu quæ putrescunt: de his omnibus disputare communi^us est, quā res, de qua agitur desideret. Quocirca de naturalibus differendū in primis. Omnium namq; principium natura est: atq; eorum exponendi potius illi sunt, qui in simplicibus, ac omnino rebus inanimalibus inesse uidentur: & qui in genere plantarum, fructuumq; habentur. Nam id quoq; prius animalū genere statui debet. Tum etiā nobis studium cōtemplandi de his in præsentia est, uelut hoc prioribus rationibus sit annexum, atq; continuum. Ergo humorum saporibus, qui in gremio terræ consistunt (hi namq; certissimi habentur) ceu acuti, & reliqui, ob eandem quodāmodo causas, aut proximas, quibus in plantis prouenire nihil dubiū est: non tamen numero pares, neq; similes illis sunt, sed turbidiores: quoniam non eodem modo, neq; proximo excoquuntur. Numero autē illis comparari nō possunt, quia fructuū sapore permulti, atq; dissimiles sunt. Et quidam nullatenus in terrenis illis notescunt, ceu austerus, acris, & alij pleriq;: nisi quis permissionem, confusionemq; cæterorum hosce dixerit, genere autem esse eosdem. Quod si ita est, innumeri prorsus saporibus fieri possint. Missio enim rationes innumere sunt, atq; etiā quod plus, minus uel adsit, differentiā faciet. Itaq; plures sunt, qui generis habent societate, ceu austeri, pingues, amari, dulces. Quapropter ueteres naturæ interpretes, saporibus esse innumeros asseruerūt: sicut & rerum mistarum numerū certum nullū putarent. Qualis enim mistura, putredoq; fuerit humoris, talē quoq; saporē producat. Cæterum quoq; melius qui genera numero certo cōplexi sunt, hisq; descriptis mistorū exinde differentiās capiūt. Porro cōditio terræ suū habet falsum sapore. Nullus enim fructus, nullū putamen saporis illius est. Sed huius causam postea reddemus.

Saporum septem putari genera sicut et odorum, colorumq;. Vtrum ex saporibus alios tanquam principia, alios tanquam priuationes dici oporteat. Vtrum præterea cetera animalia secundū naturam sint, an secundū priuationem.

Capit IIII



Aporum autem genera septem esse putantur, sicut & odorum, atq; colorum: hoc tamen ita erit, si falsum non alium, quā amarum posueris: quemadmodum & si fuscum colorem, non alium, quā nigrum. At si fecernes, octauū hunc esse necesse sit. Quippe dulcis, pinguis, amarus, austerus, acris, acutus, acerbusq; enumerantur, falsusq;

ocluus subiungitur. Sunt qui uinosum quocq; adficiendum putant, et cibus enim cum pluribus inest, & in terra nonnunquam talis comprehenditur sapor. Ad hæc, lactis sapor redigendus ad dulcem, minus appareat. Hic enim interdum tanquam species dulcis obijci potest. Nec uero uini saporem tribuere alicui facile est: sed sui generis esse is quoq; uidetur, qui & dulcem, & acerbum, & austerum possit recipere. Verum hoc nihil forsitan refert, ad cæterorum contemplationem. Numerus autē septem illorum, principalis naturæ familiarissimus est. Sed utrum alios tanquam principia, alios tanquā priuationes dici oporteat: exempli gratia, dulcem, pinguem, & reliquos hic consociatos pro principijs: ex his namq; generationes, nutritionesq; proueniunt: cæteros autem pro priuationibus: an omnes esse naturales censendum putauerim, tum & generandi, nutricandiq; rationem eosdem habere uerissimum sit. Nil enim serē generari, aut nutrirī per cæteros potest. Sed si plura naturæ tribui, quā pauciora dignius sit: cæteros prorsus magis, aut certe non minus secundū naturam esse credendum, cum paucos pars illa obineat. Proxima serē questio est, quæ de cæteris animalibus comparatione hominis agitur: Vtrum cætera animalia secundum naturam sint, an secundū priuationem. Pariter enim in his, atq; in plantis, peculiaris quædam essentia intelligi potest. Ergo si priuatio, in imperfectiōe, indigentiaq; uersatur: hæc autē, & generare, & educare possint, multoq; ualidiora cæteris sint, haud quicquam secundū priuationem dici hæc debeat. Item in genere quidem plantarum simul cuenit, ut non perfecte fructiferae-
 10 tur, & minus amara sint, quibus sapor iste ingenuus, ut in felle terræ, absinthio, & in cæteris generis eiusdem, patet: quasi natura eō tendat, dulcedoq; cruditas sit, aut incoctionis defectus. Semper enim natura suo subiecto simile alimentum reddere uult, tam in animalibus, quā in plantis. Tunc enim singulis commutari, & confici alimonia solet, cum euincunt, quod coeperint. At si adsint, quæ serue factis alicuius possint nutrirī, quod in animalibus euenit, quibus uel generatio inde est, nec alimentum, nec prima coagmentatio fidem faciet ei satis, quod secundum naturam sit: sed singulis per mixturæ rationē argumenta partiri necesse sit. Neq; enim omnes dulces saporē idonei hominibus, sed alij insaniam importāt, ceu radix, quæ carduo similis est, & alia quædam. Alij somnum conciliant, & si copiosius dentur, 30 mortem afferunt, ceu mandragoras. Nonnulli letales omnino sunt. Multi locis in multis cum radices ignotas edissent dulces atq; suauē, interiere: & alia istiusmodi complura norantur, quæ uel nocent, uel etiam omnino interimunt: quanquam gustu suauia, aut certe facilia: contrā pleraq; insuauia, & amara iuuant, ut quæ superius diximus, fel terræ, & absinthium, & quæ uenenosiores gustus important: quippe multa ex his quoq; prodesse uidemus. Sunt, quorū sapor, quia cibo per se minime idoneus sit, pro condimento cæteris additur, ut salis, atque acutus. Hos enim nisi temperemus, exuperare non possumus: sicut etiam ex cæteris animalibus pleraq; nequeunt. Quamobrem illis quoque saporē cæteros admiscere solemus. Pleraq; etiā sibi ipsa, quæ remedio forent, comperiūt, ceu aues: quo quidem 40 argumento constare appareat, genera saporum nō ita esse distincta, ut aliud uelut naturale sit, aliud innaturale, priuationiq; ascribendū: sed quod nobis inepium in cibo sit, hoc alijs esse apium: quodq; alijs aptum, alijs esse inepiū. Prout enim naturarum conditiones se habeant, ita singulis alimenta conueniūt. Pari modo & uoluptates, & anxietates, & remedia contra affectiones, dispositionesq; aduersas singulis natura statuerat. Quod pleraq; animalia facere latissime patet, non modo contra affectiones, quæ sponte accesserint: sed etiā in pastibus ipsis, cum aliquo noxio comesto, mox aliud, quod iuuat, assumunt: ceu uiperæ rutam, ubi allium ce mede-
 15 runt, cum & in odoribus eadē ratio est. Enim uero alijs alijs aduersi, nec quicquam
 20 commodi

commodum sentiuntur, non ita solum, ut non indigeant, neq; quærant, sed etiam ab his perimantur, quæ nobis suauissime olent, ceu uultures ab unguētis, & canthari rosis, Necnon & apes uehementer eos oppugnare uidentur, qui uncti sunt,

Ex brutis uel nullum, uel breue admodum esse, quod odorem persequatur. Item hominum odoratum esse deterrimum. Animalia etiam cætera odorem sentire, sed non discernere.

Caput V



10

Minimo inter bruta uel nullum, uel certe breue admodum est, quod odorem persequitur gratia suauitatis: sed ita facit, ut per euentum ita occurrit, cum scilicet cibus reddit odorē. Quippe appetitus ad ipsum pabulum, eiusq; est. Si quid tamen uel istiusmodi est, haud quaquam hominibus cōstat. Nam & pardalim cæteris animalibus suauiter olere quidam affirmant: & uenari in senecta nimirum bestias alliciendo gratia sui odoris: at nobis nullam odoris affert suauitatem. Nisi uerum etiam illud dixeris, ut certe est uerum, olfactum homines habere omnium sermē deterrimum. Itaque multi odores, suauitatesq; eorum, uel grauitates nimirum latere hominem possunt. Nec mirum, quod cætera animalia, quæ olfactum obtinent exquisitiorem, gratiam odoris non sentiunt, neque diiudicant. Forſitan enim sentiunt, sed eorum naturæ nihil conueniunt, quinimò aduersantur (ut de uulturbus dictum est) utq; omne insectorum genus oleo infestantur. Fugiant enim uehementer eius odorem: sed alia forte alium nata sunt aspernari. Temere tamen contra positionem illam pinguis saporis euenire istud appareat, cum nulla res conueniens corrumpere possit, nisi suo excessu. Sed huius ratio acritudini attribuenda est, sicut etiam origani, & generis eiusdem. Hæc enim omnia fugiunt. Sentire autē nihil posse (ut referunt) incertum hominī est, ni forte meatus quoque habere causam dixeris, ut non nulli naturæ interpretes uoluere, quod minus congrueret: ideoq; ratione magnitudinis animalia diuiserunt, paruaq; asseruerunt sentire, quæ paruis conueniant: magna, quæ magnis. Sed illi non satis fortasse, neque apte digesserant. Non enim meatibus sensus perficitur, sed pro dispositione, temperamentoq; potius sensatio & insensatio reddi debeat, in quibus suauitas, aut insuauitas consistere solita est, quod etiam hominibus euenit. Non enim idem odor gratus omnibus, sed potius ex foetidis, atq; grauius, aliqui communes omnibus inferuntur, ut qui ex quibusdam hiatibus, aut speluncis letales afflant omnes homines, qui accesserint. Sin autem illi quoque spiritibus tantummodo pestem inferat, at illud quidem latissime, sicut de saporibus patet. Odores etiam esse qui conueniunt singulis, suauemq; olentiam, quæ cibum non comitetur, nullis, uel certe paucis gratam occurrere, & hoc an commodum ali cui sit, incertius sanē est. Sed hæc latius fortasse, quàm res desideret, de qua agitur, disseruimus. Redeundum eodem est, unde nostra processit ratio.

40

Saporem dulcem maxime conuenire naturæ. Quamobrem plante singule saporem habeant suum.

Caput VI



Viuisq; saporis, odorisq; natura profectio, quemadmodum & animalium, est, quæ singulis dispositionibus, temperamentisq; conueniat. Cæterum quantum in uniuersum, communeq; res exprimi possit, dulces, & qui in eiusmodi genere confocientur, aptiores sunt ad alendum, propiusq; ad naturam accedunt. Sed forte non nihil repugnare appareat, quod ratione minus respondere existimes: quando dulcis sapor gratus omnibus sit, odor autem eodem accipi modo non possit, ni forte ob imbecillitatem sensus humani obliuiscat. Sed fortasse nec illud uerum omnino est, quod de dulci

retulimus. Sed de his satis dictum iam est. Plantarum autem uel potius omnium, quibus insunt sapores, quamobrem singula saporem habeant suum, exempli gratia, dulcem, aut amaram, aut pinguem, causa prima assignanda est coagmentatio: de qua determinandum, alij per figuras censentes, ut Democritus, rationes sese aliquas reddere arbitrantur. Quod idem uolunt, & qui per eam coagmentationem de singulis rationem propriam reddunt. Alij per excoctionem, cruditatemque dulcia, & amara, & reliqua malunt discernere: sed forte prohibere appareant, quæ paulo ante diximus. Quippe omnia per excoctionem prius assimilari uidentur, tam in animalibus, quam in plantis. Verum ita dicendum: Sapores tum dulces, tum qui omnino alere possint, atque omnem odorem suauitatem confectione, concoctioneque provenire. Nam quantum ad genus redigere liceat, percoctiora ceteris sunt, quæ istiusmodi cernimus. Constat hoc uel in ijs, quæ genere copulantur eodem. Sunt enim quæ excocta fuerunt, saporis odorisque melioris, quam quæ crudiora sentimus, dummodo utraque ritu concoctionis suæ coqui ceperint. Sed hæc latius posthac exponemus.

*Omnes plantas generandas saporibus transire per excoctionem ex alia in aliam qualitate
tem saporis: uinosque plures sortita esse sapores. Caput VII*



Nunc illud ex ceteris primum sumptum oportet, quod uniuersæ stirpium naturæ commune est. Omnes etenim plantæ in generandis saporibus transeunt per excoctionem ex alia in aliam qualitatem saporis: exempli gratia, quod quidem simpliciter dici potest, ex genere priuationis ad formæ habitum: ceu ex amaro, aut acerbo in dulcem, uel pinguem, uel aliquem istius consociabilem. At quoad particulatim res exprimi possit, proinde genera saporum sequuntur, atque natura singulis distinctionem statuerit: & in alia plures, alia in pauciores transire solita sunt. Enimvero alia ex amaro in acerbum, ceu oliua: alia ex acerbis in dulcem, aut acutum, ceu pira, & cetera. Etenim quæ acuta sunt, acerbis prius fuere: alia primum acerbis fuerunt, mox acuta, deinde dulcia redduntur, ut uuæ: quippe (ut summa dicam) plurimas alterationes uua recipere apta est, & omnino quæ saporem uinosum sortita sunt. Primum enim dilutus quasi sapor sentitur, proxime acerbis, tum acutus, inde ultimo dulcis: sic & morum acutum ex acerbis, & dulce ex acuto efficitur. Et in alijs uero idem hoc evenit. Quippe uinosæ dulcedini proxime adiacet sapor acutus. Quamobrem qui quaerunt, cur morum cum rubet, acutius est, quam cum albescit, cum propius tunc ad finem excoctionis sit, non recte quaerunt. Tunc enim uelut generatio ipsius destinata saporis obtingit. Prius autem cum albescit, acerbitas remotior à dulcedine, atque communior est. Qua de causa & siccus albescens humectius est, cum rubescit, ceu iam succum, saporemque suum adipisci occupat. Omnino quicquid fructus primum siccus consistit, mox humescit. Et hæc generatio est saporum, humore scilicet plenius influente, ac uelut articulo perfectius, & assidue maiorem in modum augente. Quo fit, ut non temere maior pars fructuum acerbis principio esse soleat, quoniam siccus est. Sed omnium humidorum siccissima esse putatur, quorum succus lacteus est, ut ficus. His igitur uelut materiam quandam saporis exhibent, illi quibus priuationem tribuimus, unde scilicet ad percoctionem transitur: ceteris autem illis ceu pro essentia, sineque interdum cruditatis qualitas est. Sunt enim fructus complures, qui & amari, & acerbis, & acuti suapte natura perficiuntur: quorum scilicet succis minus humiditatis, fa-

porisque datum est.

Omnia

Omnes fructus plantæ saporem aliquatenus monstrare: & crudos amplius, maturos minus.
 Item sapes in aliquibus ex crudis, ac pluribus transire ad perfectionem, in aliquibus
 insipidos perdurare: tum quemadmodum dulcis, & amarus sapor principia
 cæterorum intelligantur.

Caput VIII



Mnes autem fructus saporem quoque plantæ aliquatenus monstrant,
 quod forsitan ita fiat necesse est, cum inde suam illi trahant originem:
 sed crudi magis, maturi minus, utpote cum humoris effusio, quo plus
 temporis processerit, eo purior facitetur. Horum coagmentatio talis
 est. Quædam principio uelut insipida, dilutaque sunt, ceu frumenta:
 10 exempli gratia, triticum, hordeum, atque similia, quorum & perfectio statim ab ea ipsa
 qualitate accedit, antequam plures fiant mutationes. Neque enim dulcedo procul
 ab ea est, itaque nihil est opus uaria mutatione. Quapropter gemina quædam ratio
 generandi saporis esse uidetur, utraque pro natura rei compositæ. Altera enim ex cru-
 dis, ac pluribus transit ad perfectionem: altera quasi insipida, insuauisque, simplici ge-
 nerandi, alterandique uia ex natura subiecta confici solita est: quarum (ut simplicius
 loquar) altera in annuis potius, altera in arboribus est, utpote quibus plus coctionis
 delideretur. Sed forsitan melius exponetur, si non annuis, & arboribus, sed omnino
 ratione temperamenti determinemus. Quale namque hoc sit, talis mutatio sequatur
 ratio est, nam & amygdala principio aquosa sentitur, quandiu uiridis sit, atque recens:
 20 siccescens autem, pinguiscula redditur. Sic & alia quædam in eodem genere perfici-
 untur, quorum & putamina uel acerba sunt, uel acuta, modo amygdalæ, quod
 omnes fordes, omnemque terræ callum eodius naturæ secernit. Igitur natura quasi
 ex quibusdam commistis saporibus excernere percoctione saporem simplicem in-
 telligitur, quocirca res e contrario, quam in cæteris euenire appareat. Quippe cæte-
 rorum generatio permixtio conficitur, horum ueluti per detractionem, scilicet
 30 cionemque: ac ibi ex principijs, hic ipsius principij. Principium enim dulce est, id au-
 tem (ut simplicius agam) præcoctio spectat. Sed hæc minus sunt disputationis pro-
 positæ. Tum etiam illud absurdum, si omnia saporum genera ex amaro & dulci com-
 mistis exultent, ut ex elementis omnia corpora. Sed rursus absurdum occurreret aliud,
 si ex his nihil, hæc ex cæteris prodeiret. Haud enim natura talis principiorum est, nisi
 si forte multifariam principij dici potest, modisque pluribus usurpetur: quod ita esse
 uidetur, cum uelut per cõsolationem seu coordinationem aliqua explicentur. Sed
 determinare de his nihil disputationis præsentis interest.

Quod humor sit saporum communis materia. Causa uero agens, & internus, & exter-
 nus calor. Qui item sapes maxime perspicui euadant. Caput IX



Aporum autem generationes rationibus supradictis, aut ex formâ in
 formam, aut ex contrarijs in contrarios acutari putandi est. Omnium
 uero communis materia humor subest. Alterat autem, agitque calor,
 cum internus, tum externus: hic enim (ut dictum est) plantarum ge-
 40 neri maxime accommodatur, nec sicut in animalibus internus ha-
 betur accommodatur. Nam in illis quoque mutationes, alterationesque saporum fieri
 solent. Quæ cum ita sint, quonam pacto uicissim generatio fiat, à Democrito petat
 aliquis. Aut enim figuras commutari, ut ex scalenis, atque acuto constantibus angulo
 orbiculato efficiantur, omnibus scilicet inhaerentibus illis, ceu acerbis, acuto, dulci:
 aut priorum figuras excerni, reliquas autem remanere: aut tertium alias exire, alias
 subire necesse est. Sed cum transfigurari impossibile sit (quod enim incorporeum
 est, nullam sibi admittit affectionem) restat, ut uel aliæ subeant, aliæ exeant: uel
 omnibus inhaerentibus illis acerbis, acuto, dulci, priorum figuræ excernantur, reli-

quæ remaneant, quæ singulis ualeant conuenire. Sed ne ista quidem fieri ratione aliqua possunt, adhiçnanque oportet, quod hæc agat atque efficiat. Sedenim ratio hæc de pluribus fortasse petenda est: quippe omnium generationis ille hunc in modum exponit, ceu substantiæ, quantitatæ, qualitatis. Cæterorum autem excoctio, quæ calore subministratur, alia excernit, ac euaporat, alia crassat atque coagitur, alia attenuat, alia (ut simpliciter ratione dicam) alterat, quemadmodum uel in ijs agitur, quæ igne seruescunt. Omnino assumendum est, cunctos sapores inesse potentia, immutatione quæp. Sed fieri atque esse, non nisi actu contingere. Prorsus peracta excoctione succorum, alij statim sensu percipiuntur, ceu dulcis & pinguis. Hic enim quibuldam exprimi atque defluere potest, & quidem segregatio eius ita maxima ex parte fieri solita est. Alij non æque perspicui sunt, ceu uinosus in myrto, atque etiam minus qui pinguis in eodem est. Habet enim talem quoque humorem, qui uino cum saccellatur, residet atque innatat: quem detrahunt, & ad lumen lucens narum utuntur. Omnes synceriores efficiuntur suis expressi, multoq; magis qui expressi diu immoti manserunt. Sic enim diluta pars exhalatur, & terrena subidet, in totumq; calor intestinalis corroboratur. Nam & decerptis fructibus alteratio succi totidē consequitur modis: & nuces, ac cætera, quæ pari ratione oleum reddunt, spacio temporis longiori, amplius propter prædictas causas oleantur. Quare constat (quod dictum iam est) cunctos potentia inesse, actiones uero per alterationes oriri. Sunt certe mutationes succorum, quemadmodum in ipsis fructibus: sic etiam cum expressi fuerunt, in sapores excoctionis pariter, & corruptionis.

Quare uinum ex uetustate amarum fiat, curq; coacescat. Item quemadmodum sapores corruptantur: hinc omnes fructus calore concoqui. Caput XX



At et hoc maxime in uino, quippe hoc procedens suo uigore, & densens, & quasi senescens, certis quibuldam saporibus immutatur. Enimvero si ex uetustate aut secundum naturam fuerit alteratum, amarum efficitur: quod propterea euenit: quoniam aëre circumfuso, exactum sit id quod tenue, ac idoneum potui fuerit: hoc enim exolescente, relinquitur quod terreneum est, atque amarum. Sed si tanquam per uolentiam, & præter naturam mutatum sit, coacescit: id enim saporis contrarium esse natura uoluit. Pari modo uel cæteris euenit, ut inde corruptio exulter, unde naturalis generatio prodijt: quippe ex acuto in acutum uelut in materiam, resoluitur. Quod cum fuerit, mutari rursus, atque restitui raro euenit: & tunc forte, cum aut mari commistum sit, aut syderis ortu fuerit leuiter, per summaq; immutatum. Vitium enim tum etiam simile accidit, nisi uehemens sit. Sed de his aptius postea differemus. Corruptio autem, & alteratio, accidere cæteris uitijis solent. Quod enim corrumpitur, perhumescit, & sæpenumero coacescit: quod senescit, ac uetustescit, excicatur, parte hic etiam terrena tantum extante. Omnino singulæ corruptiones, aut rei alienæ admistione, aut propriæ defectu, temporis causa eueniunt. Percunt uero permissiones, aliàs externis aliquibus immixtis, aliàs parte alia uiciata, aut modum excedente interna. Sed forte uerius dixerim, parte aliqua commota, corruptaq; totum perire: sic enim fructus corrumpitur, & lac, & uinum, & reliqua generis eiusdem. Nec uero minus certa mutatio in his est. In contrarium enim omnia transeunt. Plures tamen esse contrarietates intelliguntur, atque hoc quidem manifestum est. Fructus autem cuiusque concoctio, ut subministratur caloris, uedictum est. Sed quæ serò perficiuntur, ut frigoris maturari uidentur, temporis causa. Calor enim, quod sæpe dicimus, concoquit, dum circumobfuit, atque in se uertitur.

Oleum

Oleum post arcturum nihil plus olei facere. Tum copiam olei non alimenti ubertate, atq; in pleno corpore oliuarum collocandam esse. Caput XI



Ecuiare quod de olea notatur, si uerum est. Nihil enim plus olei post arcturum fieri posse aurumant, simulq; nucleum tum obdurefcere: quo facto, non amplius humorem posse in oleum uerti. Quobrem si qua naturali ratione agendū, qualitati aëris ambientis causam impu-
tare debemus, nō occasu syderis, qui certe pro casu habendus est: atq; utrum fortasse illorū ob eandem causam euenit. Sed ambigif argumentū uerifimil
fatis, qd imbribus subsecutū nullū penitus incrementū pabulo accedit: sensu quoq;
10 experimētoq; confirmat. Cum enim albæ adhuc oliuæ torquent, minus olei emite-
runt, omniumq; præcipue illæ profundunt, quas nouissime collegerunt. Facit em̃
perfectio, ut parte aquosa humoris sublata, reliquum amplius coqui ualeat. Ratio,
quæ repugnat, hæc est. Sed fieri potest, ut ob aquosam partem, atq; amurcam, plus
esse olei appareat. Nam & prius, quā nigrescant, habere oleum constat: & synce-
rius tum esse, ac albius, argumento est, quod ex phaulijs promitur. Nec mirum, si
quam in eo, quod albis exprimitur, sentimus amaritudinē, quæ postea ex cocto frus-
tu aboléatur. Hoc enim nō parsimoniz, aut copiz, argumentū est: sed corporis am-
bientis qualitate succum affici aliquatenus indicat: quod quidem & uasa faciunt.
Minus autem solitum esse expectare, ut pulpa excoquatur, constat eo quod albis
20 adhuc profluat oliuis. Sic fit, ut neque potentia, & actu distinguere sit. Materiam
enim, ex qua sit futurum, iam obtinet. Quæ igitur ratio, modus ue quifnam sit,
si uere, uel simpliciter, uel aliquatenus plus esse dicatur: Quippe ratione caret
utrūq; sed alterum magis: at nō eadem percoctio succi, pulpæq; sit ad usum ciba-
rium. Pulpam enim gratam esse gustatu oportet: succus alteratione partis terrenæ,
aut putredine, ut quidam uolunt, perfcitur. Drupas enim putredine statuit. Oleū
uero non nisi ea ipsa succi mutatione creatur: quod quia difficilius sit, non temere
dixerim a calore confici ampliori: statimq; dum succus minus parti aquosæ, terre-
neq; permixtus est. Igitur ante arcturum ambo illa contingunt. Est enim & tempus
feruentius, & succus purgator. Contrā autem post arcturum, pulpa enim tum au-
30 gescit, atq; perfcitur. Copiam uero olei, nō alimenti ubertate, neq; in pleno corpo-
re oliuarū collocandā esse, multis rationibus patet. Imbres etenim minus olei faciūt,
& riguæ olluæ deterius fundunt: quibus quia caro multa, nucleus paruus. Hæ par-
cissime præstant oleum, ceu phauliz, ranquam uires hac in parte naturæ deficiant.
nec uero in locis frigidis olei copiam largiunt, sed carnis: quod quæstionē utiq; citat.

Quobrem uinis loco frigido, sapore non caret, oliua caret. Quodq; genus olearum, quæ egyptie appellantur, ubertate, ac magnitudine fructus excellat. Odorata item saporem gustantibus exprimere, quasi non modo sensus uicini inter se sint, uerumetiam quæ sub sensum uenire ualeant, proxima quodammodo inter se collocari natura uoluerit. Caput XII

40



Vamobremq; uitis locis prægelidis sapore non caret, oliua autem caret. Sed ratio in eo sanē est, quod superius diximus, uidelicet, quod uires
ad carnem conficiendā intendunt: uuæ autem sapor in ipsa carne con-
sistit. Addo etiam, quod prius fortasse, ac principalius sit, calorem, qui
oleo conficiendo sufficiat, minus ualidum esse: itaq; fieri, ut Vere nul-
lum, estate minus bonū creetur, atq; autumno meliorescat. Sol enim nō amplius eo
tempore exuperare nimis ualeat. Quod etiam argumento causæ sit, quobrem æsta-
te oleum fieri solet, succum enim uinosum, aut aquosum frigus coquere satis pos-
sest, at oleosum nō potest. Aquæ pluuiæ, aut conductitiæ carnem (sicut dictum est)
augent. Oleum nihil se carni permiscet, sed per se manet, quemadmodum cum ex-
x

pressum est. Genus olearum, quod ægyptium appellamus, ubertate ac magnitudine fructus excellit: reliquum abunde oleum fert. Sunt enim complura genera, ut in historijs dictum est. Igitur olei generationi causa talis reddenda est: de cæteris autem pinguibus opinandum, quemadmodum inter omnes conueniunt autores. Si uero reliqua tempore discordent, distinguendum, aut singulorum naturas, aut quas pinguedo sit, aut etiam modum generandi: cum tamen diu manserūt, ceu nuces, uim certe, ut dictum est, obtinent. Actione uero temporis spaciū educit, cum a quo solo humore exhaustio pinguis consistere, & coque cœperit. At sunt, quibus pinguedo sicca admodum est, nisi forte calor circumobstans possit id quoque in aliquibus efficere. Ex omnibus, quæ saporem aliquem obtinent, quedam odorata quoque illico sunt: maior tamen pars odorem quandam gustantibus copulatum cum sapore ostendit. Nonnulla etiam uel confricata duntaxat, & permota, reddunt odorem. Rursum, quæ odorata sunt, saporem gustantibus, aut manducantibus expriment, quasi non modo sensus uicini inter se sint, uerumetiam quæ sub sensum uenire ualeant, proxima quodammodo inter se collocari natura uoluerit. Unde haud perperam dictum appareat, odores pro saporum ratione consistere. Hæc enim opinio planè illi respondet, quæ cognatione aliqua coniungi istos inter se, atque ex eodem quodammodo oriri significat. Quod quidem utrumque genus quid sit, aut qua ratione, cum idem esset, differat, tamen inter se explicari certe oportet.

Non omnes odores reddi appellationibus posse. Species item plures uniuscuiusque saporum generis annotari. Dulce etiam principium saporis esse, amarum odoris.

Cepit X III



Erunt non omnes odores, appellationibus reddi fortasse possunt eisdem. Quippe amarum odorem, aut salsum, aut pinguem, aut acerbum nominare minus quispiam uelit: neque enim saporum omnia genera odorum rationem sequuntur. Nihil tamen id prohibet, quo minus hæc inuicem coniungantur, & utrumque alterum quodammodo consequatur. Plures autem uniuscuiusque saporum generis species annotantur, ut dulcis, amari, ac reliquorum. Melleus enim, & uinosus, & lacteus, & aquosus, dulcis species sunt. Forsitan & plus, minus uel, differentiam facit. Sed potissimum ratione subiectorum commiscendorum discrimen exoritur, & cæteris quoque pari modo intelligendum, atque de his inter omnes ferè autores conuenit. Sensum autem illum odoris, qui gustatu percipitur, non temere adiungi genus olerum indicat, quod agnomen à gratia palati accepit, ceu anethum, fœniculum, iris, & reliqua generis eiusdem, quorum pleraque nihil penitus oleni: atque etiam latius illa significant, quæ præarida sine ullo odore sunt, ceu lens, cnicum, & eiusmodi. Hæc enim perfecta statim ac manducantur, sufferuefacta uaporem emittunt præteruenem, qui sursum per meatus ad olfactum transmittitur, & saporem quoque reddunt eadem, dum manducantur. Omnia propè odorata amara sunt, sed causam huius postea dicemus. Cum uero illa duo contraria inter se sint, dulce, atque amarum: alterum uelut initium grati saporis, alterum grati odoris esse uidetur, & quodammodo magis primordium dixerim amarum grati odoris. Quippe odoratum quin amarum sit, comperire difficile est. At boni saporis complura inuenies, quæ dulcia non sint, quæ ferè odorem quoque in gustatu, olfactuque reddere apta nouimus: quod dulcedo raro, & perexiguae facit: quantum utrumque ex coctione proueniat. Sed de his postea.

Cur in

Cur in plantis saporis omnes, præter falsum, spectentur. Tum, quare falsugo aliquibus plantis aliquatenus accidat, amertudo uero aliquibus plantarum partibus.

Caput XIII



Vm autem saporum genera plura sint, quæret sanè quispiam, quamobrem cæteri omnes in plantis, & fructibus fieri solent: ut amarus, acerbus, acutus, & reliqui: falsus nunquam fieri potest. Nihil enim in genere plantarum falsum percipitur, scilicet ita ut in se talem sortiatur laporem. Sunt enim quorum summam partem duntaxat falsugo quædam obducit, ut cicer. Causa, quod falsum nullam alimoniam, nullam generationem præstare potest, Argumentum, quod nihil penè locis eiusmodi gignitur. Vires enim illud erodit, ac eximit, ut facultas generandi uetetur. Quod igitur cæteris, ne generentur causæ sit, id certe neque ex se quicquam creare posse, ratio est. Nam & ea, quæ in mari nascuntur, non sine dulcedine, aut aliqua cæterorum saporum qualitate proveniunt, atque consistunt: ut pisces, & reliquum animalium genus, quod mari uersatur. Ergo causam in uniuersum hanc opinari dignus est. Illud enim ex quo futurum aliquid sit, commutabile esse, necesse est: falsum affici nequit, atque incommutabile est: quamobrem neque perfectum quicquam, neque aliquid ullo pacto generari ex eo potest. Omnino in singulis, & consequi solitis, illud etiam consensu apparet: ut sol, & calor, quia in omnibus humorem leuissimum, atque ad alendum aptissimum attrahit: falsus, quia natura ponderosus, minimeque cibo idoneus est, à nullo hauritur. Adde, quod nullam putredinem, nullam alterationem humor istiusmodi recipere potest. Quæ cum ita sint, a uersam penitus à plantis esse qualitatem eius saporis necesse est. Ad hæc, quoniam genus plantarum nullam uim excrementorum egerendorum obtineat, nihil attrahat sibi, quod minus alere possit, uerisimile est. Quippe egestionem quoque illius aliquam subséquere oportet, non solis uel prouocari, & per summa erumpere. Lata enim ubique, magnaque afferri humoribus, incomplexa tamen, inconglutinataque, Democrito placet, quod nullum adsit scalenum, sed angulos omnia imitentur. Hæc si plantarum uetent permissionem, licet animaduertere. De his autem, quæ in uniuersum prius exposita sunt, quæret sanè aliquis, quamobrem falsugo innasci, aut subnasci aliquibus soleat. Nam si intrinsecus sit, alimento, naturæque conuenire, haud temere confirmetur: sed si extrinsecus ueniat, & hoc quidem minus, quærendum item unde, atque ex quo. Aut enim ex aëre, aut ex uapore, qui sursum feratur, aut radibus tracta per summa, deinde erumpi, tanquam aliquid fordium. Quippe falsugo per summa consistere omnino uidetur. Ergo si radibus trahitur, ratio palam est: at si minus, mirum, cur ciceri, & reliquis huiusmodi residere tantummodo apta sit. Quæ enim falsugine ægrotent, ceu rosa, & quædam alia, hæc disputationem aliam desiderant. Ciceri uero & familiaris, & perutilis falsitudo est. Abluta enim in flore fructusque proueniente, statim planta radibus arefactis, emoritur. Itaque constat naturam id qualitatatis natuum esse ciceri uoluisse, ut ualeat conseruari. Omnino quædam suis in folijs, ramisque, talem sortiuntur saporem, qui ablutis gustatu aquæ percipitur: nec in his modo, sed in fructibus quoque ipsis iidem est: quod sensus late diiudicat, si quis non fructum manducet, sed linguam ei duntaxat apponat. Quippe non in pulpa, sed in putamine fructus falsugo posita est: quo sit, ut semen reconditum, & incorruptum seruetur: nec secus à falsugine custodiatur, quam cum in uasculo conclusum plantæ adhæreat, quasi genus istud saporis sui gratia custodiendi à natura acceperit, quando uiride sit, caulis, atque siliquæ munitur falsugine, ut dictum est. Cum uero siccescere cœpit, suo quoque putamine saporem istiusmodi recipit, tanquam intrinsecus æditum. Enim uero foras uersus rem huiusmodi excerni cōsentaneum

est, utpote alienam: quemadmodū & amaritudo cucumerum, quam per summitatem sentimus. Genus quoque pirorum Carix domesticū fertur, lanugine tam falsa obductum, ut nisi aqua subluatur, edi non possit. Nihil igitur mirum, si eiusmodi plura creantur. Neque enim illud procul prædictis est, glandibus extrinsecus amaritudinem insidere, & bulbis cacumine appellato, & alijs acritudinem siliō spicæ intestum teneri. Hæc tamen alicuius ratione similitudinis addita sint. Rem autem naturalem esse, atque nativam, hinc latissime constat: ubicunque enim feratur nascaturque, aliud quid falsuginis capiat, necesse est, etiam si solum nihil sapiat falsus. Nam ea quidem, quæ locis falsis proveniant, haud temere falsuginem ceperint, sicut alia pleræque, & aurio. Nonnulla etiam suaviora, melioraque reddi ratio est, ceu brassica. Acritatē enim 10 & amaritudinem brassicæ insiram, falsugo absumit: tum etiam fragile quoddam efficit corpus totum nimio humore sublato. Quippe sal ad trahendū, absumendumque humorem, aptissimus est. Patet hoc vel etiam cruda: frangi etenim aliquas perhibent delapsas in terram. Cum igitur talis igni mandatur, facillime coquitur, & tenera, dulcisque sentitur, scilicet ut consentaneum est. Nam & quinitrum inijciunt, hoc idem conatur efficere: ut eruntamen non pridem incipiunt. Natura vero iam pridem orsa, paulatimque prosequens, talem reddiderat. Quapropter nec id a verum a ratione est, ut circa solstitiū, aut circa sydus, nonnusquam & omnino per æstatem meliorescat, ut apud Eretriam. Tum enim falsugo acris agit, evincitque, utpote cum ea ipsa largior sit, humor autem contractior. In Aegypto quoque, & locis eiusmodi 20 omnibus, optimam fieri ratio est. Sed hæc latius fortasse adiectionis. Salsugo autem siue a radicibus trahatur, siue a solis ardore ad summa ducatur, neutra sane ratione immobilis esse possit in terra, qua de re disputare incepimus. Sed de his satis.

Qui saporis humidis, siccis intelligantur. Quodque vinum ex hordeo triticoque conficiatur. Cur item odores non ex totis plantis, sed e partibus quibusdam reddantur. Quodque saporis, aut odoris suavitatis aliquorum insit radicibus. Et quod tanquam venientes plantarum sint radices. Quare etiam plantæ quædam pinguedine, ut animalia suffocentur. Caput XV



Illud autem humidum ne, an siccum potius, singulis saporum generibus datum sit, declarandū nunc est: utpote ad saporum naturam accō- 30 modatissimum prorsus. Acutus et austerus, humiditatis potius esse videtur, quam siccitatis. Contra acris, dulcisque, siccitatis potius, quam humiditatis. Et quidem humores, cum crassescunt, dulciores redduntur: ni forte hæc pro nihilo sint putanda. Illudque melius dici possit, omnes ex utraque re, hoc est humiditate, siccitateque consistere: quancumque earum altera materiam magis res præsentet. Quod si ita est, omnes eadem origine prodeunt, omnesque in siccitate positi sunt, sicut dictum iam est: sed alios succo expresso, de sede sua educimus, ut uuarum, & oliuarum: alios aqua etiam modica infusa excernimus, ut nucum, & ficulū. Nonnullos dimouendo ex propria natura, putrefaciendoque leuiter, potari habiles faciunt: ut qui vinum ex hordeo, tritico uel conficiunt, aut quod zethum Aegy- 40 ptus appellat: quorum omnium principia, viresque, naturæ conveniunt: quæ uero utendi causa sunt, hæc solertix potius, ingenioque hominis tribuendū. Sed quæ ars, & ingenium faciat, ipsa per se existimare dignius est. Saporum autem naturalium affectiones, generationesque, prædictis his rationibus contemplari certe oportet. His igitur positis, exploratisque, dubitauerit quispiam, quareque, cur non partibus eisdem omnium sapor, aut odor efficitur: sed aliorum parte superiore, aliorum inferiore, ac circa radices. nec omnium, quæ parte superiore habeant, norma eadem est: sed alia in fructu, alia in fronde, alia in flore, alia in ramorum summitate, suum habeant sapor- rem, aut odorem: magisque odor, quam sapor sede uaria collocatur. Nam & cortice suo non-

sunt montibus suauiter olent. Flores eorū, quæ tota sunt odorata, nulli (ut ita loquar)
 odorati creantur, seu serpylli, sisymbrij, helenij. Atquiratio exigite, ut quod in cæteris
 quantū inodoratis odoratissimū est, idem etiam inodoratis sit odoratissimū. Mirum
 etiam florem quorundā odorem suauissimū reddere, quorum nulla pars alia bene
 olet, quod in uiolis, rosiscis patet. Prædictū etiam illud, radicibus aliquorū saporis,
 aut odoris suauitatem esse, in dictā questionem adducit. Ambo etenim ista ex co-
 ctione conficiuntur: quodque plurimū, recensque assidue obtinet alimentum, cæterisque
 transmittit omnibus, hoc ita percoqui, ut saporis, uel odoris gratia adipiscatur, nulla
 ratio sit. Nec enim animalū uentribus contingere istud uideamus. Igitur de his, cæ-
 10 terisque similibus principio illo sumpto, quod sæpe dicimus, uidelicet per coctionem
 hæc omnia confici solere. Mox adijciendū, quod de beta dictum antea est, uidelicet
 radices tantū uentres esse plantarū, quoniam cibus in his aliquatenus alteratur. Quæ
 cum ita se habeant, nihil impedimento est, quo minus saporis, odoris uel suauitatem
 obtineant: modò confusione tali elementorū conditæ sint, ut rei capaces esse uale-
 ant. Nam & in animalū uentribus quamuis sordes plerūque sint, tamen subiacet ali-
 quid humoris, qui grato saporis, excoctionisque datur, uelut alteratio talis ea parte po-
 tissimum fieri possit, quod etiam in arboribus constat, quæ pinguescere admodū so-
 litæ sunt. Pinus enim radicem agit tæda totam referat, ut ante dictū est. Ratio eadē,
 quæ in animalibus est, quod pars alimentī, quæ feruerit, excoctaque sit, quoniam pur-
 20 gatissima est, assidet: & collecta, densataque pinguedinē reddit. Reliqua uero sursum
 transmissum, partes, quæ supra terram eminent, nutrit: nō per illam pinguedinem
 subiens, sed per alios quosdā meatus. Nam quæ in tædam omni ex parte mutatae sint,
 obefitate moriuntur, ut dictum est. Cum enim nullū transitū habeat spiritus, strangu-
 lantur: sicut animalibus accidit, quæ ultra modū pinguerint. Quippe meatus omnes
 frequentia pinguedinis obturant, ut spiratio ad finem usque transire minime ualeat.
 Quibus igitur, uel nulla penitus, uel nō multa, callosaque inest pinguedo, his nunquam
 talis crassatio euenit: at quibus inest, ijs nimirū euenit, scilicet ut feruoris exuperatis,

*Cur partes in plantis crispiores, alie alijs extent. Cur etiam sapor, aut odor, aut suauitas, ita in alijs
 quibus inest radicibus, aut nulla pars alia bene olida, beneque sapida sit. Caput XVI*

30



Proximum huic, quod in crispitudine lignorū efficienda animaduertimus. Semper enim caudices crispiores extant, quam rami: & ramorū
 ipsorum primæ partes densissimæ, atque crassissimæ sunt. Quod ita eue-
 nit, quia his in locis alimentū magis immoratur, atque consistit. Qua de
 causa & incrementū agitur in profundū. At cum ultra ad germen ef-
 fundendum transcurrit, simplicius, atque in longitudinem potius augeat. Quod igitur
 his in locis alimentū se aliquantisper firmat, & quasi conuoluitur, efficitur, ut & spissā,
 & crispa ligna creentur. Cæteris, quia ulterius assidue tendit, nihil tale exultat. Quā
 obrem in nouellis nulla est crispitudo: uis enim tota ad augendum contendit. Sed
 40 ubi in longitudinē augeri cessarunt, crispari deinde, dilatarique incipiunt, sicut etiam
 animalia. Eadem causa est, & quam obrem tædam, piceamque, aut resinam nullam pe-
 nitus nouellæ arbores habent. Alimentum etenim totum ad incrementa, fructifi-
 cationemque absumitur. Quippe postea in tædam uertuntur, atque omnino fructibus
 illum destinatum humorem magna parte usurpant. Tunc enim uelut sordes natu-
 rales quædam hæc relinquuntur, cum uis augendæ longitudinis destitit, & radix,
 atque uniuersa arbor plus roboris capere inceperit. Hæc propter causæ cognatio-
 nem hoc in loco inferere placuit. Sapor autem, aut odor, aut suauitas aliquarum ra-
 dicum, ita ut nulla pars alia bene olida, uel bene sapida sit, prædicta euenit ratione.
 Constat hoc idem in minoribus etiam, ut in herbis, oleribus, atque fructibus nonnul-

lis, quorum radices sunt dulces, reliqua uero minime respondent radicibus: *exem-*
*p*li gratia, graminis, gladioli, betæ, apij, equapij, atq; eorum quæ in paludibus, aut flu-
 uij idonea cibo proueniunt. Radices enim & caules plurimū dulces, ac cibo aptis-
 simi sunt, folia minime. Causa in his omnibus, aut quod superiora humidiora sunt,
 atq; dilutiora, ut betæ, ut cunctorū palustrium. Vnā enim & aquosa sunt, & tenuia
 & excoctione carent, cui efficere sapore datum est. Radix tamen & caulis, quia mi-
 nus habent humoris, dulcedinem obtinere aliquam possunt, aut e contrario scilicet
 quia superiora nimī sicca, ut graminis, & omnino eorum, quæ arundinacea sunt.
 Quippe pars eorū superior sicca, inferior rosida est. Sapor aut neq; in siccitate, neq;
 in humiditate nimia potest consistere. Itaq; efficitur, ut graminis, & syrinchij, & reli- 10
 quorum generis eiusdem radices sint dulces: partes uero superiores ex causa siccita-
 tis insuauis, & propemodū insipidae extant. Hoc idem & in apio, atq; equapio pla-
 nē animaduertitur. Radices enim eorum carnosæ sunt, gratæq; palato: folia siccio-
 ra, ueluti acriora. Pari modo de cæteris quoq; licet differere. Omnia enim ferē in his
 ipsis rationibus continentur. Quamobrem ubi plus alimonie subministratur, uel
 superiora eorum, quæ suapte natura sicca sunt, cibo idonea perficiuntur, ut in Aeg-
 ypto arundinis, quæ in paludibus est. Dulcis enim cætera quoq; sua extrema par-
 te sentitur, sed breuī admodum. At illa propter copiam alimenti tenera, dulcisq;
 parte ampliore exurgit. Radices etiam suam dulcedinem seruant, usq; quo resiccen-
 tur, resiccatæ statim eam amittunt. Siccitas enim neq; cibo idonea, neq; sapida est: 20
 quapropter caulium quoq; uigor certus statuitur.

*Cum uiridia, aut nihil oleant, aut non aque: sicca uero nimirum redolent. Quodq; in
 quorundam radicibus præcipue sapores insunt, ut omnium acriorum, & quomodo
 rem. Item de succorum nominibus, quib; humor communi nomine careat.*

Caput X V I I



AUERO odor e contrario ferme in his. Virides enim aut nihil olent, aut
 non aque: siccatæ nimirum redolent, ut lridis radix, atq; etiam arun-
 dinum, & iuncorum, atq; omnino generis aquatiliū. Nam & gladio-
 lus, quāuis odoratus, & sicca suapte natura sit, tamen minus redolet 30
 recens: sed eorum etiam uigor certus intelligi debet, ut sicciscentia su-
 pra modum reddi hebetiora, necesse sit. Verum hoc (ut suprà dictum est) consenta-
 neum ferē est. Sapores autem in cæteris quoq; suas uires, pari ratione habere con-
 stat. Quorundam enim in radicibus sunt præcipue, ut omnīū acriorum, ceu alliorum,
 ceparum, radicularū. Quod idem de uenenosis etiam dici potest, quæ & ipsæ carno-
 sæ omnes creantur. Cæterū uires uenenosarum perenniores sunt, in totum enim
 ualidiores ex siccitate redduntur, quia pars aquosa humoris exacta est. Ex hac ete-
 nim ratione succi corporati etiam utiles sunt, cum corporatio nonnihil segregata
 parte aquosa proueniat. Quamobrem præparare consueuerunt, alia siccantes, atq;
 succantes: alia inscantes, quo solis ac aëris uis coagere melius possit, ut resinam, &
 reliqua generis eiusdem, & thus, & myrrham, & laserpitium. Afferitur infectio alijs 40
 tam radice, quā parte superiore, ceu uenenosis quibusdam, & laseris. Quippe ra-
 dix, & caulis infecatur, atq; succus manet utrinq; alijs radice, aut caule tantum, scilicet
 prout succum emittere aptiora sunt. Nam si radices habent succosiores, radici
 infertur incisio: si partes supernas, cauli. Quibus enim radices sicca, surculosaq;
 sunt, his nunq; stercus disponunt. Eadem ratio lachrymarū etiam est, quæ spon-
 te crescunt, tam spinarum, quā arborum, ut amygdalæ, pini, abietis, terebinthi:
 quarum alie bene sapidae, beneq; olidae sunt: alie insipidae, atq; inolidae, ut gumma,
 spinæ ægyptiæ. Vocant alia succos, alia lachrymas: communius tamen uocabulum
 est succ-

est succus. Sed forte nil refert. Humor enim, qui singulis uaria excoctione conueniat, communi nomine caret. Quod uero inter humores alij callosiores, lentioresque sunt, alij aquosi, minusque lenti: hinc alij densari possunt, alij nequeunt. Nonnullis etiam aliquid miscet, quo densentur, atque concrecant.

Cum alia in caulibus, alia in radicibus uires habeant. Curque in eadem planta diuersi odores, saporesque sint.

Caput X VIII



10

20

30

40

Ausam uero, ut alia in radicibus, alia in caulibus uires habeant, illam sane opinari de cet, quam prius retulimus. Quorum enim natura minus parte utraque modica est ad unam illam condendam, quod altera satis, altera minus humiditatis, aut siccitatis habuerit, atque etiam, quorum substantiam plus in alterutra partem uergi natura uoluerit: hæc aut parte superiore, aut radice potius uires continent: sicut incrementi quoque, & magnitudinis ratio anceps est. Cucumeres enim, cucurbitæ, & alia pleræque parte ampliantur superna, luxurianturque. Radice tamen pusilla inhaerent, scilla, bulbos: denique omnia, quæ radice sunt capitata contra partem superiorem, tenue, imbecilleque, radices amplas, carnosasque gerunt. Prorsus in quibus a credo inest, uel aliqua eiusmodi uis radicibus potius inest, ut in cepe, allio, & scilla: quod ratione optima euenit, cum natura eo potius tendat. Vires enim naturam sectari, necesse est: quod in uenenis maxima ferè parte uidemus. Quippe radices uenenosiores, potentioresque sunt. Causam duo illa, quæ superius diximus, habent, id est quod neque præhumida, neque præarida sint. Altera enim ex humoris nimietate percoqui nequeunt: altera quasi materia uacant ad coctionem suscipiendam, suæ causæ siccitatis. Singula autem pro sua natura, potestateque coquuntur, ut dictum est. Igitur e contrario quasi sapores, odores, atque omnino uires eiusmodi alijs super alijs subter haberi, ex supra dictis intueri oportet. Causa uero quamobrem neque sapores, neque odores parte eadem omnibus habentur supernis, haud procul prædictis ferè rationibus est. Nam quod simpliciter dici potest) singulæ partes aliquid similitudinis habent, tum in sapore, tum in odore: sed differunt, quod magis, minus uel habent. Patet hoc in eis arboribus, quæ syncerius olent, & sapiunt: ut in abiete, pino, cupressillo, larice. Addo etiam in fico: aquosiores enim non æque istud confirmant. Imò uero differentiam hæc suscipiunt illam, ut alia sapida, alia insipida, uel male sapida sint: & alia odorata, alia inodorata. Necnon et odorum saporumque uarietate discordantia prodeunt, ceu uitis, pampinus, & uua. Denique omnium ferè, tam foliorum, quam fructuum: ratio, quod alterum crudum, alterum coctum est: uel potius, quod neque ex eadem materia sit utrumque: sed alterum uelut ex purgata, synceraque, alterum ex impura, callosa. Sunt certe ex callosiore, corporatioreque germina, rami, stipites, totaque moles. Itaque cum materie dissimiles sint, finem quoque pro sua natura dissimilem habeat unumquodque necesse est: quod etiam in animalium genere constat: uel potius ediuersum, quia finem suum habeat unumquodque, materiam quoque habeat diuersam, necesse est. Omnium uero (ut simplicius loquar) finis pro subiecta natura statutus est: quæ cum uaria, & in sapore, & in odore, & in inodoratione sit, discrimenque ad sensum hominis redigatur, hinc diuersitas partium exultet, necesse est. Nihil enim prohibet, foliorum temperamentum gustui modicum esse interdum: fructuum autem immodicum, ac uehementius, uel in acerbitate, uel in austeritate, uel in amaritudine, uel in alia quadam dispositione. Quod etiam in olerum genere perspicuum est: Quippe folia moderata, & grata sunt: semina uero acris, uel amara, & ex toto uehementiora sentimus: ita, ut contra, quam in arborum fructibus, ac terræ fructibus res eueniat. Fructus enim illarum utiles, folia inutilia sunt. Horum autem folia

tantummodo usui sunt: semina non nisi medicaminis forte dari rationi commode possint. Quod igitur in his liquet, nihil prohibet in illa quoque, ceterisque nonnullis arboribus effici, ut fructus ingustabilis, frons dulcis, atque gustabilis sit. Fructus enim naturæ conditionem puram continet, atque synceram. Enimvero siue nimum siccus, lignosusque sit, seu austerus, amarusue, aut male olidus, aut aliam quampiam difficultatem sortitus, ingustabilis redditur. At frons quia humidior, ac pensilis est, moderationem aliquam obtinet, quod etiam in lasere, atque alijs plerisque acribus patet. Folium enim laseris suave, fructusque mollis est, propter humorem. Quippe acrimoniam moderat permixtus humor aquosus. Itaque aliquam saporis gratiam generat. Contrà, siccitas uehementiora omnia reddit.

10

Cur quedam, cum uiridia sunt, mandi possint: cum uero siccificunt humoris temperie sublata, ingustabilia relinquuntur. Curque in quibusdam radices ingustabiles sint, caules autem mandi nimirum possint, et contrà. Caput XIX



Mnino multis id euenit, ut cum uiridia sunt, mandi nimirum possint, saporisque aliquam reddant suauitatem, propter commistionem aquosi humoris: cum autem siccificunt humoris temperie sublata, ingustabilia relinquuntur: ut germina uitium, & stipitum, & aculeatorum quorundam, & leguminum aliquorum, ut cicere, fabæ. Ad summam, eorum quæ dulcedinis aliquid reddunt, commune id omnino propemodum sit, quorum succi per se acerbiores, aut acriores, aut amariore. Temperati enim à natura humore aquoso meliores, dulcioresque saporis suscipiunt: quod & in myrtis, ac punicis fieri certum est. At si qua talis natura arborum, aut omnino plantarum est, ut fructus uiribus synceris progeneret: folia tamen partesque alias creet per mistionem: nil prohibet (sicut dictum est) mandi folia posse, fructum uero ingustabilem esse. Proximè his, & in radicibus quoque cibo idoneis est, quarum folia ingustabilia penè sunt, utpote sicca, spinosaque. Caules autem mandi nimirum possunt, & radices ipsæ suauitatem etiam reddunt. At sunt e contrario, quorum cetera cibo apta, & suauia sunt. Radices autem ingustabiles, quia lignosæ, amaræque, aut denique male sapidæ, uel insipidæ sunt. Differrentiam haud paruam natura quoque uaria animalium facit. Etenim quæ nobis insipida sunt, ceteris animalibus sapida sentiunt, propter uirium bonitatem, facultatemque conficiendi. Alia tamen alijs in genere quoque illorum grata, & in sapore, & in dispositione animaduertimus. Delectantur enim alia teneris, alia siccis potius. Nonnulla etiam dum tenera sunt, à nullo gustantur. Sicca autem cibo idonea propterea sunt, quia quantum in his amaritudinis, difficultatisque fuerit percoctum, excrementumque est solis opera, ut sesama, ut erisimum. Hæc enim uiridia tangi à nullo animali uidentur propter amaritudinem, & grauitatem saporis: sed siccata acceptiora euadunt, fructusque eorum suaves efficiuntur. Atque eorum causas huiusmodi putandum est. De fructibus, qui cibo idonei sunt, ratio facilius reddi potest. Horum quippe humores puri, syncerique sunt, uelut à natura liquati, purgatique, ut & pluribus, & magis ualeant conuenire.

40

De uenosis plantis. Curque eorum partes tantum medicæ sint. Item alium agrum ad alia medicamenta utilem esse. Caput XX



Ed de uenosis, & his omnino, quæ uires obtineant aliquas, considerandum deinceps est. Quippe in his, neque uires eadem intelligunt, neque pares in omnibus illico à radicibus sumpto initio intuenti. Nec enim superioribus omnibus, seu folijs, ramis, fructibus eadè uis inest: & differre quidè pluris, minorisque ratione aliquid, esse consentaneum dixerim. At aliqua esse, quæ penitus nequeunt agere, quod pars reliqua potest, ut semen, & cau

& caulem: quod radix, uel ediuerso radicem, quod semen, & caulis, hoc magis mirandum. Ergo causas ex prædictis petendum. Cum enim naturam, atque temperiem suam unumquodque habeat, uires quoque uarias habeat, necesse est: ut alia colliquare possint, atque discernere, alia nequeant: & alia magis possint, alia minus, & seruefacere, & coquere, & frigefacere, & siccare: & reliqua pari ratione addendum. Sed fructus maxime discrepare consentaneum est: siquidem non uniuersa natura radicis, & fructus, & cæterarum partium similis sit. Sed alia incoctæ penitus sint, alia coctæ, & omnino constantes ex pluribus. Itaque efficitur, ut & sapore, & uiribus, inter se plurimum distent. Ita enim, tum in agrestibus, tum in urbanis uidemus: quorum radices amaræ, lactuosæque sunt, horum fructus esse prædulces, quasi ex incocto, percoctos. Quod idem uiribus quoque uenenorum euenisse putandum. Quamobrem non temere sit, ut in alijs radix, in alijs pars alia qua ex cæteris plantæ eiusdem amplius ualeat. Nam & radices amplius à radicibus differunt. In ijs etiam, quæ generis copulantur societate, & semina seminibus, & reliquæ partes multo inter se uiribus distant, propter agrî, cœlique conditionem: sicut & frumentum, & cæteræ fruges pondere propter alimentorum uarietatem. Quapropter medicamina longe præstantiora medicaminibus explorantur, quæ longo intervallo minime distant, ut elleborum nascens in Oeta monte, melius Parnasico est. Validius enim esse illud putatur, minusque aptum medicaminis, 20 Causa quamobrem ualidum ita sit, similis atque in fructibus. Aëris enim duritia, nutrimentisque largitate grauitas in eo quoque tractu sicut in Boeotia prouenit. Porro alius ager ad alias uires idoneus est, quemadmodum in fructibus quoque perficiendis animaduertimus. Sunt etenim loca, quæ ne excoquere quidem uillo modo uires medicas ualeant. Quippe multis in locis, & niger elleborus, & aliæ radices hebetes, imbecillesque comperiuntur. Vnde credi haud temere possit, aëre frigido, & solo aperto, atque etiam alimento modico opus esse. Et quidem uenena in montibus plurima nasci uidentur, & in ijs maxime qui altissimi sunt, atque amplissimi. Et de his satis dictum iam est.

De causa odorum. Curque in eadem planta partes aliæ odoratæ, aliæ inodoratæ. Cur etiam in arboribus flores, qui minores sunt, odoratiores sentiamus. Cur præterea odor in flore aut sit, aut non sit. Caput XXI



E odoribus, quoniam ij quoque particulatim fieri solent, causas easdem, aut certas proximas esse putandum. Excoctio namque alijs in flore potius, alijs in fructu, alijs in folijs, ramisque aquosis, & quasi insipidis, aut acribus. In flore, ut rosa, croco, & reliquis generis eiusdem, quorum quæ minus bene sapida sunt, odoribus etiam suis grauitatem quandam præsentant, ut lilium, liliū, & eiusmodi. Quædam nullam penitus reddunt suauitatem odoris, sed grauius redolent: quod à sapore quodammodo fieri, nec esse rationem odoris ab illo remotam, certum est. Enim uero, quæ diluta, & insipida sunt, hæc penè omnia inolida quoque sentimus. 40 Quippe in his (ut ita loquar) duobus exordia qualitatibus inolida habentur, cum & sapor natura quadam aquosa est, & humor aquæ nimium reddit. Alterum enim misceri quasi non potest, alterum autem ex nimietate tolli necesse est: itaque id etiam misceri quodammodo nequit: quæ quidem res à ratione odoris auersa penitus est. Odor enim mistione quadam consistit. Quæ autem alimento uberiori, uehementiorique nutriuntur, ceu palustria, hæc odores etiam proximos suo alimento graues scilicet quosdam, ac turbidos reddunt. Cum igitur alijs in radicibus mistura eiusmodi, atque moderatio sit, alijs in ramis, ac folijs, alijs in fructu, pluri-

bus uero in flore: has easdem partes in singulis odoratas esse ratio est. Ideo& flores arborum, qui minores sunt, odoratores sentimus. Plus enim terræ humor in maioribus inest. Si tamen hæc ratio minus placeat, aliam quæres. Igitur in uniuersum, atque simpliciter satis fortasse dicta hæc sunt. At uero in eo, quod prædicta temperamenta singulatum animaduertere deceat: non temere plurimis odorem esse in flore appareat. Agitur enim in eo prima quasi, & leuissima coctio, siue siccitas, siue aliqua mutatio uenerit. Cum uero fructus inceptus sit, odor non amplius permanet, quia plus iam adest humoris: præterquam si qua humore tali suapte natura sint, ut odorem ualeant conferuare. Ex toto penè fructus, qui gustu suauis sunt, bene olent. Nam & mālum, & pirum, & mespilum tale est. Adde quos priuatim acceptos uocamus, ut cedrida, & terebinthum, & similes: quos& pingues sentimus, ut fructum abietis, pini, picæ, lauri.

Cur dulcia minus olent. Cur& odor in istis sit, in quibus inest aliquid acrimoniæ. In quibus item locis odorata nascantur. Præterea odorum alios ualidos, alios infirmos esse. Tum qui in succis durent. Caput XXXII



H dulcibus nullus ferè bene olet. Nam & mālā dulcia odorem minime omnium reddunt, & eo minus, quo dulciora sunt. Ratio, quod succus dulcis crassior, atque terrestrior est, præsertim cum mistus fuerit in fructu. Odor autem humoris tenuioris, siccioris, aptius distillari potius est, de quibus posthac etiam differemus. Verum (ut iummatum agamus) odor & foliorum, & ramorum, & in totum arborum, atque plantarum in eisdem generibus est, in quibus aliquid acridinis, aut pinguedinis inest: quemadmodum certe fructus quoque supradicti se habent, & quidam etiam ex uinosis. Fructus etenim myrti odoratus, & ea quoque odorem aliquem reddit, & quæcumque talem acrimoniā, siue pinguis, siue uinosa, siue etiam alius succi in suis fructibus habeat. Eadem ratio in genere quoque herbarum est, quas coronarias appellamus, ut serpylli, sisymbrij, cæterorum& in oleribus, ceu ruta, apio, menta. Siccitas enim, & acritas, uel acerbitas his innotescit, non in fructibus, neque in cæteris, quæ humoris eiusmodi sunt. In omnibus uero, tum in his, tum cæteris odoratis redditum illud per definitionem omnino inest, ut demistum siccum, quod lapidum est, uim aliquam pariat odoris. Profus odoratiora, suauiora& tam tota, quam particulatim locis placidi spiritus, ac siccis proueniunt: scilicet exhausto humore aquoso, excocto& reliquo melius. Siccitas em̄ (ut simplicius loquar) odori conuenientior est, & omnia odorata eo potius uergunt. Argumento etiam illud est, quod tractibus æstuosos plura, meliora& odoratorum genera prodeunt. Melius enim ibi concoquitur, & quædam siccata olent. Viridia nihil olent, ut calamus, iuncus: nonnulla etiam plenus olent siccata, ut iris, ac fertula campana. Sic et cenanthes odoratior est. Non tamen omnia ita se habent: sed adfunt, quæ è diuerso naturam sortita sint, quæ profecto diuissimè oportet. Diuisio uero simplex occurrit. Aliorum enim odores exiles, ut florum ferè omnium, qui uirides, atq; recentes sunt, odoratores: temporis autem spacio decurro, exhalationis causa hebetescunt. Aliorum odor ualidior est, ut eorum, quæ terrena magis, & in terrenioribus posita sunt: quibus& uis quædam aquosa permista est, qua siccata, inueterata& ad quoddam usque temporis spaciū odoratorum redduntur. Cuius generis poma coronea sunt, quæ& ex coronariorum numero acrem reddunt odorem, ut abrotonum præcipue, & sampucū, & crocū. Vnā em̄ & quantum humoris aquosi est, exhalatur, & alimenti cessat accessio: & quædam ueluti coctionis aliquid per se ipsa recipiunt. Vnde fit, ut à suis decerpta arboribus odoratiora reddantur, ut mālā, & quædam alia. Euenit, ut inter herbacea, quæ uiridia

uiridia sint, nihil oleant propter humorem: sicca autem oleant, ut alia quædam, & scenum græcum: Nam & uinum tunc maxime constans perficitur, atq; odorem capessit, cum pars eius aquosa diffolata, exacta q; est, Hæc igitur omnia odoratiores in uetustate efficiuntur.

Cur debilia celerius euanescent. Cur etiam nimium exiccata deterius oleant. Tum quomobrem flos eorum, que toto corpore odorata sunt, non spiret. Caput XXXIII



Væ autem debilia sunt, celeriter euanescent, ut uiolæ tam nigrae, quam candidæ, amaræ, maleq; olidæ in uetustate redduntur: nec sicuti rosæ suum odorem etiam sicca conseruant, dum deficient penitus: uirides tamen à longe redolent, sicca non nisi proxime admodum. Ratio, quod indurata quodammodo defectu proprii caloris halitum reddere nequeunt. Nam ad usum quidam unguentarij eas quoque aliquatenus siccare consueuerunt, ut odorem synceriores relinquant. Sertula campana uel plus temporis odorata edurat. Cæterum adsunt, quæ inter odorata nimium exiccata deterius oleant, eo quod acriorem, duriorēq; reddant odorem. Est enim quemadmodum uini, atque in totum succi, saporis uel duritia, uehementiaq;, sic etiam odoris: quod & inter agrestia quibusdam euenire uidetur, ceu serpyllo, & siymbrio, & in genere olerum rutæ præcipue. Sunt enim odores eorum duri, exsertesq; omnino dulcedinis. At urbanorum odores unā cum remissione dulcedinis quoque aliquid, benignitatisq; habent. Est enim ut in sapore, ita etiam in odore dulcedo. Et cæteræ propemodum generum appellationes, tanquam naturæ eorum non multo inter se dissent. Sed quinam odores sint diutini, & quificatis meliores reddantur, cæteraq; similia, spectari ex prædictis oportet: quæq; à nobis sunt prætermissa, facile per hæc eadem conspici à cæteris possint. Quæ autem non particulatim, sed toto corpore odorata sunt, de his quæret sane aliquis, quod prius dictum iam est, quomobrem flos odoratus esse non potest. An non ex ratione id quæret? nam & cæteris odore carentibus flos istiusmodi deest, sed in his potissimum enotatur: quia ratio, naturaq; odoris præcesserit. Causa illa esse uidetur, quod generatio floris concoctio quædam est: quod autem coquitur, in mutatione illius est, quod iam antea esset. Quæ igitur odorata ipsa non sunt, horum flos, cum humor concoquitur, odorem aliquem capit: quoniam concoctio in mutatione est. Contra quæ odorata sunt, horum odorem permutatione uariare necesse est: quod si plenè sint odorata, flos minus odoratus proueniet. Hæc enim diuersitas uelut hebetatio pristini odoris, ac uirium esse uidetur. Quapropter florem tunc olere posse affirmant. Sed hoc an ita sit, cogitandum. Fidem enim aliquam affert. Simile tum euenire uidetur, ut in succis coctis, atque in crudis, cum ignem sentiunt aut solem: quippe facta mutatione, alteri in melius, alteri in deterius commutantur. Vis enim caloris alteros coquit, alteros ex sua perfecta conditione dimouet. Cum enim res finem suum attingerit, mutationem in deterius fieri necesse est. Quod etiam hac in parte euenire uidetur, cum odor emolliri inceperit. Fit enim uelut remissio synceri odoris: tum etiam euenit, ut succus eiusmodi, qui suapte natura siccus est, in prouentu floris humefcat, si secus generatio fieri non possit, atque ita fequatúr remissio. Sin autem non humore, sed dulcedine opus sit ad fructuum generationem (Omnia nanque ex dulci creantur, & hinc flores magna ex parte dulces sentiunt) ea quoque ipsa ratione dissoluti, effeminatq; odorem consensaneum est, quasi dulcescat exempta scilicet acedine illa syncera. Horum igitur causam talem esse existimandum.

Cui fructus agrestes odoratiorei urbanis suis generis sint. De causa odoris in uino: & quomobrem, quod morale uocatur, celerius purgetur. Item si in succo est saporis gratia, & odor de succo prouenit, qualis interq; sit.

Caput XXIIII



U^r autem fructus agrestes odoratiorei urbanis suis generis sunt, ut m^ala, pira, sorba, melpila, & reliqua: atq; ipsorum malorum tam syluestrium, quam urbanoru, quæ acerbissima sunt, suauissime olent. Atqui cum odor per coctionem acquiratur, quæ maxime cocta sint, hæc olere melius putaueris oportere. Ergo de his dici quidem in uniuersum potest, agrestia duriora esse: quod in cæteris quoq; rebus naturæ animaduertitur. Sed conuenientius ratio assignetur, si quis coquendi genera saporis, atq; odoris discernere ualeat, ita, ut quo in genere uis saporis, odoris uel consistat, compertū sit. Enim uero differentie aliquid inesse uidetur, siue differant inter se, siue idem sint aliqua cōmutatione: sed hoc diuisioni generali mandandū utq; sit. Ad rem autem nobis propositam illud satis est, quod & latissime patet: dulcedinē, & ex toto saporis suauitadinē fieri non nisi succo crassescente solere: quæ de causa fructus senescentes, soleq; feruescentes dulciores omnes efficiuntur. Crassantur enim exempta parte humoris aquosa. Odoris autem ratio in priore quadam, minusq; perfecta coctione uersatur. Argumentū, quod ipsa etiam odorata, ut pira, m^ala, & cætera plus reddunt odoris, si cocta in plenū non sunt. Atqui saporis excoctio tum potissimū consummarur, cum in plenū excoquitur, & quidem in primis succorum mutationibus uidere id licet. Vberius namq; odores inde exultant, ceu simul, & flatilis quædā esset odoris conditio, & succus suam haberet naturam, ad quam cum uenisset crassatus, excoctusq; minus quidem odoris spirare, dulcedinem ramen conuenientē, atq; in totum sensui accommodatam possit acquirere. Agreste igitur genus ad priorem usq; tantūmodo coctionem deueniens, odorem quoq; ratione adipiscitur pleniorē. Urbanum, cum perfectiorem attingat cocturam, alimentoq; abundet, propter uehementiorē confectionem succos suos in dulcedinem, odorisq; hebetudinē uertit. Tum etiam humiditatem, siccitatem, largitatem alimonie, parsimoniam uel, cōmoditatemq; afflatus conferre aliquid ad odorem uersimile est. Si quidē omnino, quæ arida, locisq; aridis sunt, quæ paruo alimento contenta degunt: quæ placidæ asperantur, odoratiore proculdubio sint. Humor enim largius se permiscens, odorē hebetat. Quapropter locis opacis, dilutisq; odorata nunq; proueniunt. Nimirū ergo dum crassantur, mutationē illam recipiunt, sicut dictum est. Omnino (quod simpliciter dici potest) genus agreste siccius, ieiunius, spiratius, feruentius, atq; etiam succo tenuius est, nec succum carni permistū gerit modo urbanū. Quæ quidem omnia iuuant ad odorem efficiendū. Licet hoc in uino etiam peruidere: quod cū dulce, molle uel ue est, caret odore: quod tenuius inter cætera est, hoc odoratius. & celerius hoc, q̃ pingue, crassumq; consistit, atq; perficitur. Item unā cum odore euenit, ut fece sedente, uel segregatio humoris, partisq; terrenæ, exhalatioq; sortis aquosæ efficiat: ita ut ex his omnibus sua uis illa exoriatur olentia, id est attenuazione, segregatione, exhalatione. Nam & in ipso dolio pars uini, quæ est iuxta secem, minus redolet. Hæc eadem causa est, & quomobrem genus uini, quod morale uocatum est, celerius purgetur, consistatq;. Est etenim tenuius, & obiter quasi uitio misturæ immune. Confirmatur id etiam, quod ex tenuioribus, & succo probatis, spiratisq; commode odoratiore proueniunt, & ex uetustioribus potius, quam nouellis. Item quod, quæ large olent, ac ualide, mollitiā in gustatu nullā præsentant: utpote cum simul manere nequeant, odor suauis, & plenius ille, ac ualidius: quod etiam in unguentis, incensis, coronamentis, cæterisq; odoratis euenire uidei. Hæc etenim omnia amara sunt, maleq; sapida, sicuti amygdalæ. Et mōtana uero uinorū genera, odorē plerq; obtinent,

obstant; quæ dura, minusq; in sapore commendata existunt. His igitur omnibus constar aliud esse, quod faciat odoris suauitatem: si tamen causæ odoris, saporisq; modus adsit, quod ex ambobus exultet, suauissimum est. Prefertim, cum in quibusdam agrestibus acrodo, atque synceritas tædio admodum sit, ut retulimus: ceu in serpyllo, abrotono, ruta, permissioneq; natui humoris temperatiora, suauioraq; reddantur. At si alterum immodice adsit, querimus certe quod deest. Simul enim quodammodo in eiusmodi gustabilium genere odoris, atque admodum diximus: ut si in succo dulcedo sit, aut aliqua genera saporis: odor autem de succo proueniat, qualis nam sit uterq; & quo modo habeat. Illud igitur ex prædictis iam patet, quod principio quærebatur: quamobrem fructus agrestes sint odoratiores, atq; proinde euenire appareat, ut in perfectis, & priuatijs potius consistat odoris suauitas: siquidem ex his alia amara sint, alia actia, alia exilia, alia acerba, alia aliquid habeant tædij. Nec temere forsitan. Exit enim halitus quidam de his maiorem in modum, qui si temperata sunt, modicus sensui occurrit: sin minus, difficilis, grauisq; est. Nec in priuatione genus id collocandum, sed aliquam potius naturam aliam sortitum appareat: siquidem nonnullam uim extremorum obtinent efficiendorū. Igitur odor his de causis in succis minus dulcibus, atq; insuauibus inest. Odorum autem (ut ita dixerim) omnium potestas pro subiectæ naturæ ratione proculdubio est.

Cur aliqui flores suauiores distantes, quàm proximi sentiuntur. Et cur odores plurimi mane sentiantur, crescente die minus, meridie minime. Tum de herbis, cui nomen hesperidi. Item que etiam plantis ad odorem aptissima. Et quibus rebus odor res debentur. Cur præterea arcus coelestis loca ubi constituerit atq; arbores reddat odoratos. Cur deniq; incensa redolect. CAP. XXV.



Aeterum aliqui ex numero florū distantes odoratiores, quàm proximi sentiuntur: quod etiam in uiolis deprehensum est. Ratio, quod ad locum remotiorem odor putus, syncerusq; deferatur. Effluunt enim de cæteris etiā partibus plantæ aliqua, quæ longinquius transire non possunt, quia terrena magis, crassioraq; sunt. Quippe in uniuersum odorum generi imbecilli synceritas ualentiore. mistura conueniens commodior est, sicuti & saporibus. Exempli gratia, myrtus mulso macerata, melius quàm syncera redolect incensa putatur. Odor enim melior, atq; dulcior redditur temperatus. Hoc idem & succis euenit. Sunt enim qui misturam desiderant ad acquirendam suauitatem. Omnino (ut simplicius agam) odores plurimi syncerioresq; mane sentiuntur, die crescente minus, meridie minime, quod sol omnia siccatur: & quemadmodum horis diei, ita etiā anni temporibus pro ratione mutantur: Præterquam si qua suos odores, maturitatesq; tempore alio capere solent: aut coeli temperies aliqua ad odores conficiendos accommodata contingat: ut in herba, cui nomen hesperidi, patet: hæc enim nocte plus redolect, quàm interdiu. Cæteris autem suo spacio non ultimo, sed medio cum maxime uigent, quæq; odoratissima sunt, uel ubi paululum à suo uigore declinarunt. Haud enim fortasse conueniendi ratio eadem est saporis, atq; odoris. Nouella etenim planta alimentum excoquere nequit, utpote quæ plus attrahat, quàm possit conficere. Annosa imbecillis penitus ob inopiam caloris insita est. Cæterum uetustæ odoratiores sunt, quàm nouellæ. Minus enim humoris in his est, itaq; magis ualent exuperate: sicut etiā quæ solo gracili posita sunt. Licet tamen simpliciter illud asserere: omnia quæ uigent præstantiora tum sapore, tum odore intelligi, modo finem hunc natura illis statuerit: frigore geluq; tam sapores, quàm odores hebetiores ob densa-

tionem redduntur. Nil enim concreta exprimere possunt, tum etiam obstant quodammodo ex violentia frigoris: nec modo illa, sed etiam sensus tollitur: quippe utraque ex suo statu frigoris iniuria dimouentur, quamquam acrius illa, quam sensus: nam & fructuum dulcedine figus per gelationem euaporando, educendoque eximit. Pari modo & nimieras æliuum saporibus efficit: alia namque exurit, alia non concoquit, alia uelut putrida, & præhumida reddit (ut de ficibus dictum est) odores forsitan nonnullorum magis conseruat: & forte illos creare potest, qui familiares locis aridis sunt. Hos enim cōstar esse omnino synceros. Multos tamen peruertit, qui scilicet consistunt in fructibus: quia succiosiores, indiscere
 10 tiq̃ isti sunt. Quippe odor non nisi maturescenibus fructibus consistere potest. In totū mixturæ modum inesse, & æturamque siccitatis in ratione odoris, quæ quodammodo innotescere conuenit. Siccitas etenim est, quæ odores uel omnium, uel certe aliquorum facere potest. Quod obiter in terra quoque perspicuū est, ubi tempore æliuo solo adusto imbres accesserint. Humor enim admissus, feruentiq̃ pulueri permixtus, odorē generat. Quod idem in cæteris etiam facit: nam & quod de arcu cœlesti referunt, arbores, & loca reddere odorata, ubicunque constiterit, tale est. Reddidit enim non in omnibus modis odorata, sed si qua materia combusta proxime sit. Nec id forsitan per se agit, sed quodammodo per euentū: Impluit enim locis, ubi constiterit. Quippe materię combustæ admixtus hu-
 20 mor uaporem quendam, odoremque excitat. Neque enim aquæ multum descendit, sed magna parte guttæ itorant, ita ut caliditatis, siccitatisque modus non desit. Materia quoque ipsa certæ sit qualitatís, opus est. Non enim in qualibet, neque quibusuis modis illud fieri potest. Omnino uel in cæteris crematio, atque permixtio creabunt odorē, si modice fuerint. Nam & incensa ex hac ratione imposita igni, reuolent, molli scilicet, nec rapido cuiquam & perurenti: sic enim modus seruatur odoribus, aliter corruptio sequitur.

Cur animal nullum odoratum sit, cum in genere plantarum odora competiri permulta possint. Curque aliquis scetida homini sit: brutis uero odorata. Item sapores, odorresque agri, cœli alimonie ratione consistere. CAP. XXVI.

30 **H**ic sane proxima, & eadem ferè causa est: quomobrem in arboribus, & ad summam in genere plantarum odora competiri permulta possint, animal nullum penitus odoratum sit: nisi quis pardalim dixerit sensui belluarum bene olere, ut dictum iam est. Genus etenim animalium siccum, & calidum suæpiè natura est: itaque habitus eius tenuior, atque purior. Plantæ plus habent humoris, naturalioresque (ut ita dixerim) exstant, idcirco halitum quoque earum talem esse necessarium. Cernino alimentum simplex plantarum est, nec quicquam superuacuum habet: animalium uarium est, multaque habens superuacua. Confert autem & aliquid ad odorem conficiendum, naturam qualitate anecessisse idonea. Principium enim, & res prima natura est. Neque enim arbores omnes suauiter olent, quia non cōsimi
 40 li temperamento sunt conditæ. Hæc ita esse censendum: nisi forte odor, quem animalia reddere nata sint, certus esse humano sensui nequeat, eo, quod hominis olfactus omnium determinatus est. Quippe cæteræ animantes & à longe sentiunt, & quæ proxima sunt, percipiunt exquisitius. Unde alia grata, alia penitus insuauia hic concurrunt: sicut etiam homini alia magis alijs grata reuolent. Nonnulla etiam omnino uitamus. Sed mirum (quod antea diximus) si quod nobis scetidū inodoratumque sit, gratum illis occurrat. At mirum istud non sit, quandoquidem & alijs euenire hoc idem uidemus in ipsis protinus alimonijs, quorum temperamenta potissimum causam habere quispiā crederet: utpote, quæ inæqualia sint,

219. omnia. Figuras enim illas Democriti affectiones, mutationesq; certas efficere posse arbitrandū, cum certas habent formas (ut dictum est) hæc ita asseruisse par est. Quod autē paulò ante diximus, nunc etiā asserendum: prorsus enim odoris, saporisq; ratio qualitatē quandam & agri, & coeli, & alimentū exposcit. Nec excedere, nec deficere, nec auersum esse subiectis alimentum oportet. Quippe quod excedit, coctioni impedimēto est. Quod deficit, uelut materia caret. Quod alienū est, fungi naturæ officio nequit. Quicquid in cultu, curaq; uersatur, & ut solum conueniat, & calores, ac frigora sentiat. Hunc enim in modum alimentū, facultas quoq; coquendi subministratur: fructusq; perinde atq; saporis exultrat ueritas, ut illa inter se differant, hoc ita esse argumentis pluribus constat. Alia enī alio in agro bene olida, bene sapida, frugifera, sterilia, germinis fertilia, infertilia. Nam ea quoq; sub eandem causam ueniunt, de quibus non nisi coeli statū, ac terræ alimentum pro causis assignare debemus. Enimuero quæ uetent, augeāt, faciāntq; cocturam, iucunditatemq; saporis hæc sunt. Sed cum saporū, odorumq; uaria difformatura sit, idcirco temperamentū non unum omnium est, nec alimentum commodum omnibus unū, sed singulis quod propriæ naturæ respondeat.

Quamobrem non omnia odoratorum genera locis omnibus feruidis prodeant. Et myrri Aegyptiæ cur odoratissima sint, cum cetera inodorata gignantur. Cur item in Aegypto cetera præter myrtum, inodorata sint. CAP. XXVII.

20. **N**de illius etiā quæstionis solutio exultrat: Quamobrem cum loca feruida odoris fertilia sint: nec omnia genera odoratorum locis omnibus feruidis prodeant, atque etiā magis illius: quamobrem quæ alibi carent odore, hæc locis feruidis odorata sint, ut calamus, & iuncus in Syria: quæ autem odorata alibi, nihilo odoratiora comperiuntur locis eiusmodi immo uerò hebetiora, ut quidam aiunt. Quamquam ut odoratiora sint, ratio postulare uidetur. Hæc enim omnia prædicta causa continet. Quippe coeli & alimenti conditio alia conuenit alijs, præsertim cum etiā ipsa genera diuersa inter se sint. Quapropter & Syriæ ipsius pars exigua est, quæ calamum ferat, & iuncum. Loca item quæ succum balsami, ac cetera odorata pariunt, suis domesticis apissimè se accommodant: cæterisq; quæ alibi odorata nascuntur, minus sufficiunt, sicut & fructibus euenit. Non enim parem calorem desyderant omnia, neq; similem, sed alia maiorem, molliorem ac minorem. Quod etiā in ijs patet, quæ aqua coquuntur: & ad summam in ijs, quæ arte conficiuntur: nonnullam etiā ex singulis idem constat. Etenim in Aegypto flores, coronamenta q; deterrima ferè omnium generantur: quia cælum caliginosum, ac roscidum est. Quippe locis eiusmodi nullus penè odor cōtrahi potest, quoniam deest facultas coquendi: sed potius aridis, in his enim planè excoquitur. Nam ea quæ apud Cyrenam proueniunt, non nisi ratione siccitatis odorata consistunt, tum cætera, tum uel maxime rosa, & crocum. Ager enim ille tenuis, siccus, nec nimium feruidus, aëre tamen puro, sitientiq; ambitus: quæ quidem ad odorē creandum apissima. Rosa uerò, & crocum paruo alimento contenta sunt, & proinde cæteris odoratiora creantur. Sed mirabilis, quod de myrtis Aegyptijs fertur: quamquam enim cætera inodorata penitus sunt, illæ tamen odoris suauitate excellunt: nec quicquam iuuat siccitatē, caliditatem, cætera q; ferè, quæ sensus percipit, non minus in quibusdam ex reliquis, sed magis inesse. At est forsitan genus, quod translatum in alios tractus. ut Cyprum, Rhodum, Cnidum, non nihil suarum uirium feruet: nihil tamen idem, sed fronde etiā redditur ampliore. Quippe tenuis illa Aegyptia est, & odore longè præstantior: itaque loci natura illius

- causa potissima est, proprietatemque admirabilem præ cæteris gignit. Nam & quod fructu exiguo, nec candido, sed nigro genus hoc est, nihil odoris rationi repugnat. Fit enim utrunque causa siccitatis; & quidem causam fructus exiguitati assignant, quod aqua deest cœlestis. Quamquam fructus desiderat, rores enim haud satis auxiliari ualere. Sed hoc, & quicquid eiusmodi causæ sit, ut pleraque loca uires peculiaries possideant, priuatiùs disputari certe desiderat. Communis enim sententia, qua a gros permultos habere inæqualitates asseritur, uera quidem: sed priuatas etiam uires, ac differentias exigit. Proximū igitur esse illud quoque uidetur, quod puniceis in Lycia euenit: ut enim sapor illic peculiaris, sic in Aegypto suauitas illa odoris peculiaris est. Sed uiciniam, naturamque amnis causam illie esse putauerim. Punica enim aquarum auida est, & mutari eam confirmat ex acida in dulcem, si aquæ copiam obtineat. Itaque amnis perfluentis rigationem non modo quantitatem augeri, sed etiam qualitatis mutationem afferri eiusmodi mirum non est. Aegypto autem rationem peculiarem comperire tentandum, quæ suauitati odoris conueniat. Ergo talis inde præcipue oriri posse uidetur, si omnia componentur in unum, uidelicet genus myrti commune ac proprium, & solum, & cœlum. Planta etenim ipsa sicca omnino est, & genus illud Aegyptium plus quam cætera siccet: quod frondis angustia, & fructus exiguitate, coloreque constat. Hæc enim siccitate omnia ueniunt, siccum parum habere humoris certum est. Quod parum est, facile excoqui potest, suauitas odoris excoctione consistit, quæ olfactui congruit: hæc neque dulcis est, neque ullam saporis gratiam habet, atque ratione plantæ hæc antecedit; soli autem, & aëris opera, quod solum siccum, ac mollis, ac placidus est, quæ utraq; cocturam plurimum auget; alterum quia concoquit, alterum quia humefacit. Nam & in hac parte syluestres odoratiores urbanis: & quæ in apricis positæ sunt, præstantiores umbratilibus exunt; præcipue quæ meridiem spectant. Quæ quidem omnes minus alimenti hauriunt, meliusque quod hauserint, coquunt, itaque efficitur, ut non in longitudinem crescant, sed fructuose euadant: quippe quæ crassitudinem capiant, findanturque multipliciter: eo quod initia multa capessunt seruoere scilicet percoquente, dirigenteque utriusque. At illæ quæ loca tenent umbrosa, impetum naturalem in unum tantummodo faciunt. Quocirca uirgæ non in crassitudinem, sed in longitudinem potius adolescunt, & baculis perquam idoneæ fiunt, ut tum alibi, tum circa Cisthum patefcit. Sed hoc omnium arborum commune fortasse est. Reliquum est, ut causam, qua odorata cætera esse nequeant, explanemus. Non causa danda est, quæ abunde descendens humefacit flores largius, utpote natura humidiores: reliqua leuius, quæ sicca excretaque sunt. Quamobrem myrtus humiditati huiusmodi ualentius resistere potest. Argumento illud etiam est, quod de ea superius diximus. Fructum enim pusillum ferre propterea creditur, quia non satis cœlesti aqua potitur. Igitur causas myrti per illa ipsa indagare tentandum.

Cur frigidis locis odorata proueniant. Tum de iride illyrica. Cur item aqua nullam possint recipere odorem: unum quoque oleum possint. Cur præterea unguentarij in oleo reponant odores. CAP. XXVIII.



Doratorum autem quæ tractus frigidi pariunt, ratione calori in terra conclusio imputare debemus. Vis enim caloris est, quæ ubique excoquit. Sed alias extemplo occurrit, alias se telluri insinuat. Quemadmodum in autumnali fructuum maturitate patefcit, proximū enim quod euenit est. Quippe calor, qui pulsus est à frigore, circumobfiscens in terra excoquit. Verum neque limosam, neque pinguem, neque lentam, glutinosamque

- notamq; terram esse oportet. Humoris enim, leniorisq; causa nō æque calor suo fungetur officio: sed talem esse profectio res exigit, ut neq; frigiditatem aëris circumfusi admittat, & quantum calor in se tenet, obturare, seruareq; polleat. Hæc enim de causa iris melior in Illyride, quàm in Macedonia est: in Thracia uero, cæterisq; frigidiore locis, ac minus cocturæ idoneis odore penitus caret. Ager enim præpinguis, & humor multus, & hyems uehemens prohibent. Tepidis tamen atq; gracilibus minus odorata creatur propter molliem aëris. Haud enim parilis effici circumobstantia potest: nempe uires ad coquendū idoneæ ex amebus illis solo, & aëre petendæ sunt: quemadmodum de his quoque odoratis
- 10 agendum, quæ super terram excellunt. Sed de his satis dicta hæc sint. Odores autem uicissim nullus fructus, neque pars ulla arboris recipit: ita scilicet, ut aliquid certi odoris spirare possit. Quamobrem quædam acria iuxta scriere cōsueuimus, ut cepas, & illa iuxta coronarias plantas: id enim suauare ad creandū odoris suauitatem affirmat: quod si uere narratur, alterum ex duobus illis causam dixerim: aut quod quantum mali odoris addit, hæc detrahunt, alitur enim unumquodque re sibi simili, quodq; sibi cognatum sit, nimirū attrahit: itaq; parte aliena illa sublata, residuum purius, odoratusq; relinquitur: aut quod locum sua caliditate, edacitateq; excicent, siccis etenim locis omnia proueniunt odoratiores. Sed hoc uelut per suppositionem dictum accipies. Succi uero expressi odores facili trahit,
- 20 & maxime oleum, & uinum, quæ quidem res minus dari rationi posse uidetur. Cur enī aqua, quæ tenuissima est, omniq; odore, saporeq; uidua, & omnino synæra, & nitida, nullum potest recipere odorem. Quæ autem sapida, olida, crassioraq; sunt, recipere possunt. Vinum tamen, etiam si res odorata non sit, infecta, sed iuxta posita, odorem potest attrahere, quod calorem in se aliquem habet. Vis enim caloris est, quæ attrahit. Quod cum aqua nullatenus habet (est enim natura frigida), nihil attrahere potest. Item quod suscepturum, seruaturumq; sit odorē, non tam tenue, simplexq; esse, quàm aqua debet. Odor enim receptus in eo delabitur atq; effunditur, quasi fundus nullus sit, qui obistere possit: sed callosus, ac densius esse oportet. Tale enim ad suscipiendum, seruandumq; odorem aptissimum est, dum ad utrumq; se modicè habeat: quod quidem utrumq; uino, & oleo
- 30 cōtingit. Et uingetarij uerò odores in oleo reponunt, cū enim aliās ad usum accommodatur, tum seruare odorē maximè omnium potest: quia incommutabile permanet, aqua protinus exhalat, & quasi eluit, atq; discernit. Tenuitas uerò (ut diximus) inutilis est, neq; enim aër retinere odorē potest, sed transmittere tantū idoneus.

Que sicca odorem potissimum suscipiant. Item quando uestigia leporum certius redolent. Tum quando nullo odoris transitu solum affici potest. Curq; odoratiores sint alia ex urbanis, alia ex syluestribus. Cur etiam uestigia leporum autumno præcipue redolent. CAP. XXIX.



40

X sicca ea potissimum odorem suscipiunt, quæ soluta, inolida, atq; insipida sunt, ceu lanæ, uestimenta, & quicquid generis eiusdem. Cæterum possunt & quæ saporem, odoremq; reddunt, ceu malum: hoc enim trahit, ac suscipit humorū odores. Quippe (ut simpliciter loquar) quod odorem sit recepturum, neq; præaridum, ut cinerem, aut arenam, neq; præhumidum esse oportet: alterum enim nullo odoris transitu affici potest, alterum diffundit, ac diluit omnem odorem. Hinc enim & uestigia leporum leuiter itrorato solo certius redolent: altius enim impressa firmiter adherent, nec sublimiter uagantia delitescunt: quemadmodum cum arida humus est, neq; demersa in profundum abolentur, ut cum terra limosa ob imbrem uel austrum est. Flatus enim, & aquæ aduersantur, perimuntq; odores. Quapro-

A	Bies, ἡ ἱάλας, est e- tiam plantæ cuius- dam maritimæ spe- cies, quæ petris adnasci- tur.	alica, alliij nucleus, allium, alnus,	ὁ χένδρος, ἡ γύλις, τὸ σκουροδόν, ἡ κλίβρα,	aschium tuberis genus, τὸ ἀσχίον. aspalax, talpa, ὁ ἀσπάλαξ. aspalathus, ὁ ἀσπάλαθος. alparagus, ὁ ἀσπάρταγος, cor- ruda.
ablaqueare, <i>ἐκχέουμαι</i> .	amaracus, ὁ ἀμάρακος, καὶ τὸ ἀμάρακον.	amarago herba, ἡ πικρία.	amentum, ἡ χεύχυνος.	athragena arbor, ἡ ἀθραγενή. atrifet, ἡ μελαγκρανεῖς. atriset, iunci species, ὁ με- λαγκρανεῖς.
abrotonum, τὸ ἀβρότονον.	ablinthium, τὸ ἀβλίνδιον.	acania spina, ἡ ἀκανία. καὶ ἀκανθα.	acanus, ὁ ἀκανθός.	atrifet, ἡ μελαγκρανεῖς.
acharnica rîgua, ederae spe- cies, ὁ ἀχαιρῆκος ἀφ' ὁδοῦ ἐ- κείνου.	acer, ἡ ἀκανθός, alibi σφρί- διαιμος.	achillea ordea, ἡ ἀχιλλέαι κραιβάς.	acini punici mâli, τὸ κικὶν ἢ ἐκείνη.	auena, ὁ ἑρικός.
acini punici mâli, τὸ κικὶν ἢ ἐκείνη.	acinus, oleaster, ὁ κύπινθος.	aconitum, τὸ ἀκόνιτον.	acorna, ἡ ἀκονθα.	auena, ὁ ἑρικός.
aculeosa, suffrutex, ἡ πολυ- ἀκανθός.	acuta spina, ὁ ἐκύνκανθος, καὶ ὁ ἐκύνκανθος.	aculeosa, suffrutex, ἡ πολυ- ἀκανθός.	acuta spina, ὁ ἐκύνκανθος, καὶ ὁ ἐκύνκανθος.	auena, ὁ ἑρικός.
aculus fructus phellodry- os & ilicis, ὁ ἀκυλός.	acaria, suffrutex, ὁ ἀχαιρῆκος.	acaria, suffrutex, ὁ ἀχαιρῆκος.	acaria, suffrutex, ὁ ἀχαιρῆκος.	auena, ὁ ἑρικός.
ad nepotum procreationē inhabile, τὸ ἀκατάλληλον.	agis primo innasci, ἡ αἰγίς.	agis primo innasci, ἡ αἰγίς.	agis primo innasci, ἡ αἰγίς.	auena, ὁ ἑρικός.
æmodorū scenogræco in- nascitur, & cumino, τὸ αἰ- μόδονον.	æquus frutex, ὁ ἴσος.	æquus frutex, ὁ ἴσος.	æquus frutex, ὁ ἴσος.	auena, ὁ ἑρικός.
agitatōriū, τὸ ἐκταράσσον.	agritius tamen græco utitur nomine.	agritius tamen græco utitur nomine.	agritius tamen græco utitur nomine.	auena, ὁ ἑρικός.
alba populus, ἡ λευκή.	albucum, ὁ ἀνέλευκος, alibi ἀσφάδελλον albucum inter- pretatur.	albucum, ὁ ἀνέλευκος, alibi ἀσφάδελλον albucum inter- pretatur.	albucum, ὁ ἀνέλευκος, alibi ἀσφάδελλον albucum inter- pretatur.	auena, ὁ ἑρικός.
alga, ὁ φύκος, eodem loco τὸ φύκος.	alica, ἡ ἱάλας, est e- tiam plantæ cuius- dam maritimæ spe- cies, quæ petris adnasci- tur.	alica, ἡ ἱάλας, est e- tiam plantæ cuius- dam maritimæ spe- cies, quæ petris adnasci- tur.	alica, ἡ ἱάλας, est e- tiam plantæ cuius- dam maritimæ spe- cies, quæ petris adnasci- tur.	auena, ὁ ἑρικός.
	allij nucleus, allium, alnus,	allij nucleus, allium, alnus,	allij nucleus, allium, alnus,	auena, ὁ ἑρικός.
	amaracus, ὁ ἀμάρακος, καὶ τὸ ἀμάρακον.	amaracus, ὁ ἀμάρακος, καὶ τὸ ἀμάρακον.	amaracus, ὁ ἀμάρακος, καὶ τὸ ἀμάρακον.	auena, ὁ ἑρικός.
	amarago herba, ἡ πικρία.	amarago herba, ἡ πικρία.	amarago herba, ἡ πικρία.	auena, ὁ ἑρικός.
	amentum, ἡ χεύχυνος.	amentum, ἡ χεύχυνος.	amentum, ἡ χεύχυνος.	auena, ὁ ἑρικός.
	ametina, ἡ ἀγνός.	ametina, ἡ ἀγνός.	ametina, ἡ ἀγνός.	auena, ὁ ἑρικός.
	amomum, τὸ ἀμωμόν.	amomum, τὸ ἀμωμόν.	amomum, τὸ ἀμωμόν.	auena, ὁ ἑρικός.
	amygdala, ἡ ἀμυγδαλή.	amygdala, ἡ ἀμυγδαλή.	amygdala, ἡ ἀμυγδαλή.	auena, ὁ ἑρικός.
	anchusa herba, ἡ ἀγχουσα.	anchusa herba, ἡ ἀγχουσα.	anchusa herba, ἡ ἀγχουσα.	auena, ὁ ἑρικός.
	andryala ex olerum gene- re, ἡ ἀνδρῶνα.	andryala ex olerum gene- re, ἡ ἀνδρῶνα.	andryala ex olerum gene- re, ἡ ἀνδρῶνα.	auena, ὁ ἑρικός.
	anefum, τὸ ἀνήθον.	anefum, τὸ ἀνήθον.	anefum, τὸ ἀνήθον.	auena, ὁ ἑρικός.
	anethum, τὸ ἀνέθον.	anethum, τὸ ἀνέθον.	anethum, τὸ ἀνέθον.	auena, ὁ ἑρικός.
	anthedon, ἡ ἀνθηδὼν, me- spili species.	anthedon, ἡ ἀνθηδὼν, me- spili species.	anthedon, ἡ ἀνθηδὼν, me- spili species.	auena, ὁ ἑρικός.
	anthela, flos phlei, ἡ ἀνθελή.	anthela, flos phlei, ἡ ἀνθελή.	anthela, flos phlei, ἡ ἀνθελή.	auena, ὁ ἑρικός.
	antirrhizum, τὸ ἀντίρριζον.	antirrhizum, τὸ ἀντίρριζον.	antirrhizum, τὸ ἀντίρριζον.	auena, ὁ ἑρικός.
	apargia herba, ἡ ἀπαργία.	apargia herba, ἡ ἀπαργία.	apargia herba, ἡ ἀπαργία.	auena, ὁ ἑρικός.
	apharca, ἡ ἀφάρκα.	apharca, ἡ ἀφάρκα.	apharca, ἡ ἀφάρκα.	auena, ὁ ἑρικός.
	aphaca, ex olerum genere, ἡ ἀφάκα.	aphaca, ex olerum genere, ἡ ἀφάκα.	aphaca, ex olerum genere, ἡ ἀφάκα.	auena, ὁ ἑρικός.
	aphia herba, ἡ ἀφία.	aphia herba, ἡ ἀφία.	aphia herba, ἡ ἀφία.	auena, ὁ ἑρικός.
	apiastrum, τὸ ἀπιαστρόφυλλον.	apiastrum, τὸ ἀπιαστρόφυλλον.	apiastrum, τὸ ἀπιαστρόφυλλον.	auena, ὁ ἑρικός.
	apium, τὸ σίλιτον.	apium, τὸ σίλιτον.	apium, τὸ σίλιτον.	auena, ὁ ἑρικός.
	aquatio, ἡ ἀκρόα.	aquatio, ἡ ἀκρόα.	aquatio, ἡ ἀκρόα.	auena, ὁ ἑρικός.
	aquifolia, ἡ ἀκρόα.	aquifolia, ἡ ἀκρόα.	aquifolia, ἡ ἀκρόα.	auena, ὁ ἑρικός.
	arachidna, ἡ ἀραχιδνα.	arachidna, ἡ ἀραχιδνα.	arachidna, ἡ ἀραχιδνα.	auena, ὁ ἑρικός.
	aracum, τὸ ἀράκον.	aracum, τὸ ἀράκον.	aracum, τὸ ἀράκον.	auena, ὁ ἑρικός.
	aracus, lenti innascitur, ὁ ἀράκος.	aracus, lenti innascitur, ὁ ἀράκος.	aracus, lenti innascitur, ὁ ἀράκος.	auena, ὁ ἑρικός.
	arbor, τὸ δένδρον.	arbor, τὸ δένδρον.	arbor, τὸ δένδρον.	auena, ὁ ἑρικός.
	arbutus, ἡ κόμπος.	arbutus, ἡ κόμπος.	arbutus, ἡ κόμπος.	auena, ὁ ἑρικός.
	archiniū, siue arachiniū, oleæ morbus, τὸ ἀρχίνιον.	archiniū, siue arachiniū, oleæ morbus, τὸ ἀρχίνιον.	archiniū, siue arachiniū, oleæ morbus, τὸ ἀρχίνιον.	auena, ὁ ἑρικός.
	aria, ἡ ἀρία.	aria, ἡ ἀρία.	aria, ἡ ἀρία.	auena, ὁ ἑρικός.
	arietinum cicer, ὁ λεῖος ὀρί- βινθος.	arietinum cicer, ὁ λεῖος ὀρί- βινθος.	arietinum cicer, ὁ λεῖος ὀρί- βινθος.	auena, ὁ ἑρικός.
	arū, τὸ ἀρῶν, alibi ἀρῶν artus	arū, τὸ ἀρῶν, alibi ἀρῶν artus	arū, τὸ ἀρῶν, alibi ἀρῶν artus	auena, ὁ ἑρικός.
	aruentia, τὰ ἀρουεντία.	aruentia, τὰ ἀρουεντία.	aruentia, τὰ ἀρουεντία.	auena, ὁ ἑρικός.
	arundo, ὁ χέλαμος.	arundo, ὁ χέλαμος.	arundo, ὁ χέλαμος.	auena, ὁ ἑρικός.
	ascalionia cæra, τὰ ἀσκα- λόνια ἑρῶμενα.	ascalionia cæra, τὰ ἀσκα- λόνια ἑρῶμενα.	ascalionia cæra, τὰ ἀσκα- λόνια ἑρῶμενα.	auena, ὁ ἑρικός.

B

Bacca laurina, ἡ ἀκρόα.
bacula, ἡ σπυγία.
beta, τὸ δέντρον, idem τὸ
τρίτον & δέντρον.
beta sylvestris, frutex, ἡ λε-
μοτία.
betula, ἡ σπυγία.
bibinella, ἡ βρινέλα.
blecho blechonis, ἡ βλεχὼ.
blechus, ἡ βλεχὼ.
bletum, τὸ βλετῶν.
blitum, τὸ βλίτον.
boxotia radix, ἡ βοιωτία ἢ
φασίς.
boxoticus cucumis, ὁ βοι-
ωτικός οἶκνος.
brassica radix, ἡ βράσικος.
brassica sylvestris, ἡ βράσικος.
bromus, ὁ βρόμος.
bubula fraxinus, ἡ βουβυλία.
alibi ἡ βουβυλία.
bulbus, ὁ βολλός.

bulbina, ἡ βολβίνα.
buprestis herba, ἡ βούπρεστις.
butomus, ὁ βούτομος.
buxus, ἡ βύξος.
buxus alnina, ἡ ἐνέπνυξος.

C

Cactus ē spinoso genere
re suffrutex, ἡ κάκτος.
cæci nodi, ex quibus prodi
re nō potest ramus: sicuti
γόνιμοι, ex quibus prodit.
ἡ οἷος τυφλοῖ.

cædua, ἡ λουρεζομύνη.
cadytas herba, ὁ καδύντας.
calamus odoratus, ὁ κάλα
μος θυμάτης.

calor, τὸ θερμὸν.
chalbana gummi, est gal-
banum, ἡ χαλβαίνη.

camaciæ tritici species, ὁ
λαμακίας.

canaria herba, ὁ κανάριος.

canna, ὁ δύναιξ.

canchrydias tritici species,
ὁ καγχυδιάς πυρός.

canchrys roris marini fru-
ctus, ἡ κάγχυρος.

chandralia, ἡ χανδράς.

canina sentis, alibi caniru-
bus, τὸ κανινόβατον.

cantharis bestiola, quæ tri-
tico innascitur, ἡ κανθαρίς.

capparis, inturis, ἡ κάπα-
ρις.

capillus ueneris, τὸ ἐπίανθον

capreolus, ἡ ἐλπίς.

caprificus, ὁ ἐρεπτός, καὶ
ἐλαυθός.

caprificatio, ὁ ἐρεπασμός.

carbo, ὁ αἰθέρης.

cardamomum, τὸ καρδιό-
μνον.

carduus pinea, ἡ ἐξίρη, ἀλ-
βίβηξ.

carduus, ὁ σκόλυμος.

carica, ἡ ἰχάς herba est, quā
alii ἐπιωγ, idest pítum ap-

pellant, ἡ σάρξ.

caro, ἡ σάρξ.

caro, fructus pulpa, τὸ π-
οικάρπιον.

carpinus, ἡ ῥυγία.

calia, ἡ κασία καὶ τὸ καυωρον.

calta, ἡ σπαυρία, hanc alij
γλυκυσσίδαυ dulcissidā uo-

cant, ἡ δίοις βάλανος.

castanea, τὸ ἐπύχτος.

caudex, ἡ ἐπύχτος.

caulias succus ex cæso cau-
le, ὁ κανλιάς.

caulis, ὁ κανλός.

carya, ἡ κανρίνα.

cedria, ἡ ἐπύχτος.

cedrus, ἡ ἐπύχτος.

cedrula, ἡ ἐπύχτος.

celastrus, τὸ ἐπύχτος.

celtis, siue lotus faba græca
ὁ λατός.

centaurium, τὸ ἐπύχτος.

cenieria planta est, ἡ ἐπύ-
χτος.

centinæ culicum genus, ἐπύ-
χτος.

cepe, τὸ ἐπύχτος.

ceræ gnidix, τὸ ἐπύχτος.

ceræ cretica, τὸ ἐπύχτος.

cepigethyum, τὸ ἐπύχτος.

cera, eadē quæ brassica syl-
uestris, ἡ ἐπύχτος.

cetarus, ἡ ἐπύχτος.

ceraustes, uermis in arboris
bus, ὁ ἐπύχτος.

cerebrum in palmis, ὁ ἐπύ-
χτος.

cerinthus, τὸ ἐπύχτος.

ceronia, siliquæ species, ita
ab Ionibus appellatur, ἡ
ἐπύχτος.

cinamomum, τὸ ἐπύχτος.

cingulum algæ species, ὁ
ἐπύχτος.

circumnatio, ἡ ἐπύχτος.

circumauctio, ἡ ἐπύχτος.

clauicula edera species, ἡ
ἐπύχτος.

daucus, oleæ morbus, qui et
fungus, & olla, ὁ ἐπύχτος.

cleonæa radix, ἡ ἐπύχτος.

cneceum, ὁ ἐπύχτος.

cneorus, frutex, ὁ ἐπύχτος.

cnicum, ὁ ἐπύχτος.

coctibile, de leguminibus
dicitur, τὸ ἐπύχτος.

coix, πόξις.

colocetia, ἡ ἐπύχτος.

colus, ἡ ἐπύχτος.

columbinum cicero, ὁ ἐπύ-
χτος.

commacum, τὸ ἐπύχτος.

comythes, ubi frequēs ha-
rundo in stagnorum lo-

cis terra pingui & laeta,
ἐπύχτος.

conus, ὁ ἐπύχτος.

consecratrix, iris, ἡ ἐπύ-
χτος.

cor, idem quod medulla,
& matrix, ἡ ἐπύχτος.

corchorus, ὁ ἐπύχτος.

coriannum, τὸ ἐπύχτος.

coriannifum, τὸ ἐπύχτος.

corinthia radix, ἡ ἐπύχτος.

cornia, idest quibus ad
coronas utimur, τὸ ἐπύ-
χτος.

cornus, ἡ ἐπύχτος.

cornus foemina, foemina
cornus, ἡ ἐπύχτος.

comicularia, papaueris syl-
uestris species, ἡ ἐπύχτος.

coronarij generis, τὸ ἐπύ-
χτος.

coricæ,

cortex, ὁ φλοιός.
corymbia, ederae species,
ἡ κορυμβία.

costus, ὁ κόστος.
cotonea mālus, ἡ κονιδάινος
μηλιά.

conurnix, plantago ab alijs
dicta, ἡ ὄρνυξ.

cardaio, in fico morbus, ὁ
κράσιος.

cradæ, αἱ κράσαι.

cranium, τὸ κρανίον.

crataegus, ἡ κράταγις, καὶ
κράταγιών.

crateus, ἡ κράτειος.

crispa brassica, ἡ ἐλάφουλος
βράσηος.

crocus & crocum, ὁ κρίθος.

croton, ὁ κρότωνος ἄρbor, &
aliud morbi genus, uide
γρήγορι.

cuciothora, arbor, τὸ κον-
ιδόθορον.

cucurbita, ὁ λολοκώθας, καὶ
λολοκώθης.

cucumis, ἡ σίκκος, ὁ σίκκος
αἰθί.

cucumis sylvestris, ὁ σίκκος
ἀγρίος.

culices caprificuū, οἱ ψάθυνοι.

culmus, ὁ κάλαμος.

cuminum, τὸ λύμνον.

cunila, τὸ θυμόν.

cupressus, ἡ λευκαίτης.

cutis, τὸ δέρμα.

cycæ, palmarum genus, αἱ
κύκαι.

cyx, ἡ κύξις.

cyma, ἡ κύμα.

cyprum allium, τὸ λευκί-
ον σκόρδον.

cytissus, ὁ κύτισος.

D

Decumminatio, ἡ ἀλλο-
κοπή.

desyderium flos, ὁ πόθος.

dictamum, τὸ δίκταμον.

dracunculus herba, τὸ δρα-
κόνιον.

drupæ oliuæ, δρακύναι.

ἱλαία.

drypis, ex humili materia

planta, ἡ δραπίς.

dulcis radix, θυγαλυκαία.

quæ & ἡ σενθικὰ dicitur.

E

E Benus, ὁ ἔβνος.

edera, ὁ ἐδής.

elium, suffrutex, τὸ ἑλμο-
καλός.

elleborus, ὁ ἐλλάβορος, uera

trum.

elleborina herba, ἡ ἐλλ-
βορίνη.

enthusicum, herba ex ole-

rum genere, τὸ ἐνθουσικόν.

epimetry, herba flore ca-

rens, τὸ ἐπίμετρον.

equarium, τὸ ἐκπασσίλιον.

equeltris, radix in Scythia

nascens, ἡ ἐκπακία.

equicoeniculum, τὸ ἐκπο-
μάρετρον.

erica, ἡ ἐρίκη.

eringium, suffrutex, τὸ ἑ-
ρίγιον.

eruanga, eruo innascens,

ἡ ἐρεδαγχα.

eruca, τὸ ἐνζυμον.

erubicum, τὸ ἐρυθρίον.

euonymus, arbor, ὁ εὐ-
νυμος.

F

Faba, ὁ βίβνος.

fabetum, λευκόν.

fagus, ἡ φάγος.

febrifugia, fel terre, centau-

rium, τὸ λευκάνθειον, καὶ ἡ

λευκάνθεος.

ferula, ἡ φάραξ.

ferulago, ἡ φερουκαία.

ficus Aegyptia, ἡ συκὴ Ἀ-
γυπτία.

ficus, ἡ συκὴ, est etiam mari-

tima planta.

ficitia myrrha, πλάση

σμίρνη.

fidicula, polypodium, τὸ

πυλοπόδιον.

filicula, τὸ τευχμακίον.

filix, ἡ φήλις.

filix foemina, ἡ θάλυπηκία.

simus, ἡ κόπθος.

simus stipularis, ἡ κόπθος

συρμαστία.

fissiles cepæ, τὰ χυπὰ.

fulfuraria harundo, ἡ σόνευξ.

foeminifica, herba, τὸ θυ-

λύγονον.

foeniculus, τὸ μέραθρον.

foenumgræcum, ἡ ἐοῦκρος,

καὶ ἡ θυλλή.

flamma, seu flammula, suf-

frutex, & flos coronamē-

tis aptus, ἡ φλόξ.

fleus, ὁ φλώος.

flos, τὸ ἀέθρος.

fluida, frutex, ὁ φῶς, medica-

mentum etiam inibi.

folium, τὸ φύλλον.

fossio, ἡ σκαπάνη.

fraus, herba, ἡ ἀπάτη.

fraxinus, ἡ μηλιά.

fremium, ἡ ἀνώνμη, καὶ ἀν-
ωνμία αἰθί.

frondiflora, herba τὸ φυλ-

λανθός, in codice tamen

græco scriptum est ἀφυλ-

λανθός.

fructus, ὁ καρπός.

fruges, ἡ στήρα.

frumentum, ὁ σίτος.

frumentago, ὁ στήριος.

frutex, ὁ θάμνος.

fruticulus, ὁ ἔλλογμοσθός.

fungus, ὁ μύκης.

fungus, oleæ morbus ita

dictus, ὁ μύκης.

fustur, τὸ πύτυρον.

fusus, agrestis suffrutex, ἡ

ἀγροκτυλός.

fusus agrestis, ἡ φόσος.

G

Galla, ἡ λυγία.
 Gallica, γαλῖνος, ἢ γαλῖνον, alibi γαλῖνος.
 gallica mepili species, ἢ αὐθινοσίδος.
 gardie cepæ, τὰ γάρδα
 λεόμενα.
 geminalis, τὰ ὀρμηνοί.
 gemma in uite, ὁ ὀφθαλμός.
 geniculum, ut in harundinibus, τὸ γόνυ.
 getmen, ὁ βλαστός, καὶ τὸ βλάστημα.
 germinatio, ἡ βλάστησις.
 gethyum, τὸ γήθιον.
 gith, τὸ αὐθιμιον.
 gladiolus, ὁ λείπτειρος.
 glans, ἡ βάλανος.
 glans peculiaris Aegypti planta, ἡ βάλανος.
 gongri in arboribus & precipue in olea nascuntur. οἱ γόγγροι, id autē & τὸ πρέμιον premnum, & λερότων, id est croton appellatur.
 gramen, ἡ ἄχρησις.
 grana ficaria, quæ ficibus infunt, αἱ λυγχαμίδες.
 granum gnidium, ὁ λείδισ κώρος.
 grossi qui & grossuli ficus, τὰ ὄβια.
 gummi, τὸ κώμι. Reor tamen interpretandum uirgam sanguineam.

H

Harundo laconica, ὁ κάλαμος λακωνικός.
 hemodorum foenograceo innascitur & cumino, τὸ αἰμόδιον.
 harundo sagittaria, ὁ κάλαμος ὀφθαλμικός, quam ὀφθαλμικήν, id est ceticam uocant.
 harundo, spadonis nomine, ὁ κάλαμος ὀφθαλμικός.
 harundo bombycia, κάλα

μος βομβυκίας.
 harundo armamentaria, ὁ κάλαμος ζυγίτης.
 harundo texilis, ὁ κάλαμος πλοκίμος.
 harundo tibialis, ὁ κάλαμος αὐλιτικός.
 harundo uallatoria, ὁ κάλαμος χαρτικός.
 hastula regia, ἡ ἀσφοδελος.
 hedera, ὁ λυθός.
 helenium, τὸ ἑλνθιον.
 helica, salicis species, ἡ ἑλίκη.
 herba lanaria, τὸ σρούθιον.
 herba, ἡ πύα, & quæ species liter herba appellatur.
 herbacea, τὰ πικρὰ.
 herbula indifferenter, τὸ πύασιον.
 herculacea, spinæ genus, ἡ ἥρακλεια.
 herculana panace, τὸ ἥρακλειον πέντικος.
 herculana, ἡ ἥρακλεια.
 herculanum papauer, ἡ ἥρακλεια μέκων.
 hibiscum, ἡ ἀλτήα.
 hippophaës, quod ex laetaria conficitur, τὸ ἱπποφαίς.
 hircibarbula herba, ὁ ἥρακλειον.
 hircispina, ἡ ἥρακλειον.
 hirculatae uites, αἱ ἥρακλειον.
 hirundinaria, τὸ χελιδόνιον.
 humilis materia, τὰ ὑλθιματὰ.
 humirubus, ὁ χαμαιβάθος.
 humor, τὸ ὑγρόν.
 hyacinthus, ὁ ὑάκινθος.
 hyphear, fructus quidam ilicis, τὸ ὕφαιον.
Iafiona, ὁ ἰασόνιον.
 icma, ἡ ἰκμα.
 idea pinus, ἡ ἰκμα πίνος.
 ilex, ὁ ἰκμα.

incofibile, de leguminibus dicitur, τὸ ἀσφαιμον.
 inguinalis herba, ὁ αἰνέως.
 inoculatio, ὁ ὀφθαλμικός.
 insitio, ἡ ἰσφαιτία.
 insitiones, αἱ ἰσφαιτίαι.
 intubus, ἡ λυγία.
 intubus, siue ampulla, seu cichorea, τὸ λυγίον.
 incubus erraticus, τὸ λυγίον ἄχρησιον.
 Iouis flamma, ὁ αἰὼς πυρός.
 arbor.
 Iouis flos, τὸ αἰὼς αὐτοῦ.
 iphyum, τὸ ἱφύον.
 ipnum, τὸ ἱπνον.
 ipsipis, uermis, ὁ ἱψίς.
 iris consecratrix, ἡ ἱεὺς.
 irrigatio, aquatio, ἡ ὑδρία.
 isynichium, τὸ ἰσυνίχιον.
 iuba, quam scilicet miliacea & quæcumque miliacea comam proferunt, ἡ φοβή.
 iuncus, ὁ ἰκμα.
 iuniperus, ἡ ἰκμα.
 iuxta spina, ἡ ἰκμα.

L

Labrusca, ἡ σκαφύλη.
 lacatba, ἡ λακάθια.
 lachryma, petris adnascitur, τὸ δάκρυον.
 laconica lactuca, ἡ λακωνικήν θειδικήν.
 laconicus cucumis, ὁ λακωνικός σίκκος.
 lactifuccatio, ὁ ὀσμικός.
 lactuca, ἡ θειδικήν, καὶ ὁ θειδικός.
 lactuca caprina, seu lactaria, τὸ μακρινόν, alibi τὸ ὑμυκός.
 lanuginus, ὁ χυμικός.
 lappa, in lente nascitur, ἡ ἀπαιτία.
 lappa herba, ἡ ἰκμα.
 lappa, bi ἀπαιτία.
 lappago, τὸ ἰκμα πίνος.
 latex,

larix, picea, ἡ πίτυς.
 laserpiciū laser, τὸ σίλαριον.
 laterale, germen, ἡ πύαβλος.
 laticaulis, lactuca, ἡ πλατυ-
 κουλός θερλακύν.
 latifolia, esculus, roboris
 species, ἡ πλατυφυλλία.
 laurus, ἡ δάφνη, καὶ δασυρίς.
 lectivortaria, species aceris,
 ἡ κλυντροχός.
 legumina, τὸ δασυρίαι.
 legumina chedropa, τὴν χη-
 δροπᾶ.
 letmna, λήμονα.
 lens, ὁ φακός.
 leniscus, ὁ ἡνίοχος.
 levis brassica, ἡ λαίικανλος
 γάρανθ.
 lignum, τὸ ξύλον.
 ligusticum, τὸ πέντακλον.
 liliū, τὸ λεῖτον, ὃ ἡ κρινονία.
 limonium, ἡ λαυμονία genus
 fremij, id est αὐτὸ μινυς.
 lingua ceruina, τὸ σκολο-
 πηγίδιον.
 linogenista, τὸ λινόσπαστος.
 linum, τὸ λινον.
 litium, idem quod narcis-
 sus: postea enumerās flo-
 res ait, μὲν γὰρ τούτων ὁ νάρκισ-
 σος, καὶ τὸ λῆριον.

liquoatio, ὁ χυλισμός.
 lolium, ἡ ἀλεα.
 lotus, herba, τὸ λότην.
 lucernula, ἡ λυχνίς.
 lucina, arbor, ἡ ἐλῆθρα.
 lupinum, ὁ ὀρβανός.
 lusum, quod est uelut
 gis in pino, τὸ λῦσον.

M

Adonais, ὁ μεδοναίς,
 nymphea est.
 magydaris, ἡ μαγύδαρις.
 malinathalla, in Aegypto
 planta nascens, ἡ καλινθα-
 θάλλα.
 malua, ἡ μαλάχη.
 malua sylvestris, ἡ μαλά-

χη ἄγρια.
 malum ceteris, ἡ ἀγρία ῥοχία, καὶ
 ἡ κυκλάμινος, καὶ τὸ κυκλά-
 μινον.
 malum pericum, τὸ μῆλον
 πύρρον.
 malus, ἡ καλία.
 malus perlica, ἡ μαλία πύρ-
 ρος.
 malus uerna, ἡ καλία ἱερνός.
 malus medica, ἡ μελία
 μεδική.
 mandragora, ὁ μακροκαρπός
 maritica, herba, τὸ ἀγρία ῥο-
 χον.
 mariscus, tunci species, ὁ
 ὀλόχωνος.
 marium apinus, παρκαλία
 πίτυς.
 maridmū granū, species
 lactaria, ὁ ἡβάλτος πίκκος.
 marrubium, τὸ πύρρον.
 mascula lactaria, ὁ ἀγρία τ-
 θυμάλλος.
 maspetum, laserpiciū spe-
 cies, τὸ μεσπτον.
 medica herba, ἡ μεδική, uel
 μεδική.
 medulla, ὁ κνιόλης, id est quod
 μέτρα.
 medulla mollis, ἡ ὑπόσπαστος.
 medulla, ἡ μίτρα, alibi ma-
 trix.
 melampodium, τὸ μελαμ-
 πόδιον.
 melampyrum, in frumen-
 tis Siculis nascitur, quem
 admodum & lolium, τὸ
 μελάμπυρον.
 melfrugum herba, ὁ μελίαν-
 σίτης.
 melothrus herba, ἡ με-
 λωθρος.
 melothrum suffrutex, τὸ με-
 λωθρον.
 mentiflora, ἡ μένταρος.
 mentha, ἡ κίνθη.
 mentastrum, τὸ ἡδύστρομον.
 melpilus, ἡ μεσσίλη.

miūm, ὁ κίγχερος.
 mnasium, τὸ μενασιον.
 moly, τὸ μελίον.
 montapium, τὸ ὀροσίλιον.
 montulmus, ulmi species,
 ἡ ὀροσίλη.
 morus, ἡ στυκίμνος.
 morus Aegyptia, ἡ στυκίμ-
 νος ἡγυπτική.
 mula, herba, ἡ ἡμίονος.
 multiplex, τὸ πολύχου.
 muralis herba, τὸ ἡβρόνιον.
 muralis herba, seu murici-
 da, τὸ μούρον.
 muscus, alibi bryum, algæ
 species, τὸ βρύον.
 myrrha, ἡ σμύρνα.
 mirtha stillaticia, ἡ σπικτή
 σμύρνα.
 myrica, tamarix, ἡ μυρική.
 myrtaria, lactaria, ὁ μυρτίτης
 πυθόμυλλος.
 myrtus, ὁ μυρτίτης, alibi ὁ
 μυρτίτης.

N

Nærum, τὸ νάριον.
 narcissus, herba, ὁ
 νάρκισσος.
 nardus, ἡ νάρδος.
 narta, ἡ νάρτα.
 nasturtium, τὸ κάρδαμον.
 nepa, suffrutex, ὁ σκορπίος.
 nepita, ἡ κερκεμίνθη.
 nepotes, αἱ ἡραβλαστέσσει.
 nepotum procreatio, ἡ πηλο-
 γιωματικὸς.
 nerul in arboribus, εἰ ἡδύ-
 ις ἡνός.
 nigella, herba, τὸ ἀνθμον.
 nigella foliosa, alia ab an-
 themo, τὸ ἀνθμον φυλλώδες.
 nodus, ὁ ὄζος.
 nouale, ἡ νάος.
 nucamentum, ἡ πίκα ἄρβο-
 re flos, uel flos proporti-
 one respondens, ὁ κύνθηρος.
 nucleus, ὁ πυρρῶς.
 nux auellana, ἡ ἡρακλινωτά-
 κη κερνία.

nux castanea, ἡ καστανὴν ὀνύχην
 nux iuglans, nux euboica,
 nux persica, ἡ θυβοϊκὴ λαρύνα, καὶ λαρύνα περσικῇ.
 nux lactanæ fructus, ἡ καρύνη.
 nux pinus, ὁ ἐρρεβίλος.
 nymphæa, ἡ νυμφαία.

Oculus caninus, ὁ ἀνθρώπου.
 ocymum, ἡ ὀκυμαία.
 oenanthe, quæ vitiflora latine dici potest, ἡ οἰνοσάβη.
 œnohera, ὁ οἰνοθήρας.
 olea, ἡ ἑλαια.
 olea sylvestris, ἡ ἀγρὸς ἑλαια.
 oleagnus, ἑλαιαγνος, plantæ in lacu orchomenio nascens.
 oleaster, ὁ ὀλίανθος.
 olera, τὰ λάχανα.
 oleri arbores, τὰ δένδρεα λάχανα.
 olium, ἡ ἑλαιονόμος.
 olla, morbus olegita appellatus, ἡ ὀλίτις.
 ononis suffrutex, ἡ ὀνοσί.
 onus, uermis genus in Africa, ὁ ὄνος.
 opition, ὁ ὀπιτιον.
 orbis in ligno, ἡ ὀρεβία.
 ordeago, ὁ ὀρετανίας.
 ordeum, ἡ ὀρεθία.
 origanum, ἡ ὀρίγανος, καὶ ὀρίγανος.
 oryza, ἡ ὀρύζα.
 ostrya, ἡ ὀστρεά. ostrys idem ἡ ὀστρεα.

Padus, arbor uel frutex, ἡ πιδύς.
 palea, ἡ πάλια.
 paliurus, ὁ παλιούρος.
 palma, ἡ φοίνις, est etiā species plantæ marinæ.
 palmities, τὰ ἐλπίδια.
 paludapium, ἡ ἐλπίδιον.

panacea, ἡ πανακία.
 panace æsculapica, ἡ πινάκη.
 panace chironea, ἡ χιρὸν.
 panicum, ὁ ἑλνυμος, καὶ μάλινος.
 papauer, ἡ μπάκλα.
 papauer erraticum, ἡ βοσκία.
 papyrus, ὁ πάπυρος.
 palinaca, ἡ πάλια.
 heciolus, ὁ ἑκίολος.
 pediculus, ὁ πεδίκλος.
 pennis, quæ certus producit, ὁ πεννός.
 pepo, cucumis, ὁ σίκυθος.
 perdicium, ἡ περδικία.
 petrisus, uessicariæ species, ὁ πετρίος.
 persea, peculiaris Aegypti arbor, ἡ περσία.
 persicum, ἡ περσίτις.
 pes gallinaceus, herba ex olerum genere, ἡ πεσκαλίας.
 petina, ἡ πετίνη.
 petræum, ἡ πετρίτις.
 peucedanum, ἡ πευκεδανία.
 phalangium, bestiola in e ruonāciens, ἡ φαλάγγιος.
 phellodrys, ita ab Arcadibus appellata arbor, ἡ φελλόδρυς.
 philycia, ἡ φιλυκία.
 piper, ἡ πείπερα.
 picus martius, avis, ὁ πικύς.
 picea agrestis, ἡ πίκυς ἀγρία.
 picea pediculifera, ἡ πίκυς φθαροφόρος.
 pilus, quæ roboribus nascitur, ὁ πῖλος.
 pinus conifera, ἡ πινύς.
 pinus picosa, ἡ πινύς.
 pinus pinaster, pin astrum, ἡ πινύς.
 pira, frutex, ἡ περσία.
 piraster, ἡ περσία.

pirus phocis, ἡ περσία φωκίας.
 pirus, ἡ περσία.
 pisum, legumen, ὁ πικύς.
 pix, ἡ πίκυς.
 placida, species roboris, ἡ πλάκιδος.
 plantago, ἡ πλαντάνος.
 plantago, quæ & ἀγρὸς γλωσσὴ, agnina lingua, ὁ πλαντάνος.
 planta, ἡ πλαντάνος.
 platanus, ἡ πλάτανος.
 pollicaria, ἡ πόλινος.
 polium herba, ἡ πόλιος.
 polium, ἡ πόλιος.
 poma arbuti, τὰ μυρσίνια.
 populus, nigra populus, ἡ πούπα.
 procelia, ex olerum genere, ἡ προκίλια.
 portulaca, herba, ἡ πορτολάκη.
 portulaca, arbor, ἡ πορτολάκη.
 ponicida, bestiola quæ porris, atq; alijs pluribus herbis innascitur, ἡ πονικίδια.
 possum, est & algæ species, ὁ ποσσός.
 prunus, ἡ πυρραυλίας, καὶ πυρραυλίας.
 pternix, caulis ex cactio spinæciens, ὁ πτερνίξ.
 pugio, herba, ἡ πύγιος.
 pumex, ἡ πύμυξ.
 punica, ἡ πύμυξ.
 punica, quæ nucleo caret interiori, ἡ πύμυξ.

Quadratoria, τίτρα.
 quercus, ἡ κερκυρία.
 quinquifolium, ἡ πενταφύλλον.
 quinquepeta, ἡ πενταπέταλος.

Racemus, ὁ ῥάκμος.
 radicias, succus qui ex cactis

ex cetera radice prodit, ρίζες.	δ	rum plantarum, ut cumi- ní, ἡ ἀλμα.	planta nascens, ἡ οἶδα.
radicidium, ἡ ριζοθμία.		salvia, ἡ λιλίσθακος.	filago, herba, ἡ ἱορρανόπτερ.
radix, ἡ ρίζα.		sambucus, ἡ ἀκτὴ & ἀκθός.	filigo, ἡ ὀλίγη.
radix lithoalassia, ἡ ῥιζανίς λοιθολασσία, radix litho- alassia, ἡ κρὰ θρακία, thracia.		samothraciae cepae, τὰ σε- μαθράκια ἐκρύμμενα.	filiqua, quam sicum Aegy- ptiam appellat, ἡ λαρωιτ.
radicatio, ὁ σφακτισμός.		sansucum, ἡ ἀμέρακος, κρὰ ὁ ἀμέρακος.	filiqua, speciali nomine, ὁ δύληθ.
rami, οἱ ῥάμνοι.		sapor, ὁ βαλός, κρὰ λαμός.	filique, οἱ ῥοβοί.
rhamnus, ὁ ῥάμνος.		sari, τὸ σάει.	sinapi, τὸ ῥάπιν, κρὰ σίνινπ.
ramulus, furculus, ὁ ῥάμνους.		sarculatio, ἡ ὀσκαλισ.	silymbrium, τὸ σισύμβριον.
ramus, ἡ ῥάμνος.		sarculatio, ἡ ὀσκαλισ.	silyrinchium, τὸ σισυρίχιον.
ramus, praegrans ramus, ὁ ἀκρῆμον.		satureia, ἡ θύμβρεα, κρὰ τὸ θύμ- βρον.	situs, setedi tempus, ἀρῶς.
rapa, ἡ γορνλός.		satus, ἡ σαρῆ.	solaris, herba, ὁ σπύγχρος, ἀλ- βι uessicariam uocat.
raphanus, radix, radícula, ἡ ῥαφανίς.		satus, setedi tempus, ἀρῶς.	solaris, herba, τὸ ἀλίστροπιον.
recticortex, species robo- ris, ἡ δινύφλοιθ.		scalas, fructus casti, ὁ σκα- λίας.	sonchus, ὁ σόγχος.
resina, ἡ ῥητίνη.		scammonia, ἡ σκαμμονία.	sorba, τὰ σόρβα.
rhutrum, suffrutex, τὸ ῥύ- τρον.		scandix, ἡ σκάνδιξ.	forbus, ἡ ῥα, κρὰ ἡ οἶα, κρὰ οἶα.
rigatio, ἡ ῥιζοθμία.		scilla, & squilla, ἡ σκίλλα.	sphacelus, herba salviae fe- rè similis, σφάκιλθ.
robur, quercus, ἡ ῥούρος, est etiam marinum quiddā, quod petris adnascitur.		scilla epimencia, ἡ ῥιζοθμία.	sphondyla, bestiola quae dam, ἡ σφονδύλη.
robur nigrū, τὸ μαλινύθρον.		scissima agrestis, ὁ ῥαλὸς ἡ ῥαλὸς, ἀλβὶ ὀξύν.	spatha palmae, ἡ σπάθα.
roratio, morbus uitis, ἡ ῥοά.		scythialis cucumis, ὁ σκυτι- λίσθ.	spica, ἡ σπικ.
rosa, ἡ ῥοδιανία.		scythica radix, ἡ σκυθική.	spina, ἡ σπιν.
rosa canina, τὸ λαυρόροδον.		securina, quae aphace inna scitur, ὁ πελκύνος.	spina cædida, ἡ λονία κρὰ κρ.
rosmarinus, ἡ ῥοσμανίς.		semen, ἡ σπέρμα, ἡ ῥοά.	spina muralis, ἡ μινία κρὰ κρ.
rotundi caulis lactuca, ἡ σπυρνόκαυλθ.		semetes, id est tempora qui bus quæq; herbae proue- niunt, οἱ ἀρότοι.	spina, arbor peculiaris Ae- gypti, ἡ ἀκρῆτος, τινιχίτις.
rubeia, suffrutex, rubia ali- bi, τὸ ῥοδὸν θιόλεον.		semifertarius, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	spina dipfas, seu sitiens, ἡ ἀκρῆτος θιόλεος.
rubigo, morbus seminum, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.		senecio, herba ex olerum genere, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	spina regia, ἡ ἀκρῆτος βασι- λίσθ.
rubus, ὁ ῥοδὸν θιόλεον.		serpyllum, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	spodias, ἡ σποδία.
rumex, τὸ ῥοδὸν θιόλεον.		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	squalor, ὁ αὐχμός.
ruta, τὸ ῥοδὸν θιόλεον.		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	stercoratio, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.
rutula, τὸ ῥοδὸν θιόλεον.		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	stiba, frutex, ἡ σίβα.
		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	stimulus in lapide, τὸ ῥοδὸν θιόλεον.
		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	stoebea, frutex, ἡ σίβα.
		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	struthea málus, ἡ σπυθίθ.
		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	stengys, tritici species, ὁ εὐχμός.
		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	struthus, herba, ὁ σπυθίθ.
		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	styrax, ὁ σπυθίθ.
		sefium, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.	suber,

S

Salix, ἡ ῥιζα.
salix frugiperdi, ὡς ῥο-
δὸν θιόλεον.
salicortex, species roboris,
ἡ ῥοδὸν θιόλεον.
salugo, morbus nonnulla

rum plantarum, ut cumi-
ní, ἡ ἀλμα.
salvia, ἡ λιλίσθακος.
sambucus, ἡ ἀκτὴ & ἀκθός.
samothraciae cepae, τὰ σε-
μαθράκια ἐκρύμμενα.
sansucum, ἡ ἀμέρακος, κρὰ
ὁ ἀμέρακος.
sapor, ὁ βαλός, κρὰ λαμός.
sari, τὸ σάει.
sarculatio, ἡ ὀσκαλισ.
sarculatio, ἡ ὀσκαλισ.
sarculatio, ἡ ὀσκαλισ.
satureia, ἡ θύμβρεα, κρὰ τὸ θύμ-
βρον.
satus, ἡ σαρῆ.
satus, setedi tempus, ἀρῶς.
scalas, fructus casti, ὁ σκα-
λίας.
scammonia, ἡ σκαμμονία.
scandix, ἡ σκάνδιξ.
scilla, & squilla, ἡ σκίλλα.
scilla epimencia, ἡ ῥιζοθμία.
scissima agrestis, ὁ ῥαλὸς ἡ
ῥαλὸς, ἀλβὶ ὀξύν.
scythialis cucumis, ὁ σκυτι-
λίσθ.

planta nascens, ἡ οἶδα.
filago, herba, ἡ ἱορρανόπτερ.
filigo, ἡ ὀλίγη.
filiqua, quam sicum Aegy-
ptiam appellat, ἡ λαρωιτ.
filiqua, speciali nomine, ὁ
δύληθ.
filique, οἱ ῥοβοί.
sinapi, τὸ ῥάπιν, κρὰ σίνινπ.
silymbrium, τὸ σισύμβριον.
silyrinchium, τὸ σισυρίχιον.
situs, setedi tempus, ἀρῶς.
solaris, herba, τὸ ἀλίστροπιον.
sonchus, ὁ σόγχος.
sorba, τὰ σόρβα.
forbus, ἡ ῥα, κρὰ ἡ οἶα, κρὰ οἶα.
sphacelus, herba salviae fe-
rè similis, σφάκιλθ.
sphondyla, bestiola quae
dam, ἡ σφονδύλη.
spatha palmae, ἡ σπάθα.
spica, ἡ σπικ.
spina, ἡ σπιν.
spina cædida, ἡ λονία κρὰ κρ.
spina muralis, ἡ μινία κρὰ κρ.
spina, arbor peculiaris Ae-
gypti, ἡ ἀκρῆτος, τινιχίτις.
spina dipfas, seu sitiens, ἡ
ἀκρῆτος θιόλεος.
spina regia, ἡ ἀκρῆτος βασι-
λίσθ.
spodias, ἡ σποδία.
squalor, ὁ αὐχμός.
stercoratio, ἡ ῥοδὸν θιόλεον.
stiba, frutex, ἡ σίβα.
stimulus in lapide, τὸ ῥοδὸν
θιόλεον.
stoebea, frutex, ἡ σίβα.
struthea málus, ἡ σπυθίθ.
stengys, tritici species, ὁ
εὐχμός.
struthus, herba, ὁ σπυθίθ.
styrax, ὁ σπυθίθ.
suber,

suber, ἡ ἰσός, ὃ ὁ φυλλός.
succatio, ἡ χυλαιοσίς.
succus, liquor, ὁ ὀπός.
suffrutex, frutex, τὸ φρυγανόφυλλον.
furculus, ramulus, ὁ ὠλέας.

T

TAbes, affectio quaedam arborum, ἡ ἐκπληξίς.
tabitudo, morbus cicercis, ὁ σφαλισμός.
taxus, ἡ μίλος, alibi μάλυος.
terebinthus, ὁ τερβινθος, ὃ τριμυθός.
teredo, ἡ τερροδία.
testiculus, ὁ ὄρχος.
tetralix, suffrutex, ἡ τετραλίξ.
thescum, herba, τὸ θέσκον.
thalea, ἡ θάλασσα.
thapsia, ἡ θάψια.
thelyphonum, τὸ θελύφονον.
thyrurus, uessicariz species, ὁ θυρurus.
thusia, ἡ θύσια, alibi θύα.
thuivum, τὸ θύιον, eadem est arbor.
thus, ὁ λιβανωτός, καὶ ὁ λίβανός.
thymus, ὁ θυμός.
tilia, ἡ τίλια.
tinea, ὁ θρίψ.
tupha, ἡ τίφη.
tuphium, τὸ τίφνον.
tribulus, ὁ τριβέλος.

trimestre genus est hordei, τὸ τρίμηνον. puto tamen Theodorum legisse τὸ τριμυθόν.
trinodis, arboris nomen, τριός.
trionum, τὸ τριόνιον, alibi erysimum.
trifago, herba, ἡ χειμάδιος.
triteltiger, accipiter, ὁ τριτόξος.
trititum, ὁ πυρός.
trititum ponticum atrum, ὁ μελάμπυρος ποντικός.
tuber terrae, ὁ λακκάμυρος.
tuber, τὸ οἶονον, alibi οἶονον.
turdaria herba, ὁ σκακίλος.
turgor, id est cum arborescunt, ὁ λοπακτός.

V

Veneria, ἡ ἀκροός.
uena, αἱ φλέβες, ἡ φλέψ.
ueratrum, ὁ ἐμάμβρος.
uerbascum, ἡ φλόμος.
ueriquercus, ἡ ἑνυμείδων.
uernilago, suffrutex, uernilago alibi, ὁ χειμαλίσκος.
uessicaria herba, τὸ σπύγγον.
uillus, nucis fulus, ὁ ἰούλος.
uincaceum, seu acinus, τὸ γύγαριον.

uincaperuincia, ἡ χειμαλίσκος.
uingum, τὸ οὔγγον.
uiola, ἡ ἰωνία, ὃ τὸ ἰόν.
uiola alba, τὸ λευκόν.
uiola nigra, τὸ μαλακόν.
uiola matronalis, τὸ λευκόν.
uiola flammea, flammula, τὸ φλόγιον.
uirga, ἡ ῥάβδος.
uigulta, τὸ φρυγανόφυλλον.
uisum, ἡ ἱξία.
uistiflora, herba, ἡ αἰσάνθη.
uitis, ἡ ἀμπύλος. est etiam in mari nascens planta.
uitis insana, ἡ ἀμυγλὴ μαλακός.
uitis canthara, ἡ ἀμυγλὴ λευκός.
uitis, quam vocat capniis, ἡ κάπνιος ἀμυγλός.
ulmus, ἡ ὑλμία.
unedo, ἡ νυλμία, καὶ ὁ εἰσπρος.
uniflora, τὸ μονόφλοον.
uolucrum, ἡ αἰσάνθη, καὶ τὸ λινύριον.
uredo, arboris affectio quaedam, ὁ ὠλεσμός.
urica, vermis in cicere nascens, ἡ κάμμη.
urtica, ἡ ἀκαλὺφς.

F I N I S.



ERRATA, QVAE RELECTO VOLVIMUS
NE DEPREHENDIMVS.

Pag. 1. ver. 1. & pag. 2. ver. 21. Theodori Gazz. 11. 32. ad affectiones. 13. 20. consummari. 22. 23. pro-
uenit. 27. 28. ligno. Quidam. ver. 20. Talem. 29. 39. ulmi folliculis. 36. 25. gignit. 55. 6. quasdam perra-
ras. 55. 26. quod uel. 56. 43. componunt. 78. 37. consummetur. 84. 6. unig. 87. 37. improbo, frigido,
90. 39. alijs minime plura. 92. 9. Quin & ver. 10. coagmentantur. 97. 15. eundemq. 101. 10. quodq. ra-
dices 104. 17. canchrydias silengys. alexand. ver. 23. & canchrydias 114. 37. humilioremq. 126. 40. sub-
rutilum. alterum. 128. 14. sans ualet. 131. 31. exoriente. 151. 12. argumentū. 154. 46. fauonius. 160. 47. ui-
deantur. 171. 28. materiam. 177. 3. solent. Sinitia. 189. 10. ad palmas sale. 191. 49. multiplici. 192. 35. So-
la pluuia atq. frigida. 201. 10. ab una parte. 214. 48. fructuum. 215. 43. maiores fiant terra. 231. 29. hu-
moris conserti. 232. 28. reddi. 233. 30. sapores permulti. 238. 16. intestinus. 243. 10. Reliquum. 250. 1. sui
generis. ver. 4. sui generis. ver. 47. plenus ille ac ualidus. 251. 45. infu.

BASILEAE APVD ANDREAM CRATANDRVM, MENSE
MARTIO, ANNO M. D. XXXIIII.





